

**Міністерство охорони здоров'я України
Харківський національний медичний університет**



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕЙРОНАУК

ЗБІРНИК ТЕЗ міжвузівської наукової конференції

Харків, 2015

(средний балл - $38,6 \pm 2,9$) выше показателей реактивной тревоги (средний балл - $34,7 \pm 3,0$). Средний балл по шкале Гамильтона у мужчин: $17,0 \pm 2,3$ баллов, у женщин: $18,0 \pm 2,3$ баллов. По шкале качества жизни ниже всего были оценены: «Психоэмоциональное состояние», «Межличностное взаимодействие», «Общее восприятие качества жизни».

Вывод. Таким образом, у лиц-переселенцев из зоны АТО, наблюдаются различные психоэмоциональные нарушения, которые требуют дальнейшей коррекции в условиях специализированных медицинских учреждений.

Эффективность арт-терапии пациентам с рекуррентным депрессивным расстройством.

Хмайн С.

Харьковский национальный медицинский университет

Актуальность темы обусловлена недостаточной эффективностью психотерапии, проводимой больным с рекуррентным депрессивным расстройством, а также необходимости гендерными различиями, наблюдавшимися в клинической практике, сказывающимися на эффективности применения арт-терапии больным рекуррентным депрессивным расстройством с учетом половой принадлежности больных.

Цель работы - определение эффективности применение арт-терапии больным рекуррентным депрессивным расстройством с учётом гендерного фактора.

Задачи обследования следующие: 1 – выяснить степень диагностической эффективности АТ с учетом гендерного фактора; 2 – отметить гендерные особенности больных РДР при применение АТ; 3 – определить необходимую длительность проведения АТ у больных с РДР с учетом половой принадлежности.

В данном исследовании были применены следующие методы: 1 – клинико-диагностический; 2 – рисуночный метод; 3 – шкала депрессии Гамильтона; 4 – шкала тревоги Гамильтона.

В исследовании принимали участие 20 пациентов – мужчин и 20 - женщин в возрасте 18 - 30 лет.

Результаты исследования: уровень тревоги снизился у 50 % женщин и 70 % мужчин после 3 сеанса; у 75 % мужчин и женщин отмечалось улучшение настроения между сеансами; у 75 % мужчин и 60 % женщин увеличилась самооценка, у 80% мужчин и женщин отмечалась устойчивая ремиссия; и у 75 % мужчин и 70 % женщин появился позитивный взгляд на будущее.

Таким образом, проведенное исследование установило гендерное различие в скорости развития эффекта при применении арт-терапии больным рекуррентным депрессивным расстройством.

Паліативне лікування посттравматичного стресового розладу у бійців, які приймали участь у антитерористичних операціях.

Ярош Є.Я.

Одеський національний медичний університет.

В зв'язку з останніми подіями в Україні неухильно накопичується кількість хворих на посттравматичний стресовий розлад серед поранених у антитерористичній операції. Особливу проблему для психіатра становлять інваліди внаслідок бойової травми після ампутації одної або більше кінцівок, а також – після спінальної травми з наступною неможливістю пересуватися самостійно, без допомоги інвалідного візка. Як показує практика, жоден з стандартних методів психотерапії не може бути застосованим у даного контингенту, оскільки традиційний підхід до спілкування з цими хворими у форматі «психіатр (психотерапевт, психолог) – пацієнт» ними категорично відкидається, вони не йдуть на контакт. Дослідження проводилось у військовому госпіталі №411 м. Одеси, де поранені із зони АТО проходять лікування, а також у санаторії «Одеса» Служби безпеки України, у якому вони знаходяться тривалий час на реабілітації. Усього нами досліджено 11 хворих на посттравматичний стресовий розлад з різними порушеннями