

**Міністерство охорони здоров'я України**  
**Харківський національний медичний університет**



## **АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕЙРОНАУК**

### **ЗБІРНИК ТЕЗ**

**Всеукраїнської конференції молодих вчених  
та студентів**

**Харків, 2016**

комплексную программу реабилитации наших пациентов, мы постарались учесть наиболее значимые факторы в современном комплексном лечении параноидной шизофрении.

**Материалы и методы.** Мы исследовали качество жизни, отношение к лечению, тяжесть заболевания у 32 больных параноидной шизофренией, в возрасте 18 – 45 лет. Учитывая особенности действия современных антипсихотиков второго поколения (нейроэндокринные побочные эффекты), у всех пациенток присутствовало увеличение массы тела.

**Результаты.** Комплексное исследование больных показало, что в период ремиссии они выявляли значимый уровень депрессии, апатии, страх возвращаться в привычный социум.

Эти характеристики были положены в основу комплексной психореабилитационной программы. Она включала в себя элементы когнитивно-бихевиоральной терапии, психообразования и арт-терапии.

**Выводы.** Полученные результаты показали, что комплексное воздействие более эффективно, при, относительно не значительном удорожании лечения. Добавленные элементы арт-терапии позволяют влиять на пациента, сохраняя чувство защищенности своих переживаний.

**Крайниченко В.В.**

## **ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ СУИЦИДАЛЬНО-ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВОЗНИКНОВЕНИЮ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

**Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии,  
Харьковский национальный медицинский университет,  
г. Харьков, Украина**

**Научный руководитель: к.мед.н., асс. Зеленская Е.А.**

**Актуальность:** По данным РИА Новости Уровень смертности от суицида в 2013 году в Украине составил 18,5 на 100 тысяч населения, зарегистрировано больше 9 тысяч самоубийств (9367), причем мужчины почти в пять раз чаще накладывали на себя руки. В 2014 году самоубийств произошло немного меньше 8 тыс., это с учетом неполных данных из Донецкой и Луганской обл., Крыма.

По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, за январь-февраль 2016 г. счеты с жизнью свели 84 харьковчанина. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на отчаянный шаг решились 75 человек. Всего в 2014 году покончили с собой 528 харьковчан, в 2015 г. – 546.

**Цель работы:** Изучение причин, способствующих совершению суицидально-опасных действий и возникновению суицидального поведения. **Материалы и методы:** Были проанализированы катamnестические данные 11 пациентов, совершивших различные аутоагрессивные действия.

**Результаты исследования:**

В ходе проведения исследования выяснено:

- в 63% (7 чел.) случаев суицидальные попытки совершены людьми, никогда ранее не госпитализировавшимися в психиатрический стационар и не находящимися на учете в ПНД.
- в 72% (8 чел.) случаев суицидальные попытки совершены людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
- в 100% (11 чел.) случаев ауто-агрессия была проявлена под влиянием ситуационно неблагоприятных факторов (финансовые трудности, проблемы в семье, социальная неустроенность).
- в 72% (8 чел.) случаев уже на второй день после совершения суицидальной попытки и госпитализации, пациенты сожалеют о своем поступке.

#### **Выводы:**

Необходимо проводить санпросвет работу, направленную на разъяснение населению сведений о вреде алкоголя. Также актуальна организация общедоступных и анонимных телефонов доверия, кабинетов психологической помощи, широкое распространение информации о них. Таким образом, в случае возникновения критической ситуации человек будет знать, куда обратиться за квалифицированной помощью.

**Красковская Т.Ю.**

### **МЕСТО ДЕЛЬФИНОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ**

**Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии,  
Харьковский национальный медицинский университет,  
г. Харьков, Украина**

**Научный руководитель: к.мед.н, асс. Зеленская Е.А.**

**Актуальность.** Синдром Лео Каннера (синдром раннего детского аутизма, РДА) представляют собой группу комплексных нарушений психического развития, характеризующихся отсутствием способности к социальному взаимодействию и общению, стереотипностью поведения. Для больных характерны также фобии, возбуждение, нарушения пищевого поведения и другие неспецифические симптомы. Актуальность проблемы РДА в мире настолько возросла, что в 2001 г. — в Год психического здоровья, она была объявлена ВОЗ одной из ведущих в психиатрии. В 2008 г. Генеральной Ассамблеей ООН день 2 апреля провозглашен Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. В 2012 г. проблема РАС и других расстройств развития включена в повестку дня 67 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В Украине РДА встречается не так часто, как другие психические нарушения, однако статистические данные, полученные украинскими учеными, впечатляют, на 10 000 детей диагностируется от 4 до 26 больных РДА. Причем, за последние 10 лет прирост заболеваемости составил 273%. Значимость вопроса определяется хроническим течением РДА и резистентностью к терапии. Только четверть пациентов могут жить самостоятельно.