

Министерство здравоохранения Российской Федерации  
Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
Федеральное казенное учреждение «Республиканская клиническая инфекционная больница»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом  
Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  
ОО «Человек и его здоровье»

При поддержке:  
ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, ВОЗ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ.  
ЖЕНЩИНЫ И ВИЧ



INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE  
ACTUAL PROBLEMS OF HIV.  
WOMEN AND HIV

МАТЕРИАЛЫ / MATERIALS

---

---

abbvie



---

---

5-6 / 06 / 2017  
Санкт-Петербург / Saint Petersburg

Научное издание

Международная научно-практическая конференция  
**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ. ЖЕНЩИНЫ И ВИЧ**

Материалы конференции

СПб.: Изд-во «Человек и его здоровье», 2017. – 386 с.

*Сборник материалов Конференции будет зарегистрирован  
в национальной информационно-аналитической системе РИНЦ  
(Российский индекс научного цитирования)*

*Подготовлено на основе материалов, присланных авторами.  
Редакция не несет ответственности за содержание опубликованной  
информации*

*Издательство «Человек и его здоровье»  
191025, Санкт-Петербург  
Тел./факс: +7 (812) 380-31-55, 380-31-56  
welcome@congress-ph.ru  
www.congress-ph.ru*

*Технический редактор: Гаврилова М.Ю.  
Дизайн, верстка: Куделина Т.П.*

*Подписано в печать 23.05.2017  
Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная.  
Гарнитура «Таймс Нью Роман»  
Печать офсетная. Тираж 800 экз.*

**ISBN 978-5-9908987-4-5**

вентным поведением (8 женщин первой группы имели судимости; 30,8%). Рискованное поведение в первой группе было неразрывно связано с аддиктивной патологией, что определенно приводило к снижению социального статуса больных. Социальная адаптация всех больных первой группы была оценена как низкая, 76,9% женщин первой группы не имели постоянного места работы. Больные в первой группе характеризовались отсутствием осмысленности жизни (среднее значение субшкалы «Цели в жизни» теста «СЖО»  $22,3 \pm 7,8$  при нормальном значении у женщин  $N=29,4 \pm 6,2$ ;  $p < 0,001$ ), были ей неудовлетворенны (субшкала «Процесс жизни» –  $19,8 \pm 7,3$ ;  $N=28,8 \pm 6,1$ ;  $p < 0,001$ ) и были убеждены, что не способны ей управлять (субшкала «Локус контроля» –  $22,3 \pm 7,8$ ;  $N=29,4 \pm 6,2$ ;  $p < 0,001$ ).

Рискованное поведение у больных второй группы встречалось реже (36,4%;  $p < 0,001$  в сравнении с больными первой группы), выявлялось у женщин с расстройствами личности и проявлялось преимущественно сексуальными незащищенными контактами. Больные второй группы не были вовлечены в услуги коммерческого секса и не имели судимостей ( $p=0,016$  и  $p=0,038$ , соответственно). 63,6% больных второй группы были социально адаптированы ( $p=0,018$ ). Установлено, что ВИЧ-инфекция была выявлена впервые в ходе данной госпитализации чаще у больных второй группы (63,6% и 23,1% больных второй и первой групп, соответственно;  $p=0,032$ ), что объясняет высокую частоту развития нозогенных реакций у больных второй группы. Средние значения всех субшкал теста «СЖО» во второй группе превышали значения соответствующих субшкал в первой группе ( $p < 0,01$  для всех субшкал), что свидетельствует о более гармоничном отношении к жизни женщин второй группы.

**Выводы.** Рискованное поведение, приводящее к заражению ВИЧ, у женщин преимущественно связано с аддиктивной патологией и нарушениями поведения в рамках расстройств личности. Женщины ПИН характеризуются высокой степенью социальной уязвимости и нуждаются в дополнительных психосоциальных вмешательствах.

## ПРОБЛЕМЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

**Чумаченко Т.А., Семишев В.И., Илюха С.Э.**

Харьковский национальный медицинский университет,  
г. Харьков, Украина

**Цель.** Оценка эффективности перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции в Украине в современных условиях.

**Материалы и методы.** По данным официальной статистики проведен ретроспективный эпидемиологический анализ инфицированности ВИЧ беременных женщин и частоты вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку

**Результаты и обсуждение.** По данным государственного учреждения «Украинский центр контроля за социально опасными заболеваниями МЗ Украины» показатель частоты передачи ВИЧ от матери ребенку в 2001 г. в Украине составлял 27,8%. Внедрение программы перинатальной профилактики ВИЧ, включая антиретровирусное профилактическое лечение беременных и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, а также гарантированное государственное обеспечение свободного доступа к ней, позволило добиться снижения частоты перинатальной передачи ВИЧ до 4,7% в 2009 г. и 3,35% в 2014 г. Превалентность ВИЧ-инфекции среди беременных по результатам первичного тестирования снизилась с 0,55% в 2009 г. до 0,39% в 2014 г. Значительным успехом было достижение в 2015 г. 95%-ного охвата антиретровирусным профилактическим лечением беременных женщин, у которых ВИЧ-инфекция была выявлена во время беременности. Однако отмечается негативная тенденция к увеличению числа случаев позднего выявления ВИЧ-инфекции у беременных женщин в связи с поздним обращением их в женскую консультацию или родильный дом. Известно, что при отсутствии антиретровирусного профилактического лечения частота передачи возбудителя вертикальным путем составляет 34,2%. Анализ 83 случаев беременности в Харьковской области в 2016 г. показал, что 72 беременности закончились родами, у семи женщин беременность была прервана абортom, четыре женщины сменили место жительства и выбыли из-под диспансерного наблюдения. Только 26 (36,1%) из 72 родов проведены методом кесарева сечения. В 38 случаях (52,8%) беременные получали антиретровирусную терапию. Но профилактическое лечение, начиная с 24 недели беременности, как предписывают нормативные документы, получили только 20 женщин. Восемь беременных женщин не состояли на учете в женской консультации, в родильный дом поступали с неизвестным ВИЧ статусом, вследствие чего профилактическое лечение не получали. Родители трех детей отказались от антиретровирусного лечения своих детей, терапию получали только 69 (95,8%) детей.

Таким образом, несмотря на декларируемый доступ к программам профилактики перинатального инфицирования, в действительности профилактикой охвачены не все подлежащие контингенты. Кроме того, представляет проблему продолжающееся реформирование служб общественного здоровья, стигма по отношению к ВИЧ-инфицированным женщинам, дефицит материальных ресурсов в условиях гуманитарного кризиса, нарушения в системе закупок лекарственных препаратов, недостатки в работе по планированию семьи. Следует отметить увеличение числа потребителей инъекционных наркотиков среди беременных женщин, которые составляют дополнительную группу риска передачи ВИЧ-инфекции своим детям.

**Выводы.** В Украине существует проблема реализации программы профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции. Для расширения доступа к профилактическим программам необходимо среди женщин репродуктивного возраста проводить санитарно-просветительскую работу по планированию семьи и профилактике заболеваемости. На законодательном уровне следует предусмотреть обеспеченность ресурсами для своевременной закупки лечебно-профилактических препаратов и средств медицинского назначения, а также осуществлять постоянный мониторинг инфицированности ВИЧ беременных женщин.

## **ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Шарухо Г.В., Князева Е.Ф., Жвавая Н.В.**

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области,  
г. Тюмень

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией является актуальной проблемой для территории Тюменской области. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией по итогам 2016 г. составил 153,60 на 100 тысяч населения (по РФ-60,01, по УрФО-101,25). Среди субъектов Уральского федерального округа Тюменская область занимает 4-е ранговое место после Свердловской, Челябинской областей и ХМАО.

В 2016 г. доля полового пути передачи ВИЧ-инфекции незначительно увеличилась с 30,2% до 31,4% по сравнению с 2015 г. В 2016 г. доля наркотического пути заражения увеличилась на 0,2% и составила – 38,2% (2015 г. – 38,0%). В остальных случаях путь передачи не установлен.

Расширены показания для обследования на ВИЧ-инфекцию, в 2016 г. обследовано 363657 человек или 25% от всего населения области (в 2015 г. – 297219 человек, 21,9% от населения).

Продолжается работа по медицинскому освидетельствованию иностранных граждан, в 2016 году освидетельствовано 25400 иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию Тюменской области (в 2015 г. – 22501), среди них выявлено 45 ВИЧ-инфицированных.

В структуре ВИЧ-инфицированных по половому признаку, по-прежнему, преобладают мужчины. В 2016 году среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных доля женщин составляет 41,2% (775 случаев), доля мужчин 58,8% (1107 случаев). В 2016 году снизился удельный вес выявленных случаев ВИЧ-инфекции при обследовании беременных женщин – 7,2%, против 9,8% в 2015 г.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК РЕСУРС МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ЖЕНЩИНАМ Чернявская О.А.....	346
РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН Чумаков Е.М., Петрова Н.Н.....	348
ПРОБЛЕМЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ Чумаченко Т.А., Семишев В.И., Илюха С.Э.....	349
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Шарухо Г.В., Князева Е.Ф., Жвавая Н.В.....	351
ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РИСКОВ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УРОВНЯ ОБЩЕЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА Шатыр Ю.А., Улесикова И.В., Мулик А.Б.....	353
ПЕРВИЧНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОК ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ Шахова О.Б., Саттарова З.И., Солонин С.А., Дамиров М.М.....	355
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ СРЕДИ ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА Шкурат А.А.....	356
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТАЛОГИЯ У ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ БЕРЕМЕННЫХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР Яковлев А.А., Дьячков А.Г., Мусатов В.Б., Пенчук Т.Е., Стреляная Е.В., Микитенко Е.В.....	358
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА ФОНЕ АРВТ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ Ястребова Е.Б., Самарина А.В., Воропаева Е.К.....	359

Научное издание

Международная научно-практическая конференция  
**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ.  
ЖЕНЩИНЫ И ВИЧ**

**ISBN 978-5-9908987-4-5**

Издательство «Человек и его здоровье»  
191025, Санкт-Петербург  
Тел./факс: +7 (812) 380-31-55, 380-31-56  
welcome@congress-ph.ru  
www.congress-ph.ru

Технический редактор: Гаврилова М.Ю.  
Дизайн, верстка: Куделина Т.П.

Подписано в печать 23.05.2017  
Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная.  
Гарнитура «Таймс Нью Роман»  
Печать офсетная. Тираж 800 экз.