

**Міністерство освіти і науки України**  
**Харківський національний медичний університет**  
**Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології**



**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕЙРОНАУК**

**ЗБІРНИК ТЕЗ**

**Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів**

**Харків, 2017**

УДК 616.89

**A43 Актуальні питання нейронаук:** Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів (Харків 26 квітня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний медичний університет – Харків: – 2017. – 95 с.

***За редакцією професора В.М. ЛІСОВОГО***

Відповідальний за випуск професор Г.М. Кожина

Друкується за рішенням вченої ради Харківського національного медичного університету (протокол № 3 від 23 березня 2017 р.)

*Відповідальність за якість та достовірність матеріалів несуть автори публікацій.*

**Артамонов Р.О., Дубовик В.В.**  
**КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
**АДДИКЦИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ**  
**Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии,**  
**Харьковский национальный медицинский университет,**  
**г. Харьков, Украина**

**Научный руководитель: д.мед.н., проф. Мозговая Т.П.**

**Актуальность темы.** Проблема употребления психоактивных веществ приобретает с каждым годом все большие масштабы. Кроме известных психоактивных веществ появляются и широко распространяются новые виды токсических препаратов, формирующие новые виды зависимостей, что существенно осложняет терапевтические возможности.

Проблемы аддикций имеют многофакторный характер, возникают многочисленные психические и соматические заболевания, а также заражение таким опасным заболеванием, как ВИЧ-инфекция. Наличие ряда психических заболеваний значительно повышает риск заражения ВИЧ, факторами риска являются алкогольная и наркотические аддикции, незащищенные половые контакты.

**Цель исследования.** Диагностика психических расстройств у пациентов с аддикцией, ассоциированной с ВИЧ-инфекцией.

**Материалы и методы.** Было обследовано 43 пациента мужского пола с аддикцией, среди которых у 58,13% больных наблюдалась ВИЧ-инфекция (1-я группа) и 41,87% больных являлись серонегативными (2-я группа). Использовали клинико-психопатологический метод.

**Результаты исследования.** Следует отметить тот факт, что в 1-й группе отмечалось 40% пациентов с впервые выявленной ВИЧ – инфекцией, что еще раз подтверждает масштабы данной эпидемии. В процессе исследования было выявлено, что «Расстройство адаптации» в 1-й группе составляло 48,0%, во 2-й - 27,7%. «Расстройство личности» более чем в два раза преобладало среди ВИЧ-инфицированных пациентов (44,0%) и в 16,6% случаев отмечалось у серонегативных. Злоупотребление алкоголем было 6

выявлено у 72,0% и 16,6%, наркотические аддикции у 24,0% и 11,1% в 1-й и 2-й группах соответственно.

**Выводы.** Выявлена высокая частота психических заболеваний у ВИЧ-позитивных и серонегативных пациентов. Кроме того, больные имеют значительную частоту аддиктивных расстройств, высокий уровень реализации факторов рискованного поведения.

Полученные данные свидетельствуют о существенной роли психических нарушений в риске заражения социально значимыми инфекциями.