

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний медичний університет
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕЙРОНАУК

ЗБІРНИК ТЕЗ

Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів

Харків, 2017

УДК 616.89

A43 Актуальні питання нейронаук: Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів (Харків 26 квітня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний медичний університет – Харків: – 2017. – 95 с.

За редакцією професора В.М. ЛІСОВОГО

Відповідальний за випуск професор Г.М. Кожина

Друкується за рішенням вченої ради Харківського національного медичного університету (протокол № 3 від 23 березня 2017 р.)

Відповідальність за якість та достовірність матеріалів несуть автори публікацій.

Галашко Е.Ю., Коршунова М.С.
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ ПРИ МАНИФЕСТАЦИИ
ШИЗОФРЕНИИ

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии,
Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: к.мед.н. Зеленская Е.А.

Актуальность. Шизофрения – тяжелое психотическое расстройство, которое обычно проявляется в позднем подростковом или молодом возрасте. Манифестация, течение и исход заболевания значительно отличаются у разных лиц. Риск развития шизофрении составляет 1%, а заболеваемость - 1 случай на 1000 населения в год.

Цель. Изучить основные варианты психопатологических синдромов при манифестации шизофрении.

Материалы и методы: нами было проведено катamnестическое исследование, в котором мы изучили клиническую картину, предшествующую первичному поступлению в стационар. Было обследовано 40 пациенток в возрасте 18-26 лет, которые находились на лечении в ХОКПБ №3, с установленным диагнозом Шизофрения (F 20). Были использованы клинико-анамнестический, клинико-психопатологический, клинико-катamnестический и статистический методы.

Результаты. Было установлено, что семейная отягощенность встречалась в 25 % случаев (по линии отца – 11%, по линии матери – 14%). Проявление ведущих психопатологических симптомов на момент поступления у обследованных в 62% случаев длилось от полугода до года, а в 38% длились от 1 до 3 лет. В ходе работы в клинической картине, предшествующей первичному поступлению, преобладала аффективная симптоматика (40% случаев), наиболее часто встречались депрессивные проявления с соматизированными включениями, также встречались обратные состояния, но чаще преобладали гипомании. В остальных случаях встречалась тревожно-фобическая симптоматика (20%), негативная симптоматика в виде социальной дезадаптации (17,5%), психопатоподобный нарушения (10%) в виде бродяжничества, алкоголизации, уходов из дома, полиморфная симптоматика (12,5%).

Выводы. На основании полученных данных можно говорить о многогранности проявлений психопатологических синдромов при манифестации шизофрении, также были выявлены закономерности инициальных симптомов с последующим ведущим психопатологическим синдромом.