

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКРЫТЫХ ВРОЖДЕННЫХ ОДНОСТОРОННИХ НЕСРАЩЕНИЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И СОПУТСТВУЮЩИХ ИМ ДЕФОРМАЦИЙ КОНЦЕВОГО ОТДЕЛАНОСА.

Василенко В.М., Рузин Г.П.

Харьковский национальный медицинский университет

Среди врожденных несращений верхней губы у детей, скрытые односторонние несращения верхней губы встречаются наиболее редко. В наших наблюдениях у 162 детей в возрасте от 3-х суток жизни до года и старше они составляли всего 3 случая - 1,8%, все остальные - 159, т.е. 98,2% - были явными. Все три скрытые несращения губы были изолированными. Форма скрытых несращений у 2 детей была щелевидной (1,2%), а у одного - треугольной (0,6%). Клинически несращения губы проявлялись скрытым дефектом мышц губы (главным образом круговой мышцы рта), кожа над которым имела вид тяжа, рубцовой бороздки. У двух детей скрытый мышечный дефект локализовался в пределах красной каймы и нижней трети кожной части губы (частичные несращения губы), а у третьего ребенка занимал красную кайму и больше половины кожной части губы (неполное несращение губы). Величина мышечного дефекта в поперечнике составляла 1,5 - 2 мм в покое у детей со щелевидной формой несращения губы и 2,5 - 3 мм у основания треугольного несращения. Во время функции губы (при плаче, разговоре ребенка) она увеличивалась до 2,5 - 4 мм. У ребенка с неполным несращением во время функции отмечалось некоторое западение тканей у основания кожной части перегородки носа, у основания крыла носа, а также уплощение кожи в области филтрума. Кроме того, определялось малозаметное опущение кончика носа и небольшое расширение носового отверстия на стороне несращения. Эти признаки указывали на некоторое недоразвитие медиальной ножки крыльчатого хряща и на нарушение функций мышц, суживающих ноздрю (мышца осаждающая перегородку носа). У детей с частичными скрытыми несращениями губы деформации носа не отмечались. Скрытые несращения верхней губы наблюдались нами только у детей двух старших групп: второго полугодия жизни - один ребенок, и дети старше года - двое детей. Как выяснилось из опроса, этот, наиболее легкий вид несращений губы, не сопровождающийся выраженными эстетическими нарушениями, меньше тревожил родителей детей, и они не настаивали на ранних сроках первичной восстановительной операции.

Несомненно, скрытые несращения верхней губы встречаются чаще, нежели отмечено в наших наблюдениях. Ввиду того, что дефект мало заметен, больные намного реже обращаются за помощью к врачу.

Хирургическая тактика при скрытых несращениях такая же, как и при явных. Чем раньше устранен дефект и восстановлена функция губы, тем лучше результат.