

Національна академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів
ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»
ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів»
Харківська обласна державна адміністрація



ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

За матеріалами Науково-практичної конференції
з міжнародною участю

«Сучасні дослідження в ортопедії та травматології»

(Четверті наукові читання,
присвячені пам'яті академіка О. О. Коржа)

4–5 жовтня 2018 р.
Харків

УДК 616.7.001 – 07 – 08

ББК Р. 54. 57

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні дослідження в ортопедії та травматології» (четверті наукові читання, присвячені пам'яті академіка О.О. Коржа): тези доповідей (м. Харків, 4–5 жовтня 2018 р.).

Збірник містить матеріали науково-практичної конференції, в яких представлені результати наукових досліджень і практичної роботи провідних вчених у галузі ортопедії та травматології.

ISBN 978-966-8689-15-4

УДК 616.7.001 – 07 – 08

ББК Р. 54. 57

© ДУ «Інститут патології хребта та суглобів
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», 2018

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА

Веснин В.В., Голка Г.Г.

*Харьковский национальный медицинский университет,
Харьков, Украина*

В условиях современной эпидемиологической обстановки костно-суставной туберкулез занимает первое место в структуре заболеваемости и болезненности внелегочного туберкулеза в нашей стране, а туберкулез позвоночника занимает первое место в структуре специфических поражений костей и суставов.

Целью данной публикации является привлечение внимания практических врачей к важной проблеме лечения туберкулезного спондилита (ТС) и повышению его эффективности.

В основу исследования положены данные протоколов обследований и медицинская документация 93 больных с диагностированным впервые ТС, которым проводили хирургическое вмешательства на пораженных специфическим деструктивным процессом позвонках. Возраст больных был в пределах от 17 до 75 лет.

Среди больных преобладали лица с поражением тел позвонков. Только у 2 пациентов были поражены задние отделы позвонков: поперечные и суставные отростки, дуги.

В большинстве наблюдений отмечено поражение тел двух позвонков. Чаще всего признавали поражение грудного и поясничного отделов позвоночника. При поражении грудного отдела позвоночника вовлечение в воспалительный процесс трех тел позвонков отмечалось более часто.

Пациенты по степени неврологических расстройств были распределены следующим образом: тип А – 8, В – 12, С – 16, D – 40, E – 17 больных.

Отдаленные результаты лечения ТС изучены нами у 85 больных в срок от 2 до 10 лет. Клиническое, рентгенологическое, неврологическое обследование, а также в показанных случаях компьютерная томография не выявили рецидивов заболевания. Для клинической оценки результатов проведенного лечения использовали шкалу, предложенную Ульрих Э.В., Мушкин А.Ю. Отличные результаты получены у 46 больных; хорошие – у 21 и у 9 соответственно; удовлетворительные у 14 (16,4%) больных. Неудовлетворительный результат отмечен у 4 (4,7%) больных.

Выводы: анализ отдаленных результатов, проведенный в обследованных больных, показал, что применение комплексной терапии и хирургии ТС позволяют добиться высокой эффективности лечения у этой тяжелой категории больных.