

Рябоконь Е.Н., Костюк Н.Г., Гладкая Е.Н.

## **ЛЕЧЕНИЕ ЯТРОГЕННЫХ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ПОЛОСТИ РТА**

Харьковский национальный медицинский университет,  
кафедра терапевтической стоматологии, г. Харьков, Украина

В силу ряда причин – плохой экологии, роста хронической соматической патологии, самолечения и пр., при проведении стандартных стоматологических мероприятий (местной анестезии, препарировании зубов, физиопроцедур, медикаментозной обработки каналов и др.) участились случаи возникновения ятрогенной травматизации слизистых оболочек полости рта. Довольно быстро в полости рта происходит вторичное инфицирование таких травм, особенно дефектов слизистой – эрозивно-язвенных поражений. Лечение в таких случаях бывает затяжным, т.к. требует незамедлительного последовательного применения комплекса различных медикаментозных средств: обезболивающих, антибактериальных, кератопластиков и др. Врач-стоматолог должен иметь в своем распоряжении современный эффективный препарат для лечения ятрогенных травматических поражений слизистых оболочек полости рта, обладающий сочетанным механизмом действия. Поиск такого препарата явился целью нашей работы.

Наше внимание привлек отечественный препарат – гель «Пантестин - Дарница». В составе геля содержится мирамистин, обладающий широким антибактериальным спектром действия и пантенол, который оказывает кератопластическое влияние на слизистые оболочки.

Нами были пролечены 16 пациентов (25-45 лет) с эрозивно-язвенными поражениями слизистых оболочек полости рта ятрогенного происхождения. В ходе исследований из больных одного возраста и пола, имеющих сходную патологию, сформировали 2 группы: наблюдения и контрольную. При лечении пациентов обеих групп в очаге поражения слизистой проводились местная анестезия, антисептическая обработка. В основной группе (9 больных) на месте очага поражения применялись аппликации геля «Пантестин - Дарница»; в группе контроля (7 больных) – аппликации мази «Мирамистин» и с кератопластической целью - аппликации «Аекола». Исследования показали, что у пациентов группы наблюдения, где в качестве базового лечебного средства применялся гель «Пантестин - Дарница» с сочетанным механизмом действия, заживление дефектов слизистой полости рта происходило без осложнений в укороченные сроки на 3-4 дня раньше, чем у больных контрольной группы со сходной патологией.

Результаты проведенных нами исследований позволяют рекомендовать

препарат «Пантестин - Дарница» для лечения эрозивно-язвенных поражений слизистой полости рта ятрогенного происхождения с учетом индивидуальной переносимости пациентами его составляющих частей – пантенола и мирамистина.