



ПРОБЛЕМИ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОСТЕОСИНТЕЗУ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО - ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

1 (1) – 2015

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Почесний редактор

Гайко Г.В.

Головний редактор

Калашніков А.В.

Відповідальний секретар

Майко В.М.

Редакційна колегія

Аршулік М.А.	Левицький А.Ф.
Бур'янов О.А.	Литовченко В.О.
Гайко О.Г.	Лябах А.П.
Гайович В.І.	Малик В.Д.
Герасименко С.І.	Луцишин В.Г.
Герцен Г.І.	Павлішен Ю.І.
Грицай М.П.	Піонтковський В.К.
Гур'єв С.О.	Рой І.В.
Івченко Д.В.	Савка І.С.
Курілець І.П.	Семенович А.С.
Курінний І.М.	Ставінський Ю.О.
	Страфун С.С.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 21176-10976Р
від 16.02.2015

Дизайн, верстка Непорожній О.А.
Друк – ТОВ «Видавництво Юстон»

Редакція залишає за собою право на редагування поданих матеріалів. Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.



дозволяє уникнути негативного впливу вказаних чинників на результати хірургічного лікування.

Аналіз результатів лікування хворих похилого віку з проксимальними переломами стегнової кістки при наявності остеопорозу, артрозу кульшового суглоба 3-4 ступеня показав переваги застосування цементного ендопротезування в порівнянні з остеосинтезом.

Висновки. Показаннями до застосування тотального цементного ендопротезування кульшового суглоба при через- та міжвертельних переломах стегнової кістки у хворих похилого віку є: нестабільні багатовідламкові переломи, наявність остеопорозу кісток, що утворюють кульшовий суглоб та коксартроз III – IV стадій. У хворих похилого віку без остеопорозу або з мінімальними його проявами та без ознак артрозу кульшового суглоба доцільно застосовувати традиційні органозберігаючі способи остеосинтезу.

ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З ДІАФІЗАРНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОК КІНЦІВОК НА ФОНІ ПОЛІТРАВМИ

Григорук В.В., Власенко В.Г.

Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна

В Україні та цілому світі множинні та поєднані пошкодження постраждалих отримують переважно внаслідок ДТП. За статистикою в 205 000 ДТП травмовано понад 222 000 та загинуло більше 35 000 людей.

Для попередження погіршення стану постраждалого, починаючи від місця ДТП, потрібно виконувати іммобілізацію кінцівок за допомогою табельних шин, уведення знеболюючих та якомога швидко доставляти до стаціонару.

Згідно з патентом України № 57016 тактика ведення пацієнтів у стаціонарі визначалася в залежності від балів за шкалою ISS. У притомного постраждалого за балом по ISS < 25 балів виконували всі оперативні втручання в повному обсязі.

При оцінці за шкалою ISS більше ніж 40 – 46 балів застосовували систему «Damage control». У постраждалих з множинними та поєднаними пошкодженнями починали з лапароцентезу, пункцій обох плевральних порожнин. При потребі виконували дренажування плевральних порожнин за Бюлау, лапаротомію. За наявності черепно-мозкової травми з урахуванням КТ голови – краніотомію. Переломи довгих кісток фіксували апаратами зовнішньої фіксації в спрощеній модифікації.

У постраждалих з балом за шкалою ISS від 26 по 45 лікування всіх пошкоджень виконували протягом першої доби одночасно з проведенням протишокових заходів або після виведення вітальних функцій на рівень достатній для проведення оперативних втручань.