


**Міністерство освіти і науки України
Харківський національний медичний університет
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології**



**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕЙРОНАУК
ЗБІРНИК ТЕЗ**

Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів



Харків, 2018

УДК 616.89

A43 Актуальні питання нейронаук: Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів (Харків 27 квітня 2018 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний медичний університет – Харків: – 2018. – 61 с.

Відповідальний за випуск професор Г.М. Кожина

Відповідальність за якість та достовірність матеріалів несуть автори публікацій.

Якщо говорити про середню оцінку ступеню тривожності серед респондентів, то він вона склала 17 балів, мінімум 12 та максимум у 21 бал.

Другий етап опитування показав дещо інші результати індивідуально у кожної пацієнтки. Середнє значення вдовolenості життям зросло до 67%, мінімум склав 43%, максимум 81%. Апатія зменшилась до середнього значення у 7 балів, з мінімальним 2 та максимальним 12 балів. Вираженість тривожності також зменшилась до 10 середнє, найменший результат виявився 4 бали, найбільший 17.

Висновки. Таким чином, спираючись на отримані результати можна зробити висновок про явне покращення внутрішнього стану пацієнтів внаслідок отриманої терапії. Також можна сміливо говорити про доцільність використання стандартизованих шкал опитувань пацієнтів, адже вони можуть надати гарну можливість для оцінки якості лікування через відношення самого пацієнта до себе і навколишнього світу. Так, наприклад, вимірювання ступеню апатії (яка сама по собі входить до симптомів розладів шизофренічного спектру) дає змогу оцінити байдужість пацієнта до себе, свого здоров'я та оточення. Зростання зацікавленості до будь чого у свою чергу вказує на ефективність терапії та покращення загального стану. Теж саме можна сказати про явище тривожності в пацієнтів, зниження якої вказує на правильний підхід до лікування. Також не виникає жодних сумнівів про значущість оцінки ступеню загальної вдовolenості пацієнтом своїм життям.

Сінан Чобаноглу
ПОБІЧНІ ДІЇ АТИПОВИХ АНТИПСИХОТИКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

Харківський національний медичний університет
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
м.Харків, Україна

Науковий керівник – к.мед.н. Коровіна Л.Д.

Актуальність. Шизофренія відоме здавна захворювання, але при цьому етіопатогенетичні механізми розвитку вивчені зовсім не до кінця. Довгий період часу була визнана лише дофамінова теорія, яка відповідала, в основному за виникнення позитивної психосимптоматики.

В останні роки все більше уваги отримує серотонінова теорія шизофренії, яка пояснює появу дефіцитарної симптоматики.

Об'єднання цих гіпотез відповідає на багато питань, пов'язаних із шизофренією.

Мета. У зв'язку з цим, ми звернули увагу на особливості перебігу параноїдної шизофренії у жінок, які приймають антипсихотичні препарати, що впливають, як на дофамінові, так і серотонінові рецептори.

Матеріали і методи. У нашому дослідженні взяли участь 23 жінки, віком від 18 до 40 років, хворі на параноїдну шизофренію, які отримували у лікуванні антипсихотики другого покоління, більше 1 року.

Ми використовували клініко-психопатологічний, клініко-анамнестичний, психодіагностичний методи.

Результати. Весь контингент дослідження знаходився в стані ремісії. Пацієнтки не виявляли активної позитивної симптоматики ($P = 15$ points by PANSS). Виявляли типові для даного захворювання порушення мислення, сплюснення афекту, зниження вольових спонукань ($N = 22$ points by PANSS), загальні симптоми ($G = 31$ points by PANSS). При цьому, у всього контингенту було знижено якість життя (SF-36), у більшості випадків обумовлене наявністю нейроендокринних побічних дій, а саме лактореї.

Висновки. Таким чином, можна сказати, що застосування атипичних антипсихотиків призводить не тільки до редукції позитивної і дефіцитарної психосимптоматики, але і викликає значні нейроендокринні порушення, що знижують якість життя.

Симкіна В.Є.

ВПЛИВ РІВНЯ ВІТАМІНУ D У СИРОВАТЦІ КРОВІ НА РІВЕНЬ ЗАТРИМКИ ПСИХО-МОВНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

**Харківський національний медичний університет,
Кафедра неврології № 2
м. Харьков, Україна**

Наук. Керівник - к.мед.н. Каук О.І.

Актуальність. Згідно з останніми даними в Україні за період з 2006 по 2011 рік у 2,5 рази збільшилася кількість дітей, які мають розлади аутистичного спектру (РАС). Показник поширеності РАС стабільно підвищується протягом останніх кількох років і на даний момент становить до 35,7% в дитячій популяції у віці від 2-х до 13 років.

Однією з груп причин, що впливають на розвиток РАС, на думку багатьох авторів, є екологічні чинники. До екологічних факторів, в першу чергу, відноситься проживання в великих мегаполісах, розташованих в більш північних широтах або регіонах з високим рівнем опадів протягом року, що може призводити до недостатньої сонячної інсоляції та розвитку вторинного дефіциту вітаміну D.

Відомо, що вітамін D грає одну з важливих ролей у репарації ДНК і захисту генома від окисного стресу, який і є основною причиною його пошкодження. Фактори, пов'язані з дефіцитом вітаміну D, імовірно, сприяють підвищенню частоти нових мутацій і ускладнюють відновлення генів.

Метою нашого дослідження було встановлення впливу рівня вітаміну D в сироватці крові на ступінь затримки психо-мовного розвитку (ППР) у дітей з РАС.

Матеріали і методи. У реабілітаційному центрі при Обласному будинку дитини № 3 м. Харькова нами було обстежено 36 дітей у віці від 3 до 7 років з РАС. Всім дітям було проведено психолого-логопедичне

Ліха В. М.	33
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ТА КЛІНІЧНА КАРТИНА НЕРВОВОЇ АНОРЕКСІЇ У ЖІНОК МОЛОДОГО ВІКУ	33
Ляшенко Т. А.	34
ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД В УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ.....	34
Макарова А.В., Зюзіна М.С.	35
ВИЯВЛЕННЯ НЕРВОВО-ПСИХІЧНИХ ПОРУШЕНЬ СЕРЕД СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ ..35	
Мартин Медхат Мусса Істенеза	37
ІДЕАЛИ В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ ТА АДАПТАЦІЯ.	37
Минка Н.А.	38
Динаміка соціально-психологічної адаптації у осіб молодого віку	38
Ольхова А.О., Ковальова К.А.	40
ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСІЇ ХВОРИХ НА ПТСР БІЙЦІВ, ЩО ПОВЕРНУЛИСЯ З ЗОНИ АТО	40
Подгорная Е.А., Купина М.В.	41
ПОРІВНЯННЯ ЧАСТОТИ ВИНИКНЕННЯ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ ХНМУ ТА ХНУ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА	41
Поліков Г.О.	42
ВІДДАЛЕНІ ПСИХІЧНІ НАСЛІДКИ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ	42
Руденко С. Ю.	43
ОЦІНКА КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ У ОСІБ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ СИНТЕТИЧНІ КУРИЛЬНІ СУМІШІ ТИПУ «СПАЙС».	43
Сіліна М. П.	44
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ДІАГНОЗОМ ШИЗОФРЕНІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.....	44
Сінан Чобаноглу	45
ПОБІЧНІ ДІЇ АТИПОВИХ АНТИПСИХОТИКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ...45	
Симкіна В.Є.	46
ВПЛИВ РІВНЯ ВІТАМІНУ D У СИРОВАТЦІ КРОВІ НА РІВЕНЬ ЗАТРИМКИ ПСИХО-МОВНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ	46
Тимохіна А.О.	47
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ	47
Тимощук М.В.	48
ВПЛИВ АНГЕДОНІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ДЕПРЕСІЇ	48
Трегубенко А.Р.	49