



AKADEMIA POLONIJNA
POLONIA UNIVERSITY

Polonia University in Czestochowa

International scientific and practical conference

**SCIENTIFIC PROGRESS OF MEDICINE
AND PHARMACY OF THE EU COUNTRIES**

April 23–24, 2021

**Czestochowa,
Republic of Poland
2021**

International scientific and practical conference «Scientific progress of medicine and pharmacy of the EU countries» : conference proceedings, April 23–24, 2021. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. 208 pages.

ORGANISING COMMITTEE

Andrzej Krynski, Prof. PhD, ThDr., Dr h.c. mult., Rector of Polonia University in Czestochowa, Poland;

Antoni Stadnicki, Prof. Ph.D., Polonia University in Czestochowa, Poland;

Goran Stojiljkovic, Prof. PhD, University of Novi Sad, Serbia;

Martin Rusnák, Prof., MD, CSc, Trnava University, Slovakia.

Each author is responsible for content and formation of his/her materials.

The reference is mandatory in case of republishing or citation.

CONTENTS**CLINICAL MEDICINE: EXPERIENCE AND INNOVATIONS**

Мультисистемний запальний синдром, асоційований з COVID-19 у дітей Антонюк Л. В., Прокоф'єв М. В., Климович М. М.	8
Clinical case of acute myeloblastic leukemia on the background COVID-19-associated pneumonia Afanasiuk O. I., Shmaliy V. I., Yakovets O. O.	11
Optimization of the lower extremities trophic ulcers treatment Baranova I. V., Iliuk I. A., Postovitenko K. P.	14
Роль внутрішньочеревної гіпертензії у розвитку післяопераційної есвентрації Бодяка В. Ю.	19
Спосіб лікування неспроможності швів дванадцятипалої кишки Войтів Я. Ю.	23
Lymphoid environment in triple-negative invasive ductal breast carcinoma Volos L. I., Dudash A. P., Guley R. V., Petronchak O. A.	26
The aggravating effect of comorbidity of primary osteoarthritis and diseases with exocrine pancreatic insufficiency Halabitska I. M., Babinets L. S.	31
Метод зупинки носової кровотечі за допомогою балонної гідротампонади у хворих на фоні проведення антитромботичної терапії Гарюк Г. І., Почуєва Т. В., Бичкова Н. С.	34
Evaluation of the impact of the COVID-19 pandemic on the educational process of medical interns Hechko M. M., Kurakh A. V., Hechko K. A., Rumaneh W. W. S.	37
Діагностичні та лікувальні аспекти хронічного тазового болю у жінок з хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів на тлі варикозного розширення вен малого тазу Дрогомирецька Н. В.	42
Changes in the characteristics of the gallbladder in patients with chronic cholecystitis and COPD Dudka T. V., Dudka I. V., Pavlyuk V. O.	46

Впровадження новітніх наукових методів судово-медичної діагностики давності заподіяння механічної травми Ергард Н. М., Кубаля С. М., Ситник Ю. В., Богдаш В. В., Селін В. С.	49
Оцінка ефективності медикаментозної корекції стану хронічної ендогенної інтоксикації у пацієнтів з терапевтичним загостренням хронічного панкреатиту в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу шляхом малооб'ємної інфузійної терапії Земляк О. С., Бабінець Л. С.	53
The most common emergencies in modern clinical medicine Кернытскы R. M.	57
Sensitivity to cephalosporins of opportunistic bacteria, excreted in patients with infectious diseases of upper and lower respiratory tract Kovalenko N. I., Vovk O. O., Novikova I. V.	60
Analysis of quality of life in patients with chronic pancreatitis Kotsaba Yu. Ya., Babinets L. S.	63
Роль судинного фактора в прогресуванні хвороби Паркінсона Лукашевич П. В., Степаненко І. В., Лихачова Т. А., Попова І. Ю.	68
Feasibility of ultrasound examination in the diagnosis of local spread of thymus tumors Minuhin D. V., Yatsenko Ye. S., Yevtushenko D. O., Kudrevych I. O., Kritsak V. V.	72
Sepsis in obstetric and gynecological praxis specifics, features and new ways to solve the problem Ostapiuk L. R.	76
Рідкісний випадок артеріїту Такаюсу з одностороннім симптомом «барабаних паличок» Петрова Є. С., Макаренко Д. О., Шапаренко О. В.	81
Вплив феномену звивистості пупкового канатика на патологію плода Пилипчук І. С., Флуд В. В.	84
Morphological changes of rats` left ventricle myocardium under the influence of infusion solutions Radoha R. V., Fomina L. V., Guminskiy Yu. I.	87
Управління ризиками при проведенні гематологічних досліджень Салімонович А. А., Єрмоєнко Р. Ф., Яценко О. Ю.	91

Значення комплексного нейровізуального обстеження хворих на цереброваскулярні захворювання Степаненко І. В., Попова І. Ю., Лукашевич П. В., Лихачова Т. А...	95
Особливості перебігу пологів у жінок з різними типами ожиріння Тишко К. М., Дрозд О. О.....	100
Оцінка ефективності ліофілізованих ксенодермоімплантатів насичених нанокристаллами срібла в місцевому лікуванні хворих з поверхневими опіковими ранами Тузюк Н. В.....	104
Signs of abdominal sepsis in patients with generalized peritonitis Fuss Yu. O., Voloboyeva A. O., Polovyj V. P.	108
Features of echo-cardiographic indicators of the left ventricle in elderly women patients with stable angines with and without comorbid type II diabetes mellitus Khapitska O. P., Sarafyniuk L. A., Merculova D. O., Shinkaruk-Dykovytska M. M.....	112
Current understanding of the acute kidney injury pathogenesis in patients with COVID-19 Khmelnov D. V., Nykula B. T., Yelizarova O. T.....	115
Коммуникативная и конфликтная компетентность интернов лечебного профиля Хоботова Н. В., Ехалов В. В.....	119
Якість життя у чоловіків, хворих на анкілозивний спондиліт, зв'язок з активністю захворювання та структурно-функціональним станом кісткової тканини Шевчук С. В., Павлюк О. М.	124
Analysis of relationships between children's and their parents' behavioral habits and periodontal status, oral hygiene in school-age children with diabetes type I diabetes mellitus Sheshukova O. V., Kuz I. O., Maksymenko A. I., Polishchuk T. V., Mosiienko A. S.....	127
THEORETICAL MEDICINE: BASIC DEVELOPMENT TRENDS	
Comparative anthropometry. Changes in the longitudinal dimensions of the upper limbs of young people, rural and urban residents, during the academic year Aleksyeyenko N. S., Andriychuk V. M.	131

Теоретична медицина: основні напрямки розвитку bacteriophages in the treatment of periodontal diseases Vakhovskiy V. V., Androshchuk O. V., Iwanytsia A. O., Bashynska O. I., Shypytsyna O. V.	135
Вплив унітіолу на функцію нирок у молодих статевонезрілих тварин Гордієнко В. В., Косуба Р. Б., Гордієнко І. К.	138
Modern socio-psychological portrait of a medical intern Yekhalov V. V., Kravets O. V., Krishtafor D. A.	141
Morphological features of the arteries of the brainstem of the human at a mature age Lyutenko M. A., Vovk O. Yu., Zharova N. V., Gubar V. O.	146
Ступінь прояву хронічної втоми у студентів молодших курсів закладів вищої медичної освіти з різними рівнями фізичного здоров'я в динаміці навчального процесу Тисевич Т. В.	149
PHARMACEUTICAL SCIENCES	
Вивчення гострої токсичності екстрактів <i>Anemone nemorosa</i> L. Базавлук С. В., Конечна Р. Т., Конечний Ю. Т., Пошивак О. Б., Піняжко О. Р.	154
Рослини роду Рутвиця (<i>Thalictrum</i>) у медичній та фармацевтичній практиці Журавель У. П., Конечна Р. Т., Кричківська А. М., Половкович С. В., Губрій З. В.	158
Порівняльний аналіз кількісного вмісту флавоноїдів у траві <i>Caltha palustris</i> , заготовленої в 2018-2020 роках Карпюк В. Р., Конечна Р. Т., Курка М. С., Милянич А. О., Хоменко О. І.	162
Підходи до відновлення порушеної смакової та нюхової чутливості внаслідок інфікування SARS-CoV-2 Луцак І. В., Косяченко Н. М., Зубрицька Т. Р.	165
Визначення стехіометричних коефіцієнтів реакції соталолу та діазолу червоного 2Ж Малецька О. Р., Васюк С. О., Коржова А. С.	169
Perspective of phytochemical research of study species of flora plants of Ukraine Steshenko Ya. M., Khortetska T. V.	173

**MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES:
INNOVATIONS OF THE FUTURE**

Somatotypu płciowe i zjawiska maskulinizacji u sportsmenek uprawiających
walkę stylu dowolnego i zapasy grecko-rzymskie

Bugajewski K. A., Rybalko L. M., Filipow E. W. 176

Актуальність фізичної терапії у разі медіального великогомілкового
стрес-синдрому у курсантів вищих військових навчальних закладів

Купріненко О. В., Тимрук-Скоропад К. А., Ціж Л. М. 180

Значення пренатальної і неонатальної діагностики
у профілактиці спадкової патології у людини

Шевчук Т. І., Васенко Т. Б., Горбатюк С. М., Климчук І. М. 183

**PREVENTIVE MEDICINE:
THE CURRENT STATE AND PROSPECTS**

Щодо проблеми компенсації енергетичних витрат
військовослужбовців під час Кваліфікаційного курсу
Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

**Депутат Ю. М., Гуліч М. П., Іванько О. М.,
Горішна О. В., Левіт Й. Р. 188**

New variants of the SARS-CoV-2 virus
and their impact on the epidemic process

Kiiianytsia V. V. 192

Remote screening and monitoring as a part of functional-organizational model
of the dermatovenerological service of Ukraine

Korolenko V. V. 196

Медико-соціальні чинники та фізичний розвиток дітей шкільного віку

**Пересипкіна Т. В., Сидоренко Т. П., Голубнича Г. І.,
Зінчук А. М., Пересипкіна А. М. 199**

Psychophysiological determinants of human longevity

**Khlietova S. S., Chorna V. V., Gumeniuk N. I.,
Sprut O. V., Khlietova I. V. 202**

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-075-9-37>

MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ARTERIES OF THE BRAINSTEM OF THE HUMAN AT A MATURE AGE

Lyutenko M. A.

*Assistant at the Department of Human Anatomy
Kharkiv National Medical University*

Vovk O. Yu.

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Human Anatomy
Kharkiv National Medical University*

Zharova N. V.

*Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Human Anatomy
Kharkiv National Medical University*

Gubar V. O.

*second-year student
Kharkiv National Medical University
Kharkiv, Ukraine*

A lot of data on the arteries of the human brainstem have been published in literature in recent years. Most of them concern the sources of its blood supply. Analysis of the literature data shows us that the extraorgan part of the arteries of the human brainstem have been studied quite enough. The issue of branching arteries of the second and third order is still controversial. As for the age characteristics of the arteries, we also did not find enough literature data. As objects of research in this work, we used 54 preparations of the brainstem with arteries of people of different sexes and mature age who died not from pathologies associated with cerebral vessels. Preparations were from the cadaveric material of the Department of Human Anatomy of the Kharkiv National Medical University.

Materials and methods. To identify the sources of blood supply, we carried out the following research methods: macroscopic, macromicroscopic – the method of V.P. Vorobiev. Measurements of the arteries were carried out using a measuring divider and an MBS-2 binocular magnifier with a wide-field

eyepiece for a binocular loupe, which magnifies the image constructed by the objective up to 20 times – SIGETA WF 20x/10 mm, and a Digital caliper. Acrylic latex (3060 LBS, SYNTHOS DWORY) tinted red (Pigment-Mix, INCHEM) was injected into the arteries. Filling of the arteries with latex was carried out with disposable 2 ml syringes through a KD-FIX catheter, G18 1.3x45 mm, which was preliminarily fixed with a ligature. After that, the preparations were fixed in a 10% formalin solution until compaction. After fixation the brainstem was examined under a magnifying glass. Slices of various thicknesses (up to 1 mm) were made from it and were further examined using the enlightenment technique and under a low magnification microscope (7X10).

Research results. The branches of the vertebral, main, anterior and posterior spinal and posterior cerebellar arteries – branches of the first, second and third orders – are distributed within the reticular substance of the medulla oblongata. Small arteries form numerous anastomoses among themselves, forming a dense arterial net. Along the entire length of the medulla of the brainstem, there are areas of relatively higher concentration of arterial vessels, which correspond to the locations of the various nuclei of the cerebral nerves. Each of these sites includes from 3 to 10 branches of the 3-4th order. These small arteries form nets of varying degrees of density and are located in the areas where the nuclei of the cerebral nerves are located.

The general direction of the arteries and arterial anastomoses reflects not only the internal structure, but also the shape of various parts of the brainstem in the form of elongated ovals and polygons. In the area of the pons, 6-12 branches depart from the main and superior cerebellar arteries that supply blood to the area of the auditory fields, 5-7 arteries to the area of the facial mounds and 3-5 arteries to the area of the trigeminal nerve nuclei. In the area of the trapezoidal body of the pons, the arteries are directed along its fibers, and are connected to each other in the form of straight, oblique, arcuate, and strongly branching anastomoses.

The midbrain is supplied with blood by arteries running in the longitudinal direction. In the area of the red nucleus, the number of arteries ranges from 6 to 11. They branch off from the middle, medial and lateral group of midbrain arteries, branch at different angles and form numerous connections and extensive nets. Distinctly identifiable nets of arteries are also located in the central substance around the Sylvian aqueduct. In the tubercles of the quadruple arteries branch first fan-shaped, then in different directions. The greatest number of arteries originating from various sources supplying the human midbrain rushes to the optic tubercle. It receives blood supply from

both the ventral and dorsal sides. The ramifications of these arteries form small-looped nets of arterial anastomoses that penetrate into the substance of the optic tubercle. In addition, in the thalamus there are straight and slightly arcuate connections between large vessels, entering the optic tubercle from opposite sides.

In a person over 60 years old, the arteries of the brainstem are bent and partly change their orientation in comparison with a younger age. This is due to the general phenomena of aging of the vascular system.

Summary. So, on the base of our studies, we can conclude that part of the arterial anastomoses, both between individual arteries and between arterial networks, branches along their course, creating multiple network plexuses between themselves. Therefore, the arterial bed of the human brain stem in most areas (especially in the midbrain and diencephalon) can be characterized as a continuous arterial network, not divided into distinct zones. The significant development of the arteries of the brainstem can be explained, apparently, by the maximum development in a person of the brainstem itself, which receives arterial blood supply from a greater number of sources, as indicated by both literary and our own data. It is also associated with the growth and development of the terminal brain and the influence on the trunk of the cerebral cortex.

References:

1. Хейнс Д. Нейроанатомия: атлас структур, срезов и систем / Д. Хейнс. – Москва: Логосфера, 2008. – 344 с.
2. Cardin V. Sensitivity of human visual and vestibular cortical regions to egomotion-compatible visual stimulation / V. Cardin, A.T. Smith // *Cereb.*
3. *Cortex.* – 2010. – Vol. 20, N 8. – P. 1964–1973. Johnson C.L. Local mechanical properties of white matter structures in the human brain / C.L. Johnson, D. McGarry, A.A. Gharibans [et al.] // *Neuroimage.* – 2013. – Vol. 79. – P. 145–152.
4. Пат. № 52432, UA, МПК А61В 5/04 / Харківський національний медичний університет, Степаненко О.Ю. – З. № u201002490; Заявл. 05.03.2010; Опубл.
5. 25.08.2010. Спосіб визначення зони васкуляризації структур головного мозку. Фомкина О. А. Прочностные свойства артерий основания головного мозга взрослых людей зрелого возраста / О. А. Фомкина // *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки.* – 2009. – № 2 (10). – С. 39–43.

6. Низамов Ф.Х. Функциональные возможности ветвей мозговых артерий в зависимости от типов их ветвления / Ф.Х. Низамов // Медицинская наука и образование Урала. – 2016. – Т. 17. № 1 (85). – С. 50–53.

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-075-9-38>

СТУПІНЬ ПРОЯВУ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ У СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я В ДИНАМІЦІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Тисевич Т. В.

*асистент кафедри загальної гігієни та екології
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна*

Актуальність. Постійний потік інформації посилює психічну діяльність людини, викликаючи психологічне напруження та перенапруження. На думку психологів, саме таке психологічне перенапруження, в свою чергу, може спровокувати виникнення хронічної втоми. Хронічна втома виникає в осіб незалежно від соціального статусу, освіти та рівня доходів. Вона є синдромом тих, хто багато та сумлінно працює [1, с. 6].

Студентський період, особливо на молодших курсах, характеризується формуванням нового стереотипу повсякденної діяльності, необхідністю швидкої адаптації їх організму до незвичного середовища перебування, міжособистісних відношень, найбільшим рівнем функціонального напруження регуляторних систем організму. Тоді, коли ці чинники перевищують поріг студентського сприйняття, виникає психологічне перенапруження і, як наслідок, хронічна втома. При хронічній втомі відмічається не відповідність між витратами енергії організмом та процесами її поповнення, що знижує адаптаційні можливості та опірність організму до дії чинників зовнішнього середовища. Наскільки ефективно організм буде чинити опір різним чинникам залежить від його функціональних резервів, основою яких є фізичне здоров'я.

Мета дослідження: визначити ступінь хронічної втоми студентів I курсу закладів вищої медичної освіти в міжсесійний і сесійний періоди та встановити її взаємозв'язок з рівнем фізичного здоров'я.