Бутов Д.А., Ипатова М.А., Худолей Е.В

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Актуальность: За последнее время в мире и на Украине наблюдается нестабильная ситуация по туберкулезу (ТБ). В 2013 году Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) включила заболевания туберкулезом в число 10 ведущих причин смертности в мире. Рост заболеваемости во многом связан с прогрессирующим ухудшением экологического состояния окружающей среды, ростом химиорезистентных форм туберкулеза ибольных с ко-инфекцией (ВИЧ/СПИД и ТБ). При этом, мужчины и женщины в разной степени подвержены влиянию факторов риска, и для ряда заболеваний органов дыхания характерен гендерный диморфизм. Однако влияние гендера в этой области изучено недостаточно.

Таким образом, целью нашего исследования было проанализировать гендерные особенности у больных с туберкулезом легких по аналитически-статистическим справочникам за 2012-2014года.

Материалы и методы: Нами былапроанализирована статистика заболеваемости ТБ за 2012-2014года по аналитически-статистическим справочникамУкраины. Сравнения статистических показателей проводились в процентном соотношение с определением t критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение.По результатам когортного анализа выявлено, что в 2012 году общее число заболевших составило 68,1 на 100тыс.населения (30819 человек), 38,6(56.7) на 100тыс. из которых составили мужчины и 29,5(43.3) на 100тыс. женщины($p<0.05$). В 2013 году заболеваемость туберкулезом составила67,9 на 100 тыс. населения (29925 человек),46,4.(68.3%) на 100тыс. из которых составили мужчины и 21,5(31.7%) на 100тыс. женщины, что свидетельствует более высшему показателю у мужчин, нежели у женщин ($p<0.05$). Заболеваемость туберкулезом в Украине в 2014 составила 59,5 на 100тыс. населения (25543 человека(данные посчитаны на население без учета временно окупированных территорий АР Крым и г.Севастополь)), при этом

заболеваемость среди мужчин составила 31,3(52.6%) на 100тыс.населения и 28,2(47.4%) на 100тыс.населения среди женщин. ($p<0.05$).Расчетный показатель заболеваемости туберкулезом в тюрьмах примерно в 50 раз превышает аналогичный показатель среди гражданского населения.По данным за 2012 год туберкулез выявлен у 8205 лиц, находящихся в местах лишения свободы, из которых 5341(65.1%) – мужчины и 2864(34.9%) - женщины.

Выводы: Таким образом, несмотря на вариабельность причин заболеваемости,гендерные особенности играют важную роль в восприимчивости развития туберкулезного процесса.