

**ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ**

ДОПОВІДЬ :

- ▣ Хондросаркома вушної раковини. Особливості клінічного перебігу.

- ▣ доц. Гуржій О.В.,
- ▣ доц. Коломієць С.В.,
- ▣ доц. Дубровіна О.В.

- ▣ Полтава 2026

Визначення поняття злоякісної пухлини

- ❑ Злоякісна пухліна — патологічний процес, зумовлений неконтрольованим розмноженням клітин, інвазією та, іноді, метастазуванням. Залежно від типу тканини, клітини якої перетворились на злоякісні, розрізняють рак, саркому, лімфому та інші види злоякісних пухлин.
- ❑ Загальною характеристикою злоякісних пухлин є їх виражені тканинні аплазія, атипізм (тобто втрата клітинами здатності до диференціювання із порушенням структури тканини, з якої розвивається пухлина), агресивне зростання з ураженням, як самого органу, так і інших прилеглих органів, (інфільтративний ріст) схильність до метастазування (ознака інвазії) , кахексія.

Ознаки злоякісних пухлин:

- ▣ Пухлинні клітини характеризуються втратою диференціювання, спрощенням і атиповістю будови.
- ▣ Швидкий ріст пухлини, що спонтанно не зупиняється, мимовільна регресія таких пухлин не відома.
- ▣ Інвазивний ріст — інфільтрують навколишні тканини.
- ▣ Зазвичай метастазують.
- ▣ При відсутності ефективного лікування призводять до неблагоприємного результату.

Методи діагностики пухлин щелепно-лицевої ділянки

- Загальний огляд хворого
- Лабораторні дослідження
- ▣ Променеві методи обстеження:
 - (Радіоізотопне сканування,
 - Визначення гормонів та пухлинних маркерів)
 - Радіонуклідні дослідження.
 - Морфологічні дослідження.
 - Імунодіагностика.
 - Ендоскопічне обстеження.

Хондросаркома вуха

- ▣ Хондросаркома вуха (точніше, скроневої кістки або основи черепа поруч із вухом) — це **вкрай рідкісна злоякісна пухлина**, яка становить менше ніж 1% від усіх новоутворень головного мозку та черепа.
- ▣ Пухлина розвивається з хрящових клітин у місцях з'єднання кісток черепа, найчастіше вражаючи **скроневу кістку** (де розташовані структури середнього та внутрішнього вуха)

Хондросаркома вушної раковини



Характерні симптоми

- ▣ Через близькість до слухового апарату та черепних нервів пухлина проявляється неврологічними симптомами:
- ▣ Поступова втрата слуху (часто з одного боку).
- ▣ Постійний шум або дзвін у вухах.
- ▣ Парез (параліч) лицьового нерва — асиметрія обличчя, опущення куточка рота чи повіки.
- ▣ Глибокий біль у вусі (оталгія) або головний біль у скроневій зоні.
- ▣ Запаморочення (вертиго) та порушення рівноваги

Діагностика та лікування

- ▣ **Діагностика:** Обов'язково проводять **КТ високої роздільної здатності** (щоб побачити руйнування кістки) та **МРТ** (для оцінки поширення на судини й м'які тканини мозку). Остаточний діагноз ставлять лише після **біопсії**.
- ▣ **Лікування:** Головним методом є **високотехнологічна хірургічна операція** (видалення пухлини основи черепа). Через стійкість хондросаркоми до класичної променевої терапії, після операції може застосовуватися специфічне високоточне опромінення (наприклад, протонна терапія)

Рекомендації

- ▣ Лікарі-стоматологи мають уважно вивчати питання онкології.
- ▣ При обстеженні використовувати основні та додаткові методи дослідження.
- ▣ При необхідності звертатись за консультаціями до лікарів суміжних спеціальностей.
- ▣ Виконувати рекомендації щодо онконастороженості.

Дякуємо за увагу