MECHNIKOV READINGS
Kharkiv
International
Infectious Diseases
Conference

# МАТЕРІАЛИ

## НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ



## «МЕЧНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ - 2026: ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ СЬОГОДЕННЯ»

**М. ХАРКІВ, 06 ЛИСТОПАДА 2026 РОКУ**





**Харків**
**2026**

**Харківський національний медичний університет**
**ГО «Всеукраїнська Асоціація інфекціоністів»**
**Платформа безперервного професійного розвитку Openlikar**

# МЕЧНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2026: ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ СЬОГОДЕННЯ

**Матеріали науково-практичної конференції**
**з міжнародною участю**
**(6 листопада 2026 року, м. Харків)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**
**вченою радою ХНМУ.**
**Протокол № 10 від 29.10.2026 р.**

**Харків**
**2026**

**УДК 616.9(082)**

***Редакційна колегія:***

**проф., д.мед.н. *К.В. Юрко* (відповідальний редактор)**

**доц., к.мед.н. *О.Є. Бондар***

**доц., к.мед.н. *Г.О. Соломенник***

**доц., к.мед.н. *Я.І. Бурма***

Відповідальність за достовірність фактів, дат, назв, імен, прізвищ, цифрових даних, що наводяться у публікаціях, несуть автори тез.

Без редагування.

**© Харківський національний медичний університет, 2026**

**© Кафедра інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб та фтизіатрії ХНМУ, 2026**

*Бездітко Т.В., Єрьоменко Г.В., Рогожин А.В.*

# АЛЕРГІЧНЕ ЗАПАЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ ОБСТРУКЦІЇ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ

*Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна*

**Мета роботи.** Узагальнити сучасні дані щодо ролі алергічного запалення у розвитку бронхіальної обструкції при бронхіальній астмі та розглянути можливості її діагностики й сучасної терапії.

**Матеріали та методи.** Проведено аналіз сучасних наукових публікацій, міжнародних рекомендацій та клінічних досліджень, присвячених механізмам розвитку бронхіальної астми, особливостям алергічного запалення та формуванню бронхообструкції.

**Результати.** Алергічний тип запалення дихальних шляхів реалізується за участю клітин вродженого й адаптивного імунітету, серед яких провідне значення мають еозинофіли, опасисті клітини, базофіли, Т-лімфоцити та ILC2. Епітеліальні алярміни TSLP, IL-25 та IL-33 беруть участь в активації Th2- і ILC2-відповіді. Подальша продукція IL-4, IL-5 та IL-13 сприяє IgE-опосередкованим реакціям, активації опасистих клітин та залученню еозинофілів.

Бронхіальна обструкція формується внаслідок взаємодії бронхоспазму, набряку слизової оболонки та надлишкової секреції слизу. При тривалому перебігу запального процесу структурні зміни дихальних шляхів – ремоделювання, гіпертрофія гладенькоm'язових структур, гіперплазія келихоподібних клітин і субепітеліальний фіброз – можуть сприяти стійкому обмеженню повітряного потоку.

Для характеристики запального фенотипу можуть застосовуватися рівень загального IgE, кількість еозинофілів у крові та мокротинні, еозинофільний катіонний білок і FeNO. Підтвердження наявності бронхообструкції здійснюють насамперед за допомогою спірометрії з бронходилатаційним тестом.

Сучасний підхід до лікування передбачає контроль запального процесу та вибір терапії з урахуванням фенотипу захворювання. Базисну фармакотерапію становлять інгаляційні глюкокортикостероїди у поєднанні з бронходилататорами тривалої дії; при тяжкій астмі можуть застосовуватися таргетні біологічні препарати, спрямовані на IgE та ключові цитокінові механізми.

**Висновки.** Алергічне запалення відіграє важливу роль у формуванні бронхіальної обструкції при бронхіальній астмі. Оцінка фенотипу запалення із застосуванням відповідних біомаркерів дозволяє покращити діагностику та обґрунтувати персоналізований підхід до лікування.

*Білера Н.В[1]., Шолохова С.Є[2].*

## АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВИЯВЛЕННЯ ОПІСТОРХОЗУ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2001–2015 РОКАХ

*[1]Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна*

*[2]КНП СОР «Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення», м. Суми, Україна*

**Мета роботи:** проаналізувати динаміку виявлення опісторхозу та обсягів обстежень на опісторхоз у Сумській області у 2001–2015 рр.

**Матеріали та методи:** на підставі щорічних звітів форм № 2 і № 40 ГУ Держсанепідслужби у Сумській області, ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ України» та ДУ «ЦГЗ МОЗ України» було проведено ретроспективний аналіз частоти виявлення випадків на 100 тис. обстежених за період 2001–2015 рр.

**Результати:** за період 2001–2015 рр. у Сумській області було обстежено 2839737 осіб. Зареєстровано 7713 випадків опісторхозу, з яких 4758 (61,7 %) виявлено вперше. Щорічно планово проводились обстеження дітей організованих дитячих закладів, декретованих контингентів (персонал дитячих закладів, працівники харчових і комунальних підприємств) та населення

**ЗМІСТ**


| | |
|---|---|
| *М'ясоєдов В.В., Юрко К.В., Ткаченко В.Г., Могиленець О.І., Девятілова В.В., Соломенник Г.О., Бурма Я.І., Бондар О.Є.*<br>**УЧИТЕЛЬ НА ВСІ ЧАСИ! СВІТЛІЙ ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА КОЗЬКА (1943-2026)** | **3** |
| *Бездітко Т.В., Єрьоменко Г.В., Рогожин А.В.*<br>**АЛЕРГІЧНЕ ЗАПАЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ ОБСТРУКЦІЇ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ** | **10** |
| *Білера Н.В., Шолохова С.Є.*<br>**АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВИЯВЛЕННЯ ОПІСТОРХОЗУ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2001–2015 РОКАХ** | **11** |
| *Бондар О.Є.[1], Юрко К.В.[1], Ковальова Г.С.[12], Дудукіна С.О.[2]*<br>**МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ПЕЙЗАЖ ТА ПРОФІЛІ AMR РЕСПІРАТОРНИХ ІЗОЛЯТІВ ПРИ ВЕНТИЛЯТОР-АСОЦІЙОВАНІЙ ПНЕВМОНІЇ У ПАЦІЄНТІВ НЕЙРОІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ** | **13** |
| *Бондар О.Є.[12], Янішевська Л.П.[2]*<br>**ОЦІНКА РЕГРЕСУ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТКИ З ХРОНІЧНИМ ГЕПАТИТОМ С ПІСЛЯ ТЕРАПІЇ ПРЕПАРАТАМИ ПРЯМОЇ ПРОТИВІРУСНОЇ ДІЇ: ТРИРІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ** | **15** |
| *Бондарева А.В., Стеценко С.О.*<br>**БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЯК ПРЕДИКТОРИ ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ БАКТЕРІАЛЬНОГО СЕПСИСУ** | **17** |
| *Бондаренко А.В., Чумаченко Т.О.*<br>**ДВОФАКТОРНА МАТРИЧНА МОДЕЛЬ СТРАТИФІКАЦІЇ РИЗИКУ АНТИМІКРОБНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ НА ЕТАПАХ ЕВАКУАЦІЇ** | **19** |
| *Бондарєва М.С.*<br>**ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА БАР'ЄРИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ** | **21** |
| *Боршовська О.О., Галамба А.А.*<br>**ВІЛЬНОЖИВУЧІ АМЕБИ ЯК ЕКОЛОГІЧНА НІША ДЛЯ *YERSINIA PESTIS*: ПЕРСИСТУВАННЯ МІЖ ЕПІЗООТІЯМИ** | **23** |
| *Бочаров В.М., Чабан Т.В.*<br>**ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ГЕМОСТАТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ ІЗ COVID-19** | **24** |
| *Бражник М.О., Селегень О.М., Тверезовська І.І.*<br>**ТЮТЮНОПАЛІННЯ, ЯК ФАКТОР РИЗИКУ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ** | **26** |
| *Велієва Т.А.*<br>**КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТОКСОПЛАЗМОЗНОГО ЕНЦЕФАЛІТУ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ** | **28** |