

616.927  
5-75

Серия диссертаций, допущенных къ защитѣ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ  
Военно-Медицинской Академіи въ 1893—1894 учебномъ году.

7-НОВЯ 2012

№ 68.

КЪ ВОПРОСУ

# О ВОЗВРАТАХЪ БРЮШНАГО ТИФА.

33

ДИССЕРТАЦІИ

НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

Павла Игнатьевича Дроздовскаго.

3944  
1944

Изъ Александровской городской въ память 19 Феврали  
1861 года больницы.

Цензорами диссертации, по порученію конференціи, были: академикъ *Л. В. Поповъ*, профессоръ *Н. И. Соколовъ* и приватъ-доцентъ *В. П. Доброклюнскій*.

Изм. НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
№ 1-го Харьк. Мед. Института

ПРОВЕРЬЕНО 1936

Перечет  
1966 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Типографія В. С. Эттингера, Казанская, № 11.  
1894.

Харьковскаго Медика. Института  
БИБЛИОТЕКА  
№ 4729

1950

Перуэт-60

7-403 7112

Докторскую диссертацию лекаря Павла Игнатьевича Дроздовскаго под заглавіемъ: «Къ вопросу о возвратахъ брюшнаго тифа» печатать разрѣшается, съ тѣмъ, чтобы, по отпечатаніи оной, было представлено въ Конференцію ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академіи 500 экземпляровъ ея. С.-Петербургъ, апрѣля 2 дня 1894 года.

И. д. Ученаго Секретаря, Профессору *К. Виноградова*.

Брюшной тифъ есть типичный представитель тѣхъ острыхъ инфекціонныхъ заболѣваній, которыя, по ученію умершаго проф. С. П. Боткина <sup>1)</sup>, слѣдуютъ закону волнообразнаго теченія температуры. Протекая безъ осложненій, могущихъ такъ или иначе вліять на измѣненіе хода температуры, брюшной тифъ даетъ одну или нѣсколько температурныхъ волнъ на лихорадочныхъ цифрахъ и переходитъ или постепенно, или, повидимому, обрывисто въ періодъ выздоровленія. Этотъ послѣдній протекаетъ либо совершенно безлихорадочно, либо въ нѣкоторые дни даетъ единичныя повышенія температуры; иногда же правильность его теченія нарушается полнымъ или почти полнымъ возвратомъ тѣхъ симптомовъ болѣзни, какіе имѣлись при первомъ ея проявленіи.

Относительно отдѣльныхъ повышеній температуры въ періодъ выздоровленія проф. С. А. Wunderlich <sup>2)</sup> говоритъ слѣдующее: «наступленіе полнаго выздоровленія (Reconvalescenz) при брюшномъ тифѣ можно признать, если и вечеромъ температура даетъ не лихорадочныя цифры, если, по крайней мѣрѣ, два дня подрядъ получается низкая температура. Часто она бываетъ нѣсколько ниже, чѣмъ въ здоровомъ состояніи, утромъ  $36,0^{\circ}$  —  $36,5^{\circ}$ , вечеромъ ниже  $37,0^{\circ}$ , что еще болѣе убѣждаетъ въ выздоровленіи. Однако часто періодъ выздоровленія нарушается. Немалозначущи продолжающіеся недолго, нерѣдко высокіе подъемы температуры, которые очень часто наступаютъ послѣ перваго приема мяса или другихъ питательныхъ веществъ. Во многихъ случаяхъ брюшнаго тифа, какъ легкихъ, такъ и тяжелыхъ появляются новыя лихорадочныя состоянія, продолжающіяся 1—3 дня; причины же ихъ остаются неизвѣстными. Хотя они и случайны, однако могутъ затянуть выздоровленіе и при несоответствующемъ содержаніи больного могутъ быть вредны для него. Обыкновенно единственный указатель ихъ это — температура. Въ нѣкоторыхъ эпидеміи періодъ выздоровленія почти въ каждомъ случаѣ сопровождается такими лихорадочными состояніями и у одного и того же больного они могутъ повториться

<sup>1)</sup> Клиническія лекціи проф. С. П. Боткина за 1883—84 г., а также см. статью В. М. Ворузіна въ т. VII архива клиники внутреннихъ болѣзней проф. С. П. Боткина.

<sup>2)</sup> Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten 1868 г., стр. 296.

6shh9  
A  
6shh9

два—три раза». Таким образом в этом описании проф. С. А. Wunderlich'a периода выздоровления от брюшного тифа нет указания на так называемые «typhöse Nachschübe». Что разуметь под этим названием проф. С. А. Wunderlich, может пояснить следующая выдержка из того же его сочинения <sup>5)</sup>: «Напротив не редко, особенно в наиболее легко протекающих случаях бывают ожесточения и возвраты процесса. При этом замечается существенная разница в ходѣ и опасности, смотря по тому, начинается ли возврат болязни (Erneuerung des Processes) в повых мѣстах в то время, когда прежнія поражения еще не имѣют никакой наклонности къ заживленію или сдѣлали въ этом отношеніи немного (Recrudescenz, typhöser Nachschub), или же излечение шло далеко и уже наступила апирексія. В первомъ случаѣ повышение температуры надъ существовавшими до сихъ поръ умеренными ея высотами означаетъ начало ожесточения (Recrudescenz), или же при наступающей паденіи температуры сразу является измѣненіе ея типа: ежедневная ремиссія дѣлается менѣе глубокими, дневныя ожесточения наступаютъ раньше, дѣлаются болѣе высокими, длятся дольше и являются въ большинствѣ случаевъ тяжелыми, вызывая неправильное теченіе болязни, которое связано для больного съ большими опасностями. Совсѣмъ иначе дѣло съ настоящими рецидивами, которые начинаются по достиженіи апирексій и берутъ свое начало въ реконвалесценціи». Такимъ образомъ изъ этихъ двухъ выдержекъ видно, что проф. С. А. Wunderlich, указавъ на повышеніи температуры въ периодъ выздоровленія и на возможную связь однихъ съ первымъ приемомъ пищи, другихъ же, продолжающихся 1—3 дня, безъ извѣстныхъ причинъ, не даетъ этимъ повышеніямъ никакого названія, а лишь констатировать ихъ существованіе.

Подобная же указанія на эти повышенія температуры въ периодъ выздоровленія отъ брюшного тифа то съ прибавленіемъ «послѣдовательныхъ лихорадокъ Biermer'a» <sup>6)</sup>, то безъ названія находятся въ руководствахъ проф. Griesinger'a <sup>4)</sup>, Jaccoud <sup>5)</sup>, Liebermeister'a <sup>6)</sup>, Chantemesse'a <sup>7)</sup>, Eichhorst'a <sup>8)</sup>, Strümpell'я <sup>9)</sup> и въ

<sup>5)</sup> I. с. стр. 280. Дѣлаю эту выдержку, такъ какъ нѣкоторые авторы сдѣлываютъ «typhöse Nachschübe» съ Biermer'овскими колебаніями температуры.

<sup>6)</sup> Проф. Biermerъ похъ „Nachfieber“ разуваетъ возмозожное рецидиво при выздоролении отъ тифа, некодо прололзавозивше лихорадку, причина которой темна и которая не можетъ быть сведена на возвратъ тифа. См. диссерт. O. Fleisch'l'a, Ueber Recidive und Nachfieber beim Abdominaltyphus. Zürich 1873 г. 4) Горячечныя болязни т. I, русс. перел. 1866 г. 5) руководство съ акушерской патологіи т. IV, русс. перел. 1879 г. 6) руководство къ частной патологіи

Real-Encyclopädie Eulenburg'a <sup>10)</sup>; а также въ статьяхъ проф. Л. Попова <sup>11)</sup>, Пастернацкаго <sup>12)</sup>, д-ровъ Влуденуа <sup>13)</sup> и Иждодина <sup>14)</sup>. Большая часть указанныхъ авторовъ ставятъ эти повышенія температуры въ зависимость отъ погрѣшностей въ діетѣ, отъ душевнаго волненія и ранняго вставанія съ кровати. Особнякомъ относительно причины происхожденія повышеній температуры въ периодъ выздоровленія отъ брюшного тифа стоить мнѣнія проф. Л. Попова, д-ра Иждодина и проф. Strümpell'я. Взглядъ проф. Л. Попова лучше всего виденъ въ следующую выдержку изъ его статьи: «Конечно, можно различать, съ практической точки зрѣнія, собственно такъ называемые рецидивы брюшного тифа отъ такъ называемыхъ послѣдовательныхъ лихорадокъ (Biermer) или нами названныхъ дополнительныхъ лихорадокъ, разумѣя подъ первымъ болѣе или менѣе полную картину тифа (лихорадка, опухоль селезенки, розеола, кишечная растрйоства), а подъ послѣдними главнымъ образомъ лихорадочныя движенія, не находящія себѣ объясненія въ осложненіяхъ,—но тѣмъ не менѣе однакожъ мы знаемъ, что и при этихъ послѣдовательныхъ или собственно дополнительныхъ лихорадочныхъ движеніяхъ селезенка обычно представляется также увеличенной, а розеола, какъ извѣстно, не всегда наблюдается и при первичномъ заболѣваніи тифомъ. То же можно сказать и относительно постоянства явленій со стороны кишечника. А отсюда понятно, какая трудность возникаетъ въ опредѣленіи рецидивовъ въ томъ или другомъ частномъ случаѣ. Но здѣсь встрѣчается еще другое не менѣе существенное обстоятельство, которое сглаживаетъ разницу между обоими вторичными болязненными процессами—рецидивомъ и дополнительной лихорадкой—еще болѣе значительно. Выше мы видѣли, что послѣдовательныя лихорадочныя движенія, являющіяся иногда безъ видимыхъ причинъ по окончаніи тифа, проявляются въ такое время, которое, будучи разсматриваемо въ соотношеніи съ колебаніями температуры во время теченія тифа и со временемъ его окончанія, представляетъ извѣстную правильность, указывающую на существенную связь съ вышеска-

и терапіи Цимссена т. II, ч. I, русс. пер. 1879 г. 7) Traité de Médecine Charcot et Bouchard т. I. 8) Специальная патологія и терапія т. IV, 3-е русс. изд. 9) Практич. медицина № 1. 1894 г. 10) т. II. 11) Нѣкоторыя наблюденія ить казуистика сыпнаго и брюшного тифовъ отъ отвѣтъ 1885 г. изъ классическаго сборника. 12) О влианіи современнаго жаропонижающаго леченія на частоту возвратовъ брюшного тифа. Врачъ 1888 г. № 22, 23, 26 и 27. 13) Къ вопросу о возвратахъ брюшного тифа. Врачъ 1891 г. № 49—50. 14) Къ казуистикѣ возвратовъ брюшного тифа у дѣтей. Больничн. газета Боткина 1892 г. № 6—8.

занными колебаниями. То же самое наблюдается и по отношению ко времени обнаружения рецидивов. Тѣ большія температурныя колебанія, которыя такъ нѣрѣдко наблюдаются при первомъ теченіи тифа, по его прекращеніи, чрезъ извѣстные правильные промежутки времени, — приблизительно отвѣчающіе времени самихъ колебаній, или кратнымъ отъ этого числа, — снова обнаруживаются и начинаютъ проявлять себя нѣрѣдко съ тою же правильностью и періодичностью, какъ и въ предыдущій разъ. А это указываетъ, что какъ предыдущія, такъ и послѣдующія или дополнительныя лихорадочныя движенія, такъ точно и лихорадочныя движенія, принадлежащія рецидиву, представляютъ не что-нибудь новое и совершенно независимое отъ предыдущаго заболѣванія тифомъ, а, наоборотъ, составляютъ явленія, стоящія въ непосредственной связи съ предыдущимъ заболѣваніемъ, можно сказать, — его продолженіе. А это еще болѣе сблизжаетъ и тѣ, и другія разбрасываемыя явленія между собою.

Д-ръ же Ижболдинъ и проф. Strümpell, допуская признаваемую большинствомъ причину повышенія температуры въ періодъ выздоровленія отъ брюшнаго тифа, считаютъ возможнымъ дать этимъ повышеніямъ и иное объясненіе. Первый изъ нихъ предполагаетъ, что подобныя повышенія отчасти могутъ зависѣть отъ всасыванія болѣзнетворныхъ началъ, оставшихся еще въ организмѣ и вновь поступающихъ въ кровь, причемъ эти повышенія температуры никакъ не вызваны со стороны органа не вызывають. Проф. же Strümpell думаетъ, что въ такихъ случаяхъ кратковременныхъ, но весьма значительныхъ повышеній температуры слѣдуетъ предполагать заболѣваніе брюшныхъ лимфатическихъ железъ. Впрочемъ, говорить объ, такія внезапныя и очень сильныя повышенія температуры почти всегда бывають лишены дальнѣйшаго значенія. Вотъ этими-то указаніями и исчерпываются свидѣнія объ отдѣльныхъ повышеніяхъ температуры въ періодъ выздоровленія отъ брюшнаго тифа.

Гораздо разработаннѣе является вопросъ о возвратахъ<sup>99</sup>) брюшнаго тифа. Такъ какъ литература этого вопроса до 1891 года подробно приведена въ статьяхъ проф. Пастернака<sup>10)</sup> и д-ра Блумау<sup>11)</sup>, то здѣсь лишь кратко охарактеризуемъ положеніе дѣла въ настоящее время. Почти всѣмъ<sup>16)</sup> признано, что возвратъ

<sup>99)</sup> Ибоглаго, крокъ выдержекъ изъ статей, слова рецидивъ такъ какъ французскіе авторы разумѣють подъ этимъ словомъ повторное заболѣваніе брюшнаго тифомъ. 14) I. с. 15) I. с. 16) Проф. Liebermeister (I. с.), Jaccoud (Медц. Обозрѣніе 1885 г.), Weil (Медц. Обозрѣніе 1885 г.), Л. Поповъ (I. с.), Eichhorst (I. с.), Chantemesse (I. с.) Филатовъ (Лекція объ острыхъ инфекціон-

брюшнаго тифа какъ клинически, такъ и патолого-анатомически есть дѣйствительное повтореніе тифознаго процесса, которое происходитъ отъ дѣйствія яда, остающагося послѣ перваго приступа гдѣ-нибудь скрытно въ организмѣ. Обнаруженію подготовленнаго возврата могутъ способствовать легкія погрѣшности въ діетѣ, пощеніе или сильное движеніе<sup>17)</sup>. Но проф. Gerhardt<sup>18)</sup> и отчасти д-ръ Н. Schmidt<sup>19)</sup> не придаютъ этимъ причинамъ большаго значенія, находя (проф. Gerhardt), что причина скорѣе лежитъ въ самой природѣ заболѣванія. Между возвратами и первымъ приступомъ болѣзнъ долженъ существовать свободный отъ лихорадки промежутокъ. Продолжительность его не представляетъ чего либо точно опредѣленнаго и указанія на длину промежутокъ, повидимому, цѣлкомъ зависятъ отъ наблюдавшихся каждымъ авторомъ случаевъ. Такъ, проф. Jaccoud<sup>20)</sup> въ одной изъ своихъ лекцій говоритъ: «возвратъ можетъ повиться чрезъ два дня, даже чрезъ сутки, а иногда онъ слѣдуетъ непосредственно за безлихораднымъ промежуткомъ, на долю котораго приходится лишь нѣсколько часовъ; въ среднемъ давня промежутокъ пять—десять дней (въ исключительныхъ случаяхъ 20—29 дней), такъ что въ большинствѣ случаевъ чрезъ десять дней послѣ паденія температуры можно считать болѣзнь внѣ опасности возврата». Въ опубликованной же раньше<sup>21)</sup>, а равно и въ послѣднее время опубликованной лекціи<sup>22)</sup> тотъ же проф. Jaccoud указываетъ, что ему приходилось видѣть возврата на 38—40-й день безлихораднаго состоянія, длина котораго для большинства случаевъ равна 3—10 днямъ. Подобнаго же влѣда держится и д-ръ Ижболдинъ<sup>23)</sup>: давня промежутокъ у него колеблется отъ 2 до 13 дней. По отчету за первое десятилѣтіе городской барачной въ память С. П. Боткина больницы за 1882—1892 г. (изд. 1892), гдѣ въ рубрикѣ возвратовъ брюшнаго тифа помѣщенъ отчетъ за 1882—1886 года, длина безлихораднаго промежутка равняется 5—6 днямъ. Доктору же Звѣнецъ<sup>24)</sup>, писавшій свою статью на основанія исторій болѣзней той же больницы за 1882—1885 г., требуетъ продолженія

ныхъ болѣзняхъ у дѣтей 1891 г.). 17) Проф. Ziemssen (Клинич. лекція перев. русскій Дубозера 87 г. № 5), Liebermeister (I. с.), Jaccoud (руководство къ внутрен. педиатр. русск. переводъ Ж. М. Максимовой т. IV 1879), Weil (sur Pathologie und Therapie abdominalis—no referatъ Медц. Обозрѣніе т. XXIV 1885 г. № 17), Eichhorst (I. с.). Однако и до сихъ поръ некоторые смотрятъ на возвратъ какъ на проявленіе новаго зараженія 18) Deutsche Arch. f. klin. Med. Bd. XII, 19) Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 43, 20) Journ. de méd. et de chir. prat. 1885, № 2 по проф. Мед. Обозрѣніе 1890 г. № 2, 21) Lecons de clinique médicale 1885. По проф. Мед. Обозрѣніе 1885 г. 22) Le bulletin médical. № 5. 1894 г. 23) I. с. 24) О настоящихъ и минувшихъ возвра-

тельности безлихорадочного промежутка 7 — 10 дней. По проф. Liebermeister'у<sup>25)</sup>, Chantemesse'у<sup>26)</sup> и д-ру Блумену<sup>27)</sup> продолжительность апирексии может быть от 4 до 27 дней. В описанных проф. Лапчинским<sup>28)</sup> случаях продолжительность безлихорадочного состояния была от 10 до 42 дней. Доктор же Гадзильский<sup>29)</sup> наблюдал случай брюшного тифа, где возврат наступил послѣ 60-го дня отсутствия лихорадки. Въ эти авторы считают однако продолжительность безлихорадочного состояния имеющею большое значение. Напротив, д-ръ Подановскій<sup>30)</sup> не придает никакого значения длителю этого промежутка, требуя, чтобы только была ясно выражена апирексия.

Наблюдаются возвраты брюшного тифа как послѣ легких, так и тяжелых случаев, причѣм, по проф. Eichhorst'у<sup>31)</sup>, болѣеи процентъ возвратовъ бываетъ при повторныхъ заболѣваніяхъ брюшнымъ тифомъ. Продолжительность возврата, по проф. Liebermeister'у<sup>32)</sup>, въ общихъ чертахъ бываетъ то больше, то меньше, то равна первому приступу болѣзни. По проф. Weil'ю<sup>33)</sup> и доктору Мау<sup>34)</sup>, возвратъ можетъ продолжаться отъ 3 до 32 дней, по д-ру Блумену<sup>35)</sup> отъ 4 до 18 дней, по проф. Jaccoud'у<sup>36)</sup> отъ 5 до 14, а въ исключительныхъ случаяхъ до 18 — 21 дня. Возвраты въ случаяхъ д-ра Ижболдина<sup>37)</sup> длились отъ 10 до 25 дней. Д-ръ же Подановскій<sup>38)</sup> требуетъ отъ возврата продолжительности не менѣе 8 дней.

Для діагноза возврата считаются необходимыми: ступенчатое повышение температуры, розеола, опухоль селезенки и кишечныя расстройства. При этомъ одни авторы (проф. Liebermeister, Weil, д-ра Мау и Ижболдинъ)<sup>39)</sup> требуютъ по крайней мѣрѣ двухъ изъ этихъ признаковъ, другіе же (д-ръ Подановскій)<sup>40)</sup> существованія трехъ симптомовъ. Изъ указанныхъ признаковъ д-ръ O. Fleischl<sup>41)</sup> считаетъ розеолу главнымъ критеріемъ возврата, а при отсутствіи ея требуетъ наличности всѣхъ остальныхъ признаковъ тифа. Однако новое появленіе розолы наблюдается рѣже другихъ симптомовъ: въ 18 случаяхъ проф. Weil'я<sup>42)</sup> она отмѣчена въ двухъ; изъ 12 д-ра

Блумену<sup>43)</sup> въ трехъ; изъ 6-ти д-ра Ижболдина<sup>44)</sup> въ одномъ; проф. же Jaccoud<sup>45)</sup> видѣлъ ее въ 30% своихъ случаевъ. Чаше при возвратахъ существуетъ прихулость селезенки: по д-ру Мау въ 63%, по проф. Weil'ю въ 95%, по д-ру Блумену въ 83%, а въ 6-ти случаяхъ д-ра Ижболдина она была во всѣхъ<sup>46)</sup>.

Что касается числа возвратовъ, то оно можетъ простираться отъ 1 до 5-ти у одного и того же больного. Въ указанныхъ въ статьѣ д-ра Блумену<sup>47)</sup> случаяхъ Wunderlich'a, Griesinger'a, Hallorain и Jaccoud примыкаютъ описанныя въ 1892 г. случаи д-ра Ижболдина<sup>48)</sup> съ тремя возвратами и два случая д-ра Подановскаго<sup>49)</sup>, описанные имъ въ 1893 г.

Въ болѣеишнихъ случаяхъ возвратъ оканчивается выздоровленіемъ, хотя наблюдались и смертельные исходы (Jaccoud<sup>50)</sup>, д-ръ Подановскій<sup>51)</sup>. Въ виду послѣдняго важно, конечно, знать признакъ, который позволялъ бы судить о возможности появленія возврата. Такииъ признакомъ по проф. Wunderlich'у<sup>52)</sup> въ первые дни возврата служатъ только температура, такъ какъ „никакія другія явленія не заставляютъ обратить вниманія на возвратъ“. Въ промежутокъ же между первымъ приступомъ болѣзни и возвратомъ по проф. Gerhardt'у<sup>53)</sup>, Ziemsseu'у<sup>54)</sup> и д-ру Ижболдину<sup>55)</sup>, признакомъ могущаго наступить возврата является селезенка. Въ своей лекціи о леченіи брюшного тифа проф. Ziemsseu говоритъ: „медленное сокращеніе опухлой селезенки обращаетъ вниманіе врача и онъ въ виду рецидива тѣмъ осторожнѣе будетъ во всѣхъ своихъ предписаніяхъ“. Однако, такъ какъ бываетъ много случаевъ брюшного тифа, гдѣ не только во время безлихорадочнаго состоянія, а и во все теченіе перваго приступа болѣзни не удается прощупать селезенку, то отсюда уже ясно, что, несмотря на свою драгоцѣнность, признакъ этотъ имѣетъ относительное значеніе. Поэтому, конечно, дорого должно быть слѣдующее указаніе д-ра Зьнеца<sup>56)</sup>: „рецидивы тифа могутъ быть предсказаны происшедшимъ безъ видимои причины замедленіемъ поднятія вѣса больного или даже его остановкой, а въ теченіи рецидива вѣсъ, конечно, начинаетъ падать такъ-же, какъ это бываетъ и въ началѣ тифа“. Но неопредѣленность слѣдующей выдержки изъ той же статьи д-ра Зьнеца подрываетъ цѣнность вѣса, какъ указателя могу-

закъ брюшного тифа. Врачъ 1892 г. № 19—21. 25) 1. с. 26) 1. с. 27) 1. с. 28) Брюшной тифъ въ варшавскомъ университетскомъ военномъ госпиталѣ за 1884 г. Врачъ 1886 г. № 20. 29) Брюшной тифъ въ варшавскомъ университетскомъ военномъ госпиталѣ за 1888 г. Военно-мед. журналъ 1890 г. С. LXVII и. вторая 30) О рецидивахъ брюшного тифа. Болг. газета Ботанка 1893 г. № 7 — 13. 31) Virchow Archiv Bd. 111. 32) 1. с. 33) 1. с. 34) Zum Lehn vom Typhusreicidive — по реферату Мед. Обозрѣнія 1887 г. XXVII. 35) 1. с. 36) Рефератъ въ Мед. Обозрѣнія за 1890 г. № 2. 37) 1. с. 38) 1. с. 39) 1. с. 40) 1. с. 41) Ueber Reicidive und Nachfieber beim

Abdominaltyphus. Diss. Zurich 1873. 42) 1. с. 43) 1. с. 44) 1. с. 45) Le bulletin medical. 1894. № 5. 46) Вѣсъ тифа въ раніеи уменьшался статей.

47) 1. с. 48) 1. с. 49) 1. с. 50) Lecons de Clinique medicale 1885 г. по реферату Мем. Обозрѣнія за 1885 г. XXIII. 51) 1. с. 52) 1. с. 53) 1. с. 54) Клиническ. лекціи пер. русскій Дубовра 1887 г. лекціи № 5. 55) 1. с. 56) О волѣніяхъ вѣса тѣла больного въ теченіи брюшного тифа. Болгачка. газета

шого наступить возврата: "... Падение вѣса оканчивается, вообще говоря, одновременно съ окончаніемъ лихорадки и только въ видѣ исключенія, правда довольно не рѣдка, падение вѣса прекращается то раньше, то позже окончания лихорадки; непосредственно вслѣдъ за этимъ начинается поднятіе вѣса, которое *нерѣдко предшествуется 1—2—3 днями, а иногда и болѣе*, когда вѣсъ остается безъ перемены". Такимъ образомъ ни состояніе селезенки, ни ходъ вѣса больного далеко не всегда могутъ выручить врача у постели больного брюшнымъ тифомъ при рѣшеніи вопроса о возможности появления возврата.

Если къ этому описанію возвратовъ брюшнаго тифа прибавить предлагаемое д-ромъ Зѣнецомъ<sup>57)</sup> дѣленіе ихъ на мнимые и настоящія, или дѣленіе д-ра Подановскаго<sup>58)</sup> на типичные и нетипичные, то этимъ можно и окончить краткую характеристику положенія вопроса о возвратахъ брюшнаго тифа въ настоящее время. Дѣленіе д-ра Зѣнца является лишнимъ, такъ какъ то, что онъ называетъ истиннымъ возвратомъ, то разумѣютъ и всѣ; давать же новое названіе рецидивенціи „мнимый возвратъ“ значить увеличивать номенклатуру, не подыгая дѣла ни на шагъ. Дѣленіе д-ра Подановскаго болѣе отвѣчаетъ клиникѣ. Подъ типичнымъ возвратомъ онъ разумѣетъ такой случай, гдѣ продолжительность волны не менѣе восьми дней и изъ кардинальныхъ признаковъ тифа при возвратѣ налицо имѣется не менѣе трехъ. При нетипичныхъ же возвратахъ существуетъ меньшая дліяна волны или меньшая напряженность лихорадочнаго состоянія, а изъ признаковъ тифа не болѣе двухъ.

Это описаніе періода выздоровленія отъ брюшнаго тифа ясно показываетъ, что какъ относительно отдѣльныхъ повышеній температуры, такъ и относительно возвратовъ многое остается и до сихъ поръ невыясненнымъ. Изъ предыдущаго видно, что единственно прочно установленнымъ является только опредѣленіе возврата брюшнаго тифа. При такомъ условіи, конечно, трудно рѣшить вопросъ, будутъ-ли у того или иного больного отдѣльныя повышенія температуры, либо возвратъ болѣзни, или ихъ не будетъ; словомъ, когда выздоравливающаго отъ брюшнаго тифа можно считать внѣ опасности этихъ явленій, нарушающихъ правыльный ходъ выздоровленія. Съ подобнымъ вопросомъ пришлось столкнуться и намъ, когда въ 1892 г. вмѣстѣ съ многоуважаемымъ В. П. Дробленскимъ хотѣли

Богишна 1890 г. № 30 и 31. 57) О настоящихъ и мнимыхъ возвратахъ брюшнаго тифа. Врачъ 1892 г. № 20. 58) І. с.

прослѣдить вліяніе сыровотки крови выздорѣвшаго отъ брюшнаго тифа больного на находящагося въ полномъ разгарѣ болѣзни. Тутъ прежде всего и надо было рѣшить указанный вопросъ. Не найдя точнаго отвѣта и желая съ своей стороны внести посильную лепту въ разъясненіе клинической картины періода выздоровленія и возврата брюшнаго тифа, я съ одобренія многоуважаемаго В. П. Дробленскаго и прозвѣсть рядъ наблюденій въ этомъ направленіи надъ брюшнотифозными больными въ Александровской въ память 19 февраля 1861 г. больницѣ.

Постановка наблюденія была слѣдующая. Всѣ больные находились въ баракѣ, въ двухъ палатахъ, гдѣ кромѣ больныхъ брюшнымъ тифомъ не было никакихъ другихъ. Надзоръ за больными былъ самый строгій, что при жизни моей въ больницѣ не представляло большаго труда. Опредѣленіе вѣса больного, подробное ежедневное наблюденіе, изслѣдованіе мочи и осмотръ испражненія проводилъ самъ. Во время лихорадки основной волны<sup>59)</sup> дѣлалось 1—2 ванны 28°R. въ сутки по 15—20 минутъ каждая, смотря по общему состоянію больного, а въ видѣ лекарства давалась t-ra valeriana aetherea по 40 капель 3 раза въ день. Пищею въ это время служило молоко въ такомъ количествѣ, сколько могло выпить больной (большинство 1700—2500 куб. сант.). Липъ только вечеромъ температура падала ниже 38°Ц., въ чемъ убѣждали два измѣренія одно за другимъ въ теченіи получаса, то начиналось измѣреніе ея чрезъ два часа круглыми сутки вплоть до выписки больного. У каждаго такого больного былъ свой максимальный термометръ, проверенный мною съ нормальнымъ. Температуру измѣряли сестры милосердія, а же время отъ времени проверяли ихъ заниси до двухъ часовъ ночи. Для чистоты въ періодъ выздоровленія каждаго больного получалъ одинъ разъ въ недѣлю ванну 29—30°R., и то за два часа до слѣдующаго измѣренія. Переходъ отъ молока къ твердой пищѣ всаа сообразно съ температурою, объективными данными и видомъ испражненія; пища давалась въ такомъ количествѣ, что она вполне удовлетворяла аппетитъ больного. Съестъ что-либо кромѣ казеннаго, назначеннаго не могъ ни одинъ больной. Чай все время утренній давался около шести часовъ утра, а вечерній около четырехъ часовъ пополудни безъ ограниченія количества. Всѣ больные опредѣлялся постоянно въ 10 часовъ утра со всѣми предосторожностями. Вставать съ кровати и ходить по комнатѣ (вначалѣ

<sup>59)</sup> Называю такъ первичное измѣреніе тифомъ вплоть до окончанія лихорадки на обычной кривой температуры.

очень немного) разрывалось на 10—12 день по прекращении лихорадки основной волны (судя по обычной кривой температуры—запись в 8 часов утра и 6 часов вечера). Для выписки требовалось достижение той цифры в вѣсѣ, съ которою больной являлся в палату, отсутствие объективных явлений со стороны внутренних органов, оформленное и хорошо окрашенное испражнение, ну и, конечно, хорошая сила большого (все это удалось выполнить для большинства). Изъ 236-ти больных брюшным тифом, проведенных мною подряд съ октября 1892 по декабрь 1893 года, это были съ измѣреніем температуры чрезъ два часа круглая сутки въ периодъ выздоровленія; здѣсь же привожу лишь 85, какъ наиболее доказательныхъ, имѣвшихъ частую, вѣчѣмъ не осложненную форму брюшного тифа. Для удобства изложенія исторій болѣзней этихъ больныхъ разбиты на 5 группъ, смотря по тому, были-ли повышены температуры въ периодъ выздоровленія, и если да, то какія. Въ основу дѣленія каждой группы на легкіе, средние и тяжелые случаи принято дѣленіе проф. Liebermeister'a, основывающееся на продолжительности лихорадки основной волны тифа \*). За высокую нормальную, не лихорадочную температуру принято 37,5°С.

### Первая группа \*\*).

Къ первой группѣ случаевъ, не имѣющихъ въ периодъ выздоровленія повышенной температуры выше 37,5°С., относятся одиннадцать легкихъ, десять среднихъ и пятнадцать тяжелыхъ больныхъ (всего тридцать шесть), въ возрастѣ отъ 10-ти до 30-ти лѣтъ. Большая часть изъ нихъ были люди въ возрастѣ отъ 15-ти до 20 лѣтъ, именно 22 человека. Изъ тридцати шести больныхъ на 5-й, 9-й и 10-й дни заболѣванія поступило по четыре человека; на 6-й день пятеро, на 7-й семеро, на 8-й восемь, на 11-й двое и на 12-й и 13-й дни по одному. Пашею у всѣхъ во время лихорадки служило молоко въ количествѣ отъ 1800 до 2200 куб. сант. въ сутки. Какъ въ легкихъ, такъ и въ среднихъ случаяхъ реакція Эрлиха въ мочѣ держалась не долѣе пятнадцатаго дня, тогда какъ въ тяжелыхъ она лишь одинъ разъ исчезла на четырнадцатый день,

\*) Случаи 2-недельной продолжительности по Liebermeister'у легкіе  
 > 3-недельной > > > > средние  
 > болѣе > > > > тяжелые.

\*\*) Исторіи болѣзней всѣхъ группъ и 4 кривыхъ 5 группъ см. въ приложеніи.

въ остальныхъ же продолжалась за пятнадцатый день (отъ 16-го до 26-го дня). Бѣлокъ въ мочѣ, не превышая незначительнаго количества, наблюдался у двадцати семи больныхъ. Оформленность испраженія наступала въ легкихъ случаяхъ между двадцатымъ—двадцать девятымъ днемъ болѣзни, въ среднихъ между двадцать вторымъ и тридцать пятымъ, а въ тяжелыхъ между двадцать восьмымъ и шестидесять восьмымъ днемъ заболѣванія. Хорошую же окраску оформленное, желтое испраженіе принимало въ легкихъ случаяхъ на тридцать первый—сороковой, въ среднихъ на тридцать девятый—пятьдесятъ седьмой, а въ тяжелыхъ на сороковой—шестидесять первый день болѣзни. Въ первые дни по наступленіи въ баракъ задержку въ вѣсѣ или легкое его нарастаніе имѣли шестнадцать больныхъ изъ тридцати шести, т. е. 44,4%. Теряя во время лихорадки тотъ или другой процентъ вѣса, тридцать одинъ изъ тридцати шести падалъ въ вѣсѣ и по прекращеніи лихорадки (судя о лихорадкѣ по записи въ 8 часовъ утра и 6 часовъ вечера).

Такое паденіе вѣса продолжалось (таблица а):

|        |         |         |                |         |             |
|--------|---------|---------|----------------|---------|-------------|
| 5 разъ | 1 день, | причемъ | % потери вѣса= | отъ 0,3 | до 1,2%     |
| 5 >    | 2 дня   | >       | >              | >       | 0,2 > 2,1 > |
| 3 >    | 3 >     | >       | >              | >       | 0,7 > 1,7 > |
| 3 >    | 4 >     | >       | >              | >       | 1,3 > 3,3 > |
| 2 >    | 5 дней  | >       | >              | >       | 0,9 > 2 >   |
| 6 >    | 6 >     | >       | >              | >       | 1 > 3,3 >   |
| 1 >    | 7 >     | >       | >              | >       | — > 3,7 >   |
| 1 >    | 8 >     | >       | >              | >       | — > 2 >     |
| 4 >    | 10 >    | >       | >              | >       | 2,5 > 3,9 > |
| 1 >    | 11 >    | >       | >              | >       | — > 0,7 >   |

Отсюда уже видно, что больной брюшнымъ тифомъ въ большинстве случаевъ и по минованіи лихорадки способенъ потерять въ вѣсѣ отъ 0,2 до 3,9%. Эту потерю въ вѣсѣ организмъ несетъ въ теченіи времени отъ 1 до 11 дней, причемъ промежутокъ времени самъ по себѣ не имѣетъ большаго вліянія на процентъ потери. Такое послѣдующее паденіе вѣса въ приводимыхъ случаяхъ у одиннадцати существуетъ одновременно съ поносомъ, и у семнадцати со скрытою лихорадкою, замѣтною только при двухчасовомъ измѣреніи температуры круглая сутки. Закончивъ свое паденіе, вѣсѣ въ восьми изъ тридцати одного случая, оставался далѣе безъ перемѣнъ. Въ двухъ же изъ остальныхъ пяти случаяхъ этой группы такая

устойчивость въ вѣсѣ наблюдалась безъ предшествовавшего паденія вѣса по прекращеніи лихорадки. Время, въ теченіи котораго существовало это явленіе, какъ видно изъ слѣдующей таблицы, колебалось отъ 2 до 8 дней. (Таблица в).

| 2 раза въ теченіе 2 дней |           |
|--------------------------|-----------|
| 1                        | > > > 3 > |
| 2                        | > > > 4 > |
| 1                        | > > > 5 > |
| 1                        | > > > 6 > |
| 1                        | > > > 7 > |
| 2                        | > > > 8 > |

Объ послѣднія (а и в) таблицы, взятыя вмѣстѣ, убѣждаютъ, что лишь рѣдко (въ двухъ изъ тридцати шести случаевъ) при чистой формѣ брюшнаго тифа вѣсѣ больного начинаетъ сразу по прекращеніи лихорадки (по записи температуры въ 8 часовъ утра и 6 часовъ вечера) подниматься; и въ одномъ только № 36 имѣется поднятіе вѣса до прекращенія лихорадки. Въ преобладающемъ числѣ случаевъ (изъ 36-ти въ 31-мъ) начавшееся поднятіе вѣса идетъ дальше не непрерывно линіею, а скачками, т. е. поднѣвшись на ту или другую высоту вѣсѣ 1—2 дня или остается безъ перемѣны, или нѣсколько падаетъ, а затѣмъ снова поднимается. Ломанныя линіи паденія и поднятія вѣса больного при графическомъ изображеніи въ общихъ чертахъ совершенно соответствуютъ другъ другу. Что касается скорости поднятія вѣса больного, то въ двадцати одномъ изъ тридцати шести замѣтна медленность подъема въ сравненіи съ паденіемъ.

Прослѣдивъ ходъ вѣса, обратимся теперь къ теченію температуры въ періодѣ выздоровленія. Сравненіе вышней за сутки<sup>29)</sup> температуры при двухчасовомъ ея измѣреніи съ вышнюю температурою обычной кривою (записи въ 8 часовъ утра и 6 часовъ вечера) показываетъ, что далеко не всегда малы лихорадочныя цифры, такъ называемыя субфебрильныя, обычной кривою указываютъ на дѣйствительно малую лихорадку; а съ другой стороны также не всегда существуетъ въ дѣйствительности отсутствіе лихорадки въ первые дни апирексиса, определяемой по обычной кривой температуры. Въ общемъ несовпаденіе вышнихъ цифръ температуры при двухчасовомъ ея измѣ-

<sup>29)</sup> Какъ здѣсь, такъ и въ другихъ мѣстахъ сутки считаются отъ 8-ми часовъ утра до 8-ми часовъ утра слѣдующаго дня.

реніи круглыми сутки и при обычной записи температуры въ 8 часовъ утра и 6 часовъ вечера наблюдалось (таблица с):

| 11 разъ въ теченіи 1 дня. |               |
|---------------------------|---------------|
| 3                         | > > > 2 дней. |
| 11                        | > > > 3 >     |
| 2                         | > > > 4 >     |
| 1                         | > > > 5 >     |
| 1                         | > > > 6 >     |
| 1                         | > > > 7 >     |
| 1                         | > > > 8 >     |

т. е. изъ 36 больныхъ у 31-го въ теченіи времени отъ 1 до 8 дней. Изъ 17 больныхъ этой группы, у которыхъ существуетъ несовпаденіе вышнихъ температуры на субфебрильныхъ цифрахъ, въ 8-ми случаяхъ (№ 3; 12; 13; 14; 16; 27; 30 и 36-мъ) такое несовпаденіе объясняется, что повышеніе температуры на обычной кривой надъ субфебрильными цифрами въ ближайшіе слѣдующіе дни есть лишь продолженіе лихорадки, почему-то давшей въ предшествовавшіе дни высшія свои цифры въ другіе часы, а не въ шесть вечера, но не новое ожесточеніе лихорадки. Далѣе, въ то время какъ обычная кривая температуры показываетъ уже наступленіе апирексиса, при двухчасовомъ измѣреніи существуетъ еще лихорадка въ двадцати-шести изъ тридцати-шести случаевъ. При этомъ случаи № 15; 20; 27; 29; 35 и 36 показываютъ, что не всегда, при паденіи температуры на обычной кривой до 37,5—37,0° Ц., послѣдующее повышеніе температуры на той же кривой въ дальнѣйшіе дни можно объяснять новымъ ожесточеніемъ лихорадки, такъ какъ она въ такихъ случаяхъ является тоже лишь непосредственнымъ продолженіемъ. Кроме того случаи № 2; 11; 13; 15; 21 и 27 я являются убедительнымъ доказательствомъ того, что въ первые дни апирексиса не только температуру въ 37,0—37,5-Ц., но и температуру въ 36,3—36,8° Ц. обычной кривою не всегда можно считать началомъ апирексиса, такъ какъ въ это время высшая температура при двухчасовомъ ея измѣреніи круглые, сутки можетъ быть равна 37,6°—38,2° Ц., какъ это было въ только-что указанныхъ случаяхъ. Такое несовпаденіе вышнихъ температуръ при уже нормальныхъ цифрахъ обычной кривой температуры можетъ существовать отъ 1-го до 5-ти дней. Высшая температура при двухчасовомъ ея измѣреніи двадцать два раза (изъ 26-ти) пришлась

на время послѣ шести часовъ вечера и лишь въ четырехъ случаяхъ на утро.

### Вторая группа.

Особенностью второй группы случаевъ являются однодневныя повышенія температуры въ периодъ выздоровленія. Легкихъ случаевъ здѣсь четыре, среднихъ двѣнадцать и тяжелыхъ пятнадцать. Въ возрастѣ отъ 10 до 15 лѣтъ было пять человекъ; отъ 15 до 20 шестнадцать; отъ 20 до 25 семь и отъ 25 до 30 лѣтъ трое. На 6 день болѣзни поступило двое, на 7-й семеро, на 8-й, 9-й и 10-й по 5 человекъ, на 11-й четыре и, наконецъ, трое на 14 день заболѣванія. Пищью во время лихорадки было тоже молоко у большинства въ количествѣ 1700—2200—2500 к. с. и лишь семеро сначала выпивали по 1000 к. с. Въ легкихъ и среднихъ случаяхъ реакція Эрлиха въ мочѣ 11-ти больныхъ держалась не дольше 17 днй, въ одномъ до 19 днй, въ одномъ до 21, и въ двухъ была отрицательная. У тяжелыхъ же больныхъ лишь одинъ разъ была положительною до 15 днй и одинъ разъ отрицательною, у остальныхъ же продолжалась за 15 день (до 24 днй). 9формозность испражнения въ легкихъ случаяхъ была на 26—34 день болѣзни, въ среднихъ на 25—45, въ тяжелыхъ на 28—56 день заболѣванія. Хорошую же окраску испражненіе приобрѣтало въ легкихъ случаяхъ на 36—38 день заболѣванія, въ среднихъ на 33—60-й, а въ тяжелыхъ на 37—73-й день. Задержку или легкое поднятіе вѣса въ первые дни по прибытіи въ баракъ обнаружили шесть больныхъ изъ тридцати одного или 19,3%. Потерявъ известный процентъ вѣса тѣла во время лихорадки основной волны тифа (таблица д),

|      |          |        |    |      |   |        |    |      |   |     |     |     |    |     |   |
|------|----------|--------|----|------|---|--------|----|------|---|-----|-----|-----|----|-----|---|
| 2-е  | больныхъ | теряли | въ | вѣсѣ | и | дальше | въ | теч. | 1 | дня | отъ | 0,7 | до | 1,6 | % |
| 2-е  | »        | »      | »  | »    | » | »      | »  | »    | 2 | »   | »   | 1,4 | »  | 1,5 | » |
| 5-е  | »        | »      | »  | »    | » | »      | »  | »    | 3 | »   | »   | 0,5 | »  | 1,4 | » |
| 6-е  | »        | »      | »  | »    | » | »      | »  | »    | 4 | »   | »   | 0,6 | »  | 3,6 | » |
| 3-е  | »        | »      | »  | »    | » | »      | »  | »    | 5 | »   | »   | 0,4 | »  | 2,3 | » |
| 4-го | »        | »      | »  | »    | » | »      | »  | »    | 6 | »   | »   | 0,7 | »  | 1,9 | » |
| 2-е  | »        | »      | »  | »    | » | »      | »  | »    | 7 | »   | »   | 2,3 | »  | 4,2 | » |
| 2-е  | »        | »      | »  | »    | » | »      | »  | »    | 8 | »   | »   | 0,8 | »  | 2,0 | » |
| 1    | »        | »      | »  | »    | » | »      | »  | »    | 9 | »   | »   | —   | »  | 6,6 | » |

Изъ этой (д) таблицы, равно какъ и изъ подобной (а) въ первой группѣ случаевъ видно, что и по прекращеніи лихорадки основной волны тифа организмъ несетъ потерю въ вѣсѣ и дальше въ теченіи времени отъ одного до девяти дней, причемъ продолжительность этого времени сама по себѣ не имѣетъ большого значенія на процентъ потери вѣса. Одновременно съ несомною потерей вѣса тѣла у пятнадцати больныхъ существуетъ поносъ, но не въ теченіи всѣхъ дней, въ которые вѣсъ тѣла продолжаетъ падать; а у тринадцати больныхъ при продолжающемся паденіи вѣса двухчасовое измѣреніе температуры обнаруживаетъ существованіе лихорадки, однако тоже не въ теченіи всѣхъ дней паденія вѣса. Закончивъ свое паденіе, у тринадцати больныхъ вѣсъ не тотчасъ переходитъ въ поднятіе, а (таблица е)

|   |      |     |      |          |      |          |    |       |
|---|------|-----|------|----------|------|----------|----|-------|
| у | 3-хъ | изъ | нихъ | остается | безъ | перемѣны | 1  | день, |
| » | 2-хъ | »   | »    | »        | »    | »        | 2  | дня,  |
| » | 2-хъ | »   | »    | »        | »    | »        | 3  | дня,  |
| » | 2-хъ | »   | »    | »        | »    | »        | 5  | дней, |
| » | 1-го | »   | »    | »        | »    | »        | 6  | дней, |
| » | 1-го | »   | »    | »        | »    | »        | 8  | дней, |
| » | 1-го | »   | »    | »        | »    | »        | 11 | дней, |
| » | 1-го | »   | »    | »        | »    | »        | 13 | дней. |

Послѣ подобной устойчивости у этихъ тринадцати больныхъ, равно какъ и у остальныхъ восемнадцати этой группы безъ этого явленія въ вѣсѣ, послѣдній начинаетъ нарастать. У двадцати семи изъ тридцати одного больного этой группы вѣсъ поднимается такъ же, какъ и въ первой группѣ, скачками, въ общемъ выношѣ напоминая при графическомъ изображеніи линію паденія вѣса. Такимъ образомъ и въ этой группѣ случаевъ общіе послѣднія таблицы убѣждаютъ, что лишь рѣдко (изъ 31-го въ 4-хъ случаяхъ) паденіе вѣса сразу переходитъ въ поднятіе.

Посмотримъ теперь ходъ температуры при окончаніи основной волны тифа и въ самомъ периодѣ выздоровленія. Несовпаденіе высшихъ температуръ при сравненіи цифръ двухчасоваго измѣренія температуры круглыми сутки и цифры обычно (перевѣрено 1936 8 часовъ утра и 6 часовъ вечера) наблюдалось относительно субфебрильныхъ цифръ температуры у четырнадцати больныхъ этой группы, продолжаясь отъ одного до четырехъ дней. А до чего имѣть

БИБЛИОТЕКА  
Имя. НАУЧ. И БИБЛИОТЕНА  
№ 1-го Харьк. Мед. Института  
№ 4299

доходить такое несоответствие особенно резко видно в случае № 17 этой группы, где высшая температура по обычной кривой равна 37,7°Ц., на самом же деле высшая температура, приходится на время после 8-ми часов утра, есть 40,1°Ц. Измерение температуры через два часа круглые сутки в случаях № 6, 9, 16, 17 и 20-й, где после субфебрильных цифр обычной кривой температуры являются на той же кривой повышения до 38,6°—39,1°Ц., объяснить эти повышения не ожесточением лихорадки; а лишь ее продолжением. Существование лихорадки в действительности в то время, когда обычная кривая температуры показывает уже наступившую аспирексию, видется в двадцати случаях из тридцати одного. Подобно тому, как и в первой группе, и здесь не всегда падение температуры даже до 36,8°—37,5 служит доказательством действительно существующей аспирексии (№ 6, 7, 9, 10, 12, 15, 19, 24, 30 и 31). Случай № 15 при измерении температуры через два часа круглые сутки вследствие последнего явления представляется кончившим свою лихорадку основной волны не кризисом, а также апирексией, ибо, в то время как высшая температура обычной кривой равняется 37,2°—37,0°Ц., высшая температура на самом деле в эти двое суток была 38,2—37,7°Ц. Даже существование лихорадки в действительности при наступившей уже аспирексии по обычной кривой заставляет признать последующие повышения, замеченные и на обычной кривой температуры, не ожесточением лихорадки, а лишь ее продолжением, как это было в случаях № 1, 9, 10, 11, 20, 24, 26 и 31.

Если иметь под руками только обычную кривую температуры, то из тридцати одного больного этой группы только у тринадцати существуют повышения температуры, в период выздоровления, да и то незначительная. При двухчасовом измерении температуры повышения ее однако происходят у всех больных этой группы. Отсюда уже ясно, что такие повышения в период выздоровления при обычном измерении температуры зачастую остаются совершенно неизвестными врачу. Если бы в цифры двухчасового измерения температуры, легко замечать, что некоторые повышения носят характер волны, т. е. температура в течение нескольких часов медленно поднимается, достигает своего максимума и затем медленно или довольно быстро падает; другая же носит характер единичных повышений, т. е. за промежуток времени наприм. в течение шести часов лишь одна средняя запись температуры дает лихорадочную цифру. Случаев первого рода в

этой группе семнадцать и отчасти сюда же принадлежат № 7 и № 25, следовательно всего девятнадцать. Из них наиболее характерны № 4 и № 24. Остальные же двенадцать случаев имеют повышения температуры в период выздоровления в вид единичных ее подъемов. Эти повышения (без различия их характера) восемь раз приходится на утренние часы, в остальных же двадцати трех случаях происходят после 6-ти вечера. У двадцати больных повышения температуры в период выздоровления не зависели от перемены пищи, в пяти связь их с пищею, как причиной их появления, сомнительна и лишь в шести случаях можно еще обвинять в их появлении перемену пищи. Так как у тринадцати больных повышения температуры, оставаясь незамеченными на обычной кривой, происходят за один—пять дней до выпяски больного, то едва ли позволительно судить, как делят д-р Зенц<sup>60)</sup>, по концу обычной кривой температуры о нормальной ее величине, свойственной данному выздоравливающему от брошного тифа больному. Что касается валиния таких повышений температуры на общее состояние выздоравливающего, то в одиннадцати случаях они проходят незамеченно; в остальных же двадцати они совпадают то с задержкой вѣса, то с извѣщением консистенции испражнения вплоть до поноса (см. случай № 24). А это совпадение явлений не совместимо с взглядом некоторых авторов, „что подобная повышения температуры никаких изменений со стороны организма не вызывают“.

### Третья группа.

Семь больных, один легкий, четыре средних и два тяжелых, составляют третью группу случаев, сходных между собою в том, что по окончании лихорадки основной волны наступает аспирексия, а через несколько дней является новая малая волна, замеченная и на обычной кривой температуры и продолжающаяся от одного до одиннадцати дней. Из дальнейшего описания этих случаев видно, что отнеси их в группу возвратов не позволяет малое количество объективных данных, наблюдавшихся при второй волне. Четверо больных этой группы были в возрасте от 15 до 20 лет, двое от 20 до 25 лет и один 30 лет. На 5, 7, 10 и 12 дни болезни поступило по одному, а трое осталь-

<sup>60)</sup> О настоящих и мнимых возвратах брошного тифа. Врач, 1893 г. № 20.

ных на 8 день заболевания. Во время лихорадки основной волны больные и этой группы питались молоком, выпивая от 1700—до 2200—2500 куб. сант. за сутки. Реакция Эрлиха во мочь легкого и одного тяжелого случая была отрицательная, во мочь средних держалась до 12—17 дня болезни, во мочь же второго тяжелого до 28 дня болезни. Выброс в мочь во время лихорадки основной волны тифа отмечен у четырех больных (в одном случае был в порядочном количестве). Оформленность испражнения в легком случае получалась на 29 день болезни, в средних на 23—46, а в тяжелых на 27—65 день болезни, хорошую же окраску испражнение принимало на 40—73 день заболевания.

При сравнении высшей температуры конца основной волны на обычной кривой температуры сь высшею за это время при двухчасовом ее измерении круглыми сутками получается совпадение их в случаях № 3, 4 и 7; в случае № 6, где высшая температура при двухчасовом измерении равна 39° Ц., во то время как на обычной кривой в эти сутки она равна 37,8° Ц., последующее повышение до 38° Ц. является лишь продолжением лихорадки, а не ее усилением. Наконец, случаи № 1, 2 и 6 еще раз доказывают, что даже падение температуры при конце основной волны на обычной кривой до 36,8—37,0° Ц. не всегда может быть принимаемо за начало апирексии, так как в это время двухчасовое измерение температуры может обнаружить такие цифры, как 37,7—38,2° Ц.

Задержка во всем в первые дни по прибытии в барак была только у одного № 7, остальные же шесть больных надали во всем сь первого дня пребывания в барак.

Что касается промежутка между основною волною тифа и малою волною, то, как видно из таблицы\*), онъ лишь в одном только случае был все время безлихорадочнымъ в теченіи 10 дней. Отнести однако этотъ случай (№ 4) къ группѣ возвратовъ мѣшаетъ малое число объективныхъ данныхъ. Въ остальныхъ шести случаяхъ этотъ промежутокъ или совершенно не былъ безлихорадочнымъ (№ 2), или в теченіи его въ одинъ дни была лихорадка, въ другіе ея не было при двухчасовомъ измереніи температуры круглыми сутками. Число такихъ дней колебалось отъ одного до шести. Высшая температура въ такіе дни въ действительности была 37,6—39,4° Ц.

\*) См. № 3 въ приложении.

Изъ другихъ объективныхъ явленій в теченіи этого промежутка у всѣхъ наблюдался слезка обложенный языкъ, въ двухъ случаяхъ селезенка была увеличена, въ четырехъ жидкое испражнение и лишь въ одномъ (№ 1) испражнение было оформлено, но не окрашено въ темный цвѣтъ. Въсь у всѣхъ больныхъ этой группы по прекращеніи лихорадки основной волны на обычной кривой температуры продолжалъ свое паденіе в теченіе 3—12 дней, понижаясь на 1,1%—2,9%. Закончивъ же паденіе, въсь четырехъ начинаетъ уже нарастать и такое поднятіе въсь равняется до начала малой волны 0,7—3,7%.

При этихъ объективныхъ явленіяхъ наступаетъ вторая малая волна, продолжительность которой по обычной кривой температуры въ двухъ случаяхъ равняется 1 дню, въ одномъ 2 днямъ, въ одномъ 3 днямъ, въ двухъ 4 днямъ и въ одномъ 11 днямъ. Сравняя эту продолжительность второй волны, определенную по обычной кривой сь ея продолжительностью при двухчасовомъ измереніи температуры, не трудно замѣтить, что въ трехъ случаяхъ длина второй волны на самомъ дѣлѣ была больше на 1 день (№ 2, 4 и 7), въ одномъ (№ 6) больше на 3 дня и въ одномъ (№ 3) больше на 4 дня.

Среди всѣхъ больныхъ этой группы № 2 выдѣляется по продолжительности второй волны и, по авторамъ, не придающимъ значенія длинѣ безлихорадочнаго промежутка, случай этотъ на основаніи обычной кривой температуры могъ быть разсматриваемъ какъ случай сь возвратомъ брышнаго тифа. Однако едва-ли здѣсь имѣлось дѣло сь возвратомъ: здѣсь не было въ дѣйствительности безлихорадочнаго промежутка и, несмотря на значительное улучшение въ состояніи больного, температура у него въ это время была на самомъ дѣлѣ 39,4°Ц., а не 37,5—37,0°Ц., какъ то видно на обычной кривой; следовательно, вторая волна есть непосредственное продолженіе основной волны тифа.

Высшая температура во время второй волны при двухчасовомъ измереніи нѣредко достигаетъ 38,2—39,8°Ц. Изъ объективныхъ явленій въ это время наблюдалась у всѣхъ обложенный языкъ; у шести поносъ, причемъ у двухъ онъ появился вновь, не раньше однако 3-го дня отъ начала лихорадки; у одного отмечена новая опухоль селезенки. Несмотря на появленіе лихорадки второй волны, у четырехъ больныхъ происходитъ дальнѣйшее поднятіе въсь отъ 0,7 до 3,2%, а подъ влияніемъ второй волны въсь шести падаетъ на 0,3—4,4%. Изъ всѣхъ этихъ объективныхъ данныхъ второй малой волны видно, что сь одной стороны такіа волны вовсе не

обходится организму даромъ, какъ на это указываютъ проф. Strümpell<sup>61)</sup> и д-ръ Ижболдинъ<sup>62)</sup>; а съ другой стороны при повышении температуры и ухудшении общего состояния больного въсъ начинаетъ падать не тотчасъ же. Кровь этихъ малыхъ волнъ, замѣтныхъ на обычной кривой температуры, у двухъ больныхъ этой группы (№ 1 и 3-й) происходятъ еще отдѣльные повышенія температуры, обнаруживаемыя только при двухчасовомъ ея измѣреніи. Эти повышенія еще разъ доказываютъ невозможность опредѣлять норму температуры данного больного по концу обычной кривой.

#### Четвертая группа.

Отличительною чертою двухъ среднихъ (№ 2 и 4-й) и двухъ тяжелыхъ (№ 1 и 3-й) случаевъ, образующихъ четвертую группу, служитъ появленіе въ періодъ выздоровленія двухъ или трехъ малыхъ волнъ, замѣтныхъ и на обычной кривой температуры. Больные этой группы были въ возрастѣ 13—23-хъ лѣтъ. Двое изъ нихъ (№ 3 и 4-й) поступили на 10-й день заболѣванія, другіе же двое на 6-й и 7-й день болѣзни. Пищею во время лихорадки основной волны тифа служило молоко въ количествѣ 1700—2200—2500 куб. сант., а № 1-й и № 2-й получали еще и бульонъ съ развѣшаннымъ въ немъ сырымъ яйцомъ. По теченію первой своей основной волны случаи эти ничѣмъ не отличались отъ случаевъ первыхъ трехъ группъ. При окончаніи лихорадки основной волны тифа и здѣсь видно несовпаденіе высшей температуры обычной кривой съ высшею температурою за тѣ же сутки при двухчасовомъ ея измѣреніи. Это происходитъ и здѣсь какъ на субфебрильныхъ цифрахъ обычной кривой (случаи № 1 и 2-й), такъ и на цифрахъ температуры нормальной. Такое несовпаденіе высшихъ температуръ, какъ напримѣръ на обычной кривой 37,7 или 37,2 (№ 4), а при двухчасовомъ измѣреніи 38,0 или 38,1, заставляетъ смотрѣть на послѣдующія ближайшія повышенія обычной кривой какъ на продолженіе лихорадки, а не на новое ея ожесточеніе. Въсъ больныхъ во время лихорадки основной волны падаетъ и лишь въ одною только № 1-мъ происходитъ задержка въсъ въ первые дни по прибытіи въ баракъ. Въ случаяхъ № 1 и 2-й еще до прекращенія лихорадки основной волны въсъ начинаетъ уже подниматься; въ случаѣ № 3 по прекращеніи лихорадки въсъ остается безъ перемѣнъ, а въ № 4-мъ происходитъ дальнѣйшее его паденіе въ теченіи четырехъ дней.

<sup>61)</sup> I. c. <sup>62)</sup> I. c.

Что касается промежутка между основною волною тифа и первою малою волною, то онъ у всѣхъ четырехъ больныхъ не былъ въ дѣйствительности безлихорадочнымъ, такъ какъ при двухчасовомъ измѣреніи температуры она въ нѣкоторые дни достигала 37,6—38,2°Ц. Зато промежутку между первою малою и второю малою волнами температуры, а у № 4-го и между второю малою и третьею, лишень лихорадки въ дѣйствительности. Если оставить въ сторонѣ случай № 3-й, гдѣ въсъ послѣ основной волны тифа, колебался, остается и въ теченіи первой малой волны безъ перемѣнъ, то у всѣхъ остальныхъ больныхъ въ первый промежутокъ между основною волною тифа и первою малою происходитъ уже и поднятіе въсъ, не прекращающееся и при появленіи первой малой волны. Причиной появленія послѣдней лишь въ одномъ только № 2-мъ могла служить нища; у другихъ же связать ея появленіе съ пищею или съ чѣмъ либо другимъ не представляется возможнымъ. Вліяніе первой малой волны на общее состояніе больного сказалось во всѣхъ случаяхъ незначительнымъ паденіемъ въсъ: на 1,1—1,4%. У больного № 3-го и у больного № 4-го, быть можетъ, появленію первой малой волны обязанъ продолжающийся нососъ.

Во второй промежутокъ между первою и второю малою волнами происходитъ дальнѣйшее поднятіе въсъ, нарушенное было первою малою волною. Это нарастаніе въсъ тѣла продолжаетъ существовать и съ появленіемъ второй малой волны, въ теченіи 1—2 первыхъ ея дней, что особенно рѣзко видно у больныхъ № 1 и 2.

Вторая малая волна сопровождается или существовавшимъ уже раньше (№ 3 и 4), или вновь появившимся нососомъ (№ 1 и 2); держатся опухолью селезенки (№ 2 и 3), или новымъ ея припуханіемъ (№ 1). Подъ вліяніемъ же 2-й малой волны паденіе въсъ больше (1,6—5,1%). Послѣднее рѣзко замѣтно у больныхъ № 2 и № 3 и слабѣе у № 1 и № 4. Всѣ эти объективныя явленія, наблюдающіяся рѣзче при второй малой волнѣ, выстѣ съ подобными же явленіями третьей группы случаевъ заставляютъ отказать отъ того взгляда, по которому малая скорпеходящая лихорадочная состояніи не вызываютъ измѣненій со стороны организма (проф. Strümpell<sup>63)</sup> и д-ръ Ижболдинъ<sup>64)</sup>). Подобного взгляда, да и то съ большою осторожностью, было бы можно держаться относительно первыхъ малыхъ волнъ случаевъ этой группы.

Не лишено значенія повышеніе температуры до 37,8°Ц., наблюдавшееся у больного № 3 послѣ второй малой волны при двухча-

<sup>63)</sup> I. c. <sup>64)</sup> I. c.

совом измерении температуры. Оно еще раз указывает на осторожность, с какою надо судить о нормальной температурѣ, свойственной данному выдоравливающему, по концу обычной кривой (д-ръ Зынецъ<sup>65</sup>).

#### Пятая группа.

Въ послѣднюю группу случаевъ входитъ семь, изъ которыхъ по продолжительности лихорадки основной волны тифа два легкихъ (№ 6332 и № 9018), два среднихъ (№ 4165 и № 5333) и три тяжелыхъ (№ 2578, 2650 и 4349). Возрастъ больныхъ колебался отъ 13 до 22 лѣтъ.

Первая основная волна тифа всѣхъ этихъ больныхъ клинически ничѣмъ не отличалась отъ такой же приведенныхъ въ первыхъ четырехъ группахъ случаевъ. На основании кривой температуры, получаемой изъ записи ея въ 8 часовъ утра и 6 часовъ вечера, между основною волною тифа и возвратомъ болѣзни существуетъ во всѣхъ семи случаяхъ лихорадочный промежутокъ. Продолжительность его колеблется между 6 и 31 днемъ. Однако ближайшее изучение температуры тѣла за цѣлыя сутки показываетъ, что не всегда промежутокъ этотъ лихорадки въ дѣйствительности, а является при обычной записи температуры лишь кажущимся. Съ одной стороны это происходитъ потому, что подобно всѣмъ остальнымъ случаямъ у трехъ больныхъ этой группы (№ 4349, 4165 и 2578) въ то время, какъ по обычной кривой температуры можно считать уже начало безлихорадочнаго промежутка, на самомъ дѣлѣ существуетъ лихорадка основной волны еще одинъ день; съ другой стороны происходитъ это и потому, что подобно случаямъ второй группы у двухъ больныхъ (№ 4349 и № 9018) впадаютъ въ этотъ промежутокъ односторонняго повышения температуры въ видѣ малой волны, максимум которой приходится послѣ 6-ти часовъ вечера, и потому такія волны остаются незамѣтными на обычной кривой температуры. Иногда, однако, эти повышения температуры попадаютъ и на обычную кривую, какъ въ случаѣ № 2578. Что касается вліянія этихъ малыхъ волнъ на общее состояніе, то, какъ видно у этихъ трехъ больныхъ, они либо поддерживаютъ паденіе въ вѣсѣ (№ 4349), или поносятъ (№ 9018), или же производятъ измѣненіе консистенціи испражденія изъ оформленнаго въ жидкое (№ 2578). Въ общемъ же за весь безлихорадочный промежутокъ, высчитываемый по обычной записи температуры, организмъ

болѣзною порядочно управляется: происходитъ очищеніе языка, даже до полной его чистоты; уменьшается или даже совсѣмъ исчезаетъ опухоль селезенки; измѣняется консистенція и окраска испраженія. Ходъ же вѣса тѣла за этотъ промежутокъ виденъ изъ слѣдующей таблицы:

|        |                |                       |     |                                  |    |
|--------|----------------|-----------------------|-----|----------------------------------|----|
| № 4349 | въ теч. 12 дн. | потерялъ въ вѣсѣ 5,2% | , а | приобрѣлъ въ вѣсѣ въ теч. 12 дн. | 0% |
| № 5333 | » 8 »          | » 5,7 »               | »   | » 23 » 10,6 »                    |    |
| № 9018 | » 9 »          | » 3,6 »               | »   | » 8 » 2 »                        |    |
| № 6332 | » 6 »          | » 2,4 »               | »   | » 16 » 6,2 »                     |    |
| № 4165 | » 3 »          | » 1,9 »               | »   | » 8 » 6,3 »                      |    |
| № 2650 | » 6 »          | » 2,4 »               | »   | » — » — »                        |    |
| № 2578 | » — »          | » — »                 | »   | » 10 » 1,9 »                     |    |

При сравненіи первой части этой таблицы съ подобными же (таблицы *a* и *d*) первыхъ трехъ группъ можно сказать, что несомнѣнно организмъ потерѣ вѣса по прекращеніи лихорадки основной волны (по обычной кривой) въ двухъ случаяхъ больше (№ 4349 и 5333). Сравненіе второй части этой таблицы съ быстротою паденія вѣса въ случаяхъ первой группы<sup>66</sup>) наводитъ на мысль о медленности подъема вѣса до начала возврата. Въ общемъ же въ ходѣ вѣса тѣла во время промежутка между основною волною и возвратомъ болѣзни нѣтъ ничего характернаго, общаго для всѣхъ случаевъ, почему можно было бы предугадать возвратъ болѣзни: вѣсѣ болѣзною или все время падаетъ (№ 4349 и отчасти № 2650), или, закончивъ начавшееся еще при основной волнѣ тифа паденіе, переходитъ въ поднятіе. Всѣ эти объективныя явленія, наблюдавшіяся въ промежутокъ между основною волною тифа и возвратомъ болѣзни, показываютъ, что, несмотря на значительное изученіе общаго состоянія, болѣзною далеко еще отъ полного выздоровленія. Такой выводъ позволяетъ прикинуть къ взгляду тѣхъ авторовъ, которые считаютъ возвратъ болѣзни не за проявленіе новаго зараженія, а лишь за всплывшій старый, остававшагося въ промежутокъ скрытно въ организмѣ и вліяющаго задерживающимъ образомъ на полное исчезновеніе всѣхъ симптомовъ основной волны тифа.

При только что описанныхъ явленіяхъ наступаетъ у нашихъ больныхъ возвратъ брюшнаго тифа. Постепенность появленія объективныхъ данныхъ, которыя при этомъ наблюдаются, лучше всего замѣтна на слѣдующей таблицѣ:

<sup>65</sup>) Врачъ 1892 г. № 20.

<sup>66</sup>) Съ ними, мнѣ кажется, только и можно сравнивать.

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| № 4319 | 1) Обильный потъ въ число.<br>2) Показіе темпера- тура и увеличеніе судорожнаго опу- дили сосиски.<br>3) Замедленіе ходьбы въ 5-ю дн.<br>4) Истощеніе въ 4-е сутки и пониженіе температуры. | 5) Ресолы въ 6-й дн.<br>6) Тифозное состо- яніе въ 7-й дн.               | Окончаніе лихорадки означено съ дур- часными явлені- ями.                   |
| № 5313 | 1) Обильный потъ въ число.<br>2) Показіе темпера- тура и увеличеніе концентрации ис- пражненія.   | 3) Новая оспа въ 4-й дн.<br>4) Пониженіе въ 5-й дн.                      | 6) Лихорадка при тифоз- ныхъ явленіяхъ на 4-й дн далеко отъ обычной кривой. |
| № 6332 | 1) Обильный потъ въ число.<br>2) Показіе темпера- тура.   | 3) Сосиски оспа въ 3-й дн.<br>4) Пониженіе въ 4-й дн.                    | 6) Лихорадка при тифоз- ныхъ явленіяхъ на 2-й дн далеко.                    |
| № 9018 | 1) Показіе темпера- тура.   | 2) Пониженіе въ 5-й дн.<br>3) Новая оспа въ 4-й дн.                      | 6) Обильно.   |
| № 2650 | 1) Показіе темпера- тура.<br>2) Уменьшеніе потъ на языкъ.   | 3) Новая оспа въ 2-й дн.<br>4) Пониженіе въ 3-й дн.                      | 7) Лихорадка при тифоз- ныхъ явленіяхъ далеко на 1-й дн.                    |
| № 2578 | 1) Показіе темпера- тура.   | 2) Пониженіе въ 4-й дн.<br>3) Уменьшеніе потъ на языкъ.                  | 6) Обильно.   |
| № 4105 | 1) Показіе темпера- тура.<br>2) Обильный потъ въ число.   | 3) Новая оспа въ 3-й дн.<br>4) Уменьшеніе судорожнаго опу- дили сосиски. | 6) Обильно.   |

7) Селезёнка сосиски — увеличена пропорционально.

Такимъ образомъ прежде всего или появляется налетъ на языкъ, если раньше онъ успѣлъ уже сдѣлаться чистымъ, или происходитъ повышеніе температуры. Позже же всего, за исключеніемъ № 9018, на 4—10 день возврата болѣзни начинается паденіе вѣса, которое продолжается, какъ и послѣ первой волны тифа, и по прекращеніи лихорадки возврата. По ходу вѣса особенно выдается случай № 2578, который, несмотря на лихорадочное состояніе, продолжаетъ расти въ вѣсѣ до послѣдняго дня возврата и лишь съ прекращеніемъ лихорадки возврата наступаетъ паденіе вѣса (у больного были исключе- ния въ возможная другія причины лихорадки и поднятія вѣса). По прекращеніи паденія подъ влияніемъ возврата болѣзни вѣсъ снова начинаетъ подниматься. Полученный нами ходъ вѣса тѣла при воз- вратахъ брюшного тифа не находится въ согласіи съ заявленіемъ д-ра Эйвенца <sup>67)</sup>, что «въ теченіи рецидива вѣсъ, конечно, начинаетъ падать такъ же, какъ это бываетъ и въ началѣ тифа». Наблюдае- мья въ первые дни возврата брюшного тифа задержки вѣса или подлітія его не находятся въ связи ни съ прѣемомъ пищи, ни съ запоромъ или задержкой мочи. То же самое нужно сказать и о тѣхъ задержкахъ или подъемахъ вѣса, которые наблюдаются при возномъ ходѣ лихорадки основной волны тифа. Оба эти факта на- водятъ на мысль, не завися- ли подобное явленіе (задержка вѣса или легкое его подлітіе) и при поступленіи большого брюшнымъ тифомъ въ больницу отъ тѣхъ же условий со стороны организма, какъ и при возвратахъ брюшного тифа. Едва-ли эти задержки вѣса при поступленіи въ больницу цѣлкомъ могутъ быть объяснены ухудше- ніемъ обстановки больного, лучшимъ уходомъ и соответствующею пищею. Въдѣ далеко не всѣ больные удерживаютъ вѣсъ тѣла или даже приобретаютъ въ вѣсѣ въ первые дни по поступленіи въ боль- ницу, а между тѣмъ обстановка улучшается для всѣхъ, поступаю- щихъ въ городскую больницу, людей чернорабочихъ. Но, къ сожа- лѣнію, точныхъ доказательствъ, объясняющихъ это явленіе, пред- ставить въ настоящее время не можемъ.

Такъ какъ въ случаѣ № 2578 и по прекращеніи лихорадки возврата болѣзни существуетъ при двухчасовомъ измѣреніи темпе- ратуры повышеніе ея до 37,6°С., остающееся незамѣтнымъ на обычной кривой, то это позволяетъ еще разъ указать на ту остро- рожность, съ какою надо судить о нормальной, свойственной дан- ному больному температурѣ по обычной кривой температуры въ пе- риодъ выздоровленія.

<sup>67)</sup> Больничная газета Боткина 1890 г. № 30—31.

Вот, имея все эти данные, можно следующим образом охарактеризовать период выздоровления и возврата брюшного тифа. Подъ конец основной волны брюшного тифа рядом с улучшением общего состояния и самочувствия больного происходит постепенное падение температуры тела. При этом на обычной кривой температуры получаются так называемая субфебрильная ее цифры. Однако далеко не всегда эти малые лихорадочные цифры обычной кривой указывают на существование в действительности малого лихорадочного состояния. Если в ближайшие следующие дни получаются повышения температуры над существовавшими субфебрильными ее цифрами на обычной кривой, то такие подъемы температуры есть не новое омертвление лихорадки, а лишь продолжение существовавшей до некоторой степени скрытно. При дальнейшем падении температуры не только цифры ее в  $37,5—37,0^{\circ}\text{C}$ ., а даже  $36,3—36,8^{\circ}$  на обычной кривой в первые дни не всегда могут считаться началом апирексии, так как нередко в это время при двухчасовом изменении температуры получается  $37,6^{\circ}—38,2^{\circ}$ . Появляющиеся при этих условиях повышения температуры до лихорадочных цифр на обычной кривой в ближайшие дни по падению на  $36,3—36,8^{\circ}\text{C}$  должны быть тоже рассматриваемы как продолжение существующей лихорадки, а не ее омертвление. В своем течении период выздоровления больше, чем в половине случаев нарушается подъемами температуры. При обычной записи температуры такие повышения ее носят характер или единичных повышений, или малых волн. При двухчасовом же изменении температуры оказывается, что первая бывает двух родов: или это волны, протекающие в течение суток, или это действительно единичные повышения. Так как эти повышения температуры, оставаясь зачастую незамеченными при обычной записи, могут происходить за несколько дней (за 4—5 дней) до того, когда большой считается способным покинуть больницу (20—25 день апирексии), то и нельзя судить по температуре периода выздоровления по обычной записи о нормальной свойственной данному выздоравливавшему температуре, как то делает д-р Зынец. Если при выздоровлении появляется малая волна, заметная и на обычной кривой температуры, то, во-первых, продолжительность ее в действительности часто бывает на 1—4 дня больше, чем при обычной записи температуры; а во-вторых, промежуток между основной волной тифа и малой волною лишь редко (в 1 из 11 наших случаев) бывает лишь лихорадки: или последняя существует все время, или в половине числа дней промежутка.

Как отдельные повышения температуры, так и малые ее волны не проходят в большинстве случаев для организма бесследно: они, вызывая падение веса тела и изменение консистенции испражнения вплоть до поноса, тем самым затягивают выздоровление (вопреки мнению д-ра Ижболдина и проф. Strümpell'a). Обвинять пишу или что-либо другое в появлении этих повышений нужно с большою осторожностью.

Ходь веса тела больного при брюшном тифе в общих чертах похож на ход температуры. Подобно той постепенности, с какою температура тела с высших лихорадочных цифр достигает цифр нормальных, происходит и падение веса тела. Сравнение обычной кривой температуры с кривою веса тела показывает, что с прекращением лихорадки на обычной кривой вес в большинстве случаев (у нас из 85 в 74) не сразу переходит в поднятие. В течение 1—12 дней продолжается еще падение, причем процент несомненной потери не зависит от числа дней; но и этим еще иногда (у нас из 85 в 25) далеко не ограничивается: в течение 1—13 дней вес тела может оставаться без перемещения. После всего этого уже начинается поднятие веса тела, идущее скачками. Ливня поднятия при графическом изображении веса тела напоминает линию падения. Повышения температуры в период выздоровления не сразу вызывают падение веса тела: подобно поднятию температуры вес тела сначала тоже нарастает.

Такая же постепенность, как относительно температуры и веса тела, замечается и при исчезании других объективных явлений брюшного тифа. Рвце она видна в изменении консистенции и окраски испражнения: в течение нескольких дней апирексия существует понос; затем испражнение делается кашцеобразным; это переходит в оформленное почти лишенное окраски (желтое) и, наконец, уже появляется оформленное и хорошо окрашенное испражнение.

Что касается возврата брюшного тифа, то они наступают чрез известный промежуток по окончании основной волны тифа, как бы она ни протекала по своей тяжести. Точно определить продолжительность этого промежутка нельзя, так как колебания ее в ту или другую сторону пожим прочего зависят и от числа дней наблюдения выздоравливающего больного. Промежутком этот не всегда бывает в действительности лишь лихорадки: в течение его могут происходить повышения температуры, не заметны при обычной ее записи. Чем больше этот промежуток, тем больше

оправляется больной: язык может совершенно или значительно очиститься; исчезает или значительно уменьшается опухоль селезенки; испражнение может оформиться и получить хорошую окраску; силы больного могут сдвигаться вполне удовлетворительными или даже хорошими. Во всем этом нет признака, почему можно было бы предсказать возврат болезни. Таким признаком не может служить и весь тьла больного: весь или все время промежутка падают, или, закончив свое падение, значительно поднимается. Общим для всех наших случаев относительно всего тьла было достижение той фазы всего, с которой больной явился в палату. Но едва ли это может служить указанием на возможность возврата болезни, так как за неизменем данных нельзя утверждать, что по достижении указанных цифр всего или даже больших цифр не мыслим уже возврат болезни.

В первый день возврата прежде всего или язык из чистого дьлается обложенным, или повышается температура. В дальнейшем же течении выступают другие кардинальные признаки тифа. Весь тьла или поднимается в течении всего возврата болезни, или падение его наступает позже других явлений возврата. Начавшееся же падение всего тьла продолжается и по прекращении лихорадки возврата; затем весь тьла снова подымается. Продолжительность лихорадки возврата болезни в действительности или совпадает с продолжительностью его по обычной высоте температуры, или на 1—4 дня является дольше. Перенесение возврата болезни не застраховывает однако от дальнейших отдельных повышений температуры. Изъ всего этого уже ясно, что только изменение температуры может служить указателем гладко вдушаго выздоровления больного от брюшного тифа. Конечно, измерять температуру у каждого больного брюшным тифом через два часа круглые сутки, да еще при больничной обстановке, когда таких больных накаплиется до 40—60 человек, есть дело весьма невозможное. Ход температуры за сутки как в случаях, где были замечены отдельные ее повышения в период выздоровления, так и в случаях с возвратами болезни, прямо показывает, что практическому врачу и нет надобности измерять температуру через два часа круглые сутки. Для правильной оценки состояния больного достаточно, если, кроме измерения температуры в 8 часов утра и 6 вечера, будут еще два измерения: между 10 и 12 часами дня и 8—10 часами вечера, так как на основании хода температуры у приведенных случаев высшие цифры температуры

или начала их в период выздоровления и совпадают с указанным временем.

В заключение считаю долгом выразить глубокую благодарность главному врачу Александровской больницы В. П. Доброклонскому как за предоставление мне возможности произвести эту работу, так и за все советы, которыми я неоднократно пользовался в лаборатории больницы и у постели больного.

Долгом считаю поблагодарить здесь же и завдушаго мужских отделений больницы П. Д. Кувшинского за все те советы и указания у постели больного, которыми я пользовался в течении всего времени пребывания моего в больнице.

Благодарю также и бывшую сестру милосердия В. Безпалову, принимавшую немалое участие в этой работе.

Faint, illegible text visible through the paper from the reverse side.

НБ ХНМАУ

ПРИЛОЖЕНІА.

### Краткія історіі болѣзней и таблицы пер- выхъ трехъ группъ.

Допущенныя сокращенія: р=разъ; м=моча; уд. в.=удѣльный вѣсъ; б=бѣлокъ; р. Эрл.=реакція Эрлиха; ч=чай вѣсъ съ выдѣвавшейся за день водою или моремъ. Вѣсъ тѣла вездѣ опредѣленъ въ граммахъ, а числа, стоящія рядомъ, означаютъ день болѣзни; st. pr.=status praesens. Въ історіяхъ болѣзней 3, 4, и 5 группъ при каждомъ днѣ стоитъ число мѣсяца, затѣмъ температура утромъ и вечеромъ и вѣсъ. На прилагаемыхъ 4 кривыхъ: точки при 43°=розеолы; кружки, соединенныя прямой линіей=вѣсъ тѣла; черныя точки, соединенныя прямой=температура; точки, соединенныя пунктиромъ, показываютъ высшую температуру, наблюдавшуюся при двухчасовомъ измѣреніи въ теченіи сутокъ; мѣста при 39°, зачерченныя продольными линіями, означаютъ понось, а въ этой же линіи, но вертикально=запоръ; густо зачерченное при 41°=потъ; крупныя точки при 40°=бронхитъ. Мѣста, зачерченныя наискось при 36°=бѣлокъ. Крестъ при 35,5°=тифозное состояніе; двойной крестъ=тифоз. состояніе съ бредомъ, а тройной=сильное тифоз. состояніе. Треугольникъ при 35°=селезенка; онъ же, зачерченный = болѣзненная селезенка.

#### ПЕРВАЯ ГРУППА.

№ 1. № пр. журн. 1538. Крестьянинъ Мор—въ, 13 лѣтъ поступилъ 25 февраля 1893 г. на 7 день болѣзни, жалуюсь на головную боль, отсутствіе аппетита.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Со стороны органовъ груди только кое-гдѣ отдѣльные высокіе свисты. Границы тупости печени и селезенки не измѣнены. На печень, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры и вѣса съ 7 по 14 день болѣзни таковы:

Т-ра утр. 38,5 38,7 39,0 37,5 39,2 38,8 37,2 37,4.  
веч. 39,7 40,0 39,0 40,2 39,5 39,2 38,8 38,3. Далась 1 ванна 28°R. веч.  
Вѣсъ 55100—54100—52700—53100—52600—52500—52100.

Пищеву за это время было молоко: на 7 д. болѣзни 1000 к. с., на 8 д. — 1800 к. с., а съ 9 по 15 д. включительно бульонъ, 2 яйца, 2200 к. с. молока. Объективно наблюдалось: стулъ по 1 — 2 р. въ сутки жидкѣй; мочи отъ 800 до 2700 к. с., при уд. в. 1,020—1,009; бѣлка не было, р. Эрл. до 12 дня, исчезавшее свистеть въ груди съ 12 дня болѣзни; съ этого же дня прощупывался край селезенки; тифозное состояние постепенно уменьшалось. Дальше температура понижалась чрезъ 2 часа и вначалѣ ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | Всѣх. | 8°)  | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15           | 52000 | 37,2 | —    | 37,7 | 38,0 | 38,5 | 38,8 | 38,4 | 38,3 | 38,7 | 37,6 | 37,0 | 36,9 |
| 16           | 51700 | 36,8 | 37,0 | 37,6 | 37,7 | 38,0 | 38,2 | 38,7 | 38,8 | 38,2 | 38,5 | 38,0 | 37,0 |
| 17           | 51500 | 37,0 | 36,3 | 37,7 | 37,4 | 37,7 | 37,9 | 38,4 | 38,3 | 38,4 | 37,7 | 37,1 | 36,7 |
| 18           | 52200 | 36,9 | 36,8 | 37,2 | 37,7 | 38,3 | 37,5 | 37,6 | 37,9 | 37,3 | 37,4 | 37,0 | 36,8 |
| 19           | 52100 | 36,6 | 37,1 | 36,8 | 37,2 | 37,4 | 37,5 | 38,1 | 37,7 | 37,6 | 37,4 | 37,0 | 36,8 |
| 20           | 51800 | 36,5 | 37,0 | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,2 | 37,9 | 36,9 | 36,8 | 36,9 | 36,8 | 36,4 |

Съ 21 по 37 день болѣзни температура въ теченіи сутокъ колебалась при двухчасовомъ ея измѣреніи отъ 36,2 до 37,4° и только на 24 день болѣзни въ 2 часа дня одинъ разъ достигла 37,5° Ц. Ходъ всѣхъ тѣла виденъ изъ слѣдующей таблицы (съ 21 по 37 день):

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52300 (21) | 52200 | 51900 | 51900 | 52000 | 52600 | 52900 | 52800 |
| 53300 (29) | 53900 | 53400 | 54200 | 54100 | 54500 | 55000 | 55000 |

Объективными же явленіями измѣнились такъ: до 16 дня болѣзни стулъ былъ по 1 р. жидкѣй; съ 17 до 24 дня стулъ въ видѣ густой кашицы, а съ 25 до 37 дня оформленный. Количество мочи 3500 — 4300 к. с., уд. в. 1,005 — 1,007, безъ бѣлка. Съ 16 дня болѣзни не было уже тифознаго состоянія; съ 17 дня не прощупывалась селезенка. Съ 25 дня языкъ оставался обложеннымъ только въ задней половинѣ, а съ 33 дня былъ уже чистымъ. Чаю выпивалъ по 1600—2000 к. с. утромъ и вечеромъ. При выпискѣ на 37 день болѣзни вѣсъ=55000, а со стороны внутреннихъ органовъ измѣненій не замѣчалось.

№ 2. № пр. журн. 6899. Сыръ солдата Лим—лъ, 14 лѣтъ,

\*) Цифры эти означаютъ часы съ 8 ч. утра.

поступилъ 16 августа 1893 г. на 7(?) день болѣзни, жалуся на головную боль и поносъ.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Верхнія границы тупости печени а селезенки не измѣнены. Печень не прощупывается; селезенка — край. Ходъ температуры съ 7 дня и всѣхъ тѣла съ 9 по 15 д. болѣзни включительно былъ:

|      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |           |           |
|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|-----------|-----------|
| Т-ра | утр. | 38,8  | 37,5 | 38,0 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 36,6 | 36,5 | 38,0 | 1 | ванна 28° | вечеромъ. |
|      | веч. | 39,0  | 38,5 | 39,2 | 38,8 | 38,7 | 38,4 | 38,0 | 38,1 | 38,4 |   |           |           |
|      |      | Всѣхъ тѣла 36900—36900—36600—36400—35800—35600—35500. |      |      |      |      |      |      |      |      |   |           |           |

Объективно за это время наблюдалось: стулъ 1—2 р. въ сутки жидкѣй; мочи 500—2300—3000 к. с., уд. в. 1,020—1,007, безъ бѣлка, р. по Эрл. отрицательна; тифозное состояние было до 12-го дня болѣзни, головная боль до 14-го дня; на 10 и 11 дни была болѣзненность селезенки. Пищеву служило молоко: на 7 и 8 дни по 1000 к. с., а съ 9 до 19 дня 1800 к. с. Съ 16 дня болѣзни начало измѣреніе температуры чрезъ 2 часа, и вначалѣ ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | Всѣх. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16           | 35300 | 37,2 | —    | —    | —    | —    | 37,6 | 38,2 | 38,2 | 37,6 | 37,5 | 36,9 | 36,2 |
| 17           | 35200 | 36,2 | 36,1 | 37,0 | 36,4 | 36,7 | 36,6 | 37,7 | 38,0 | 37,7 | 37,7 | 36,2 | 36,0 |
| 18           | 35200 | 36,1 | 36,3 | 36,2 | 36,8 | 36,3 | 36,7 | 37,3 | 37,3 | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 36,0 |

Съ 19-го же дня болѣзни и до 41-го температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,1° Ц., давъ на 29-й день болѣзни въ 6 часовъ утра 1 разъ 37,2° Ц. Ходъ всѣхъ тѣла виденъ изъ слѣдующей таблицы:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 35400 (19) | 35200 | 35500 | 35300 | 35200 | 35700 | 35700 | 36000 |
| 35900 (27) | 36200 | 36400 | 35800 | 35800 | 36700 | 36100 | 36500 |
| 36500 (35) | 36900 | 37100 | 37600 | 37600 | 38200 | 38000 |       |

Объективными же явленіями измѣнились такъ: жидкѣй стулъ былъ до 19 дня болѣзни; съ 20 до 29 дня болѣзни стулъ въ видѣ густой кашицы желтаго цвѣта; а съ 30 по 41 оформленный и хорошо окрашенный. Количество мочи 3000—4900 к. с., уд. в. 1,007—1,005, безъ бѣлка. Чаю выпивалъ по 1600—2000 к. с.

Съ 17 же дня и до 29-го дня болѣзни температура при двухчасовомъ измѣреніи колебалася между 36° и 37,3° Ц. Измѣненіе же вѣса тѣла съ 16 по 29 день болѣзни было таково:

|            |       |       |       |       |       |       |      |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 58700 (16) | 58500 | 58500 | 58200 | 58700 | 58000 | 59200 | 5880 |
| 59100 (24) | 59800 | 60800 | 61200 | 60600 | 61100 |       |      |

Объективные же явленія измѣнились такъ: стулъ на 16 день болѣзни жидкій, съ 17 по 21 кашцеобразный, а съ 22 по 29 оформленный. Количество мочи 3200 — 4100 к. с., уд. в. 1,008—1,005, безъ бѣлка. Чаю выпивалъ по 1600—2000 к. с. утромъ и вечеромъ. Съ 21 дня не удавалось прогнать селезенку. Языкъ очистился къ 28 дню болѣзни. Выписанъ на 29 день болѣзни, причѣмъ измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 5. № пр. журн. 5060. Крестьянинъ Гр—въ, 17 лѣтъ, поступилъ 12 июня 1893 г. на 12 день болѣзни, жалуюсь на головную боль, поносъ.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Верхняя граница тупости печени не измѣнена. Селезеночная тупость сверху съ 8 ребра. Ни печень, ни селезенку прогнать не удается. Ходъ температуры съ 12 и вѣса тѣла съ 13 до 15 дня болѣзни:

Т-ра утр. 38,0 37,9 37,7 37,1; на 15-ый д. болѣзни температура въ 8 ч. в. Вечер. 38,6 38,5 38,7 37,6 38, а въ 10 ч. в. 38,4° Ц.

Вѣсъ тѣла 59100—57800—56700.

Пищею было молоко: на 12 день 1000 к. с., а затѣмъ до 16 дня болѣзни 1800 к. с.. Объективные явленія за это время: стулъ по 2—3 р., жидкій; мочи 400—800 к. с., уд. в. 1,025—1,024, съ незначи. колич. бѣлка; р. по Эрл. положительная до 15 дня болѣзни включительно. На 15 день болѣзни исчезаетъ тифозное состояніе и головная боль; появляется сильное головокруженіе. Съ 16 дня болѣзни начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и вначалѣ ходъ ея такой:

| День болѣзн. | Вѣс.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16           | 56100 | 37,0 | —    | 37,5 | 37,4 | 37,0 | 37,4 | 37,5 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 37,1 |
| 17           | 55400 | 36,4 | 36,8 | 36,9 | 37,2 | 36,9 | 37,1 | 37,7 | 37,3 | 36,7 | 36,8 | 36,5 | 36,3 |
| 18           | 55400 | 36,7 | 36,6 | 37,1 | 37,1 | 37,3 | 37,4 | 37,5 | 37,9 | 36,3 | 36,3 | 37,1 | 37,2 |
| 19           | 55000 | 36,9 | 36,9 | 36,7 | 37,0 | 37,9 | 37,3 | 37,4 | 37,0 | 37,1 | 36,5 | 36,6 | 36,9 |
| 20           | 55600 | 36,5 | 36,8 | 36,9 | 36,7 | 37,5 | 37,4 | 37,1 | 37,2 | 36,6 | 36,4 | 36,5 | 36,9 |

Съ 21 же до 37 дня болѣзни температура въ теченіи сутокъ, при двухчасовомъ измѣреніи ея, колебалася между 36 — 37,2° Ц. Ходъ вѣса тѣла до 37 дня болѣзни таков:

|            |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 55600 (21) | 55400 | 55100 | 55000 | 54800 | 55400 |
| 55600 (27) | 56000 | 56900 | 57100 | 57400 | 58200 |
| 57800 (33) | 58400 | 58900 | 59700 | 60100 |       |

Объективные же явленія съ 16 дня болѣзни по 37 день измѣнились такъ: стулъ жидкій до 18 дня; съ 20 до 32 дня стулъ въ видѣ густой кашицы съ примѣсомъ оформленного, желтого; а съ 33 до 37 дня испраженіе было оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи отъ 500 до 4500 к. с., уд. в. 1,020—1,005, со сѣдками бѣлка до 18 дня болѣзни; р. Эрл. была отрицательная. Языкъ очистился къ 35 дню. Головокруженіе держалось до 22 дня. При выпискѣ измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 6. № пр. журн. 7240. Крестьянинъ К—въ, 19 лѣтъ, поступилъ 27 августа 1893 г. на 5(?) день болѣзни, жалуюсь на головную боль, слабость.

St. pr. Средняго роста. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Общая развитость. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только отдѣльные высокие свисты. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнены. Печень не прощупывается; селезенка—твердый край. Урчаніе въ правой подвздошной. Ходъ температуры съ 5 и вѣса тѣла съ 7 до 17 дня болѣзни таковы:

Т-ра утр. 38,5 38,0 38,2 37,8 38,3 38,2 37,4 37,8 37,9 37,8 37,3 38,0 37,4. Веч. 39,0 38,7 38,7 38,2 39,0 38,8 38,7 38,6 38,2 38,7 38,8 38,2 37,8. Вѣсъ тѣла 57000—57600—57200—56900—56300—55900—55800—55600—55200—54800—54100.

Все это время получалъ по 1 ваннѣ 28°R. вечеромъ. Пищею было молоко: на 5 и 6 дни по 1000 к. с., а затѣмъ до 19 дня

болѣзни 2200 к. с. Объективно наблюдалось: стулъ по 2—3 р., жидкій; мочи отъ 300 до 2800 к. с., уд. в. 1,025—1,007, безъ бѣлка; р. по Эрл. отрицательная. Съ 9 дня болѣзни селезенка прощупывалась на палецъ, съ 13 дня болѣзни уменьшились головная боль и разбитость. Съ 18 дня болѣзни начато измѣненіе температуры чрезъ 2 часа и въ началѣ ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | Всѣх. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 18           | 54300 | 37,0 | 36,6 | 36,7 | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,5 | 37,4 | 37,3 | 36,9 | 36,7 | 36,5 |
| 19           | 54200 | 36,6 | 36,3 | 36,6 | 36,6 | 36,9 | 36,7 | 36,9 | 37,4 | 37,1 | 36,8 | 36,5 | 36,3 |

Съ 20 же дня болѣзни и до 43 (день выписки) температура при двухчасовомъ измѣреніи, колебалась между 36,0 — 36,9° Ц., давъ на 37 день болѣзни одинъ разъ въ 6 час. утра 37,4° Ц. Ходъ всѣхъ тѣла съ 20 по 43 день болѣзни былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54200 (20) | 53800 | 54100 | 54700 | 54400 | 54600 | 53800 | 54100 |
| 53700 (28) | 55000 | 54800 | 54860 | 55000 | 55800 | 55100 | 56000 |
| 57600 (36) | 57490 | 57300 | 57400 | 57800 | 57400 | 58000 | 58700 |

Объективные же явленія измѣнились такъ: съ вечера 18 дня болѣзни до 23 испражненіе было въ видѣ густой кашицы; съ 23 до 30 дня болѣзни оформленное желтое, а съ 31 дня и до выписки — 43 дня — оформленное и хорошо окрашенное. Количество мочи отъ 2200—5000 к. с., при уд. в. 1,007—1,005. Чаю большой выпивать 3200—4800 к. с. въ сутки. Высокие свисты въ груди исчезли на 20 день болѣзни; селезенка перестала прощупываться съ 31 дня болѣзни; языкъ совершенно очистился къ 38 дню болѣзни. При выпискѣ на 43 день болѣзни измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось; силы хороши.

№ 7. № пр. журн. 5503. Крестьянинъ К.—въ, 20 лѣтъ, поступилъ 27 іюня 1893 г. на 7 день болѣзни, жалуюсь на головную боль, понось, общую слабость.

St. pr. Средняго роста. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Порадочное тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только разбросанные высокие и низкіе свисты. Селезеночная тупость сверху съ 8 ребра. Верхняя граница тупости печени не измѣнена. Селезенка твердая, прощупывается на

1 палецъ; пенью—край. Ходъ температуры 7 и всѣхъ съ 8 по 17 день болѣзни таковъ:

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| T-ра | 39,2  | 39,1 | 38,8 | 38,4 | 38,0 | 38,4 | 37,5 | 37,0 | 37,4 | 37,2 | 1 ванна 28°R вѣч. |
|      | 39,0  | 38,9 | 39,4 | 39,3 | 38,8 | 39,2 | 38,0 | 38,2 | 38,8 | 38,9 | 37,7              |
|      | Всѣхъ тѣла 54000—53800—53600—53000—52900—52600—52000—52000—51600—51400. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   |

Объективно за это время наблюдалось: стулъ по 3—4 р., жидкій; мочи отъ 200 до 1800 к. с., уд. в. 1,019—1,007, съ незнач. колич. бѣлка до 15 дня, на 16 и 17 дни болѣзни бѣлка въ мочѣ были слѣды, р. Эрл. до 14 дня. Уменьшеніе постепенное и полное исчезаніе къ 17 дню болѣзни тифознаго состоянія. Уменьшеніе свистовъ въ груди. Ослабленіе и исчезаніе головной боли къ 16 дню болѣзни. Пищю за это время служило молоко: на 8 день 1000 к. с., на 9—12 дни 1800 к. с., на 13—18 дни 2200 к. с. Съ 18 дня болѣзни температура измѣнялась чрезъ 2 часа и ходъ ея въ началѣ такой:

| День болѣзн. | Всѣх. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 18           | 51000 | 36,9 | —    | 36,8 | 36,6 | 36,3 | 37,8 | 37,6 | 37,5 | 37,1 | 37,2 | 37,3 | 37,5 |
| 19           | 50800 | 37,1 | 37,4 | 37,0 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 37,3 | 37,5 | 37,8 | 37,8 | 37,3 | 37,5 |
| 20           | 50900 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 37,0 | 36,7 | 36,3 | 37,1 | 36,8 | 36,4 | 36,3 | 36,4 | 36,9 |

Съ 21 по 51 день болѣзни температура при двухчасовомъ измѣреніи колебалась между 36,0 и 37,4° Ц., на 32 день болѣзни достигла въ 6 часовъ вечера 37,5°; этой же цифры достигла она и на 49 и 50 дни болѣзни въ 4 часа вечера. Ходъ же всѣхъ тѣла съ 21 по 51 день болѣзни виденъ въ слѣдующей таблицѣ:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 50400 (21) | 51300 | 51900 | 50000 | 50400 | 52800 | 50800 | 51500 |
| 51000 (32) | 51900 | 50000 | 50800 | 52800 | 50500 | 51000 | 54100 |
| 51500 (40) | 50000 | 50700 | 52600 | 50300 | 51000 | 53900 | 54200 |
| 50500 (48) | 51200 | 52800 | 50300 | 50400 | 53400 | 50600 |       |

Объективные явленія за это время измѣнились такъ: поносъ по 1—3 р. въ сутки существовалъ до 25 дня болѣзни; на 26—28 день испражненіе имѣло видѣ густой кашицы; съ 29 и до 40 испражненіе оформлено, желтое; съ 41 до 48 оформлено бурое и выше съ 49 дня испражненіе было оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2400 до 4700 к. с., уд. в. ея 1,005 —

1,007, безъ бѣлка. Чаю больной выпивалъ по 3200—4000 к. с. въ сутки. Связисты въ груди исчезли съ 19 дня болѣзни; языкъ совершенно очистился къ 43 дню; селезенка, постепенно уменьшаясь, перестала прощупываться съ 44 дня болѣзни; край же печени не прощупывался съ 24 дня болѣзни. При выпискѣ на 51 день болѣзни измѣненной со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 8. № пр. журн. 3204. Крестьянинъ Ш—нъ, 21 г., поступилъ 19 апрѣля 1893 г. на 7 день болѣзни, жалуюсь на головную боль, отсутствие аппетита, поносъ.

St. рг. Высокого роста. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только разбросанные въ небольшомъ количествѣ высокіе свисты. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Печень прощупать не удается; селезенка — край. Ходъ температуры 7 и вѣса съ 8 по 16 день болѣзни такой:

Т-ра утр. 0 39,2 39,3 38,8 39,5 38,5 37,9 38,7 38,4 37,2 i ванна 28°R. вѣч. вѣч. 39,6 39,6 40,0 40,0 39,7 37,4 38,2 37,6 38,5 38,0  
Вѣсъ тѣла 64700—63900—63200—63200—63100—61400—61700—60500—59600

Объективная же явленія за это время таковы: стулъ 2—3 р. въ сутки, жидкій; мочи 400—2000 к. с., уд. вѣса 1,025—1,007, съ незначит. колич. бѣлка до 12 дня болѣзни и со свѣдами бѣлка на 13 и 14 дни, р. Эриха положительная до 13 дня. Постепенное ослабленіе тифознаго состоянія и исчезаніе его на 16 день болѣзни. Съ 13 дня селезенка прощупывалась на 1 палецъ. Уменьшеніе головной боли и позывъ на пищу съ 9 дня болѣзни. Пищею служило молоко: изъ 7 день болѣзни 1000 к. с., а затѣмъ до 18 дня 1700 к. с. Температура въ 8 часовъ вечера 12 дня = 38,6, а въ 8 часовъ вечера 14 дня = 38,8. Съ 17 дня болѣзни температура измѣрялась чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзни. | Вѣсъ. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 17            | 59500 | 37,1 | —    | —    | —    | —    | 37,1 | 37,3 | 37,0 | 37,3 | 37,5 | 37,4 |      |
| 18            | 59000 | 36,9 | 37,0 | 37,3 | 37,2 | 37,3 | 37,2 | 37,3 | 37,4 | 37,5 | 37,6 | 37,1 | 37,1 |

Съ 19 по 40 день (день выписки) температура при двухчасовомъ измѣреніи колебалась между 36—37 3° Ц. въ теченіи сутокъ и лишь одинъ разъ на 37 день болѣзни достигла въ

4 часа пополудни 37,4° Ц. Ходъ же вѣса тѣла съ 19 по 40 день былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 58900 (19) | 58700 | 58700 | 58900 | 58500 | 58300 | 58700 | 58500 | 58500 | 59600 | 59900 |
| 60700 (30) | 61300 | 62100 | 61800 | 63000 | 62500 | 62600 | 63000 | 63300 | 63600 | 64000 |

Объективная же явленія измѣнялись такимъ образомъ: поносъ до 18 дня болѣзни, съ 19 до 23 дня испраженіе въ видѣ густой кашицы; съ 26 до 35 испраженіе оформлено, желтое, а съ 35 до 40 оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи 2800—5000 к. с., уд. вѣса 1,008—1,005, безъ бѣлка. Языкъ очистился къ 35 дню болѣзни. Селезенка, уменьшаясь, перестала прощупываться съ 36 дня болѣзни. Съ 17 до 21 дня болѣзни было головокруженіе. При выпискѣ на 40 день болѣзни измѣненной со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 9. № пр. журн. 1594. Крестьянинъ Ар—въ, 23 лѣтъ, поступилъ 27 февраля 93 г. на 8(?) день болѣзни, жалуюсь на головную боль и поносъ.

St. рг. Высокого роста. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Селезеночная тупость съ 8 ребра. Верхняя граница тупости печени не измѣнена. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры съ 8 и вѣса тѣла съ 9 по 11 день болѣзни такой:

Т-ра утр. 39,2 38,6 38,8 (ванна 28° вечер.) вѣсъ 69900 68900 68600;  
вѣч. 39,7 39,9 34,8 38,6

Объективная же явленія за это время таковы: стулъ по 2—4 р., жидкій; мочи 400—500 к. с., уд. вѣса 1,025—1,024 съ незначит. колич. бѣлка до 9 дня; на 10 и 11 дни бѣлка были свѣды; р. по Эриху до 11 дня включительно. Уменьшеніе головной боли. Пища на 8 день 1000 к. с. молока, а съ 9 по 11—бульонъ, 1 яйцо, 2400 к. с. молока. Съ 12 дня болѣзни начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзни. | Вѣсъ. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12            | 68000 | 37,2 | —    | 37,6 | 38,0 | 38,2 | 37,8 | 37,8 | 38,0 | 37,2 | 37,5 | 37,1 | 36,9 |
| 13            | 67500 | 36,8 | 36,6 | 37,0 | 37,4 | 37,2 | 37,2 | 37,0 | 37,4 | 36,9 | 36,7 | 36,2 | 36,2 |

Съ 14 до 33 дня болѣзни температура при двухчасовомъ измѣреніи колебалась между 36°—37,1° Ц. Ходъ вѣса тѣла за это время былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 68800 (14) | 69600 | 66000 | 65600 | 65900 | 65500 | 66300 | 66200 | 66300 | 67200 |
| 67500 (24) | 67800 | 67500 | 67400 | 68500 | 68700 | 68800 | 69500 | 70000 | 70300 |

Объективные же явленія измѣнялись такъ: поносъ по 3 р. въ сутки до 15 дня болѣзни; съ вечера 15 дня и до 28 испражненіе въ видѣ густой кашицы, съ 29 же дня и до 33 (день выписки) оформленное. Количество мочи колебалось отъ 2000 до 4100 к. с. при уд. в. 1,010 — 1,005, со слѣдами бѣлка до 12 дня, дальше же безъ бѣлка; р. Эрлиха отрицательная съ 12 дня. Тифозное состояніе исчезло на 12 день болѣзни. Головная боль прошла къ 14 дню. Языкъ совершенно очистился къ 32 дню. Чаю выпивать въ сутки по 2800 — 4000 к. с. При выпискѣ на 33 день со стороны внутреннихъ органовъ измѣненій не замѣчалось.

№ 10. № пр. журн. 6244. Крестьянинъ П-въ, 25 лѣтъ, поступилъ 22 июля 1893 г. на 10 день болѣзни, жалуясь на головную боль и общее недомоганіе.

St. рг. Высокаго роста. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только разбросанные въ небольшомъ количествѣ высокіе свѣты. Селезеночная тупость сверху съ 8 ребра; печеночная тупость сверху не измѣнена. Прощупывается твердый, болѣзненный край селезенки. Печень не прощупывается. Ходъ температуры съ 10 и вѣса съ 11 до 13 дня болѣзни таковы:

|      |        |      |      |      |      |                       |
|------|--------|------|------|------|------|-----------------------|
| Т-ра | утр.   | 38,5 | 38,3 | 38,0 | 37,9 | 1 ванна 28° вечеромъ. |
|      | вечер. | 38,5 | 38,8 | 39,4 | 38,2 |                       |

Вѣсъ тѣла 67800—67000—67000.

Объективно за это время наблюдалось: уменьшеніе тифознаго состоянія и свѣтловъ въ груди; стулъ по 3 р. въ сутки, жидкій; мочи 400 — 500 к. с., уд. вѣса 1,028 — 1,014, съ незначит. количеств. бѣлка, р. по Эрлиху положительная. Съ 14 дня болѣзни начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзни. | Вѣс.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 14            | 66000 | 37,7 | —    | —    | —    | 37,5 | 37,7 | 37,5 | 37,1 | 37,3 | 37,2 | 37,0 |      |
| 15            | 65900 | 37,2 | 37,3 | 37,9 | 37,8 | 37,5 | 37,4 | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 36,7 | 37,0 | 37,2 |
| 16            | 65300 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 37,2 | 37,0 | 37,5 | 37,6 | 36,2 | 36,0 | 36,2 | 36,5 | 36,4 |
| 17            | 64800 | 36,3 | 36,4 | 36,9 | 37,1 | 37,2 | 37,4 | 37,3 | 36,7 | 36,0 | 36,1 | 36,5 | 36,6 |

Начиная съ 18 дня болѣзни и до 42 (день выписки), температура при двухчасовомъ измѣреніи колебалась между 36,0 — 37,3° Ц. и лишь на 22 день въ 8 часовъ вечера достигла 37,4°, на 38 день въ 4 часа пополудни равнялась 37,5° и на 42 день въ 6 часовъ утра тоже была 37,5° Ц. Ходъ же вѣса тѣла съ 18 по 42 день болѣзни былъ таковъ:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 65100 (18) | 64900 | 64900 | 64100 | 64400 | 63500 | 63400 | 64200 | 64200 |
| 63800 (27) | 64300 | 64700 | 64500 | 65100 | 64800 | 65400 | 66000 | 69300 |
| 66500 (36) | 67300 | 67500 | 67400 | 67800 | 68300 | 68800 |       |       |

Объективные же явленія измѣнялись такимъ образомъ: на 14 день исчезли тифозное состояніе и свѣты въ груди; прошла головная боль; головокруженіе держалось съ 14 по 20 день; болѣзненность селезенки исчезла на 15 день, а селезенка перестала прощупываться съ 30 дня; языкъ совершенно очистился къ 39 дню; поносъ держался до 22 дня, съ 23 до 26 испражненіе въ видѣ густой кашицы; съ 27 до 34 дня оно было оформлено, желтое, а съ 35 дня оформлено и хорошо окрашено; количество мочи колебалось отъ 1600 к. с. до 4900 к. с., при уд. в. 1,013—1,005, со слѣдами бѣлка до 16 дня болѣзни. Чаю большой выпивать 2400—4000 к. с. въ сутки. При выпискѣ на 42 день измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 11. № пр. журн. 3740. Крестьянинъ, Сл-въ, 28 лѣтъ, поступилъ 4 мая 1893 г. на 10(?) день болѣзни съ жалобой на головную боль.

St. рг. Средняго роста; хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только разбросанные высокіе свѣты въ небольшомъ количествѣ. Верхнія границы тупости печени и селезенки не измѣнены. Печень прощупать не удается, селезенка — твердый,

болъзненный край. Ходъ температуры съ 10 и вѣса тѣла съ 11 по 14 день болъзни таковы:

Т-ра утр. " 38,3 38,2 37,6 37,4 1 ванна 28° вечер.  
вечер. 39,5 39,3 39,3 38,8 38,8

Вѣсъ тѣла 72400—71800—71800—71500.

Объективныя же явленія были таковы: стулъ по 1—2 р., жидкий; мочи 400—2000 к. с., уд. в. 1,021—1,012, съ незнач. количеств. бѣлка до 13 дня и слѣды бѣлка на 14 день, р. по Эрлиху до 13 дня положительная. Тифозное состояніе, уменьшаясь, исчезло на 14 день; на 11 и 12 дни было небольшое носовое кровотеченіе. Пищею служило молоко по 1800 к. с. въ сутки до 16 дня болъзни. Съ 15 дня болъзни начато измѣреніе температуры чрезъ два часа и ходъ ея былъ слѣдующій:

| День болъзни. | Вѣсъ. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15            | 70900 | 36,5 | —    | —    | —    | 37,7 | 37,6 | 37,2 | 36,9 | 36,9 | 36,6 | 36,6 | 36,3 |
| 16            | 70100 | 36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,7 | 36,8 | 37,1 | 37,0 | 37,4 | 36,8 | 36,4 | 36,0 | 37,0 |
| 17            | 69800 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 36,6 | 36,7 | 37,6 | 37,2 | 36,6 | 36,3 | 36,2 |

Начиная съ 18 дня болъзни и до 35 (день выписки) температура колебалась между 36—37,1°С., при двухчасовомъ ея измѣреніи и лишь на 32 день болъзни въ 4 часа дня одинъ разъ была 37,2°С. Ходъ вѣса за это время былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 69600 (18) | 69700 | 68900 | 68500 | 68900 | 68900 | 69600 | 68300 | 69100 |
| 69600 (27) | 70100 | 70500 | 71000 | 71600 | 71800 | 72000 | 72000 | 72500 |

Объективныя же явленія измѣнялись такимъ образомъ: на 15 день болъзни исчезли свисты въ груди и болѣзненность селезенки; прошла головная боль, но появилось головокруженіе, державшееся до 18 дня. До утра 16 дня былъ поносъ, съ вечера 16 дня и до 19 испраженіе было въ видѣ густой кашицы, съ 20 же дня и до 37 испраженіе было оформлено. Количество мочи колебалось отъ 1900 до 4800 к. с. при уд. вѣсѣ 1,010—1,005, безъ бѣлка. Чаю большой выпивалъ по 1600—4000 к. с. въ сутки. Селезенка пере-

стала прощупываться съ 27 дня болъзни. Языкъ совершенно очистился къ 29 дня. При выпискѣ на 35 день болъзни измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 12. № пр. журн. 7255. Крестьянинъ См—въ, 15 лѣтъ, поступилъ 27 VIII 93 г. на 5 (?) день болъзни съ неопредѣленными жалобами.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Порядочное тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди кое-гдѣ высокіе свисты. Верхнія границы тушести печени и селезенки не измѣнены. Селезенка тверда, прощупывается на 1 палецъ; печень—край. Ходъ температуры съ 5 и вѣса тѣла съ 6 по 20 день болъзни таковы:

Т-ра утр. 38,8 39,7 38,6 38,0 37,7 38,6 38,2  
вечер. 39,5 39,0 39,0 38,4 39,7 38,8 39,3 39,4  
утр. 37,8 37,7 38,3 38,0 37,6 39,2 39,0 37,6  
вечер. 38,0 39,8 39,9 38,4 38,3 38,8 39,4 39,8  
Вѣсъ тѣла: 44900—44600—44100—43200—43400—42600—41800—41800—41200  
—41000—40800—40400—40600—39500—39200.

За все это время получалъ утромъ и вечеромъ по 1 ваннѣ 28 К. Пищею же служило молоко—1800 к. с. Объективныя явленія были таковы: стулъ все время жидко по 1—2 р. въ сутки; мочи 400—1200 к. с., уд. вѣса 1,024—1,007 со слѣдами бѣлка до 9 дня болъзни; до 9 же дня и р. Эрлиха была положительною. Съ 8 дня селезенка прощупывалась на 2 пальца. Тифозное состояніе, постепенно уменьшаясь, исчезло на 13 день болъзни. Головная боль прошла на 14 день. Иногда бывалъ потъ подъ утро. Съ 21 дня болъзни начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болъзни. | Вѣсъ. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21            | 39000 | 37,5 | —    | —    | —    | —    | 37,8 | 38,3 | 39,8 | 39,3 | 37,3 | 37,0 | 37,0 |
| 22            | 39400 | 37,2 | 36,7 | 36,4 | 37,1 | 37,3 | 38,1 | 38,5 | 39,0 | 39,3 | 39,0 | 37,7 | 37,9 |
| 23            | 39000 | 37,2 | 36,7 | 36,6 | 36,9 | 37,0 | 37,2 | 37,6 | 38,5 | 38,8 | 38,4 | 37,2 | 37,0 |
| 24            | 38800 | 37,0 | 36,7 | 36,4 | 36,5 | 36,8 | 37,1 | 37,2 | 37,1 | 37,6 | 37,5 | 36,8 | 37,2 |

Съ 25 и до 61 дня (день выписки) температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,2° и лишь на 48, 49, 51 дни въ 4 часа дня и на 50 день въ 12 час. дня она равнялась 37,4; а въ 2 ч. дня 48 дня болъзни = 37,5°С. Ходъ вѣса тѣла до 61 дня болъзни былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 38900 (25) | 38700 | 38500 | 38500 | 38500 | 39000 | 39000 | 39000 |
| 39000 (33) | 39200 | 39200 | 39300 | 39200 | 39600 | 39300 | 39100 |
| 39700 (41) | 39500 | 39800 | 40700 | 41100 | 41600 | 41600 | 41500 |
| 41500 (49) | 41900 | 42600 | 42700 | 43000 | 42900 | 43200 | 43400 |
| 43700 (57) | 43500 | 44500 | 44500 | 45200 |       |       |       |

Объективными же явлениями извѣнялись такъ: поносъ по 1 р. въ сутки продолжался до 29 дня болѣзни; съ 30 по 39 день испражнение было ввидѣ густой кашицы, а съ 40 и до 61 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи было отъ 2000 до 5000 к. с.; уд. в. ея 1,008—1,005, безъ бѣла. Свисты въ груди исчезли на 29 день. Печень перестала прощупываться съ 21 дня. Языкъ то очищался, то снова былъ слегка обложенъ. Селезенка постепенно уменьшалась, но и въ день выписки (61 день болѣзни) прощупывалась еще на 1/2 пальца и была твердовата.

№ 13. № пр. журн. 7143. Крестьянинъ Сем—въ, 17 лѣтъ, поступилъ 23 VIII 93 г. на 9 (?) день болѣзни, жагуясь на знобъ и головокружение.

Ст. пр. Хорошаго тѣлосложения. Порядочнаго питания. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди извѣній не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не извѣнны. Печень не прощупывается; селезенка тверда, болѣзненна, на 1 палецъ. Ходъ температуры съ 9 и вѣса тѣла съ 11 по 17 день болѣзни таковы:

|            |       |       |       |       |       |       |       |        |                      |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------|
| Т-ра утр.  | 39,0  | 38,5  | 37,4  | 37,1  | 39,0  | 37,5  | 36,6  | 36,2   | 1 ванна 28°R. вечер. |
| веч.       | 38,5  | 39,8  | 39,9  | 39,3  | 39,4  | 38,8  | 38,5  | 38,7   | 37,7                 |
| Вѣсъ тѣла: | 44200 | 43400 | 42700 | 42200 | 41800 | 41800 | 42000 | 41100. |                      |

Объективными же явлениями извѣнялись такъ: стулъ по 1 р. въ сутки жидко; мочи 900—2800 к. с., уд. вѣса 1,020—1,010, со слѣдами бѣла до 12 дня; р. Эрлиха положительна до 11 дня. Съ 12 дня исчезла болѣзненность селезенки; съ 14 дня селезенка прощупывалась на 1 1/2 пальца. Тифозное состояніе и свисты въ груди исчезли съ 16 дня. Температура въ 10 ч. вечера 17 дня = 38,7° Ц. Пищею было молоко: на 9 и 10 дни по 1000 к. с., а затѣмъ до 20 дня 1800 к. с. Съ 18 дня начало извѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ таковъ:

| День болѣзн. | Вѣс.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 18           | 40800 | 36,0 | —    | 36,6 | 37,0 | 37,8 | 37,9 | 38,0 | 38,4 | 38,0 | 37,8 | 37,2 | 36,8 |
| 19           | 40800 | 36,2 | 36,1 | 36,3 | 36,6 | 36,4 | 37,9 | 38,3 | 37,4 | 37,4 | 37,1 | 37,0 | 37,0 |
| 20           | 40300 | 36,5 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,5 | 37,0 | 36,8 | 37,4 | 37,9 | 38,2 | 37,3 | 37,4 |
| 21           | 40600 | 36,8 | 36,3 | 36,4 | 36,3 | 36,2 | 36,5 | 36,4 | 37,5 | 38,0 | 37,1 | 36,7 | 36,0 |

Начиная съ 22 и до 62 дня болѣзни температура колебалась между 36—36,8° при двухчасовомъ ея извѣреніи и лишь на 22 день въ 12 и 2 часа ночи была 37,2, а въ 12 ч. ночи 24 дня 37,3° Ц. Ходъ вѣса тѣла за это время таковъ:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 40700 (22) | 40800 | 40500 | 40400 | 40700 | 41000 | 40300 | 41000 |
| 41300 (30) | 40400 | 40700 | 41000 | 41100 | 41200 | 40900 | 41500 |
| 41000 (38) | 41000 | 41600 | 40900 | 41500 | 41200 | 41500 | 41400 |
| 41100 (46) | 41500 | 41900 | 42800 | 42500 | 41800 | 42300 | 42400 |
| 43300 (54) | 43600 | 43800 | 43700 | 43800 | 44200 | 44500 | 45000 |
| 45200 (62) |       |       |       |       |       |       |       |

Объективными же явлениями извѣнялись такъ: до 31 дня стулъ чрезъ 2—4 дня по 1 разу жидко; съ 33 до 40 дня испражнение ввидѣ густой кашицы; съ 41 до 43 стулъ снова жидко; съ 45 до 51 ввидѣ густой кашицы, желтое; съ утра 51 до утра 53 опять жидко; съ вечера 53 до 56 ввидѣ густой кашицы, цвѣта глины; а съ 56 и до 62 оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2900 до 5000 к. с. при уд. вѣсѣ 1,010—1,005, безъ бѣла. Чаю болѣзнь вызывалъ по 3200—4400 к. с. въ сутки. Головокружение исчезло на 26 день. Языкъ очистился къ 59 дню. Селезенка постепенно уменьшалась и въ день выписки (62 день болѣзни) прощупывалась на 1/2 пальца.

№ 14. № пр. журн. 5744. Крестьянинъ Б—въ, 18 лѣтъ, поступилъ 5 VIII 93 г. на 11 день болѣзни, жагуясь на головокруж. боль.

Ст. пр. Средняго роста. Хорошаго тѣлосложения и питания. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Со стороны органовъ груди извѣній не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не извѣнны. Печень не прощупывается; селезенка—край. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 17 дня болѣзни включительно таковы:

|            |       |       |       |       |       |        |      |                |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|----------------|
| Т-ра утр.  | 39,2  | 39,2  | 38,9  | 38,3  | 38,6  | 37,3   | 37,4 | 1 ванна 28° R. |
| веч.       | 39,4  | 39,6  | 39,2  | 39,3  | 39,1  | 38,8   | 38,4 |                |
| Вѣсъ тѣла: | 52300 | 50900 | 51000 | 50500 | 50500 | 49900. |      |                |

Объективными явлениями за это время таковы: стулъ по 1—2 р. жидко; мочи 800—1700 к. с., уд. вѣса 1,018—1,012, съ незначительнымъ количествомъ бѣла до 14 дня, а затѣмъ бѣла слѣды; р. по Эрлиху до 14 дня; селезенка перестала прощупываться съ 13 дня болѣзни; тифозное состояніе исчезло на 17 день. Пищею служило молоко: на 11 и 12 дни по 1000 к. с., а затѣмъ до 19 дня 1800 к. с. Съ 18 дня болѣзни температура извѣрялась чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ таковъ:

| День<br>болъзни. | Въсь. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 18               | 49800 | 37,2 | —    | —    | —    | —    | 37,8 | 38,9 | 38,4 | 37,6 | 37,5 | 38,6 | 38,3 |
| 19               | 49100 | 36,8 | 37,4 | 37,5 | 37,6 | 37,3 | 38,1 | 38,1 | 37,7 | 37,2 | 37,0 | 38,1 | 38,0 |
| 20               | 48600 | 37,0 | 37,1 | 37,7 | 37,7 | 37,3 | 38,2 | 38,4 | 38,4 | 37,7 | 38,1 | 38,4 | 37,6 |
| 21               | 48800 | 36,8 | 37,1 | 37,0 | 37,0 | 37,5 | 37,9 | 37,7 | 38,1 | 37,8 | 37,1 | 37,6 | 37,7 |
| 22               | 48500 | 36,5 | 36,8 | 36,9 | 37,2 | 37,0 | 37,7 | 37,7 | 37,8 | 37,7 | 37,9 | 37,7 | 37,3 |
| 23               | 48300 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 37,0 | 37,1 | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 37,7 | 37,4 | 37,7 | 36,8 |
| 24               | 48200 | 36,6 | 37,0 | 37,0 | 37,2 | 37,1 | 37,5 | 37,8 | 37,3 | 37,0 | 36,8 | 37,1 | 37,1 |
| 25               | 48100 | 36,5 | 36,7 | 36,7 | 36,6 | 37,1 | 37,3 | 37,7 | 37,1 | 36,9 | 36,9 | 37,3 | 37,5 |
| 26               | 47700 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | 36,9 | 37,0 | 37,5 | 37,6 | 37,3 | 36,9 | 37,4 | 37,3 | 37,3 |
| 27               | 47700 | 36,3 | 36,7 | 37,2 | 36,9 | 36,9 | 37,3 | 37,1 | 37,0 | 36,5 | 36,6 | 36,8 | 36,8 |

Начиная съ 28 и до 52 дня болъзни (день выписки) температура при двухчасовомъ ей измѣреніи колебалась между 36,1—37,3° Ц. и лишь на 44 день въ 10 часовъ утра одинъ разъ = 37,5° Ц. Ходъ въса тѣла за это время былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 47800 (28) | 47600 | 47300 | 47300 | 47900 | 47600 | 47500 | 47300 |
| 47600 (36) | 47600 | 48200 | 48900 | 49000 | 49300 | 50000 | 50000 |
| 50500 (44) | 50900 | 51100 | 51800 | 52000 | 52100 | 52700 | 52800 |

Объективныя же явленія измѣнялись такъ: стулъ по 1 р. жидко до 21 дня болъзни; съ 22 до 30 испражненіе ввидѣ густой кашицы; съ 31 и до 40 испражненіе оформлено, желтое, а съ 41 и до 52 оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2400 до 5400 к. с., при уд. въсь 1,013—1,005, безъ бѣлака. Чаю большии вышивалъ по 3200—4400 к. с. въ сутки. Языкъ очистился совершенно къ 50 дню. При выпискѣ на 52-день болъзни измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось, а въсь тѣла = 53400 gtm.

№ 15. № пр. журн. 4532. Крестьянинъ Д—въ 18 лѣтъ, поступилъ 26 VI 93 г. на 5 (?) день болъзни, жалуясь на головную боль, знобъ, поносъ.

St. рг. Хорошаго тѣлозложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Верхняя граница тулости итечени не измѣнена. Селезеночная тулость сверху съ 8 ребра. Ни итечени, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры съ 20 и въса до 23-го дня болъзни таковы:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Т-ра                     | утр. 38,4 38,6 38,9 38,8 39,4 38,2 38,2 38,8 38,2 38,1 38,0 37,8 |
|                          | веч. 37,8 37,9 39,9 39,8 39,8 39,0 39,4 39,2 39,2 39,7 39,4 39,3 |
|                          | утр. 36,6 37,6 36,8 36,4   |
| веч. 39,0 39,1 38,3 37,5 |  |

Въсь тѣла 41500—41800—41300—41100—40700—40700—40500  
—40200—39700—39500—39400—39300—39200

Объективныя же явленія измѣнялись такъ: стулъ 1—3 р. жидко въ сутки; мочи 400—3100 к. с., уд. въса 1,015—1,007, безъ бѣлака; р. по Эрл. до 16-го дня. На 14 день въ груди появились отдѣльныя высокіе свисты. На 20 день небольшое носовое кровотеченіе; головная боль смѣнилась головокруженіемъ, исчезло тифозное состояніе. Температура въ 10 часовъ ввечера 20 дня болъзни 38,6° Ц. Пищею было молоко: на 5—7 дня 1000 к. с., на 8—15 дня 1800 к. с.; на 15—20 дня: бульонъ и 2300 к. с. молока. Съ 21-го дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День<br>болъзни. | Въсь. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21               | 39400 | 36,3 | —    | 36,8 | 37,1 | 36,5 | 37,6 | 38,4 | 38,5 | 37,6 | 36,8 | 36,9 | 36,6 |
| 22               | 39300 | 36,2 | 36,2 | 36,0 | 36,5 | 36,7 | 37,8 | 38,2 | 37,5 | 37,0 | 36,1 | 36,0 |      |

Съ 23 и до 48 дня болъзни температура при двухчасовомъ измѣреніи колебалась между 36,0 и 37,3° Ц., давъ на 41 день въ 10 часовъ ввечера 37,4° Ц. и на 47 день въ 8 часовъ ввечера 37,5° Ц. Ходъ въса за это время таковъ:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 39000 (23) | 38900 | 39100 | 39000 | 39400 | 39300 | 39900 | 39900 | 40100 |
| 40400 (32) | 40500 | 40500 | 40900 | 41100 | 41200 | 41200 | 41800 | 41800 |
| 42200 (41) | 42100 | 42600 | 42600 | 43200 | 43700 | 44200 | 44500 |       |

Объективныя же явленія измѣнялись такъ: до 21 дня болъзни стулъ жидко; съ 23 до 43 дня испражненіе ввидѣ густой кашицы, желтое, а съ 43 до 48 дня большая часть испражненія оформлена, меньшая ввидѣ густой кашицы, но хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 3000 до 4400 к. с., при уд. въсь 1,009—1,005, безъ бѣлака. Свисты въ груди исчезли на 21 день, головокруженіе на 31 день. Языкъ очистился къ 39 дню. При выпискѣ

на 48-ой день болезни изменений со стороны внутренних органов не замечалось.

№ 16. № пр. журн. 3637. Крестьянин Ер—въ, 19 летъ, поступил 1/V 93 г. на 8 день болезни, жалуюсь на головную боль и общее недомогание.

St. pr. Среднего роста. Хорошего телосложения и питания. Порядочное тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только отдаленные высокие свисты въ небольшомъ количествѣ. Верхнія границы тупости печени и селезенки не изменены. Печень и селезенка прощупываются своими краями. Ходъ температуры съ 8 и вѣса тѣла съ 10 по 18 день болезни таковы:

утр. 39,3 37,6 39,0 38,6 39,4 38,8 38,6 38,4 37,1 37,5 37,3  
Т-ра вѣч. 39,8 40,0 39,4 40,0 39,6 39,4 39,4 38,7 38,7 38,9 38,8 2 ванны 28°R. въ сут.  
Вѣсь тѣла: 58000—57300—57000—56500—55400—54500—53800—54000—53100.

Объективными же явления за это время были: ступь 1—3 р. жидко въ сутки; мочи 800—1400 к. с., уд. вѣса 1,020—1,009, съ незначит. количествомъ бѣлка до 17 дня, а на 18 день слѣды; р. по Эрлиху положительная до 15 дня. На 10 и 11 дни розеола на кожѣ груди. Съ 11 дня явления ларингита. Съ 14 дня селезенка прощупывалась на 1 палецъ. Тифозное состояние постепенно ослабѣвало. Пища—молоко: на 8 и 9 дни 1000 к. с., на 10—13 дни 1800 к. с., на 14—20 дни 2200 к. с. Съ 19 дня начало изменение температуры чрезъ два часа и ходъ ея былъ такой:

| День болзн. | Вѣсь. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 19          | 52800 | 37,0 | —    | —    | —    | 37,6 | 38,0 | 37,8 | 37,5 | 37,3 | 37,1 | 36,9 |      |
| 20          | 52000 | 36,8 | 36,5 | 37,0 | 37,4 | 37,8 | 37,9 | 37,5 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 36,3 |      |
| 21          | 51700 | 36,5 | 36,4 | 36,8 | 36,7 | 37,2 | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 36,4 | 36,9 | 36,2 | 36,7 |

Съ 22 по 51 день болезни (день выписка) температура при двухчасовомъ измѣреніи колебалась между 36,0 и 37,1° Ц. и лишь на 44 день въ 8 часовъ вечера одинъ разъ была 37,2° Ц. Ходъ вѣса тѣла за это время былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 51600 (22) | 51000 | 51200 | 51400 | 51300 | 51100 | 51000 | 51000 | 50700 | 51000 |
| 51000 (32) | 51000 | 51700 | 51700 | 52400 | 52400 | 52900 | 54000 | 54400 | 54400 |
| 54800 (42) | 55000 | 55200 | 56100 | 55800 | 55700 | 55600 | 56900 | 57000 | 57000 |

Объективными же явления измѣнялись такъ: поносъ по 2—3 раза

держался до 23 дня болезни; съ 24 до 34 дня испражнение было ввидѣ густой кашицы; съ 35 и до 41 испражнение было оформлено, желтое, а съ вечера 41 и до 51 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2600 до 5200 к. с., при уд. вѣсѣ 1,008—1,005, безъ бѣлка. Чаю большой выпивалъ по 1600—4400 к. с. въ сутки. Тифозное состояние исчезло на 19 день болезни, съ этого же дня перестала прощупываться печень. Явления ларингита исчезли на 22 день болезни. На 25 день исчезли свисты въ груди. Съ 19 до 31 дня было головокружение. Языкъ очистился къ 33 дню. Селезенка перестала прощупываться съ 35 дня. При выпискѣ на 51 день болезни изменений со стороны внутренних органовъ не замѣчалось.

№ 17. № пр. журн. 3457. Крестьянинъ Б—въ, 19 летъ, поступилъ 26/IV 93 г. на 7 день болезни, жалуюсь на головную боль, отсутствие аппетита.

St. pr. Хорошаго телосложения: Порядочнаго питания. Небольшое тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди изменений не замѣтно. Верхнія границы тупости печени и селезенки не изменены. Печень прощупать не удается. Селезенка твердая, прощупывается почти на 1 палецъ. Ходъ температуры и вѣса до 18 дня болезни такой:

Т-ра утр. 39,0 39,0 38,6 38,3 38,7 38,2 38,7 38,7 38,3  
вѣч. 40,1 39,7 39,8 39,8 39,1 39,1 38,9 39,2 39,2  
утр. 38,3 38,2 37,0  
вѣч. 39,2 38,8 38,3 2 ванны 28° въ сутки.  
Вѣсь тѣла: 48900—48100—48600—47500—47300—46900—  
46700—46700—45900—46200—45600.

Объективными явления за это время шли такъ: ступь по 1—3 р. въ сутки жидко; мочи 600—2800 к. с.; уд. вѣса 1,024—1,009, съ бѣлкомъ: до 11 порядочно, до 16 незначит. количество и до 18 слѣды; р. по Эрлиху до 14. Позывъ на ишу на 12 день. Тифозное состояние исчезло на 18 день. Головная боль уменьшалась. Пищею было молоко: на 7 день 1000 к. с.; съ 8 до 14 дня 1800 к. с., а съ 15 до 19 дня 2400 к. с. Съ 19 дня начало изменение температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болзн. | Вѣсь. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 19          | 45100 | 37,1 | —    | —    | 37,3 | 37,4 | 38,1 | 38,2 | 37,2 | 37,5 | 37,8 | 37,6 | 37,0 |
| 20          | 44800 | 36,7 | 36,4 | 36,3 | 37,1 | 37,0 | 37,6 | 37,4 | 37,1 | 36,9 | 37,3 | 37,1 | 37,2 |
| 21          | 44600 | 37,0 | 37,5 | 36,8 | 37,1 | 36,7 | 37,1 | 37,0 | 36,6 | 37,4 | 37,5 | 37,0 | 36,4 |

Съ 22 до 45 дня болѣзни (день выписки) температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,1°C, и лишь на 22 день въ 8 часовъ вечера, а также на 40 день въ 2 часа дня=37,2°C. Ходъ вѣса тѣла за это время былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45000 (22) | 44700 | 45100 | 44900 | 44900 | 45200 | 45400 | 46100 |
| 45700 (30) | 46100 | 46100 | 46000 | 46300 | 46900 | 46700 | 47900 |
| 47300 (38) | 47900 | 48200 | 47800 | 48000 | 48000 | 48000 | 48600 |

Объективные же явленія измѣнились такъ: до 25 дня существовалъ поносъ по 2—3 р. въ сутки; съ 25 до 31 дня испражненіе ввидѣ густой кашицы; съ 31 до 39 дня испражненіе оформлено, желтое и съ 39 до 45 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2800 до 5000 к. с. при уд. вѣсѣ 1,006—1,005, безъ бѣлка. Селезенка, уменьшаясь, перестала прощупываться съ 21 дня болѣзни. Языкъ совершенно очистился къ 39 дню. При выпискѣ на 45 день болѣзни измѣнений со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 18. № пр. журн. 4311. Крестьянинъ Г—въ, 20 лѣтъ, поступилъ 19/V 93 г. на 10 день болѣзни, жалуюсь на головную боль, слабость.

St. pr. Высокаго роста. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Со стороны органовъ груди измѣнений не замѣтно. Верхняя граница тупости печени не измѣнена. Печень не прощупывается. Селезеночная тупость съ 8 ребра. Прощупывается край селезенки. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 21 дня болѣзни таковы:

|            |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Т-ра       | утр. | 38,9  | 38,8   | 37,5   | 38,3   | 38,4   | 37,8   | 37,8   | 37,0   | 37,3   | 36,7   | 37,0   |
| вѣсъ тѣла: | веч. | 39,1  | 39,7   | 39,6   | 39,1   | 39,4   | 39,2   | 38,8   | 39,0   | 38,1   | 38,1   | 37,6   |
|            |      | 65300 | —65200 | —64500 | —63900 | —63700 | —63100 | —63300 | —63100 | —63100 | —63100 | —63100 |

Получалъ все это время 1 ванну 28°R. вечеромъ. Объективно наблюдалось: стулъ по 1 р. жидко; мочи 700—3500 к.с., уд. вѣса 1,020—1,006, со следами бѣлка до 18 дня болѣзни; р. по Эрлиху до 13 дня. Селезенка перестала прощупываться съ 16 дня. Тифозное состояніе исчезло на 18 день болѣзни. Пищью до 12 дня было 1000 к.с. молока, съ 13 до 18 дня—1800 к.с. молока, а съ 19 до 23 дня—бульонъ, 1 манная каша, 1600 к.с. молока. Головная боль держалась до 19 дня. Съ 22 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзни. | Вѣсѣ. | 8    | 10 | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22            | 62700 | 36,7 | —  | 37,1 | 37,2 | 37,0 | 37,3 | 37,6 | 37,4 | 37,0 | 36,8 | 36,7 | 36,8 |

Съ 23 же до 48 дня (день выписки) температура колебалась при двухчасовомъ ея измѣреніи между 36,0—37,3°C. Ходъ же вѣса тѣла за это время такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 61800 (23) | 62200 | 62300 | 62700 | 62570 | 61800 | 62600 | 62800 | 63300 |
| 63700 (32) | 63500 | 63900 | 63900 | 64500 | 63800 | 64100 | 64500 | 64100 |
| 64300 (41) | 64500 | 64600 | 64000 | 64000 | 64200 | 64900 | 65500 |       |

Объективные же явленія измѣнились такъ: съ 22 и до 29 испражненіе было оформлено, на 31 день кашцеобразно; съ 32 и до 37 снова стало жидкимъ, на 38—39 дни опять ввидѣ густой кашицы, а съ 40 до 48 дня снова оформлено. Количество мочи колебалось отъ 3700 до 5600 к. с., при уд. вѣсѣ 1,010—1,005, безъ бѣлка. Чаю большой выпивалъ по 3200—4800 к.с. въ сутки. Головокруженіе держалось до 35 дня. Языкъ совершенно очистился къ 41 дню. При выпискѣ на 48 день болѣзни измѣнений со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 19. № пр. журн. 4620. Крестьянинъ С—въ, 20 лѣтъ, поступилъ 29/V 93 г. на 4 (?) день болѣзни, жалуюсь на головную боль, отсутствіе аппетита.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только отдѣльные высокие вѣсы сады. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 22 дня болѣзни такой:

|            |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Т-ра       | утр.       | 38,6  | 38,6   | 39,4   | 39,2   | 39,1   | 39,0   | 38,2   | 38,6   | 37,5   | 38,2   |
| вѣсъ тѣла: | веч.       | 39,4  | 40,2   | 39,6   | 40,1   | 40,3   | 39,7   | 39,2   | 38,7   | 39,3   | 39,4   |
|            | утр.       | 38,0  | 38,3   | 37,5   | 37,7   | 36,8   | 37,3   | 36,5   | 36,7   | 37,2   |        |
|            | веч.       | 38,8  | 39,1   | 39,3   | 39,8   | 38,5   | 38,5   | 38,9   | 38,3   | 38,0   |        |
|            | вѣсъ тѣла: | 58600 | —57300 | —57000 | —56700 | —55300 | —54800 | —54200 | —54200 | —54200 | —54200 |
|            |            | 54200 | —53700 | —53400 | —53100 | —53500 | —52200 | —52000 | —52000 | —52000 | —52000 |
|            |            | 52200 | —51700 | —51800 |        |        |        |        |        |        |        |

Пищью было молоко: на 4 и 5 дни по 1000 к.с., а съ 6 до 22 дня 2200 к.с. До 13-го дня получалъ по 2 ванны 28°R. а съ 13 по 22 день по 1 ваннѣ 28°R. вечеромъ. Объективные же явленія были таковы: стулъ по 1—3 р. въ сутки жидко; мочи 600—2000 к.с., уд. вѣса 1,020—1,007, съ незначит. количествомъ бѣлка до 13 дня, а затѣмъ до 21 бѣлка въ мочѣ сады; р. по Эрлиху положительная до 15 дня. Отъ 7 до 9 дня были розовыя на груди. Съ 9 до 14 дня прощупывался край селезенки. На 17 день уже не было тифознаго состоянія. Позывъ на пищу съ

12-го дня. Съ 20 дня головная боль замѣнилась головокруженіемъ. Съ 23 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | Вѣсь. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23           | 51300 | 36,5 | —    | —    | —    | 37,2 | 38,0 | 38,0 | 37,3 | 37,1 | 37,2 | 36,8 |      |
| 24           | 51500 | 36,7 | 36,4 | 36,7 | 36,5 | 36,9 | 36,8 | 37,3 | 37,2 | 36,8 | 36,6 | 36,5 | 36,2 |

Съ 25-го же и до 43-го дня (день выписки) температура колебалась между 36,0—37,1° Ц. при двухчасовомъ ея измѣреніи и лишь на 23 день въ 6 часовъ вечера одиъ разъ=37,4° Ц. Ходъ же вѣса тѣла за это время былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 51500 (25) | 51900 | 52300 | 53200 | 53100 | 53000 | 53100 | 53400 | 53300 |
| 55200 (34) | 55500 | 55700 | 55200 | 56900 | 57100 | 57400 | 58000 | 58800 |

Объективныя же явленія измѣнялись такъ: стулъ жидко до 26 дня, на 28 и 29 испраженіе видѣтъ густой кашицы; съ 30 до 40 дня испраженіе оформлено, желтое, а съ 40 и до 43 оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи отъ 3300 до 5800 к. с., уд. вѣса 1,009—1,005, безъ бѣлка. Чаю большой выпивать по 2400—4800 к. с. въ сутки. Съ 27 дня не было ни головокруженія, ни свистовъ въ груди. Съ 39-го дня языкъ былъ чистъ. При выпискѣ на 43 день болѣзни вѣсъ тѣла равнялся 59000 грам., а со стороны внутреннихъ органовъ измѣненій не замѣчалось.

№ 20. № пр. журн. 4960. Крестьянинъ Ф—въ, 20 лѣтъ поступилъ 9/VI 93 г. на 9 день болѣзни, жалуясь на общую слабость и головную боль.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія. Подкожный жирный слой развитъ слабо. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. На кожѣ туловища розеола въ небольшомъ количествѣ. Со стороны органовъ груди только кое-гдѣ отдѣльные высокіе свисты и среднепузырчатые хрипы. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Печень не прощупывается. Селезенка прощупывается на 1 палецъ, тверда, болѣзненна. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 18-го дня болѣзни такой:

Т-ра утр. 38,6 38,8 38,4 38,2 38,3 38,3 37,8 37,4 37,0 36,5  
веч. 39,8 38,8 38,8 39,5 39,8 38,9 39,2 38,5 38,4 37,5  
Вѣсъ тѣла: 44000—44000—43800—43700—42500—42300—42000—41500—41000

Пищу за это время было молоко: на 9 день 1000 к. с., а затѣмъ до 21 дня болѣзни 2200 к. с. Объективныя явленія до 18 дня таковы: стулъ жидко отъ 1 до 5 р. въ сутки; мочи 600—1500 к. с., уд. вѣса 1,013—1,009 безъ бѣлка, р. по Эриху отрицательна. Розеола держалась до 13-го дня. На 12--14 дни было сильное тифозное состояніе. На 18 день исчезло тифозное состояніе; свистовъ и хриповъ въ груди почти не выслушивалось. На 18 день въ 10 часовъ вечера температура=38,8° Ц. Съ 19 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такъ:

| День болѣзн. | Вѣсь. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 19           | 41500 | 36,7 | —    | —    | —    | 37,8 | 38,6 | 38,2 | 37,4 | 37,3 | 36,4 | 36,7 |      |
| 20           | 40400 | 36,2 | 36,0 | 36,3 | 37,0 | 36,9 | 38,3 | 38,4 | 38,0 | 37,0 | 36,4 | 37,0 | 36,4 |
| 21           | 40600 | 36,3 | 36,4 | 36,8 | 36,8 | 37,1 | 37,3 | 37,9 | 37,2 | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 36,7 |

Съ 22 до 44 (день выписки) температура при двухчасовомъ измѣреніи колебалась между 36,0—37,3° Ц. Ходъ вѣса тѣла за это время былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 40700 (22) | 41200 | 40900 | 41100 | 41100 | 41000 | 40500 | 40500 |
| 41200 (30) | 41300 | 41000 | 41200 | 41900 | 41800 | 42300 | 41700 |
| 41900 (38) | 42600 | 42800 | 41000 | 44500 | 44100 | 44500 |       |

Объективныя явленія измѣнялись такъ: до 26 дня поносъ по 1—3 р. въ сутки, съ 27 до 34 дня испраженіе было видѣтъ густой кашицы; съ 35 до 38 испраженіе оформлено, желтое, а съ 39 и до 44 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 1700—4700 к. с., при уд. вѣсѣ 1,012—1,005, безъ бѣлка. Чаю большой выпивалъ по 800—3200 к. с. въ сутки. Съ 19-го дня не было болезненности селезенки, ни свистовъ, ни хриповъ въ груди; проща головная боль. Селезенка, постепенно уменьшалась, не прощупывалась уже съ 40 дня. Съ этого же дня языкъ оставался чистымъ. При выпискѣ на 44 день измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 21. № пр. журн. 6446. Крестьянинъ Х-въ, 27 лѣтъ поступилъ 29/VI 93 г. на 6 день болѣзни, жалуясь на головную боль и общую слабость.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ

груди только высокие и низкие свисты в небольшом количестве. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измениена. Печень не прощупывается. Прощупывается край селезенки. Ходь температуры и веса тела до 22 дня болезни такой:

|      |       |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| утр. | 39,0  | 38,5                                       | 39,2 | 39,2 | 38,6 | 38,3 | 38,0 | 38,0 | 37,0 | 37,4 | 37,0 | 37,6 |      |
| Т-ра | веч.  | 39,6                                       | 38,7 | 39,8 | 39,5 | 39,2 | 38,9 | 38,6 | 38,6 | 38,5 | 38,1 | 39,1 | 38,8 |
|      | утр.  | 37,2                                       | 36,5 | 36,9 | 36,5 | 37,8 |      |      |      |      |      |      |      |
|      | веч.  | 38,4                                       | 38,6 | 38,7 | 38,1 | 37,7 |      |      |      |      |      |      |      |
| Весь | Т-ра: | 67500—67000—67500—67400—66400—65700—65200— |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |       | 65100—64800—64100—64000—63700.             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Ежедневно делалась 1 ванна 28°R вечером. Пищью было молоко: до 10-го дня 1000 к. с., а затем до 26 дня 1800 к. с.. Объективные явления до 22 дня таковы: стул 1—4 р. в сутки жидко; мочи 400—3200 к. с., уд. веса 1,023—1,007, белка незначит. количество до 12 дня, с 13 до 19 следы, но не постоянно. С 12 дня селезенка прощупывалась на 1/2 пальца. Тифозное состояние держалось до 18 дня. Свисты в груди до 22 дня. Головной боли не было с 20 дня. Температура в 10 часов вечера 22 = 38,4°С. С 23 дня начато изменение температуры чрез 2 часа и ходь ей был такой:

| День бол-ни. | Весь. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23           | 63300 | 36,7 | —    | —    | —    | 37,1 | 37,8 | 38,2 | 37,9 | 37,3 | 36,4 | 36,6 |      |
| 24           | 63000 | 36,2 | 36,3 | 36,2 | 36,9 | 36,4 | 36,5 | 37,4 | 37,6 | 37,4 | 37,8 | 36,8 | 36,3 |
| 25           | 63200 | 36,3 | 36,1 | 36,3 | 36,7 | 36,8 | 37,0 | 36,8 | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 36,4 | 36,2 |
| 26           | 63400 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,0 | 36,3 | 36,5 | 37,5 | 37,7 | 36,8 | 36,7 | —    |

С 27 до 45 дня (день выписки) температура колебалась при двухчасовом ее изменении между 36,0—37,2°С. и лишь один раз на 37 день болезни в 4 часа дня равнялась 37,5°С. Ходь веса тела за это время такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 63600 (27) | 63300 | 63500 | 63100 | 64200 | 64300 | 64900 | 64100 | 64900 |
| 65600 (36) | 65900 | 65400 | 66100 | 66800 | 66800 | 67300 | 67800 |       |

Объективными же явлениями изменялись так: до 24 дня иносью по 1 разу в сутки; с 27 до утра 32 испражнение видят густой кашицы; с вечера 32 до 43 дня испражнение оформлено. Количество мочи колебалось от 3000 до 5300 к. с., при уд. весе 1,008—1,005, без белка. Селезенка перестала прощупываться

с 28 дня. Язык очистился к 39 дню. Чаю больной выпивал по 3200—4400 к. с. в сутки. При выписке на 43 день изменений со стороны внутренних органов не замечалось.

№ 22. № пр. журн. 9156. Крестьянин М—в, 14 лет, поступил 12/XI 92 г. на 11 день болезни, жалуются на головную боль и слабость.

St. pr. Хорошего телосложения и питания. Небольшое тифозное состояние. Обложенный язык. На коже туловища бледные розеола в небольшом количестве. Со стороны органов груди изменений не замечено. Селезеночная тупость сверху с 8 ребра. Верхняя граница тупости печени не изменена. Прощупывается край печени, а селезенка на 1 палец, тверда, чувствительна. Ходь температуры и веса тела до 25 дня таковы:

|      |       |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| утр. | 38,4  | 39,0                                       | 39,0 | 38,6 | 39,0 | 38,2 | 39,3 | 38,8 | 38,9 | 38,0 | 38,2 |
| Т-ра | веч.  | 39,7                                       | 39,8 | 39,5 | 39,1 | 39,5 | 39,8 | 39,6 | 39,2 | 39,3 | 39,2 |
|      | утр.  | 37,9                                       | 36,5 | 36,9 | 36,7 |      |      |      |      |      |      |
|      | веч.  | 39,5                                       | 39,1 | 38,7 | 38,0 |      |      |      |      |      |      |
| Весь | Т-ра: | 34800—34300—34100—33500—33200—33000—32700— |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |       | 32400—32400—32300—32300—32000—32400.       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Ежедневно делалось 2 ванны 28°R. Пищью было молоко: на 11 и 12 дни по 600 к. с., с 13 до 21 дня 1700 к. с., а с 22 до 25 дня получал еще бульон и кисель. Объективные явления были таковы: стул до 24 дня по 1—2 р. жидко; мочи 600—1800 к. с., уд. веса 1,020—1,007, без белка. Розеола держались до 13 дня. Селезенка была чувствительна до 18 дня. Тифозное состояние держалось до 22 дня. С 26 дня было начато изменение температуры чрез два часа. Колебания ее были между 36,0 и 37,0°С. и только в 8 часов вечера 26 дня она достигла 37,2°С. Ходь веса тела с 26 до 41 дня (день выписки) был такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 32200 (26) | 32200 | 32200 | 32600 | 32200 | 32000 | 32400 | 32600 |
| 32900 (34) | 33200 | 33900 | 34400 | 34400 | 34700 | 34900 | 35200 |

Объективные явления изменялись так: испражнение, сдвинувшись кашнеобразным на 25 день болезни, оставалось таковым до 28 дня; а с 29 до 41 было оформлено. Количество мочи колебалось от 2800 до 3500 к. с., при уд. весе 1,008—1,005, без белка. Край печени перестал прощупываться с 27 дня, а селезенка не прощупывалась с 32 дня. Язык оставался чистым

сь 36 дня. При выпискѣ на 41 день болѣзни измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 23 № пр. журн. 6630. Крестьянинъ Р.—въ, 16 лѣтъ, поступилъ 25/VI 93 г. на 8 день болѣзни, жалуюсь на головную боль и общее недомоганіе.

St. рг. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Со стороны органовъ груди только разбросанные въ порядочномъ количествѣ высокіе свисты и среднеузырчатые хрипы. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 26 дня болѣзни таковы:

|      |            |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|------|------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| Т-ра | утр.       | 38,5  | 39,6 | 39,5  | 39,4 | 39,4  | 39,3 | 39,0  | 38,5 | 37,8  | 38,2 | 37,6  | 39,0 | 38,5  | 38,6 |
|      | веч.       | 40,0  | 40,4 | 39,8  | 39,8 | 40,4  | 40,0 | 39,4  | 39,6 | 39,0  | 38,8 | 39,1  | 39,3 | 39,0  | 39,4 |
|      | утр.       | 38,3  | 39,4 | 38,5  | 37,9 | 37,9  |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|      | веч.       | 39,3  | 39,3 | 39,3  | 38,8 | 38,3  |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|      | Вѣсъ тѣла: | 40900 | —    | 40800 | —    | 40200 | —    | 39800 | —    | 39600 | —    | 39400 | —    | 38100 | —    |
|      |            | 38100 | —    | 37700 | —    | 37100 | —    | 36800 | —    | 36300 | —    | 36100 | —    | 35500 | —    |
|      |            | 35500 | —    | 35300 | —    | 35000 | —    | 34500 |      |       |      |       |      |       |      |

До 18 дня дѣлалось по 3 ванны 28°R. въ сутки, а затѣмъ по 2 ванны 28°R. Пищею было молоко: на 8 день 1000 к. с., а затѣмъ до 30-го дня 2200 к. с. Объективная явленія до 26 дня были: стулъ отъ 1 до 5 разъ въ сутки жидко; мочи 300—1900 к. с., уд. вѣса 1,030—1,008 съ незначительнымъ количествомъ бѣлка до 24 дня, а на 25 и 26 дня бѣлка были слѣды; р. по Франку положительная до 20 дня. На 11—14 день было сильное тифозное состояніе съ бредомъ. Съ 14 дня стала прощупываться селезенка и съ 15 дня выдавалась на 1 палецъ, твердая и болѣзненна. Болѣзненность ея держалась до 19 дня. Съ 18 дня стало уменьшаться тифозное состояніе и исчезло на 26 день. Съ 19 дня въ груди выслушивались только высокіе свисты и то когдѣ. Съ 26 дня начало измѣненіе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзни. | Вѣс.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 27            | 34500 | 37,1 | —    | —    | —    | —    | —    | 37,7 | 38,1 | 38,2 | 37,3 | 37,0 | 37,3 |
| 28            | 34200 | 36,3 | 36,5 | 36,4 | 37,1 | 36,3 | 37,0 | 36,9 | 37,0 | 36,8 | 36,6 | 36,5 | 36,3 |

Съ 29 до 47 дня температура при двухчасовомъ ея измѣненіи колебалась между 36,0—37,3°С., а съ 48 до 65 дня между 36,0—36,8°С. Ходъ вѣса тѣла до 65 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 34300 (29) | 34000 | 34200 | 34300 | 34400 | 34500 | 34800 | 34700 | 34900 |
| 34800 (38) | 35100 | 35400 | 35200 | 35100 | 35300 | 36000 | 36500 | 36800 |
| 36900 (47) | 37600 | 39000 | 37800 | 38100 | 38600 | 38700 | 38800 | 39700 |
| 39600 (56) | 39100 | 39300 | 38900 | 38900 | 39400 | 39200 | 39500 | 39500 |

Объективная же явленія измѣнялись такъ: до 30 дня стулъ по 1 р. въ сутки жидко; съ 31 до 42 дня испражненіе ввидѣ густой кашицы; съ 43 до 46 дня испражненіе оформлено, желтое, а съ 46 до 65 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2800 до 5500 к. с., при уд. вѣсѣ 1,008—1,005, безъ бѣлка. Чаю большой выпивалъ по 2400—4000 к. с. въ сутки. На 27 день исчезли свисты въ груди. Селезенка перестала прощупываться съ 29 дня. Языкъ совершенно очистился на 61 день. При выпискѣ на 65 день болѣзни вѣсъ тѣла=40000 граммъ, а со стороны внутреннихъ органовъ измѣненій не замѣчалось.

№ 24. № пр. журн. 9238. Крестьянинъ Ч.—въ, 17 лѣтъ, поступилъ 15/XI 92 г. на 9 день болѣзни, жалуюсь на головную боль, поносъ.

St. рг. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Порядочное тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только отдѣльные среднеузырчатые хрипы подъ углами лопатокъ. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Печень и селезенка прощупываются на 1 палецъ. Селезенка болѣзненна. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 23 дня болѣзни таковы:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Т-ра | утр. | 39,1 | 39,2 | 39,2 | 39,4 | 39,2 | 38,5 | 38,5 | 38,3 | 38,4 | 38,2 | 36,8 |
|      | веч. | 40,2 | 39,9 | 39,9 | 39,6 | 39,5 | 39,4 | 39,6 | 39,4 | 39,5 | 38,8 | 38,0 |
|      | утр. | 38,0 | 36,9 | 37,6 | 37,2 |      |      |      |      |      |      |      |
|      | веч. | 38,3 | 38,8 | 38,3 | 38,0 |      |      |      |      |      |      |      |

Вѣсъ тѣла: 57400—56800—56800—56100—55100—55000—54600—53800—53400—53600—52900—52500—52100.

Ежедневно дѣлалось по 2 ванны 28°R. Пищею было молоко: на 9 и 10 дни 1000 к. с., на 11—18 дни 1700 к. с., на 19—22 дни 1600 к. с. и кашель, а на 23 день давъ еще бульонъ. Объективные явленія до 23 дня были: стулъ 1—2 р. жидко; мочи 600—3300 к. с., уд. вѣса 1,025—1,005, безъ бѣлка. На 11 день болѣзни исчезли хрипы въ груди. Съ 11 до 22 дня селезенка прощупывалась почти на 2 пальца, а съ 22 дня на 1 палецъ; болѣзненность ея была до 18 дня. Съ 17 дня прощупывался край печени. Съ 22 дня не было тифознаго состоянія.

Съ 24 дня начато измерение температуры чрезъ два часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзни. | Вѣск. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 24            | 52400 | 37,3 | —    | 37,0 | 37,2 | 37,0 | 37,6 | 37,7 | 37,2 | 37,2 | 37,4 | 37,2 | 37,2 |
| 25            | 52500 | 37,0 | 36,9 | 37,2 | 37,2 | 37,4 | 37,7 | 38,0 | 37,9 | 37,0 | 36,4 | 37,0 | 37,0 |
| 26            | 52400 | 36,8 | 36,9 | 37,2 | 37,1 | 37,1 | 37,2 | 37,5 | 37,4 | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 36,3 |
| 27            | 52000 | 36,6 | 36,7 | 37,0 | 36,8 | 37,2 | 37,3 | 37,2 | 37,9 | 38,0 | 38,4 | 37,2 | 36,6 |

Съ 28 до 46 дня (день выписки) температура при двухчасовомъ ея измереніи колебалась между 36,0—37,2 и только на 39 день въ 4 часа дня, а также на 42-й день въ 2 часа ночи равнялась 37,3°Ц. Ходъ вѣса тѣла за это время такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52000 (28) | 52600 | 53200 | 52000 | 52600 | 52800 | 52700 | 52700 | 53600 |
| 53700 (37) | 53900 | 53800 | 53400 | 53900 | 54800 | 54600 | 54600 | 55700 |

Объективныя же явленія шли такъ: до 25 дня стулъ жидко; съ вечера 25 до утра 32 дня кашцеобразное испражненіе; съ вечера же 32 и до 46 дня испражненіе оформлено. Количество мочи колебалось отъ 3200 до 4600 к. с., уд. вѣсъ ея 1,008—1,005, безъ бѣлка. Печень не прощупывалась съ 24, селезенка съ 35 дня. Языкъ совершенно очистился къ 41 дню. При выпискѣ на 46 день вѣсъ=55900 граммъ, а со стороны внутреннихъ органовъ измѣненій не замѣчалось.

№ 25. № пр. журн. 5846. Крестьянинъ Фл.—въ, 17 лѣтъ, поступилъ 8/VI 93 г. на 9 день болѣзни, жалуюсь на головную боль и отсутствіе аппетита.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Ни печень, ни селезенку прощупать не удастся. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 26 дня болѣзни таковы:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Т-ра | утр. | 38,6 | 38,2 | 38,0 | 37,9 | 37,9 | 37,8 | 38,1 | 38,8 | 38,4 | 37,8 |
|      | веч. | 39,0 | 39,4 | 39,1 | 39,2 | 39,0 | 38,9 | 39,4 | 39,2 | 39,6 | 39,6 |
|      | утр. | 38,2 | 37,2 | 38,0 | 38,1 | 37,7 | 39,6 | 36,3 | 37,3 |      |      |
|      | веч. | 39,4 | 39,2 | 39,7 | 39,2 | 38,9 | 38,2 | 38,7 | 37,5 |      |      |

Вѣсъ тѣла: 52000—51400—51300—50400—50000—49500—49000—48300—48800—47700—47200—47200—47200.

Ежедневно дѣлалась одна ванна 28°R. вечеромъ. Пищью было молоко: до 13 дня по 1000 к. с., съ 14 до 24 дня 1800 к. с., на 24—26 была данъ еще бульонъ. Объективныя явленія были таковы: стулъ по 1—3 р. въ сутки, жидко; мочи 600—2000 к. с., уд. вѣса 1,024—1,007 безъ бѣлка; р. по Франку отрицательная. На 21 день не было уже головной боли, а только головокруженіе. Съ 22 дня не было тифознаго состоянія и появился аппетитъ. Температура въ 8 часовъ вечера 26 дня была 38°Ц. Съ 27 до 47 дня болѣзни температура при двухчасовомъ ея измереніи колебалась между 36—37,2°Ц., достигнувъ лишь однажды—въ 8 часовъ вечера 27 дня 37,4°Ц. Ходъ вѣса тѣла до 47 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 47000 (27) | 46800 | 46900 | 47000 | 47200 | 47500 | 47400 | 47300 | 47900 | 48300 |
| 48300 (37) | 49100 | 50100 | 50200 | 50700 | 52000 | 52400 | 53200 | 53400 | 53900 |

Объективныя же явленія были: ставшее съ 25 дня испражненіе кашцеобразнымъ, было таковымъ до 27 дня включительно; съ 28 до 40 дня испражненіе оформлено, желтое, а съ 40 дня до 47 оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи отъ 2800 до 5200 к. с. при уд. вѣсѣ 1,010—1,005 безъ бѣлка. Головокруженіе держалось до 31 дня. Языкъ оставался чистымъ съ 45 дня. При выпискѣ на 47 день вѣсъ тѣла равнялся 54300 грам., а со стороны внутреннихъ органовъ измѣненій не замѣчалось.

№ 26. № пр. журн. 603. Крестьянинъ Б.—въ, 17 лѣтъ, поступилъ 22/VI 93 г. на 8 день болѣзни, жалуюсь на головную боль и поносъ.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія. Порядочнаго питанія. Порядочное тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Искьсколы розездъ на кождъ груди. Со стороны органовъ груди только кое-гдѣ отдѣльные высокіе свисты. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнены. Печень и селезенку прощупываются на 1 палець. Селезенка слегка болѣзненна. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 46 дня болѣзни таковы:

|      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Т-ра | утр. | 39,3 | 39,8 | 38,7 | 39,6 | 39,3            | 39,6 | 39,3 | 39,0 | 39,0 | 38,6 | 39,0 | 39,3 | 39,0 | 38,3 |
|      | веч. | 39,0 | 39,8 | 39,5 | 39,7 | 39,3            | 40,0 | 38,2 | 39,2 | 39,3 | 38,8 | 39,7 | 39,7 | 39,5 | 39,2 |
|      | утр. | 39,5 | 38,4 | 38,3 | 39,3 | (25 д. болѣзни) | 38,4 | 37,9 | 38,0 | 38,0 | 38,5 | 38,6 | 38,7 |      |      |
|      | веч. | 39,4 | 39,2 | 39   | 39,0 | »               | »    | »    | 38,8 | 39,0 | 37,8 | 39,2 | 40,3 | 39,3 | 39,3 |

утр. 39,2 39,2 38,2 38,2 38,0 38,6 38,3 37,8 38,4 38,3 37,7 37,7 37,4 37,3

веч. 40,4 39,0 39,3 39,5 39,0 38,6 38,2 39,2 38,6 39,3 38,4 38,0 38,2 37,1

Весь г/ла.

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 48300 (9)  | 47600 | 47000 | 46200 | 46400 | 47200 | 46800 | 46300 | 46000 | 45300 |
| 45400 (19) | 44800 | 44700 | 44300 | 44200 | 43800 | 43300 | 43200 | 42900 | 43200 |
| 42700 (29) | 42500 | 42800 | 41900 | 41800 | 41900 | 42300 | 41900 | 41300 | 41400 |
| 41500 (39) | 41400 | 40900 | 41000 | 40900 | 40900 | 40500 | 40700 |       |       |

Объективная же явления шли так: стул 1—4 р. в сутки, жидко; мочи 300—2200 к. с., уд. веса 1,026—1,009, сь незначительным количеством б/лка до 23 дня; на 24, 25, а также сь 31 до 40 дня б/лка в мочѣ были слѣды; вь остальные же дни его не было; р. по Эрлиху была положительною до 23 дня. Розеола держалась до 10 дня. Тифозное состояние до 39. Сыпсты вь груди до 41. Сь 14 дня селезенка была безоблѣзненна, прощувалась почти на 2 пальца. Печень, постепенно уменьшаясь, не прощувалась сь 45 дня. Пашчо было молоко: до 17 дня 1800 к. с., сь 18 до 34 2300 к. с.; сь 35 до 46 получалъ бульонъ, 2 яйца, 1800 к. с. молока. Ежедневно до 42 дня дѣлалось 2 ванны 28°R., а затѣмь по одной вечером. Сь 47 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | Весь. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 47           | 40200 | 36,4 | —    | 36,9 | 37,1 | 37,2 | 37,1 | 37,5 | 37,7 | 37,5 | 37,4 | 37,0 | 36,4 |
| 48           | 40900 | 36,7 | 36,8 | 37,3 | 37,5 | 37,2 | 37,3 | 37,4 | 37,1 | 37,6 | 37,4 | 37,1 | 37,1 |
| 49           | 40400 | 37,2 | 36,8 | 37,1 | 37,1 | 37,4 | 37,4 | 37,2 | 37,3 | 37,5 | 37,0 | 36,9 | 36,7 |

Сь 50 до 72 дня (день выписки) температура колебалась при двухчасовомъ ея измѣреніи между 36,1—37,4°Ц. и лишь на 51 и 55 дни вь 8 часовъ вечера достигла два раза 37,5°Ц. Ходъ веса за это время былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 40900 (50) | 41200 | 41900 | 42000 | 42400 | 42300 | 42800 | 43500 |
| 43600 (58) | 43400 | 43100 | 43200 | 43200 | 43500 | 43500 | 43800 |
| 44300 (66) | 45000 | 44800 | 44500 | 45000 | 46000 | 46400 |       |

Объективныя явления шли такъ: до 49 дня стулъ былъ жидко; сь вечера 49 до утра 55 дня испражненіе видѣтъ густой кашки; вечеромъ 55 и утромъ 56 дня снова стулъ жидко; сь утра 57 до 68 дня снова видѣтъ густой кашки, а сь 69 дня уже оформлено. Количество мочи колебалось отъ 2800 до 5000 к. с., при уд. весе 1,007—1,005, безъ б/лка. Чаю больной выпивалъ по 2400—4000 к. с. вь сутки. Головокруженіе держалось до 57

дня. Селезенка, постепенно уменьшаясь, не прощувалась сь 68 дня. Языкъ оставался чистымъ сь 64 дня. При выпискѣ на 72 день болѣзнъ излѣненной со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 27. № пр. журн. 3395. Крестьянинъ В—нъ, 17 лѣтъ, поступилъ 25/IV 93 г. на 6 день болѣзни, жалуюсь на знобъ и головную боль.

St. pr. Хорошаго тѣлоложения и питанія. Сильное тифозное состояние. Обложеніе языка. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только кое-гдѣ высотіе сыпсты. Селезеночная тупость сь 8 ребра. Верхняя граница тупости печени не измѣнена. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры и веса г/ла до 22 дня таковы:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| утр. | 38,7 | 38,2 | 38,3 | 38,7 | 37,9 | 38,4 | 37,8 | 37,8 | 37,7 | 38,1 |
| веч. | 39,2 | 39,0 | 39,6 | 39,8 | 39,0 | 38,3 | 38,9 | 38,5 | 39,3 | 39,2 |
| утр. | 37,3 | 37,0 | 36,0 | 37,5 | 36,9 | 37,2 | 36,8 |      |      |      |
| веч. | 39,0 | 38,3 | 39,1 | 38,6 | 38,6 | 38,2 | 38,7 |      |      |      |

Весь г/ла: 37100—30800—37000—37500—36800—36700—36100—36400—36100—35100—35800—35700—34800—34700—34300.

До 14 дня болѣзни дѣлалось ежедневно двѣ ванны 28°R., а затѣмь до 22 дня по одной вечеромъ. Пашчо было молоко: на 6 и 7 дни 1000 к. с., а затѣмь 2200 к. с. Объективно наблюдалось: стул 1—2 р. вь сутки жидко; мочи 800—2200 к. с.; уд. веса 1,025—1,007, б/лка незначительное количество до 12 дня, а сь 12—16 дня слѣды; р. по Эрлиху положительна до 14 дня. Сь 12 дня стало уменьшаться тифозное состояние и къ 21 дню исчезло. Сь 18 дня сыпсты вь груди не выслушивались. Сь 23 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | Весь. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23           | 34300 | 36,5 | —    | —    | —    | —    | 37,6 | 38,3 | 38,5 | —    | —    | —    | —    |
| 24           | 34300 | 36,7 | 37,3 | 38,1 | 38,3 | 38,2 | 38,9 | 39,0 | 39,0 | 38,6 | 38,2 | 37,6 | 37,9 |
| 25           | 34200 | 37,3 | 37,9 | 37,9 | 38,0 | 38,6 | 38,1 | 38,8 | 39,0 | 38,5 | 37,9 | 37,0 | 36,3 |
| 26           | 34000 | 36,9 | 37,2 | 37,9 | 37,7 | 38,8 | 38,7 | 38,8 | 38,7 | 38,6 | 38,3 | 37,0 | 36,9 |
| 27           | 33700 | 36,8 | 36,8 | 37,1 | 37,3 | 37,9 | 38,3 | 38,9 | 38,5 | 37,5 | 38,0 | 37,6 | 37,5 |
| 28           | 33800 | 36,8 | 37,1 | 37,0 | 36,8 | 37,4 | 38,2 | 38,6 | 38,4 | 38,6 | 38,4 | 37,6 | 36,9 |
| 29           | 33700 | 36,4 | 36,5 | 36,9 | 36,4 | 37,6 | 37,9 | 38,7 | 38,3 | 38,4 | 38,2 | 37,3 | 36,4 |
| 30           | 33700 | 36,4 | 36,9 | 36,9 | 36,6 | 36,7 | 37,4 | 38,5 | 38,6 | 38,1 | 37,4 | 37,3 | 36,4 |
| 31           | 34500 | 36,4 | 36,3 | 36,6 | 36,6 | 36,7 | 37,4 | 38,5 | 38,6 | 38,1 | 37,4 | 37,1 | 36,6 |
| 32           | 33600 | 36,7 | 36,3 | 36,7 | 37,0 | 36,9 | 37,2 | 37,7 | 37,8 | 38,4 | 37,8 | 37,1 | 36,5 |
| 33           | 33500 | 36,5 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | 36,9 | 36,8 | 36,3 | 37,3 | 37,6 | 37,0 | 37,0 | 36,5 |
| 34           | 33700 | 36,5 | 36,7 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 37,2 | 37,1 | 37,2 | 37,0 | 36,9 | 36,8 | 36,4 |

Съ 35 до 52 дня температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,1°C. и лишь на 37 день въ 8 час. вечера одинъ разъ = 37,2°C. Ходъ же вѣса тѣла былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 33400 (35) | 33600 | 33800 | 33800 | 33800 | 33900 | 34200 | 34200 |       |
| 34200 (43) | 34700 | 35100 | 35900 | 37200 | 37500 | 38000 | 37900 | 38200 |

Объективные же явленія были: до 36 дня стулъ по 1 р. жидко; съ 36 до 39 испражненіе видѣтъ густой кашпцы; съ 39 до 43 половина была оформлена; а съ 43 до 52 дня испражненіе совершенно оформлено. Количество мочи колебалось отъ 2000 до 5000 к. с., при уд. вѣсѣ 1,007—1,005 безъ бѣлка. Съ 32 дня не было уже головной боли. Чаю большой выпивалъ по 2400—4900 к. с. въ сутки. Съ 48 дня языкъ оставался совершенно чистымъ. При выпискѣ на 52 день вѣса тѣла = 38500 грам., а со стороны внутреннихъ органовъ измѣній не замѣчалось.

№ 28. № пр. журн. 9437. Крестьянинъ Г—въ, 18 лѣтъ, поступилъ 22/XI 92 г. на 7 день болѣзни, жалуюсь на головную боль и знобъ.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣній не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнены. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 24 дня болѣзни таковы:

|     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Тра | утр. | 39,3 | 39,8 | 39,4 | 39,4 | 39,5 | 39,0 | 38,5 | 39,4 |
|     | веч. | 38,4 | 40,4 | 39,6 | 39,8 | 39,4 | 39,7 | 38,3 | 39,6 |
|     | утр. | 39,4 | 38,8 | 39,3 | 38,8 | 39,0 | 39,0 | 37,5 | 36,8 |
|     | веч. | 39,4 | 39,2 | 39,8 | 40,1 | 40,0 | 39,6 | 39,0 | 38,8 |

Вѣса тѣла: 53000—51600—50900—50300—49200—49000—49600—48900—48900—48800—48500—48000—47400—47200—46500—45900.

Съ 13 по 18 день дѣлалось 2 ванны 28°R., въ остальные же дни по одной. Пища молоко: на 7 и 8 день по 1000 к. с., а затѣмъ до 24 дня по 1700 к. с. Объективные явленія за это время были: стулъ по 1—3 раза, жидко, мочи 600—1800 к. с., уд. вѣса 1,025—1,007, безъ бѣлка. Съ 10 дня до 23 выслушивались когдѣ въ груди высокіе свисты. Съ 13 до 18 дня было порядочное тифозное состояніе. Съ 20 дня прощупывался край селезенки. На 24 день исчезло тифозное состояніе и головная боль. Съ 25 дня температура, измѣряемая чрезъ 2 часа, колебалась между 36,0—37,1°C. и только на 29 день въ 6 часовъ вечера, а также на 48

день въ 8 и 10 часовъ вечера = 37,2°C. Ходъ вѣса за это время былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45700 (25) | 45600 | 44800 | 44400 | 45000 | 45800 | 45800 | 46100 | 46800 |
| 46600 (34) | 46900 | 47900 | 47200 | 47000 | 46500 | 47800 | 47900 | 46800 |
| 46600 (43) | 47100 | 46900 | 47800 | 48300 | 49400 | 49400 | 49200 | 49300 |

Объективные же явленія измѣнялись такъ: съ 25 до 46 испражненіе видѣтъ густой кашпцы по 1—2 р. въ сутки; съ 46 до 52 оно оформлено. Количество мочи колебалось отъ 2700 до 4000 к. с., при уд. вѣсѣ 1,009—1,005, безъ бѣлка. Селезенка прощупывалась до 27 дня. Языкъ совершенно очистился къ 49 дню. Головокруженіе до 34 дня. При выпискѣ на 52 день болѣзни вѣса = 50100 грам., а со стороны внутреннихъ органовъ измѣній не замѣчалось.

№ 29. № пр. журн. 8767. Крестьянинъ Ж—въ, 18 лѣтъ, поступилъ 29/X 92 г., на 6 день болѣзни, жалуюсь на головную боль и общую слабость.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди лишь кое-гдѣ высокіе свисты. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнены. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 29 дня болѣзни таковы:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Т-ра | утр. | 40,0 | 40,6 | 40,4 | 40,2 | 39,3 | 39,6 | 38,8 | 39,0 | 39,6 | 39,8 | 39,8 | 39,6 | 39,8 | 39,2 |
|      | веч. | 40,2 | 40,8 | 40,4 | 39,5 | 39,6 | 39,6 | 39,4 | 40,0 | 40,2 | 39,8 | 39,9 | 39,7 | 39,8 | 39,8 |
|      | утр. | 39,7 | 39,6 | 39,0 | 39,0 | 38,9 | 38,9 | 38,7 | 38,6 | 38,0 | 37,5 |      |      |      |      |
|      | веч. | 39,7 | 40,0 | 39,0 | 39,3 | 38,9 | 39,8 | 39,0 | 38,6 | 38,7 | 38,2 |      |      |      |      |

Вѣса тѣла: 58700 (10)—58000—57400—57000—57200—57100—57400—57500—56000—55900—55900—55400—55500—54100—53900—53000—52600—52000—51800—51700.

До 20 дня дѣлалось ежедневно по 2 ванны 28°R., а затѣмъ по одной. Пищуе молоко: до 12 дня 1600 к. с., а затѣмъ 1700 к. с. Объективные явленія за это время таковы: стулъ 1—3 р. въ сутки, жидко; мочи 500—1600 к. с., уд. вѣса 1,025—1,012, бѣлка до 16 дня порядочно, съ 17 до 21 незначительное количество, на 22—23 слѣды; а затѣмъ бѣлка не было. Тифозное состояніе держалось до 29 дня; также и головная боль. Позывъ на пищу съ 12 дня. Съ 30 дня начало измѣренія температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болъзни. | Вѣс.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30            | 51500 | 37,5 | —    | 37,6 | 38,7 | 38,5 | 37,4 | 37,5 | 38,0 | 38,3 | 37,9 | 37,6 | 37,2 |
| 31            | 51500 | 37,3 | 36,5 | 36,8 | 36,9 | 37,6 | 38,2 | 37,7 | 37,4 | 37,6 | 37,2 | 37,3 | 37,2 |
| 32            | 51200 | 37,2 | 37,1 | 37,4 | 37,5 | 36,7 | 38,0 | 38,2 | 37,9 | 37,6 | 37,2 | 37,2 | 36,6 |
| 33            | 51300 | 36,8 | 36,9 | 36,7 | 37,5 | 37,5 | 37,9 | 37,5 | 37,9 | 37,6 | 36,9 | 37,0 | 36,8 |
| 34            | 51000 | 36,4 | 35,9 | 37,0 | 37,2 | 37,1 | 37,8 | 38,5 | 37,5 | 37,6 | 37,5 | 37,0 | 36,9 |
| 35            | 51300 | 36,7 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 37,6 | 37,8 | 38,7 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 36,8 | 36,2 |
| 36            | 51300 | 36,4 | 36,3 | 37,0 | 36,9 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 36,5 | 36,4 | 36,9 | 36,5 | 36,5 |

Съ 37 до 58 дня температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,1°Ц. и лишь на 44 день въ 10 и 12 часовъ вечера, а также на 50 день въ 2 часа дня равнялась 37,2°Ц. Ходъ вѣса тѣла былъ такъ я:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 51700 (37) | 51900 | 51800 | 51700 | 52700 | 52500 | 53100 | 52300 | 53000 | 53400 | 52800 |
| 53400 (48) | 53500 | 53700 | 54300 | 54300 | 54300 | 54000 | 53500 | 53600 | 54200 | 54600 |

Объективныя явленія шли такъ: на 30 день стулъ 1 р. жидко; съ 32 до 46 дня испражненіе ввидѣ густой кашицы, а съ 47 до 58 испражненіе на половину оформлено, на половину ввидѣ густой кашицы по 1—2 раза въ сутки. Количество мочи колебалось между 2300—4100 к. с., при уд. вѣсѣ 1,009—1,005, безъ бѣлка. Головокруженіе до 39 дня. Языкъ оставался чистымъ съ 51 дня. При выискѣхъ кромя не ввидѣ оформленнаго испражненія другихъ измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 30. № пр. журн. 10188. Крестьянинъ Б—въ, 18 лѣтъ, поступилъ 20/ХІІ 92 г. на 6 день болъзни, жагуясь на головную боль и ознобъ.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обожженный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Верхнія границы тулости печени и селезенки не измѣнены. Селезенка не прощупывается. Прощупывается край печени. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 23 дня болъзни таковы.

Т-ра

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| утр. | 38,6 | 39,0 | 39,6 | 39,2 | 39,7 | 39,7 | 39,8 | 39,0 | 39,3 | 39,3 | 39,2 | 39,5 | 37,5 | 39,3 |
| веч. | 39,5 | 40,5 | 40,3 | 40,7 | 40,4 | 40,4 | 39,9 | 39,6 | 39,8 | 39,3 | 40,0 | 40,8 | 39,4 | 40,4 |
| утр. | 39,2 | 39,0 | 39,2 | 36,8 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| веч. | 39,2 | 39,8 | 39,3 | 39,5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Вѣсъ тѣла: 71600—70600—70600—70000—69100—68400—67600—67100—66000—64700—64400—63700—63900—62900—62700—62400—61000.

До 17 дня дѣлались 2 ванны 28°R., а затѣмъ по одной. Пищю было молоко: на 6 день 1000 к. с., съ 7 по 17 день 1700 к. с., а съ 18 дня давъ еще и бульонъ. Объективныя явленія были: стулъ 1—3 раза въ сутки жидко; мочи 400—800 к. с., уд. вѣса 1,026—1,018, безъ бѣлка; р. по Эрлиху до 15 дня. Съ 9 по 15 день порядочное тифозное состояніе, а затѣмъ оно, уменьшаясь, исчезло на 23 день. Съ 8 по 10 день рвезоны. Съ 8 дня въ груди высунувались отдѣльныя высокія свисты. Печень прощупывалась до 22 дня. Съ 24 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болъзни. | Вѣс.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 24            | 60800 | 37,0 | —    | —    | 39,9 | 39,8 | 39,8 | 39,7 | 39,8 | 39,9 | 38,6 | 37,6 | 37,2 |
| 25            | 60700 | 36,4 | 37,2 | 39,0 | 39,8 | 40,0 | 39,8 | 38,4 | 38,3 | 37,5 | 37,3 | 37,7 | 37,8 |
| 26            | 60400 | 36,6 | 37,9 | 37,4 | 37,4 | 37,8 | 39,0 | 38,8 | 38,7 | 38,3 | 37,9 | 37,5 | 37,1 |
| 27            | 60000 | 37,4 | 37,0 | 37,3 | 37,6 | 38,4 | 39,0 | 39,2 | 38,6 | 38,2 | 37,6 | 37,7 | 37,6 |
| 28            | 59900 | 37,2 | 37,1 | 37,2 | 38,1 | 38,5 | 37,8 | 38,0 | 38,1 | 38,4 | 38,5 | 37,1 | 36,5 |
| 29            | 59200 | 37,2 | 36,8 | 36,5 | 37,8 | 38,1 | 38,6 | 38,5 | 38,5 | 38,3 | 38,2 | 37,6 | 37,4 |
| 30            | 59100 | 36,8 | 36,0 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 37,6 | 37,5 | 37,3 | 37,5 | 37,2 | 36,8 |      |
| 31            | 58600 | 36,4 | 36,0 | 36,3 | 37,0 | 37,0 | 37,2 | 37,2 | 37,4 | 37,5 | 37,1 | 36,2 | 36,8 |
| 32            | 58500 | 36,8 | 36,9 | 36,7 | 37,2 | 37,2 | 37,3 | 37,3 | 37,2 | 37,3 | 37,1 | 37,0 | 37,1 |
| 33            | 58100 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 37,0 | 37,1 | 37,2 | 37,4 | 37,6 | 37,2 | 37,0 | 36,7 | 36,1 |
| 34            | 58400 | 36,5 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 37,0 | 37,4 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 36,5 | 36,4 | 36,9 |

Съ 35 до 60 дня температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,3°Ц. Ходъ вѣса за это время былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 58700 (35) | 58900 | 58900 | 59100 | 59300 | 59700 | 60000 | 60000 | 59900 |
| 59900 (44) | 60000 | 60300 | 60500 | 60600 | 60800 | 60800 | 61000 | 61900 |
| 61200 (53) | 62200 | 61600 | 62300 | 63300 | 64300 | 63500 | 64000 |       |

Объективныя же явленія измѣнялись такъ: до 29 дня стулъ по 1—2 раза [въ сутки жидко, съ 30 до 56 дня испражненіе ввидѣ густой кашицы; а съ 56 до 60 дня оформлено. Количество мочи колебалось отъ 2400 до 3800 к. с., при уд. вѣсѣ 1,011—1,005, безъ бѣлка. На 27 и 31 дни было небольшое носовое кровотеченіе. До 38 дня было головокруженіе. Языкъ оставался чистымъ съ 57 дня. При выискѣхъ на 60 день болъзни измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 31. № пр. журн. 10391. Мѣщанинъ Я—скій 19 лѣтъ, поступилъ 28/ХІІ 92 г. на 8 день болъзни, жагуясь на головную боль, отсутствіе аппетита.

St. pr. Хорошего тѣлосложения и питания. Небольшое тифозное состояние. Обложенный языкъ. Со стороны органовъ груди только кое-гдѣ высокіе свисты. Верхнія границы тупости печени и селезенки не измѣнены. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается. Кожа чиста. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 21 дня болѣзни таковы:

|            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Т-ра       | утр. | 39,5   | 39,4 | 39,3 | 38,5 | 39,6 | 39,2 | 38,6 | 38,2 | 38,3 | 38,5 | 38,3 | 38,2 | 37,3 | 37,4 |
|            | веч. | 39,8   | 39,4 | 38,5 | 40,3 | 39,4 | 39,4 | 39,2 | 38,8 | 38,8 | 39,8 | 38,6 | 38,6 | 38,8 | 38,8 |
| Вѣсъ тѣла: |      | 58800—58600—57400—57300—56400—55900—55400—55200—54900—54600—54100—53600—53100. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Объективная явленія до 21 дня: стулъ по 1—2 р. въ сутки жидко; мочи 600—2500 к. с., уд. вѣса 1,024—1,010, со свѣдами бѣла до 10 дня; р. по Эрлику положительная до 14 дня. Съ 12 дня свистовъ въ груди не было. Тифозное состояние исчезло на 20 день. Пищею было молоко: на 8 день 1000 к. с., съ 9 до 14 1700 к. с., а 15 до 23 дня получалъ бульонъ, 1 яйцо, 1600 к. с., молока. Съ 22 дня температура измѣрялась чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзни. | Вѣсъ. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22            | 52800 | 37,2 | 37,1 | 37,2 | 38,2 | 38,3 | 38,4 | 38,2 | 37,8 | 37,6 | 37,2 | 37,4 | 36,9 |
| 23            | 52600 | 36,3 | 37,0 | 37,2 | 37,3 | 37,6 | 37,8 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 36,9 | 36,3 |

Съ 24 до 47 дня температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,2—37,5 Ц. Ходъ вѣса тѣла за это время такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52000 (24) | 51800 | 51800 | 51500 | 51400 | 51000 | 51800 | 52000 | 52200 | 52500 | 52800 | 53300 |
| 53300 (36) | 54000 | 54500 | 54700 | 54700 | 54600 | 54400 | 54400 | 55000 | 53800 | 55200 | 53800 |

Объективно наблюдалось: съ 22 до 39 дня испражненіе вѣдѣ густой кашицы, а съ 39 до 47 оформлено. Количество мочи колебалось отъ 2200 до 3900 к. с., при уд. вѣсѣ 1,011—1,006, безъ бѣла. До 30 дня головокруженіе. Съ 43 дня языкъ оставался чистымъ. При вышкѣ въ 47 день болѣзни измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 32. № пр журн. 9812. Мѣщанинъ П—въ, 22 лѣтъ, поступилъ 6—XII 92 г. на 8 день болѣзни, жалуюсь на общее недомоганіе и поносъ.

St. pr. Хорошего тѣлосложения и питания. Небольшое тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только разбросанные высокіе свисты. Верхнія границы тупости печени и селезенки не измѣнены. Печень и селезенка прощупываются на 1 палецъ. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 25 дня таковы:

|            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Т-ра       | утр. | 38,8   | 38,3 | 39,6 | 38,8 | 39,2 | 38,7 | 38,2 | 38,4 | 39,3 | 39,6 | 39,2 |
|            | веч. | 39,1   | 39,0 | 39,6 | 39,3 | 39,3 | 39,0 | 39,0 | 38,8 | 39,6 | 38,8 | 39,8 |
| Вѣсъ тѣла: |      | 54800—53600—53000—52200—51800—51100—51100—51100—50800—49900—49100—49200—48700—48700—48400—47600. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

До 13 дня дѣлалось 2 ванны 28° R, а затѣмъ по одной Пища—молоко: на 8 день 600 к. с., съ 9 до 24 дня 1700 к. с., а съ 24 до 27 дня 1600 к. с. и бульонъ. Объективно до 25 дня болѣзни наблюдалось: стулъ 1—6 р. въ сутки жидкий, мочи 400—1000 к. с., уд. вѣса 1,026—1,014, съ бѣлками: до 17 дня незначительное количество, свѣды до 20 дня; р. по Эрлику положительная до 20 дня. Съ 10 до 13 дня порядочное тифозное состояние; затѣмъ оно, уменьшаясь, исчезло на 25 день. На 11 день небольшое носовое кровотеченіе. Съ 13 дня печень и селезенка прощупывались на ½ пальца. Съ 26 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзни. | Вѣсъ. | 8    | 0    | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 26            | 47800 | 36,3 | —    | —    | 37,9 | 37,9 | 38,6 | 37,8 | 37,9 | 36,9 | 36,2 | 36,0 | 36,1 |
| 27            | 47400 | 36,0 | 36,4 | 36,5 | 37,5 | 37,6 | 37,5 | 37,4 | 37,0 | 36,8 | 36,0 | 36,1 | 36,0 |

Съ 28 до 43 дня температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,2° и лишь въ 4 часа пополудни 39 дня и въ 2 часа дня 40 дня равнялась 37,3° Ц. Ходъ вѣса тѣла до 43 дня такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 47800 (28) | 47900 | 47900 | 47600 | 47700 | 48100 | 49000 | 48900 |
| 4920 (36)  | 49600 | 50900 | 51500 | 52900 | 53500 | 53500 | 53500 |

Объективные же явленія шли такъ: до 30 дня стулъ по 1—2 р. жидко, а затѣмъ сразу переходъ въ оформленное испражненіе.

Количество мочи колебалось между 1800—4000 к. с., уд. вѣса 1,015—1,005, безъ бѣлка. Съ 26 дня не прощупывалась печень, съ 28 дня селезенка. Съ 29 дня исчезли свисты въ груди. Съ 38 дня языкъ оставался чистымъ. При выпискѣ на 43 день болѣзни измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 33. № пр. журн. 1711. Крестьянинъ Ив—въ, 26 лѣтъ, поступилъ 3/Ш 93 г. на 7 день болѣзни, жалуюсь на головную боль.

Ст. пр. Хорошаго тѣлосложения и питанія. Порядочное тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди разбросанные высокие и низкіе свисты. Верхнія границы тупости печени и селезенки не измѣнены. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 22 дня болѣзни таковы:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Т-ра | утр. | 39,5 | 40,2 | 39,5 | 39,7 | 39,8 | 39,7 | 39,6 | 39,4 | 39,8 | 39,4 |
|      | веч. | 40,3 | 40,2 | 40,4 | 40,8 | 39,8 | 40,5 | 40,3 | 40,6 | 39,5 | 40,4 |
|      | утр. | 40,2 | 38,6 | 39,8 | 39,6 | 39,3 | 39,0 |      |      |      |      |
|      | веч. | 39,6 | 39,4 | 39,8 | 39,2 | 39,7 | 38,7 |      |      |      |      |

Вѣсъ тѣла: 66800—64300—64400—64700—64500—64000—64300—64200—63400—63100—62700—62400—62100—61500—61500.

До 18 дня ежедневно по 2 ванны 28° R, а затѣмъ по одной Паша на 7 день 600 к. с. молока; съ 8 до 13 бульонъ, 2 яйца, 2200 к. с. молока; а затѣмъ до 24 дня бульонъ, 2 яйца, 2500 к. с. молока. Объективно до 22 дня наблюдалось: стулъ отъ 2 до 5 р. въ сутки жидко; мочи 400—3200 к. с., уд. вѣса 1,020—1,006 съ бѣлкомъ: незначит. количество до 18 дня; на 18 и 19 слѣды; затѣмъ бѣлка въ мочѣ не было; р. по Эрлиху положительная до 18 дня. Съ 10 до 14 дня усиліе тифознаго состоянія и бредъ. Съ 10 до 19 дня прощупывался край селезенки. На 18 день небольшое носовое кровотеченіе. На 22 день не было уже тифознаго состоянія. Съ 23 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзни. | Вѣс.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23            | 60800 | 36,7 | —    | 39,0 | 39,0 | 38,3 | 38,2 | 37,7 | 36,9 | 37,0 | 36,9 | 36,5 | 36,7 |
| 24            | 60700 | 37,2 | 36,6 | 38,4 | 38,8 | 38,6 | 37,3 | 37,0 | 36,8 | 36,6 | 36,5 | 36,2 | 36,2 |

Съ 25 же дня до 47-го температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,3° Ц., давъ лишь одинъ

разъ въ 6 вечера 46 дня цифру 37,5° Ц. Ходъ вѣса тѣла до 47 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 59300 (25) | 59600 | 59100 | 60000 | 60000 | 59100 | 59700 | 59900 | 60400 | 61400 | 61500 |
| 62400 (36) | 62800 | 62400 | 62800 | 63200 | 63800 | 64200 | 64200 | 65000 | 65500 | 65400 |

Объективныя же явленія шли такъ: до утра 26 дня стулъ жидко по 1 р. въ сутки; съ вечера 26—до утра 33 дня испражненіе ввидѣ густой кашицы; съ вечера же 33 дня и до 47 испражненіе было оформлено. Количество мочи колебалось отъ 3000 до 5000 к. с., при уд. вѣсѣ 1,008—1,005, безъ бѣлка. Чаю больной выпивалъ по 2800—4000 к. с. въ сутки. Съ 26 дня свистовъ въ груди не было. Головокруженіе держалось до 35 дня. Съ этого же дня языкъ оставался чистымъ. При выпискѣ на 47 день измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось, а вѣсъ тѣла—65700 граммъ.

№ 34. № пр. журн. 103. Крестьянинъ Н—въ, 27 лѣтъ, поступилъ 5/І 93 г. на 18 день болѣзни, жалуюсь на головную боль и общую слабость.

Ст. пр. Хорошаго тѣлосложения и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только отдѣльные высокие свисты. Верхнія границы тупости печени и селезенки не измѣнены. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 24 дня болѣзни таковы:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Т-ра | утр. | 38,6 | 38,0 | 38,6 | 37,7 | 38,5 | 38,8 | 37,8 |
|      | веч. | 39,2 | 39,6 | 39,3 | 40,0 | 40,2 | 39,1 | 39,6 |

Вѣсъ тѣла: 53400—53600—53400—53400—53300—53300. Паша: 1700 к. с. молока.

Объективныя явленія за это время были: стулъ отъ 1—4 р. въ сутки жидко; мочи 500—650 к. с., уд. вѣса 1,028—1,025, съ бѣлкомъ: до 22 дня незначит. количество, а затѣмъ до 24 слѣды; р. по Эрлиху положительная до 24 дня. Исчезаніе головной боли, свистовъ въ груди и тифознаго состоянія на 24 день. Съ 25 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзни. | Вѣс.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 25            | 53600 | 37,0 | —    | —    | —    | —    | 36,9 | 38,5 | 38,2 | 38,0 | 38,2 | 37,8 | 37,2 |
| 26            | 52900 | 37,3 | 37,1 | 37,4 | 38,4 | 38,8 | 39,5 | 38,6 | 37,9 | 37,7 | 37,6 | 37,3 | 37,0 |
| 27            | 52400 | 36,7 | 36,9 | 37,2 | 38,1 | 38,5 | 38,6 | 38,6 | 37,2 | 37,0 | 36,4 | 36,8 | 36,4 |
| 28            | 51900 | 37,0 | 37,1 | 37,2 | 37,8 | 37,8 | 38,4 | 37,4 | 37,2 | 37,4 | 37,2 | 36,8 |      |
| 29            | 51900 | 36,9 | 36,6 | 36,7 | 37,1 | 37,3 | 38,8 | 38,2 | 37,4 | 37,5 | 37,0 | 36,4 | 36,6 |
| 30            | 51800 | 36,4 | 36,2 | 36,4 | 36,8 | 37,3 | 37,4 | 37,7 | 37,4 | 37,2 | 37,1 | 37,2 | 36,8 |

Съ 31 по 53 день температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,2° Ц., достигнувъ въ 4 часа пополудни 40 дня 37,4° Ц., въ 4 часа пополудни 44 дня 37,5° Ц., а также въ 2 часа пополудни 50 дня 37,4° Ц. Ходъ вѣса тѣла до 53 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52200 (31) | 51500 | 51400 | 51900 | 51200 | 51500 | 51500 | 52400 | 52600 | 51900 | 53100 |
| 53100 (42) | 53600 | 53500 | 53400 | 53800 | 54000 | 54100 | 54200 | 54800 | 54800 | 55000 |

Объективные же явления шли такъ: до 29 дня стулъ по 1—2 р. жидко; съ вечера 29 до 35 дня испражненіе видѣтъ густой кашицы; съ 35 же до 53 дня оформлено. Количество мочи колебалось съ 25 до 31 дня отъ 1200 до 2100 к. с. при уд. вѣсѣ 1,021—1,012 со слѣдами бѣлка на 25 день; р. по Эрлиху положительная до 27 дня; съ 31 до 53 дня количество мочи колебалось отъ 3200 до 4000 к. с. при уд. вѣсѣ 1,009—1,005, безъ бѣлка. Языкъ оставался чистымъ съ 42 дня. При выпискѣ на 53 день бѣлѣзны измѣненія со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось, а вѣсъ тѣла=55900 граммъ.

№ 35. № пр. журн. 2735. Крестьянинъ Ф—въ, 28 лѣтъ, поступилъ 5/IV 93 г. на 10 день бѣлѣзны, жалуетъ на головную боль и поносъ.

Ст. рг. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только кое-гдѣ высокіе свисты. Верхнія границы тупости печени и селезенки не замѣнены. Ни печень, ни селезенку простушить не удается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 22 дня таковы:

|            |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |       |   |       |   |       |
|------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| утр.       | 39,8  | 40,0 | 39,3  | 39,9 | 39,7  | 39,2 | 39,1  | 38,7 | 38,3  | 38,6 | 37,8  | 38,3 |       |   |       |   |       |   |       |
| веч.       | 39,5  | 40,3 | 39,8  | 39,2 | 39,9  | 39,2 | 39,4  | 39,3 | 38,8  | 38,7 | 38,7  | 38,2 |       |   |       |   |       |   |       |
| Вѣсъ тѣла: | 56800 | —    | 55900 | —    | 56000 | —    | 55900 | —    | 55300 | —    | 55300 | —    | 55000 | — | 54200 | — | 54200 | — | 54200 |
|            | 54200 | —    | 53300 | —    | 53400 | —    | 53700 | —    |       | —    |       | —    |       | — |       | — |       |   | —     |

Ежедневно дѣлалась 1 ванна 28°R. вечеромъ. Пища—молоко: на 10 день 600 к. с., на 11 и 12 дня 1700 к. с., на 13—15 дня 2200 к. с., на 16—22 дня 2400 к. с.; съ 20 дня кромѣ молока получалъ еще бульонъ и 1 яйцо. Объективно до 22 дня наблюдалось: стулъ 1—4 р. въ сутки жидко; мочи 400—3000 к. с., уд. вѣса 1,020—1,007, съ незначительнымъ количествомъ бѣлка до 17 дня; съ 18 до 20 дня бѣлка были слѣды; р. по Эрлиху положительная до 17 дня. Съ 15 дня селезенка прощупывалась на 1 палецъ. На 22 день прошла головная боль, появилось головокруженіе, исчезло тифозное состояние. Съ 23 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | Вѣс.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |      |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23           | 53700 | 38,0 | —    | —    | —    | —    | —    | 37,7 | 37,8 | 37,9 | 37,9 | 38,6 | 38,2 | 37,6 |
| 24           | 53200 | 37,3 | 37,3 | 37,9 | 37,8 | 38,0 | 38,0 | 37,9 | 38,2 | 38,7 | 37,7 | 37,6 | 37,8 |      |
| 25           | 53000 | 37,8 | 36,7 | 37,8 | 38,1 | 38,4 | 38,0 | 38,2 | 38,5 | 38,2 | 37,3 | 37,8 | 37,7 |      |
| 26           | 53700 | 37,1 | 37,2 | 37,7 | 37,0 | 37,4 | 37,2 | 38,0 | 38,4 | 38,6 | 37,8 | 37,4 | 36,8 |      |
| 27           | 53700 | 37,1 | 36,9 | 37,1 | 37,0 | 37,6 | 37,4 | 38,0 | 37,7 | 37,7 | 37,6 | 37,4 | 37,2 |      |
| 28           | 52800 | 37,1 | 37,0 | 37,4 | 37,0 | 37,2 | 37,2 | 37,6 | 37,2 | 37,5 | 37,2 | 37,1 | 36,8 |      |
| 29           | 52500 | 36,6 | 36,7 | 36,6 | 36,9 | 37,0 | 37,5 | 37,5 | 37,4 | 37,2 | 37,0 | 36,9 | 37,0 |      |
| 30           | 52500 | 36,6 | 36,7 | 36,9 | 37,0 | 36,8 | 37,2 | 37,1 | 37,3 | 37,5 | 37,4 | 36,3 | 36,8 |      |

Съ 31 до 49 дня температура при двухчасовомъ измѣреніи между 36,0—37,0° Ц. и только на 31 день въ 8 ч. вечера поднялась 37,3° Ц., а также въ 12 ч. пополудни 32 дня = 37,2° Ц. Ходъ вѣса былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52400 (31) | 52700 | 52700 | 52500 | 53100 | 53000 | 53100 | 53300 | 54500 |
| 54000 (40) | 54500 | 55200 | 55100 | 54500 | 55100 | 55300 | 55500 | 55900 |

Объективные же явления измѣнились такъ: до утра 31 дня стулъ 1—3 р. въ сутки жидко; съ вечера 31 до 34 дня испражненіе видѣтъ густой кашицы; съ 34 до 45 дня испражненіе оформлено, желтое, а съ 45 до 49 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2900 до 5200 к. с. при уд. вѣсѣ 1,007—1,005 безъ бѣлка. Чаю большой выпивалъ по 3200—4400 к. с. въ сутки. Селезенка не прощупывалась съ 27 дня. Съ 31 дня свистовъ въ груди не выслушивалось. Съ 33 дня не было головокруженія. На 48 день языкъ совершенно очистился. При выпискѣ на 49 день измѣненія со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось, а вѣсъ тѣла = 56400 граммъ.

№ 36. № пр. журн. 8627. Крестьянинъ С—въ, 20 лѣтъ, поступилъ 8/X 93 г. на 8 день бѣлѣзны, жалуетъ на головную боль, потерю аппетита, поносъ.

Ст. рг. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненія не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не замѣнена. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 19 дня бѣлѣзны таковы:

Т-ра утр. 38,5 38,2 38,0 38,6 38,2 38,0 37,7 38,5 38,4 38,2 38,8 37,8  
веч. 40,0 38,8 38,9 39,5 38,7 39,4 39,2 39,1 39,5 38,7 39,7 39,2 ванна 28°R веч.  
Вьсь тьла: 55000—53700—53200—52800—52300—51700—51400—50100—  
50300—49300.

Объективные явления до 19 дня были: стул по 1—2 р. в сутки жидко, мочи 400—2400 к. с. уд. вьса 1,019—1,008 со слъдами бьлка до 13 дня; р. по Эрланку положительная до 14 дня. Исчезание тифозного состояния на 19 день. Съ 20 дня начато измьрение температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болъзни. | Вьсь. | 8    |      | 10   |      | 12   |      | 2    |      | 4    |      | 6    |      |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|               |       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
| 20            | 49100 | 37,6 | —    | —    | —    | —    | 38,0 | 38,8 | 39,0 | 38,8 | 37,5 | 37,3 | 37,2 |
| 21            | 48200 | 37,3 | 38,3 | 37,3 | 37,0 | 37,7 | 37,9 | 38,0 | 37,8 | 37,7 | 37,8 | 36,8 | 36,2 |
| 22            | 47900 | 37,0 | 37,5 | 38,1 | 37,8 | 38,8 | 38,8 | 38,4 | 37,6 | 36,8 | 37,9 | 37,2 | 37,3 |
| 23            | 47000 | 37,2 | 37,0 | 37,3 | 37,3 | 38,6 | 38,5 | 38,6 | 38,5 | 38,3 | 38,1 | 37,9 | 37,7 |
| 24            | 46900 | 37,4 | 37,1 | 37,6 | 37,3 | 37,6 | 39,5 | 39,1 | 38,8 | 38,0 | 37,0 | 37,2 | 36,1 |
| 25            | 46200 | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 37,0 | 38,2 | 38,5 | 37,8 | 37,7 | 37,6 | 37,2 | 37,0 | 36,1 |
| 26            | 46300 | 36,6 | 36,6 | 37,0 | 36,9 | 37,8 | 36,8 | 37,4 | 37,7 | 38,2 | 38,0 | 36,2 | 36,8 |
| 27            | 46800 | 36,8 | 37,3 | 37,4 | 37,2 | 37,4 | 38,0 | 38,8 | 38,2 | 38,6 | 38,1 | 37,9 | 36,8 |
| 28            | 46400 | 36,8 | 37,0 | 37,4 | 37,2 | 37,4 | 38,2 | 38,2 | 38,8 | 38,6 | 37,0 | 36,7 | 36,2 |
| 29            | 46700 | 36,6 | 36,8 | 36,7 | 37,4 | 37,6 | 39,2 | 38,8 | 38,2 | 38,2 | 37,8 | 37,6 | 36,6 |
| 30            | 46400 | 36,6 | 36,7 | 37,2 | 36,8 | 36,8 | 37,7 | 37,5 | 38,0 | 38,2 | 37,4 | 36,8 | 36,7 |
| 31            | 47000 | 36,3 | 36,7 | 36,5 | 37,5 | 37,7 | 39,0 | 38,8 | 38,6 | 38,5 | 38,0 | 37,0 | 36,8 |
| 32            | 46400 | 36,0 | 36,5 | 37,3 | 36,9 | 36,6 | 37,6 | 38,0 | 38,1 | 37,5 | 37,7 | 37,3 | 37,0 |
| 33            | 46800 | 37,2 | 36,2 | 37,3 | 37,7 | 37,2 | 38,7 | 37,9 | 37,9 | 37,4 | 36,6 | 36,3 | 36,4 |
| 34            | 47000 | 36,4 | 36,0 | 36,4 | 37,4 | 37,5 | 37,3 | 38,4 | 38,4 | 37,7 | 37,6 | 36,9 | 36,0 |
| 35            | 47100 | 36,7 | 36,3 | 37,0 | 36,6 | 37,5 | 37,0 | 38,5 | 38,7 | 38,6 | 36,2 | 36,3 | 36,2 |
| 36            | 47300 | 37,0 | 36,5 | 36,7 | 36,7 | 36,2 | 37,6 | 38,2 | 37,2 | 36,7 | 36,8 | 36,6 | 36,2 |
| 37            | 47200 | 36,2 | 36,3 | 36,8 | 36,4 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 37,9 | 37,1 | 36,4 | 36,3 | 36,0 |
| 38            | 47400 | 36,4 | 36,4 | 36,1 | 36,2 | 36,4 | 36,5 | 37,0 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,9 | 36,7 |

Съ 39 дня до 68 дня температура колебалась при двухчасовомъ ея измьреніи между 36,0—37,1° Ц., давъ лишь одинъ разъ въ 4 часа пополудни 65 дня 37,2° Ц. Ходъ вьса тьла за это время такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 47800 (39) | 48500 | 48000 | 48400 | 48000 | 49200 | 48600 | 49000 | 49000 | 49300 |
| 49800 (49) | 50100 | 50400 | 51200 | 51200 | 51700 | 52100 | 53300 | 33000 | 53500 |
| 53200 (59) | 53800 | 53800 | 55700 | 54300 | 53600 | 53900 | 54300 | 54500 | 54300 |

Объективные же явления измьнялись такъ: до 33 дня стулъ 1—3 р. въ сутки жидко, на 34 и 35 испражненіе ввидѣ густой кашицы; съ 36 до 54 дня испражненіе оформлено, желтое; на 54—56 день—ввидѣ густой кашицы, желтое; съ 57 до 61 дня испражненіе жидкое, желтое; на 63 день (на 62 день стула не

было) оформлено, глинистаго цвьта, а съ 64 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2400 до 5200 к. с. при уд. вьсѣ 1,013—1,005, со слъдами бьлка до 22 дня. На 25 день прошла головная боль. Съ 63 дня языкъ оставался чистымъ. При выпискѣ на 68 день болъзни измьненій со стороны внутреннихъ органовъ не замьчалось.

### ВТОРАЯ ГРУППА.

№ 1. № пр. журн. 560. Крестьянинъ Г.—въ, 14 лѣтъ, поступивъ 21/1 93 г. на 8 день болъзни, жалуюсь на головную боль, отсутствие аппетита, поносъ.

St. pr. Хорошаго тьлослосения и питания. Небольшое тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измьненій не замьтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измьнена. Прочувствуется твердоватый край селезенки. Печень не прочувствуется. Ходъ температуры и вьса тьла до 14 дня болъзни таковы:

Т-ра утр. 38,5 38,3 37,7 37,8 38,0 37,0 37,0  
веч. 39,5 38,7 38,6 37,5 38,0 38,0 37,4  
Вьсь тьла: 33900—33500—33800—34000—33900—34200.

Ежедневно дьталась вечеромъ 1 ванна 28°R. Пища на 8 день 1000 к. с. молока, на 9 день—бульонъ, 1 яйцо, 1300 к. с. молока, а съ 10 до 17 дня тоже, но молока 1600 к. с. Объективные явления до 14 дня: стулъ 2—4 р. въ сутки жидко; мочи 600—2000 к. с., уд. вьса 1,022—1,008, безъ бьлка; исчезание тифозного состояния на 11 день; исчезание головной боли, появленіе головокруженія и позыва на пищу на 14 день. Температура въ 8 ч. вечера 11 дня = 38,3°, а въ 10 часовъ 14 дня 38,4° Ц. Съ 15 дня начато измьрение температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болъзни. | Вьсь. | 8    |      | 10   |      | 12   |      | 2    |      | 4    |      | 6    |      |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|               |       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
| 15            | 34100 | 36,5 | —    | —    | 37,1 | 37,2 | 37,2 | 37,4 | 37,7 | 37,9 | 37,9 | 37,8 | 37,2 |
| 16            | 33900 | 37,6 | 37,9 | 38,3 | 38,3 | 38,4 | 38,8 | 38,8 | 38,2 | 38,1 | 37,7 | 37,5 | 37,8 |
| 17            | 33500 | 37,4 | 37,5 | 37,8 | 37,8 | 37,6 | 37,7 | 37,0 | 36,9 | 36,6 | 36,9 | 37,1 | 37,3 |

Съ 18 до 32 дня температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,3° Ц., давъ на 22 день въ 2 ч. дня, а также на 31 день въ 12 часовъ дня 37,4°, а въ 2 часа дня 28 дня болѣзни 37,5° Ц. Ходъ же вѣса тѣла до 32 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 33300 (18) | 33700 | 33400 | 33200 | 33200 | 33200 | 34000 | 33800 |
| 34000 (26) | 33900 | 34300 | 34200 | 34300 | 34200 | 34300 |       |

Объективныя же явленія измѣнялись такъ: стулъ по 2—3 р. въ сутки жидко до 23 дня, съ 23 до 26 испражненіе ввидѣ густой кашицы, а съ 26 до 32 оформлено. Количество мочи колебалось отъ 2400 до 4400 к. с., при уд. вѣсѣ 1,008—1,005, безъ бѣлка. Селезенка перестала прощупываться съ 18 дня. Головокруженіе прошло на 21 день. Языкъ совершенно очистился къ 31 дню. При выпаскѣ на 32 день болѣзни измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 2. № пр. журн. 4707. Крестьянинъ М—въ, 15 лѣтъ поступилъ 1/VI 93 года на 7 день болѣзни, жалуюсь на головную боль.

Стъ рг. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Верхняя граница тупости печени не измѣнена. Селезеночная тупость съ 8 ребра. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 14 дня болѣзни такой:

Т-ра утр. 39,0 38,8 38,1 38,5 38,8 38,3 38,3 37,8.  
веч. 39,3 38,5 38,8 38,8 39,0 38,8 38,3 38,1.  
Вѣсъ тѣла: 44000—42900—43000—42700—42600.

Ежедневно дѣлалась 1 ванна 28°R. Пища—молоко: на 7—9 день 1000 к. с., съ 10 до 19 дня 1800 к. с., да кромѣ того бульонъ и кисель. Объективныя явленія до 15 дня болѣзни были: стулъ 1—2 р. въ сутки жидко; мочи 1000—2000 к. с., уд. вѣса 1,027—1,009 съ незначит. количествомъ бѣлка до 12 дня и слѣды бѣлка на 13 день; р. по Эрлиху до 12 дня. Тифозное состояніе держалось до 12 дня. Съ 15 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзни. | Вѣсь. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15            | 42300 | 37,3 | —    | —    | —    | —    | 37,7 | 37,7 | 38,0 | 38,5 | 38,0 | 37,8 | 37,6 |
| 16            | 41600 | 37,2 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 37,0 | 36,7 | 37,5 | 37,0 | 37,1 | 37,7 | 37,5 | 37,2 |

Давъ на 17 и 18 день въ 2 часа ночи 37,5° Ц., температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась съ 19 до 29 дня включительно между 36—37° Ц.; съ 30 же дня шла такъ:

| День болѣзни. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30            | 36,9 | 36,4 | 36,5 | 36,4 | 37,1 | 36,8 | 36,8 | 36,4 | 36,2 | 36,3 | 37,0 | 37,0 |
| 31            | 37,1 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 36,6 | 37,0 | 38,0 | 38,1 | 37,6 | 37,0 | 37,0 | 36,5 |
| 32            | 36,7 | 36,6 | 36,1 | 36,4 | 36,4 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,6 | 36,8 |
| 33            | 36,7 | 37,1 | 36,5 | 36,9 | 36,6 | 36,7 | 37,1 | 37,2 | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 36,8 |
| 34            | 36,7 | 36,6 | 36,7 | 36,5 | 36,7 | 36,5 | 37,0 | 36,6 | 36,8 | 36,5 | 36,7 | 36,6 |
| 35            | 36,5 | 36,7 | 36,6 | 37,9 | 37,4 | 36,6 | 36,5 | 36,6 | 37,0 | 37,8 | 37,7 | 37,1 |

Съ 36 до 39 дня при той же пищѣ температура колебалась при двухчасовомъ ея измѣреніи между 36—37,1° Ц., давъ въ 6 часовъ вечера 38 дня 37,2° Ц. Ходъ вѣса тѣла съ 17 до 39 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41600 (17) | 41100 | 41100 | 41000 | 40700 | 40500 | 40900 | 41400 |
| 40800 (25) | 41500 | 42900 | 42700 | 42800 | 43100 | 43100 | 43800 |
| 44100 (33) | 44800 | 44700 | 44100 | 45700 | 44800 | 45100 |       |

Объективныя явленія измѣнялись такъ: съ 15 до 21 дня стулъ по 1—2 р. въ сутки, жидко; съ 21 до 24 дня испражненіе ввидѣ густой кашицы; съ 24 до 32 дня испражненіе оформлено, желтое; на 32 и 33 день оформлено темнаго цвѣта, на 34 день вечеромъ и на 35 утромъ жидкое испражненіе темнаго цвѣта; вечеромъ 35 и утромъ 36 дня испражненіе ввидѣ густой кашицы, темное, а съ вечера 36 и до 39 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2000 до 4100 к. с., при уд. вѣсѣ 1,009—1,005, безъ бѣлка. Чаю большой выпивалъ по 800—3200 к. с. Головокруженіе держалось до 19 дня. Къ 29 дню языкъ оставался обложеннымъ въ задней половинѣ, а съ 34 дня былъ совершенно чистымъ. Субъективныхъ ощущеній повышенія температуры не вызывали. При выпаскѣ на 39 день измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 3. № пр. журн. 5171. Крестьянинъ Л—въ, 17 лѣтъ,

поступил 15—VI 93 г. На 8 день болезни, жалуюсь на головную боль, потерю аппетита, понос.

St. pr. Хорошего тѣлосложения и питания. Порядочное тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только небольшое количество среденузырчатыхъ хриповъ подъ нижними углами лопатокъ. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 14 дня болезни такой:

|            |      |       |        |        |        |        |        |
|------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Т-ра       | утр. | 39,0  | 39,0   | 38,3   | 38,7   | 37,8   | 37,2   |
|            | веч. | 38,8  | 39,5   | 39,4   | 39,4   | 39,3   | 38,7   |
| Вѣсъ тѣла: |      | 54600 | —54700 | —54600 | —54000 | —53300 | —53400 |

Ежедневно дѣлалась 1 ванна 28° R. вечеромъ. Пища—молоко: на 8—10 дни 1000 к. с., а на 11—14 дни 2200 к. с. Объективно: стулъ 1—3 жидко; мочи 600—2000 к. с., уд. вѣса 1,023—1,008, со слѣдами бѣлка до 12 дня; р. по Эрлиху положительная до 12 дня. На 11 день появился позывъ на пищу. На 13 день исчезло тифозное состояние. Съ 15 дня начато измѣнение температуры чрезъ 2 часа и ходъ ее былъ такой:

| День болзн. | Вѣс.  | 8    |       | 10   |      | 12   |      | 2    |      | 4    |      | 6    |      | 8    |      | 10   |      | 12   |      | 2    |      | 4    |      | 6    |      |      |
|-------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             |       | 15   | 53100 | 37,1 | —    | 37,3 | 37,4 | 37,6 | 37,9 | 37,6 | 37,8 | 37,6 | 37,7 | 37,6 | 36,9 | 36,9 | 37,6 | 37,7 | 37,6 | 37,7 | 37,6 | 36,9 | 36,9 | 37,6 | 37,7 | 37,6 |
| 16          | 52600 | 36,5 | 36,2  | 36,6 | 37,0 | 36,9 | 36,9 | 37,4 | 38,0 | 37,7 | 38,0 | 37,5 | 36,8 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
| 17          | 52300 | 36,6 | 36,3  | 36,1 | 36,6 | 36,5 | 36,6 | 37,1 | 37,3 | 37,2 | 37,0 | 37,2 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |

Давъ въ 2 часа ночи 18 дня 37,3° Ц., температура дальше при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась до 27 дня влчательно между 36—37° Ц., а затѣмъ приняла такой ходъ:

| День болзн. | 8    |      | 10   |      | 12   |      | 2    |      | 4    |      | 6    |      | 8    |      | 10   |      | 12   |      | 2    |      | 4    |      | 6    |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 28   | 36,8 | 36,6 | 36,7 | 37,0 | 37,3 | 37,2 | 37,0 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,2 | 37,3 | 37,1 | 37,1 | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,4 | 37,2 | 37,3 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 29          | 37,1 | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,1 | 37,5 | 37,6 | 37,6 | 36,8 | 36,6 | 36,6 | 36,7 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| 30          | 36,7 | 37,1 | 37,0 | 37,3 | 37,3 | 37,2 | 37,4 | 37,6 | 37,5 | 37,6 | 37,5 | 37,6 | 37,4 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 31          | 37,4 | 36,9 | 37,1 | 37,9 | 37,2 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,2 | 37,2 | 37,3 | 37,3 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| 32          | 37,3 | 37,1 | 37,4 | 37,2 | 37,3 | 37,5 | 37,6 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
| 33          | 37,2 | 37,0 | 37,4 | 37,3 | 37,0 | 37,2 | 37,6 | 37,8 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 34          | 37,2 | 37,3 | 37,2 | 37,0 | 37,3 | 37,3 | 37,5 | 37,7 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |

Съ 35 же до 43 дня температура при двухчасовомъ измѣреніи колебалась между 36,2—37,4° Ц. Ходъ вѣса тѣла съ 18 до 43 дня такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 51700 (18) | 51200 | 51400 | 51600 | 51900 | 51500 | 52200 | 51500 | 52000 |
| 52200 (27) | 52200 | 52600 | 53000 | 53500 | 53700 | 54500 | 54700 | 54800 |
| 54600 (41) | 55300 | 55600 | 56400 | 56800 | 57200 | 57300 | 57800 |       |

Объективныя же явленія измѣнялись такъ: стулъ по 1 р. въ сутки жидко до 21 дня; съ 21 до 26 испражненіе ввидѣ густой кашицы; съ 26 до утра 33 дня испражненіе оформлено, желтое, съ вечера 33 до 38 дня испражненіе ввидѣ густой кашицы, темное, а съ 38 до 43 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2600 до 4700 к. с., при уд. вѣсѣ 1,008—1,005, безъ бѣлка. Чаю большой выпивать по 2400—4000 к. с., въ сутки. Съ 17 дня не было хриповъ въ груди. Съ 15 до 19 дня было головокруженіе. Языкъ совершенно очищается къ 40 дню. Субъективныхъ ощущеній повышенія температуры не вызывали.

№ 4. № пр. журн. 5277. Крестьянинъ Л—въ, 21 года, поступилъ 19—VI 93 г. на 7 день болезни, жалуюсь на головную боль, поносъ.

St. pr. Хорошаго тѣлосложения и питания. Небольшое тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только отдѣльные высокие свисты. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Печень и селезенка прощупываются на 1 палецъ, болѣзненные. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 16 дня болезни таковъ:

|            |      |       |        |        |        |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|-------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| Т-ра       | утр. | 38,6  | 39,4   | 39,2   | 38,6   | 37,8 | 38,1 | 38,8 | 38,1 | 37,8 | 37,7 |
|            | веч. | 39,6  | 39,0   | 39,0   | 39,8   | 39,3 | 39,0 | 39,5 | 38,2 | 39,2 | 38,2 |
| Вѣсъ тѣла: |      | 54700 | —54400 | —52800 | —52700 |      |      |      |      |      |      |

До 15 дня ежедневно по 2 ванны 28° R, а затѣмъ одна вечеромъ. Пища до 12 дня 1000 к. с., а съ 13 до 21 дня 2200 к. с. молока. Объективныя явленія до 16 дня таковы: стулъ по 1 р. въ сутки жидко; мочи 300—1000 к. с., уд. вѣса 1,026—1,022 съ незначительнымъ количествомъ бѣлка; р. по Эрлиху положительная до 15 дня. На 8—10 дни розеолы на кожѣ живота. Съ 12 дня печень и селезенка безболѣзненны. Съ 13 до 16 дня прощупывался край печени, а затѣмъ прощупать его не удавалось. Позывъ на пищу съ 15 дня. Съ 17 дня температура, измѣряемая чрезъ 2 часа, имѣла такой ходъ:

| День болзн. | Всь.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 17          | 52800 | 37,5 | —    | —    | —    | —    | 37,4 | 37,7 | 37,5 | 37,4 | 37,2 | 36,5 | 36,8 |
| 18          | 52800 | 36,9 | 37,2 | 36,8 | 37,0 | 36,7 | 37,0 | 37,6 | 37,9 | 38,2 | 37,7 | 37,0 | 37,2 |
| 19          | 52100 | 37,4 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 37,1 | 36,8 | 37,5 | 37,6 | 37,0 | 36,8 | 37,0 | 36,9 |
| 20          | 51400 | 36,7 | 36,3 | 36,7 | 37,0 | 37,0 | 37,3 | 37,1 | 36,7 | 37,1 | 37,6 | 36,6 | 36,6 |
| 21          | 51600 | 36,4 | 36,0 | 36,1 | 36,1 | 36,4 | 36,8 | 37,3 | 37,3 | 37,7 | 37,6 | 37,6 | 36,6 |

Колеблется дайте при двухчасовом измѣреніи между 36—37,2° Ц. и давь 8 часовъ вечера 24 дня 37,4° Ц. и 26 дня 37,3 Ц., температура дошла такимъ образомъ до 38 дня болзнѣи, а затѣмъ приняла такой ходъ:

| День болзн. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 38          | 36,7 | 36,6 | 36,4 | 37,2 | 37,3 | 37,0 | 37,0 | 37,1 | 36,5 | 36,6 | 37,2 | 37,2 |
| 39          | 37,1 | 36,8 | 36,7 | 37,3 | 37,4 | 37,0 | 37,2 | 37,6 | 38,6 | 38,8 | 38,2 | 38,7 |
| 40          | 37,6 | 36,9 | 36,8 | 36,6 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | 36,5 | 36,1 | 36,3 | 36,1 | 36,1 |

На 41 и 42 дни температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36—37° Ц. (Пищею съ 37 дня было: супъ, котлета, 2 манн, каша, 1 ф. бѣл. и ½ ф. черн.). Ходъ вѣса тѣла съ 22 дня болзнѣи такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 51600 (22) | 51500 | 51500 | 51800 | 51800 | 52300 | 52800 | 52100 |
| 52500 (30) | 52400 | 53700 | 53600 | 53500 | 54500 | 54000 | 54600 |
| 54600 (38) | 55000 | 55900 | 55700 | 55800 | 55800 |       |       |

Объективными же явленіями съ 22 до 43 дня шли такъ: до 26 дня стулъ по 1 р. въ сутки, жидко; съ 27 до 33 дня испражнение ввидѣ густой кашицы; съ 34 до 43 дня оформлено, желтое. Количество мочи колебалось отъ 1000 до 4500 к. с., при уд. вѣсѣ 1,014—1,005, со слѣдами бѣлка до 18 дня. Чаю большій выпивалъ по 800—4000 к. с. Съ 17 дня не было тифознаго состоянія. Головокруженіе держалось до 22 дня; съ этого же дня свистовъ въ груди не выслушивалось. Съ 23 дня прощупывался только край селезенки. Объективныхъ и субъективныхъ явленій повышеніе температуры на 39—40 дни не было. Выписанъ на 43 день болзнѣи, имѣя обложенный въ задней половинѣ языкъ и прощупываемый твердый край селезенки.

№ 5. № пр. журн. 3099. Крестининъ Г.—въ, 14 лѣтъ, поступилъ 16—IV 93 г. на 8 день болзнѣи, жаловался на головную боль и поносъ.

St. рг. Хорошаго тѣлоосложненія и питанія. Сильное тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только разбросанные въ небольшомъ количествѣ высокіе свисты. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Печень не прощупывается. Селезенка тверда, на 1 палецъ изъ-за края реберъ. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 21 дня таковы:

| Т-ра | утр. | веч. | утр. | веч. | Вѣсъ тѣла:   |
|------|------|------|------|------|--|
|      | 38,6 | 39,5 | 39,2 | 39,2 | 34900—34600—33900—33700—33500—33100—32900—32000—32100—31800—31700—31400, |
|      | 40,0 | 39,8 | 39,3 | 39,8 |  |
|      | 37,8 | 37,3 | 37,4 |      |  |
|      | 39,2 | 38,8 | 38,4 |      |  |

До 18 дня дѣлалось ежедневно 2—3 ванны 28° R, а затѣмъ по одной. Пища—молоко: до 11 дня по 1000 к. с., а затѣмъ до 23 дня 1800 к. с. Объективные явленія шли такъ: стулъ 2—8 р. за сутки жидко; мочи 100—400 к. с., уд. вѣса 1,023—1,005 съ незначи. количествомъ бѣлка до 19 дня болзнѣи, затѣмъ бѣлка не было, р. по Эрлику положительная до 21 дня. Съ 10 до 17 дня бредъ ночью. Съ 13 дня селезенка прощупывалась почти на 2 пальца и была болѣзненна до 20 дня. Съ 14 дня стало уменьшаться тифозное состояніе. Утромъ 17 дня небольшое носовое кровотеченіе. Съ 22 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болзн. | Всь.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22          | 30800 | 37,2 | —    | —    | —    | —    | 35,0 | 38,2 | 37,8 | 37,0 | 36,7 | 36,4 | 36,7 |
| 23          | 30800 | 36,6 | 36,7 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 37,3 | 37,3 | 37,0 | 37,1 | 36,6 | 36,4 | 36,3 |

Съ 24 до 42 дня включительно температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,4° Ц., давь 3 раза за это время 37,5° Ц., именно въ 8 часовъ вечера 31 дня и въ 12 часовъ дня 36 и 39 дней. На 43 и 44 дни были повышены, прощупавшія такъ:

| День болзн. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 43          | 36,8 | 37,2 | 37,6 | 37,3 | 37,3 | 37,4 | 37,5 | 37,4 | 37,1 | 36,6 | 36,4 | 37,1 |
| 44          | 37,2 | 37,4 | 37,6 | 37,3 | 37,1 | 37,1 | 37,0 | 36,6 | 36,4 | 36,3 | 36,6 | 36,9 |

Въ дальѣйшемъ теченіи до 55 дня температура при двухча-

совомъ ея измѣреніи опять колебалась между 36—37,4, давъ два раза еще 37,5° Ц., и именно въ два часа пополудни 46 дня и въ 12 часовъ дня 53 дня. Ходъ вѣса тѣла съ 24 до 55 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31000 (24) | 31200 | 31300 | 31400 | 31200 | 31200 | 31200 |
| 31000 (32) | 31400 | 31900 | 31800 | 31700 | 32400 | 32800 |
| 33400 (40) | 33500 | 34000 | 34200 | 33700 | 34200 | 34600 |
| 34500 (48) | 34400 | 34600 | 34600 | 35200 | 34900 | 35200 |
|            |       |       |       |       |       | 35600 |

Объективные же явления шло такъ: до 29 дня стулъ по 1—3 р. въ сутки жидко; съ 29 до 32 дня испражненіе ввидѣ густой кашицы; съ 32 до 55 дня оформлено. Количество мочи колебалось отъ 1800 до 4600 к. с., при уд. вѣсѣ 1,010—1,005 безъ бѣлка. Чаю больнои выпивалъ 1600—3200 к. с. въ сутки. Съ 22 дня не было тифознаго состоянія. Съ 31 дня не прощупывалась селезенка. Съ 36 до 46 дня языкъ былъ обложенъ только въ задней половинѣ; а съ 46 до 55 дня оставался чистымъ. Субъективно повышенія ничемъ не сказывались. При выпискѣ на 55 день измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 6. № пр. журн. 10189. Крестьянинъ П.—въ, 15 лѣтъ, поступилъ 20/ХІІ 92 г. на 9 день болѣзни, жалуюсь на головную боль.

Ст. рг. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Сильное тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди разбросанные въ небольшомъ количествѣ отдѣльные высокие свисты. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Печень не прощупывается. Селезенка прощупывается на 1½ палца, тверда, болѣзненна. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 15 дня таковы:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Т-ра | утр. | 37,8 | 39,0 | 38,4 | 38,8 | 38,8 | 37,3 | 37,4 |
|      | веч. | 39,5 | 39,0 | 40,2 | 40,0 | 39,0 | 38,9 | 38,2 |

Вѣсъ тѣла 41100—40700—40500—40200—40000—40500.

До 14 дня дѣлалось ежедневно по 2 ванны 28°, а затѣмъ по одной. Пища—молоко: на 9 день 600 к. с., а затѣмъ до 19 дня 1700 к. с. Объективные явления до 15 дня были: стулъ по 2 р. въ сутки жидко; мочи 600—1000 к. с., уд. вѣса 1,017—1,010, безъ бѣлка; р. по Эрику положительная до 15 дня. Съ 10 до 14 дня бредъ по ночамъ. Съ 14 дня селезенка прощупывалась на 2 палца и на 15 день была безболѣзненна. Постепенно уменьшаясь, на 15 день тифозное состояніе было выражено слабо. Съ 16 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ тако

| День болѣзн. | Вѣсь. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16           | 39500 | 37,7 | —    | 37,5 | 37,8 | 37,9 | 37,8 | 38,8 | 38,2 | 37,4 | 37,7 | 37,8 | 36,6 |
| 17           | 39500 | 36,8 | 37,4 | 38,1 | 37,7 | 37,8 | 38,2 | 38,0 | 38,3 | 37,8 | 38,1 | 37,2 | 37,4 |
| 18           | 39100 | 37,4 | 37,2 | 37,1 | 38,1 | 38,0 | 38,6 | 38,5 | 38,7 | 37,6 | 37,6 | 37,0 | 37,6 |
| 19           | 39000 | 38,8 | 36,5 | 36,7 | 36,7 | 37,4 | 37,8 | 38,2 | 39,1 | 38,5 | 36,8 | 36,2 | 36,6 |
| 20           | 38500 | 36,5 | 36,1 | 36,7 | 36,5 | 37,6 | 37,8 | 38,0 | 38,0 | 37,8 | 37,4 | 37,4 | 37,5 |
| 21           | 39000 | 36,1 | 36,2 | 36,3 | 36,0 | 37,2 | 37,8 | 39,0 | 39,1 | 38,3 | 38,4 | 38,7 | 37,3 |
| 22           | 38800 | 36,4 | 36,3 | 36,4 | 36,6 | 37,1 | 37,3 | 37,9 | 37,8 | 38,3 | 37,0 | 38,2 | 37,0 |
| 23           | 38600 | 36,9 | 36,6 | 36,7 | 36,1 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 38,1 | 38,5 | 37,1 | 37,1 | 36,2 |

Давъ въ 12 часовъ ночи 25 дня 37,3° Ц., а также въ 4 часа утра 31 дня—37,5° Ц., температура въ остальные дни съ 24 до 32 дня колебалась при двухчасовомъ ея измѣреніи между 36—37,2° Ц. Съ 33 дня начались повышенія температуры и были таковы:

| День болѣзн. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 33           | 36,5 | 36,4 | 36,4 | 36,7 | 36,8 | 37,8 | 38,4 | 38,4 | 38,0 | 37,2 | 37,0 | 36,4 |
| 34           | 36,2 | 36,0 | 36,5 | 36,5 | 36,2 | 36,6 | 36,7 | 36,4 | 36,2 | 36,3 | 36,6 | 36,4 |
| 35           | 36,6 | 36,5 | 36,5 | 37,0 | 36,5 | 37,5 | 36,5 | 36,2 | 36,6 | 36,5 | 36,6 | 36,9 |
| 36           | 36,5 | 36,5 | 37,4 | 37,0 | 37,2 | 37,5 | 37,9 | 37,7 | 37,5 | 37,1 | 36,5 | 36,7 |
| 37           | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 36,8 | 37,0 | 37,3 | 37,6 | 37,3 | 37,2 | 37,7 | 36,8 | 36,7 |
| 38           | 37,0 | 36,2 | 37,0 | 36,9 | 37,4 | 37,6 | 38,0 | 37,5 | 36,6 | 36,4 | 36,0 | 36,4 |

Съ 39 до 49 дня температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36—37,1 Ц. Ходъ вѣса тѣла съ 24 до 49 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 38700 (24) | 38700 | 38000 | 38300 | 38200 | 38300 | 38,00 | 38900 | 39400 |
| 39700 (33) | 39100 | 40000 | 39800 | 39800 | 40000 | 39800 | 40400 | 40400 |
| 40600 (42) | 41000 | 41000 | 41100 | 41000 | 41600 | 41400 | 42000 |       |

Объективные же явления съ 16 до 49 дня измѣнялись такъ: стулъ съ 16 до 22 дня по 1—2 р. жидко; съ 22 до 26 кашнеобразное испражненіе; на 26 день на половину оформлено; съ 27 до 33 дня испражненіе оформлено; съ 33 до 39 дня снова жидкое по 1 р. въ сутки; на 39 день кашнеобразное, на 41 день на половину оформленное и, наконецъ, съ 42 до 49 снова оформленное. Количество мочи съ 16 до 34 дня колебалось отъ

2000 до 3500 к. с. при уд. вѣсѣ 1,008—1,005, безъ бѣлка, съ 34 до 39 дня мочи было 1000—1800 к. с. уд. вѣса 1,018—1,011, безъ бѣлка, а съ 40 до 49 дня снова мочи было 3000—3500 к. с., уд. вѣса 1,006—1,007, безъ бѣлка. Тифознаго состоянія не было съ 19 дня. Головная боль прошла на 20 день. Свисты въ груди не выслушивались съ 21 дня. Языкъ, постепенно очищаясь, на 33 день былъ обложенъ только въ задней своей половинѣ, а съ 34 до 38 дня снова былъ обложенъ весь. На 35 день было небольшое носовое кровотечение. Съ 36 до 38 аппетитъ понижень. Съ 36 дня селезенка прощупывалась на 1 палецъ, была тверда. Съ 41 дня языкъ оставался чистымъ. Аппетитъ снова хорошимъ былъ съ 39 дня. При выпискѣ на 49 день со стороны внутреннихъ органовъ только селезенка была тверда, выступающа на 1 палецъ изъ-за края реберъ.

№ 7. № пр. журн. 4982. Крестьянинъ Д.—въ 16 лѣтъ, поступилъ 9 VI 93 г. на 9 день болѣзни, жалуюсь на общую слабость и головную боль.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Порядочное тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только кое-гдѣ отдѣльные высокие висты. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Печень и селезенка прощупываются на 1 палецъ. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 19 дня таковы:

Т-ра утр. 38,0 39,3 38,8 38,2 38,8 38,4 38,0 38,0 38,3 37,3  
веч. 38,0 39,5 39,6 39,5 39,5 39,8 39,6 39,3 39,2 37,6 38,4

Вѣсъ тѣла: 41800—41300—41200—40300—39800—39800—39100.

Съ 9 до 12 дня дѣлалась одна ванна 28° В. вечеромъ, а съ 13 до 19 по двѣ въ сутки. Пищею до 23 дня было 2200 к. с. молока, а на 24 и 25 день данъ еще и бульонъ. Объективные явленія съ 9 до 19 дня были: стулъ 1—3 р. въ сутки жидко; мочи 300—1800 к. с., уд. вѣса 1,019—1,007 съ незначительнымъ количествомъ бѣлка; р. по Эриху положительная до 19 дня. До 14 дня бредъ по ночамъ. Съ 17 дня стало уменьшаться тифозное состояніе. Температура въ 10 ч. вечера 18 дня равнялась 38,8° Ц.. Съ 20 дня начато измѣненіе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | Вѣс.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20           | 38700 | 37,4 | 37,5 | 37,8 | 38,9 | 38,3 | 38,5 | 38,8 | 38,2 | 38,5 | 37,6 | 36,9 | 37,5 |
| 21           | 38700 | 37,2 | 37,7 | 38,4 | 38,2 | 38,7 | 39,0 | 37,9 | 37,1 | 37,6 | 37,3 | 37,5 | 37,5 |
| 22           | 38700 | 37,2 | 37,1 | 37,3 | 37,2 | 37,6 | 37,8 | 37,9 | 37,7 | 37,8 | 38,4 | 37,5 | 37,2 |
| 23           | 38800 | 37,0 | 36,6 | 37,0 | 37,5 | 37,8 | 37,7 | 38,4 | 37,6 | 37,4 | 37,3 | 37,2 | 36,9 |
| 24           | 38700 | 36,4 | 36,7 | 36,7 | 37,1 | 37,2 | 37,6 | 37,6 | 37,5 | 37,6 | 37,4 | 37,6 | 36,5 |
| 25           | 39100 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 36,9 | 37,3 | 37,1 | 37,3 | 37,6 | 37,4 | 37,3 | 36,5 | 36,5 |

Съ 26 до 48 дня температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,4° Ц., давъ въ 6 часовъ утра 33 дня и въ 12 часовъ дня 39 дня 37,5° Ц. Съ 48 до 51 дня были такія повышенія:

| День болѣзн. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 48           | 37,2 | 37,1 | 37,2 | 37,5 | 37,7 | 37,4 | 37,3 | 37,1 | 36,7 | 36,5 | 36,9 | 37,1 |
| 49           | 37,3 | 37,1 | 37,2 | 37,0 | 37,2 | 37,1 | 37,3 | 37,1 | 37,3 | 36,9 | 36,1 | 36,3 |
| 50           | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,2 | 37,4 | 37,3 | 37,0 | 37,2 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | 36,6 |
| 51           | 37,0 | 37,2 | 37,2 | 37,7 | 36,9 | 37,1 | 36,9 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | 36,7 | 37,3 |

Съ 52 до 54 дня температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,1—37,3° Ц. Пища какъ до, такъ и во время указанныхъ повышеній одна и та же: супъ, котлета, 2 маньяны каши, 1 ф. бѣл. и ½ ф. черн.. Ходъ вѣса тѣла съ 26 до 54 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 39000 (26) | 38800 | 38500 | 38700 | 38800 | 38500 | 38400 | 38600 | 38700 | 38800 |
| 38800 (36) | 39200 | 39400 | 40000 | 40200 | 39800 | 40600 | 40400 | 39900 | 40400 |
| 40300 (46) | 40200 | 40800 | 41000 | 41300 | 41800 | 41900 | 41900 | 41900 |       |

Объективные же явленія съ 20 дня шли такъ: съ 20 до 25 дня стулъ по 1—2 р. жидко; съ 26 до 41 стулъ 1—2 р. ввидѣ густой кашицы; съ 41 до 43 дня снова стулъ по 1—3 р. жидко; съ 44 до 46 испражненіе оформлено желтое, съ 47 до 54 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 1700—5500 к. с. при уд. вѣсѣ 1,008—1,005 со слѣдами бѣлка до 21 дня. Чаю больной выпивалъ по 1600—3200 к. с. въ сутки. Съ 20 дня исчезло тифозное состояніе. Печень про-

шупывалась до 23 дня. Головная боль прошла на 24 день. Съ 25 дня не было свистовъ въ груди. Съ 24 до 30 дня было головокруженіе. Селезенка, уменьшаясь постепенно, перестала прощупываться съ 46 дня. Языкъ съ 49 дня оставался чистымъ. При выпискѣ на 54 день болѣзни измѣній со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 8. № пр. журн. 8420. Крестьянинъ П—въ, 18 лѣтъ, поступилъ 30 IX 93 г. на 9 день болѣзни, жалуюсь на головную боль и поносъ.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Порядочное тифозное состояніе. Обложенный языкъ. На кожѣ груди розеола. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не намѣнена. Печень не прощупывается. Селезенка тверда, на 1 палецъ въ-за края реберъ. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 20 дня таковы:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| утр. | 39,6 | 39,5 | 39,0 | 39,3 | 39,0 | 39,2 | 38,8 | 39,3 | 38,5 | 38,2 | 38,4 |
| веч. | 40,0 | 40,1 | 39,8 | 39,7 | 39,6 | 39,8 | 39,9 | 39,5 | 39,5 | 39,7 | 39,0 |

Вѣсъ тѣла: 59500—58600—58800—58300—58700—57700—57300—57100—57500—58500—55500.

Начиная съ 10 дня дѣлалось ежедневно 2 ванны 28° R. Пищею было молоко: на 9 день 600 к. с., на 10—12 день 1800 к. с., а съ 13 до 20 дня 2400 к. с. Объективных же явленія до 20 дня были: стулъ 1—4 р. жидко; количество мочи 800—3000 к. с., уд. вѣса 1.021—1,008, съ незначительнымъ количествомъ бѣлка до 14 дня и слѣды бѣлка на 18 и 20 дни; р. по Эралику до 15 дня. На 10 и 11 день сильное тифозное состояніе. Бредъ тихій до 13 дня. Затѣмъ тифозное состояніе, постепенно уменьшаясь, исчезло на 20 день. Селезенка съ 11 дня прощупывалась на 2 пальца. Розеола держалась до 12 дня. Съ 21 дня съ 6-ти ч. вечера начато измереніе температуры чрезъ 2 часа, причемъ ходъ ея въ этотъ день былъ такой: въ 8 ч. утра—38,8°, а съ 6-ти часовъ вечера: 36,8; 36,8; 37,1; 37,0; 37,2; 37,3; 37,0. Съ 22 же дня до 48-го температура колебалась при двухчасовомъ измѣреніи между 36,0—37,2°, давъ въ 10 часовъ утра 41 дня 37,3° Ц. Съ 48 же до 54 дня ходъ температуры при той же пищѣ былъ такой:

| День болѣзни. | Температура |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|               | 8           | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
| 48            | 36,7        | 36,2 | 36,1 | 36,8 | 36,2 | 36,4 | 36,3 | 36,2 | 36,4 | 36,4 | 36,5 | 36,6 |
| 49            | 36,8        | 36,6 | 36,9 | 37,6 | 37,0 | 36,9 | 36,7 | 36,4 | 36,3 | 36,4 | 36,7 | 36,4 |
| 50            | 36,8        | 36,8 | 36,3 | 37,2 | 37,0 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,1 | 36,2 | 36,4 | 36,6 |
| 51            | 36,5        | 37,3 | 37,2 | 37,1 | 37,6 | 36,6 | 36,4 | 36,0 | 36,5 | 36,6 | 36,5 | 36,6 |
| 52            | 37,0        | 37,4 | 37,0 | 37,4 | 36,9 | 36,5 | 36,4 | 36,3 | 36,8 | 36,3 | 36,7 | 36,7 |
| 53            | 37,1        | 36,6 | 36,5 | 36,8 | 36,6 | 36,0 | 36,2 | 36,0 | 36,3 | 36,2 | 36,1 | 36,0 |
| 54            | 37,0        | 37,2 | 37,6 | 37,4 | 37,6 | 37,2 | 36,9 | 36,7 | 36,3 | 36,6 | 37,0 | 37,1 |

Въ дальнейшемъ своемъ теченіи температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,4°, давъ въ 10 утра 61 дня 37,5° Ц. Ходъ вѣса тѣла съ 21 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54100 (21) | 52800 | 52000 | 51700 | 51400 | 51200 | 51600 | 51100 |
| 51200 (29) | 50500 | 50700 | 50500 | 51000 | 51500 | 51700 | 51000 |
| 51200 (37) | 51700 | 51400 | 51000 | 52000 | 52800 | 53000 | 52300 |
| 53100 (45) | 52900 | 53600 | 53900 | 54200 | 53800 | 54800 | 54200 |
| 54900 (53) | 55100 | 55200 | 54700 | 54900 | 56000 | 56800 | 56500 |
| 56800 (61) | 56400 | 56100 | 57000 | 57900 | 57900 | 58500 | 58700 |

Объективные же явленія съ 21 дня болѣзни шли такъ: стулъ 1—2 р. жидко до 34 дня; съ 35 до 38 дня испражненіе ввидѣ густой кашицы, желтое; съ 39 до 41 испражненіе оформлено; желтое, а съ 42 до 44 оформлено и хорошо окрашено; на 45 и 46 день стула не было; съ 47 до 52 дня снова оформлено, желтое; съ 53 до 58 дня ввидѣ густой кашицы, желтое, на 59 день такое же, но цвѣта глины, а съ 60 и до 69 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2200 до 5000 к. с. при уд. вѣсѣ 1013—1,005 безъ бѣлка. Чаю больная выливала по 1600—4000 к. с. въ сутки. Съ 21 до 38 дня держалось головокруженіе. Съ 58 дня языкъ оставался чистымъ. Съ 66 дня селезенка не прощупывалась. Субъективныхъ ощущеній повышенія температуры не дали. При выпискѣ на 69 день болѣзни измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось, а вѣсъ тѣла=58800 граммъ.

№ 9. № пр. журн. 6867. Крестьянинъ Ф—въ, 18 лѣтъ, поступилъ 14/УШ 93 г. на 10 день болѣзни, жалуюсь на головную боль и поносъ.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и

селезенки не изменена. Печень не прощупывается. Селезенка твердая, выдвигается на 1 палец из-за края ребер. Ходь температуры и веса тела до 16 дня таковы:

Т-ра утр. 37,5 37,6 37,3 38,0 37,4 37,2  
веч. 39,0 38,9 38,8 38,8 39,4 38,5 38,4

Весь тела: 46000—45500—45100—44600—44900.

Пищевое было молоком на 10—11 день, а с 12 до 23 дня 1800 к. с. Объективные явления до 16 дня болезни были: стул 1—3 р. жидко; мочи 1400—1900 к. с., уд. веса 1,013—1,006 безь бѣлка, р. по Эрляку отрицательная. Съ 13 дня сильное головокружение при уменьшении головной боли. Исчезание тифозного состояния на 16 день. Съ 17 дня начало изменение температуры и ходь ее былъ такой:

| День болѣзн. | Весь. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 17           | 44600 | 36,8 | —    | —    | —    | 37,8 | 38,4 | 38,0 | 38,1 | 38,0 | 37,6 | 37,0 | 37,0 |
| 18           | 43800 | 36,7 | 36,5 | 36,7 | 37,1 | 37,3 | 37,7 | 38,4 | 38,7 | 38,3 | 37,8 | 36,9 | 37,0 |
| 19           | 43500 | 36,4 | 36,4 | 36,9 | 37,5 | 37,0 | 37,9 | 37,5 | 37,4 | 37,0 | 37,0 | 37,2 | 36,3 |
| 20           | 42900 | 36,2 | 36,6 | 36,5 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 38,3 | 38,1 | 38,0 | 37,4 | 37,0 | 36,5 |
| 21           | 43400 | 36,0 | 36,4 | 37,0 | 36,8 | 36,8 | 37,1 | 37,7 | 37,6 | 37,6 | 37,7 | 37,0 | 36,5 |
| 22           | 43100 | 36,3 | 36,1 | 36,2 | 36,6 | 36,6 | 37,0 | 37,2 | 37,0 | 36,9 | 36,7 | 37,0 | 36,7 |
| 23           | 42900 | 36,7 | 36,0 | 36,6 | 37,0 | 36,7 | 37,2 | 37,5 | 37,5 | 37,2 | 37,0 | 37,2 | 36,8 |
| 24           | 42800 | 36,3 | 36,2 | 36,3 | 36,6 | 36,5 | 37,0 | 37,2 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 36,4 | 36,5 |
| 25           | 43000 | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 36,9 | 36,6 | 37,5 | 37,5 | 37,6 | 37,8 | 37,3 | 37,1 | 37,3 |
| 26           | 43000 | 36,1 | 36,4 | 36,7 | 37,0 | 36,5 | 37,6 | 37,6 | 37,4 | 37,3 | 36,9 | 36,2 | 36,0 |
| 27           | 42700 | 36,3 | 36,1 | 36,5 | 36,5 | 36,7 | 37,1 | 37,0 | 37,0 | 37,4 | 37,1 | 36,5 | 36,9 |

Давь въ 10 часовъ вечера 28 дня 37,3°, въ 6 часовъ 29 дня 37,1°, въ 2 и 4 часа утра 32 дня 37,0°, температура въ дальнейшемъ своемъ теченіи при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—36,9°C. вплоть до 61 дня болѣзни. Ходь же веса тела съ 28 до 61 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 42800 (28) | 43200 | 43200 | 43200 | 43900 | 43500 | 43200 | 43400 | 43700 |
| 43400 (37) | 43300 | 43000 | 43700 | 44100 | 43200 | 43600 | 43200 | 43400 |
| 43400 (46) | 44200 | 43500 | 43600 | 44700 | 45000 | 44700 | 43300 | 45800 |
| 45200 (56) | 46000 | 46400 | 46500 | 47200 | 46900 | 47300 |       |       |

Объективными же явления изменялись такъ: съ 17 до 29 дня стулъ по 1—2 р. въ сутки жидко, также вечеромъ 31 и 33 дней; утромъ же 30, 33 и съ 34 до 45 дня по 1—2 р.

видѣ густой кашицы; съ 45 до 48 дня испражненіе оформлено, желтое; съ вечера 49 до утра 52 испражненіе оформлено, бурого цвѣта, а съ 52 до 61 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2200 до 5200 к. с., при уд. вѣсѣ 1,008—1,005, безь бѣлка. Чаю больной выпивалъ по 1600—4400 к. с. въ сутки. Головокружение исчезло на 26 день. Языкъ оставался чистымъ съ 51 дня. Съ 53 дня прощупывался край селезенки, съ каковымъ ея состояніемъ больной и выписался на 61 день болѣзни, не имѣя другихъ измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ.

№ 10. № пр. журн. 8903. Крестьянинъ К—нъ, 19 лѣтъ, поступилъ 18/X 93 г. на 8(?) день болѣзни, жалуюсь на головную боль и слабость.

Ст. рг. Хорошаго тѣлоосложения и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обожженный языкъ. На кожѣ туловища нѣсколько розеолъ. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не изменена. Печень не прощупывается, селезенка—на 1 палецъ. Ходь температуры и веса тела до 18 дня таковы:

Т-ра утр. 39,0 38,6 38,0 38,5 38,6 37,8 37,8 37,6 37,3 37,8 37,0  
веч. 39,9 39,8 39,6 39,4 39,3 39,0 38,8 39,0 38,9 38,1 38,0

Весь тела: 45000—44300—44000—43800—43600—43400—42500—42600—42400—41700.

Ежедневно дѣлалась 1 ванна 28° вечеромъ. Пищевое—молоко. на 8 и 9 дни по 1000 к. с., а съ 10 до 18 дня 1700 к. с. Объективными явления шли такъ: до 15 дня стулъ 1—2 раза, жидко; на 16 день стула не было, на 17 день утромъ одно испражненіе въ видѣ густой кашицы, а вечеромъ 17 дня оформлено, желтое; мочи 900—2800 к. с., уд. вѣса 1,020—1,008 съ незначительнымъ количествомъ бѣлка; р. по Эрляку отрицательная. Съ 10 дня не было тифозного состоянія. Съ 13 дня не было головной боли. Съ 17 дня хорошей аппетитъ. Съ 19 дня начало измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходь ее былъ такой:

| День болѣзн. | Всѣ.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 19           | 41500 | 36,5 | —    | —    | —    | —    | 37,0 | 38,5 | 38,5 | 38,7 | 38,6 | 38,5 | 36,3 |
| 20           | 41200 | 36,5 | 36,0 | 36,3 | 36,6 | 36,6 | 36,7 | 37,6 | 38,1 | 37,8 | 38,4 | 37,7 | 37,1 |
| 21           | 41400 | 36,6 | 36,7 | 36,6 | 36,3 | 36,2 | 36,8 | 37,3 | 37,6 | 37,3 | 37,3 | 37,6 | 36,0 |

Съ 22 до 54 дня температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36—37,1°С. Изъ этого ея общаго хода слѣдующіе дни представляютъ исключенія, приходившіяся на 2 часа пополуни: 33, 48 и 52 дни, когда она=37,2°С., и 51 день, когда она=37,4°С. Съ 54 же дня ходъ температуры былъ такой:

| День болѣзн. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 54           | 36,4 | 36,6 | 36,7 | 37,5 | 37,9 | 36,8 | 36,5 | 36,4 | 36,2 | 36,3 | 36,5 | 36,8 |
| 55           | 36,9 | 37,1 | 37,5 | 37,4 | 37,0 | 36,6 | 36,4 | 36,4 | 36,3 | 36,5 | 36,5 | 36,3 |
| 56           | 36,5 | 36,9 | 37,3 | 37,2 | 37,0 | 36,7 | 36,4 | 36,1 | 36,7 | 36,5 | 36,0 | 36,5 |

Съ 57 до 59 дня колебалась между 36,0—37,2°С. Пища съ 40 дня до 51 включительно была: супъ, котлета, 2 манн. кашн, 1000 к. с. молока, 1 ф. бѣлаго, а съ 51 до 57 дня прибавлено было еще 1/2 ф. чернаго хлѣба. Ходъ вѣса тѣла съ 22 до 59 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41100 (22) | 41000 | 41100 | 41000 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41300 | 41800 |
| 41900 (32) | 41300 | 41000 | 41500 | 41600 | 42000 | 42200 | 42400 | 42600 | 42900 | 42900 |
| 43200 (42) | 43400 | 43600 | 43500 | 43500 | 43700 | 44100 | 44000 | 44300 | 44300 | 44700 |
| 44700 (52) | 44900 | 45300 | 45500 | 45400 | 45900 | 45600 | 45900 | 45900 |       |       |

Объективная же явленія извѣщались такъ: съ 19 до 34 дня испражненіе по 1 разу въ сутки оформлено, желтое; съ 34 до 37 дня видѣ густой кашицы, желтое; съ 38 до 41 дня снова оформлено желтое; съ 42 до 49 дня снова видѣ густой кашицы, желтое; на 49 день опять оформлено, желтое; на 50—52 дни оформлено и хорошо окрашено; на 53—54 дни снова видѣ густой кашицы, желтаго цвѣта; на 55—57 дни половинна оформлена, половина видѣ густой кашицы темнаго цвѣта; а съ вечера 57 дня до 59 оформлено, желтое. Количество мочи колебалось отъ 2600 до 5200 к. с., при уд. вѣсѣ 1,008—1,005, съ незначительнымъ количествомъ бѣлка на 19 день и садами бѣлка до 23 дня. Чаю большой выпивалъ отъ 2400 до 4800 к. с. въ сутки. Языкъ оставался чистымъ съ 52 дня. Селезенка съ 30 до 37 дня прощупывалась на 1/2 палца, съ 37 до 58 дня прощупывалась край. Субъективно повышеніе температуры на 55 день ничѣмъ не сказалось. При вышнѣхъ на 59 день болѣзни измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 11. № пр. журн. 4648. Крестьянинъ Еф—въ, 19 лѣтъ, поступилъ 30/У 93 г., на 6 день болѣзни, жалуясь на головную боль и общее недомоганіе.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія. Отличнаго питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обожженный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Печень не прощупывается; селезенки край. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 18 дня болѣзни таковы:

|            |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Т-ра       | утр. | 38,6  | 38,4  | 37,7  | 38,2  | 38,2  | 38,8  | 38,8  | 38,4  | 38,4  | 38,6  | 38,3  | 38,0   |
|            | веч. | 38,2  | 39,3  | 39,6  | 39,8  | 39,2  | 39,4  | 39,2  | 38,5  | 38,8  | 38,8  | 38,2  | 39,2   |
| Вѣсъ тѣла: |      | 75700 | 74500 | 74400 | 74400 | 73400 | 73100 | 72500 | 72100 | 71900 | 71500 | 71500 | 70500. |

Ежедневно дѣлалось 2 ванны 28°С. Пища—молоко: на 6 и 7 дни по 1000 к. с., на 8—12 дни 2200 к. с., а съ 13 до 18 дня 2500 к. с. Объективные явленія до 18 дня были: стулъ 1—2 р. въ сутки жидко; мочи 300—3200 к. с., уд. вѣса 1,032—1,010 безъ бѣлка; р. по Эрлиху положительна до 14 дня. Небольшое носовое кровотеченіе утромъ 7 дня. Съ 9 дня селезенку прощупать не удавалось. Съ 10 дня появились кое-гдѣ въ груди высокіе свѣты. Позывъ на пищу съ 11 дня. Съ 17 дня не было головной боли, а только головокруженіе. На 18 день исчезло тифозное состояніе. Съ 19 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | Вѣс.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 19           | 70000 | 37,4 | —    | —    | —    | —    | 38,0 | 38,4 | 38,5 | 38,7 | 38,5 | —    | —    |
| 20           | 69700 | 37,8 | —    | —    | —    | —    | 37,8 | —    | —    | 38,2 | 37,5 | 36,1 | 37,3 |
| 21           | 69200 | 37,3 | 37,4 | 38,1 | 38,3 | 38,0 | 37,5 | 37,7 | 37,6 | 37,2 | 37,7 | 37,1 | 37,5 |
| 22           | 68800 | 36,9 | 38,2 | 38,3 | 38,1 | 37,9 | 37,7 | 37,7 | 37,4 | 37,3 | 37,2 | 37,3 | 37,3 |
| 23           | 68700 | 37,5 | 37,7 | 37,8 | 37,8 | 37,2 | 37,3 | 37,5 | 37,6 | 37,2 | 37,0 | 36,9 | 36,7 |
| 24           | 68000 | 37,1 | 37,2 | 37,2 | 37,5 | 37,2 | 37,3 | 37,2 | 37,0 | 36,8 | 36,9 | 37,1 | 36,9 |

Давъ затѣмъ въ 2 часа пополуни 25, 34 и 39 дня 37,4° и въ 2 часа пополуни 38 дня 37,5°, въ остальные дни съ 21 до 41 температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36—37,3° С. (Пищено до 25 дня было 2500 к. с. молока, кисель и бульонъ). Съ 41 до 44 дня и на 53 день была повышенія температуры такого рода:



Объективные же явления изменялись так: стул по 1—2 р. жидкий до 18 дня, на 19—22 день введъ густой кашицы; въ ночь на 23 день 1 жидкое испражнение; на 24 день введъ густой кашицы; на 25—26 дня оформлено желтое; на 27—29 оформлено и хорошо окрашено; съ 30 и до 37 снова введъ густой кашицы, желтое; съ 38 до 43 дня оформлено, желтое; на 44—45 дни оформлено, цвѣта глины и, наконецъ, съ 46 до 50 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 1600—5600 к. с. при уд. вѣсѣ 1,012—1,005 безъ бѣлка. Чаю большой выпивать по 1600—4400 к. с. въ сутки. Съ 21 дня не было головокружения. Языкъ оставался чистымъ съ 32 дня. Съ 25 дня прощупывался край селезенки, а съ 47 дня селезенка не прощупывалась. Субъективныхъ ощущений повышения температуры не вызывали. При выпискѣ на 50 день измененийъ со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 13. № пр. журн. 1712. Крестьянинъ Ст—съ, 22 лѣтъ, поступилъ 3/III 93 г. на 8 день болѣзни, жалуюсь на головную боль и поносъ.

Ст. пр. Хорошаго тѣлосложения и чистаго. Порядочное тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только разбросанные въ небольшомъ количествѣ высокіе свѣты. Верхняя граница тупости печени и селезенки не намѣнена. Прощупывается край печени, а селезенка на 2 пальца. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 15 дня таковъ:

Т-ра утр. 38,5 39,0 38,7 38,3 38,5 39,0 38,6 38,4.  
веч. 39,5 39,2 39,3 39,7 40,2 38,8 38,8 38,4.

Вѣсъ тѣла: 53400—52400—52300—51900—51600—51400—51200.

Ежедневно 1 ванна 28° R вечеромъ. Пища на 8 день 1000 к. с. молока, а съ 9 и до 17 дня бульонъ, 2 яйца, 2200 к. с. молока. Объективные явления до 15 дня были: стул 1—3 р. жидкий; мочи 200—2000 к. с., уд. вѣса 1,023—1,010, съ незначит. количествомъ бѣлка до 13 дня, свѣды на 14 и 15 дни. Съ 11 дня селезенка выдавалась на 2½ пальца. На 15 день тифозное состояние было выражено слабо, а печень не прощупывалась. Съ 16 дня начато изменение температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ таковой:

| День болѣзн. | Вѣс.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16           | 51400 | 39,5 | —    | —    | —    | —    | 37,8 | —    | —    | —    | 37,5 | 37,3 | 37,7 |
| 17           | 50800 | 38,3 | 37,8 | 37,3 | 37,0 | 36,8 | 37,4 | 37,8 | 38,0 | 38,1 | 37,5 | 37,3 | 37,3 |
| 18           | 50500 | 37,7 | 37,6 | 37,1 | 37,2 | 37,1 | 37,3 | 37,6 | 37,0 | 37,1 | 37,2 | 37,3 | 37,7 |
| 19           | 50500 | 37,9 | 37,9 | 37,6 | 37,7 | 37,6 | 37,5 | 36,9 | 36,6 | 36,4 | 36,5 | 36,7 | 36,9 |

Давъ въ 8 часовъ утра 20 дня 37,3° Ц., температура затѣмъ до 31 дня колебалась между 36—37,1° Ц. Съ 31 до 35 дня температура колебалась между 36—37,3°, при этомъ въ 12 и 2 часа дня 31 дня дала 37,4° Ц. На 35 день было повышение температуры.

35 | — | 37,0 36,7 37,7 37,1 36,8 36,8 36,4 36,0 36,1 36,0 36,7 36,9

а на 36 и 37 день опять колебалась между 36—37,2° Ц. Ходъ вѣса тѣла съ 20 дня таковой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 50300 (20) | 49900 | 49700 | 49600 | 49900 | 50100 | 50200 | 51000 | 50800 |
| 51400 (29) | 51800 | 51700 | 51900 | 52000 | 52400 | 52900 | 53200 | 54000 |

Объективные же явления изменялись такъ: до 21 дня стулъ жидко 1—3 р. въ сутки; на 23—24 дни испражнение введъ густой кашицы, съ 25 до 32 дня испражнение оформлено, желтое; на 32—33 день оформлено, цвѣта глины, а съ вечера 33 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2900 до 5500 к. с., при уд. вѣсѣ 1,009—1,005, безъ бѣлка; р. по Эрлиху была положительною до 16 дня. Чаю большой выпивать по 2400—3200 к. с. въ сутки. На 16 день исчезло тифозное состояние. Съ 20 дня не было свистовъ въ груди. Съ 25 дня селезенка прощупывалась на 1½ пальца, съ каковымъ ея состояниемъ и выпивать на 37 день болѣзни. Съ 28 дня языкъ оставался чистымъ. Субъективныхъ ощущений повышение температуры на 35 день не дало.

№ 14. № пр. журн. 5891. Крестьянинъ Р—нь, 24 лѣтъ, поступилъ 9 VII 93 г. на 11 день болѣзни, жалуюсь на головную боль и поносъ.

Ст. пр. Хорошаго тѣлосложения. Небольшое тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только кое-гдѣ отдѣльные высокіе свѣты. Селезеночная тупость съ 8 ребра. Верхняя граница тупости печени не намѣнена. Селезенка прощупывается на ½ пальца; печень не прощупывается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 17 дня таковой:

Т-ра утр. 38,8 38,8 38,4 37,4 37,1 37,5  
веч. 39,0 40,0 39,5 38,9 38,2 38,1 38,2 1 ванна 28° R вечеромъ.  
Вѣсъ тѣла: 49700—49000—49300.

Пищу было молоко: до 14 дня 1000 к. с., а сь 15 до 19 дня 2200 к. с. Объективные явления до 17 дня были: стул 1—2 р. въ сутки жидкий; мочи 400 — 800 к. с., уд. вѣса 1,026—1,025, со слѣдами бѣлка до 16 дня; р. по Эрлиху положительная до 17 дня. Селезенка сь 16 дня выдавалась почти на 1 палецъ изъ-за края реберъ. На 17 день не было ни свистовъ въ груди, ни тифознаго состоянія. Сь 18 дня начало измѣненіе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | 8    | 10 | 12 | 2 | 4 | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|------|----|----|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 18           | 38,0 | —  | —  | — | — | 37,8 | 37,8 | 38,0 | 38,0 | 38,1 | 37,8 | 37,0 |

Сь 19 до 23 дня температура колебалась между 36,1—37,3°, а сь 23 дня шла такъ:

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23 | 36,6 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 36,6 | 36,5 | 37,0 | 36,7 | 36,8 | 37,0 | 37,2 | 37,0 |
| 24 | 37,8 | 37,3 | 37,0 | 36,8 | 37,0 | 36,8 | 37,1 | 36,3 | 36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,8 |

Пища на 23 и 24 дни была: бульонъ, кисель, 1 манн. каша, 1700 к. с. молока. Сь 25 до 41 дня температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36—36,9°, давъ въ 10 часовъ вечера и въ 2 часа ночи 30 дня 37,1° Ц. и 37° Ц. въ 2 часа дня 34 дня. Ходъ вѣса тѣла сь 18 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 48800 (18) | 48400 | 48200 | 48100 | 48000 | 48600 | 48600 | 48500 |
| 48700 (26) | 48400 | 48400 | 48200 | 48600 | 48800 | 49000 | 49300 |
| 49200 (34) | 50000 | 50300 | 50600 | 51000 | 51700 | 52000 | 52300 |

Объективные же явленія измѣнились такъ: до 26 дня стулъ по 1 р. въ сутки жидко; сь 27 до 29 дня испраженіе видѣтъ густой кашки; сь 30 до 38 дня оформлено, желтое, а сь 38 до 41 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 1800 до 4500 к. с., при уд. вѣсѣ 1,012—1,005, безъ бѣлка. Сь 31 дня языкъ оставался чистымъ. Сь 32 дня не прощупывалась селезенка. При выдискѣ на 41 день болѣзни измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 15. № пр. журн. 5012. Крестьянинъ Г—въ, 26 лѣтъ, поступилъ 10 VI 93 г. на 7 (?) день болѣзни.

Ст. рг. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Порядочное тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только отдѣльные высокие свисты. Селезеночная тупость

сь 8 ребра. Верхняя граница тупости печени не измѣнена. Печень не прощупывается. Селезенка прощупывается край. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 19 дня таковъ:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| утр.       | 39,0  | 38,6  | 38,7  | 38,8  | 39,0  | 38,5  | 38,6  | 38,2  | 38,8  | 38,3  | 37,8  | 37,2  | 36,9  |
| веч.       | 39,6  | 39,8  | 39,5  | 39,2  | 39,3  | 39,4  | 39,3  | 39,2  | 39,0  | 38,6  | 38,4  | 39,8  | 37,2  |
| Вѣса тѣла: | 57000 | 56000 | 55200 | 54700 | 54600 | 54200 | 53600 | 52900 | 52000 | 51800 | 51200 | 51000 | 50800 |

До 16 дня дѣлалось по 2 ванны 28° R., а затѣмъ по одной. Пищу было молоко: до 7 и 8 дни по 1000 к. с., а сь 9 по 20 день 2500 к. с. Объективные явленія до 19 дня были: стул 1—4 р. въ сутки жидко; мочи 200—1400 к. с., уд. вѣса 1,025—1,013, со слѣдами бѣлка до 11 дня, а сь 13 дня бѣлка незначительное количество; р. по Эрлиху положительная до 16 дня. Сь 8 до 12 дня сильно тифозное состояніе съ бредомъ. Сь 13 дня тифозное состояніе, постепенно уменьшаясь, исчезло на 19 день. Сь 16 дня не удавалось прощупать селезенку. Температура въ 8 ч. вечера 19 дня равнялась 38,2° Ц. Сь 20 дня начало измѣненіе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20           | 36,6 | 37,2 | 36,9 | 36,9 | 36,8 | 37,0 | 37,7 | 37,4 | 37,2 | 37,4 | 36,9 | 37,0 |
| 21           | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 36,6 | 37,3 | 37,1 | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 37,0 |

Сь 22 до 30 дня температура колебалась между 36—37,1° Ц.  
 > 30 > 35 > > > > > 36—37,2° Ц.  
 > 35 > 39 >, давъ въ 4 ч. дня 35 дня 37,5° > 36—37,4° Ц.

На 39 | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 37,5 | 37,6 | 37,4 | 37,2 | 36,9 | 36,1 | 36,1 | 36,2 | 36,8

а сь 40 до 43 дня снова колебалась между 36—37,2°, давъ въ 2 часа дня 42 дня 37,4° Ц. Ходъ вѣса тѣла сь 20 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52000 (20) | 52200 | 52300 | 52400 | 52700 | 52600 | 53000 | 53000 |
| 53100 (28) | 53400 | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 | 54700 | 57600 |
| 57300 (36) | 57600 | 58000 | 58400 | 58000 | 57700 | 58700 | 58600 |

Объективные же явленія сь 20 дня измѣнились такъ: на 20—21 стулъ по 2 р. жидко; сь 22 до 24 дня испраженіе видѣтъ гу-

стой кашицы; съ 25 до 28 дня оформлено, желтого цвета; на 29—30 дни снова испражнение ввидъ густой кашицы; съ 32 до 39 дня оформлено и окрашено въ темный цвѣтъ; съ вечера 39 до утра 41 снова ввидъ густой кашицы, а съ вечера 41 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2200 до 5000 к. с., при уд. вѣсѣ 1,010—1,005, со слѣдами бѣла на 20 день. Чаю большой выпивалъ отъ 2000 до 3200 к. с. въ сутки. Съ 33 до 40 дня языкъ былъ чистымъ; на 40—41 день снова слегка обложился. Субъективныхъ ощущений повышения температуры 39 дня не было (пищю съ 33 дня было: супъ, котлета, 2 мани. кашн, 250 к. с. молока, 1 ф. бѣл., ½ ф. черн. хлѣба). При выпискѣ на 43 день измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 16. № пр. журн. 6631. Крестьянинъ Т—въ, 32 лѣтъ, поступилъ 6/VIII 93 г. на 6 день болѣзни, жалуюсь на головную боль и знобы.

St. pr. Хорошаго тѣлосложения и питания. Небольшое тифозное состояніе. Обожженный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Ни печени, ни селезенки не прощупываются. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 14 дня болѣзни таковы:

|            |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |
|------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Т-ра       | утр. | 38,5  | 38,2 | 38,8  | 38,2 | 38,0  | 37,5 | 38,3  | 37,6 | 37,5  |
|            | веч. | 39,0  | 39,3 | 39,6  | 39,2 | 38,9  | 38,8 | 38,7  | 38,2 | 38,1  |
| Вѣсъ тѣла: |      | 65700 | —    | 63100 | —    | 64800 | —    | 64200 | —    | 64000 |
|            |      |       |      |       |      |       |      | 63300 |      | 62800 |

Ежедневно дѣлалась одна ванна 28°R. вечеромъ. Пищю было молоко: на 6—7 дни по 1000 к. с., съ 8 до 20 дня 1800 к. с. Объективные явленія шли такъ: стулъ 1—4 р. въ сутки жидко; мочи 500—900 к. с., уд. вѣса 1,022—1,012, съ незначительнымъ количествомъ бѣла отъ 8 до 11 дня, а съ 12 дня бѣла не было; р. по Эрлику положительная до 10 дня. Съ 9 дня появлялись въ груди отдѣльные высокие свисты. На 14 день исчезло тифозное состояніе. Съ 15 дня начала измѣненіе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзни. | 8    |      |      |      |      |      | 10   |      |      |      |      |      | 12   |      |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|               | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
| 15            | 37,2 | —    | —    | —    | —    | 37,8 | 38,2 | 38,0 | 37,6 | 37,4 | 37,5 | 37,6 | 37,8 | 38,2 | 38,0 | 37,6 | 37,4 | 37,5 |
| 16            | 37,1 | 37,2 | 37,7 | 36,9 | 37,5 | 38,0 | 38,2 | 37,8 | 37,6 | 37,8 | 37,5 | 37,0 | 38,5 | 38,9 | 37,1 | 37,2 | 38,0 | 37,6 |
| 17            | 36,8 | 36,9 | 37,1 | 37,2 | 38,0 | 37,6 | 37,9 | 37,6 | 37,8 | 37,4 | 36,5 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 37,3 | 37,9 | 37,6 | 37,6 |
| 18            | 36,6 | 36,7 | 37,3 | 37,9 | 37,6 | 37,6 | 37,4 | 36,6 | 36,4 | 36,5 | 36,7 | 36,1 |      |      |      |      |      |      |
| 19            | 37,0 | 36,2 | 36,9 | 36,9 | 37,4 | 37,0 | 37,4 | 37,3 | 37,1 | 37,1 | 36,4 | 37,3 |      |      |      |      |      |      |

Давъ въ 12 часовъ ночи 20 дня и въ 4 часа дня 27 дня 37,3, а также въ 8 часовъ вечера 26 дня 37,4° Ц., въ остальное время съ 20 до 28 дня т-ра колебалась между 36—37,1°; съ 28 же дня шла такъ:

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 28 | 37,1 | 36,9 | 37,2 | 37,1 | 37,4 | 37,4 | 37,2 | 37,0 | 37,2 | 37,0 | 36,5 | 36,9 |
| 29 | 36,8 | 37,6 | 37,5 | 37,6 | 37,7 | 37,6 | 36,9 | 36,8 | 37,2 | 37,1 | 37,8 | 37,8 |
| 30 | 36,9 | 37,0 | 36,8 | 37,6 | 37,6 | 37,4 | 37,1 | 37,0 | 36,8 | 36,9 | 36,8 | 37,4 |

а съ 31 до 62 дня т-ра колебалась при двухчасовомъ ея измѣреніи между 36—37,2°, давъ одинъ разъ въ 2 часа дня 32 дня болѣзни 37,3° Ц. (Пищю съ 29 до 38 дня болѣзни было: супъ, 2 яйца, 2 мани. кашн, 1000 к. с. молока, ½ ф. бѣл. хлѣба). Ходъ вѣса тѣла съ 15 дня такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 62100 (15) | 61500 | 61300 | 60700 | 60400 | 60000 | 59900 | 60000 |
| 60400 (23) | 60300 | 60700 | 60500 | 60500 | 60500 | 60600 | 61000 |
| 60600 (31) | 60100 | 60200 | 59900 | 60400 | 60100 | 60100 | 60200 |
| 60300 (39) | 60300 | 60900 | 61300 | 61200 | 61800 | 61300 | 62600 |
| 62300 (47) | 63300 | 63600 | 64000 | 63600 | 64200 | 64200 | 63000 |
| 64000 (55) | 63700 | 64700 | 64000 | 64000 | 64500 | 64400 | 64900 |

Объективные же явленія съ 15 дня измѣнялись такъ: до 22 дня стулъ 1—2 р. въ сутки жидко; съ 23 до 28 дня испражненіе ввидъ густой кашицы; на 29 стула не было; съ 30 до 32 снова стулъ по 2 р. въ сутки жидко; съ 33 до 37 дня опять ввидъ густой кашицы; на 38 день оформлено, желтое, а съ 39 в до 62 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 1200 до 4500 к. с., при уд. вѣсѣ 1,015—1,005, безъ бѣла. Съ 15 до 21 дня было головокруженіе. Съ 55 дня языкъ оставался чистымъ. Субъективныхъ ощущений повышения температуры 29—30 дня не было. При выпискѣ на 62 день болѣзни измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не было.

№ 17. № пр. журн. 3306. Крестьянинъ В—въ, 13 лѣтъ, поступилъ 28/IV 93 г. на 7 день болѣзни, жалуюсь на головную боль.

St. pr. Хорошаго тѣлосложения и питания. Порядочное тифозное

состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди разбросанные отдѣльные свисты, а подъ углами лопатокъ немного среднепупырчатыхъ хриповъ. Верхняя граница печени и селезенки не измѣнена. Селезенка прощупывается на  $\frac{1}{2}$  пальца. Печень не прощупывается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 21 дня таковъ:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Т-ра | утр. | 38,7 | 39,2 | 38,8 | 38,8 | 38,9 | 39,6 | 38,6 | 38,5 | 38,2 | 38,2 | 39,2 |
|      | веч. | 39,9 | 39,6 | 39,8 | 39,6 | 39,8 | 39,6 | 39,4 | 39,6 | 39,3 | 39,2 | 39,0 |
|      |      | 38,8 | 39,0 | 38,8 | 38,7 |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      | 39,2 | 38,8 | 37,9 | 38,9 |      |      |      |      |      |      |      |

Вѣсъ тѣла: 30500—30800—30400—30100—29800—29600—29600—29400—29200—28900—28600.

До 11 дня дѣлалась 1 ванна 28° R. Вечеромъ, а съ 11 до 21 дня по двѣ въ сутки. Пищью было молоко: на 7—10 дня по 1000 к. с., а съ 11 до 26 дня 1800 к. с.. Объективные явленія до 21 дня были: стулъ 1—4 р. въ сутки, жидкій; мочи 400—1200 к. с., уд. вѣса 1,020—1,008, безъ бѣлка; р. по Эрлиху положительная до 17 дня. Съ 14 дня селезенка прощупывалась на 1 палецъ. Съ 16 дня въ груди выслушивались только высокіе свисты, и съ этого же дня стало уменьшаться тифозное состояние. Температура въ 8 часовъ вечера 20 дня равнялась 38,3° C. Съ 22 дня начато измѣренье температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | 8    |      | 10   |      | 12   |      | 2    |      | 4    |      | 6    |      |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
| 22           | 38,8 | —    | —    | —    | —    | 37,5 | 38,3 | 39,4 | 39,4 | 39,7 | 39,0 | 39,0 |
| 23           | 37,1 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 37,8 | 38,8 | 39,5 | 39,4 | 38,8 | 37,9 | 36,0 | 36,9 |
| 24           | 37,7 | 39,8 | 40,1 | 38,6 | 37,6 | 37,4 | 37,3 | 37,1 | 37,7 | 37,6 | 37,8 | 37,4 |
| 25           | 37,9 | 38,0 | 38,1 | 37,6 | 37,6 | 37,5 | 37,2 | 37,5 | 37,1 | 36,9 | 36,6 | 36,8 |
| 26           | 39,1 | 37,9 | 37,5 | 37,1 | 37,1 | 37,0 | 36,2 | 36,4 | 36,5 | 36,8 | 36,6 | —    |

Съ 27 до 37 дня температура колебалась между 36—37,1°, давъ въ 12 дня и 10 часовъ вечера 28 дня, въ 4 часа дня 30 дня, въ 4 часа дня 35 дня и въ 12 пополудни 37 дня 37,2° C. а въ 6 часовъ 35 дня, 37,5° C. Съ 38 дня шла такъ:

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 38 | 37,0 | 37,2 | 37,2 | 37,5 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,0 | 36,7 | 36,3 | 36,9 | 37,4 |
| 39 | 37,1 | 37,3 | 37,5 | 37,8 | 37,7 | 37,8 | 38,2 | 37,7 | 37,2 | 36,4 | 36,8 | 37,3 |
| 40 | 37,4 | 37,3 | 37,2 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,2 | 37,0 | 36,7 | 36,2 | 36,3 | 37,0 |

Съ 41 же дня до 54 температура при двухчасовомъ ея измѣрени колебалась между 36,2—37,3, давъ на 41 день въ 4 часа дня и на 49 день въ 12. пополудни 37,4, а въ 2 часа дня 53 дня 37,5° C. Ходъ вѣса тѣла съ 22 дня болѣзни былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 28600 (22) | 28300 | 28200 | 27900 | 27900 | 27700 | 27900 | 28800 |
| 28500 (30) | 28600 | 28700 | 29000 | 29000 | 29000 | 28800 | 29400 |
| 29000 (38) | 28800 | 29400 | 29200 | 29300 | 29600 | 29300 | 29400 |
| 29400 (46) | 30000 | 30900 | 31300 | 30900 | 31700 | 31500 | 31400 |

Объективные же явленія измѣнялись такъ: съ 22 до 28 дня стулъ по 1—2 р. въ сутки, жидкій; съ 28 до 32 испражненіе ввидѣ густой кашицы; съ 32 до 40 оформлено, желтое; съ 40 до 43 дня снова ввидѣ густой кашицы, а съ 43 и до 54 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 1800 до 5000 к. с., при уд. вѣсѣ 1,008--1,065, безъ бѣлка. Чаю большой выпивалъ по 3200—3600 к. с. въ сутки. Съ 23 дня не было тифознаго состоянія. Съ 31 дня въ груди не выслушивались высокіе свисты. Съ 26 до 52 дня прощупывалась край селезенки. Съ 44 дня языкъ оставался чистымъ. При выпискѣ на 54 день болѣзни вѣсъ тѣла—31800 граммъ, а со стороны внутреннихъ органовъ измѣненій не замѣчалось. Субъективныхъ ощущеній повывшенія температуры на 39 день не дали.

№ 18. № пр. журн. 10129. Крестьянинъ Г.—въ, 13 лѣтъ, поступилъ 18—XII 92 г. на 14 день болѣзни, жалуясь на лопаточную боль и жаръ.

St. pr. Хорошаго тѣлосложения и питанія. Порядочное тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Прощупывается край печени; селезенка не прощупывается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 22 дня болѣзни таковъ:

|     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Тра | утр. | 39,3 | 39,2 | 39,1 | 39,0 | 39,4 | 39,2 | 39,4 | 38,6 | 37,8 |
|     | веч. | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 40,0 | 40,2 | 39,8 | 40,0 | 39,3 | 37,5 |

Вѣсъ тѣла: 36800—36300—35400—35500—34800—34700—34500.

Объективные же явленія шли такъ: стулъ 1—3 р. въ сутки жидкій; мочи 200—400 к. с., уд. вѣса 1,021, безъ бѣлка. Постепенное ослабленіе тифознаго состоянія и его исчезаніе на 22 день болѣзни. Температура въ 8 часовъ вечера 22 дня—38,2° C. Ни-

шею было молоко: на 14—15 день по 1000 к. с., а 16 до 25 дня 1700 к. с. Съ 16 дня дѣлалось ежедневно по 2 ванны 28 R, а до этого по одной (14 и 15 ни). Съ 23 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ей былъ такой:

| День болѣзн. | 8    | 10 | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23           | 37,2 | —  | 38,0 | 37,9 | 37,6 | 37,4 | 36,4 | 36,9 | 36,5 | 36,0 | 36,3 | 36,0 |

Съ 24 до 32 дня температура колебалась между 36,0—37,0° Ц. Съ 33 до 39 дня, давъ въ 2 часа дня 38 дня 37,5°, колебалась между 36,1—37,4° Ц., а на 40 день шла:

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 40 | 37,1 | 37,2 | 37,1 | 37,4 | 37,4 | 37,0 | 37,8 | 36,8 | 36,5 | 36,1 | 38,4 | 36,3 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

а съ 41 до 44 дня колебалась между 36,1—37,5° Ц. Ходъ же вѣса тѣла былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 34300 (23) | 34100 | 34100 | 34500 | 34600 | 34200 | 34500 | 34800 |
| 35200 (31) | 35900 | 35700 | 36100 | 35800 | 35400 | 35500 | 35700 |
| 36000 (39) | 35900 | 36400 | 37100 | 36500 | 37100 |       |       |

Объективные же явленія измѣнялись такъ: съ 23 до 25 стулъ по 1-2 р. въ сутки жидкія; съ 26 до 36 дня испраженіе ввидѣ густой кашницы, а съ 37 до 44 дня оформлено. Количество мочи колебалось отъ 900 до 3800 к. с., при уд. вѣсѣ 1,011—1,005, безъ бѣлка. Съ 23 дня головная боль прошла и появилось головокруженіе, державшееся до 35 дня. Съ 25 дня печень не прощупывалась. Съ 32 дня языкъ оставался чистымъ. Субъективныхъ ощущеній повышеніе температуры 40 дня не даю. (Пища съ 28 дня болѣзни смѣшанная—сушь, котлета, яйца вѣн макароны и хлѣбъ.) При выпискѣ на 44 день болѣзнь измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 19. № пр. журн. 3482. Крестьянинъ П.—въ, 13 лѣтъ, поступилъ 27—IV 93 г. на 14 день болѣзни, жалуются на общее недомоганіе и поносъ.

St. рг. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Сильное тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только отдѣльные высокіе свисты. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 33 дня болѣзни таковы:

| Т-ра | утр. 38,5 38,5 39,2 39,1 39,2 39,0 38,8 38,7 38,9 38,7 38,8 38,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      | веч. 39,4 38,5 39,8 40,0 39,9 39,4 39,3 39,7 39,2 39,3 39,4      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | утр. 38,8 38,5 38,4 38,3 38,4 38,2 37,7 37,1 36,8                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | веч. 39,1 39,7 38,2 39,4 40,0 40,0 39,2 38,8 38,2                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вѣсъ тѣла: 34300—34000—34300—34200—33900—33700—33200—32900—32200—32200—31700—31600—31400—31300—30900—30700—30500—30400.

Ежедневно съ 16 дня дѣлалось по 2 ванны 28° R, а на 15 день одна. Пища—молоко: на 14—15 день по 1000 к. с., съ 16 до 21 дня 1700 к. с., а съ 22 до 38 дня 1800 к. с., при чемъ съ 27 дня данъ еще бульонъ и кашка. Объективные явленія до 33 дня были: стулъ 1—3 р. въ сутки жидкія; мочи 600—2000 к. с. (до 20 дня зачастую мочился и марался подъ себя), уд. вѣса 1,025—1,005, съ незначит. количествомъ бѣлка до 19 дня; слѣды бѣлка съ 20 до 24 дня, а съ 24 до 33 дня опять незначит. количество; р. по Эрлиху положительная до 25 дня. Съ 17 до 24 дня селезенка прощупывалась на 1 палецъ, а затѣмъ, постепенно сокращаясь, перестала прощупываться съ 33 дня. Съ 21 дня уменьшалось тифозное состояніе и исчезло на 33 день. Съ 34 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ей былъ такой:

| День болѣзн. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 34           | 36,7 | 36,9 | 37,2 | 38,2 | 38,9 | 39,9 | 39,9 | 39,0 | 39,5 | 39,1 | 38,0 | 37,0 |
| 35           | 37,0 | 36,8 | 36,9 | 37,5 | 38,3 | 39,1 | 39,1 | 38,8 | 38,5 | 38,1 | 37,3 |      |
| 36           | 36,9 | 36,3 | 36,2 | 36,5 | 36,7 | 37,2 | 37,6 | 38,2 | 38,0 | 38,0 | 37,9 | 37,2 |
| 37           | 36,6 | 36,5 | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 37,2 | 38,1 | 37,6 | 37,1 | 37,1 |
| 38           | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 36,2 | 36,7 | 36,5 | 36,7 | 36,6 | 37,1 | 37,0 | 36,4 | 36,6 |

На 39 и 40 дни т-ра колебалась между 36,1—36,7° Ц., а на 41 день шла такъ:

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 41 | 36,1 | 36,4 | 36,3 | 36,4 | 37,6 | 36,6 | 36,3 | 36,1 | 36,0 | 36,2 | 36,5 | 36,4 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

На 42 и 43 дни опять колебалась между 36,0—36,7° Ц., а на 44 день снова повышеніе:

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 44 | 36,3 | 36,7 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 36,7 | 37,9 | 36,7 | 36,3 | 36,4 | 36,3 | 36,7 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Съ 45 дня до 62 дня температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,2° Ц, давъ въ 4 часа дня

56, 58 и 61 дней, а также в 6 часов вечера 61 дня 37,4°, в 8 же часов вечера 61 дня 37,5° Ц. Ходь вьса тьла съ 34 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30100 (34) | 30000 | 29500 | 29800 | 29700 | 29500 | 29600 | 29800 |
| 30000 (42) | 29900 | 30000 | 30500 | 30500 | 31300 | 31200 | 31200 |
| 31700 (31) | 32100 | 32000 | 32300 | 32600 | 33400 | 33000 | 33400 |
| 33500 (58) | 33300 | 33800 | 34400 | 35000 |       |       |       |

Объективныя же явления съ 34 дня измѣнялись такъ: до 41 дня стулъ по 1 р. жидкій; на 42-ой день испражнение ввдѣ густой кашицы; съ 43 до утра 52 дня испражнение оформлено желтое, вечеромъ 52 дня оформлено и хорошо окрашено, утромъ же 53 дня снова 1 р. жидкое, желтое, съ утра 54 и до 62 испражнение оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2400—4700 к. с., при уд. вѣсѣ 1,008—1,005, безъ бѣлка. Чаю большой выпивалъ по 2000—4000 к. с. въ сутки. Съ 36 дня свистовъ въ груди не было. Съ 38 до 40 языкъ былъ чистъ, а съ 40 дня и до 59 дня снова слегка обложенъ. До 39 дня держалось головокружение. Пища съ 40 до 43 дня была 2 яйца, 2 мани. каши, 1600 к. с., молока, а на 44—45 дни супъ, 2 яйца, 2 мани. кашн, 1000 к. с. молока, 1 булка безъ корки. При выпискѣ на 62 день бѣлѣзны измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 20. № пр. журн. 5242. Крестьянинъ С-въ, 16 лѣтъ, поступилъ 18—VI 93 г. на 7 день бѣлѣзны, жалуюсь на ломоту во всемъ тѣлѣ, головную боль.

St. pr. Хорошаго тѣлоположенія и питанія. Сильное тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только отдѣльные высокие свисты. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Селезенка прощупывается на 1 палецъ, тверда, бѣлѣзница, печень—край. Ходь температуры и вьса тьла до 24 дня такой:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| T-ре | утр. | 38,3 | 38,9 | 39,2 | 39,2 | 38,6 | 38,8 | 39,0 | 39,3 | 39,2 | 38,9 | 39,0 |
|      | веч. | 39,8 | 39,7 | 39,5 | 39,6 | 39,8 | 39,6 | 39,8 | 39,7 | 40,3 | 39,5 | 39,1 |
|      | утр. | 39,8 | 40,0 | 38,8 | 40,3 | 39,3 | 37,6 | 38,7 |      |      |      |      |
|      | веч. | 39,6 | 39,5 | 40,0 | 38,5 | 38,0 | 38,2 | 37,8 |      |      |      |      |

Вьса тьла: 33200—32700—32600—32500—31900—31600—32000—31300—31300—30800—31200—30800—30400—30500—29800—29100—25700.

Пищею было молоко: на 7 день 1000 к. с., а съ 8 до 26

дня. 1800 к. с. До 23 дня дѣлалось по 3 ванны 28° R. ежедневно, а на 23—24 дня по одной. Объективныя явления до 24 дня были: стулъ 1—5 р. въ сутки, жидкій (нерѣдко подѣ себя) мочи 100—400 к. с., уд. вѣса 1,020—1,013, со слѣдами бѣлка; р. по Эрлиху положительная до 22дня. Съ 17 дня стало уменьшаться тифозное состояние и исчезло на 24 день. Съ 14 дня не было бѣлѣзненности селезенки. Съ 15 дня печень не прощупывалась. Съ 25 дня начато измѣрение температуры чрезъ 2 часа и ходь ея былъ такой:

| День болѣзн. | Температура |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              | 8           | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
| 25           | 37,7        | —    | —    | —    | —    | 37,2 | 37,0 | 37,2 | 37,0 | 37,3 | 37,9 | 37,7 |
| 26           | 37,7        | 38,2 | 38,7 | 38,2 | 38,3 | 38,0 | 37,8 | 37,9 | 38,8 | 38,6 | 38,3 | 37,0 |
| 27           | 37,3        | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 37,2 | 37,6 | 37,0 | 37,3 | 37,6 | 37,8 | 37,5 | 37,7 |
| 28           | 37,1        | 37,1 | 37,6 | 37,2 | 37,7 | 37,5 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,2 | 37,0 | 37,0 |
| 29           | 37,0        | 37,1 | 37,6 | 38,3 | 37,8 | 37,4 | 37,6 | 37,8 | 37,9 | 37,3 | 36,8 | 37,0 |
| 30           | 37,1        | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 37,3 | 37,9 | 38,1 | 37,8 | 37,2 | 37,2 | 36,6 | 36,8 |
| 31           | 36,5        | 36,3 | 37,2 | 37,1 | 36,3 | 37,8 | 37,4 | 37,8 | 37,2 | 37,4 | —    | —    |
| 32           | 36,0        | 36,0 | 36,4 | 37,0 | 36,5 | 37,4 | 37,2 | 36,8 | 36,7 | 36,9 | 36,4 | 36,0 |

Давь въ 6 и 8 часовъ вечера 33 дня 37,5° Ц., въ остальное время съ 33 до 37 дня температура колебалась между 36—37,1° Ц., а съ 38 дня шла такъ:

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 38 | 36,6 | 36,8 | 37,0 | 37,2 | 36,8 | 37,0 | 37,6 | 37,5 | 37,0 | 37,2 | 36,0 | 36,8 |
| 39 | 36,3 | 36,7 | 36,6 | 37,1 | 37,4 | 37,6 | 37,9 | 37,5 | 37,6 | 37,2 | 37,2 | 36,4 |
| 40 | 36,6 | 36,7 | 36,4 | 37,2 | 36,9 | 37,2 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 36,8 | 36,8 | 36,2 |
| 41 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | 37,1 | 37,2 | 37,0 | 37,6 | 37,3 | 36,5 | 36,7 | 36,7 | 36,6 |
| 42 | 36,5 | 36,8 | 37,2 | 37,3 | 37,2 | 37,4 | 37,6 | 37,2 | 37,5 | 36,5 | 36,7 | 36,1 |

Съ 43 же до 68 дня температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,3° Ц., давь въ 4 часа дня 54 и 61 дней, а также въ 2 часа пополудни 60 дня 37,5° Ц.; въ 6 часовъ вечера 53 и 59 дней, равно какъ и въ 4 часа дня 58 дня она ровнялась 37,4° Ц. Ходь вьса тьла съ 25 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 28300 (25) | 28100 | 27400 | 27900 | 27600 | 27000 | 27300 | 27200 | 27400 |
| 27200 (34) | 27000 | 27100 | 27400 | 27800 | 27700 | 28000 | 28300 | 28700 |
| 28600 (43) | 28600 | 28500 | 29100 | 29000 | 29600 | 29100 | 29500 | 30000 |
| 29700 (52) | 30500 | 30500 | 31700 | 32100 | 32100 | 32500 | 32500 | 33000 |
| 32600 (61) | 33000 | 32900 | 33100 | 34400 | 33200 | 34000 | 34500 | —     |

Объективные же явления съ 25 дня изменялись так: до 35 дня стул 1—2 р. въ сутки жидкий; на 36—37 дни испражненіе ввидѣ густой кашицы; съ 38 до 42 дня оформлено, желтое; съ 43 до 45 снова жидкое испражненіе 1—2 р. въ сутки; на 46—47 дни ввидѣ густой кашицы; съ 48 до 61 дня оформлено, бурого цвѣта, а съ 61 до 68 оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 1900 до 4900 к. с., при уд. вѣсъ 1,009—1,005, безъ бѣлка. Чаю большой выпивалъ 400—3200 к. с. въ сутки. Съ 34 дня свистовъ въ груди не было. До 36 дня держалось головокруженіе. Съ 29 до 38 дня селезенка прощупывалась на  $\frac{1}{2}$  пальца, а съ 38 до 54 дня прощупывалась край ея; съ 54 же дня селезенка не прощупывалась. Съ 46 дня языкъ оставался чистымъ. Пища на 38—39 день была: бульонъ, 2 яйца, 2 мани. кашн, 1600 к. с. молока, а съ 40-го дня: супъ, 2 яйца 2 мани. кашн 1000 к. с. молока 1 булка безъ корн. При выпискѣ на 68 день болѣзни взятійей со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 21. № пр. журн. 9901. Крестьянинъ М—въ, 16 лѣтъ, поступилъ 9/XII 92 г. на 9 день болѣзни, жалужься на головную боль и понось.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Порядочное тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 21 дня таковъ:

утр. 38,6 40,0 39,8 39,2 38,8 38,6 38,8 38,5 39,0 39,1 38,4 37,8 38,2  
веч. 39,7 40,6 39,0 39,5 39,2 39,5 40,0 39,8 39,0 39,5 39,3 38,9 38,3

Вѣсъ тѣла: 46500—46000—45500—44500—44500—44000—43600—43700—  
43600—43000—42600—43000.

Пищею было молоко: на 9 день 1000 к. с., на 10—24 день 1700 к. с., причеъ съ 18 дня давался еще бульонъ. До 13 дня ежедневно дѣлалось 2 ванны 28° R., а затѣмъ по одной. Объективная явленія до 21 дня были: стулъ по 1—2 р. въ сутки жидкій; мочи 400—1900 к. с., уд. вѣса 1,025—1,007, со слѣдами бѣлка до 14 дня; р. по Эрлиху положительная до 18 дня. Съ 12 дня стадо уменьшаться тифозное состояніе и исчезало на 21 день. Съ 22 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22           | 37,8 | —    | —    | 38,2 | 38,4 | 39,0 | 39,0 | 38,9 | 38,6 | 38,1 | 37,5 | 36,5 |
| 23           | 37,4 | 38,1 | 38,2 | 37,7 | 38,2 | 38,6 | 38,2 | 38,4 | 38,6 | 38,2 | 37,8 | 37,2 |
| 24           | 37,4 | 37,4 | 37,7 | 37,8 | 37,8 | 37,9 | 38,0 | 38,0 | 37,9 | 37,1 | 36,3 | 36,4 |
| 25           | 37,1 | 37,0 | 37,3 | 37,9 | 38,0 | 37,5 | 38,1 | 37,7 | 36,7 | 36,0 | 36,2 | 36,3 |
| 26           | 36,8 | 36,9 | 37,2 | 37,3 | 37,2 | 37,3 | 37,6 | 37,8 | 37,1 | 36,8 | 37,0 | 37,0 |

Давъ на 27 день въ 4 часа дня 37,4° и въ 2 часа ночи 28 дня 37,2° Ц., температура въ остальное время съ 27 до 37 дня колебалась между 36—37° Ц., а съ 38 дня шла такъ:

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 38 | 37,3 | 37,3 | 37,2 | 37,3 | 37,2 | 37,0 | 36,8 | 36,2 | 36,0 | 36,2 | 36,7 | 37,2 |
| 39 | 37,4 | 37,0 | 37,2 | 37,0 | 37,2 | 37,0 | 37,0 | 36,5 | 36,2 | 36,6 | 36,6 | 37,0 |
| 40 | 37,3 | 37,2 | 37,6 | 37,5 | 36,8 | 37,0 | 37,2 | 36,4 | 36,8 | 36,7 | 37,2 | 37,1 |

Ходъ же вѣса тѣла съ 22 дня такой:

|            |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 43000 (22) | 42300 | 42300 | 42300 | 42100 | 42500 | 42300 |
| 42500 (29) | 42000 | 42500 | 42700 | 42500 | 42700 | 42900 |
| 43200 (36) | 44100 | 44900 | 45500 | 45700 | 46000 |       |

Объективные же явленія съ 22 дня шли такъ: до 27 дня стулъ по 1—2 р. въ сутки жидко; на 28 и утромъ 29 дня испражненіе ввидѣ густой кашицы, а съ 29 до 41 дня оформлено. Количество мочи колебалось между 2400—3700 к. с. при уд. вѣсъ 1,009—1,005, безъ бѣлка. Съ 26 дня не было головокруженія, появившагося на 21 день. Съ 33 дня языкъ оставался чистымъ. Субъективныхъ ощущеній повышеніе температуры 40 дня не дало. При выпискѣ на 41 день болѣзни измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 22. № пр. журн. 9700. Крестьянинъ К—въ, 17 лѣтъ, поступилъ 2/XII 92 г. на 11 день болѣзни, жалужься на головную боль, понось.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Печень не прощупывается. Селезенка выдается на 1 палецъ изъ-за края реберъ, твердая. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 25 дня такой:

Т-ра утр. 38,0 38,0 38,5 39,4 38,8 38,8 38,2 38,5 38,6 38,2  
веч. 39,5 39,6 39,0 39,4 39,8 38,8 38,3 38,8 39,2 38,0  
38,1 38,3 38,6 38,2 38,3  
37,9 37,5 38,0 39,6 38,1

Весъ тѣла: 52800—52300—51800—51500—51000—50800—50400—49600—  
49400—48600—48600—49100—48200.

Ежедневно дѣлалась 1 ванна 28° R. вечеромъ. Пищею было молоко: на 11—12 дни по 1000 к. с., съ 13 до 21 дня 1700 к. с., а съ 22 до 25 дня 1300 к. с., бульонъ и кисель. Объективные явленія шли такъ: стулъ 1—4 р., жидкій; мочи 200—2600 к. с., уд. вѣса 1,025—1,006, безъ бѣлка; р. по Эрлангу положительная до 17 дня. Уменьшеніе и исчезаніе тифознаго состоянія на 25 день. Съ 21 дня не было головной боли, а только головокруженіе. Съ 26 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой: съ 26 до 30 дня она колебалась между 36,5—37,4, давъ въ 8 часовъ вечера 27 дня 37,5°; съ 30 до 40 дня температура колебалась между 36—37,2°, давъ въ 10 часовъ вечера 32 дня и въ 4 часа дня 35 дня 37,4°; въ 12 же часовъ ночи 36 дня, а также въ 4 часа дня 38 дня она равнялась 37,3° Ц. Съ 40 же дня болѣзни температура шла такъ:

| День болѣзни. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 40            | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 37,2 | 37,3 | 36,9 | 36,8 | 36,0 | 36,4 | 36,0 |
| 41            | 37,2 | 36,9 | 37,2 | 37,4 | 37,6 | 37,3 | 37,1 | 37,3 | 36,8 | 36,4 | 36,0 | 36,5 |
| 42            | 37,0 | 36,8 | 36,9 | 37,1 | 37,3 | 37,2 | 37,3 | 37,2 | 36,5 | 36,0 | 36,4 | 36,7 |
| 43            | 37,3 | 37,0 | 37,2 | 37,3 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 36,4 | 36,6 | 36,5 | 36,2 | 36,0 |
| 44            | 37,2 | 37,0 | 37,2 | 37,5 | 37,5 | 37,4 | 37,3 | 36,4 | 36,6 | 36,3 | 36,5 | 36,9 |

Ходъ же вѣса тѣла съ 26 дня болѣзни былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 48000 (26) | 48200 | 47500 | 48000 | 48200 | 48200 | 47800 |
| 47800 (33) | 48900 | 49200 | 49200 | 49600 | 49000 | 49700 |
| 49900 (40) | 50700 | 50800 | 51100 | 51800 | 52500 |       |

Объективные же явленія съ 26 дня намѣнялись такъ: до 27 дня стулъ по 1 р. жидкій, съ 28 до 33 дня испраженіе ввидѣ густой кашицы, а съ 34 до 45 дня оформлено. Количество мочи колебалось отъ 1900 до 3500 к. с. при уд. вѣсѣ 1,010—1,005,

безъ бѣлка. Съ 28 дня головокруженія не было. Съ 38 дня языкъ оставался чистымъ. Съ 42 дня селезенка, постепенно уменьшавшаяся, не прощупывалась. Съ 34 дня получалъ смѣшанную пищу. При выпискѣ на 45 день болѣзни измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 23. № пр. журн. 5479. Крестьянинъ Р—въ, 17 лѣтъ, поступилъ 27/VI 93 г. на 10 день болѣзни, жалуюсь на головную боль.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложеніе языка. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только кое-гдѣ отдѣльные высокіе свисты. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Селезенка прощупывается почти на 1 палецъ; печень—край. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 21 дня таковъ:

Т-ра утр. 37,0 39,2 37,3 36,0 37,6 37,3 37,5 37,7 36,9 37,1 37,2  
веч. 38,8 39,0 38,5 38,1 38,3 38,7 38,4 39,2 38,6 38,8 38,2 37,7  
Весъ тѣла: 57400—57000—56500—55900—55100—55000—54700—54700—  
54000—53500—53500.

Ежедневно дѣлалась одна ванна 28° R. Пища—молоко: на 10 день 1000 к. с., съ 11 до 19 дня 1800 к. с., а съ 20 до 22 дня 2400 к. с. Объективные явленія до 21 дня были: стулъ 1—3 р. въ сутки жидко; мочи 700—2000 к. с., уд. вѣса 1,017—1,009, ѳо слѣдами бѣлка съ 19 дня, р. по Эрлангу отрицательная. Исчезаніе свистовъ въ груди и тифознаго состоянія на 14 день. Температура въ 8 часовъ вечера 21 дня=38,1° Ц. Съ 22 дня начато намѣреніе температуры чрезъ 2 часа—и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзни. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22            | 37,1 | —    | —    | —    | 37,2 | 37,7 | 37,8 | 37,6 | 37,6 | 37,0 | 37,3 | 37,4 |
| 23            | 36,8 | 36,7 | 36,9 | 37,5 | 37,0 | 37,5 | 37,6 | 37,3 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 37,1 |
| 24            | 37,0 | 36,8 | 36,8 | 37,2 | 37,6 | 37,6 | 38,0 | 37,8 | 37,5 | 37,4 | 36,8 |      |
| 25            | 36,5 | 36,6 | 36,8 | 37,0 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 37,3 | 36,5 | 36,6 | 36,8 | 36,8 |

Съ 26 до 31 дня температура колебалась между 36,0—36,9; съ 32 до 37 дня колебалась между 36,0—37,1°, давъ на 32 день въ 2 часа дня 37,5°, а въ 4 часа дня 37,4°; на 34 день въ 4 часа дня равнялась 37,3°. На 38 день температура шла такъ:

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 38 | 36,6 | 36,6 | 36,7 | 37,6 | 37,1 | 36,8 | 37,0 | 36,7 | 36,5 | 36,6 | 36,3 | 36,5 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Съ 39 же до 43 дня температура колебалась между 36,0—37,1°, давъ въ 2 часа пополудни 39 дня 37,2° Ц. Ходъ вѣса тѣла съ 22 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52500 (22) | 52500 | 53100 | 51700 | 51900 | 51500 | 52000 |
| 51600 (29) | 51300 | 52100 | 52800 | 52900 | 53100 | 53500 |
| 53500 (36) | 53300 | 53600 | 54400 | 54200 | 54900 | 55400 |

Объективныя же явленія съ 22 дня шли такъ: до утра 26 дня стулъ 1—2 р. въ сутки жидко, вечеромъ 26 и на 27 день испражненіе ввидѣ густой кашицы; съ 28 до 36 дня испражненіе оформлено, желтое, а съ 37 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 1600 до 4100 к. с., при уд. вѣсъ 1,012—1,005, со слѣдами бѣлка до 24 дня. Чаю большой выпивать по 1600—3200 к. с. въ сутки. Съ 28 дня не прощупывалась селезенка, печень же съ 23 дня. Съ 30 дня не было головокруженія. Съ 37 дня языкъ оставался чистымъ. Съ 32 дня получалъ смѣшанную пищу. При выпискѣ на 43 день бѣзменій въсь = 56000 граммъ, а со стороны внутреннихъ органовъ измѣненій не замѣчалось.

№ 24. № пр. журн. 5797. Крестьянинъ Н—въ, 19 лѣтъ, поступилъ 7 VII 93 г. на 10 день бѣзмени, жалудся на общее недомоганіе и головную боль.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Порядочное тифозное состояніе. Обожженный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только кое-гдѣ отдѣльные высокіе свѣты. Верхняя граница тупости печени и селезенки не извѣстна. Печень не прощупывается; селезенка—на 1 палецъ. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 20 дня таковъ:

T-ра

|           |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| утр.      | 38,7                           | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,9 | 37,3 | 36,8 | 37,5 | 37,2 | 36,4 | 36,6 |
| веч.      | 40,0                           | 39,2 | 39,8 | 39,0 | 39,0 | 38,0 | 38,4 | 38,8 | 38,4 | 38,0 | 37,1 |
| Вѣсь тѣла | 51000—50200—49500—49100—48600. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Ежедневно дѣлалась 1 ванна 28°R. Пища—мозоко: до 15 дня 1000 к. с., а съ 16 до 20 дня 1800 к. с. Объективныя явленія до 20 дня шли такъ: стулъ 2—5 р. въ сутки жидко; мочи 200—1600 к. с., уд. вѣса 1,024—1,009, съ незначительнымъ количествомъ бѣлка до 19 дня и слѣды бѣлка на 20 день; р. по Эриху положительная до 17 дня. Постепенное уменьшеніе тифоз-

наго состоянія и исчезаніе его на 19 день. Уменьшеніе селезенки, такъ что на 20 день прощупывался ея край. Температура въ 12 часовъ ночи 20 дня = 38,7° Ц. Съ 21 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21           | 36,0 | —    | —    | —    | —    | 37,1 | 38,7 | 38,6 | 38,6 | 38,8 | 36,7 | 36,5 |
| 22           | 36,0 | 36,2 | 36,9 | 37,7 | 37,9 | 37,6 | 37,2 | 37,5 | 36,3 | 37,0 | 36,6 | 36,0 |
| 23           | 36,2 | 36,6 | 36,8 | 36,7 | 37,1 | 37,7 | 38,3 | 38,7 | 37,3 | 36,8 | 37,0 | 36,4 |
| 24           | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,0 | 37,3 | 37,8 | 38,2 | 38,3 | 38,4 | 37,8 | 37,6 | 37,0 |
| 25           | 36,1 | 37,0 | 36,9 | 37,7 | 38,1 | 37,7 | 37,1 | 36,7 | 36,6 | 36,9 | 36,7 | 37,0 |

Съ 26 до 34 дня температура колебалась между 36,0—36,9°, давъ въ 2 часа дня 26 дня и въ 6 ч. вечера 29 дня 37,0°, а въ 8 часовъ вечера 29 дня 37,2° Ц. Съ 35 же дня шла такъ:

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 35 | 36,0 | 36,1 | 37,5 | 36,8 | 36,4 | 36,6 | 37,3 | 37,4 | 37,1 | 37,0 | 37,1 | 36,6 |
| 36 | 36,4 | 36,5 | 36,5 | 36,3 | 36,6 | 36,9 | 37,6 | 37,4 | 38,1 | 39,2 | 38,9 | 38,4 |
| 37 | 37,4 | 37,2 | 37,7 | 36,6 | 36,2 | 36,7 | 36,3 | 36,2 | 36,7 | 36,2 | 36,3 | 36,0 |

Съ 38 же до 58 дня температура колебалась между 36,0—36,9°, давъ въ 8 часовъ вечера 46 дня 37,0°, а въ 8 ч. вечера 47 дня 37,4° Ц. Ходъ же вѣса тѣла съ 21 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 48800 (21) | 48600 | 48300 | 48000 | 48200 | 48100 | 47900 | 47700 | 47900 | 47700 | 48000 | 48500 | 48100 |
| 47700 (31) | 47800 | 47700 | 48100 | 47700 | 48000 | 48500 | 48000 | 48500 | 48800 | 48800 | 48500 | 48500 |
| 47900 (41) | 47800 | 48300 | 48200 | 48300 | 48300 | 48300 | 48500 | 48500 | 48600 | 49100 | 49700 | 49700 |
| 49500 (51) | 50200 | 50300 | 50800 | 50900 | 51000 | 51700 | 52000 |       |       |       |       |       |

Объективныя же явленія съ 21 дня шли такъ: до утра 25 дня стулъ по 1—2 р. жидко; вечеромъ 25 дня испражненіе ввидѣ густой кашицы; вечеромъ 26 и утромъ 27 дня испражненіе оформлено, желтое; вечеромъ 27 и днемъ 28 дня снова ввидѣ густой кашицы; съ 30 до 34 дня оформлено, желтое; на 34—35 день оформлено, бурого цвѣта; въ ночь съ 36 на 37 день стулъ 7 р. жидко и оставался жидкимъ по 1—2 р. въ сутки до 40 дня; на 41—42 день стула не было; на 43 день испражненіе ввидѣ густой кашицы; съ 45 дня до 52 дня оформлено, желтое; съ 53 же дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ

2600 до 5000 к. с., при уд. вѣсѣ 1,010—1,005, со слѣдами бѣлка до 21 дня. Чаю большой выпивалъ по 1600—4000 к. с. въ сутки. Съ 21 дня не было свистовъ въ груди. Съ 22 дня не было головной боли. Съ 36 дня не прощупывалась селезенка. Съ 41 дня языкъ оставался чистымъ. Пищею съ 21 до 27 дня было: бульонъ и 1800 к. с. молока; съ 32 до 35 дня: бульонъ, 2 яйца, 2 манн. кашн, 1200 молока, 1 булка безъ корки; на 36—37 дни: супъ,  $\frac{1}{2}$  котлеты, 2 манн. кашн, 1200 молока и  $\frac{1}{2}$  ф. бѣл. хлѣба. При выпискѣ на 58 день болѣзни измѣнений со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 25. № пр. журн. 8730. Крестьянинъ Д.—въ, 19 лѣтъ, поступилъ 12/X 93 г. на 11 день болѣзни, жалующься на головную боль и поносъ.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣнений не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Печень не прощупывается. Селезенка прощупывается на 1 палецъ. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 26 дня таковы:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| утр. | 38,5 | 38,8 | 38,2 | 39,5 | 38,8 | 38,1 | 38,3 | 37,9 | 38,0 | 38,6 | 38,2 | 39,0 | 38,0 |
| веч. | 38,5 | 39,8 | 39,5 | 39,7 | 39,6 | 39,0 | 39,3 | 39,0 | 39,3 | 39,8 | 39,2 | 40,1 | 39,3 |
| утр. | 38,0 | 38,5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| веч. | 39,0 | 38,3 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Вѣсь тѣла: 55500—54900—55000—53400—54100—53700—53800—53400—53400—52500—52600—52700—51800—51500—51200.

До 21 дня дѣлалось по 2 ванны 28°R., а затѣмъ по одной. Пища—молоко: на 11 день 1000 к. с., а съ 12 до 31 дня 1800 к. с. Объективная явленія до 26 дня были: стулъ по 1—3 р. въ сутки жидко; моча 400—2600 к. с., уд. вѣса 1,027—1,008, со слѣдами бѣлка съ 11 до 16 дня и съ 22 до 26 дня; въ промежуткѣ же мочѣ не было, р. по Эрлаку положительная до 15 дня. Съ 14 до 18 дня въ груди подъ углами лопатокъ выслушивались отдѣльные высокие свисты. На 18 день небольшое носовое кровотечение. Съ 21 дня не было уже тифознаго состоянія. На 26 день прошла головная боль, появилось головокружение. Съ 27 дня начато измѣреніе температуры:

| День болѣзн. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 27           | 37,8 | —    | —    | —    | —    | 37,8 | 38,7 | 38,2 | 37,9 | 38,2 | 37,8 | 37,5 |
| 28           | 37,1 | 37,2 | 37,0 | 37,2 | 37,6 | 37,8 | 38,0 | 37,9 | 37,4 | 37,0 | 37,3 | 37,0 |
| 29           | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,9 | 37,2 | 37,3 | 37,2 | 37,5 | 37,7 | 37,4 | 37,3 | 37,4 |
| 30           | 36,4 | 36,7 | 36,6 | 36,7 | 36,6 | 37,1 | 37,2 | 37,4 | 37,5 | 37,0 | 37,0 | 36,4 |

Съ 31 до 49 дня температура колебалась между 36,1—37,2°, давъ въ 8 часовъ вечера 32 дня, въ 6 ч. вечера 36 дня, въ 4 часа дня 44 дня и въ 2 ч. пополудни 47 дня 37,3°; а въ 4 ч. дня 37 и 49 дней 37,4°. Съ 50 дня шла такъ:

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 50 | 36,7 | 36,7 | 36,9 | 36,8 | 37,1 | 37,2 | 37,6 | 37,0 | 36,8 | 36,2 | 36,8 | 36,6 |
| 51 | 36,6 | 36,9 | 36,8 | 37,1 | 37,2 | 37,1 | 37,6 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,4 | 36,8 |

Достигнувъ въ 8 ч. вечера 52 дня и въ 2 ч. дня 57 дня 37,4°, въ остальное время съ 52 до 57 дня т-ра колебалась между 36,0—37,2°; съ 58 до 62 дня колебалась между 36,1—37,4°. Съ 63 дня шла такъ:

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 63 | 37,4 | 37,3 | 37,3 | 37,6 | 37,2 | 37,6 | 37,6 | 37,2 | 36,7 | 36,5 | 37,0 | 37,6 |
| 64 | 37,4 | 37,6 | 37,4 | 37,6 | 37,8 | 37,5 | 37,7 | 37,6 | 37,6 | 37,5 | 37,4 | 37,4 |

а съ 65 до 68 дня опять колебалась между 36,0—37,2° Ц. Ходъ же вѣса тѣла съ 27 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 51000 (27) | 51000 | 50300 | 50300 | 50000 | 50000 | 50400 | 50100 | 49800 |
| 50000 (36) | 49900 | 49900 | 50100 | 50000 | 50000 | 50200 | 50200 | 50200 |
| 50000 (45) | 50200 | 50500 | 50500 | 50800 | 50800 | 51500 | 51100 | 51100 |
| 52000 (54) | 52100 | 52800 | 53000 | 52600 | 52900 | 53000 | 53500 | 53600 |
| 53800 (63) | 53900 | 53700 | 53700 | 54000 | 54900 |       |       |       |

Объективные же явленія съ 27 дня шли такъ: до 30 дня стулъ по 1 р. въ сутки жидко; на 32—33 день испражненіе ввидѣ густой кашицы; съ 35 до 55 дня испражненіе то оформлено, то ввидѣ густой кашицы, желтое; съ 56 до 62 испражненіе оформлено тѣмъ желтое, то темно-коричнево; съ 62 же до 68 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи колебалось отъ 2800 до 5200 к. с., при уд. вѣсѣ 1,008—1,005, безъ бѣлка. Чаю большой выпивалъ 2400—4800 к. с. въ сутки. Съ 35 до 53 дня прощупывался край селезенки; на 53 день селезенка прощупывалась на  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  пальца, затѣмъ, постепенно уменьшаясь, перестала прощупываться съ 62 дня. Языкъ оставался чистымъ съ 65 дня. Съ 46 дня пища была смѣшанная (съ мясомъ). При выпискѣ на 68 день болѣзни измѣнений со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 26. № пр. журн. 9308. Крестьянинъ Б.—въ, 19 лѣтъ,

поступил 17/XI 92 г. на 7 день болезни, жалуюсь на головную боль, отсутствие аппетита, понос.

St. pr. Хорошего тѣлосложения и питания. Порядочное тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди изменений не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не изменѣна. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 18 дня болезни такой:

|           |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Т-ра      | утр.   | 39,2 | 39,8 | 39,0 | 38,5 | 38,6 | 38,4 | 39,2 | 38,9 | 38,2 | 38,3 | 37,0 |
|           | веч.   | 39,6 | 40,0 | 39,6 | 39,4 | 39,1 | 39,8 | 39,7 | 39,6 | 39,0 | 38,8 | 38,4 |
| Вѣс тѣла: | 58700—58300—58400—58400—58100—57800—57600—57400—56900—56300—55200. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Ежедневно до 16 дня дѣлалось по 2 ванны 28°; а затѣмъ по одной. Пища—молоко: на 7 день 600 к. с., на 8 день 1600 к. с., а съ 9 до 22 дня 1700 к. с. Объективные явленія до 18 дня шли такъ: стулъ 2—4 р. въ сутки жидко; мочи 300—600 к. с., уд. вѣса 1,025—1,020, съ незначительнымъ количествомъ бѣлка до 13 дня, а затѣмъ слѣды бѣлка. Съ 9 до 11 дня сильное тифозное состояние съ бредомъ по ночамъ, а затѣмъ, постепенно уменьшаясь, оно исчезло на 18 день. Съ 9 дня въ груди отдѣльные высокие свисты. Съ 19 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | Вѣс.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 19           | 55200 | 37,5 | —    | 37,6 | 38,6 | 39,0 | 39,5 | 38,2 | 38,5 | 37,8 | 38,2 | 37,8 | 37,4 |
| 20           | 54700 | 37,0 | 37,2 | 37,5 | 36,7 | 38,2 | 38,2 | 38,3 | 37,2 | 38,4 | 38,5 | 37,8 | 36,8 |
| 21           | 54200 | 37,2 | 37,4 | 38,2 | 37,4 | 37,4 | 36,5 | 37,7 | 39,0 | 38,7 | 39,1 | 36,7 | 36,6 |
| 22           | 54100 | 37,2 | 36,8 | 37,3 | 36,8 | 38,2 | 38,8 | 37,9 | 38,5 | 38,6 | 38,1 | 37,9 | 37,5 |
| 23           | 53800 | 36,8 | 36,6 | 36,7 | 37,2 | 37,6 | 37,8 | 38,5 | 37,9 | 38,4 | 38,6 | 37,2 | 37,0 |
| 24           | 53400 | 36,8 | 36,4 | 36,7 | 36,9 | 37,1 | 37,8 | 38,1 | 38,2 | 38,0 | 37,2 | 37,0 | 36,6 |
| 25           | 53500 | 36,6 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 37,2 | 37,2 | 38,0 | 38,4 | 38,0 | 38,0 | 37,1 | 36,7 |
| 26           | 53100 | 36,6 | 36,3 | 36,9 | 36,7 | 37,1 | 37,3 | 36,9 | 36,0 | 36,5 | 38,5 | 38,6 | 36,6 |
| 27           | 53200 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,7 | 37,2 | 37,5 | 37,7 | 38,2 | 37,8 | 36,8 | 36,8 | 36,9 |
| 28           | 53500 | 36,5 | 36,8 | 36,8 | 37,1 | 37,0 | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 37,9 | 37,2 | 37,3 | 37,1 |
| 29           | 53400 | 36,9 | 36,8 | 36,9 | 36,6 | 37,0 | 37,4 | 37,8 | 37,5 | 37,7 | 37,6 | 36,9 | 37,0 |
| 30           | 53400 | 36,4 | 36,6 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | 36,8 | 37,1 | 37,0 | 37,2 | 37,0 | 36,7 | 36,7 |
| 31           | 53000 | 36,8 | 36,8 | 36,6 | 36,2 | 36,5 | 36,8 | 37,0 | 37,7 | 36,8 | 36,3 | 36,4 | 36,5 |
| 32           | 52300 | 36,5 | 36,4 | 36,8 | 36,3 | 36,7 | 36,7 | 36,9 | 36,6 | 36,4 | 36,4 | 36,2 | 36,6 |
| 33           | 52700 | 36,7 | 36,3 | 36,5 | 36,6 | 36,9 | 36,9 | 37,3 | 37,3 | 36,7 | 36,8 | 37,1 | 37,4 |
| 34           | 53300 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 37,9 | 37,2 | 37,1 | 36,7 | 36,8 | 36,0 | 36,7 | 36,6 | 37,0 |

Съ 35 же до 50 дня температура при двухчасовомъ ея измѣреніи колебалась между 36,0—37,2°, давъ въ 4 часа дня

35, 37 и 46 дней 37,3°; въ 4 часа дня 36 дня 37,4°, а въ 4 часа 38 дня 37,5° Ц. Ходъ же вѣса тѣла съ 35 до 50 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54000 (35) | 53700 | 54000 | 55000 | 54700 | 54900 | 56200 | 57100 |
| 57100 (48) | 56600 | 56900 | 57300 | 57300 | 57200 | 57500 | 57700 |

Объективные явленія съ 19 дня шли такъ: стулъ до 29 дня по 1—2 р. въ сутки жидко; съ 29 до 36 испражненіе ввидѣ густой кашицы; съ 36 до 50 дня оформлено. Количество мочи отъ 1000 до 3900 к. с., при уд. вѣсѣ 1,014—1,006, со слѣдами бѣлка до 20 дня. Съ 25 дня свистовъ въ груди не было. Съ 35 дня исчезло головокруженіе. Съ 44 дня языкъ оставался чистымъ. При выпискѣ на 50 день измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 27. № пр. журн. 56336. Крестьянинъ Ев—въ, 20 лѣтъ, поступилъ 2/VI 93 г. на 14 день болезни, жалуюсь на головную боль и поносъ.

St. pr. Хорошаго тѣлосложения и питания. Порядочное тифозное состояние. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только разбросанные въ небольшомъ количествѣ высокие свисты и среднепузырчатые хрипы. Верхняя граница тупости печени и селезенки не изменѣна. Селезенка прощупывается на 1 палецъ, тверда. Печень не прощупывается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 27 дня таковъ:

|           |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Т-ра      | утр.   | 38,5 | 39,0 | 38,8 | 39,4 | 38,2 | 38,9 | 38,5 | 38,2 | 38,6 | 38,1 | 37,7 |
|           | веч.   | 39,0 | 39,4 | 39,7 | 39,8 | 39,7 | 39,8 | 39,8 | 39,9 | 40,0 | 39,6 | 39,3 |
|           |  | 37,6 | 36,7 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |  | 38,6 | 37,8 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Вѣс тѣла: | 52400—51500—50900—50000—49700—49000—50300—49600—49100—49100—48800—48600—48000—48000. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Ежедневно до 27 дня дѣлалось 2 ванны 28° R. Пища—молоко: на 15—17 дни 1800 к. с., съ 18 до 31 дня 2200 к. с., причѣмъ съ 22 дня давъ еще и бульонъ. Объективные явленія до 27 дня были: стулъ 2—3 р. въ сутки жидко; мочи 400—2400 к. с., уд. вѣса 1,024—1005, со слѣдами бѣлка на 22—24 дни; р. по Эрлиху положительная до 24 дня. Постепенное уменьшеніе тифознаго состоянія и исцеленіе его на 26 день. Уменьшеніе свистовъ и хриповъ въ груди съ 23 дня. Съ 25 дня не было головной боли, а только головокруженіе. Съ 28 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болъзни. | Вѣсь. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 28            | 48200 | 37,0 | 36,6 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 37,0 | 36,8 | 36,3 | 36,2 | 36,3 | 36,7 | 36,8 |
| 29            | 48200 | 36,8 | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 36,5 | 36,6 | 37,2 | 37,8 | 38,4 | 37,6 | 37,6 | 36,5 |
| 30            | 48200 | 36,9 | 36,7 | 36,9 | 36,8 | 37,0 | 37,1 | 36,5 | 37,0 | 37,7 | 37,4 | 37,0 | 37,0 |

Съ 31 до 49 дня температура при двухчасовомъ ей измѣреніи колебалась между 36,0—37,2°, давъ въ 4 часа дня 37 дня и въ 8 часовъ вечера 43 дня 37,3° Ц. Ходъ вѣса тѣла съ 31 дня такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4790 (31)  | 47800 | 48500 | 48300 | 48500 | 48300 | 48900 | 49500 | 48700 |
| 48700 (40) | 48300 | 48700 | 48600 | 49700 | 49500 | 49700 | 50300 | 50700 |

Объективные же явленія съ 28 дня измѣнялись такъ: до утра 28 дня стулъ жидко; съ вечера 28 до 32 дня испражненіе ввидѣ густой кашицы; съ 32 же и до 49 дня испражненіе оформлено, желтое. Количество мочи колебалось отъ 2700 до 4600 к. с., при уд. вѣсь 1,009—1,005, безъ бѣлка. Чаю больной выпивалъ по 1600—4000 к. с. въ сутки. Съ 29 дня свистовъ и хриповъ въ груди не было. Съ 41 дня не прощупывалась селезенка. Съ 46 дня языкъ оставался чистымъ. Субъективныхъ ощущеній повышеніе температуры 29—30 дней не дало. При выпискѣ на 49 день болъзни вѣсь тѣла = 50700 граммъ, а со стороны внутреннихъ органовъ измѣненій не замѣчалось.

№ 28. № пр. журн. 9318. Крестьянинъ Н — въ, 24 лѣтъ, поступилъ 18/XI 92 г. на 10 день болъзни, жаловался на головную боль и поносъ. Въ анамнезѣ: 6 лѣтъ назадъ брюшной тифъ.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Порядочное тифозное состояніе. Обложенный языкъ. На кожѣ груди нѣсколько бѣдныхъ розеолъ. Со стороны органовъ груди только отдѣльные высокіе свисты. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Селезенка прощупывается на 2 пальца, слегка болъзненна. Печень не прощупывается. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 21 дня таковъ:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Т-ра       | утр.  | 39,3  | 39,8  | 39,6  | 39,0  | 38,8  | 38,2  | 38,3  | 37,9  | 38,4  | 37,9  | 37,8 | 37,5 |
| веч.       | 40,0  | 39,6  | 39,5  | 39,5  | 39,6  | 39,5  | 39,2  | 39,4  | 38,8  | 39,0  | 38,7  | 38,2 |      |
| Вѣсь тѣла: | 59800 | 60200 | 60100 | 60200 | 59900 | 59200 | 58200 | 57900 | 57000 | 56900 | 56100 |      |      |

До 19 дня ежедневно по 2 ванны 28° R., а затѣмъ по одной. Пища—молоко: на 10 день 1000 к. с.; съ 11 до 14 дня 1600 к. с.; съ 15 до 21 дня 1700 к. с. Объективные явленія до 21 дня были: стулъ 1—2 р. въ сутки жидко; мочи 500—2500 к. с., уд. вѣса 1,022—1,007, съ незначительнымъ количествомъ бѣлка до 17 дня, слѣды на 18—20 дни. На 11 день исчезли розеолы; съ 15 до 21 дня прощупывался край печени. Съ 16 дня не было болъзненности селезенки. Съ 17 дня стало уменьшаться тифозное состояніе и исчезло на 21 день. Съ 22 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа.

| День болъзни. | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22            | 37,4 | —    | 38,3 | 39,1 | 38,5 | 38,8 | 38,7 | 37,4 | 36,9 | 37,2 | 37,2 | 37,7 |
| 23            | 37,8 | 38,4 | 38,7 | 39,0 | 39,0 | 38,9 | 39,4 | 39,4 | 38,8 | 38,6 | 38,5 | 38,8 |
| 24            | 39,1 | 39,7 | 39,7 | 39,3 | 39,4 | 38,8 | 37,8 | 37,5 | 36,8 | 36,5 | 36,9 | 36,0 |
| 25            | 36,2 | 36,3 | 36,9 | 37,3 | 38,1 | 39,2 | 39,0 | 38,2 | 37,8 | 37,9 | 36,1 | 36,0 |
| 26            | 36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,4 | 36,2 | 36,4 | 36,3 | 36,4 | 36,0 | 36,1 | —    | —    |

Давъ въ 8 ч. вечера 27 дня 37,4°, а также въ 10 ч. вечера 35 дня 37,3°, въ остальное время до 38 дня т-ра колебалась между 36—37,2° Ц., а съ 38 дня шла такъ:

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 38 | 36,8 | 36,7 | 37,2 | 37,0 | 37,0 | 37,1 | 37,6 | 36,3 | 36,1 | 36,4 | 36,3 | 36,5 |
| 39 | 37,1 | 37,1 | 37,2 | 37,0 | 36,9 | 36,9 | 36,6 | 36,3 | 36,1 | 36,0 | 36,3 | 36,1 |
| 40 | 37,2 | 37,2 | 36,5 | 37,9 | 37,0 | 36,8 | 36,5 | 37,5 | 36,4 | 36,2 | 36,0 | 36,4 |

Съ 41 до 45 дня температура колебалась между 36,2—37,2°, а съ 45 до 52 дня между 36,0—36,8° Ц. Ходъ вѣса тѣла съ 22 дня былъ таковъ:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 55700 (22) | 55700 | 55400 | 53900 | 53900 | 53600 | 53200 | 53000 |
| 53500 (30) | 53400 | 53200 | 53000 | 53000 | 53400 | 53900 | 53900 |
| 54100 (38) | 54800 | 54900 | 53300 | 53100 | 53600 | 53600 | 53500 |
| 56800 (46) | 56500 | 57200 | 57500 | 58000 | 57700 | 58000 |       |

Объективные же явленія съ 22 дня шли такъ: до 29 дня стулъ 1—2 р. въ сутки жидко; съ 30 до 37 дня испражненіе ввидѣ густой кашицы, а съ 37 до 52 дня оформлено. Количество мочи колебалось отъ 2100 до 4400 к. с., при уд. вѣсѣ 1,009—1,005, безъ бѣлка. Съ 22 дня не было свистовъ въ груди. Съ

32 до 39 дня селезенка прощупывалась на  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{3}{4}$  пальца, а загибъ до 50 дня прощупывался край, съ каковымъ состояніемъ селезенки большой и выписался.

№ 29. № пр. журн. 5580. Крестьянинъ Ак — въ, 26 лѣтъ, поступилъ 30/VI 93 г. на 9 день болѣзни, жалуясь на головную боль и общее недомоганіе.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Ни печень, ни селезенка не прощупываются. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 30 дня таковъ:

|      |            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Т-ра | утр.       | 38,2  | 38,3   | 38,7   | 38,0   | 38,2   | 38,2   | 38,1   | 37,6   | 37,8   | 38,0   | 37,1   | 37,3   | 38,2   |
|      | веч.       | 39,0  | 39,3   | 39,1   | 39,0   | 38,6   | 38,2   | 38,8   | 38,6   | 38,8   | 38,6   | 38,5   | 38,9   | 38,8   |
|      | утр.       | 37,8  | 38,0   | 38,0   | 37,2   | 37,5   | 37,2   | 38,0   | 36,7   |        |        |        |        |        |
|      | веч.       | 39,2  | 38,0   | 39,3   | 38,4   | 38,7   | 38,2   | 38,4   | 37,0   |        |        |        |        |        |
|      | Вѣсъ тѣла: | 50700 | —50400 | —50000 | —49500 | —48800 | —48800 | —49100 | —48700 | —48400 | —48200 | —47600 | —47700 | —47100 |
|      |            | 48200 | —47600 | —47700 | —47100 | —47100 | —46700 | —46500 | —46900 | —46400 | —46200 | —46000 |        |        |

Съ 12 до 19 дня дѣлалось ежедневно по 2 ванны 28° R., въ остальные же дни по одной. Пища — молоко: до 11 дня по 1000 к. с., а съ 12 до 30 дня 2200 к. с. Объективные явленія до 30 дня были: стулъ 2—4 р. въ сутки жидко; мочи 500—2600 к. с., уд. вѣса 1,025—1,008, съ незначит. количествомъ бѣлка до 23 дня; р. по Эрлиху положительная до 21 дня. Съ 16 дня прощупывался край селезенки, а съ 21 дня селезенка выдавалась на 1 палецъ. Тифозное состояніе исчезло на 26 день. Съ 25 дня головокруженіе безъ головной боли. Съ 31 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болѣзн. | Температура |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              | 8           | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
| 31           | 37,0        | 36,0 | 36,7 | 37,4 | 37,7 | 37,6 | 38,3 | 38,1 | 37,8 | 37,2 | 37,0 | 37,0 |
| 32           | 36,3        | 36,4 | 36,5 | 37,0 | 36,6 | 36,8 | 37,2 | 37,0 | 37,4 | 37,2 | 37,2 | 37,0 |

Давъ въ 12 ч. ночи 33 дня 37,1° и въ 8 ч. вечера 36 дня 37,2°, въ остальное время до 46 дня т-ра колебалась между 36,0—37,0° C.; съ 47 дня шла такъ:

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 47 | 37,0 | 36,5 | 36,5 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 36,4 | 36,5 | 36,3 | 36,1 | 36,2 | 36,4 |
| 48 | 37,7 | 36,6 | 36,4 | 37,0 | 36,8 | 37,0 | 36,6 | 36,5 | 36,3 | 36,5 | 36,4 | 36,4 |
| 49 | 36,8 | 37,0 | 36,4 | 37,1 | 37,0 | 37,1 | 36,9 | 36,5 | 36,4 | 36,3 | 36,8 | 36,6 |
| 50 | 36,6 | 36,3 | 36,6 | 36,8 | 37,0 | 37,8 | 37,0 | 37,2 | 37,2 | 36,7 | 36,8 | 36,5 |

Достигнувъ въ 6 ч. вечера 51 дня 37,2°, температура далѣе до 62 дня колебалась опять между 36,0—37,0° C. Ходъ вѣса тѣла съ 31 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 46000 (31) | 45900 | 45900 | 45900 | 45700 | 46600 | 46200 | 46200 |
| 46700 (39) | 46600 | 47200 | 47700 | 48000 | 48000 | 48300 | 48600 |
| 49200 (47) | 49500 | 49900 | 49900 | 50200 | 50600 | 50800 | 50800 |
| 51100 (55) | 51400 | 51200 | 52100 | 52300 | 52500 | 52900 | 52700 |

Объективные же явленія съ 31 дня шли такъ: до 36 дня испраженія ввидѣ густой кашицы; съ 36 до 54 дня оформлено желтое; а съ 54 до 62 дня оформлено цвѣта глины. Количество мочи отъ 2400—5600 к. с., при уд. вѣсѣ 1,008—1,005, безъ бѣлка. Чаю большой выпивалъ по 2400—4400 к. с. въ сутки. Съ 40 дня не было головокруженія. Съ 47 дня прощупывался край селезенки до 52 дня. Съ 55 дня языкъ оставался чистымъ. Съ 44 дня пища събитанная (съ мясомъ). При выпискѣ на 62 день измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 30. № пр. журн. 2303. Крестьянинъ Г—въ, 22 лѣтъ, поступилъ 23/III 93 г. на 11 день болѣзни, жалуясь на головную боль и поносъ.

St. pr. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди измѣненій не замѣтно. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнена. Печень не прощупывается. Селезенка прощупывается на 1 палецъ, тверда. Ходъ температуры и вѣса тѣла до 17 дня таковъ:

|      |            |       |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------|--------|--------|--------|------|------|
| Т-ра | утр.       | 38,7  | 39,0   | 38,6   | 38,4   | 38,5 | 38,0 |
|      | веч.       | 39,5  | 39,5   | 39,4   | 39,1   | 39,0 | 38,0 |
|      | Вѣсъ тѣла: | 51400 | —50500 | —50100 | —49800 |      |      |

Пищью — молоко: до 14 дня 1000 к. с., а съ 14 до 18 дня 2400 к. с. и бульонъ съ 2 яйцами. Объективные явленія до 17 дня были: стулъ 3—4 р. въ сутки жидко; мочи 300—400 к. с., уд. вѣса 1,020—1,016, съ незначительнымъ количествомъ бѣлка; р. по Эрлиху до 18 дня. Уменьшеніе тифозного состоянія и его исчезаніе на 17 день. Съ 18 дня начато измѣреніе температуры чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болъзн. | Въсь  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 18           | 50300 | 37,2 | 37,4 | 31,5 | 37,9 | 37,3 | 38,0 | 38,6 | 38,5 | 39,7 | 37,6 | 37,4 | 37,4 |
| 19           | 49800 | 37,1 | 36,5 | 36,9 | 36,6 | 36,9 | 37,3 | 37,6 | 38,2 | 38,0 | 38,0 | 37,8 | 36,7 |
| 20           | 50200 | 36,7 | 36,8 | 36,6 | 36,7 | 36,9 | 37,0 | 37,9 | 38,2 | 37,9 | 37,4 | 4,7  | 37,2 |
| 21           | 50700 | 36,7 | 36,6 | 36,7 | 36,3 | 37,2 | 37,3 | 38,0 | 38,4 | 38,3 | 38,3 | 37,9 | 36,7 |
| 22           | 51000 | 36,3 | 36,2 | 36,6 | 36,6 | 37,2 | 36,9 | 37,3 | 37,6 | 37,6 | 37,4 | 4,7  | 36,6 |
| 23           | 51300 | 36,3 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,4 | 36,8 | 37,3 | 37,8 | 38,0 | 37,2 | 37,5 | 36,9 |
| 24           | 51800 | 36,4 | 36,3 | 36,3 | 36,4 | 36,5 | 36,8 | 37,3 | 37,7 | 37,5 | 37,1 | 37,2 | 36,7 |
| 25           | 51000 | 36,4 | 36,3 | 36,4 | 36,3 | 36,6 | 37,2 | 37,7 | 37,7 | 37,8 | 37,8 | 37,1 | 36,8 |
| 26           | 51000 | 36,6 | 36,3 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 37,4 | 37,4 | 37,6 | 37,6 | 37,8 | 37,0 | 37,1 |
| 27           | 51000 | 36,0 | 36,4 | 36,4 | 36,7 | 37,0 | 36,8 | 37,4 | 37,6 | 37,6 | 37,3 | 37,0 | 36,5 |
| 28           | 51400 | 36,4 | 36,5 | 37,1 | 37,3 | 37,2 | 37,4 | 37,3 | 37,5 | 37,5 | 37,3 | 37,4 | 36,8 |

Съ 29 до 36 дня температура колебалась между 36,2—37,3°, давъ въ 8 ч. вечера 30 дня 37,4°; на 37 день температура шла такъ:

|    |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 37 | — | 36,8 | 37,1 | 36,6 | 37,3 | 37,6 | 37,1 | 37,3 | 37,0 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 36,5 |
|----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

а съ 38 до 43 дня температура колебалась между 36,0—37,2°, достигнувъ лишь одинъ разъ 37,3°С. (8 ч. вечера 38 дня). Ходъ въса тѣла съ 29 дня былъ такой:

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 51000 (29) | 51200 | 51300 | 51600 | 51800 | 52500 | 52500 | 53000 |
| 52700 (37) | 53300 | 54000 | 53700 | 53800 | 54100 | 54400 |       |

Объективная же явленія съ 18 дня измѣнялись такъ: до 26 дня стулъ 1—3 р. въ сутки жидко; съ 26 до 36 дня испражнение ввидъ густой кашицы; а съ 36 до 43 дня оформлено. Количество мочи колебалось отъ 600 до 4800 к. с., при уд. вѣсѣ 1,016—1,005, съ незначительнымъ количествомъ бѣлка до 20 дня и слѣды бѣлка на 21 день. Чашъ болъзны выпивалъ по 1600—4000 к. с. въ сутки. Пища съ 22 до 29 дня была: бульонъ, котлета, 2 манн. кашн, 1300 к. с. молока. Съ 27 дня селезенка, постепенно уменьшавшаяся, перестала прощупываться. Съ 31 дня не было голопокружения. Съ 38 дня языкъ оставался чистымъ. При вышнѣхъ на 43 день измѣненій со стороны внутреннихъ органовъ не замѣчалось.

№ 31. № пр. журн. 7994. Крестьянинъ Е.—въ, 17 лѣтъ, поступилъ 18/IX 93 г. на 10 день болъзни, жалуясь на головную боль и поносъ.

St. pr. Хорошаго тѣлосложения и питанія. Порядочное тифозное

состояніе. Обложенный языкъ. Кожа чиста. Со стороны органовъ груди только кое-гдѣ отдѣльные высокіе свисты. Верхняя граница турности печени и селезенки не измѣнена. Прощупываются: край печени и на 1 палецъ твердая селезенка; обѣ слегка болъзненны. Ходъ температуры и въса тѣла до 22 дня таковъ:

|           |             |             |             |             |             |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| утр.      | 38,5        | 39,6        | 39,6        | 39,6        | 39,4        | 39,0         | 39,1 | 38,7 | 38,6 | 38,8 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| веч.      | 40,0        | 40,4        | 40,0        | 40,1        | 40,0        | 39,5         | 39,3 | 39,2 | 39,9 | 39,3 | 35,8 | 38,7 | 38,7 |
| Вѣс тѣла: | 52500—51900 | 51200—51200 | 50700—50400 | 50000—49200 | 48700—48400 | 47800—47600. |      |      |      |      |      |      |      |

Съ 11 дня ежедневно дѣлалось 3 ванны 28°R. Пища—молоко: на 10 день 1000 к. с., на 11—12 день 1800 к. с., а съ 13 до 38 дня 2400 к. с. Объективные явленія до 22 дня были: стулъ 2—7 р. въ сутки жидко; мочи 100—600 к. с., уд. вѣса 1,030—1,016, съ незначительнымъ количествомъ бѣлка (на 20 день его было порядочно); р. по Эрлиху положительная до 22 дня. Съ 12 дня не было болъзненности селезенки и съ 20 дня селезенка прощупывалась на 1/2 пальца; съ 16 дня не было болъзненности печени. Съ 17 дня стало уменьшаться тифозное состояніе и исчезло на 23 день. Съ 23 дня началъ измѣрять температуру чрезъ 2 часа и ходъ ея былъ такой:

| День болъзн. | Въсь  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23           | 46900 | 37,8 | —    | —    | —    | —    | 36,8 | 36,9 | 37,3 | 37,8 | 38,1 | 37,8 | 37,6 |
| 24           | 46400 | 37,4 | 37,8 | 38,3 | 38,9 | 39,0 | 39,8 | 39,5 | 39,4 | 39,0 | 38,0 | 38,6 | 38,3 |
| 25           | 46600 | 38,0 | 38,2 | 38,6 | 38,8 | 39,0 | 39,4 | 39,1 | 38,7 | 38,1 | 38,8 | 39,0 | —    |
| 26           | 46100 | 37,8 | 37,0 | 37,7 | 37,2 | 38,4 | 38,8 | 38,7 | 38,3 | 38,1 | 37,8 | 37,6 | 37,0 |
| 27           | 45900 | 37,2 | 37,1 | 37,8 | 37,8 | 38,0 | 38,3 | 38,5 | 38,3 | 37,4 | 37,3 | 37,2 | 37,3 |
| 28           | 46100 | 36,7 | 36,9 | 37,1 | 37,0 | 37,3 | 37,7 | 37,7 | 37,8 | 37,8 | 37,6 | 37,5 | 36,6 |
| 29           | 45600 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | 36,4 | 37,6 | 37,4 | 36,8 | 37,6 | 37,5 | 37,4 | 37,2 |
| 30           | 45600 | 37,2 | 36,8 | 37,1 | 37,3 | 37,2 | 37,5 | 37,8 | 38,2 | 38,6 | 38,2 | 37,0 | 37,0 |
| 31           | 45700 | 36,8 | 37,1 | 37,4 | 37,4 | 37,5 | 37,6 | 37,7 | 37,8 | 37,9 | 39,8 | 40,5 | 40,3 |
| 32           | 46000 | 39,2 | 38,6 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,1 | 37,0 | 36,5 | 36,7 | 36,8 | 36,3 | 36,4 |
| 33           | 45100 | 36,2 | 36,4 | 36,1 | 36,8 | 36,6 | 36,4 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,1 | 36,0 | 36,2 |
| 34           | 44500 | 36,8 | 36,1 | 36,5 | 36,5 | 36,7 | 36,4 | 36,0 | 36,0 | 36,7 | 36,0 | 36,1 | 36,2 |
| 35           | 45000 | 36,4 | 36,7 | 37,2 | 40,0 | 38,9 | 37,7 | 37,0 | 37,2 | 36,8 | 36,8 | 36,0 | 36,4 |
| 36           | 45300 | 36,2 | 36,0 | 36,4 | 36,6 | 36,2 | 36,0 | 36,4 | 36,3 | 36,5 | 36,8 | 36,8 | 36,4 |
| 37           | 44900 | 36,6 | 36,3 | 36,7 | 37,3 | 38,4 | 38,2 | 37,2 | 37,0 | 36,8 | 37,0 | 36,7 |      |
| 38           | 45100 | 36,4 | 36,2 | 36,7 | 36,5 | 36,3 | 36,5 | 36,7 | 36,1 | 36,3 | 36,4 | 36,0 | 36,6 |

Съ 39 до 78 дня болъзни температура колебалась при двухъ часовомъ ея измѣреніи между 36,0—37,2° и лишь въ слѣдующіе

дни она была выше: въ 10 ч. утра 50 дня и въ 2 часа дня 57 дня т-ра=37,3; на 55 день (въ 2 часа дня) на 64 и 77 дни (въ 4 часа дня), а также на 69 (въ 6 ч. вечера) т-ра=37,4; наконецъ на 68 день (въ 4 ч. дня и 10 ч. вечера) и на 69 день (въ 8 ч. вечера) т-ра=37,5°C. Ходъ вѣса тѣла съ 39 дня виденъ изъ слѣдующей таблицы:

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45200 (39) | 45700 | 45100 | 45700 | 45800 | 45900 | 46000 | 46300 | 46500 | 46600 |
| 46600 (49) | 47400 | 47500 | 47900 | 47700 | 47000 | 48000 | 48500 | 48500 | 48800 |
| 48900 (59) | 48800 | 49200 | 49800 | 50300 | 49700 | 50600 | 50300 | 51200 | 51600 |
| 50800 (69) | 50200 | 50700 | 52000 | 52200 | 52200 | 52100 | 51800 | 52200 | 52400 |

Объективные же явленія съ 23 дня измѣнялись такъ: до 40 дня стулъ 1—2 р. въ сутки жидко; съ 40 и до 47 дня испраженіе видѣтъ густой кашицы, желтое; съ 47 до 52 дня видѣтъ густой кашицы, то желтое, то хорошо окрашено; съ 52 до 65 дня оформлено, желтаго цвѣта; съ 65 до 69 дня оформлено, цвѣта глины; съ 69 до 72 дня снова видѣтъ густой кашицы, то желтое, то хорошо окрашенное; а съ 73 дня оформлено и хорошо окрашено. Количество мочи до 30 дня колебалось отъ 400 до 1600 к. с., при уд.вѣсѣ 1,021—1,009, съ незначительнымъ количествомъ бѣлка до 26 дня и слѣды бѣлка до 29 дня; затѣмъ мочи было 1600—5400 к. с., уд. вѣса 1,010—1,005, безъ бѣлка. Чаю больной выпивалъ по 1600—4400 к. с. въ сутки. Съ 28 дня не было свистовъ въ груди. На 35 день въ 12 часовъ пополудни знобъ. Съ 38 дня не было головокруженія. Съ 46 дня языкъ оставался чистымъ. Съ 26 дня прощупывался край селезенки, съ каковымъ ея состояніемъ больной и выписался на 78 день болѣзни.

Во всѣхъ случаяхъ 1 и 2 группы переходъ отъ молока къ твердой пищѣ велся такъ же, какъ это подробно видно въ случаяхъ 3, 4 и 5 группъ.

ТРЕТЬЯ ГРУППА.

№ 1-в. Крестьянинъ М—въ 16 лѣтъ поступилъ 17—IV 93 г. на 8 день заболѣванія, жалуясь на головную боль, знобъ, поносъ. № пр. журн. 3117.

17—IV 38,5—39,1. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Тифозное состояніе выражено отчетливо, но не сильно. Языкъ обложенъ по краямъ. Розовды на груди въ небольшомъ количествѣ. Со стороны органовъ груди только разбросанные въ небольшомъ количествѣ высокіе свисты. Верхнія границы печени и селезенки нормальны. Селезенка прощупывается краемъ. Отсутствіе аппетита. Дано 1000 кс. молока.

18. 39,0—38,8. 58200. Стулъ вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 400 кс. и 800 кс. вечер. Дано 2200 кс. молока.

19. 37,7—39,2. 58000. Стулъ вчера 1 р. и утр. 2 р. жидко. Ч. утр. 1200 кс., вечер. 800 кс. Дано 2200 кс. молока.

20. 37,4—39,4. 57200. Стулъ только утр. 2 р. жидко. Ч. по 800 кс. Потъ къ утру. М. 1100 кс. Уд. в. 1,015 б. незначит. колич., р. по Эрл. положительная. Дано: бульонъ, 2200 кс. молока.

21. 37,8—38,0. 57000. Стулъ вчера 2 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. Селезенка на  $\frac{1}{2}$  палеца. М. 1400 кс. Уд. в. 1,014, б. незначит. колич., р. по Эрл. положит. Дано: бульонъ, 2200 кс. молока.

22. 37,8—38,8. 56500. Стулъ только утр. 2 р. жидко. Ч. по 1600 кс. Позывъ на пищу. Розовды блѣдны. М. 1200 кс. Уд. в. 1,010, б. слѣды, р. по Эрл. отрицательная. Дано: бульонъ, 2200 кс. молока.

23. 37,5—38,4. 56200. Стулъ только утр. 3 р. жидко. Ч. по 1600 кс. Потъ къ утру. Головная боль меньше. Розовды нѣтъ. Селезенка на 1 палецъ. М. 2900 кс. Уд. в. 1,007, б. слѣды. Дано: бульонъ, кисель, 2500 кс. молока.

24. 36,8—38,3. 56100. Стулъ вчера днемъ 1 р. и утр. 2 р. жидко. Ч. по 2000 кс. Тифознаго состоянія нѣтъ. Шумъ въ ушахъ. Аппетитъ больше. М. 3600 кс. Уд. в. 1,006, б. слѣды. Дано: бульонъ, кисель, 2500 кс. молока.

25. 36,4—37,2. 55300. Стулъ только утр. 3 р. жидко. Ч. по 1600 кс. Потъ въ ночи. Свистовъ въ груди много меньше. М. 3600 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ. Дано: бульонъ, 2 яйца, 2500 кс. молока.

26. 37,3—38,0. 55400. Стулъ только утр. 2 р. жидко. Ч. по 1600 кс. Головная боль нѣтъ. М. 2900 кс. Уд. в. 1,007 б. нѣтъ. Дано: бульонъ, 2 яйца, 2500 кс. молока.

| Число<br>месяц. | Всех  | П И Щ А. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-----------------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                 |       | 8        | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |   |
| 27              | 54800 | 36,0     | —    | —    | —    | 36,8 | 37,4 | 36,6 | 36,7 | 37,4 | 37,7 | 37,3 |      | Бульон, 2 яйца, 2500 кс. молока.                      |
| 28              | 54800 | 36,6     | 36,8 | 36,9 | 37,1 | 36,7 | 36,8 | 37,0 | 37,2 | 37,2 | 37,3 | 37,1 | 36,4 | Бульон, 2 яйца, 2200 кс. молока.                      |
| 29              | 54500 | 36,7     | 36,4 | 37,0 | 37,1 | 37,2 | 37,1 | 37,3 | 36,8 | 36,9 | 36,6 | 37,1 | 36,4 | Манная каша.  |
| 30              | 54900 | 36,9     | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 37,2 | 37,5 | 37,5 | 36,9 | 37,3 | 36,9 | 37,2 | 36,8 |   |
| 1/у             | 54700 | 36,8     | 36,8 | 36,8 | 37,1 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 36,9 | 36,7 | 36,6 | 36,7 | —    | Суп, 2 яйца, 2 яйца, каша, 1250 кс. мол.              |
| 2               | 55000 | 36,9     | 37,0 | 37,0 | 37,6 | 37,3 | 37,5 | 37,7 | 37,5 | 37,6 | 36,9 | 37,5 | 36,8 |   |
| 3               | 55700 | 37,0     | 37,1 | 36,8 | 37,2 | 37,4 | 37,4 | 37,7 | 37,4 | 37,1 | 37,3 | 37,0 | 36,7 | Суп, котл., 2 яйца, 600 кс. молока.                   |
| 4               | 53700 | 37,1     | 37,0 | 37,2 | 37,3 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 36,9 | 36,5 | 36,1 | 36,7 | 36,7 | Тоже + 1 банка безж. корня.                           |
| 5               | 55600 | 36,5     | 36,9 | 37,2 | 36,9 | 37,0 | 37,3 | 37,3 | 37,0 | 36,8 | 36,5 | 36,9 | 37,1 | Тоже.   |
| 6               | 55400 | 37,1     | 36,9 | 37,0 | 37,6 | 37,5 | 37,9 | 36,9 | 36,8 | 36,4 | 36,6 | 36,9 | —    | Тоже.   |
| 7               | 55500 | 36,9     | 37,1 | 37,1 | 37,6 | 37,4 | 37,5 | 37,5 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,9 | 36,9 | Тоже + 1 банка безж. корня.                           |
| 8               | 55500 | 36,8     | 37,0 | 37,4 | 37,2 | 37,3 | 37,3 | 37,6 | 37,2 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 36,8 | Тоже.   |
| 9               | 55900 | 36,9     | 37,0 | 37,1 | 37,4 | 37,5 | 37,7 | 37,5 | 37,2 | 37,3 | 37,0 | 37,1 | 37,1 | Тоже.   |
| 10              | 56500 | 37,2     | 37,3 | 37,3 | 37,7 | 37,8 | 37,9 | 37,5 | 37,4 | 37,0 | 37,5 | 37,6 | 37,7 | Суп, котл., 2 яйца манн., 600 кс. мол.                |
| 11              | 57000 | 37,2     | 37,7 | 37,3 | 37,5 | 38,2 | 39,0 | 38,1 | 39,6 | 39,5 | 39,2 | 38,4 | 37,7 |   |
| 12              | 56200 | 37,5     | 36,9 | 36,8 | 36,5 | 37,2 | 37,9 | 38,4 | 39,1 | 39,1 | 38,7 | 38,2 | 37,6 | Суп, 2200 кс. мол., кисель.                           |
| 13              | 55300 | 37,3     | 37,4 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,1 | 36,4 | 37,0 | 36,4 | 36,6 |   |
| 14              | 54700 | 36,6     | 36,4 | 36,6 | 37,0 | 36,6 | 36,8 | 37,1 | 36,8 | 36,5 | 36,3 | 36,5 | 36,5 | Тоже.   |
| 15              | 54700 | 36,4     | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 36,5 | 36,4 | 36,5 | 36,4 | 36,9 | 36,0 | 36,0 | 36,4 | Тоже + 1 яйцо.  |
| 16              | 54300 | 36,5     | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,4 | 36,7 | 36,8 | 36,5 | 36,6 | 36,3 | 36,4 | 36,6 | Тоже.   |
| 17              | 54500 | 36,5     | 37,0 | 36,9 | 36,2 | 36,8 | 37,2 | 36,6 | 37,1 | 36,4 | 36,3 | 36,8 | 36,8 | Суп, 2 яйца, кисель, 2200 кс. молока.                 |
| 18              | 54700 | 36,6     | 36,4 | 37,2 | 38,0 | 37,3 | 37,1 | 37,1 | 36,7 | 36,4 | 36,5 | 36,4 | 36,6 |   |
| 19              | 54500 | 36,5     | 36,5 | 36,5 | 37,0 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | 36,4 | 36,1 | 36,1 | 36,7 | 36,6 | Суп, 1/2 котл., мя. каш. 1700 кс. мол., 1 булка.      |
| 20              | 54500 | 36,4     | 36,8 | 36,7 | 36,9 | 36,9 | 36,7 | 36,9 | 36,8 | 36,3 | 36,3 | 36,7 | 36,5 | Суп, котлет, 2 яйца, каша, 400 кс. молока, 1 ф. сыра. |
| 21              | 54500 | 36,8     | 36,7 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,3 | 36,6 | 36,1 | 36,2 | 36,5 |   |
| 22              | 54800 | 36,6     | 36,1 | 36,5 | 36,8 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,3 | 36,1 | 36,1 | 36,2 | 36,5 |   |
| 23              | 55300 | 36,6     | 36,6 | 36,8 | 37,0 | 36,8 | 36,8 | 36,6 | 36,4 | 36,0 | 36,1 | 36,4 | 36,4 |   |
| 24              | 55300 | 36,4     | 36,6 | 36,8 | 37,2 | 36,6 | 36,8 | 36,7 | 36,4 | 36,3 | 36,1 | 36,2 | 37,0 | Тоже + 1/2 ф. черн.                                   |
| 25              | 55900 | 36,6     | 36,8 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 37,0 | 36,9 | 36,6 | 36,3 | 36,1 | 36,5 | 36,6 | Тоже.   |
| 26              | 56300 | 36,6     | 36,8 | 37,0 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 37,0 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,3 | 36,9 | Суп, котл., 2 яйца, каша, 1 ф. ч. + 1/2 ф. б.         |
| 27              | 56400 | 36,7     | 36,8 | 36,6 | 37,1 | 36,8 | 37,0 | 36,7 | 36,3 | 36,2 | 36,5 | 36,4 | 36,7 |   |
| 28              | 56800 | 36,8     | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 36,9 | 37,3 | 36,9 | 36,8 | 36,3 | 36,6 | 36,5 | 36,5 | Щи, котл., макарона,                                  |
| 29              | 56900 | 36,4     | 36,8 | 36,9 | 37,1 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,0 | 36,5 | 36,3 | 1 1/2 ф. ч. + 1/2 ф. б.                               |
| 30              | 57100 | 36,6     | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 36,8 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,8 | 36,8 |   |
| 31              | 57000 | 36,9     | 36,9 | 36,8 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 37,0 | 36,7 | 36,4 |   |
| 1/чт            | 57800 | 37,0     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |

Объективные и субъективные явления.

Ступ 1 р. утр. жидко. Ч. по 1600 кс. Из. слегка обож. Вь легк. вознн. дмх. Селесенка на 1 1/2 пальца, тверда. М. 4000 кс. с. Уд. в 1,005, б. нить.

1 р. утр. вьдв густ. каш. Ч. утр. 2000 кс. и в. 1600 кс. Селесенка на 1 ш. М. 4600 кс. Уд. в 1,005, б. нить.

вчера вч. 1 р. и утр. 1 р. тапннж же. Ч. утр. 1600 кс., вч. 2000 кс. М. утр. 1 р. утр. тапннж же. Ч. утр. 1600 кс. и вч. 2000 кс. Уд. в 1,005, б. нить.

утр. 2 р. тапннж же. Ч. утр. 1600 кс., вч. 2000 кс. Селез. вь полож. на си. на 1/2 пальца; вь боков. волоку. М. 3600 кс. Уд. в 1,005, б. нить.

1 р. утр. оформл. Ч. утр. 2000 кс. М. 3700 кс. Уд. в 1,008, б. нить.

1 р. не жидко. Ч. утр. 1600 кс., вч. 2000 кс. Край селез. вь боков. полоз. при глукб. вздохх М. 4200 кс. Уд. в 1,005, б. нить.

1 р. утр. не жидко. Ч. утр. 1600 кс., вч. 2000 кс. Небольшой поть в очнн. М. 3800 кс. Уд. в 1,007, б. нить.

1 р. утр. не жидко. Ч. утр. 1600 кс., вч. 2000 кс. М. 3300 кс. Уд. в 1,007, б. нить.

2 р. утр. не жидко. Ч. по 2000 кс. Селез. прощн. не улетает. Животх магннй. М. 3800 кс. Уд. в 1,006, б. нить.

вчера вч. 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. утр. 1600 кс., вч. 2000 кс. М. 3600 кс. Уд. в 1,008, б. нить.

вчера днень 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. по 1600 кс. М. утерпа.

вчера вч. 1 р. и утр. 1 р. не жидко, жстот. Ч. утр. 1600 кс., вч. 2000 кс. Уралоц вь животх. М. 3700 кс. Уд. в 1,009, б. нить.

вчера вч. 1 р. и утр. 1 р. кашнеобразно, но не жидко. Ч. по 1400 кс. Языкх сильно облоажн. М. 2000 кс. Уд. в 1,009, б. нить.

вчера вч. 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 2000 кс. Край селезенка при глукб. вздохх вь положеннн на боку. М. 4000 кс. Уд. в 1,010, б. нить.

вчера вч. 1 р. и утр. 2 р. жидко. Ч. по 2000 кс. Поть вь очнн. М. 4200 кс. Уд. в 1,006, б. нить.

вчера 2 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 1600 кс. вч. 2000 кс. Селесенку прощнать не улетает. Потх ночью. М. 3100 кс. Уд. в 1,007, б. нить.

вч. дн. 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 2000 кс. М. 3600 кс. Уд. в 1,005, б. нить.

вчера 2 р. и утр. 2 р. жидко. Ч. утр. 2400 кс., вч. 2000 кс. М. 3400 кс. Уд. в 1,005, б. нить.

вчера днень 1 р. и утр. 1 р. кашнеобразно. Ч. по 2000 кс. М. 3300 кс. Уд. в 1,005, б. нить.

только утр. 1 р. кашнеобразно. Ч. по 2000 кс. Языкх слегка облоажн. М. 4200 кс. Уд. в 1,009, б. нить.

вчера 1 раз и утр. 1 р. вьдв густой кашнцы. Ч. по 2000 кс. М. 4200 кс. Уд. в 1,005, б. нить.

вчера 1 р. и утр. 1 р. вьдв густой кашнцы. Ч. по 2000 кс. Языкх слегка облоажн вь кашней подложнн. М. 4500 кс. Уд. в 1,005, б. нить.

вч. 1 р. и утр. 1 р. так же. Ч. по 2000 кс. М. 3200 кс. Уд. в 1,008, б. нить.

вчера 2 р. и утр. 1 р. тапннж же. Ч. утр. 2400 кс., вч. 2000 кс. М. 3800 кс. Уд. в 1,008, б. нить.

вчера 1 р. и утр. 1 р. оформлено. Языкх чнще. Ч. по 2000 кс. М. 3800 кс. Уд. в 1,005, б. нить.

1 р. утр. не жидко. Ч. по 2800 кс. М. 4900 кс. Уд. в 1,004, б. нить.

1 р. утр. не ж. Ч. утр. 2400 кс., в. 2400 кс. М. 4800 кс. Уд. в 1,005, б. нить.

вчера вч. 1 р. не жидко, хорошо обрашено. Ч. по 2800 кс. М. 4500 кс. Уд. в 1,006, б. нить.

1 р. вч. и 1 р. утр. не жидко. Ч. по 2800 кс. Языкх чнсть. М. 4500 кс. Уд. в 1,008, б. нить.

1 р. утр. не жидко. Ч. по 2800 кс. М. 4500 кс. Уд. в 1,007, б. нить.

вч. 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. по 2800 кс. М. 4300 кс. Уд. в 1,009, б. нить.

вч. 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. по 2800 кс. М. 4200 кс. Уд. в 1,006, б. нить.

1 р. утр. не жидко. Ч. по 2800 кс. Со стороны внутренн. орган. ннжнн нить.

№ 2-в. Крестьянинъ Сер—въ, 17 лѣтъ, поступилъ 6—УП 93 г. на 7 день заболѣванія съ жалобою на головную боль, общее недомоганіе, поносъ. № пр. журн. 5793.

6—УП 0—39,5. Хорошаго тѣлосложенія, порядочнаго питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный по краямъ языкъ; конецъ его чистъ. Кожа чиста. При перкуссии груди заглушенія звука не замѣтно. Дыханіе везикулярное, сера. тушость въ предѣлахъ нормъ. Тоны чисты. Селезенка тверда на 1 палецъ. Печень протушивается край. Верхнія границы тупости печени и селезенки не измѣнены.

7. 39,5—39,5. 49600. Стулъ 1 р. вечер. вчера жидко. Ч. не пилъ. Наожвъ живота нѣсколько ровное. *Вз груди везикулярное дыханіе съ выдохомъ и разбросанные высокие свисты.*

8. 38,9—39,3. 48700. Стула не было. Ч. не пилъ. *Ночью бредъ.* Мочился оба эти дня подъ себя.

9. 39,5—39,6. 47600. Стулъ 1 р. ночью жидко подъ себя. Ч. по 400 кс. Бреда нѣтъ и не было. Сильное тифозное состояніе. Слабость значительная. Уд. в. М. 1,026, б. порядочно, р. по Эрл. полож.

10. 39,6—39,0. 48000. Стулъ вчера днемъ 1 р. и ночью 1 р. жидко подъ себя. Ч. по 400 кс. *Розовъ пнтъ.* М. 800 кс. Уд. в. 1,022, б. порядочно, р. по Эрл. положит.

11. 38,8—39,0. 47300. Стулъ вчера 2 р. и утр. 1 р. жидко подъ себя. Ч. по 400 кс. *Свистовъ въ груди меньше.* М. 800 кс. Уд. в. 1,020, б. порядочно, р. по Эрл. полож.

12. 38,8—38,9. 46300. Стулъ вчера днемъ 3 р. и ночью 2 р. жидко подъ себя. Ч. по 400 кс. М. Уд. в. 1,023, б. порядочно, р. по Эрл. полож.

13. 38,8—39,2. 45500. Стулъ вчера 2 р. днемъ подъ себя и утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 400 кс., вечер. 800 кс. *Тифозное состояніе выражено слабо.* М. Утерина.

14. 38,0—39,4. 45300. Стулъ вчера днемъ 3 р. подъ себя и утр. 2 р. жидко. Ч. утр. 800 кс., вечер. 400 кс. М. Уд. в. 1,016, б. порядочно, р. по Эрл. полож.

15. 37,8—38,2. 44500. Стулъ вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 кс. Небольшое тифозное состояніе. М. 900 кс. Уд. в. 1,015, б. незначит. кол., р. по Эрл. полож.

16. 38,0—38,9. 44500. Стулъ вчера 3 р., ночью 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 кс. Позывъ на ишчу. М. 800 кс. Уд. в. 1,018, б. незначит. кол., р. по Эрл. полож.

17. 38,2—37,8. 43600. Стулъ 1 р. вчера днемъ жидко. Ч. утр. 400 кс., вечер. 800 кс. Свистовъ въ груди почти нѣтъ; лишь при первыхъ выдохахъ отдѣльные свисты слыши. М. 1000 кс. Уд. в. 1,015, б. незначит. кол., р. по Эрл. отрицательная. Давалось 2200 куб. сант. молока. Ежедн. 2 ванны 28°.

| Число<br>мѣсяца. | Вѣс.  | П И Щ А. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  |       | 8        | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
| 18/VII           | 44000 | 37,3     | —    | —    | —    | —    | 37,5 | 39,4 | 39,0 | 38,3 | 37,6 | 37,8 | 37,8 |
| 19               | 43500 | 37,0     | 37,4 | 37,3 | 37,7 | 38,2 | 37,0 | 38,2 | 37,5 | 37,5 | 38,0 | 37,6 | 37,0 |
| 20               | 42900 | 36,1     | 36,1 | 37,0 | 37,6 | 37,6 | 37,7 | 38,6 | 38,8 | 37,2 | 37,8 | 37,5 | 37,3 |
| 21               | 42700 | 36,9     | 36,7 | 37,6 | 38,0 | 37,4 | 37,4 | 38,2 | 38,6 | 38,5 | 37,6 | 37,4 | 36,9 |
| 22               | 42600 | 36,3     | 36,1 | 37,4 | 37,6 | 37,6 | 38,0 | 38,2 | 38,4 | 38,6 | 37,2 | 37,0 | 37,1 |
| 23               | 42300 | 36,2     | 36,4 | 37,3 | 37,3 | 37,0 | 37,8 | 38,2 | 38,6 | 38,8 | 37,6 | 36,4 | 36,4 |
| 24               | 42100 | 36,7     | 36,8 | 37,4 | 37,2 | 37,7 | 37,7 | 38,6 | 38,6 | 38,3 | 37,6 | 36,2 | 37,0 |
| 25               | 42200 | 36,6     | 36,6 | 36,9 | 37,2 | 37,4 | 37,8 | 38,5 | 38,4 | 38,6 | 37,7 | 37,4 | 37,2 |
| 26               | 42000 | 36,1     | 36,6 | 37,2 | 36,8 | 37,8 | 38,1 | 38,7 | 39,2 | 38,7 | 38,2 | 38,0 | 37,8 |
| 27               | 42300 | 37,6     | 37,9 | 38,0 | 38,3 | 38,2 | 38,4 | 39,0 | 39,2 | 39,0 | 38,0 | 37,4 | 36,8 |
| 28               | 41600 | 36,4     | 36,9 | 36,7 | 37,5 | 37,6 | 38,0 | 38,0 | 38,9 | 38,6 | 38,1 | 37,1 | 37,6 |
| 29               | 41800 | 36,5     | 36,3 | 36,8 | 37,5 | 37,7 | 38,0 | 38,1 | 38,3 | 38,2 | 38,0 | 37,8 | 37,5 |
| 30               | 41600 | 36,7     | 37,1 | 36,8 | 37,3 | 36,8 | 37,7 | 37,7 | 37,8 | 37,9 | 38,0 | 37,3 | 37,0 |

Буэльъ и 1800 кс.  
молока.

Объективные и субъективные явленія.

- Стулъ вчера 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. Языкъ обложенъ. Въ груди везикулярное дыханіе. Селез. на 1/2 пальца. Тупия, согг. нѣтъ. Слабость. Печень не протушивается.
- вчера 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. Позывъ на ишчу слышимъ. М. 1100 кс. Уд. в. 1,008; б. незначит. кол.
  - 1 р. вчера вечер. жидко. Ч. по 800 кс. М. 1200 кс. Уд. в. 1,011; б. незнач. кол.
  - 1 р. вч. жидко. Ч. по 800 кс. Головок. М. 1500 кс. Уд. в. 1,011; б. незнач. кол.
  - 1 р. вчера жидкой каш. Ч. утр. 800 кс., вѣч. 1200 кс. Ночь къ утру М. 1200 кс. Уд. в. 1,010; б. незнач. кол.
  - 1 р. вчера такъ же. Ч. утр. 1200, вѣч. 800 кс. Слаб. меньше. М. 1800 кс. Уд. в. 1,008; б. слыш.
  - 1 р. вчера такъ же. Ч. по 800 кс. М. 1200 кс. Уд. в. 1,008; б. слыш.
  - 1 р. вчера такъ же. Ч. утр. 1200, вѣч. 2000 кс. Селезенка на 1 палецъ, тверда. М. 2000 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.
  - 1 р. вчера такъ же. Ч. по 1200 кс. М. 2600 кс. Уд. в. 1,005; б. слыш.
  - вчера 1 р. и утр. 1 р. такъ же. Ч. по 800 кс. Головокруж. нѣтъ. М. 1700 кс. Уд. в. 1,007; б. нѣтъ.
  - вчера 2 р. и утр. 1 р. такъ же. Ч. утр. 800, вѣч. 1200 кс. М. 1200 кс. Уд. в. 1,006; б. нѣтъ.
  - вчера 1 р. такъ же. Ч. по 1200 кс. М. 1600 кс. Уд. в. 1,006; б. слыш.
  - вчера 1 р. такъ же. Ч. по 1200 кс. М. 2400 кс. Уд. в. 1,007; б. нѣтъ.

| Число. | Въс.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | П и щ а. |      |  |       |
|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|--|-------|
|        |       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    |          | 4    | 6  |       |
| 31     | 41200 | 37,3 | 37,4 | 37,5 | 37,2 | 37,2 | 37,3 | 37,6 | 38,0 | 37,8 | 37,6 | 37,6     | 37,6 | 37,6   | Тоже. |
| 1/шт   | 41600 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,8 | 36,6 | 37,4 | 37,0 | 37,4 | 37,1 | 37,3 | 37,3     | 37,3 |  |       |
| 2      | 41400 | 36,6 | 37,5 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 37,4 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 37,3 | 37,2     | 37,1 |  |       |
| 3      | 41500 | 37,3 | 37,1 | 37,7 | 37,2 | 37,3 | 37,2 | 37,7 | 37,4 | 37,4 | 37,2 | 37,5     | 37,8 |  |       |
| 4      | 41300 | 37,2 | 37,4 | 37,2 | 37,0 | 37,2 | 37,0 | 37,7 | 37,5 | 37,2 | 37,0 | 37,2     | 36,8 |  |       |
| 5      | 41400 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 37,3 | 36,9 | 37,3 | 37,2 | 37,5 | 37,2 | 37,6 | 37,0     | 37,0 | Буалош, 1800 кг. мол.  |       |
| 6      | 41200 | 36,8 | 36,6 | 36,6 | 36,8 | 36,9 | 36,8 | 37,1 | 36,6 | 37,4 | 37,0 | 37,0     | 37,1 | 1 мясная каша.   |       |
| 7      | 41500 | 37,2 | 36,9 | 36,6 | 36,7 | 37,1 | 37,4 | 37,9 | 37,4 | 37,3 | 37,3 | 37,4     | 37,5 | Буалош, 1 ящик, 1 каш.   |       |
| 8      | 41900 | 36,9 | 36,7 | 37,1 | 37,0 | 37,1 | 37,7 | 37,8 | 37,5 | 37,2 | 37,0 | 36,8     | 37,0 | пшесль, 1 ящик молоча.   |       |
| 9      | 41800 | 36,7 | 37,1 | 36,7 | 37,1 | 37,2 | 37,5 | 37,3 | 37,1 | 37,5 | 37,4 | 36,8     | 36,6 |  |       |
| 10     | 42100 | 36,7 | 36,8 | 37,1 | 36,8 | 37,2 | 37,4 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 37,0     | 36,9 |  |       |
| 11     | 42200 | 37,0 | 36,9 | 37,3 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,1 | 37,4 | 36,9 | 36,7 | 36,6     | 36,3 |  |       |
| 12     | 41800 | 36,7 | 36,9 | 37,2 | 37,2 | 37,0 | 37,0 | 36,7 | 36,4 | 36,4 | 36,2 | 36,6     | 36,6 | Овесл., 2 ящика, 2 мян. каша, 1200 молоча.                                       |       |
| 13     | 42400 | 36,5 | 36,7 | 36,7 | 36,9 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 36,5 | 36,3 | 36,0 | 36,0     | 36,2 | Тоже+1 букака безъ корки.  |       |
| 14     | 42200 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,9 | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 36,3 | 36,0     | 36,3 |  |       |
| 15     | 42100 | 36,4 | 36,6 | 36,3 | 36,7 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,6 | 36,2     | 36,1 |  |       |
| 16     | 42700 | 36,5 | 36,6 | 36,4 | 36,4 | 36,5 | 36,8 | 36,8 | 36,6 | 36,5 | 36,6 | 36,4     | 36,7 | Була, 1/2 якт., 2 мя. каш.   |       |
| 17     | 43000 | 36,3 | 36,3 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,7 | 36,4 | 36,0 | 36,0 | 36,2     | 36,2 | 1200 кс. м. т. безъ кор.   |       |
| 18     | 42800 | 36,5 | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,6 | 36,7 | 36,6 | 36,4 | 36,2 | 36,1     | 36,2 | Суп., 1/2 молоч., 2 мя. каш.   |       |
| 19     | 42500 | 36,5 | 36,7 | 36,7 | 37,1 | 36,5 | 36,6 | 36,8 | 36,4 | 36,2 | 36,1 | 36,3     | 36,8 | Суп., 500 кс. молоча-пшесль, 2 мян. каша, 1200 кс. мол., 1/2 ф. бѣл.             |       |
| 20     | 43600 | 36,7 | 36,8 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 36,6 | 36,5 | 36,8 | 36,5 | 36,6 | 37,0     |      | Суп., ктл., 2 мя. каш., 1000 кс. мол., 1/2 бѣл.                                  |       |
| 21     | 43700 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,4 | 36,7     |      | Суп., 500 кс. молоча-пшесль, 2 мян. каша, 1200 кс. мол., 1 ф. бѣл., 1/2 ф. черн. |       |
| 22     | 43900 | 36,7 | 36,7 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 36,4 | 36,2 | 36,0 | 36,4 | 36,8     |      | Суп., 500 кс. молоча-пшесль, 2 мян. каша, 1200 кс. мол., 1 ф. бѣл., 1/2 ф. черн. |       |
| 23     | 42800 | 36,7 | 36,7 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 36,4 | 36,2 | 36,0 | 36,4 | 36,8     |      | Суп., 500 кс. молоча-пшесль, 2 мян. каша, 1200 кс. мол., 1 ф. бѣл., 1/2 ф. черн. |       |
| 24     | 44200 | 36,8 | 36,7 | 37,1 | 37,3 | 37,0 | 36,8 | 36,3 | 36,2 | 36,0 | 36,2 | 36,7     |      | Суп., котлета, 2 мян. каша, 250 кс. молоча, 1 ф. бѣл.-1/2 ф. черн.               |       |
| 25     | 44100 | 36,2 | 36,3 | 36,6 | 37,0 | 37,3 | 36,7 | 36,2 | 36,5 | 36,1 | 36,0 | 36,0     | 37,0 |  |       |
| 26     | 45400 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | 36,8 | 37,1 | 36,7 | 36,9 | 36,3 | 36,0 | 36,3 | 36,6     | 36,6 |  |       |
| 27     | 44900 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 37,1 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,5 | 36,3 | 36,0 | 36,6     | 36,6 |  |       |
| 28     | 46200 | 36,6 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,4 | 36,3 | 36,2 | 36,3     | 36,8 |  |       |
| 29     | 45900 | 36,7 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,4 | 36,5 | 36,2 | 36,3 | 36,2     | 36,1 |  |       |
| 30     | 46400 | 36,7 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | 36,2 | 36,0     | 36,8 |  |       |
| 31     | 47300 | 36,8 | 36,7 | 36,9 | 36,8 | 37,1 | 36,7 | 36,8 | 36,3 | 36,4 | 36,0 | 36,7     | 36,8 |  |       |
| 1/шт   | 46900 | 36,8 | 36,6 | 36,6 | 37,2 | 36,8 | 36,9 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,4     | 36,5 |  |       |
| 2      | 46800 | 36,5 | 36,6 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,7 | 36,4 | 36,3 | 36,2     | 36,3 |  |       |
| 3      | 47300 | 36,8 | 36,5 | 36,3 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,4 | 36,3 | 36,3 | 36,4     |      | Щи, котлета, 2 мян. каша, 250 кс. молоча, 1 ф. бѣл.-1 ф. черн.                   |       |
| 4      | 48000 | 36,7 | 36,4 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 36,6 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,1 | 36,9     |      |  |       |
| 5      | 47900 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 37,3 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 36,5 | 36,5     |      |  |       |
| 6      | 48200 | 36,7 | 37,1 | 37,2 | 36,9 | 36,7 | 36,9 | 36,8 | 36,5 | 36,3 | 36,0 | 36,2     | 36,8 |  |       |
| 7      | 49700 | 36,8 | 36,7 | 37,1 | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,6 | 36,4 | 36,3 | 36,2     | 36,6 |  |       |
| 8      | 49500 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,9 | 36,7 | 36,9 | 36,8 | 36,4 | 36,0 | 36,1 | 36,2     | 36,9 |  |       |
| 9      | 50000 | 36,8 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |  |       |

Объективные и субъективные явления.

Стуаз вч. 2 р. такни же Ч. по 1200 кс. Нымя часть. М. 2600 кс. Уд. в. 1,006; 6. нѣт.

- вчера 1 р. такни же Ч. по 1200 кс. Селезна на 1/2 ящца, тверд. М. 2800 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. такни же Ч. утр. 1600, вечер. 1200 кс. М. 1600 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. такни же Ч. утр. 1600, вечер. 1200 кс. М. 2900 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- вчера 2 р. такни же Ч. утр. 1600, вечер. 1200 кс. Край селезна твердый. М. 2600 кс. Уд. в. 1,006; 6. нѣт.
- 1 р. такни же Ч. по 1600 кс. Спмь хорони. М. 3800 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- вчера 1 р. такни же Ч. по 1600 кс. М. 3100 кс. Уд. в. 1,006; 6. нѣт.
- вчера 1 р. такни же Ч. по 1600 кс. М. 3900 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- 1 р. утр. такни же Ч. по 1600 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- вчера 1 р. такни же Ч. утр. 2000, вечер. 1600 кс. М. 3500 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- вчера 1 р. вчдѣт гуск. каш. Ч. утр. 1600, вечер. 2000 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,004; 6. нѣт.
- 1 р. утр. такни же Ч. утр. 1600, вч. 2000 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,004 6. нѣт.
- 1 р. утр. такни же Ч. по 1600 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,004; 6. нѣт.
- 1 р. вчра такни же Ч. по 1600 кс. М. 4400 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- 2 р. вчра и утр. 1 р. такни же Ч. по 1600 кс. М. 4300 кс. Уд. в. 1,005 6. нѣт.
- не было. Ч. утр. 1600, вечер. 2000 кс. М. 4800 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- 1 р. вчра такни же Ч. по 2000 кс. М. 4300 Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- 1 р. утр. такни же Ч. утр. 2000, вч. 1600 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- не было. Ч. по 2000 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1,006; 6. нѣт.
- 1 р. вчра такни же Ч. по 2000 кс. М. 5000 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- 1 р. вчра и утр. 1 р. такни же Ч. утр. 2000, вч. 2100 кс. М. 5000 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- 1 р. вчра такни же Ч. утр. 2000 кс., вечер. 2400 кс.
- не было. Ч. утр. 2000, вечер. 1600 кс. М. 5200 кс. Уд. в. 1,006; 6. нѣт.
- 1 р. вчра оформлено, желтое. Ч. утр. 1600, вечер. 2000 кс. М. 5600 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- 1 р. вчра такни же Ч. по 2000 кс. М. 4500 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- 1 р. утр. такни же Ч. по 2000 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- не было. Ч. утр. 1600, вечер. 2000 кс. М. 5200 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- вчера 1 р. такни же Ч. по 2000 кс. М. 5700 кс. Уд. в. 1,004; 6. нѣт.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. такни же Ч. по 2400 кс. М. 5500 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- вчера 1 р. такни же Ч. по 2400 кс. М. 5200 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- вчера 1 р. такни же Ч. по 2400 кс. М. 4800 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- вчера 2 р. такни же, нѣтѣтѣ Ч. по 1600 кс. М. 4400 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- вчера 2 р. такни же Ч. утр. 2400, вч. 2000 кс. М. 6700 кс. Уд. в. 1,004; 6. нѣт.
- вчера 2 р. такни же Ч. по 2000 кс. М. 4300 кс. Уд. в. 1,006; 6. нѣт.
- вчера 2 р. оформлено и хорошо окрашено. Ч. по 2000 кс. М. 6000 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- вч. 1 р. такни же Ч. утр. 2000, вч. 2400 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,008; 6. нѣт.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. такни же Ч. утр. 2000, вч. 2400 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,007; 6. нѣт.
- утр. 1 р. такни же Ч. утр. 2400 кс., вечер. 1600 кс. М. 6200 кс. Уд. в. 1,004; 6. нѣт.
- не было. Ч. утр. 2000 кс., вч. 1200 кс. М. 3600 кс. Уд. в. 1,010; 6. нѣт.
- вчера 2 р. такни же Ч. по 1600 кс. Выпскам: со стороны внутренних огра-нонь край твердый селезна.

№ 3. Крестьянин Ор-в, 22 лѣтъ, поступилъ 9 - IV 93 г. на 7 д. болѣзнъ съ жалобой на головную боль и поносъ. № пр. журн. 2998.

9 - IV 39, 0 - 38, 5. Хорошаго тѣлосостоянія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный языкъ. На козѣ живота нѣсколько розеолъ. Со стороны органовъ груди замѣненіи не замѣтно. Верхнія границы печени и селезенки не замѣнены. Печень и селезенку прощупать не удается. 10. 38, 2 - 39, 0, 11. 38, 8 - 39, 4. St. idem. Стулъ по 2 р. жидко. М. Уд. в. 1, 021, б. пѣтъ. Дано 1000 кс. молока. 12. 38, 7 - 39, 5. 62500. Стулъ вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. Розеолъ нѣтъ. 13. 38, 7 - 39, 8. 61900. Стулъ вчера вец. 1 р. и утр.

1 р. жидко. Ч. утр. 1200 кс., вечер. 800 кс. М. Уд. в. 1, 008 при 800 кс., б. пѣтъ. р. по Эрх. отрицательная. 14. 38, 0 - 39, 3. 61800. Стулъ вчера днемъ 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 1600 кс., вечер. 1200 кс. М. 2400 кс. Уд. в. 1, 008, б. пѣтъ. 15. 37, 4 - 38, 6. 62000. Стулъ вчера днемъ 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 1600 кс., вечер. 2400 кс. М. 2000 кс. Уд. в. 1, 007, б. пѣтъ. 16. 37, 3 - 38, 2. 61500. Стулъ вчера днемъ 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 1200, вечер. 1600. М. 4000 кс. Уд. в. 1, 005 б. пѣтъ. Тифознаго состоянія нѣтъ. Давалось: бульонъ, 2 яйца, 1700 кс. мол. 1 ванна 28° вечер.

| Число<br>мѣсц. | Вѣс.  | П И Ц А. |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |   |
|----------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|                |       | 8        | 10    | 12    | 2     | 4     | 6         | 8     | 10    | 12    | 2     | 4     | 6     |   |
| 17/iv          | 61300 | —        | —     | —     | 37, 3 | 37, 2 | 37, 2     | 37, 0 | 36, 9 | 37, 0 | 36, 7 | 37, 0 | 36, 6 | Бульонъ, 2 яйца, 2<br>манныя кашн 1700 кс.<br><br>молока. |
| 18             | 60800 | 36, 5    | 36, 8 | 36, 8 | 36, 8 | 36, 8 | 37, 0     | 37, 1 | 36, 7 | 36, 8 | 36, 9 | 36, 5 | 36, 6 |   |
| 19             | 60400 | 36, 2    | 37, 0 | 36, 5 | 36, 8 | —     | 37, 0     | 36, 7 | 36, 1 | 36, 6 | 36, 2 | 36, 5 | 36, 6 |   |
| 20             | 60200 | 36, 3    | 36, 4 | 36, 8 | 36, 3 | 36, 5 | 36, 9     | 36, 8 | 36, 7 | 36, 7 | 36, 6 | 36, 5 | 36, 4 |   |
| 21             | 60100 | 36, 5    | 36, 6 | 36, 7 | 36, 7 | 37, 2 | 37, 4     | 37, 5 | 37, 6 | 37, 4 | 37, 3 | 37, 1 | 36, 9 |   |
| 22             | 60100 | 36, 9    | 37, 3 | 37, 2 | 37, 3 | 37, 4 | 38, 0     | 37, 9 | 37, 8 | 37, 7 | 37, 7 | 37, 7 | 37, 5 |   |
| 23             | 60100 | 37, 4    | 37, 3 | 37, 0 | 36, 8 | 37, 3 | 37, 4     | 37, 8 | 38, 2 | 37, 8 | 37, 3 | 36, 6 | 36, 4 |   |
| 24             | 59900 | 37, 3    | 37, 2 | 38, 0 | 37, 0 | 37, 3 | 36, 6     | 36, 6 | 36, 8 | 36, 6 | 36, 3 | 36, 4 | 36, 9 |   |
| 25             | 60500 | 36, 6    | 36, 3 | 37, 8 | 36, 8 | 36, 9 | 36, 5     | 36, 9 | 36, 8 | 36, 6 | 36, 8 | 36, 5 | 36, 5 |   |
| 26             | 60200 | 36, 5    | 36, 8 | 36, 8 | 36, 6 | 37, 0 | 36, 6     | 37, 1 | 36, 8 | 36, 7 | 36, 7 | 36, 4 | 36, 5 |   |
| 27             | 59700 | 36, 8    | 37, 1 | 37, 2 | 37, 1 | 36, 9 | 36, 7     | 37, 1 | 36, 7 | 36, 6 | 36, 6 | 36, 4 | 36, 3 |   |
| 28             | 60100 | 36, 3    | 36, 2 | 36, 4 | 36, 8 | 37, 0 | 36, 8     | 37, 1 | 37, 4 | 36, 9 | 36, 5 | 36, 7 | 37, 0 |   |
| 29             | 60300 | 36, 8    | 36, 7 | 36, 9 | 36, 9 | 36, 8 | 36, 9     | 36, 8 | 36, 4 | 36, 6 | 36, 6 | 36, 5 | 36, 6 |   |
| 30             | 59800 | 36, 7    | 36, 9 | 37, 1 | 37, 4 | 37, 3 | 37, 0     | 37, 0 | 37, 0 | 37, 3 | 37, 6 | 36, 6 | 37, 0 |   |
| 1/v            | 60500 | 37, 2    | 37, 3 | 37, 0 | 36, 7 | 36, 8 | 37, 0     | 36, 8 | 36, 7 | 36, 7 | 36, 7 | 36, 5 | 36, 6 |   |
| 2              | 59700 | 36, 7    | 36, 6 | 36, 8 | 37, 1 | 37, 1 | 37, 1     | 36, 9 | 37, 2 | 36, 7 | 36, 4 | 36, 8 | 36, 8 |   |
| 3              | 60400 | 36, 7    | 36, 7 | 36, 9 | 37, 1 | 36, 7 | 37, 37, 1 | 36, 8 | 36, 7 | 36, 7 | 36, 3 | 36, 5 | 36, 4 |   |
| 4              | 60600 | 36, 6    | 36, 6 | 36, 7 | 37, 0 | 37, 1 | 36, 9     | 37, 0 | 36, 6 | 36, 4 | 36, 1 | 36, 2 | 36, 5 |   |
| 5              | 60700 | 36, 2    | 36, 4 | 36, 6 | 36, 8 | 37, 0 | 37, 3     | 37, 7 | 35, 3 | 36, 7 | 36, 4 | 36, 4 | 36, 5 |   |
| 6              | 61200 | 36, 5    | 36, 4 | 36, 6 | 36, 7 | 36, 7 | 36, 7     | 36, 8 | 36, 5 | 36, 2 | 36, 3 | 36, 4 | 36, 3 |   |
| 7              | 61700 | 36, 5    | 36, 6 | 36, 5 | 36, 6 | 36, 8 | 36, 8     | 36, 6 | 36, 4 | 37, 1 | 36, 1 | 36, 1 | 36, 4 |   |
| 8              | 62400 | 36, 6    | 36, 6 | 36, 6 | 36, 5 | 36, 6 | 36, 9     | 36, 7 | 36, 3 | 36, 4 | 36, 2 | 36, 1 | 36, 0 |   |
| 9              | 62600 | 36, 4    | 36, 6 | 36, 7 | 37, 0 | 37, 2 | 36, 9     | 36, 7 | 36, 4 | 36, 2 | 36, 1 | 36, 3 | 36, 4 |   |
| 10             | 62500 | 36, 4    | 36, 4 | 36, 5 | 36, 7 | 36, 7 | 36, 7     | 36, 5 | 36, 2 | 36, 2 | 36, 0 | 36, 4 | 36, 7 |   |
| 11             | 63100 | 36, 4    | 36, 7 | 36, 5 | 36, 8 | 36, 6 | 36, 8     | 36, 6 | 36, 3 | 36, 4 | 36, 4 | 36, 5 | 36, 3 |   |
| 12             | 64000 | 36, 6    | 36, 6 | 36, 4 | 36, 7 | 36, 6 | 36, 6     | 36, 4 | 36, 3 | 36, 3 | 36, 1 | 36, 3 | 37, 4 |   |
| 13             | 64800 | 36, 5    |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |   |

Объективными и субъективными явленіи.

Стулъ вчера 2 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 1600 кс. Слегка облож. лз. Шумъ въ уш. М. 4800 кс. Уд. в. 1, 005 б. пѣтъ.  
 > вч. 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 1600 кс. Потъ въ утру. М. 4400 кс. Уд. в. 1, 008; б. пѣтъ.  
 > 1 р. утр. жидко. Ч. по 1600 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1, 006; б. пѣтъ.  
 > вчера 2 р. жидкой кашней. Ч. утр. 2000, вец. 1600 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1, 005; б. пѣтъ.  
 > 1 р. утр. такъ же. Ч. утр. 1600, вец. 2000 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1, 006; б. пѣтъ.  
 > 1 р. вец. такъ же. Ч. утр. 2000, вец. 2400 кс. Шумъ въ ушахъ меньше. М. 4600 кс. Уд. в. 1, 005; б. пѣтъ.  
 > 1 р. вчера днемъ такъ же. Ч. утр. 2000, вец. 2400 кс. Потъ въ утру. М. 4300 кс. Уд. в. 1, 005; б. пѣтъ.  
 > 1 р. вчера вец. такъ же. Ч. утр. 2000, вец. 2400 кс. М. 4400 кс. Уд. в. 1, 008; б. пѣтъ.  
 > 1 р. утр. такъ же. Ч. по 2400 кс. М. 3600 кс. Уд. в. 1, 005; б. пѣтъ.  
 > 1 р. вчера днемъ густой кашней. Ч. по 2400 кс. Шумъ въ ушахъ нѣтъ. М. 4900 кс. Уд. в. 1, 008; б. пѣтъ.  
 > 1 р. вчера днемъ такъ же. Ч. по 2400 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1, 005; б. пѣтъ.  
 > 1 р. вч. вец. такъ же. Ч. по 2400 кс. М. 6000 кс. Уд. в. 1, 004; б. пѣтъ.  
 > 1 р. вец. вч. такъ же. Ч. по 2000 кс. М. 4400 кс. Уд. в. 1, 005; б. пѣтъ.  
 > 1 р. вч. вец. такъ же. Ч. по 2400 кс. М. 6800 кс. Уд. в. 1, 005; б. пѣтъ.  
 > вч. 1 р. и утр. 1 р. форма. Ч. по 2400 кс. М. 3900 кс. Уд. в. 1, 007; б. пѣтъ.  
 > вч. лз. 2 р. такъ же. Ч. утр. 2000, вец. 2400 кс. М. 5100. Уд. в. 1, 008; б. пѣтъ.  
 > вчера днемъ 1 р. такъ же. Ч. утр. 2000 кс., вец. 2400 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1, 007; б. пѣтъ.  
 > вч. 1 р. и утр. 1 р. такъ же. Ч. по 2400 кс. М. 3600 кс. Уд. в. 1, 005; б. пѣтъ.  
 > вчера вец. 1 р. такъ же. Ч. утр. 2000, вец. 2400 кс. Нымякъ чище. М. 4200 кс. Уд. в. 1, 006; б. пѣтъ.  
 > вчера 1 р. и утр. 1 р. такъ же. Ч. утр. 2000, вец. 2400 кс. М. 2900 кс. Уд. в. 1, 011; б. пѣтъ.  
 > вч. 1 р. и утр. 1 р. такъ же. Ч. по 2400 кс. М. 4400 кс. Уд. в. 1, 010; б. пѣтъ.  
 > вчера вец. 1 р. такъ же. Ч. утр. 2000, вец. 2400 кс. М. 4400 кс. Уд. в. 1, 010; б. пѣтъ.  
 > вчера вец. 2 р. такъ же. Ч. по 2400 кс. Языкъ чистъ. М. 5500 кс. Уд. в. 1, 005; б. пѣтъ.  
 > вчера 1 р. и утр. 1 р. такъ же. Ч. утр. 2000, вец. 2400 кс. М. 5300 кс. Уд. в. 1, 006; б. пѣтъ.  
 > вч. 1 р. и утр. 1 р. такъ же. Ч. по 2400 кс. М. 5600 кс. Уд. в. 1, 006; б. пѣтъ.  
 > вч. 1 р. и утр. 1 р. такъ же. Ч. по 2400 кс. М. 4400 кс. Выпалсы: со стороны внутреннихъ органовъ замѣненіи не замѣтно.

№ 4. Кр. В. Па — нр, 25 лѣтъ, поступилъ 17/ХП 92 г. на 12-й день болѣзнъ съ жалобой на головную боль, поносъ. № пр. журн. 10120.

17/ХП. 39,5 — 38,8. Хорошаго тѣлосложенія и пита- нія. Небольшое гастроезное состоянiе. Обложенный по краямъ языкъ, конецъ его чистъ. Кожа чиста. При перкуссии груди аукутъ всюду ясный. Дыханiе везикулярное съ выдохомъ и кое-гдѣ отдаленныя свисты. Серд. туновъ въ предѣлахъ нормы. Тоны чисты. Верхняя граница печени и селезенки безъ измѣненiй. Печень про- шупать не удается. Селезенка прощупывается краемъ при глубокомъ вдохѣ въ боковомъ положенiи больного. Головная боль; отсутствiе аппетита, небольшой кашель. 600 кс. молока.

18. 39,5—40,2. 68800. Стулъ вчера 1 р., ночью 2 р. и утр. 3 р. жидко. Тѣ же явленія. Дано 1700 кс. молока. 1 ванна 28° вечер.

19. 39,5—40,0. 68200. Стулъ вчера днемъ 3 р. и утр. 2 р. жидко. Чувствуетъ себя лучше. Объективно тѣ же явленія. М. 1400 кс. Уд. в. 1010; 6 нѣтъ. Дано 1700 кс. молока. 1 ванна 28° вечер.

20. 39,2—39,0. 67600. Стулъ 1 р. вечер. вчера жидко. *Тиф. состоянiе меньше. Позвог на пишу.* М. 3200 кс. Уд. в. 1,009; 6 нѣтъ. Дано 1700 кс. молока. 1 ванна 28° вечер.

21. 38,2—39,5. 66500. Стулъ 1 р. утр. жидко. *Селе-зенку прощупать не удается.* М. 1600 кс. Уд. в. 1,012, 6 нѣтъ. Дано 1700 кс. молока. 1 ванна 28° вечер.

22. 38,0—38,6. 66200. Стула со вчерашняго утра не было. Головной боли нѣтъ, но сильное головокруженiе. М. 2300 кс. Уд. в. 1,010 б. нѣтъ. Дано 1700 кс. молока. 1 ванна 28° вч. р.

| Число<br>мѣсяца | Вѣсь  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | П и щ а.                            |
|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------|
| 23/хп           | 66000 | 37,5 | —    | —    | —    | —    | 37,6 | —    | —    | —    | —    | —    | 37,3 | 36,5 Бульонъ+1700 кс. молока.       |
| 24              | 65000 | 36,5 | 36,5 | 37,0 | 36,8 | 37,1 | 37,2 | 36,7 | 36,5 | 36,4 | 36,4 | 36,1 | 36,3 | Бул., 2 яйца, 1200 кс. молока.      |
| 25              | 65300 | 37,0 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 36,6 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,2 | «                                   |
| 26              | 64800 | 37,2 | 37,0 | 36,8 | 36,5 | 36,8 | 36,6 | 36,5 | 36,6 | 36,6 | 36,8 | 36,2 | 36,3 | «                                   |
| 27              | 64400 | 36,8 | 36,5 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 36,8 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,8 | «                                   |
| 28              | 64100 | 36,3 | 37,0 | 36,6 | 36,7 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,3 | 36,2 | Тоже+1 бух. безъ кор.               |
| 29              | 64300 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 36,2 | 36,1 | 36,8 | 36,4 | 36,3 | 36,3 | 36,8 | 36,8 | Тоже+1 ман. каша.                   |
| 30              | 65100 | 36,8 | 36,6 | 36,2 | 36,0 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,6 | 36,0 | 36,2 | 36,2 | 36,3 | Супъ, котл., 2 ман. каша, 1/2 ф. б. |
| 31              | 65100 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,4 | 36,9 | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 36,9 | 36,8 | 36,9 | 37,4 | Тоже+еще 2/3 ф. бка.                |
| 1               | 65700 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | 37,1 | Тоже.                               |
| 2               | 65300 | 36,6 | 36,8 | 36,6 | 36,4 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 36,7 | 36,8 | 37,0 | «                                   |
| 3               | 68000 | 37,3 | 37,3 | 37,0 | 37,3 | 37,6 | 37,5 | 37,1 | 37,7 | 37,0 | 36,9 | 37,6 | 37,6 | «                                   |
| 4               | 67800 | 37,8 | 36,8 | 37,0 | 37,9 | 38,1 | 37,4 | 37,8 | 37,6 | 37,7 | 37,5 | 38,0 | 37,7 | «                                   |
| 5               | 68600 | 37,2 | 37,0 | 37,3 | 37,7 | 37,8 | 37,8 | 37,5 | 36,9 | 38,1 | 38,7 | 38,8 | 37,0 | «                                   |
| 6               | 67200 | 37,0 | 36,8 | 37,0 | 37,8 | 37,6 | 38,3 | 38,5 | 38,7 | 38,0 | 38,1 | 37,0 | 36,6 | «                                   |
| 7               | 67400 | 36,6 | 37,2 | 37,4 | 37,7 | 37,4 | 37,5 | 37,2 | 37,0 | 36,8 | 36,7 | 37,3 | 37,2 | «                                   |
| 8               | 66900 | 37,0 | 37,0 | 37,3 | 37,7 | 37,3 | 36,3 | 37,0 | 37,0 | 36,6 | 36,4 | 36,6 | 36,6 | «                                   |
| 9               | 66100 | 36,6 | 36,3 | 37,1 | 37,5 | 36,8 | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 36,6 | 36,0 | 36,6 | 36,6 | «                                   |
| 10              | 67500 | 36,7 | 36,3 | 37,9 | 37,0 | 37,0 | 36,3 | 36,8 | 36,6 | 36,3 | 36,7 | 36,8 | 36,6 | Тоже+1/2 ф. черн.                   |
| 11              | 67000 | 36,7 | 36,5 | 36,7 | 37,2 | 37,2 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | 36,5 | 36,7 | 37,0 | 36,3 | Тоже.                               |
| 12              | 67400 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 37,0 | 36,6 | 36,4 | 36,4 | 36,2 | 37,0 | 37,2 | 36,6 | 36,6 | «                                   |
| 13              | 67100 | 36,5 | 36,6 | 37,1 | 37,3 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 36,2 | 36,1 | 36,3 | 36,5 | «                                   |
| 14              | 67000 | 36,7 | 36,5 | 36,4 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 36,3 | 36,4 | 36,3 | 36,3 | 36,2 | 36,3 | Тоже+1/2 ф. черн.                   |
| 15              | 67800 | 36,3 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 37,1 | 36,6 | 36,7 | 36,5 | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 36,2 | Тоже.                               |
| 16              | 67800 | 36,8 | 36,4 | 36,5 | 37,1 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,3 | 36,5 | 36,4 | 36,0 | Щи, котл., макарона,                |
| 17              | 69700 | 36,6 | 36,4 | 36,7 | 37,0 | 37,0 | 36,3 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | —    | 36,8 | 36,8 | 2 ф. черн.+1/2 ф. б.                |
| 18              | 6000  | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 37,0 | 36,8 | 36,6 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,8 | 36,6 | «                                   |

Объективныя и субъективныя явленія.

Стулъ вчера днемъ 1 р. кашцеобразно. Тиф. осет. нѣтъ. Языкъ слегка обложен. Въ груди кое-гдѣ свисты при везикулярномъ см. выдохѣ. М. 3600 кс. Уд. в. 1,006; 6 нѣтъ.

- 1 р. ночью кашцеобразно. М. 2800 кс. Уд. в. 1,007; 6 нѣтъ.
- 1 р. утромъ ввѣдъ густой кашицы. М. 3700 кс. Уд. в. 1,006; 6 нѣтъ.
- 1 р. вчера вечер. таковыя же. М. 3500 кс. Уд. в. 1,008; 6 нѣтъ.
- вчера вч. 1 р. и утр. 1 р. таковыя же. Свистовъ въ груди не замѣтно. М. 2300 кс. Уд. в. 1,006; 6 нѣтъ.
- 1 р. утр. таковыя же. М. 3500 кс. Уд. в. 1,007; 6 нѣтъ. Головокруженiя нѣтъ.
- 1 р. утр. таковыя же. М. 2800 кс. Уд. в. 1,006; 6 нѣтъ.
- 1 р. утр. таковыя же. М. 3600 кс. Уд. в. 1,005; 6 нѣтъ.
- 1 р. вечер. вчера оформлено. М. 3400 кс. Уд. в. 1,007; 6 нѣтъ.
- 1 р. утр. не жидко. М. 4100 кс. Уд. в. 1,005; 6 нѣтъ.
- не было. Языкъ слегка обложенъ въ зад. полов. М. 3800 кс. Уд. в. 1,006; 6 нѣтъ.
- 1 р. утр. не жидко. Ч. утр. 2400 кс. (вечер. не отбѣял). М. 4300 кс. Уд. в. 1,006; 6 нѣтъ.
- 1 р. утр. ввѣдъ густой кашицы. Ч. утр. 2400 кс. Только слегка обложенный по краямъ языкъ М. 3800 кс. Уд. в. 1,007; 6 нѣтъ.
- не было. Ч. утр. 1600 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1,010; 6 нѣтъ.
- 1 р. ночью таковыя же. Пота не было. М. 3200 кс. Уд. в. 1,011; 6 нѣтъ. Ч. утр. 1600 кс.
- не было. М. 3600 кс. Уд. в. 1,009; 6 нѣтъ. Ч. утр. 1600 кс.
- 1 р. утр. таковыя же. Ч. утр. 1600 кс. М. 3500 кс. Уд. в. 1,009; 6 нѣтъ.
- 1 р. утр. таковыя же. Ч. утр. 1600 кс. М. 3300 кс. Уд. в. 1,006; 6 нѣтъ.
- 1 р. утр. таковыя же. Ч. утр. 1600 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,010; 6 нѣтъ.
- 1 р. утр. таковыя же. Ч. утр. 2000 кс. М. 3700 кс. Уд. в. 1,005; 6 нѣтъ.
- 1 р. утр. таковыя же. Ч. утр. 1600 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,009; 6 нѣтъ.
- 1 р. утр. таковыя же. Ч. утр. 2000 кс. Языкъ обложенъ немного. М. 3400 кс. Уд. в. 1,008; 6 нѣтъ.
- вчера днемъ оформлено. Ч. утр. 1600 кс. М. 3500 кс. Уд. в. 1,008; 6 нѣтъ.
- вчера вечер. 1 р. таковыя же. Ч. утр. 2000 кс. Языкъ чистъ. М. 3500 кс. Уд. в. 1,008; 6 нѣтъ.
- 1 р. вчера вечер. не жидко. Ч. утр. 1600 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1,006; 6 нѣтъ.
- 1 р. утр. не жидко. Ч. утр. 1600 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1,006; 6 нѣтъ.
- 1 р. утр. не жидко. Ч. утр. 2000 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1,006; 6 нѣтъ. Выписанъ: со стороны внутреннихъ органовъ измѣненiй не замѣтно.

№ 5. Крестьянин Дуб—въ, 17 лѣтъ, поступилъ 20—1 93 г. на 5-й день заболѣванія съ жалобою на головную боль, общую разбитость, потерю аппетита. № пр. журн. 544.

20—1. 0—83,5. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный по краямъ языкъ, конецъ его чистъ. Кожа чиста. При перкуссіи груди звукъ всюду ясный. Дыханіе везикулярное съ выдохомъ и разбросанные въ небольшомъ количествѣ высокіе свисты, а подъ углами лопатокъ небольшое количество среднепузырчатыхъ хриповъ. Серд. тупость въ предѣлахъ нормы. Тоны чисты. Селезеночная тупость съ 8 ребра. Селезенка тверда, на 1 палець, болѣзненна. Верхняя граница печени нормальная. Печень прощупывается своимъ краемъ, болѣзненна. Gargouillement и болѣзненность правой подвздошной. Стула нѣтъ 4—я день. Дано 1000 кс. молока. 2 ванны 28°.

21. 39,8—40,2. Стулъ 1 р. ночью жидко. Тѣ же явленія. Дано 1000 кс. молока. 2 ванны 28°.

22. 39,7—40,1. 58600, Стулъ вчера днемъ 1 р. жидко. *Розеола въ небольшомъ количествѣ на туловищѣ.* Дано 1000 кс. молока. 2 ванны 28°.

23. 39,2—40,0. 58600. Стулъ 1 р. ночью жидко. Тѣ же явленія. Дано 1200 кс. мол. 2 ванны.

24. 39,8—40,2. 57200. Стулъ вчера днемъ 1 р. жидко. Ч. не явл. *Болѣзненности печени, селезенки и правой подвздошной нѣтъ.* М. 400 кс. Уд. в. 1,025; б. нѣтъ, р. по Эрл. полож.

25. 39,0—39,7. 56300. Стулъ 1 р. вчера днемъ жидко. Ч. не явл. *Печень прощупать не удается.* М. 500 кс. Уд. въсь 1,025; б. свѣды, р. по Эрл. пол. Дано бульонъ, 1700 кс. мол. 2 ванны 28°.

26. 39,1—40,3. 55800. Стулъ вчера вечер. 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 800 кс. и вечер. 400 кс. *Розеола блѣдная. Позывъ на пишу.* М. 800 кс. Уд. в. 1,018; б. нѣтъ, р. по Эрл. слабая положит.

27. 39,8—40,2. 55400. Стула не было. Ч. по 400 кс. *Розеола нѣтъ.* М. 1000 кс. Уд. в. 1,018; б. нѣтъ, р. по Эрл. слабая положит.

28. 39,7—39,8. 55000. Стула не было. Ч. по 800 кс., М. 900 кс. Уд. в. 1,015; б. нѣтъ, р. по Эрл. отрицательная.

29. 39,8—39,9. 55000. Стула не было. Ч. утр. 800 кс. вечер. 1200 кс. М. 1800 кс. Уд. в. 1,015; б. нѣтъ.

30. 39,4—39,3. 54600. Стулъ 1 р. вчера вечер. жидко. Ч. утр. 1200 и вечер. 800 кс. М. 2200 кс. Уд. в. 1012; б. нѣтъ.

Дано: бульонъ, 1 яйцо, 1800 кс. мол. 2 ванны 28°.

31. 39,1—38,7. 54300. Стула не было. Ч. утр. 800 кс. и вечер. 1200 кс. М. 2200 кс. Уд. в. 1,011; б. нѣтъ.

1—1. 38,2—40,0. 54300. Стула не было. Ч. по 1200 кс. Небольшой потъ подъ утро. *Тифозное состояніе меньше. Свистовъ и хриповъ въ груди значительно меньше.* М. 2700 кс. Уд. в. 1,009; б. нѣтъ.

2. 38,3—38,5. 53300. Стулъ 1 р. вчера днемъ кашнеобразно. Ч. по 1200 кс. М. 2000 кс. Уд. в. 1,010; б. нѣтъ.

3. 38,0—38,7. 52700. Стулъ 1 р. вчера вечер. кашнеобразно. Ч. по 1200 кс. Хриповъ въ груди меньше, кое-гдѣ свисты высокіе. М. 3200 кс. Уд. в. 1,006; б. нѣтъ.

4. 38,2—39,0. 53000. Стула не было. Ч. утр. 1200 кс. вечер. 800 кс. М. 2800 кс. Уд. в. 1,009, б. нѣтъ.

5. 38,0—38,4. 52900. Стула не было. Ч. утр. 800 кс., вечер. 1200 кс. Тиф. состояніе выражено слабо. М. 3200 кс. Уд. в. 1,008; б. нѣтъ.

Дано: бульонъ, кисель, 2200 кс. молока, 2 ванны 28°.

| Число<br>набл. | Взв.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | П И Ц А.   |
|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                |       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |  |
| 6/ш            | 52500 | 37,6 | —    | —    | 38,0 | 38,2 | 37,8 | 37,2 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 36,9 | Бузают, 1 яйцо, 1 каша, 2200 кс. мол.                          |
| 7              | 52800 | 36,9 | 36,8 | 37,3 | 37,3 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,6 | 36,0 | 36,0 | 36,6 | 36,7 |  |
| 8              | 52100 | 37,0 | 36,9 | 36,9 | 37,1 | 37,3 | 37,0 | 37,0 | 36,6 | 36,6 | 37,0 | 36,7 | 36,6 |  |
| 9              | 52000 | 36,7 | 36,5 | 36,8 | 36,8 | 37,2 | 37,3 | 37,3 | 36,3 | 36,1 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | Сунь, 1 яйцо, 1 м. в. 1800 кс. молока.                         |
| 10             | 52000 | 36,7 | 36,1 | 36,7 | 36,3 | 36,8 | 37,2 | 37,2 | 37,5 | 37,4 | 37,4 | 37,6 | 36,3 | Сунь, 1/2 яйца, 1 яйцо 1 м. в., 600 кс. мол. 1 б. безь корки.  |
| 11             | 51800 | 36,2 | 36,1 | 36,7 | 36,6 | 37,2 | 36,9 | 37,3 | 37,2 | 36,8 | 36,8 | 36,3 | 36,2 |  |
| 12             | 51900 | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 36,7 | 37,3 | 37,4 | 38,0 | 36,8 | 36,7 | 36,3 | 36,3 | 36,4 |  |
| 13             | 51700 | 36,5 | 36,5 | 36,6 | 36,8 | 37,4 | 37,4 | 37,3 | 36,3 | 36,5 | 36,5 | 36,9 | 36,4 | Сунь, котлета, 2 яйца 600 кс. молока, 1 ф. блага безь корки.   |
| 14             | 51400 | 36,9 | 36,5 | 36,8 | 37,2 | 37,5 | 37,2 | 37,2 | 37,0 | 36,8 | 36,6 | 37,0 | 36,5 |  |
| 15             | 51500 | 36,6 | 36,7 | 36,6 | 36,9 | 37,0 | 37,4 | 37,4 | 37,3 | 36,8 | 37,0 | 36,3 | 36,1 |  |
| 16             | 52000 | 36,8 | 36,4 | 36,5 | 37,0 | 36,8 | 37,2 | 37,2 | 36,5 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,5 |  |
| 17             | 52500 | 36,7 | 36,6 | 36,9 | 36,8 | 36,9 | 36,7 | 37,1 | 37,3 | 36,2 | 36,4 | 36,2 | 36,5 |  |
| 18             | 52400 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 37,2 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 36,4 | 36,1 | 36,6 | 36,4 | 36,4 |  |
| 19             | 52700 | 36,5 | 36,2 | 36,0 | 36,7 | 37,0 | 36,8 | —    | 36,9 | 36,6 | 36,2 | 36,7 | 36,5 |  |
| 20             | 53300 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | 37,2 | 36,9 | 39,8 | 39,8 | 39,7 | 38,8 | 38,3 | 38,7 | 38,7 |  |
| 21             | 53100 | 37,8 | 37,4 | 37,5 | 37,4 | 37,8 | 37,6 | 37,4 | 37,8 | 36,8 | 36,2 | 36,7 | 37,0 | Сунь, 2 яйца, 2 ман. кашн. 1000 кс. мол. 1 ф. блага безь кор.  |
| 22             | 53000 | 36,5 | 36,5 | 36,8 | 36,6 | 37,0 | 36,7 | 36,8 | 36,6 | 36,1 | 36,4 | 36,0 | 36,3 |  |
| 23             | 52700 | 36,4 | 36,2 | 36,6 | 37,0 | 37,1 | 37,3 | 37,3 | 36,8 | 37,1 | 37,2 | 37,1 | 36,5 |  |
| 24             | 53000 | 36,4 | 36,3 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | 36,6 | 36,4 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | Сунь, котлета, 2 ман. кашн. 600 кс. молока. 1 ф. блага.        |
| 25             | 52900 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,5 | 36,7 | 36,7 | 36,5 | 36,5 | 36,2 | 36,2 | 36,0 | 36,0 |  |
| 26             | 53200 | 36,2 | 36,0 | 36,3 | 36,2 | 36,5 | 36,5 | 36,2 | 36,0 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,2 |  |
| 27             | 53500 | 36,5 | 36,2 | 36,8 | 37,0 | 37,0 | 36,3 | 36,6 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,1 |  |
| 28             | 53600 | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,4 | 36,0 | 36,1 | 36,1 | 36,2 | 36,1 |  |
| 1/ш            | 53900 | 36,1 | 36,1 | 36,3 | 36,6 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | 36,2 | 36,1 | 36,1 | 36,2 | 36,1 | Сунь, котлета, 2 ман. кашн. 1000 кс. мол. 1 ф. блага.          |
| 2              | 54900 | 36,7 | 36,3 | 36,5 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,1 |  |
| 3              | 55100 | 36,4 | 36,3 | 36,4 | 36,6 | 36,9 | 37,0 | 36,6 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,3 | Тоже + 1/2 ф. черн.  |
| 4              | 55200 | 36,3 | 36,3 | 36,2 | 36,5 | 36,6 | 36,6 | 36,7 | 36,5 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | Тоже.  |
| 5              | 55000 | 36,5 | 36,2 | 36,4 | 36,7 | 36,7 | 36,9 | 36,8 | 36,4 | 36,2 | 36,1 | 36,0 | 36,4 | Сунь, кул., 2 яйца, 1 м. 1 ф. чер.+1/2 ф. б.                   |
| 6              | 55400 | 36,3 | 36,2 | 36,3 | 36,5 | 37,0 | 36,9 | 36,8 | 36,2 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | Сунь, котлета, яйца, ромы, 400 кс. молока. 1 ф. чер.+1/2 ф. б. |
| 7              | 55600 | 36,5 | 36,7 | 36,4 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,4 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,4 |  |

Субъективные и объективные явления.

Ступ 1 р. вч. в. каш. Ч. 1200 кс. Тиф. сест. нйт. Яз. обл. Селез. тп., на 1 пал. Отд. выс. слнств в груди. М. 3000 кс. Уд. в. 1,008; б. нйт.

- не было. Поть вч. вечер. Ч. по 1200 п. с. М. 3700 кс. Уд. в. 1,007; б. нйт.
- не было. Небол. поть вчера днем и ночью. Ч. по 1200 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,006; б. нйт.
- не было. Пота не было. Ч. по 1600 кс. М. 3700 кс. Уд. в. 1,006; б. нйт.
- вчера днем 2 р. в утр. 1 р. жидко (дано Ol. Ricini 15 grm.). Ч. по 2000 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,005; б. нйт.
- вчера днем 2 р. кашнеоб. Ч. по 2000 кс. Свастов в груди нйт. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005; б. нйт.
- вчера днем 1 р. в утр. 1 ввид густой кашни, желто. Ч. по 2400 кс. М. 4300 кс. Уд. в. 1,005; б. нйт.
- не было. Ч. по 1600 кс. Слмоч. хороше. М. 8000 п. с. Уд. в. 1,004; на блага, на сахара.
- утр. 2 р. такнм же. Ч. по 2000 кс. Селез. на 2 палца при глубоком вздох. М. 4400 кс. Уд. в. 1,005; б. нйт.
- вчера вечером 1 р. в утр. 1 р. такнм же. Ч. по 2000 кс. М. 4100 кс. Уд. в. 1,006; б. нйт.
- вчера вечером 1 р. в утр. ввид жидкой кашни. Ч. по 2000 кс. М. 4500 кс. Уд. в. 1,005; б. нйт.
- 1 р. утр. ввид густой каш. Ч. по 2000 кс. М. 5300 кс. Уд. в. 1,006; б. нйт.
- не было. Ч. по 2400 кс. М. 5000 кс. Уд. в. 1,006; б. нйт.
- утр. 2 р. ввид густой кашни. Ч. по 2000 кс. Селезена тверда на 1 палец. М. 4200 к. с. Уд. в. 1,005; б. нйт.
- не было. Ч. по 2000 кс. М. 3600 кс. Уд. в. 1,005; б. нйт. Селез. тп. сь 9 ребра. вч. вч. послв кашни 1 р. в утр. 1 р. жидко. Ч. по 2000 кс. Язык желто. обл. Селез. на 1 1/2 пал. тверда. М. 4300 кс. Уд. в. 1,006; б. нйт.
- вчера днем 2 р. в утр. 1 р. ввид жидкой кашни. Ч. по 2400 кс. Селезенка на 1 палец. М. 3600 к. с. Уд. в. 1,006; б. нйт.
- вчера днем 2 р. в утр. 2 р. жидко.
- утр. 2 р. жидко. Ч. по 1600 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005; б. нйт.
- вч. 1 р. в утр. 2 р. жид. каш. Ч. по 1600. Моча утер.
- вчера 1 р. в утр. 1 раз ввид густой кашни. Ч. по 1200 кс. М. 3500 кс. Уд. в. 1,005; б. нйт.
- вчера днем 1 р. такнм же. Ч. по 2000 кс. М. 3600 кс. Уд. в. 1,007; б. нйт.
- вчера днем 2 р. в утр. 1 р. такнм же. Ч. по 2000 кс. М. 420 кс. Уд. в. 1,005; б. нйт.
- не было. Ч. по 2000 кс. Край селезенки. М. 4500 кс. Уд. в. 1,005; б. нйт.
- вчера днем 1 раз в утр. 1 раз оформлено. Ч. по 2000 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,005; б. нйт.
- вчера днем 1 р. такнм же. Ч. по 2400 кс. М. 4300 кс. Уд. в. 1,005; б. нйт.
- 1 р. вчера днем и 1 р. утр. такнм же. Ч. по 1600 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005; б. нйт.
- 1 раз вчера вч. такнм же. Ч. по 2000 кс. Моча утер.
- 1 раз утр. такнм же. Ч. по 2400 кс. М. 3600 кс. Уд. в. 1,005; б. нйт.
- не было. Ч. по 2400 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1,005; б. нйт.

| Число<br>исл.в. | Всех. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | П И Щ А.   |
|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
|                 |       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6     |  |
| 8               | 55800 | 36,4 | 36,4 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,3 | Тоше. |  |
| 9               | 55800 | 36,4 | 36,3 | 36,3 | —    | 37,0 | 37,2 | 36,8 | 36,7 | 36,2 | 36,0 | 36,0 |       |  |
| 10              | 56300 | 36,5 | 36,8 | 36,5 | 36,8 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 36,9 | 36,5 | 36,2 | 36,0 |       | Щи, колбаса, макар,<br>200 кс. молока, 1 ф.<br>черн.+1/2 ф. бля. |
| 11              | 56800 | 36,8 | 36,6 | 36,3 | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 36,8 | 36,6 | 36,0 | 36,0 | 36,1 |       |  |
| 12              | 56800 | 36,7 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |       |  |

№ 6. Крестьянин С — нъ, 19 лѣтъ поступилъ 3—IX 93 г. на 8-й день заболѣванія: головная боль, отсутствие аппетита, стулъ жидко. *Лѣ пр. журн. 7456.* ЗИХ 39,0 — 40,0. Хорошаго тѣлосложения. Порядочнаго питания. Небольшое тифозное состояние. Обожженный языкъ. Кожа чиста. При перкусии груди звукъ всюду ясный. Дыханіе везикулярное съ выдохомъ. Сердечная тупость въ предѣлахъ нормы. Тоны чисты. Верхняя граница тупости печени и селезенки не измѣнены. Ни печень, ни селезенку прощупать не удается.

4. 38,7—39,0. 45500. Стулъ вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 кс. М. 400 кс. Уд. в. 1,025; б. незнач. кол., р. по Эрл. полож.

5. 38,7—39,4. 45000. Стулъ вчера днемъ 3 р. и утр. 3 р. жидко. Ч. утр. 400, вечер. 800 кс. М. 400 кс. Уд. в. 1,023; б. незначит. кол. р. по Эрл. полож.

6. 39,3—39,8. 44800. Стулъ 1 р. утр. жидко. Ч. по 800 кс. Въ груди кое-гдѣ свисты высокіе.

7. 38,8—39,4. 44400. Стулъ вчера, ночью и утр. по 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 100 кс. Уд. в. 1,023; б. незнач. кол. р. по Эрл. полож.

8. 38,8—39,3. 44000. Стулъ вчера, ночью и утр. по 2 р. жидко. Ч. по 800 кс. *Край селезенки въ боковомъ положеніи.*

9. 38,5—39,0. 43200. Стулъ вчера и ночью по 2 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 300 кс. Уд. в. 1,017; б. незнач. кол., р. по Эрл. полож.

10. 38,8—39,6. 42900. Стулъ вчера и утр. по 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 900 кс. Уд. в. 1,013; б. незначит. кол., р. по Эрл. полож.

11. 38,7—39,3. 42800. Стулъ ночью и утр. по 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 900 кс. Уд. в. 1,015; б. незначит. кол. р. по Эрл. полож.

12. 39,0—39,7. 42300. Стулъ ночью 2 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 800 кс. Уд. в. 1,013; б. незначит. кол., р. по Эрл. полож.

## Объективные и субъективные явленія.

- 1 разъ вчера днемъ и 1 разъ утрѣмъ таковы же. Ч. по 2400 кс. М. 4100 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.
- 1 р. утрѣмъ таковы же. Ч. по 2000 кс. Языкъ чистъ. М. 3800 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.
- 1 разъ утрѣмъ таковы же. Ч. по 2000 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.
- 1 разъ утр. таковы же. Ч. по 2000 кс. М. 4500 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

Выписаны: со стороны внутреннихъ органовъ только край селезенки въ боковомъ положеніи большого.

13. 39,8—39,9. 41900. Стулъ вчера и ночью по 2 р., утр. 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 1000 кс. Уд. в. 1,013; б. незначит. кол. р. по Эрл. полож.

14. 39,7—39,5. 41500. Стулъ вчера и ночью по 2 р., утр. 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. Уд. в. 1,023; б. незначит. кол., р. по Эрл. полож.

15. 39,0—39,2. 41300. Стулъ вчера, ночью и утр. по 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 500 кс. Уд. в. 1,015; б. незнач. кол., р. по Эрл. полож.

16. 39,2—39,5. 40700. Стулъ вчера 1 р., утр. 2 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 300 кс. Уд. в. 1,019; б. незначит. кол., р. по Эрл. полож.

17. 39,2—39,7. 40500. Стулъ вчера и ночью по 2 р. жидко. Ч. по 800 кс. Шумъ въ ушахъ: М. 300 кс. Уд. в. 1,019; б. незначит. кол. р. по Эрл. полож.

18. 39,0—39,2. 40000. Стулъ вчера 3 р., ночью 4 р. и утр. 2 р. жидко. Ч. по 800 кс. Свистовъ въ груди нѣтъ.

19. 38,1—39,2. 39200. Стулъ вчера 1 р., ночью и утр. по 2 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 100 кс. Уд. в. 1,014; б. незначит. кол., р. по Эрл. полож.

20. 37,9—38,6. 39100. Стулъ вчера, ночью и утр. по 2 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 600 кс. Уд. в. 1,015; б. незначит. количество, р. по Эрл. полож.

21. 38,3—39,5. 39000. Стулъ вчера 1 р. и ночью 2 р. жидко. Ч. по 800 кс. Бредъ тихій ночью.

22. 39,0—39,2. 38100. Стулъ вчера 1 р., ночью 3 р. и утр. 2 р. жидко. Ч. только вечер. 800 кс. Бреда не было.

23. 38,8—39,4. 37900. Стулъ вчера и ночью по 2 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. только утр. 800 кс. М. 600 кс. Уд. в. 1,014; б. незнач. кол., р. по Эрл. слабая полож. *Тифозное состояніе — слабо.*

24. 38,1—38,7. 37500. Стулъ вчера, ночью и утр. по 2 р. жидко. Ч. по 400 кс. М. 1000 кс. Уд. в. 1,009; б. *слыды р. по Эрл отрицательная*



№ 7. Крестьянин Бор—ский, 30 лет, поступил в больницу 14—III 93 г. на 10-й день заболвания; головная боль, зноб, плохой аппетит, стул жидко. *№ пр. журн. 2013.*

14. 37,8—37,8. Хорошего телосложения; подкожный жирный слой развит слабо. Язык обложен по краям, конец его чист. При перкуссии груди звук ясный. Дыхание везикулярное с выдохом и с правой стороны груди кое-где свисты высокие. Серд. тупость в пределах нормы. Тоны чисты. Верхняя граница печени и селезенки не изменены. Печень не прощупывается; селезенка твердая, выдается на 1½ пальца.

15. 36,5—38,8. Тѣже явления. Стул 2 р. жидко.

16. 38,0—38,3. 56000. Стул вчера днем 3 раза и утр. 2 р. жидко. *Небольшое тифозное состояние*; остальные явления тѣже. *Аппетитъ порлодочный.*

Дано по 1000 кс. молока, 1 ванна 28° вечером.

17. 38,5—40,0. 56400. Стул вчера днем 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 800 кс., веч. 400 кс.

18. 38,7—39,6. 56100. Стул вчера днем 4 р. жидко. Ч. по 400 кс. М. 1000 кс. Уд. в. 1,013; б. нѣтъ р. по Эр. отрицательная.

Дано: бульонъ, 2 яйца, 1700 кс. мол. 1 ванна 28° вечером.

19. 38,7—40,0. 55700. Стул вчера днем 3 р. жидко. Ч. по 400 кс. М. 1000 кс. Уд. в. 1,012; б. нѣтъ.

20. 38,3—39,8. 55200. Стул вчера 2 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 400 и вечер. 800 кс. *Больничность правой подвздошной небольшая.* М. 1400 кс. Уд. в. 1,014; б. нѣтъ.

21. 38,0—39,0. 55000. Стул вчера днем 2 р., ночью 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 1700 кс. Уд. в. 1,010; б. нѣтъ.

22. 38,0—39,8. 54900. Стул вчера днем 1 р., половина жидко, половина въ видѣ густой каши. Селезенка на 2 пальца твердая. М. 2100 кс. Уд. в. 1,010; б. нѣтъ. Ч. утр. 800 кс., вечер. 1200 кс.

23. 37,8—39,0. 54200. Стул вчера днем 2 р. такимъ же. Ч. по 800 кс. Тифозное состояніе выражено слабо. *Совстловъ оз груди нѣтъ. Аппетитъ болше.* М. 2600 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

Дано: бульонъ, 2200 кс. мол., 2 яйца, кисель. 1 ванна 28° вечером.

24. 38,0—38,5. 53900. Стул вчера днем 1 р. кашцеобразно. Ч. утр. 800 кс., вечер. 400 кс. М. 2000 кс. Уд. в. 1,010; б. нѣтъ.

25. 37,3—38,2. 53700. Стул вчера 2 р. кашцеобразно. *Тифознаго состоянія нѣтъ.* Ч. только вечер. 400 кс. М. 2500 кс. Уд. в. 1,007; б. нѣтъ.

26. 37,2—38,0. 53400. Стула не было. Ч. только вечер. 400 кс. М. 2400 кс. Уд. в. 1,007; б. нѣтъ.

27. 37,2—38,3. 53300. Стул 1 р. вечер. вчера жидко. Ч. утр. 400 кс. и вечер. 800 кс. М. 2100 кс. Уд. в. 1,010; б. нѣтъ.

28. 36,8—37,8. 53400. Стула не было. Ч. утр. 1200 кс. и вечер. 400. Больничность правой подвздошной ничтожная. Головокруженіе. М. 3800 кс. Уд. в. 1,007; б. нѣтъ.

Дано: бульонъ, 2500 кс. молока, 2 яйца. 1 ванна 28° вечером.

| Число<br>мѣсяца. | Вѣс.  | П И Ц А. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                  |       | 8        | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |  |
| 29/ш             | 53200 | 36,6     | —    | 36,6 | 36,6 | 36,8 | 37,3 | 37,5 | 36,9 | 36,0 | 36,2 | 36,2 | 36,1 | Стул, 2500 кс. мол.,<br>2 яйца.  |
| 30               | 53000 | 36,5     | 36,6 | 36,2 | 36,7 | 36,5 | 36,7 | 36,8 | 36,1 | 36,6 | 36,0 | 36,2 | 36,3 |  |
| 31               | 53000 | 36,3     | 36,3 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 37,0 | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 36,6 | 36,4 |  |
| 1/г              | 53000 | 36,4     | 36,6 | 36,5 | 36,5 | 36,6 | 36,4 | 36,7 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | Стул, мол., 1200 кс.<br>молока, 1 яйцо, 1 м.<br>каша, 1 булка безъ<br>корки. |
| 2                | 52700 | 36,5     | 36,2 | 36,4 | 36,3 | 36,5 | 36,4 | 36,5 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,2 |  |
| 3                | 53000 | 36,1     | 36,3 | 36,2 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 36,4 | 36,2 | 36,4 | 36,0 | 36,4 | 36,4 |  |
| 4                | 53100 | 36,2     | 36,2 | 36,4 | 36,9 | 36,8 | 37,3 | 37,4 | 36,9 | 37,2 | 37,1 | 37,2 | 37,1 |  |
| 5                | 53100 | 36,8     | 37,1 | 37,4 | 37,2 | 37,7 | 37,5 | 37,4 | 36,7 | 36,7 | 37,0 | 36,8 | 37,0 |  |

Объективные и субъективные явления.

Стул вчера 1 р. кашцеобр. Ч. утр. 1200 кс. и веч. 800 кс. Яз. сл. облож. Сел. на 1 п. Болши. прав. подвз. нѣтъ. Головокруж. М. 3000 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.  
 » вч. веч. 1 р. такъ же. Ч. утр. 1200, в. 800 кс. М. 2400 кс. Уд. в. 1,009, б. нѣтъ.  
 » вч. веч. 1 р. оформ. желтое. Ч. утр. 1200 кс., веч. 400 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.  
 » вч. веч. 1 р. такимъ же. Ч. по 1200 кс. Головокруж. нѣтъ. Селезенка на 1/4 пальца. М. 4300 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.  
 » не было. Ч. по 1200 кс. Селез. притуп. нѣуд. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.  
 » 1 р. утр. не жидко. Ч. по 1600 кс. Только слегка облож. яз. М. 4000 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.  
 » вч. 1 р. утр. 1 р. не жидко. Ч. утр. 2000 кс. и веч. 1600 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.  
 » вч. дн. 2 р. и утр. 1 р. впадъ жидкой кашицы. Ч. утр. 1600 и веч. 1200 кс. Чувствит. правой подвздошной. М. 2800 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.

| Число. | Взв.  | 8    | 1'   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | П И Щ А.   |
|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 6      | 53500 | 36,7 | 37,1 | 37,0 | 37,1 | 37,7 | 38,3 | 38,2 | 37,9 | 37,5 | 37,3 | 37,0 | 37,1 | Тоже.  |
| 7      | 53300 | 36,8 | 36,6 | 37,1 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 37,5 | 37,2 | 36,9 | 36,4 | 36,7 | 36,0 |  |
| 8      | 53500 | 36,6 | 36,9 | 36,8 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 37,4 | 36,7 | 36,5 | 36,6 | 36,1 | 36,4 |  |
| 9      | 53400 | 36,4 | 36,6 | 36,6 | 36,8 | 37,0 | 37,0 | 37,3 | 36,7 | 36,5 | 36,7 | 36,6 | 36,7 |  |
| 10     | 53400 | 37,0 | 36,6 | 36,9 | 37,0 | 36,9 | 36,7 | 37,0 | 36,2 | 36,0 | 36,1 | 36,5 | 36,4 | Супь, кля., 1200 кс.,<br>молока, 1 вш. каша,<br>1/2 ф. бѣлаго.   |
| 11     | 53500 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,6 | 36,8 | 37,2 | 36,5 | 36,0 | 36,6 | 36,0 | 36,4 | —    |  |
| 12     | 53500 | 36,3 | 36,4 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,8 | 36,8 | 36,4 | 36,3 | 36,2 | 36,1 | 36,2 |  |
| 13     | 53600 | 36,5 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 37,0 | 36,8 | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 36,4 | 36,1 | 36,5 | Супь, душ. гов., 2 яйца  |
| 14     | 53800 | 36,6 | 36,4 | 36,5 | 36,9 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,2 | 36,0 | 36,2 | 36,5 | 2 каша, 1 ф. бѣл.  |
| 15     | 54400 | 36,7 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 36,2 | 36,1 | 36,0 | 36,1 | 36,4 | Супь, котлета, 2 яйца,<br>500 кс., яблока 1 ф.                   |
| 16     | 54400 | 36,4 | 36,4 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 37,0 | 36,8 | 36,5 | 36,5 | 36,3 | 36,3 | 36,6 | бѣл.+1/2 ф. черн.  |
| 17     | 54700 | 36,7 | 36,4 | 36,3 | 36,7 | 37,0 | 36,7 | 36,7 | 36,4 | 36,3 | 36,1 | 36,4 | 36,4 |  |
| 18     | 54800 | 36,6 | 36,4 | 36,2 | 36,9 | 36,7 | 37,1 | 37,2 | 36,5 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,5 |  |
| 19     | 55000 | 36,6 | 36,6 | 36,4 | 36,7 | 36,7 | 37,3 | 36,7 | 36,4 | 36,1 | 36,1 | 36,2 | 36,7 | Супь, котлета, 1 яйцо,<br>магароны, 1 ф. чер.+<br>1/2 ф. бѣлаго. |
| 20     | 55500 | 36,5 | 36,7 | 36,9 | 36,6 | 36,9 | 37,3 | 37,0 | 36,5 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |  |
| 21     | 54800 | 36,6 | 36,2 | 36,3 | 36,7 | 36,8 | 37,2 | 37,0 | 36,4 | 36,7 | 36,5 | 36,4 | 36,2 |  |
| 22     | 55800 | 36,6 | 36,4 | 36,3 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | 37,1 | 36,6 | 36,7 | 36,4 | 36,4 | 36,2 | Тоже.  |
| 23     | 55100 | 36,4 | 36,3 | 36,1 | 37,0 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 36,7 | 36,5 | 36,4 | 36,2 | 36,5 | Тоже.  |
| 24     | 56000 | 36,5 | 36,8 | 36,9 | 37,1 | 37,0 | 37,1 | 36,5 | 36,7 | 36,6 | 37,0 | 36,5 | 36,8 | Тоже.  |
| 25     | 56600 | 36,8 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | Тоже.  |

Объективные и субъективные явления.

- 1 р. утр. такимъ же. Ч. утр. 1200 кс. и веч. 1600 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ.
- 1 р. утр. такимъ же. Ч. утр. 1600 кс. и веч. 800 кс. Пота не было. Боли въ животѣ нѣтъ. М. 3400 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.
- 1 р. веч. вчера такимъ же. Ч. утр. 800 кс. и веч. 1200 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.
- вч. 1 р. и утр. 1 р. такъ же. Ч. по 1200 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ.
- вч. 1 р. и утр. 1 р. ввидѣ густой кашицы. Ч. по 1200 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.
- вч. веч. 1 р. такимъ же. Ч. по 1200 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.
- вч. 2 р. и утр. 1 р. такъ же. Ч. по 1200 кс. М. 2900 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.
- вч. 2 р. и утр. 1 р. такъ же. Ч. по 1600 кс. М. 2900 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ.
- вчера днемъ 2 р. оформлено и хорошо опрам. Ч. утр. 2000 кс., веч. 1200 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.
- вч. 1 р. и утр. 1 р. такимъ же. Ч. утр. 2000 кс. и веч. 1600 кс. Яз. чистъ. М. 3500 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.
- вч. 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. по 2000 кс. М. 3600 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.
- 1 р. утр. не жидко. Ч. по 2000 кс. М. 3700 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.
- вч. веч. 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. по 2000 кс. М. 3300 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. по 2000 кс. М. утерина.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. не ж. Ч. по 2000 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ.
- вч. 1 р. и утр. 1 р. не ж. Ч. по 2000 кс. М. 2900 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ.
- вчера днемъ 2 р. не жидко. Ч. утр. 1200 кс. и веч. 2400 кс. М. утерина.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. утр. 1600 кс. и веч. 2400 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.
- вчера днемъ не жидко. Ч. утр. 800 кс. и веч. 1600 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.

Со стороны внутренних органовъ никакихъ измененийъ. Выписанъ.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА.

№ 1-й Мъщанинъ Василей Уд.—въ, 23 лѣтъ, поступилъ 31—III 1893 г. на 7 день заболѣвая съ жаждою на общее недомоганіе, головную боль и головокруженіе, отсутствіе аппетита, поносъ. *Лѣ пр. журн. 2494.*

31—III. 0—39,0. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Небольшое тифозное состояніе. Языкъ обложенъ по краямъ, конецъ его чистъ. Кожа чиста. При перкусіи грудъ звукъ всюду ясный. Дыханіе везикулярное съ выдохомъ. Сердъ. тупость въ предѣлахъ нормъ. Тоны чисты. Животъ нѣсколько вздутъ. Урчаніе въ правой подвздошной. Болѣзненность области печени. Край селезенки въ боковомъ положеніи. Верхнія границы печени и селезенки не измѣнены.

1—IV. 38,3—39,4. 51600. Стулъ вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 к. с. Молока 1700 к. с.

2. 39,5—40,4. 51600. Стулъ вчера днемъ 2 р. жидко. Ч. по 400 к. с. Утромъ до чая рвота 1 р. въ небольшомъ количествѣ. *Селезенка на 1 палецъ въ боковомъ положеніи. Болѣзненности области печени нѣтъ.* М. 800 к. с. Уд. в. 1,018, б. незначител. количество, р. по Эрл. положительная. Молока 2500 к. с.

3. 39,3—39,7. 51400. Стулъ 1 р. ночью и 1 р. утр. жидко. Ч. по 400 кс. Утромъ до чая рвота, какъ вчера. *Позывъ на пищу.* М. 800 кс. Уд. в. 1,020, б. незнач. кол., р. по Эрл. положит.

4. 38,8—40,2. 50300. Стулъ вчера днемъ 3 р., ночью 2 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 кс. Рвоты не было. *Спереди на кожу груди нѣсколько розеолъ.* Кое-гдѣ отдѣльные высокіе

свиеты въ груди. М. 1000 к. с. Уд. в. 1,014, б. слѣды, р. по Эрл. полож.

5. 50300. Стулъ вчера днемъ 3 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 к. с. М. 1100 к. с. Уд. в. 1,010 б. слѣды, р. по Эрл. полож.

6. 39,4—39,6. 50300. Стулъ вчера днемъ 3 р., ночью 2 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400. Розеола на груди блѣдыѣ. М. 1100 к. с. Уд. в. 1,014, б. незначит. кол., р. по Эрл. полож.

7. 39,8—39,7. 49700. Стулъ вчера днемъ 3 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 800 к. с., вечер. 400 к. с. *Розеолъ нѣтъ.* М. 1200 к. с. Уд. в. 1,012, б. незначит. кол., р по Эрл. полож. 8. 39,5—40,3. 50300. Стулъ вчера днемъ 3 р. жидко. Ч. по 400 к. с. М. 1200 к. с. Уд. в. 1,012, б. незначит. кол., р. по Эрл. полож.

9. 40,0—39,5. 49400. Стулъ вчера днемъ 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 к. с. М. 1200 к. с. Уд. в. 1,014, б. незначит. кол., р. по Эрл. полож.

10. 39,7—39,3. 48600. Стулъ вчера вечер. 1 р. и утр. 1 р. Ч. утр. 800 к. с. вечер. 400 к. с. М. 900 к. с. Уд. в. 1,018, б. незнач. кол., р. по Эрл. полож. Давалось бульонъ, 1 яйцо, 2500 к. с. молока.

11. 38,9—39,0. 48100. Стулъ вчера 2 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 800 к. с. вечер. 400 к. с. *Тифозная состоянія почти нѣтъ.* М. 1000 к. с. Уд. в. 1,016, б. незнач. кол. р. по Эрл. слабая полож.

12. 39,0—39,4. 48000. Стулъ только ночью 1 р. жидко. Ч. по 800 к. с. Головная боль меньше. Тифозная состоянія нѣтъ. 1000 к. с. Уд. в. 1,013, б. слѣды, р. по Эрл. отрицательная.

13. 38,7—38,7. 47500. Стулъ 1 р. вчера вечер. жидко Ч. по 400 к. с. М. 2400 к. с. Уд. в. 1,010, б. слѣды. Давалось бульонъ, 2 яйца, 2500 к. с. мол. Утромъ и вечеромъ ванна 28° Н.

| Число<br>нѣсая. | Вѣс.  | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | И И Ц А.                            |
|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------|
| 14/IV           | 47200 | 37,8 | —    | 38,0 | 38,9 | 38,3 | 38,2 | 38,4 | 38,4 | 37,4 | 37,7 | 38,2 | 37,8 |                                     |
| 15              | 47700 | 37,3 | 37,3 | 37,6 | 38,1 | 38,4 | 38,2 | 38,0 | 38,1 | 37,2 | 37,8 | 37,6 | 37,7 | Бульонъ, 2 яйца<br>2500 кс. молока. |
| 16              | 46500 | 37,1 | 37,3 | 38,0 | 38,8 | 38,4 | 38,8 | 39,3 | 39,1 | 39,2 | 39,0 | 37,7 | 37,8 |                                     |
| 17              | 46100 | 37,3 | 37,4 | 38,0 | 38,3 | 38,5 | 38,6 | 38,9 | 38,3 | 37,6 | 37,0 | 37,4 |      |                                     |
| 18              | 45600 | 36,6 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 37,7 | 37,7 | 37,8 | 38,0 | 37,7 | 37,5 | 37,4 | 36,8 |                                     |

Объективныя и субъективныя явленія.

Стулъ вч. 1 р. и утр. 1 р. жид. Ч. по 800 кс. Языкъ слегка обл. Ссл. на 1 и. в. в. бок. под. твердъ. Кое-гдѣ свиеты выс. въ гр. при перкуларіи. дм. Гол. 6. нѣтъ. Головокруженіе. М. 2400 кс. Уд. в. 1,008; 6. слѣды.  
 » вчера 1 р. днемъ и 1 р. утр. жид. Ч. по 800 кс. Аппетитъ хорошій. М. 2200 кс. Уд. в. 1,007; 6. слѣды.  
 » 1 р. утр. вчлдъ жид. каш. Ч. по 400 кс. М. 2000 кс. Уд. в. 1,009; 6. слѣды.  
 » 1 разъ утр. тапаяъ же. Ч. по 400 кс. Свистъ. въ гр. желныя. М. 2400 кс. Уд. в. 1,009; 6. нѣтъ.  
 » 1 р. вч. вч. и 1 р. утр. тапаяъ же. Ч. утр. 400 кс. вч. 800 кс. Свиство въ гр. нѣтъ. Край сел. въ бок. под. М. 2300 кс. Уд. в. 1,009; 6. нѣтъ.

| Число<br>мѣсц. | Вѣс.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | П и Ц А. |      |      |   |
|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|---|
|                |       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   |          | 2    | 4    | 6   |
| 19             | 45700 | 36,6 | 36,7 | 36,9 | 36,9 | 37,4 | 37,3 | 37,7 | 37,6 | 37,7 | —        | 37,1 | 37,0 | Бульон, 1 яйцо, 1 ман.<br>паша, 2200 кс. молока.            |
| 20             | 46700 | 36,7 | 36,3 | 36,7 | 36,9 | 36,5 | 37,7 | 37,7 | 37,9 | 37,4 | 36,8     | 36,7 | 37,0 |   |
| 21             | 46000 | 36,5 | 36,6 | 36,8 | 36,9 | 37,3 | 37,2 | 37,0 | 37,5 | 37,5 | 37,3     | 36,6 | 36,4 | 2200 кс. молока+1 яйцо,<br>2 манн. кашн.                    |
| 22             | 46800 | 36,5 | 36,6 | 36,7 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,4 | 36,8 | 36,8 | 37,0     | 36,6 | 36,7 |   |
| 23             | 46800 | 36,2 | 36,2 | 36,7 | 36,4 | 36,9 | 37,2 | 37,2 | 37,3 | 37,6 | 37,3     | 37,2 | 36,7 |   |
| 24             | 46700 | 37,2 | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 37,4 | 37,3 | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 38,0     | 37,8 | 37,3 |   |
| 25             | 47100 | 37,1 | 37,2 | 37,2 | 37,8 | 38,0 | 38,5 | 38,9 | 38,0 | 38,2 | 37,6     | 37,9 | 37,4 |   |
| 26             | 47500 | 37,4 | 37,3 | 37,0 | 37,0 | 37,1 | 37,4 | 37,3 | 37,1 | 36,7 | 36,8     | 36,5 | 36,5 | Бульон, 1 манн. кашн.<br>2200 кс. молока.                   |
| 27             | 46900 | 36,6 | 36,4 | 36,4 | 36,6 | 37,0 | 37,2 | 37,2 | 36,7 | 36,8 | 37,2     | 37,1 | 37,0 |   |
| 28             | 47500 | 36,9 | 36,7 | 37,1 | 37,3 | 37,1 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,2 | 37,2     | 37,2 | 37,3 |   |
| 29             | 47900 | 37,8 | 37,6 | —    | 38,0 | 38,2 | 38,8 | 38,3 | 38,3 | 37,6 | 37,5     | 37,3 | 36,9 | 36,6  |
| 30             | 47500 | 37,0 | 36,8 | 37,1 | 37,2 | 37,3 | 37,7 | 37,6 | 37,4 | 37,0 | 37,0     | 36,6 | 36,6 |   |
| 1/ч            | 47400 | 36,5 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 36,7 | 36,4     | 36,3 | 36,2 |   |
| 2              | 47200 | 36,6 | 36,2 | 36,7 | 36,7 | 36,9 | 37,0 | 37,0 | 36,5 | 36,3 | 36,0     | 36,3 | 36,5 | Сух., 2 ман. кашн.,<br>1800 кс. мол., 1 булга<br>безь корн. |
| 3              | 47700 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,2 | 36,2 | 36,0     | 36,0 | 36,0 |   |
| 4              | 47600 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,8 | 36,7 | 37,0 | 36,4 | 36,2 | 36,0 | 36,0     | 36,1 | 36,5 |   |
| 5              | 47900 | 36,6 | 36,4 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,4 | 36,2     | 36,0 | 36,0 |   |
| 6              | 48200 | 36,1 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 36,9 | 36,7 | 36,3 | 36,0 | 36,0     | 36,1 | 36,3 | Сух., котл., 2 м. кашн.<br>1200 кс. м., 1 б. б. пор.        |
| 7              | 48300 | 36,1 | 36,0 | 36,3 | 36,1 | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 36,1 | 36,0 | 36,0     | 36,0 | 36,4 | Сух., котл., 2 м. кашн.<br>1000 кс. м., 1/2 ф. бл.          |
| 8              | 48200 | 36,1 | 36,1 | 36,2 | 36,4 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 36,6 | 36,1     | 36,0 | 36,5 | Сух., котл. 2 м. х.<br>600 кс. мол. 1 фун.                  |
| 9              | 48800 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | —    | 36,8 | 36,6 | 36,6 | 36,3 | 36,0 | 36,0     | 36,0 | 36,3 | бл. + 1/2 ф. ч.   |
| 10             | 49100 | 36,0 | 36,3 | 36,6 | 37,1 | 36,8 | 36,8 | 37,0 | 36,8 | 36,1 | 36,7     | 36,4 | 36,5 |   |
| 11             | 49800 | 36,7 | 36,2 | 36,4 | 36,9 | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 36,5 | 36,2 | 36,0     | 36,2 | 36,4 | Сух., котл. 2 м. х.,<br>400 кс. мол. 1 фун.                 |
| 12             | 49800 | 36,5 | 36,3 | 36,3 | 36,9 | 36,9 | 36,7 | 36,9 | 36,6 | 36,5 | 36,3     | 36,5 | 36,5 | бл. + 1/2 ф. черн.  |
| 13             | 50300 | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,1 | 36,0     | 36,0 | 36,6 |   |
| 14             | 50200 | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 36,8 | 36,8 | 36,6 | 36,7 | 36,5 | 36,0 | 36,0     | 36,1 | 36,2 | Щи, котл., макс. 1 ф.<br>черн. + 1/2 ф. бл.                 |
| 15             | 50400 | 36,1 | 36,2 | 36,3 | 36,8 | 36,8 | 36,6 | 36,5 | 36,5 | 36,2 | 36,0     | 36,2 | 36,4 |   |
| 16             | 50900 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,3 | 36,3     | 36,5 | 36,3 |   |
| 17             | 51600 | 36,5 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |   |

**Вывод:** случай тяжелой по продолжительности лихорадки — до 27 дня. За тиф брюшной все явления, кроме печени. Попытка до 28 дня болѣзни. Высшая t°-ра конца не совпадает 3 дня. Падение в вѣсѣ съ 8 дня до 25 дня — 11,6%. Далеже уже при малой лихорадкѣ вѣсѣ поднимается и, не смотря на слѣдующія 2 волны,

**Объективные и субъективные явления.**

- Сух. р. утр. тапкнъ же. Ч. по 800 кс. Голововер. нѣтъ. М. 2000 кс. Уд. в. 1,009; б. нѣтъ.  
 вч. день 2 р. и утр. 1 р. тапкнъ же. Ч. по 800 кс. М. 2600 кс. Уд. в. 1,008; б. нѣтъ.  
 вч. 1 р. и утр. 1 р. тапкнъ же. Ч. утр. 800, веч. 1200 кс. М. 3300 кс. Уд. в. 1,006; б. нѣтъ.  
 1 р. утр. вѣздъ густой кашнцы. Ч. по 1200 кс. Селезенка не прощупывается. М. 3600 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч. дн. 2 р. и утр. 1 р. тапкнъ же. Ч. по 1200 кс. М. 3060 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч. день 2 р. и утр. 1 р. тап. же. Ч. утр. 1600 кс. вч. 1200 кс. М. 2500 кс. Уд. в. 1,007; б. нѣтъ.  
 вч. 2 р. день и 1 р. утр. половина оформлено, половина вѣздъ густой кашнцы. Ч. по 1600 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч.ра день 2 р. тапкнъ же. Ч. по 1600 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ. Кроме слегка обложен. языка ниж. чистого. М. 3600 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч. 2 р. тапкнъ же, утр. 1 р. оформл. желтое. Ч. утр. 1200 кс., веч. 2000 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч. день 1 р. и утр. 1 р. оформл. Ч. по 1600 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч. 2 р. день и утр. 1 р. вѣздъ густой кашнцы. Ч. по 1600 кс. М. 2800 кс. Уд. в. 1,007; б. нѣтъ.  
 вч.ра 1 р. и утр. 2 р. тапкнъ же. Ч. утр. 2000, веч. 1200 кс. Край селез. въ бол. полоз. М. 3400 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч.ра 2 р. и утр. 1 р. тапкнъ же. Ч. утр. 1600 кс., веч. 2000 кс. Селезенка не прощупывается. М. 3000 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч.ра 2 р. и утр. 1 р. Псалтыне 2 р. вѣздъ жидкой кашнцы. Ч. по 1600 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1,006; б. нѣтъ.  
 вч.ра 2 р. и утр. 1 р. вѣздъ жидкой кашнцы. Ч. по 1600 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,006; б. нѣтъ.  
 вч. 2 р. и утр. 1 р. вѣздъ густой кашнцы. Ч. утр. 1600, веч. 2000. М. 3800 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч.ра 1 р. и утр. 1 р. тапкнъ же. Ч. по 1600 кс. М. 4100 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч.ра день 1 р. оформлено. Ч. утр. 1600 кс., веч. 2000 кс. М. 3100 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч. 1 р. и утр. 1 р. оформлено. Ч. по 2000 кс. Язык слегка обложен въ задней половинѣ. М. 3800 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч. 1 р. и утр. 1 р. тапкнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч. 1 р. и утр. 1 р. тапкнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч. 2 р. и утр. 1 р. тапкнъ же. Ч. по 2000 кс. Языкъ чистый. М. 3600 кс. Уд. в. 1,007; б. нѣтъ.  
 вч. 2 р. и утр. 1 р. тапкнъ же, но темное. Ч. по 2000 кс. М. 4400 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч. 1 р. и утр. 1 р. тапкнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,003; б. нѣтъ.  
 вч. 1 р. и утр. 1 р. тапкнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 3900 кс. Уд. в. 1,006; б. нѣтъ.  
 вч. 1 р. и утр. 1 р. тапкнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 вч. 1 р. и утр. 1 р. тапкнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,006; б. нѣтъ.  
 вч. 1 р. и утр. 1 р. тапкнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.  
 Выписаны со стороны внутренних органовъ никакихъ измѣненій не замѣтно.

вызывающія послѣдующее его падение на 1,2 — 1,4%, вѣсѣ продолжаетъ расти и къ 54 дню болѣзни достигаетъ прежней цифры 51600, слѣд. прибыль = 13,2%. Общ. волна едва-ли зависѣла отъ пни. Первая волна, являясь на обычной кривой вѣздъ единичного повышения, на самомъ дѣлѣ продолжается три дня, не вызывая

кроме послѣдующаго паденія въ вѣсъ на 1,2% другихъ измѣненій. Вторая же на 36—37 день болѣзни кроме послѣдующаго паденія въ вѣсъ на 1,4%, сопровождается повою припухлостью селезенки и поносомъ на 39—40 дни болѣзни. Если промежутокъ между первую волною тифа и первымъ повышениемъ до 38,5° не есть вполне безлихорадочный, то второй промежутокъ между первую и второю малыми волнами можно считать безлихорадочнымъ. Какъ передъ первую, такъ и передъ второю малую волною вѣсъ поднимается, причемъ поднятіе существуетъ и въ дни уже лихорадочные.

№ 2. Крестьянинъ Иванъ Латкѣй, 20 лѣтъ, поступилъ въ больницу 3—IV 93 г. на 6-й день заболѣванія съ жалобою на общую рабатовъ. № пр. журн. 2627.

3—IV. 38,5—39,6. Средняго роста; хорошаго тѣлосложенія; порядочнаго питанія. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный по краямъ языкъ. При перкусіи груди заглушенія звука пѣть. Дыханіе везикулярное съ выдохомъ и разбросаннымъ отдѣльные свисты. Серд. тугость въ предѣлахъ нормы. Тоны чисты. Верхнія границы тупости печеночной и селезеночной не измѣнены. Селезенка на 1 палецъ, тверда, слегка чувствительна. Печеночная область болѣзненна. Печень прощупать не удается. Головная боль, головокруженіе, отсутствіе аппетита. Молока 1000 к. с.

4. 39,5—39,7. 43900. Стулъ вчера вечер. 1 р. жидко. М. 500 к. с. Уд. в. 1,025; б. незначит. колич., р. по Эрл. положит. 1700 кс. молока.

5. 38,9—39,7. 43700. Стула не было. Ч. утр. 200 к. с. и вечер. 400 к. с. Селезенка на 2 палца. М. 1200 к. с. Уд. в. 1,025; б. незначит. количество, р. по Эрл. положительна.

6. 38,5—39,7. 43200. Стулъ вчера днемъ 1 р. жидко. Ч. по 400 к. с. М. 800 к. с. Уд. в. 1,022; б. незначит. кол., р. по Эрл. положительна.

7. 38,8—40,0. 42500. Стулъ 1 р. утр. жидко. Ч. по 400

к. с. Позывъ на пишу. М. 500 к. с. Уд. в. 1,023; б. незначит. кол. р. по Эрл. положит.

Давалось: 2500 к. с. молока; 1 ванна вечеромъ 28° R.

8. 39,7—39,6. 42100. Стулъ 1 р. утр. жидко. Ч. не пѣть. М. 400 к. с. Уд. в. 1,025; б. незначит. кол. р. по Эрл. положит.

9. 39,0—39,3. 42200. Стулъ 1 р. утр. жидко. Ч. не пѣть. *Волнѣнности печеночной области нѣтъ.* М. 600 к. с. Уд. в. 1,024; б. незначит. кол. р. по Эрл. полож.

10. 39,6—39,1. 42500. Стулъ вчера вечер. 1 р. жидко. Ч. по 400 к. с. М. 1000 к. с. Уд. в. 1,014; б. незначит. кол. р. по Эрл. полож.

11. 38,6—39,2. 41500. Стулъ вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 к. с. *Тифозное состояніе выражено слабо. Свистовъ въ груди меньше.* Сильный позывъ на пишу. М. 1600 к. с. Уд. в. 1,010; б. слады, р. по Эрл. слабая полож.

12. 38,3—39,0. 41000. Стула не было. Ч. по 400 к. с. М. 800 к. с. Уд. в. 1,015; б. слады, р. по Эрл. отрицательна.

Давалось: бульонъ, 1 яйцо, 2500 к. с. мол., 1 ванна вечер. 28° R.

13. 38,0—39,2. 41100. Стулъ вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 400 к. с. вечер. 800 к. с. *Селезенка на 1½ палца, не чувствительна.* М. 2000 к. с. Уд. в. 1,010, б. слады.

14. 37,0—38,8. 40600. Стулъ вечер. вчера 1 р. жидко. Ч. по 800 к. с. *Головной боли нѣтъ. Селезенка на 1 палецъ. Кое-гдѣ свисты въ груди при первыхъ глубокихъ вздохъ.* М. 2200 к. с. Уд. в. 1,007; б. слады.

15. 36,8—39,0. 40800. Стулъ 1 р. вчера вечер. жидко. Ч. утр. 800 к. с., вечер. 1200. *Тифознаго состоянія нѣтъ.* М. 2100 к. с. Уд. в. 1,008; б. слады.

16. 36,6—37,8. 40400. Стулъ 1 р. вчера вечер. жидко. Ч. по 1200 к. с. М. 3600 к. с. Уд. в. 1,007; б. нѣтъ.

Давалось: бульонъ, 2 яйца, 2500 к. с. мол. 1 ванна вечеромъ 28° R.

| Число<br>мѣсяца. | Вѣсъ  | П И Ц А. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                                   |
|------------------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|-----------------------------------|
|                  |       | 8        | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6                   |                                   |
| 17/IV            | 40600 | 36,7     | —    | 37,1 | 37,0 | 37,3 | 37,4 | 38,6 | 38,0 | 37,5 | 36,8 | 36,5 | 36,6                | Бульонъ, 2 яйца, 2500 кс. молока. |
| 18               | 40200 | 36,0     | 36,2 | 36,7 | 37,1 | 37,5 | 37,8 | 38,0 | 38,5 | 38,3 | 37,6 | 36,9 | 36,4                | Бул., 2 яйца, 1 мяс.              |
| 19               | 40300 | 36,2     | 36,3 | 36,8 | 37,1 | 37,9 | 37,9 | 37,6 | 38,1 | 37,3 | 37,1 | 36,7 | каша, 2200 кс. мол. |                                   |
| 20               | 40500 | 36,2     | 36,4 | 36,8 | 36,6 | 36,9 | 37,3 | 36,4 | 37,7 | 37,6 | 36,9 | 36,8 | 36,9                | Бул., 2 яйца, 2 мяс.              |
| 21               | 40400 | 36,7     | 36,3 | 36,7 | 37,1 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,6 | 37,2 | 37,0 | 36,7 | 36,5                | каши, 2200 кс. мол.               |
| 22               | 40600 | 36,6     | 36,6 | 37,0 | 37,2 | 37,1 | 37,3 | 37,9 | 36,8 | 37,3 | 36,7 | 36,6 | 36,5                |                                   |

Объективныя и субъективныя явленія.

- Стулъ вч. вѣч. 1 р. жидко. Яз. слегка облож. Сед. на 1 п. тверда. Сжали въ груди вину свисты высокие при пера. надолга. Головокруж. М. 3200 к. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.
- 1 р. вечер. жидко. Ч. по 1200 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,006; б. нѣтъ.
  - 1 р. утр. кашнеобразно. Ч. по 1200 кс. Свистовъ въ груди вѣч. Потъ ночью. М. 3400 кс. Уд. в. 1,006; б. нѣтъ.
  - 1 р. утр. жидко. Ч. по 1600 кс. Потъ вѣч. утр. М. 3500 кс. Уд. в. 1,006; б. нѣтъ.
  - 1 р. утр. кашнеобразно. Ч. по 1600 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.
  - 1 р. утр. вѣч. устогъ кашни. Ч. по 1600 кс. М. 4100 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ. Головокруженіе меньше.

| Число<br>месяца. | Ввс.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | II II III A.   |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                  |       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |  |
| 23               | 40800 | 36,9 | 36,2 | 36,5 | 36,7 | 37,0 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 36,9 | 36,2 | 36,4 | 36,2 | Буз., 2 янв, 2 мая,<br>каши, 2200 кс. мол.                 |
| 24               | 40700 | 36,5 | 37,0 | 36,9 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 37,0 | Бузьянь, 2 янв, 2 м.,<br>1800 кс. м. 1 б. безъ и.          |
| 25               | 41000 | 36,6 | 36,4 | 37,0 | 37,2 | 37,2 | 37,4 | 37,7 | 37,4 | 37,6 | 37,4 | 36,8 | 36,9 | Оуаь, 2 янв, 2 м. и.,<br>1800 кс. м., 1 б. безъ и.         |
| 26               | 41500 | 36,9 | 37,0 | 37,9 | 37,5 | 37,3 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,0 | 1800 кс. м., 1 б. безъ и.                                  |
| 27               | 41200 | 36,6 | 36,9 | 37,3 | 37,3 | 37,2 | 37,9 | 37,5 | 37,3 | 37,2 | 37,0 | 36,9 | 36,8 |  |
| 28               | 41500 | 37,1 | 37,2 | 37,2 | 37,4 | 37,3 | 37,5 | 37,4 | 37,8 | 37,1 | 36,9 | 36,4 | 36,9 | Сунь, 1/2 котл., 2 янв,<br>2 м., 1/2 ф. бля. безъ и.       |
| 29               | 41500 | 36,7 | 36,8 | —    | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,5 | 37,2 | 36,8 | 36,4 | 36,4 | 36,8 |  |
| 30               | 41800 | 36,9 | 36,9 | 36,8 | 37,1 | 37,0 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 36,6 | 36,6 | 36,3 | 37,0 |  |
| 1/V              | 41500 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,2 | 36,9 | 36,5 | 36,3 | 36,2 | 36,7 | Сунь, котл., 2 мая,<br>каши, 1 ф. бля. безъ<br>корн.       |
| 2                | 41800 | 36,6 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,3 | 37,0 | 36,6 | —    | 36,4 | 37,1 |  |
| 3                | 42500 | 36,8 | 36,7 | 36,9 | 37,2 | 37,2 | 37,3 | 37,1 | 36,7 | 36,6 | 36,4 | 36,5 | 36,6 |  |
| 4                | 42700 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 37,2 | 37,2 | 37,1 | 37,1 | 36,7 | 36,4 | 36,3 | 36,3 | 36,7 |  |
| 5                | 42700 | 36,2 | 36,5 | —    | 37,2 | 37,4 | 37,1 | 37,2 | 36,7 | 36,6 | 36,4 | 36,9 | 37,2 |  |
| 6                | 43200 | 36,8 | 37,1 | 37,0 | 37,8 | 37,9 | 38,2 | 38,7 | 38,9 | 38,6 | 38,3 | 37,8 | 37,6 |  |
| 7                | 43500 | 37,6 | 37,2 | 37,0 | 37,3 | 37,2 | 37,3 | 37,0 | 36,6 | 36,3 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | Буз., 2 мая, кашн,<br>1600 кс. м., 1/2 бляго<br>безъ корн. |
| 8                | 43300 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 36,7 | 36,2 | 36,2 | 36,4 | 36,7 |  |
| 9                | 43000 | 36,5 | 36,7 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 37,0 | 37,2 | 36,6 | 36,2 | 36,2 | 36,4 | 36,7 |  |
| 10               | 43500 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,9 | 37,1 | 37,2 | 36,9 | 36,3 | 36,2 | 36,3 | 36,5 | 37,2 |  |
| 11               | 44000 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 37,1 | 37,3 | 38,0 | 39,8 | 40,8 | 40,8 | 40,7 | 40,7 | 40,2 |  |
| 12               | 44800 | 40,5 | 40,4 | 40,0 | 40,0 | 39,5 | 38,8 | 38,5 | 37,8 | 38,0 | 38,7 | 38,3 | 38,0 | Бузьянь, 2200 кс. мо-<br>лока.                             |
| 13               | 43400 | 37,9 | 37,5 | 38,1 | 38,0 | 37,8 | 37,9 | 37,8 | 37,2 | 36,3 | 36,2 | 36,3 | 36,7 |  |
| 14               | 42500 | 36,7 | 36,3 | 36,8 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | 36,3 | 36,2 | 36,1 | 36,1 | 36,0 | 36,2 |  |
| 15               | 42000 | 36,3 | 36,2 | 36,2 | 36,3 | 36,5 | 36,5 | 36,4 | 36,8 | 36,6 | 36,6 | 36,0 | 36,3 | Буз., 2500 кс. мол.  |
| 16               | 42700 | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 36,5 | 36,3 | 36,6 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | Бузьянь, 1 мая. и.,<br>2500 кс. молока.                    |
| 17               | 42900 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,3 | 36,4 | 36,5 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | Сунь, 2 мая, кашн,<br>2200 кс. мол.                        |
| 18               | 43000 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,9 | 36,8 | 36,6 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 37,2 | 37,0 | Сунь, 1800 кс. мол.<br>2 кашн, 1/2 бляго.                  |
| 19               | 43400 | 37,1 | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 36,9 | 37,2 | 37,2 | 37,0 | 36,2 | 36,2 | 36,4 | 36,5 |  |
| 20               | 43300 | 36,7 | 36,4 | 36,9 | 36,9 | 36,6 | 37,0 | 36,9 | 36,5 | 36,2 | 36,3 | 36,2 | 36,6 | Сунь, котл., 2 янв,<br>1000 кс. мол., 1/2 бля.             |
| 21               | 43700 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,5 | Сунь, котл., 2 янв,<br>100 кс. мол., 1 ф. бля.             |
| 22               | 43600 | 36,2 | 36,2 | 36,4 | 36,7 | 36,4 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,2 | 36,2 | 36,1 | 36,3 | Сунь, котл., 2 кашн,<br>1/2 ф. бля. + 1/2 черн.            |
| 23               | 44200 | 36,3 | 36,3 | 36,2 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | 37,0 | 36,4 | 36,2 | 36,0 | 36,9 | 36,2 |  |
| 24               | 44400 | 36,4 | 36,3 | 36,7 | 36,8 | 36,5 | 37,0 | 36,7 | 36,6 | 36,2 | 36,2 | 36,0 | 36,3 |  |
| 25               | 44800 | 36,4 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,6 | 36,4 | 36,2 | 36,5 | Сунь, котлста, кашар.<br>1 ф. чер.+1/2 ф. б.               |
| 26               | 45000 | 36,5 | 36,5 | 36,9 | 36,9 | 36,7 | 37,2 | 37,2 | 36,8 | 36,6 | 36,5 | 36,4 | 36,4 |  |
| 27               | 45700 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 36,9 | 37,1 | 37,2 | 37,1 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,6 |  |
| 28               | 46000 | 37,1 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

Объективные и субъективные явления.

- Стуа 1 р. утр. тапнъ же. Ч. по 1600 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- 1 р. утр. тапнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - не было. Ч. по 2000 кс. М. 3600 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт. Головокруж. нѣт.
  - вчера динь, оформлено. Ч. по 1800 кс. М. Салочувствіе хорошее. М. 6300 кс. Уд. в. 1,004; 6. нѣт.
  - 1 р. утр. шлов. оформлено, половина вьдѣ густ. кашн. Край же. Ч. утр. 2000 кс. вечер. 2400 кс. Уд. в. 1,004; 6. нѣт.
  - 1 р. утр. тапнъ же. Ч. по 2000 кс. Твердый край селез. только въ бокомъ положенн. М. 6600 кс. Уд. в. 1,004; 6. нѣт.
  - 1 р. утр. тапнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 6100 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - 1 р. утр. тапнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 4700 кс. Уд. в. 1,007; 6. нѣт.
  - вчера динь 1 р. и утр. 1 р. тапнъ же. Ч. утр. 2400 кс., вечер. 2000 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - вч. дн. 1 р. и утр. 1 р. тапнъ же. Ч. по 2000. М. 6000 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - 1 р. оформлено. Ч. по 2000 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,006; 6. нѣт.
  - вч. 1 р. и утр. 1 р. тапнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 6100 кс. Уд. в. 1,005 6. нѣт.
  - вч. вч. 1 р. тапнъ же. Ч. по 2000 кс. Селез. на 1 нал., тверд. М. 4800 кс. Уд. в. 1,006; 6. нѣт.
  - вчера 1 р. и утр. 1 р. тапнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 5000 кс. Уд. в. 1,006; 6. нѣт. Съ 12-ти для вьдѣло, вечером головная боль.
  - 1 р. вчера вч. оформлено. Ч. по 2000 кс. Вчера вч. головн. боль. Из. слегка облож. въ задн. позад. Селез. на 1 палец. М. 4100 кс. Уд. в. 1,007; 6. нѣт.
  - вчера 1 р. оформлено, утр. 1 р. вьдѣ густ. каш. Ч. утр. 2000 кс. вч. 2400 кс. М. 5500 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - вчера вч. 1 р. и утр. 1 р. вьдѣ густ. каш. Ч. по 2000 кс. М. 6500 кс. Уд. в. 1,005 6. нѣт. Субъективно ничего.
  - вчера 1 р. и утр. 1 р. тапнъ же. Ч. по 2400 кс. М. 5700 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - вчера 1 р. и утр. 1 р. тапнъ же. Ч. утр. 2000 кс., вч. 2400 кс. М. 7000 кс. Уд. в. 1,004; 6. нѣт.
  - 1 р. вч. вч. вч. жидко. Ч. только утр. 400 кс. Съ вч. ПУГ головнор. и головн. боль. На кашн, на наем. Со стѣр. вьдѣ ничего. Гарачени. саст. Животъ нѣск. вьдуть М. 38 00 кс. Уд. в. 1,010 6. нѣт.
  - вч. 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 кс. Небод. гол. боль. Из. сильно облож. по краинь, конецъ его чистъ. Селез. на 1 нал. М. 3200 кс. Уд. в. 1,008; 6. нѣт.
  - вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 1600 кс. Потъ въ ночь. Горач. саст. нѣт.
  - М. 3000 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - вчера 1 р. и утр. 1 р. вьдѣ жид. каш. Ч. утр. 2000 кс., вч. 1600 кс. На головн. боли, на головнор. М. 4200 кс. Уд. в. 1,006; 6. нѣт.
  - вчера 1 р. и утр. 1 р. вьдѣ густ. каш. Ч. по 2000 кс. М. 4700 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - вч. 1 р. и утр. 1 р. тапнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 5600 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - вч. 1 р. и утр. 1 р. тапнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 5800 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - вч. дн. 1 р. и утр. 1 р. тапнъ же. Ч. по 2000 кс. Из. слегка облож. по краинь.
  - М. 400 кс. Уд. в. 1,006; 6. нѣт.
  - вч. 1 р. и утр. 1 р. тапнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 6500 кс. Уд. в. 1,004; 6. нѣт.
  - вч. 1 р. и утр. 1 р. оформл. Ч. по 2000 кс. М. 5800 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - вчера 1 р. и утр. 1 р. тапнъ же. Ч. утр. 2000 кс., вч. 2400 кс. М. 7600 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - вчера 1 р. и утр. 1 р. тапнъ же. Ч. утр. 2100 кс., вч. 2400 кс. М. 6100 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - вчера 1 р. и утр. 1 р. тапнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 5100 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - 1 р. вч. вч. и 1 р. утр. тапнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 5300 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - вчера 1 р. и утр. 1 р. тапнъ же. Ч. по 2000 кс. М. 5300 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
  - вчера 1 р. и утр. 1 р. тапнъ же, хорошо окраи. въ темн. нѣтъ. Ч. по 2000 кс. М. 5000 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣт.
- Вышеизг.: со стороны внутреннихъ органовъ только селезенка тверда, на 1 палец.

**Вывод:** Случай средней по продолжительности лихорадки (до 22 дня). За брюшной тиф—все явления, кроме розеол и печени. Понос до 22 дня. Высшая  $t^{\circ}$ -ра конца несовпадает 6 дней (2 дня на лихорадочных цифрах и 4 дня на безлихорадочных). Падение в вѣсь съ 7-го дня до 21-го дня=8,4%. Безлихорадочного промежутка между первой основной волной и первой малой (39—40 д.) въ строгомъ смыслѣ слова не было, такъ какъ при двухчасовомъ измѣреніи  $t^{\circ}$ -ры имѣемъ вечеромъ повышения на 28 день болѣзни до 37,7 и на 31 день 37,8; тогда какъ между первой малой и второй 41, 42 и 43 дня являются лихорадочными лихорадки. Все время держится опухоль селезенки. Подъ вліяніемъ первой волны испражненіе изъ оформленнаго переходитъ въ кашицеобразное, а съ появленіемъ второй малой и дальше становится жидкимъ. Вѣсь большого, началъ подниматься на 22 день болѣзни еще при существованіи лихорадки основной волны, продолжаетъ подниматься, правда нѣсколько медленно, до 39 дня и прибыль = 7,5%; съ появленіемъ второй волны поднимается еще на 0,7%, а подъ ея вліяніемъ падаетъ слѣдующіе два дня на 1,1%. За одинъ день до появленія второй малой волны и въ первые два ея дня вѣсь поднимается дальше на 4,2%. На третій день второй малой волны и слѣдующій за нимъ день падаетъ на 5,1%; затѣмъ 1 день остается безъ перемѣнъ, съ 49 дня по 61 день болѣзни прибыль въ вѣсь = 8,2%. Общая же прибыль съ 22 дня болѣзни до 61-го равна 14,4%.

Высшая  $t^{\circ}$ -ра при первой малой волнѣ была 38,9, а не 38,2, какъ на обычной кривой; при второй же малой волнѣ  $t^{\circ}$ -ра 40,5 на 45 день есть уже собственно нижняя  $t^{\circ}$ -ра отъ ночи 44-го дня, когда было 40,9°. Возможно, что эти повышения зависѣли отъ пищи.

№ 3. Крестьянинъ Павелъ Еф-въ, 13 лѣтъ, поступилъ 17—IV 93 г. на 10-й день заболѣванія, съ жалобой на головную боль, отсутствіе аппетита, стулъ жидкій. № пр. журн. 3132.

17—IV. 0—38,5. Хорошаго тѣлосложенія и питанія мальчикъ. Небольшое тифозное состояніе. Обложенный слегка языкъ. Кожа чиста. При перкуссии груди заглушенія звука не замѣтно. Дыханіе везикулярное съ выдохомъ и разбросанное въ небольшомъ количествѣ высокіе свисты, а зади подлѣ углами лопатокъ средненизучастные хрипы тоже въ небольшомъ количествѣ. Серд. тулость въ предѣлахъ нормы. Тоны чисты. Животъ слегка болѣзненъ при ощупываніи. Верхнія границы тулости печени и селезенки не измѣнены. Селезенка тверда на 1 палецъ.

18. 39,4—40,0 и 19. 39,8—39,6. Тѣ же явленія. Стулъ по 1 р. жидко.

Давалось по 1000 кс. молока.

20. 39,3—39,4. 30000. Стулъ вчера днемъ 1 р. жидко. Раота утромъ принятымъ чаемъ. Селезенка слегка болѣзненна. *Небольшой поносъ на пищу.* М. Уд. в. 1,023 б. незначат. кол. р. по Эрл. положительна.

21. 39,1—39,6. 29600. Стула не было. Ч. утр. 400 кс., вечер. 800 кс. *Нѣсколько розеолъ на груди середи и зади.* М. 600 кс. Уд. в. 1,015 б. слѣды р. по Эрл. положит.

22. 38,8—39,4. 29200. Стулъ 1 р. утр. жидко. Ч. по 400 кс. М. 400 кс. Уд. в. 1,020 б. нѣтъ. р. по Эрл. положит.

23. 39,0—39,3. 29100. Стулъ вчера днемъ 1 р. жидко. Ч. по 400 кс. Моча утерпана.

24. 39,4—39,5. 29100. Стулъ вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 кс. Розеолы блѣдыя. М. 500 кс. Уд. в. 1,016 б. нѣтъ. р. по Эрл. полож.

25. 39,3—39,5. 28500. Стулъ вчера 2 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 кс. *Розеолъ нѣтъ. Болѣзненности селезенки нѣтъ.*

26. 38,0—38,6. 28000. Стулъ вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 кс. М. 400 кс. Уд. в. 1,016; б. нѣтъ. р. по Эрл. полож.

27. 39,0—40,2. 28000. Стулъ вчера днемъ 1 р. жидко. Ч. по 400 кс. *Свистозъ и хрипозъ въ груди меньше.*

28. 39,2—39,8. 27800. Стула не было. Ч. утр. 400 кс., вечер. 800 кс. М. 1000 кс. Уд. в. 1,010; б. нѣтъ р. по Эрл. положит.

29. 38,1—39,4. 27200. Стулъ 1 р. утр. жидко. Ч. по 800 кс. М. 600 кс. Уд. в. 1,016; б. нѣтъ. р. по Эрл. полож.

30. 38,2—39,7. 27800. Стула не было. Ч. по 800 кс. *Шумъ въ ушахъ.* М. 600 кс. Уд. в. 1,017; б. нѣтъ, р. по Эрл. полож.

1—V. 39,2—39,5. 27800. Стула не было. Ч. по 800 кс. *Поносъ на пищу больше.* М. 900 кс. Уд. в. 1,015; б. нѣтъ, р. по Эрл. полож.

2. 38,7—39,5. 27000. Стулъ вчера днемъ 1 р. и ночью 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 700 кс. Уд. в. 1,019; б. нѣтъ, р. по Эрл. слабая полож.

3. 38,6—39,3. 27600. Стула не было. Ч. по 800 кс. М. 1500 кс. Уд. в. 1,010; б. нѣтъ, р. по Эрл. слабая полож.

4. 38,6—39,2. 26500. Стулз вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко Ч. утр. 800 кс., вечер. 400 кс. М. 2000 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ, р. по Эрл. слабый полог.

5. 38,2—38,8. 26700. Стула не было. Ч. утр. 400 кс., вечер. 800 кс. Тиф. состояніе выражено слабо.

6. 37,5—38,2. 26500. Стулз вчера днѣмь 1 р. жидко. Ч.

| Число<br>мѣсяца. | Вѣсъ  | П и Ш А. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                  |
|------------------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
|                  |       | 8        | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |                                  |
| 8                | 25400 | 36,7     | —    | —    | 37,2 | 37,3 | 38,1 | 38,9 | 38,6 | 38,0 | 37,5 | 37,0 | 36,9 | Бульонъ, 1700 кс. манна, кисель. |
| 9                | 25800 | 36,7     | 36,7 | 37,8 | 37,4 | 37,7 | 37,5 | 38,1 | 37,8 | 37,0 | 36,2 | 36,7 | 36,7 |                                  |
| 10               | 25800 | 37,1     | 37,1 | 36,8 | 36,6 | 37,3 | 37,3 | 38,0 | 37,8 | 37,8 | 37,1 | 37,3 | 36,3 |                                  |
| 11               | 25700 | 37,1     | 37,0 | 36,8 | 36,6 | 37,6 | 38,1 | 38,1 | 37,9 | 37,6 | 37,3 | 37,0 | 36,1 |                                  |
| 12               | 25600 | 37,1     | 36,7 | 37,1 | 37,2 | 36,8 | 37,0 | 38,3 | 38,1 | 37,9 | 37,1 | 37,0 | 36,6 |                                  |
| 13               | 25400 | 36,9     | 36,6 | 37,2 | 37,4 | 37,8 | 38,0 | 37,3 | 36,5 | 36,4 | 37,0 | 36,9 |      |                                  |
| 14               | 25600 | 36,8     | 37,3 | 37,3 | 37,4 | 37,2 | 37,7 | 37,2 | 37,0 | 36,8 | 36,5 | 36,5 | 37,1 |                                  |
| 15               | 25700 | 37,1     | 37,1 | 37,2 | 36,9 | 37,0 | 37,6 | 37,5 | 37,0 | 36,6 | 36,3 | 36,9 | 36,6 |                                  |
| 16               | 25800 | 36,8     | 36,7 | 36,9 | 37,2 | 37,5 | 37,6 | 37,1 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 35,9 |                                  |
| 17               | 25400 | 37,1     | 37,2 | 37,3 | 37,5 | 37,2 | 37,7 | 37,4 | 37,0 | 37,2 | 36,3 | 36,7 | 36,9 |                                  |
| 18               | 26000 | 36,7     | 36,6 | 36,9 | 36,9 | 37,0 | 37,3 | 36,8 | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 36,2 | 35,6 |                                  |
| 19               | 25700 | 36,8     | 36,7 | 37,2 | 37,5 | 37,9 | 38,7 | 38,7 | 37,4 | 37,0 | 36,9 | 36,8 | 37,3 |                                  |
| 20               | 25800 | 37,1     | 37,0 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 38,1 | 38,2 | 38,3 | 38,2 | 37,4 | 37,4 | 37,8 |                                  |
| 21               | 25400 | 37,2     | 37,6 | 37,6 | 37,7 | 38,3 | 38,8 | 38,4 | 39,0 | 38,0 | 38,1 | 37,9 | 37,8 |                                  |
| 22               | 25200 | 37,3     | 38,1 | 38,0 | 38,2 | 38,6 | 38,8 | 38,6 | 38,2 | 38,0 | 37,4 | 37,7 |      |                                  |
| 23               | 25500 | 36,8     | 37,3 | 37,6 | 38,1 | 37,9 | 38,1 | 38,4 | 38,1 | 37,5 | 37,4 | 37,4 | 36,6 |                                  |
| 24               | 25100 | 37,2     | 37,1 | 37,4 | 38,0 | 36,8 | 38,1 | 38,5 | 38,3 | 37,0 | 37,3 | 37,3 | 37,0 |                                  |
| 25               | 25100 | 37,3     | 37,0 | 37,1 | 37,5 | 37,0 | 37,8 | 37,8 | 37,3 | 37,3 | 37,1 | 37,0 | 37,4 |                                  |
| 26               | 25000 | 36,8     | 36,6 | 37,2 | 37,4 | 37,5 | 36,6 | 37,8 | 36,7 | 36,6 | 36,7 | 36,2 | 37,2 |                                  |
| 27               | 25200 | 37,0     | 36,8 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 37,5 | 37,2 | 36,9 | 36,2 | 36,0 | 36,1 | 36,5 |                                  |
| 28               | 25100 | 36,6     | 36,5 | 36,9 | 37,0 | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 36,3 | 36,1 | 36,0 | 36,2 | 36,6 |                                  |
| 29               | 25300 | 36,8     | 36,3 | 36,8 | 37,0 | 36,7 | 37,0 | 37,1 | 36,2 | 36,0 | 36,2 | 36,7 | 37,0 |                                  |
| 30               | 25400 | 36,9     | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 37,0 | 37,0 | 37,8 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,7 |      |                                  |
| 31               | 25300 | 36,3     | 36,3 | 36,9 | 36,8 | 37,3 | 36,9 | 36,6 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 37,1 |                                  |
| 1/х              | 25700 | 36,5     | 36,7 | 36,6 | 36,9 | 36,8 | 37,0 | 36,3 | 36,4 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,8 |                                  |
| 2                | 26000 | 36,7     | 36,8 | 37,1 | 37,0 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,6 | 36,2 | 36,3 | 36,3 |                                  |
| 3                | 26200 | 36,4     | 36,1 | 36,7 | 37,0 | 36,1 | 36,8 | 36,8 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,2 | 36,6 |                                  |
| 4                | 26000 | 36,8     | 36,7 | 37,0 | 37,0 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 36,6 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,7 |                                  |
| 5                | 26100 | 36,2     | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 37,0 | 36,5 | 36,3 | 36,2 | 36,1 | 36,3 |                                  |
| 6                | 26000 | 36,5     | 36,5 | 36,7 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 36,9 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,6 |      |                                  |
| 7                | 26800 | 36,7     | 36,4 | 37,1 | 36,8 | 36,9 | 36,7 | 36,7 | 36,5 | 36,2 | 36,0 | 36,2 | 36,6 |                                  |
| 8                | 36900 | 36,7     | 36,6 | 36,8 | 37,1 | 37,1 | 36,4 | 36,8 | 36,2 | 36,0 | 36,6 | 36,7 |      |                                  |
| 9                | 26800 | 36,8     | 36,9 | 37,1 | 37,1 | 37,0 | 37,0 | 36,4 | 36,7 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,6 |                                  |
| 10               | 27400 | 36,1     | 36,9 | 36,9 | 36,6 | 36,9 | 36,5 | 36,8 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,6 |                                  |
| 11               | 27600 | 36,9     | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 37,1 | 37,0 | 36,8 | 36,5 | 36,3 | 36,4 | 36,6 | 36,8 |                                  |
| 12               | 28300 | 37,0     | 37,0 | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 36,9 | 36,7 | 36,7 | 36,5 | 36,0 | 36,6 |      |                                  |
| 13               | 28400 | 36,7     | 36,8 | 36,9 | 37,2 | 36,9 | 37,1 | 36,8 | 36,9 | 36,4 | 36,1 | 36,2 | 36,6 |                                  |
| 14               | 29200 | 37,0     | 36,8 | 37,0 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 37,1 | 36,4 | 36,3 | 36,2 | 36,0 | 36,6 |                                  |
| 15               | 28900 | 36,9     | 37,1 | 36,9 | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 36,7 | 36,4 | 36,3 | 36,2 | 36,5 | 36,6 |                                  |
| 16               | 30100 | 36,8     | 36,8 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,0 | 36,9 | 36,6 | 36,2 | 36,0 | 36,2 | 36,4 |                                  |
| 17               | 30900 | 37,0     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                  |

по 800 кс. М. 1700 кс. Уд. в. 1,007; б. нѣтъ, р. по Эрл. отрицательная.

7. 37,3—38,1. 25800. Стулз вчера днѣмь 1 р. и утр. 2 р. жидко. Ч. по 800 кс. Тифозно состояніе нѣтъ. Общая разбитость.

Давалось молоко 1700 к. с. 2 ванны 28°R. ежедневно.

Общественныя и субъективныя явленія.

Стула не было. Ч. по 800 к. с. Изъ слегка вѣд. Взд. утр. отдѣлы. вѣс. свѣтлы при безмолв. дмх. Селез. на 1 ян. вѣд. М. 1800 кс. Уд. в. 1,003; б. нѣтъ.

» вч. 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 1600 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» вчера 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 2500 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» вчера 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 2200 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» не было. Ч. по 800 кс. М. 2100 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ. Слѣд. вѣтр. меньше.

» вчера днѣмь 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. Изъ сл. облож. въ задней полов. Потг къ утру. М. 2500 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» не было. Ч. по 800 кс. Разбитость меньше. Слѣд. въ груди вѣд. М. 3200 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» не было. Ч. утр. 1600, вечер. 400 кс. М. 2400 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» не было. Ч. по 800 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,008; б. нѣтъ.

» 1 р. вѣтра вечер. жидко. Ч. по 800 кс.

» не было. Ч. по 1200 кс. Пота не было. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» не было. Ч. по 800 кс. Лямъзъ вѣд. М. 2800 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» не б. Ч. по 1200 кс. М. 4300 кс. Уд. в. 1,006; б. нѣтъ. Дано Оrl. Ricini 15 grm.

» 1 р. утр. жидко. Ч. утр. 800, вѣч. 1200 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» 1 р. вч. вѣд. Ч. по 1200 кс. Пота не было. М. 2600 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» 1 р. вѣтра вѣч. жидко. Ч. по 1200 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» не было. Ч. утр. 1200, вѣч. 1600 кс. М. 5000 кс. Уд. в. 1,004; б. нѣтъ.

» вчера вѣс. 2 р. жидко. Ч. утр. 1200, вечер. 1600 кс. Селезенка на 1/2 пальца, матч. М. 4000 кс. Уд. в. 1,004; б. нѣтъ.

» вчера вѣс. 2 р. жидко. Ч. утр. 1600, вечер. 1200 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,004; б. нѣтъ.

» вчера вѣс. 2 р. жидко. Ч. по 1600 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

Стулз 1 р. вч. вѣд. жид. Ч. по 1600 кс. М. 5600 кс. Уд. в. 1,004; б. нѣтъ.

» вч. 1 р. и утр. 1 р. жид. Ч. утрѣцъ 1200, вѣч. 1600 кс. М. 4800 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» вчера днѣмь 2 р. жидко. Ч. по 1600 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» вчера днѣмь 2 р. жидко. Ч. утр. 1600, вѣч. 2000 кс. Селез. только въ боков. возвышеніи на 1/2 пальца. М. 5500 кс. Уд. в. 1,004; б. нѣтъ.

» вч. вѣс. 1 р. вѣдѣзъ густой кашицы. Ч. утр. 1600, вѣч. 1200 кс. М. 5100 кс. Уд. в. 1,004; б. нѣтъ.

» вч. вѣс. 1 р. тапикъ же. Ч. по 1600 кс. М. 5300 кс. Уд. в. 1,004; б. нѣтъ.

» вч. 2 р. оформл. и хор. опрѣд. Ч. по 1600 кс. М. 3900 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» вчера 1 р. тапикъ же. Ч. утр. 1600, вечер. 1200 кс. Край селез. въ боковомъ пологѣ. М. 7000 кс. Уд. в. 1,003; б. нѣтъ.

» 1 р. утр. тапикъ же. Ч. по 1600 кс. М. 8000 кс. Уд. в. 1,003; б. нѣтъ.

» 1 р. вечер. тапикъ же. Ч. утр. 2000, вѣч. 1600 кс.

» 1 р. утр. тапикъ же. Ч. по 1600 кс. М. 5600 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» вч. 1 р. и утр. тапикъ же. Ч. по 1600 кс. М. 5600 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» вчера 1 р. тапикъ же. Ч. по 1200 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ. Утр. носовое кровоточеніе.

» вчера 1 р. тапикъ же. Ч. утр. 1200, вѣч. 1600 кс. М. 4500 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» вч. днѣмь 2 р. тапикъ же. Ч. по 1200 кс. М. 4900 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» вч. вѣс. 1 р. тапикъ же. Ч. по 1600 кс. М. 3900 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» вч. вѣс. 1 р. тапикъ же. Ч. по 1200 кс. М. 3900 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» вѣч. вѣс. 1 р. тапикъ же. Ч. утр. 1200 кс., вечер. 800 кс. М. 3900 кс. Уд. в. 1,005; б. нѣтъ.

» вчера днѣмь 2 р. тапикъ же. Ч. утр. 1600, вѣч. 1200 кс. М. 2900 кс. Уд. в. 1,006; б. нѣтъ.

» вчера 1 р. тапикъ же. Ч. по 1600 кс. Вышинскіе со стороны внутреннихъ органовъ край селезенки въ боковомъ пологѣ. при глуб. вѣдохъ.

**Вывод.** Случай тяжелый по продолжительности лихорадки (до 31-го дня болезни). За брюшной тиф все явления, кроме розеол и печени. Понос до 53-го дня болезни. Потеря во всех за первую основную волну с 13-го дня болезни = 15,3%. После первой основной волны идуть как бы три малых: 1-я оть 32 до 34 дня, вторая оть 36 до 40 дня и третья оть 42 до 48 дня. При всьх этих малых волнах опухоль селезенки, понос и обложенный язык. Однако между первую и второю малыми волнами не существует на самом деле безлихорадного промежутка, равно как между первую основною и первую малую, так как на 32-й день болезни высшая t°ра за сутки при двухчасовом ей измьреніи равна 38°, а на 35 день равна 38,3°. За обь первая малая волны всьх, строго говоря, остается без переьвын. Промежуткок между второю малую волною и третью на 41-й день болезни лишне лихорадочной t°-ры. Продолжается эта третья волна при двухчасовом измьреніи t°-ры на 1 день больше, чьмь на обычной кривой. Подь вьшшемь третьей волны всьх надаеть на 1,5%. Следовательно общая потеря всьа за всю лихорадку равна 16,7%. Подняте всьа идеть сь 50 до 54 дня медленно, а затьмь бы-стрье и скачками и кь 71 дню болезни достигаеть 30900, следовательно прибыль = 21,6%. На 4-й день посль третьей волны (50 день болезни) иьветь посльднее единичное повышенте t°-ры до 37,8°, но замьтное на обычной кривой.

№ 4. Крестьянин Василь Черн — вь, 21 г., поступил 2—V 93 г. на 10 день забольвания, сь жалобю на головную боль, познабливаніе. *Ль пр. журн. 3660.*

2—V. 40,0—40,1. Средняго роста, хорошаго тьлосложения и

питанія. Сильное тифозное состояніе. Обложенный по краямь языкь конець его чисть. Бользанность икроножныхь мышць. Кожа чиста. При перкуссии груди заглуженія звука ньтъ. Дыханіе вьизукарное сь выдохомь и разрозненные вьсокы свьсты и средьпуа. хрипы вь небольшомь количествь. Сердечная тупость вь предьлахь нормы. Тоны чисты. Селезен. тупость сь 8 ребра. Верхняя граница печени не измьнена. Ни печень, ни селезенку прощупать не удаетсь. 3—V 39,6—39,8. Тьже явления. Вадутьость живота.

4—V. 39,5—39,8. 51700. Стуль вчера днесь 1 р. жидко. Ч. по 400 к. с. М. 800 к. с. Уд. в. 1,018; б. сьды, р. по Эра. полож.

5. 38,9—39,9. 51900. Стула не было. Ч. по 400 к. с. М. 600 кс. Уд. в. 1,020, б. ньтъ; р. по Эра. полож.

6. 38,4—38,7. 51100. Стуль вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 к. с. *Тифозное состояніе выражено ньсколко слабеь.* М. 500 к. с. Уд. в. 1,021, б. ньтъ; р. по Эра. полож.

7. 37,7—38,2. 50400. Стуль вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 к. с. Сильный шумь вь ухахь и головокруженіе. Небольшая головная боль. М. 800 к. с. Уд. в. 1,017, б. ньтъ; р. по Эра. полож. 2 ванны 28°R, ежедн.

8. 37,5—38,4. 49100. Стуль вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 кс. *Тифозное состояніе выражено слабо.* Вь груди только высокы свьсты. М. 900 к. с. Уд. в. 1,015, б. ньтъ, р. по Эра. отрицательная.

9. 37,3—38,6. 48500. Стуль вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. 400 к. с. Селезенка при глубокомь вьдохь почти на 1 палецъ. Вадутьости живота ньтъ. М. 800 к. с. Уд. в. 1,014, б. ньтъ. Давалось: 2200 к. с. молока, 1 ванна 28° вечеромь.

Обьективныя и субъективныя явления.

| Число мьсяца. | Температура |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | П И Щ А. |   |  |
|---------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|---|--|
|               | Всьх.       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    |          | 6 |  |
| 10            | 47400       | 37,0 | —    | —    | —    | —    | 37,2 | 38,1 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,2 | 37,4     |   |  |
| 11            | 47100       | 37,1 | 37,2 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,5 | 38,9 | 38,7 | 38,4 | 38,3     |   |  |
| 12            | 46700       | 38,2 | 37,8 | 37,5 | 37,6 | 37,5 | 37,5 | 37,2 | 37,0 | 36,8 | 36,9 | 37,0 |          |   |  |
| 13            | 45900       | 36,6 | 37,1 | 36,9 | 37,5 | 37,3 | 37,4 | 37,2 | 37,4 | 37,0 | 37,1 | 37,2 | 36,6     |   |  |
| 14            | 46500       | 37,2 | 37,4 | 37,4 | 37,2 | 36,7 | 37,0 | 36,7 | 36,5 | 36,8 | 36,8 | 37,2 |          |   |  |
| 15            | 46900       | 37,4 | 37,9 | 38,2 | 38,0 | 38,1 | 37,5 | 37,2 | 36,9 | 36,5 | 37,0 | 37,1 | 36,6     |   |  |
| 16            | 45200       | 36,9 | 36,8 | 37,2 | 37,2 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | 36,5 | 36,6     |   |  |
| 17            | 45200       | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,4 | 36,9 | 36,5 | 36,8 | 36,6 | 36,7 | 36,5 | 36,5 | 36,6     |   |  |
| 18            | 46000       | 36,4 | 36,6 | 36,9 | 36,4 | 36,6 | 37,1 | 37,0 | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 36,4 | 36,9     |   |  |

2200 кс. молока.

Буалоно, 2200 кс. м.  
Буалоно, кисель,  
2200 кс. молока.

Стуль вч. 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. только вч. 400 кс. Слаб. тифоз. сост. Облож. аз Стуль. вьнос. свьсты вь груди при вьздухь. дьх. Слаб. на 1 палецъ.  
 • не было. Ч. по 400 кс. Тифоз. сост. ньтъ. М. 1200 кс. Уд. в. 1,012, б. ньтъ.  
 • ночью 1 р. жидко. Ч. по 400 кс. Селезенка не прощ. Сьстошь вь груди ньтъ. М. 800 кс. Уд. в. 1,011, б. ньтъ.  
 • ночью 1 р. жидко. Ч. по 400 кс. М. 500 кс. Уд. в. 1,010, б. ньтъ.  
 • ночью 1 р. жидко. Ч. по 400 кс. М. 600 кс. Уд. в. 1,010, б. сьды.  
 • вч. 1 р. жидко. Ч. по 400 кс. М. 600 кс. Уд. в. 1,009, б. сьды.  
 • ночью 1 р. жидко. Ч. утр. 800, вч. 400 кс. М. 1100 кс. Уд. в. 1,012, б. сьды.  
 • ночью 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 1400 кс. Уд. в. 1,007, б. ньтъ.  
 • вч. 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. Шумь вь головь немьше. М. 1600 кс. Уд. в. 1,009, б. сьды.

| Число месяца | Всех  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Итого |      |   |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|---|
|              |       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    |       | 4    | 6   |
| 19           | 45400 | 36,9 | 36,7 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 36,9 | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 37,2 | 37,2  | 37,2 | Бульон, 1 ман. каша, 2200 кс. молока.                         |
| 20           | 45800 | 36,7 | 37,3 | 37,5 | 37,4 | 37,7 | 37,9 | 38,1 | 38,3 | 38,2 | 38,3 | 37,2  | 37,7 | Бульон, 2200 кс. молока.                                      |
| 21           | 46100 | 37,5 | 38,0 | 37,8 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 38,0 | 38,2 | 38,2 | 38,3 | 38,0  | 37,8 | Бульон, 2200 кс. молока.                                      |
| 22           | 46000 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,5 | 37,3 | 37,2 | 37,0 | 36,6 | 37,2 | 37,3 | 37,3  | 37,3 | Бульон, кисель, 2200 кс. молока.                              |
| 23           | 45700 | 36,8 | 37,1 | 37,0 | 36,8 | 36,7 | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 37,1 | 36,7  | 36,9 | Бульон, 1 ман. каша, 2200 кс. молока.                         |
| 24           | 45700 | 36,9 | 37,0 | 36,9 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 36,6  | 36,7 | Бульон, 1 ман. каша, 2200 кс. молока.                         |
| 25           | 46000 | 36,8 | 36,8 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,3 | 37,2 | 36,8  | 37,0 | Бульон, 1 ман. каша, 2200 кс. молока.                         |
| 26           | 46100 | 37,2 | 37,3 | 37,2 | 37,0 | 37,2 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,2 | 37,3 | 37,4  | 37,2 | Бульон, 1 ман. каша, 2200 кс. молока.                         |
| 27           | 46000 | 37,9 | 37,4 | 37,4 | 37,7 | 37,5 | 37,7 | 37,8 | 37,8 | 37,4 | 37,4 | 37,3  | 37,5 | Бульон, 1 яйцо, 2 м. каша, 1600 кс. мол.                      |
| 28           | 46500 | 37,1 | 37,3 | 37,7 | 37,3 | 37,7 | 37,7 | 37,8 | 37,3 | 37,1 | 37,0 | 36,8  | 36,7 | Сув. 2 яйца, 2 ман. каша, 1200 кс. мол.                       |
| 29           | 46100 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 37,2 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,6  | 36,7 | Сув. 2 ман. каша, 800 кс. молока, 1 бул. безь корка.          |
| 30           | 46400 | 36,3 | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,5 | 36,2 | 36,5 | 36,4  | 36,6 | Теле-п. по бул. с зар.  |
| 31           | 45900 | 36,4 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 36,6 | 36,3 | 36,3 | 36,0  | 36,3 | Сув. Утка, 2 м. каша, 600 кс. мол., 1 ф. бля.                 |
| 1/вт         | 46300 | 36,1 | 36,5 | 36,3 | 36,4 | 36,6 | 36,7 | 36,5 | 36,2 | 36,4 | 36,1 | 36,4  | 36,7 | Сув. кл., 2 м. каш., 400 кс. мол., 1 ф. бля.                  |
| 2            | 46200 | 36,3 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,6 | 36,3 | 36,3 | 36,2  | 36,3 | Сув. кл., 2 м. каш., 250 кс. молока, 1 ф. бля. + 1/2 ф. черн. |
| 3            | 46400 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 36,6 | 36,3  | 36,2 | Сув. кл., 2 м. каш., 400 кс. мол., 1 ф. бля.                  |
| 4            | 46600 | 36,5 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,6 | 36,4 | 36,3 | 36,2  | 36,5 | Сув. кл., 2 м. каш., 400 кс. мол., 1 ф. бля.                  |
| 5            | 47100 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | 36,8 | 36,6 | 36,6 | 36,3 | 36,4  | 36,6 | Сув. кл., 2 м. каш., 400 кс. мол., 1 ф. бля.                  |
| 6            | 47600 | 36,7 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,6 | 36,7 | 36,3 | 36,3 | 36,4  | 36,8 | Сув. кл., 2 м. каш., 250 кс. молока, 1 ф. бля. + 1/2 ф. черн. |
| 7            | 48200 | 36,5 | 36,3 | 36,5 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 36,5  | 36,4 | Сув. кл., 2 м. каш., 250 кс. молока, 1 ф. бля. + 1/2 ф. черн. |
| 8            | 48100 | 36,6 | 36,2 | 36,6 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 36,5 | 36,2 | 36,2 | 36,0 | 36,3  | 36,8 | Сув. кл., 2 м. каш., 250 кс. молока, 1 ф. бля. + 1/2 ф. черн. |
| 9            | 48000 | 36,4 | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 36,4 | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,3 | 36,0 | 36,0  | 36,4 | Сув. кл., 2 м. каш., 250 кс. молока, 1 ф. бля. + 1/2 ф. черн. |
| 10           | 48800 | 36,3 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | 36,3 | 36,6 | 36,2 | 36,0  | 36,7 | Сув. кл., 2 м. каш., 400 кс. мол., 1 ф. бля.                  |
| 11           | 49000 | 36,3 | 36,6 | 36,6 | 36,9 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,5 | 36,0 | 36,1 | 36,5  | 36,4 | Сув. кл., 2 м. каш., 400 кс. мол., 1 ф. бля.                  |
| 12           | 49000 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 37,1 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,3 | 36,3 | 36,6  | 36,6 | Сув. кл., 2 м. каш., 400 кс. мол., 1 ф. бля.                  |
| 13           | 49300 | 36,4 | 36,7 | 36,6 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 36,6 | 36,6 | 36,3 | 36,3  | 36,8 | Сув. кл., 2 м. каш., 400 кс. мол., 1 ф. бля.                  |
| 14           | 49400 | 36,5 | 36,6 | 36,6 | 37,0 | 37,0 | 37,2 | 37,6 | 38,1 | 38,2 | 38,5 | 38,3  | 38,3 | Сув. кл., 2 м. каш., 400 кс. мол., 1 ф. бля.                  |
| 15           | 49400 | 37,7 | 37,6 | 37,4 | 37,3 | 37,8 | 38,1 | 38,0 | 38,0 | 37,9 | 37,8 | 37,8  | 37,7 | Сув. кл., 2 м. каш., 400 кс. мол., 1 ф. бля.                  |
| 16           | 49500 | 37,3 | 37,2 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,5 | 37,5 | 36,7 | 36,9 | 36,8 | 36,5  | 37,0 | Сув. кл., 2 м. каш., 400 кс. мол., 1 ф. бля.                  |
| 17           | 49900 | 36,8 | 36,9 | 36,7 | 36,9 | 36,8 | 36,9 | 36,6 | 36,5 | 36,4 | 36,3 | 36,3  | 36,4 | Томе.   |
| 18           | 49000 | 36,3 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,3 | 36,7 | 36,7 | 36,3 | 36,4 | 36,0 | 36,0  | 36,2 | Томе.   |
| 19           | 50200 | 36,3 | 36,5 | 36,6 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,3 | 36,2 | 36,3  | 36,5 | Томе.   |
| 20           | 50500 | 36,4 | 36,7 | 37,0 | 36,7 | 37,0 | 36,6 | 36,5 | 36,3 | 36,5 | 36,4 | 36,4  | 36,9 | Томе.   |
| 21           | 50600 | 36,3 | 36,6 | 36,6 | 36,7 | 37,0 | 36,8 | 36,5 | 36,4 | 36,2 | 36,0 | 36,2  | 36,7 | Томе.   |
| 22           | 50500 | 36,4 | 36,3 | 36,5 | 36,5 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,2 | 36,2  | 36,1 | Томе.   |
| 23           | 50400 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,3 | 36,5 | 37,2 | 36,2 | 36,1 | 36,1 | 36,0 | 36,2  | 36,7 | Томе.   |
| 24           | 50800 | 36,1 | 36,7 | 36,3 | 36,8 | 36,6 | 36,4 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,0  | 36,5 | Томе.   |
| 25           | 51000 | 36,3 | 36,4 | 36,4 | 36,6 | 36,9 | 36,8 | 36,6 | 36,6 | 36,7 | 36,6 | 36,6  | 36,6 | Сув. кл., мансарны, 1 ф. бля. + 1/2 ф. черн.                  |
| 26           | 50900 | 36,6 | 36,8 | 36,6 | 36,6 | 36,3 | 36,5 | 36,4 | 36,1 | 36,3 | 36,2 | 36,4  | 36,5 | Сув. кл., мансарны, 1 ф. бля. + 1/2 ф. черн.                  |
| 27           | 51200 | 36,2 | 36,4 | 36,7 | 36,3 | 36,4 | 36,6 | 36,7 | 36,3 | 36,4 | 36,3 | 36,2  | 36,7 | Сув. кл., мансарны, 1 ф. бля. + 1/2 ф. черн.                  |
| 28           | 51000 | 36,0 | 36,4 | 36,2 | 36,7 | 36,9 | 36,5 | 36,0 | 36,5 | 36,0 | 36,0 | 36,4  | 36,5 | Сув. кл., мансарны, 1 ф. бля. + 1/2 ф. черн.                  |
| 29           | —     | 36,1 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |   |

Субъективные и объективные явления.

- вчера 1 р. янко. Ч. по 800 кс. М. 1700 кс. Уд. в. 1,005, 6 нбтв.
- не было. Ч. по 800 кс. Яз. слегка облож. вь задн. пол. М. 2900 кс. Уд. в. 1,007, 6 нбтв.
- не было. Ч. по 800 кс. М. 1800 кс. Уд. в. 1,005, 6 нбтв.
- 1 р. вчер янко. Ч. по 800 кс. Птичь угрр. М. 2100 кс. Уд. в. 1,007, 6 нбтв.
- 1 р. вчер янко. Ч. по 800 кс. М. 2800 кс. Уд. в. 1,005, 6 нбтв.
- 1 р. утр. янко. Ч. утр. 800, веч. 1200 кс. М. 2100 кс. Уд. в. 1,006, 6 нбтв.
- 1 р. вчер янко. Ч. по 1200 кс. М. 2700 кс. Уд. в. 1,005, 6 нбтв.
- 1 р. вчер ян. каш. Ч. по 1200 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1,005, 6 нбтв.
- 1 р. вчер тапикж же. Ч. по 1200 кс. Шума в ушках нбтв.
- 1 р. вчер тапикж же. Ч. утр. 1600, веч. 1200 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,005, 6 нбтв.
- Студя вчера 1 р. тапикж же. Ч. по 1200 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1,006, 6 нбтв.
- 1 р. вч. густой каш. Ч. по 1200 кс. М. 3500 кс. Уд. в. 1,007, 6 нбтв.
- 1 р. вчер тапикж же. Ч. по 1600 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1,005, 6 нбтв.
- вчера 2 р. тапикж же. Ч. по 1200 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1,006, 6 нбтв.
- не было. Ч. утр. 1200, вечер. 800 кс. М. 3900 кс. Уд. в. 1,005, 6 нбтв.
- вчера 1 р. на позов. оформано, на полав. видя густой кашки желтого цбта. Ч. утр. 1200, веч. 1600 кс. М. 3300 кс. Уд. в. 1,005, 6 нбтв.
- вчера 1 р. тапикж же. Ч. утр. 1600, вечер. 1200 кс. Язьмь чест. М. 3700 кс. Уд. в. 1,007, 6 нбтв.
- вчера 1 р. тапикж же. Ч. утр. 1600, вечер. 1200 кс. М. 3700 кс. Уд. в. 1,007, 6 нбтв.
- вчера 1 р. тапикж же. Ч. по 1600 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1,006, 6 нбтв.
- вчера 2 р. тапикж же. Ч. по 1600 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,005, 6 нбтв.
- вчера 1 р. тапикж же. Ч. по 1600 кс. М. 3900 кс. Уд. в. 1,006, 6 нбтв.
- вчера 1 р. тапикж же. Ч. по 1600 кс. М. 3600 кс. Уд. в. 1,006, 6 нбтв.
- вчера 1 р. в утр. 1 р. тапикж же. Ч. по 1600 кс. М. 4500 кс. Уд. в. 1,004, 6 нбтв.
- вчера 1 р. тапикж же. Ч. по 1600 кс. М. 3900 кс. Уд. в. 1,007, 6 нбтв.
- вчера 1 р. тапикж же. Ч. по 1600 кс. М. 4500 кс. Уд. в. 1,008, 6 нбтв.
- вч. 1 р. оформано желтое. Ч. по 1600 кс. М. 3600 кс. Уд. в. 1,008, 6 нбтв.
- вчера 1 р. оформано, утр. видя густой кашки желтого. Ч. утр. 1600, вечер. 1200 кс. М. 4300 кс. Уд. в. 1,008, 6 нбтв.
- вч. 1 р. мансарны оформано, пол. видя густой кашки желтого. Ч. по 1600 кс. М. 4400 кс. Уд. в. 1,004, 6 нбтв.
- вчера 2 р. тапикж же. Ч. по 1200 кс. М. 4400 кс. Уд. в. 1,004, 6 нбтв.
- вчера 1 р. тапикж же. Ч. утр. 1600, в. 2000 кс. М. 5600 кс. Уд. в. 1,004, 6 нбтв.
- вчера 2 р. тапикж же. Ч. утр. 2400, в. 2000 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,006, 6 нбтв.
- вчера 1 р. тапикж же. Ч. по 2000 кс. М. 4300 кс. Уд. в. 1,006, 6 нбтв.
- вчера 2 р. тапикж же. Ч. по 2000 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,007, 6 нбтв.
- вчера 1 р. тапикж же. Ч. утр. 1600, в. 2000 кс. М. 5000 кс. Уд. в. 1,005, 6 нбтв.
- вчера 1 р. тапикж же. Ч. по 2000 кс. М. 4800 кс. Уд. в. 1,005, 6 нбтв.
- вчера 1 р. тапикж же. Ч. утр. 2000, в. 1600 кс. М. 5000 кс. Уд. в. 1,005, 6 нбтв.
- вчера 1 р. тапикж же. Ч. по 1600 кс.
- вчера 1 р. тапикж же. Ч. по 2000 кс. М. 3500 кс. Уд. в. 1,006, 6 нбтв.
- вчера 1 р. тапикж же. Ч. по 2000 кс. Выпасаки: со стороны внутренних органов виднышия не закитно; легкое дрояние в ногах около 10—15 минутно стояния.

**Вывод:** По продолжительности лихорадки основной волны тифа случай среднй; клинически же протекал тяжело. За бршной тиф.

всё явления кромь розеол и печени. Понос продолжался до 36 дия болъзни. Хотя на обычной кривой температуры на 18 день бо-

лѣзни и имѣется какъ бы аширексія (37—37,2), но на самомъ дѣлѣ высшая температура за эти сутки была 38,1° и потому послѣдую щее повышение температуры обычной кривой есть лишь продолженіе лихорадки. Паденіе въ вѣсъ съ 12 до 20 дня болѣзни = 9,7%. По прекращеніи лихорадки основной волны по обычной кривой вѣсъ падаетъ 5 дней на 3,2%. Обиная же потеря съ 12 дня болѣзни = 12,6%. Затѣмъ вѣсъ начинаетъ подниматься медленно и къ 68 дню болѣзни прибавъ = 7200 грм. или 15,9%. Въ періодъ выздоровленія наблюдались три малыя волны, при чемъ промежутокъ между основною волною тифа и первою малою не былъ вполнѣ безлихорадочнымъ въ дѣйствительности (на 23 д. болѣзни высшая t-ра была 38,2, а не 37,5 какъ на обычной кривой). Съ появленіемъ малыхъ волнъ вѣсъ продолжаетъ расти, а затѣмъ нѣсколько падаетъ. Первые двѣ малыя волны сопровождаются поносомъ.

#### ГРУППА ПЯТАЯ.

Крестьянинъ Алексѣй Б—въ, 19 лѣтъ, поступилъ 21—VI 93 г. на 8 день заболѣванія съ жалобою на головную боль, общую разбитость. (См. кривую t-ры). *№ пр. журн. 5333.*

21—VI 38,5—38,5. Средняго роста. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Порядочное тифозное состояніе. Обложенный по краямъ языкъ. На кожѣ туловища розеола въ порядочномъ количествѣ. Болѣзненности икроножныхъ мышцъ. При перкусіи груди звукъ всюду ясный. Дыханіе везикулярное и кое-гдѣ видѣе свисты. Сердечная тупость въ предѣлахъ нормы. Тоны чисты. Селезеночная тупость сверху съ 8-го ребра. Селезенка въ положеніи на спинѣ на 1 палецъ тверда, болѣзненна. Верхняя граница тупости печени не измѣнена. Печень прощупать не удается. Печеночная область болѣзненна. 22—VI 56800. Стулъ вчера 1 р. жидко. Ч. по 800 к. с. Пища 1200 к. с., молока.

23. 39,8—40,0. 56200. Стулъ вчера и утромъ по 2 р. жидко. Ч. утр. 800, вечер. 200 к. с. Сильное тифозное состояніе

Отдельныя розеола на рукахъ. М. 300 к. с., уд. в. 1,025; б. слѣды, р. по Эрл. положит.

24. 39,8—39,0. 55400. Стулъ вчера и ночью по 3 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 200, вечер. 400 к. с. *Тифозное состояніе выражено слабо.*

25. 39,1—39,7. 55200. Стулъ вчера 3 р. и утр. 2 р. жидко. Ч. утр. 800, вечер. 400 к. с. М. 1200 к. с., уд. в. 1,012, б. нѣтъ, р. по Эрл. положит., по слабѣ.

26. 38,9—39,6. 51700. Стулъ вчера и утр. по 1 р. жидко, Ч. утр. 800, вечер. 400 к. с. Позывъ на пищу. Розеола блѣдная. М. 900 к. с., уд. в. 1,016, б. нѣтъ р. по Эрл. полож.

27. 39,0—39,9. 54000. Стулъ вчера и утр. по 1 р. жидко. Ч. по 800 к. с. *Небольшое тифозное состояніе. Розеола тѣмъ.* Болѣзненность икроножныхъ мышцъ меньше. М. 800 к. с. уд. в. 1,015; б. нѣтъ; р. по Эрл. положит.

Давалось 1900 куб. сант. молока.

28. 39,2—39,7. 53700. Стулъ вчера и утр. по 1 р. жидко, Ч. утр. 1200, вечер. 800 к. с. Свистовъ въ груди меньше. Болѣзненности печеночной области нѣтъ. М. 900 к. с., уд. в. 1,016, б. нѣтъ, р. по Эрл. положит.

29. 39,1—39,5. 52700. Стулъ вчера 2 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 1200, вечер. 800 к. с. М. 1900 к. с., уд. вѣса. 1,015; б. нѣтъ, р. по Эрл. слабѣ положит.

30. 38,5—38,7. 51800. Стула не было. Ч. утр. 1200, вечер. 800 к. с. *Тифознаго состоянія нѣтъ. Свистовъ въ груди нѣтъ.* М. 1600 к. с., уд. в. 1,010; б. нѣтъ, р. по Эрл. *отрицательная.*

1—VII 37,2—37,7. 51100. Стулъ вчер. и утр. по 1 р. жидко. Ч. только вечер. 800 к. с. *Возбужденности икроножныхъ мышцъ нѣтъ.* М. 2100 к. с., уд. в. 1,014; б. нѣтъ.

Давалось 2200 куб. сант. молока.

2 ванны 28° въ сутки ежедневно.

| Число<br>мыльца | Весь  | П П Ш А. |      |      |      |      |      | П П Ш А. |      |      |      |      |      |   |
|-----------------|-------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|---|
|                 |       | 8        | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8        | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |   |
| 2/уп            | 50100 | 36,2     | 36,3 | 36,3 | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,0     | 36,7 | 36,4 | 36,4 | 36,5 | 36,8 | 2200 кс. молока.                                      |
| 3               | 48300 | 36,5     | 36,7 | 36,5 | 36,7 | 36,6 | 36,8 | 37,0     | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,3 | 36,5 | Бульон, ислед, 2200 кс. молока.                       |
| 4               | 48900 | 36,0     | 36,3 | 36,7 | 36,6 | 36,8 | 36,6 | 37,0     | 36,5 | 36,1 | 36,5 | 36,8 | 37,0 |   |
| 5               | 48900 | 36,8     | 36,7 | 36,4 | 37,0 | 36,9 | 36,5 | 37,0     | 37,0 | 36,6 | 36,5 | 36,8 | 36,8 |   |
| 6               | 48300 | 36,8     | 36,7 | 37,1 | 37,0 | 37,2 | 37,1 | 37,0     | 37,2 | 37,0 | 36,8 | 36,7 | 36,9 |   |
| 7               | 48500 | 36,8     | 37,0 | 36,9 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 37,2     | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 36,7 | 37,0 |   |
| 8               | 48200 | 37,0     | 36,8 | 36,9 | 36,8 | 36,9 | 36,8 | 36,9     | 36,8 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | 37,0 | Бульон, 1 ман. кашн, 1800 кс. молока.                 |
| 9               | 48200 | 36,8     | 36,8 | 36,6 | 36,9 | 36,7 | 36,7 | 36,8     | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 37,0 |   |
| 10              | 48500 | 36,5     | 36,9 | 36,4 | 37,1 | 37,0 | 36,5 | 36,6     | 36,6 | 36,2 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | Бул., 1 яйцо, 2 ман. к. н.                            |
| 11              | 48500 | 36,3     | 36,7 | 36,4 | 36,3 | 36,8 | 36,5 | 37,1     | 37,0 | 36,6 | 36,8 | 37,0 | 36,5 |   |
| 12              | 48300 | 36,7     | 37,0 | 36,8 | 36,3 | 36,9 | 36,6 | 36,4     | 36,7 | 36,3 | 36,2 | 36,6 | 36,2 | Бульон, 2 яйца, 2 ман. кашн, 1700 кс. молока.         |
| 13              | 48300 | 36,6     | 36,8 | 36,9 | 36,6 | 37,0 | 36,6 | 36,8     | 36,4 | 36,3 | 36,5 | 36,3 | 36,7 |   |
| 14              | 48900 | 36,5     | 37,0 | 36,9 | 36,7 | 36,3 | 36,8 | 37,0     | 36,8 | 36,6 | 36,2 | 36,5 | 36,8 |   |
| 15              | 48900 | 36,7     | 37,0 | 36,9 | 36,9 | 37,0 | 36,8 | 36,8     | 36,4 | 36,5 | 36,8 | 36,4 | 36,2 |   |
| 16              | 49000 | 36,3     | 36,5 | 36,5 | 37,1 | 37,0 | 36,7 | 36,8     | 36,3 | 36,1 | 36,2 | 36,7 | 36,2 | Бул. 1/2 котл., 2 м. к. н. 1600 кс. м. 1 б. бел. кор. |
| 17              | 49100 | 36,8     | 36,9 | 36,5 | 36,7 | 37,0 | 36,6 | 36,8     | 36,5 | 36,2 | 36,4 | 36,4 | 36,9 |   |
| 18              | 49200 | 36,9     | 37,0 | 36,5 | 37,2 | 37,4 | 37,2 | 37,0     | 36,5 | 36,2 | 36,3 | 36,5 | 36,1 | Бул., котл., 2 м. к. н.                               |
| 19              | 49000 | 36,8     | 36,5 | 36,6 | 36,9 | 37,0 | 37,0 | 36,9     | 36,8 | 37,0 | 36,8 | 36,2 | 36,5 |   |
| 20              | 50000 | 36,5     | 36,6 | 36,7 | 37,3 | 37,4 | 37,0 | 37,1     | 36,8 | 36,4 | 36,6 | 36,2 | 36,2 | 1200 кс. мол., 1/2 ф. б.                              |
| 21              | 51000 | 36,7     | 36,9 | 36,8 | 37,1 | 37,1 | 36,8 | 37,0     | 36,6 | 36,3 | 36,8 | 36,4 | 36,8 |   |
| 22              | 50900 | 36,9     | 37,2 | 36,8 | 36,9 | 37,1 | 37,1 | 36,9     | 36,7 | 36,3 | 36,2 | 36,8 | 36,5 | 1000 кс. мол. 1, ф. б. к.                             |
| 23              | 51600 | 36,5     | 36,7 | 36,4 | 37,0 | 37,1 | 36,8 | 36,6     | 36,5 | 36,8 | 36,2 | 36,4 | 36,7 | Тоже + 1/2 ф. б. к.                                   |
| 24              | 51500 | 37,0     | 36,8 | 36,7 | 37,1 | 37,2 | 36,6 | 36,6     | 36,9 | 36,2 | 36,3 | 36,5 | 36,5 |   |
| 25              | 52000 | 36,6     | 37,0 | 36,6 | 37,2 | 37,2 | 37,0 | 36,8     | 36,5 | 36,7 | 36,5 | 36,4 | 36,8 |   |
| 26              | 51700 | 36,6     | 36,8 | 37,0 | 37,1 | 37,2 | 36,8 | 37,0     | 36,6 | 36,3 | 36,2 | 36,8 | 36,8 | Суп, котл., 2 м. к. н., 450 кс. м. 1 ф. б. + 1 ф. ч.  |
| 27              | 52500 | 37,0     | 37,0 | 36,9 | 37,1 | 37,2 | 37,0 | 37,2     | 36,8 | 36,5 | 36,3 | 36,8 | 36,4 |   |
| 28              | 52500 | 37,2     | 37,0 | 36,4 | 36,8 | 37,2 | 36,9 | 37,0     | 36,7 | 36,4 | 36,1 | 36,8 | 36,3 | Суп, кот., макс. 450 кс.                              |
| 29              | 53000 | 36,7     | 36,8 | 36,7 | 37,0 | 37,2 | 36,9 | 37,1     | 36,7 | 36,4 | 36,2 | 36,0 | 36,4 |   |
| 30              | 53000 | 36,9     | 36,7 | 36,8 | 37,1 | 37,0 | 36,5 | 36,7     | 36,6 | 36,4 | 36,5 | 36,2 | 36,6 | Суп, кот., макс. 450 кс. м., 1 ф. б. + 1 ф. ч.        |
| 31              | 53000 | 37,0     | 36,6 | 36,3 | 37,1 | 37,0 | 37,2 | 36,8     | 36,7 | 36,3 | 36,3 | 36,5 | 36,8 |   |
| 1/уп            | 53100 | 36,4     | 36,8 | 36,6 | 37,1 | 37,0 | 36,9 | 36,9     | 36,6 | 36,7 | 36,5 | 36,4 | 36,3 |   |
| 2               | 53300 | 36,8     | 36,7 | 37,2 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,6     | 37,6 | 36,9 | 36,8 | 37,0 | 36,9 |   |
| 3               | 53900 | 37,1     | 37,1 | 36,9 | 37,3 | 37,8 | 37,8 | 38,0     | 37,8 | 37,7 | 37,2 | 37,0 | 37,0 | Суп, кот., 2 ман. кашн, 2200 кс. молока.              |
| 4               | 53300 | 37,2     | 37,4 | 37,5 | 37,8 | 38,4 | 38,8 | 39,0     | 38,1 | 37,9 | 37,8 | 38,4 | 37,6 |   |
| 5               | 53100 | 37,7     | 37,8 | 38,4 | 38,8 | 38,9 | 38,9 | 38,8     | 38,8 | 38,3 | 38,4 | 38,3 | 37,9 |   |
| 6               | 52600 | 37,7     | 37,6 | 38,0 | 38,4 | 39,0 | 39,3 | 38,8     | 39,2 | 38,9 | 38,4 | 38,2 | 38,2 | Бульон, 2300 кс. молока.                              |
| 7               | 52400 | 38,2     | 38,2 | 38,4 | 38,6 | 38,3 | 39,0 | 38,9     | 39,0 | 38,6 | 38,8 | 39,0 | 38,2 |   |
| 8               | 52100 | 37,9     | 37,9 | 38,0 | 38,6 | 38,8 | 38,6 | 38,8     | 38,5 | 37,9 | 38,0 | 38,8 | 38,2 |   |

Объективные и субъективные явления.

- Стул 2 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. Облож. язык. Селезенка тверда, на 1/2 пальца. Головокружение. М. 1200 кс. Уд. в. 1,010, б. ивты.
- вч. 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. 2300 кс. Уд. в. 1,005, б. ивты.
- вчера 1 р. жидко. Ч. по 1200 кс. М. 2400 кс. Уд. в. 1,005, б. ивты.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. кашнеобразно. Ч. по 1200 кс. М. 2600 кс. Уд. в. 1,013, б. ивты.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 1600 кс. Головогр. меньше. М. 3400 кс. Уд. в. 1,006, б. ивты.
- вчера 1 р. кашнеобразно. Ч. по 1600 кс. Селезенка—край.
- 1 р. утр. так же. Ч. по 1600 кс. Яз. сл. обл. свид. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005, б. ивты.
- 1 р. утр. так же. Ч. по 1600 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1,005, б. ивты.
- вчера 2 р. так же. Ч. по 1600 кс. Селезенка пропуната не удается.
- вчера 1 р. так же. Ч. по 1600 кс. М. 3700 кс. Уд. в. 1,007, б. ивты.
- вч. 1 р. и утр. 1 р. так же. Ч. по 1600 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1,008, б. ивты.
- вчера 1 р. так же. Ч. по 1600 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1,006, б. ивты.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. так же. Ч. по 1600 кс. Головокруж. ивты. М. 3200 кс. Уд. в. 1,006, б. ивты.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. еформа. желт. Ч. по 1600 кс. М. 3700 кс. Уд. в. 1,005, б. ивты.
- вч. 1 р. и утр. 1 р. так же. Ч. по 1600 кс. М. 4300 кс. Уд. в. 1,005, б. ивты.
- вч. 1 р. и утр. 1 р. так же. Ч. по 2000 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005, б. ивты.
- вч. 1 р. и утр. 1 р. так же. Ч. по 1600 кс. М. 2900 кс. Уд. в. 1,010, б. ивты.
- вч. 1 р. и утр. 1 р. так же. Ч. по 1600 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1,005, б. ивты.
- вч. 1 р. так же. Ч. по 1600 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,008, б. ивты.
- не было. Ч. утр. 1200 кс. вечер. 1600 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,008, б. ивты.
- вечер. 1 р. и утр. 1 р. так же. Ч. по 1600 кс. М. 2900 кс. Уд. в. 1,008, б. ивты.
- 1 р. утр. так же. Ч. по 1600 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1,007, б. ивты.
- вчера 1 р. так же. Ч. по 1600 кс. М. 2800 кс. Уд. в. 1,010, б. ивты.
- вчера 2 р. еформено ивты так же. Ч. по 1600 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,009, б. ивты.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. так же. Ч. по 1600 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,010, б. ивты.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. так же. Ч. по 1600 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1,008, б. ивты.
- 1 р. утр. еформено желто. Ч. по 1600 кс. Язык чист. Селезеночная туность съ 9-го ребра.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. так же. Ч. по 1600 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,010, б. ивты.
- вчера 1 раз так же. Ч. по 1600 кс. Язык слегка обложень свид. М. 3500 кс. Уд. в. 1,005, б. ивты.
- вчера 1 р. так же. Ч. по 1600 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,006, б. ивты.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. являг густой кашци, уроло окрашено. Ч. по 1600 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,005, б. ивты.
- вчера 1 р. так же. Ч. по 1600 кс. Край селезенки на боковом положении.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. так же. Ч. утр. 1600, веч. 1200 кс. Чувство жар. М. 2600 кс. Уд. в. 1,012, б. ивты.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко, желто. Ч. по 1200 кс. Урчание на живот. Небольшая головная боль. М. 2700 кс. Уд. в. 1,009, б. ивты.
- вч. 3 р., ночью 1 р. и у. 2 р. жидко, желто. Ч. утр. 1300, в. 1600 кс. Селез. на живот. на свидь на 1 пал. тверда. М. 3100 кс. Уд. в. 1,005, б. ивты.
- вчера 3 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 1600 кс. Язык обложень ивты. М. 2000 кс. Уд. в. 1,005, б. ивты.
- вч. 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 1600 кс. М. 3600 кс. Уд. в. 1,007, б. ивты.

| Число<br>мысака. | Вес.  | П    |      |      |      |      |      | И И Ц А. |      |      |      |      |      |  |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|--|
|                  |       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8        | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |  |
| 9                | 52200 | 37,8 | 37,8 | 37,9 | 38,4 | 38,7 | 39,1 | 38,9     | 38,8 | 38,5 | 38,2 | 38,2 | 37,6 | Тоже.  |
| 10               | 51700 | 37,6 | 37,7 | 37,6 | 37,8 | 37,8 | 38,0 | 38,5     | 38,5 | 38,4 | 38,0 | 38,1 | 37,7 |  |
| 11               | 52000 | 37,2 | 37,2 | 37,3 | 37,8 | 37,6 | 38,3 | 38,2     | 38,1 | 37,9 | 37,8 | 37,7 | 37,3 |  |
| 12               | 51600 | 37,0 | 37,1 | 37,2 | 37,2 | 37,4 | 37,5 | 38,1     | 37,6 | 37,6 | 38,0 | 37,9 | 37,5 | Бульон 2300 кс.<br>молока.   |
| 13               | 51700 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 37,3 | 37,6 | 37,3 | 37,8     | 37,7 | 37,9 | 37,6 | 37,8 | 37,5 |  |
| 14               | 51200 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,9 | 37,1 | 37,2 | 37,8     | 37,6 | 38,0 | 37,5 | 37,0 | 36,9 |  |
| 15               | 51000 | 36,8 | 36,3 | 37,7 | 36,9 | 37,0 | 36,8 | 36,7     | 36,6 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 36,6 | Бульон, кисель,<br>2300 кс. молока.  |
| 16               | 50700 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 37,2     | 37,4 | 37,4 | —    | 37,2 | 36,9 |  |
| 17               | 51100 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 37,0 | 37,0 | 36,7 | 36,8     | 36,6 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | 36,6 |  |
| 18               | 51100 | 36,5 | 36,6 | 36,5 | 36,5 | 36,6 | 36,6 | 36,9     | 36,7 | 36,6 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | Тоже+1 ман. каша.  |
| 19               | 51100 | 36,6 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 36,6 | 36,8     | 36,4 | 36,3 | 36,2 | 36,3 | 36,4 |  |
| 20               | 51300 | 36,7 | 36,7 | 36,4 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 36,9     | 36,5 | 36,8 | 36,5 | 36,5 | 36,3 |  |
| 21               | 51100 | 36,6 | 36,5 | 36,4 | 36,7 | 36,6 | 36,7 | 36,6     | 36,4 | 36,2 | 36,4 | 36,5 | 36,1 | Бул., 1 яйцо, кисель,<br>2 н. каша, 1800 кс. н.  |
| 22               | 51500 | 36,4 | 36,4 | 36,3 | 36,8 | 36,6 | 36,5 | 36,6     | 36,1 | 36,6 | 36,2 | 36,4 | 36,4 |  |
| 23               | 51700 | 36,4 | 36,5 | 36,3 | 36,8 | 36,9 | 36,6 | 36,4     | 36,3 | 36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,6 |  |
| 24               | 51600 | 36,3 | 36,3 | 36,4 | 36,6 | 36,5 | 36,9 | 36,5     | 36,4 | 36,2 | 36,1 | 36,0 | 36,1 | Тоже+1 б. бев. пор.<br>Сух. 1/2шт. 2н. каш.<br>1600 кс. м. 1/2 ф. бн.<br>Сух. котл. 2 ман.<br>каши, 1600 кс. мол.,<br>1 ф. бульон. |
| 25               | 52000 | 36,4 | 36,5 | 36,5 | 36,6 | 36,9 | 36,5 | 36,6     | 36,4 | 36,1 | 36,2 | 36,3 | 36,5 |  |
| 26               | 52500 | 36,4 | 36,0 | 36,3 | 36,4 | 36,6 | 36,5 | 36,4     | 36,4 | 36,3 | 36,4 | 36,8 | 36,6 |  |
| 27               | 52500 | 36,2 | 36,4 | 36,1 | 36,3 | 36,8 | 36,6 | 36,5     | 36,3 | 36,1 | 36,0 | 36,2 | 36,4 |  |
| 28               | 53000 | 36,5 | 36,1 | 36,2 | 36,7 | 36,5 | 36,5 | 36,4     | 36,6 | 36,2 | 36,1 | 36,2 | 36,4 | Тоже+1/2 ф. черн.  |
| 29               | 52800 | 36,6 | 36,5 | 36,3 | 36,3 | 36,7 | 36,6 | 36,7     | 36,7 | 36,8 | 36,3 | 36,2 | 36,2 |  |
| 30               | 53400 | 36,1 | 36,3 | 36,2 | 36,3 | 36,6 | 36,2 | 36,6     | 36,4 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,1 |  |
| 31               | 53800 | 36,3 | 36,4 | 36,3 | 36,8 | 36,4 | 36,5 | 36,3     | 36,2 | 36,3 | 36,2 | 36,3 | 36,7 |  |
| 1/ix             | 54100 | 36,4 | 36,3 | 36,2 | 36,3 | 36,6 | 36,4 | 36,4     | 36,5 | 36,3 | 36,1 | 36,2 | 36,6 | Ще. варгала. 2 ман.<br>каш. 1000 кс. молока.<br>1 ф. бн. + 1/2 ф. черн.  |
| 2                | 51200 | 36,5 | 36,2 | 36,5 | 36,7 | 36,6 | 36,4 | 36,3     | 36,1 | 36,2 | 36,1 | 36,4 |      |  |
| 3                | 54200 | 36,2 | 36,4 | 36,3 | 36,5 | 36,6 | 36,4 | 36,3     | 36,5 | —    | —    | 36,2 | 36,3 |  |
| 4                | 55000 | 36,6 |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |

**Вывод.** По продолжительности лихорадки основной волны случай средний (лихорадка до 18-го дня болезни), а по тесноте тяжелой. Ход температуры, тифозное состояние, опухоль селезенки, розовый, обложенный язык, понос, словом всё явления, кроме пени, говорящие за брюшную тиф. Явления бронхита до 17-го дня; бульон в мочь до 10-го дня—сады. Реакция Эрлиха в мочь до 16-го дня. Падение во всё съ 9-го до 18-го дня болезни=5700 грам. или 10%. Понос до 22 дня. Безлихорадочный промежуток в полном смысле слова, так как высшая температура за это время была 37,4 и при 2-х часовом заб-

Объективные и субъективные явления.

вс. 1 р. и у. 1 р. жидко. Ч. у. 1600 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1.007, 6. итв  
вчер 2 р. и утр. жидко. Ч. у. 1200 кс. Головной боли итв. головокружени  
вчер 2 р. и утр. 1 р. видт жидкой кашицы желто. Ч. у. 1200 кс. М. 2400 кс.  
Уд. в. 1.008, 6. итв.  
вчер 1 р. и утр. 1 р. видт густой кашицы желто. Ч. утр. 1200, вech. 1600 кс.  
Головокружени итв. М. 4100 кс. Уд. в. 1.006, 6. итв.  
2 р. утр. таковы же. Ч. утр. 1600, вech. 1200 кс. М. 3600 кс.  
Уд. в. 1.005, 6. итв.  
вчер 2 р. таковы же. Ч. у. 1600 кс. Потя ночью. М. 3000 кс. Уд. в. 1003,  
5. итв.  
вчер 1 р. и утр. 1 р. таковы же. Ч. у. 1200 кс. М. 3300 кс. Уд. в. 1.007,  
6. итв.  
не было. Ч. у. 1200 кс. М. 3600 кс. Уд. в. 1.005, 6. итв.  
вчер 1 р. и утр. 1 р. оформлено, желто. Ч. у. 1200 кс. Селез. на 1/2 нааца,  
тверд. М. 3300 кс. Уд. в. 1.007, 6. итв.  
1 р. утр. таковы же. Ч. у. 1200 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1.008, 6. итв.  
вчер 1 р. и утр. 1 р. таковы же. Ч. у. 1200 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1.006,  
6. итв.  
1 р. утр. таковы же. Ч. у. 1200 кс. М. 3300 кс. Уд. в. 1.006, 6. итв.  
вчер 1 р. таковы же. Ч. у. 1200 кс. Моча утрена.  
вч. 1 р. таковы же. Ч. у. 1200 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1.007, 6. итв.  
вч. 1 р. и утр. 1 р. таковы же. Ч. у. 1200 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1.008,  
6. итв.  
1 р. утр. таковы же. Ч. у. 1200 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1.009, 6. итв.  
1 р. утр. таковы же. Ч. у. 1200 кс. Селез. только вь боковомь подем.—край.  
вчер 1 р. таковы же. Ч. у. 1200 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1.005, 6. итв.  
вчер 1 р. и утр. 1 р. таковы же. Ч. у. 1200 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1.009,  
6. итв.  
вчер 1 р. таковы же. Ч. у. 1200 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1.007, 6. итв.  
вчер 1 р. и утр. 1 р. таковы же. Ч. у. 1200 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1.006,  
6. итв.  
не было. Ч. у. 1200 кс. Селез. промучать не удается. М. 3900 кс. Уд. в.  
1.006, 6. итв.  
1 р. утр. форм. и хорошо окрамено. Ч. у. 1600 кс. М. 3300 кс. Уд. в.  
1.006, 6. итв.  
1 р. утр. таковы же. Ч. у. 1200 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1.009, 6. итв.  
вчер 1 р. и утр. 1 р. таковы же. Ч. у. 1200 кс. М. 3200 кс. Уд. в. 1.010,  
5. итв.  
вчер 1 р. и утр. 1 р. таковы же. Ч. у. 1200 кс. Выписан: со стороым вну-  
тренних органов изменений не замтено.

и ей круглые сутая, продолжался 31 день, съ 19-го дня болъза  
до 49-го. Въ первые восемь дней его существовала еще опу-  
селезенки, постепенно уменьшавшаяся до полной невозможности  
душать ее; всё большого падатъ и дошеат до 48200 г. т. е. е  
ря за эти 8 дней равна 5,7%. Затъмъ съ 27-го дня болъза  
начало медленно и равномерно, а потомъ скачками въсь по-  
дета и къ 49 дню достигаетъ 53400 грам. т. е. прибл  
=10,7%. Все идетъ хорошо и лишь конспенция испражне-  
вылетает; не смотря на такой сравнительно долгий срокъ без-  
рабочного промежутка испражнени и на 49-ый день болъзни,

хотя и оформлено, но желтого цвета, а на 50 день болезни становится кашцеобразным, изменяя цвет свой в темный. В этот день начинается и возврат болезни. За возврат брюшного тифа говорят: лестницеобразное повышение температуры, поная опухоль селезенки, обложенный язык, понос. Последний появился на 4-й день возврата, а опухоль селезенки на 2-ой день возврата.

Продолжительность возврата, если судить о ней по обычной кривой (запись температуры в 8-мь утр. и 6-ть вечера), равна 10-ти дням; если же судить о ней по взвѣрѣнью чрезъ два часа круглые сутки, то продолжительность возврата равна 14 днямъ. Первые сутки дня возврата вѣсь собственно остается безъ перемѣны, если не считать подъема на 600 грам. на 2-ой день возврата, затѣмъ въ слѣдующіе шесть дней вѣсь падаетъ на 1600 грам. или на 3%. По прекращеніи лихорадки на обычной кривой температуры падаетъ пять дней на 1000 грам. или на 2%. Общая потеря вѣса за возвратъ 4,9%. (2600 грам). Общая же потеря за первую основную волну 15,1%. Прибыль вѣсь послѣ возврата къ 83 дню болезни, начавшаяся тотчасъ по полномъ прекращеніи лихорадки, равна 4300 грам. или 8,5%. Общая же прибыль вѣсь равна 6800 грам. или 14,%.  
 Крестьянинъ Петръ Гру—въ, 18 лѣтъ, поступилъ въ больницу 3/IV 93 г. на 6 день болезни съ жалобою на головную боль, общую слабость, отсутствіе аппетита, поносъ. № приемаго журн. 2650. Въ анамнезѣ никакихъ заболеванийъ.

3. Хорошаго тѣлоположенія и питанія. Сильное тифозное состояніе. Обложенный по краямъ языкъ; конецъ его чистъ. Кожа чиста. При перкуссии груди заглушенія звука нѣтъ. Подъ обоими нижними углами лопатокъ среднепузырчатые хрипы, дыханіе здѣсь жесткое; въ остальныхъ же мѣстахъ дыханіе везикулярное съ выдохомъ и кое-гдѣ свисты высокіе. Сердечная тупость въ предѣлахъ нормы. Тоны чисты. Селезеночная тупость съ 8 ребра. Ни печени, ни селезенку прощупать не удается. Верхняя граница печени нормальная. Пища: 1200 к. с. молока.

4. Тѣ же явленія. Съ трудомъ отвѣчаетъ на вопросы. М. Уд. в. 1,025, бѣлка незначит. количество. Стулъ вчера 3 раза жидко, Пища: 1200 к. с. мол.

5. 61200. Перемѣлъ нѣтъ. Стулъ жидко 4 раза. Мочится подъ себя. Пища: 1200 к. с. молока.

6. 60700. Стулъ вчера 3 раза и утр. 2 р. жидко. Ч. не пилъ. Хриповъ подъ углами лопатокъ меньше. Мочился подъ себя.

7. 59700. Стулъ только вечеромъ 1 р. жидко. Ч. по 200 к. с. Объективно то же, но самочувствіе лучше. М. 1400 к. с. Уд. в. 1,027; бѣлка порядочно; р. по Эрлангу положительная.

Дано 1700 к. с. молока.

8. 59100. Стулъ вчера 2 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. не пилъ. М. 850 к. с. Уд. в. 1,027; б. порядочно, р. по Эрлангу положительная.

9. 59300. Стулъ только утр. 1 р. жидко. Ч. не пилъ. Тифозное состояніе выражено слабѣе. На вопросы отвѣчаетъ свободно. Хриповъ подъ нижними углами лопатокъ еще меньше, отдѣльные же свисты въ груди по прежнему; дыханіе везикулярное съ выдохомъ вездѣ. Слабость сильная. М. 700 к. с. Уд. в. 1,028, бѣлка порядочно, р. по Эрл. положительная.

10. 58400. Стула не было. Ч. по 400 к. с. М. 600 к. с. Уд. в. 1,027; б. незначит. колич., р. по Эрл. положит.

11. 58800. Стулъ вчера 1 р. жидко. Ч. по 400 к. с. М. 500 к. с. Уд. в. 1,027; б. незначит. количество; р. по Эрлангу положительная.

12. 57300. Стулъ вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 к. с. Хриповъ подъ углами лопатокъ еще меньше. М. 1400 к. с. Уд. в. 1,028 бѣлка незначит., р. по Эрл. положит.

13. 57300. Стулъ вчера вечеромъ 1 р. жидко. Тифозное состояніе выражено порядочно. По всей груди разбросанные отдѣльные высокіе свисты; отдѣльные среднепуз. хрипы подъ углами лопатокъ. М. 500 к. с. Уд. в. 1,027; б. незнач. кол., р. по Эрл. слабая положительная.

14. 56800. Стула не было. Ч. по 400 к. с. М. 700 к. с. Уд. в. 1,025, бѣлка незначит. кол., р. по Эрл. отрицательная. Дано: молока 2250 к. с. Ежедневно утр. и вечер. ванна 28°.

15. 56000. Стулъ 1 р. утр. жидко. Ч. по 400 к. с. Тифозное состояніе выражено слабо. *Позывъ на пишу.* М. 1500 к. с. Уд. в. 1,018, б. незначит. количество.

16. 55700. Стула не было. Ч. утр. 400 к. с. и вечеромъ 800 к. с. Пота не было. Аппетитъ больше. М. 2100 к. с. Уд. в. 1,011; бѣл. незначит. количество.

17. 54900. Стула не было. Ч. утр. и вечер. по 800 к. с. Въ груди кое-гдѣ высокіе свисты при везикулярномъ дыханіи съ выдохомъ. М. 1700 к. с. Уд. в. 1,014; б. незначит. колич.

Давалось: молока 2250 к. с. Утр. и вечер. ванна 28°.

18. 55800. Стула не было. Ч. утр. 800 и вечер. 400 к. М. 2300 к. с. Уд. в. 1,011; б. слѣды.

19. 54000. Стулѣ 2 р. ночью жидко (веч. дано Ol. Ricini. 15 grт Ч. по 800 к. с. М. 1600 к. с. Уд. в. 1,011; была слѣды.

1 ванна 28° вечер.

20. 54700. Стулѣ 1 р. вчера вечер. жидко. Ч. по 1200 к. утр. и вечеромъ. *Глибозаго состоянія нѣтъ*, Небольшая голо-

ная боль. М. 1700 к. с. Уд. в. 1,010; б. слѣды. Т-ра въ 8 ч. вечер. 38,1 и въ 12 ночи 38,1.

21. 54700. Стулѣ вечер. жидко. Ч. по 1200 к. с. утр. и вечер. Общая разбитость. М. 2900 к, с. Уд. в. 1007; б. нѣтъ. Т-ра въ 1 ч. ночи 37,6.

Давалось: бульонъ съ яичномъ, 2500 к. с. молока. Безъ ваннъ.

| Число<br>ислѣд. | Вѣсь  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | И И Ц А |  |                                       |
|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--|---------------------------------------|
|                 |       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |         |  |                                       |
| 22/iv           | 54500 | 37,2 | —    | 38,6 | 38,1 | 37,9 | 37,7 | 38,4 | 38,8 | 38,2 | 37,9 | 37,4 | 37,2 |         |  | Бульонъ, 1 литр<br>2500 кс. молока    |
| 23              | 54800 | 36,6 | 37,0 | 38,4 | 38,3 | 37,7 | 37,4 | 37,4 | 37,3 | 37,2 | 37,2 | 37,1 | 37,1 |         |  |                                       |
| 24              | 53500 | 37,1 | 37,2 | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 37,2 | 37,2 | 37,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,0 |         |  |                                       |
| 25              | 54400 | 37,5 | 37,3 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,0 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | 36,7 | 36,5 | 36,8 |         |  |                                       |
| 26              | 53800 | 36,5 | 36,3 | 36,7 | 36,9 | 36,4 | 36,4 | 36,9 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,5 | 36,4 |         |  | Супъ, безъ мас.<br>кс. мол. мал. в.   |
| 27              | 53200 | 36,2 | 36,9 | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 36,4 | 36,8 | 36,5 | 36,3 | 36,4 | 36,4 | 36,5 |         |  |                                       |
| 28              | 53200 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 37,2 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,4 | 36,3 | 36,2 |         |  | Супъ, безъ мас.<br>кс. мол. 2 мал. в. |
| 29              | 54400 | 36,5 | 36,7 | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,5 | 37,5 | 37,3 | 37,5 | 37,4 | 37,0 | 36,6 |         |  |                                       |
| 30              | 54100 | 36,8 | 37,2 | 37,2 | 37,1 | 37,8 | 38,2 | 38,5 | 38,2 | 38,6 | 37,2 | 37,3 | 37,2 |         |  |                                       |
| 1/v             | 54000 | 37,3 | 37,5 | 37,2 | 37,5 | 38,1 | 39,2 | 39,4 | 39,6 | 39,9 | 39,2 | 38,7 | 37,2 |         |  |                                       |
| 2               | 54400 | 37,6 | 37,6 | 38,1 | 38,6 | 39,3 | 39,5 | 39,2 | 39,3 | 39,9 | 39,0 | 38,3 | 37,9 |         |  |                                       |
| 3               | 54400 | 37,9 | 38,0 | 38,3 | 39,5 | 39,3 | 39,6 | 39,3 | 39,2 | 39,5 | 39,3 | 38,7 | 38,6 |         |  |                                       |
| 4               | 54400 | 38,0 | 38,2 | 38,4 | 39,5 | 39,7 | 39,5 | 39,7 | 39,6 | 39,0 | 38,3 | 38,9 | 38,8 |         |  |                                       |
| 5               | 54000 | 38,2 | 37,8 | 38,0 | 38,4 | 39,6 | 39,7 | 39,5 | 39,3 | 39,0 | 38,9 | 39,0 | 38,0 |         |  |                                       |
| 6               | 53900 | 37,7 | 37,4 | 38,0 | 39,4 | 40,0 | 39,6 | 39,2 | 39,0 | 38,5 | 39,0 | 38,9 | 37,6 |         |  |                                       |
| 7               | 53900 | 37,8 | 36,8 | 39,0 | 38,6 | 38,9 | 39,1 | 38,8 | 38,3 | 38,9 | 38,9 | 38,2 | —    |         |  |                                       |
| 8               | 53500 | 36,9 | 36,5 | 37,0 | 37,6 | 39,3 | 39,2 | 38,9 | 38,9 | 38,6 | 38,8 | 37,5 | 37,4 |         |  |                                       |
| 9               | 53900 | 37,0 | 37,1 | 37,5 | 38,3 | 39,1 | 38,8 | 38,7 | 38,1 | 38,0 | 37,5 | 37,3 | 37,3 |         |  |                                       |
| 10              | 53400 | 36,9 | 36,8 | 37,3 | 38,5 | 38,8 | 38,9 | 38,7 | 38,0 | 37,7 | 37,6 | 38,0 | 37,2 |         |  |                                       |
| 11              | 53400 | 36,9 | 36,5 | 36,9 | 38,3 | 38,8 | 38,9 | 38,1 | 38,0 | 37,8 | 37,2 | 37,4 | 37,0 |         |  |                                       |
| 12              | 53300 | 36,5 | 36,5 | 36,9 | 37,4 | 37,3 | 37,6 | 38,0 | 38,1 | 38,0 | 37,7 | 37,0 | 36,9 |         |  |                                       |
| 13              | 53000 | 36,2 | 36,2 | 36,5 | 36,8 | 37,4 | 37,5 | 37,6 | 37,6 | 37,5 | 37,2 | 37,2 | 36,6 |         |  |                                       |
| 14              | 53500 | 36,4 | 36,2 | 36,5 | 36,1 | 36,5 | 36,5 | 36,6 | 36,2 | 36,5 | 36,6 | 36,6 | 36,0 |         |  |                                       |
| 15              | 53100 | 36,4 | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 36,5 | 36,2 | 36,5 | 36,6 | 36,5 | 36,4 | 36,4 | 36,5 |         |  | Бульонъ, 2500 кс.<br>кисель.          |

Бульонъ, 2500 кс. молока. 2 — 3 ложки жидка вперемѣш.

Объективными и субъективными явленіи.

Стула не было. Ч. по 1200 кс. Слаб. порядкомъ. Яв. слегка о'лож. Селез. туп. съ 9-го ребра, селез. не прощупывается. М. 3300 кс. Уд. в. 1,009, б. нѣтъ.  
 • не было. Ч. утр. 1200 кс. и веч. 400 кс. М. 2600 кс. Уд. в. 1,009, б. нѣтъ.  
 • Дано Ol Ricini 3г  
 • только днемъ 2 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. М. утеряна.  
 • только утр. 1 разъ жидко. Ч. по 800 кс. Уд. в. 1,009, б. нѣтъ, лишь отдѣл. слѣды посятъ отъшны. М. 2200 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.  
 • 1 р. утр. жидко. Ч. по 800 кс. М. 2900 кс. Уд. в. 1,008, б. нѣтъ.  
 • 1 р. утр. жидко тугъ. М. Ч. по 800 кс. Кроетъ облож. въ над. пол. яз., да небол. слаб. нѣж. друг. на ам. М. 2400 кс. Уд. в. 1,008, б. нѣтъ.  
 • не было. Ч. утр. 1200 кс. и веч. 800 кс. Языкъ чистъ. М. 2800 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.  
 • 1 р. вчера днемъ такъ же. Ч. по 1200 кс. Небольш. головокруженіе.  
 • 1 р. вч. дн. такъ же. Ч. утр. 1200 кс. веч. 800 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.  
 • 1 р. утр. жидко жидкой каш. Ч. по 800 кс. Яв. слегка облож. Голос. и шумъ въ ушахъ. М. 3000 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ.  
 • 1 р. вч. дн. такъ же. Ч. утр. 800 и веч. 1200 кс. Тоже. Пота не было. М. 3300 кс. Уд. в. 1,010, б. нѣтъ.  
 • 1 р. вч. дн. такъ же. Ч. по 1200 кс. Яв. обложень. М. 2900 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.  
 • Бѣл. голови. болъ. Сел. въ пролг. М. 2800 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.  
 • не было. Ч. по 800 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ. Тяже живота.  
 • 1 р. веч. вчера такъ же. Ч. по 400 кс. Селез. туп. съ 8-го межребрія. М. 3200 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.  
 • 1 р. вч. дн. жидко. Ч. утр. 800 кс. веч. 1200 кс. При перв. вздох. край селъ въ бокъ. пол. М. 1800 кс. Уд. в. 1,009, б. нѣтъ.  
 • вч. дн. 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 800 кс. Тоже, слг. среднелуга, хрипы свѣдъ полая уга. Явн. лог. М. 2600 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ. р. по Эрл насыщ. нѣтъ съ красн. отъшкыю.  
 • вч. дн. 1 р. жидко. Ч. по 1200. Пота не было. М. 4000 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ. р. по Эрл. такая же.  
 • только утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 800 кс. веч. 1200 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ. р. по Эрл. отъшнелая.  
 • 1 р. утр. жидко. Ч. утр. 1200 кс. веч. 1600 кс. Сел. прощ. неуд. М. 3400 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.  
 • 1 р. утр. жидко. ч. утр. 1200 кс., веч. 1600 кс. Хрип. въ гр. нѣтъ. М. 3600 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.  
 • не было. Ч. утр. 1600 кс. и веч. 1200 кс. М. 3460 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ. Пота не было.  
 • 1 р. утр. жидко. Ч. утр. 1200 кс. и веч. 1600 кс. Головной болъ нѣтъ. Головокруженіе. М. 4800 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.  
 • не было. Ч. утр. 1600 кс., веч. 2000 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ.  
 • вч. дн. 1 р. жидко. Ч. утр. 1200 кс., веч. 2000 кс. Самочух. хор., лишь небол. шумъ въ ушахъ при встав. Слегка облож. яз. Селез. туп. съ 9 ребра. М. 4200 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.

| Число<br>месц. | Всех  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | П И Ш А.   |   |
|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|
|                |       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |  |   |
| 16ч            | 52900 | 36,2 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,3 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,5 | 36,3   | Тоже.   |
| 17             | 53300 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,1 | 36,0   |   |
| 18             | 54100 | 36,2 | 36,2 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0   | Булавъ, ман. каша,<br>2500 кс. мол.           |
| 19             | 53600 | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 36,4 | 36,3 | 36,7 | 36,5 | 36,3 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,3   | Супъ, 2250 кс. молока,<br>2 ман. каша.        |
| 20             | 53900 | 36,4 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,1 | 36,2 | 36,1 | 36,4 | 36,2 |  |   |
| 21             | 54100 | 36,3 | 36,2 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | 36,5 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,3 |  |   |
| 22             | 54100 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,3 | 36,7 | 36,7 | 36,5 | 36,3 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2   | Тоже + 1 б. безъ кор.                         |
| 23             | 55100 | 36,3 | 36,2 | 36,2 | 36,5 | 36,9 | 36,7 | 36,4 | 36,3 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | Супъ, 1/2 котл., 2 ман.<br>каши, 1250 кс. мол.,<br>бузма безъ корки. |   |
| 24             | 54800 | 36,3 | 36,3 | 36,5 | 37,0 | 36,9 | 36,9 | 36,7 | 36,3 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,6 | Супъ, котл., 2 ман. каша,<br>1000 кс. мол., 1/2 ф. б.                |   |
| 25             | 55400 | 36,3 | 36,2 | 36,6 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,2 | 36,2 | 36,0 | 36,8 |  |   |
| 26             | 55100 | 36,4 | 36,4 | 36,7 | 36,5 | 36,6 | 36,8 | 36,3 | 36,2 | 36,4 | 36,2 | 37,0 |      |  | Тоже + 1/2 ф. бульо.                          |
| 27             | 55800 | 36,7 | 36,7 | 37,2 | 37,1 | 36,9 | 36,6 | 36,5 | 36,2 | 36,3 | 36,2 | 36,3 |      |  | Тоже.   |
| 28             | 55600 | 36,5 | 36,5 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 36,6 | 36,8 | 36,6 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  | Тоже + 1/2 ф. чери.                           |
| 29             | 56100 | 36,9 | 36,5 | 36,8 | 36,7 | 36,9 | 36,5 | 36,8 | 36,4 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,9 |  |   |
| 30             | 56500 | 36,5 | 36,4 | 37,0 | 36,9 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,3 | 36,6   |   |
| 31             | 57000 | 36,5 | 36,6 | 36,6 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,2 | 36,2 | 36,5 | 36,2 | 36,7 |  |   |
| 1/чт           | 57800 | 36,5 | 36,6 | 36,9 | 37,0 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,7 |  |   |
| 2              | 57800 | 36,5 | 36,5 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,5 | 36,6 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,4 |  | Тоже + еще 1/2 ф. чери.                       |
| 3              | 58100 | 36,6 | 36,3 | 36,8 | 36,6 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | 36,4 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,7 |  | Ща, котл., макароны,<br>1 ф. бульо. + 1 чери. |
| 4              | 58500 | 36,7 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,5 | 36,8 | 36,8 | 36,5 | 36,4 | 36,4 | 37,0 |      |  |   |
| 5              | 58600 | 36,6 | 36,6 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | 36,6 | 36,7 | 36,6 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,8 |  |   |
| 6              | 58500 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,1 | 36,6 |  |   |
| 7              | 59000 | 36,8 | 36,7 | 37,0 | 36,9 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |

**Вывод.** Какъ по продолжительности лихорадки — до 25 дня болъзни, такъ и клиническа случай зотъ относится къ тяжклымъ. Ходъ температуры, вначалъ сильное тифозное состояние, постепенно ослабшающее до полного исчезанія, обложенный языкъ, поносъ, вотъ явленія, говорящая въ данномъ случаѣ за тифъ. Не было розеолъ, не прощупывалась ни печени, ни селезенка. Поносъ существовалъ до 29 дня болъзни, явленія бронхита до 28; бульокъ въ ночь сначала въ порядочномъ количествѣ, а затѣмъ въ незначительномъ до 23 дня болъзни, реакція Эрлиха до 16 дня. Паденіе вѣса съ 8 дня болъзни до 25 дня равно 6700 гтп. или 10,9%. Высшая температура конца лихорадки, полученная при двухчасовомъ измѣреніи, не совпадаетъ два дня съ высшею температурою обычной кривой (запись въ 8 ч. утра и 6 часовъ вечера).

Объективныя и субъективныя явленія.

- > вч. ди. 1 р. жидко. Ч. по 2000 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1,005 б. ить.
- > вч. вч. 1 р. и утр. 1 р. ввздъ мягкой каш. Ч. по 2000 кс. Изъ часть. Жалобъ никакихъ. М. 4600 кс. Уд. в. 1,004, б. ить.
- > не было. Ч. утр. 2000 кс. и вч. 2400 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,005, б. ить. Головокруженіе при попыткѣ ходить.
- > вч. 1 р. жидко. Ч. по 2000 кс. М. 4700 кс. Уд. в. 1,005, б. ить.
- > вч. 1 р. и утр. 1 р. ввздъ густ. каш. Ч. утр. 2000 кс. и вч. 2400 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,005, б. ить.
- > не было. Ч. утр. 2400 кс. и вч. 2000 кс. Головокр. ить. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005, б. ить.
- > вч. 2 р. на пол. оформл., желт. цв. Ч. по 2000 кс. М. 5300 кс. Уд. в. 1,005, б. ить.
- > вч. ди. 1 р. оформл., цв. галны. Ч. по 2000 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,005, б. и.
- > вч. ди. 1 р. не жидко. Ч. по 2000 кс. М. 4900 кс. Уд. в. 1,004, б. ить.
- > вч. ди. 1 р. не жидко. Ч. утр. 2000 кс. и вч. 2400 кс. М. 5600 кс. Уд. в. 1,004, б. ить.
- > 1 р. вч. вчера не жидко. Ч. по 2000 кс. Моча утерана.
- > вч. 1 р. не жидко, хор. окраш. Ч. по 2000 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,005, б. и.
- > 1 р. вч. не жидко. Ч. утр. 2000 кс. и вч. 2400 кс. М. 5500 кс. Уд. в. 1,004, б. ить.
- > вч. 1 р. и у. 1 р. не жидко. Ч. по 2400 кс. М. 3600 кс. Уд. в. 1,007 б. и.
- > вч. 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. утр. 1600 кс. и вч. 2400 кс. М. 5000 кс. Уд. в. 1,005, б. ить.
- > вч. вч. 1 р. не жидко. Ч. 2400 кс. М. 5100 кс. Уд. в. 1,004, б. ить.
- > вч. ди. 2 р. не жидко. Ч. утр. 2400 кс. и вч. 2800 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,005, б. ить.
- > вч. 2 р. не жидко. Ч. утр. 2800 кс. и вч. 2400 кс. М. 5400 кс. Уд. в. 1,004, б. ить.
- > вч. 2 р. не жидко. Ч. по 2400 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,005, б. ить.
- > вч. ди. 2 р. не жидко. Ч. по 2400 кс. М. 6000 кс. Уд. в. 1,004, б. ить.
- > вч. ди. 1 р. не жидко. Ч. утр. 2400 кс. и вч. 2000 кс. М. 5000 кс. Уд. в. 1,005 б. ить.
- > вч. ди. 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. утр. 2000 кс. и вч. 2400 кс. М. 5100 кс. Уд. в. 1,005, б. ить.
- > вч. 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. утр. 2400 кс. Со стороны внутреннихъ органовъ никакихъ измѣненій. Силы хороши. Выпис. и отпущенъ днѣмъ.

Сузя по обычной кривой, безлихорадочный промежутокъ продолжался семь дней (отъ 26 до 32 дня болъзни); продолжительность же его при двухчасовомъ измѣреніи температуры равна 6 днямъ, такъ какъ на 26 день болъзни высшая температура была 38,4 (12 часовъ дня), а не 37,4, какъ на обычной кривой. Три первые дня этого промежутка существуетъ поносъ, два первые дня остатки бронхита; затѣмъ исчезаетъ и то, и другое. Испраженіе становится кашнеобразно-густо. Языкъ становится чистымъ. Больномъ все это время не позволялось даже садиться въ кровати, кромѣ естественныхъ надобностей. Вѣсъ первые 6 дней въ общемъ падаетъ на 1300 гтп. или на 2,4%, на 7 день (32 день болъзни) вѣсъ подымается на 1200 или на 2,3%. Субъективно же за все это время лишь легкое головокруженіе. На 33 день болъзни

начинается возврат, который продолжается тринадцать дней по обычной кривой, а при двухчасовом намерении температуры четырнадцать дней. Температура поднимается эфтиниеобразно и ибьет в дальнейшем течении ремитирующей тип. Со второго дня возврата начинается понос и язык становится снова обложенным. На седьмой день возврата прочувывается селезенка и так до 10 дня. На восьмой день явления бронхита, держащаяся до 11 дня. Субъективно небольшая головная боль и головокружение. Первые 5 дней вьсь, строго говоря, остается без перемен: держится съ колебаниями на 300—400 гтм. на той цифрѣ, которую достигъ къ 32 дню болъзни (54400). Затѣмъ въ слѣдующіе восемь дней падаетъ на 1100 гтм. или на 2%. По прекращеніи лихорадки возврата падаетъ еще четыре дня на 400 гтм. или на 0,8%. Слѣд. общая потеря за всю болъзнь равна 8300 гтм. или 13,6%. Съ 49 дня вьсь поднимается и къ 71 дню прибылъ = 6100 гтм: или 11,5%.

Мѣшанинъ Владимиръ Р—въ, 19 лѣтъ, поступилъ въ больницу 30/V 92 г. на 8 день заболѣванія съ жалобой на знобъ и головную боль. № пр. журн. 4349. 30/V (8). Высокого роста. Хорошаго тѣлосложения и питанія. Порядочное тифозное состояніе. Языкъ обложенъ. На груди и животѣ отдѣльные розеола. При перкуссии груди звукъ ясный. Дыханіе везикулярное съ выдохомъ. Серд. тугоупъ въ предѣлахъ нормы. Тоны чисты. Селезенка твердая, почти на 2 пальца. Урчаніе въ правой подвздошной. 31 и 1/V Тѣже явленія. Ночью бредъ. Стулъ по 1 р. жидко. М. уд. в. 1,017 бѣлка незначит. количество. Молока 600 к. с.

2. Стулъ 2 р. жидко. Розеола нѣтъ. Бреда нѣтъ. Молока 1200 к. с.

| Число<br>вѣсна. | Вѣсь. | П И Ц А. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-----------------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                 |       | 8        | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |   |
| 17 (v)          | 56700 | 36,5     | —    | —    | 36,1 | 36,7 | 37,2 | 37,8 | 38,0 | 38,9 | 38,3 | 36,8 | 36,7 | Бульонъ, 500 к. мол.<br>3 яйца, 2 манн. кашн.     |
| 18              | 56300 | 36,4     | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,5 | 37,1 | 37,0 | 37,2 | 37,3 | 36,4 | 36,0 | 36,0 |   |
| 19              | 56200 | 36,0     | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,4 | 37,0 | 36,5 | 36,0 | 36,1 | 36,6 | 36,3 | 36,6 |   |
| 20              | 55800 | 36,0     | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,3 | 36,0 | 36,3 | 36,1 | 36,0 | 36,2 | 36,3 | 36,3 |   |
| 21              | 55300 | 36,3     | 36,0 | 36,1 | 36,4 | 36,7 | 36,5 | 36,7 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,1 | Стулъ, 2 яйца, 600 кс.<br>мол. 1 бул. безъ корки. |
| 22              | 55500 | 36,0     | 36,8 | 36,2 | 36,2 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | Стулъ, котл., 2 ман.<br>кашн, 1/2 ф. бѣл.         |
| 23              | 55900 | 36,0     | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,7 | 37,0 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |   |
| 24              | 55500 | 36,0     | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,5 | 36,3 | 37,3 | 37,6 | 36,0 | 36,2 | 36,1 | 36,0 |   |

- С. 3. 62400. Стулъ 1 р. жидко. Селезенка тверда на 2 пальца. М. 1000 к. с. Уд. в. 1,014, бѣлка незначит. кол. и 4 тѣже явленія. Стулъ 2 р. жидко. 1600 к. с. молока.
5. 61500. Стулъ 2 р. жидко. Небольшое тиф. состояніе. Потъ подъ утро. М. 700 к. с. Уд. в. 1,015, б. незначит. количество и 6. Потъ подъ утро. Стулъ 1 р. жидко.
7. 60600. Стулъ 1 р. жидко. М. 1000 к. с. Уд. в. 1,015 б. незначит. количество и 8 Стулъ 2 р. жидко. Въ груди кое-дѣ свисты при везикул. дыханіи. 2 ваши 28°.
9. 60000. Стулъ 1 р. жидко. Тифозное состояніе выражено слабо. М. 1800 к. с. Уд. в. 1,010 бѣлка незначит. колич. Позывъ на пищу.
10. 59500. Стулъ вчера днемъ 1 р. и утр. 1 р. жидко. М. 2300 к. с. Уд. в. 1,009, бѣлка незначит. колич.
11. 59100. Стулъ вчера днемъ 1 р. жидко. Тифознаго состоянія и головной боли нѣтъ. Свистовъ въ груди нѣтъ. М. 1800 к. с. Уд. в. 1,010 бѣлка незначит. колич.
12. 58700. Стулъ вчера днемъ 1 р. и утр. 1 р. жидко. М. 2100 к. с. Уд. в. 1,010 б. нѣтъ. 1000 к. с. молока, манн. каша, кисель.
13. 58400. Стулъ вчера днемъ 1 р. и утр. 1 р. жидко. М. 2300 к. с. Уд. в. 1,008 б. нѣтъ.
14. 58200. Стулъ вчера 1 р. и утр. 1 р. жидко. Потъ подъ утро. 600 к. с. молока, 3 яйца, 2 манн. кашн.
15. 57700. Стулъ только утр. 1 р., жидко. Языкъ обложенъ меньше. М. 2300 к. с. Уд. в. 1,008 б. нѣтъ.
16. 57200. Стулъ только утр. 1 р. жидко. Потъ ночью. М. 2800 к. с. Уд. в. 1,008 б. нѣтъ. Бульонъ, 400 мол., 3 яйца, 2 кашн. 1 ванна 28° вечер.

Объективными и субъективными явленія.

- Стулъ 1 р. кашиниеобразно. Языкъ слегка обложенъ. Селез. тверда выдается на 2 пальца. М. 2600 к. Уд. в. 1,008, б. нѣтъ.
- » вчера 1 р. тамъ же. М. 2400 кс. Уд. в. 1,008, б. нѣтъ.
- » вчера 1 р. не жидко—оформлено. Селезенка на 1 1/2 пальца, тверда. Потъ утромъ. М. 2400 кс. Уд. в. 1,008, б. нѣтъ.
- » вчера вечер. 1 р. не жидко. М. 2300 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.
- » вчера 1 р. и утр. 1 р. не жидко. М. 2800 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ.
- » вчера днемъ 1 р. не жидко. Языкъ слегка обложенъ въ задней половинѣ. М. 2500 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.
- » вчера днемъ 1 р. не жидко. Селезенка мягче, выдается на 1 палецъ. М. 2400 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.
- » только утр. 1 р. не жидко. М. 2300 кс. Уд. в. 1,009, б. нѣтъ.

| Число<br>дней. | Въск. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | II III A.                               |
|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                |       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |   |
| 25             | 55300 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,6 | 36,2 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,0 | Тоже.                                   |
| 26             | 54700 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,5 | 36,4 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,6 | 36,5 | 36,5 |   |
| 27             | 54700 | 36,5 | 36,5 | 36,0 | 36,4 | 36,9 | 36,5 | 36,8 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,5 |   |
| 28             | 54900 | 36,4 | 36,5 | 36,3 | 36,6 | 37,8 | 37,7 | 38,3 | 38,3 | 38,1 | 36,9 | 37,1 | 36,3 |   |
| 29             | 54500 | 36,5 | 36,0 | 36,5 | 36,0 | 37,0 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,2 | 36,5 | Суть, 600 кс. молока,                   |
| 30             | 54600 | 36,5 | 36,6 | 36,5 | 36,6 | 37,5 | 38,5 | 38,9 | 39,0 | 38,8 | 36,4 | 37,9 | 37,7 | 2 м. п., 1 б. безъ и.                   |
| 1/VII          | 54300 | 37,5 | 37,6 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 39,0 | 39,5 | 39,0 | 39,5 | 39,0 | 38,6 | 38,4 | 1200 кс. мол., кашн.                    |
| 2              | 54200 | 38,0 | 37,5 | 38,4 | 39,5 | 39,5 | 38,5 | 39,7 | 39,9 | 39,5 | 39,0 | 39,4 | 39,2 | паша, кисель.                           |
| 3              | 54400 | 38,5 | 38,8 | 39,0 | 39,7 | 41,5 | 40,8 | 39,9 | 40,0 | 39,0 | 39,4 | 39,2 | 38,5 |   |
| 4              | 54400 | 39,0 | 39,0 | 39,5 | 39,5 | 40,0 | 40,0 | 40,2 | 38,7 | 39,1 | 39,6 | 39,5 | 39,5 | 1600 кс., молока.                       |
| 5              | 54100 | 39,0 | 39,0 | 39,3 | 39,5 | 40,0 | 39,7 | 39,0 | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 37,7 | 39,3 |   |
| 6              | 53600 | 38,2 | 38,5 | 39,1 | 39,9 | 40,3 | 39,3 | 39,5 | 39,3 | 38,3 | 38,2 | 39,1 | 39,0 |   |
| 7              | 52900 | 38,4 | 38,8 | 38,6 | 39,5 | 39,5 | 38,7 | 39,2 | 39,5 | 39,5 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 1700 кс. молока,                        |
| 8              | 52100 | 38,9 | 39,0 | 38,7 | 39,0 | 39,6 | 38,4 | 39,8 | 39,7 | 39,0 | 38,5 | 39,0 | 39,0 |   |
| 9              | 51900 | 38,8 | 38,7 | 38,5 | 38,9 | 38,4 | 38,6 | 39,0 | 38,8 | 37,2 | 37,5 | 38,1 | 37,7 |   |
| 10             | 51300 | 37,6 | 38,4 | 38,3 | 39,0 | 39,4 | 39,0 | 39,1 | 38,9 | 39,0 | 38,4 | 37,3 | 37,2 |   |
| 11             | 51000 | 37,5 | 37,8 | 37,3 | 37,5 | 37,0 | 37,5 | 37,6 | 37,9 | 37,7 | 36,8 | 37,3 | 38,5 |   |
| 12             | 50700 | 37,8 | —    | 36,4 | 36,7 | 36,6 | 37,0 | 37,1 | 37,3 | 37,0 | 36,1 | 36,3 | 36,5 |   |
| 13             | 50500 | 36,6 | 36,6 | 36,3 | 36,6 | 36,6 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | Бульон, 1200 кс. м.                     |
| 14             | 50300 | 36,0 | 36,5 | 36,1 | 36,8 | 36,3 | 36,2 | 36,4 | 36,0 | 36,6 | 36,6 | 36,4 | —    | кисель.                                 |
| 15             | 50900 | 36,3 | 36,6 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,2 | 36,1 | Бул., 600 кс. мол. 2 м.                 |
| 16             | 50000 | 36,1 | 36,9 | 36,1 | 36,5 | 36,6 | 36,5 | 36,0 | 36,8 | 36,5 | 36,3 | 36,8 | 36,5 | каши, 2 яйца.                           |
| 17             | 49800 | 36,7 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,3 | 36,8 | 36,2 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | Тоже + 1 б. безъ кор.                   |
| 18             | 50000 | 36,0 | 36,2 | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 36,1 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,0 | 36,4 | Суть, 600 кс. молока,                   |
| 19             | 50700 | 36,0 | 36,8 | 36,9 | 36,7 | 36,1 | 36,8 | 36,4 | 36,2 | 36,7 | 36,6 | 36,0 | 36,4 | 2 каша, 1/3 ф. бульона.                 |
| 20             | 51000 | 36,5 | 36,9 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,2 | 36,5 |      |      |      |      |      | Суть, кл., 2 ман. кашн, 1/3 ф. бульона. |

*Вывод.* По продолжительности лихорадки основной волны случай этот относится к тяжелым. За броншной тифз говорили всё явления: ходъ температуры, розеола, опухоль селезенки, тифозное состояние, съ бредомъ на 9 и 10 день болѣзны, поносъ. Явления

## Объективные и субъективные явления.

- 1 р. вчера днем не жидко. М. 2400 кс. Уд. в. 1,006, 6. ить.
- 1 р. утром не жидко. Языкъ чистъ. М. 3000 кс. Уд. в. 1,005, 6. ить.
- 1 р. утр. не жидко. Селезенка при лежаніи на спинѣ—кряб, а въ боковомъ положеніи на 1 палецъ, тверда.
- 1 р. утр. не жидко. Тоже. Температура вновь. М. 2900 кс. Уд. в. 1,007, 6. ить.
- 1 р. утр. не жидко. Языкъ весь обложенъ желтобѣлымъ налетомъ. Селезенка языкъ 27/ст. М. 3300 кс. Уд. в. 1,007, 6. ить.
- 1 р. утр. не жидко. Селезенка при лежаніи на спинѣ на 1 палецъ, тверда. М. 3000 кс. Уд. в. 1,005, 6. ить.
- вч. 1 р. и утр. 1 р. кашн. Паша къ утру. М. 3600 кс. Уд. в. 1,007, 6. ить.
- вч. 1 р. кашн. М. 3600 кс. Уд. в. 1,009, 6. ить.
- 1 р. утр. кашн. Яз. слегка обл. блѣвъ налетъ. На кожѣ груди спереди 5 розеола. Селез. на 1 1/2 пал., тверда. М. 2800 кс. Уд. в. 1,010, 6. ить.
- 1 р. утр. жидко. М. 1600 кс. Уд. в. 1,012, 6. ить. Небольшое тифозное сост.; головная боль, отсутствіе аппетита. Розеола на груди и животѣ.
- 1 р. вч. жидко. М. 900 кс. Уд. в. 1,016, 6. ить. Небольшое тифозное сост.; головная боль, отсутствіе аппетита. Розеола на груди и животѣ.
- вч. 1 р. и утр. 1 р. жидко. Тифозное состояніе выражено слабо. Селезенка тверда, слегка бол., на 2 мм. М. 400 кс. Уд. в. 1,015, 6. ить.
- вч. 2 р. жидко. Поносъ на лицу. М. 500 кс. Уд. в. 1,013, 6. ить. не было. Розеола блѣдная. Селезенка на 2 пальца, не болѣзненна. М. 1700 кс. Уд. в. 1,009, 6. ить.
- 1 р. вечеромъ жидко. Розеола почти ить (очень блѣдная). М. 1002 кс. Уд. в. 1,008, 6. ить.
- 1 р. утр. жидко. Розеола ить. Языкъ чистъ. Тифознаго состоянія ить. М. 1600 кс. Уд. в. 1,600 кс. Уд. в. 1,007, 6. слѣды.
- 1 р. утромъ жидко. Селезенка на 1 1/2 пальца. М. 2200 кс. Уд. в. 1,008, 6. слѣды.
- вч. 1 р. вечеромъ 1 р. жидко. М. 2700 кс. Уд. в. 1,005, 6. ить. Головной. боли ить.
- 1 р. утр. кашн. Языкъ чистъ. М. 2000 кс. Уд. в. 1,005, 6. ить.
- 1 р. вч. вечеромъ кашн. обр. густо. Селезенка на 1 палецъ тверда. М. 3500 кс. Уд. в. 1,005, 6. ить.
- 1 р. утромъ и вч. густой кашн. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005, 6. ить.
- 1 р. вч. вечеромъ и 1 р. утромъ таковы же. Селезенка меньше, чѣмъ на 1 палецъ. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005, 6. ить.
- 1 р. вч. вестер. обр. М. 3000 кс. Уд. в. 1,006, 6. ить.
- 1 р. вечеромъ таковы же. М. 3500 кс. Уд. в. 1,006, 6. ить.
- вч. 1 р. и утромъ 1 р. таковы же. Селезенка на 1/2 пальца, тверда. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005, 6. ить.
- Съ 20/чн. паденіе температуры было превращено въ дѣйствіе появленія хазерныхъ бѣлыхъ и невозможности хорошаго извѣренія температуры ночью. Наростаніе въ вѣсѣ было таково: 51000, 51200, 51400, 52000, 52400, 52400, 53200, 53800, 53600, 53400, 53500, 54000, 55000, 55300, 55200, 55400, 55400. Больной постепенно былъ переведенъ на твердую съмѣшанную пишу. Изъ объективныхъ явленій—только селезенка, которая и въ день выписки была 3/4чн. прощупывалась на 1/2 пальца. Количество мочи колебалось отъ 3600 до 4000 кс. Уд. в. 1,007—1006, 6. не было

бронхита были отъ 16 до 20 дня. Бѣлокъ въ мочѣ отъ 9 до 20 дня въ незначительномъ количествѣ. Паденіе вѣса съ 12 дня болѣзны и до 24 дня равно 4700 или 7,5%. Если смотрѣть только на кривую, полученную записью температуры въ 8 часовъ утра и

6 часовъ вечера, то позволительно принять для безихорадочного промежутка между первую основною волною и 2 волною (возвратомъ) за 12 дней. Объективныя явленія за этотъ промежутокъ: очищение языка до полной его чистоты, уменьшающаяся опухоль селезенки, не жидкое испражнение, отсутствие бѣлка въ мочѣ, вплоть удлетворительное самочувствие больного; а рядомъ съ этимъ, не смотря на большіе приемы пищи, въся за эти 12 дней падаетъ на 3000 гтм. или на 5,2 %. По безихорадочной промежутку при двухчасовомъ измѣреніи температуры круглая сутки былъ не полнымъ, такъ какъ на 26 день болѣзни, когда обычная кривая т-ры показываетъ высшую цифру какъ 37,2, на самомъ дѣлѣ высшая т-ра въ 12 ночи этого дня=38,9°; также и на 33 день болѣзни высшая т-ра была 37,6 (10 час. вечера), а не 36,3, какъ это видимъ на обычной кривой.

За возвратъ брюшнаго тифа говорятъ: лѣстницеобразное повышение т-ры, увеличение существовавшей опухли селезенки, появленіе снова розеолъ на 6 день возврата, появленіе на 7 день поноса и тифознаго состоянія. Продолжительность возврата равна 15 днямъ (съ 37 до 51 дня болѣзни). Въ первые восемь дней возврата въся падаетъ медленно и потеря за это время=600 гтм. или 1,1%; въ слѣдующіе же семь дней въся тѣла падаетъ быстро и потеря въся=3400 гтм. или 6,2%. Но и по прекращеніи второй волны въся падаетъ еще въ теченіе 5 дней на 900 гтм. или 1,8%. Слѣдовательно общая потеря за обѣ волны равна 12600 гтм. или 20,2%. По прекращеніи 2 волны исчезаютъ всѣ бывшія явленія, кромѣ селезенки, прощупывавшейся и на 75 день болѣзни на  $\frac{1}{2}$  пальца. Прибыль въ въся равна 11,2%.

Крестьянинъ Федоръ Кур—нъ, 13 лѣтъ, поступилъ въ больницу 15—V 93 г. на 7 день болѣзни (первые два дня перемогался; пять дней лежалъ) головная боль, отсутствие аппетита, поносъ. № пр. журн. 4165. 15—V Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Сильное тифозное состояніе. Обложенный по краямъ языкъ; конецъ его чистъ. Кожа чиста. При перкусіи груди звукъ ясный. Дыханіе везикулярное. Серд. туность въ предѣлахъ нормы. Тоны чисты. Животъ вадутъ. Селезен. туность маскирована тимпанитомъ. Селезенка при покойномъ дыханіи на 1 палецъ, тверда. Печень тоже на 1 палецъ, тверда. 16—V. Тѣже явленія. М. Уд. в. 1,020 б. вѣтъ. Стулъ 2 р. жидко.

800 к. с. молока.

17—V. 28000. Стулъ 1 р. вчера днемъ жидко. Ч. не палъ. Утромъ небольшое носовое кровотеченіе.

18—V. 27100. Стулъ 1 р. вечер. вчера жидко. Ч. утр. 400 к. с. Вадутость живота меньше. М. 500 к. с. Уд. в. 1.024, б. незначит. количество р. по Эрл. положительная.

19—V. 27500. Стулъ вчера вечер. 1 р. и утромъ 1 р. жидко. Ч. по 400 к. с. Головная боль меньше.

1 ванна 28°.

20—V. 27100. Стулъ 1 р. ночью жидко. Ч. по 400 к. с. Селезенка на 2 пальца, тверда, при покойномъ дыханіи. М. Уд. в. 1,020 при 100 к. с., б. незнач. кол. р. по Эрлиху положит.

21—V. 27300. Стулъ 1 р. вчера вечер. жидко. Ч. по 400 к. с. Тифозное состояніе выражено слабо. Въ правомъ легкомъ отдѣльныя высокіе свисты и среднеузурчатые хрипы.

22—V. 27000. Стулъ 1 р. ночью жидко, Ч. по 400 к. с. М. 1100 к. с. Уд. в. 1,011, б. незначит. колич. р. по Эрлиху положит; но слабая. Свистовъ и хриповъ нѣсколько больше; есть и въ лѣвомъ легкомъ. Печень—край при глубокомъ вадохѣ.

23—V. 26500. Стулъ 1 р. вечер. и 1 р. ночью жидко. М. Уд. в. 1,010 при 800 к. с., б. незначит. колич., р. по Эрл. слабая положит.

24—V. 26500. Стулъ вчера вечер. 1 р. жидко. Ч. по 400 к. с. Небольшое тиф. состояніе. Селезенка тверда на 1 палецъ. Печень прощупать не удается. Свистовъ и хриповъ меньше; дыханіе везикулярное. М. Уд. в. 1,013 при 800 к. с., б. незначит. колич. р. по Эрл. слабая положительная.

Молока 1800 куб. сант.

25—V. 25700. Стулъ вчера 1 р. и утр. 2 р. жидко. Ч. по 400 к. с. М. Уд. в. 1,011 при 1000 к. с., б. незначит. колич., р. по Эрл. слабая положит. Т-ра въ 8 ч. вечер. 38,4, въ 10 ч. вечер. 38,8,

26—V. 26500. Стулъ 1 р. утр. жидко. Ч. по 400 к. с. Тиф. состояніе выражено слабо. Головокруженіе. Головной боли не чувствовать. М. Уд. в. 1,006 при 1200 к. с., б. слѣды, р. по Эрл. отрицательная.

Бульонъ и 1800 куб. молока.

По 2 ванны 28°.

| Число<br>вспаха. | Въск. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | П П Ц А.             |  |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|--|
|                  | 8     | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |                      |  |
| 27/у.            | 26400 | 39,3 | —    | —    | —    | 37,4 | 37,7 | 38,4 | 39,1 | 38,1 | 37,5 | 37,7 | Бузыль в 1800 кс. м. |  |
| 28               | 26000 | 39,2 | 39,4 | 38,4 | 37,8 | 37,3 | 37,5 | 37,8 | 37,7 | 38,0 | 37,8 | 37,2 | 38,2                 | Тоже + клесть.   |
| 29               | 26000 | 38,8 | 39,1 | 38,3 | 37,8 | 37,2 | 36,9 | 37,0 | 37,3 | 37,6 | 37,8 | 37,4 | 37,8                 |  |
| 30               | 25800 | 37,5 | 37,6 | 36,9 | 37,1 | 36,7 | 37,0 | 36,6 | 37,0 | 36,7 | 36,6 | 36,8 | —                    | Бузыль, 1 айно, клесть, 1700 кс. молк.                   |
| 31               | 25800 | 36,9 | 36,7 | 36,8 | 36,4 | 36,7 | 36,8 | 36,6 | 36,2 | 36,5 | 36,5 | 36,7 | 36,8                 |  |
| 1/у.             | 25500 | 36,9 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,0 | 36,7 | 37,0 | 36,5                 | 36,8   |
| 2                | 25800 | 36,2 | 36,4 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | 36,9 | 36,3 | 36,3 | 36,0 | 36,3 | 36,6                 | Суть, 2 айна, 2 ман. каша, 1000 кс. мол.                 |
| 3                | 25800 | 36,4 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,2 | 36,6 | 36,6 | 36,3 | 36,1 | 36,3 | 36,5 | 36,5                 | Тоже + 1 будка бей корки.                                |
| 4                | 26000 | 36,5 | 36,3 | 36,9 | 37,3 | 36,7 | 37,2 | 36,9 | 36,8 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,6                 |  |
| 5                | 26300 | 36,7 | 36,6 | 36,9 | 37,1 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 36,3 | 36,3 | 36,5 | 36,7                 | Суть, 1/2 ктл., 2 ман. каша, 1000 кс. мол. 1/2 ф. блага. |
| 6                | 26300 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 37,1 | 36,8 | 36,6 | 36,9 | 36,7 | 36,0 | 36,0 | 36,6 | 36,6                 |  |
| 7                | 26700 | 36,5 | 37,0 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 37,2 | 37,0 | 36,8 | 36,8 | 36,4 | 36,5 | 36,1                 | Суть, ктл., 2 ман. к., 800 кс. мол. 1/2 ф. б.            |
| 8                | 27400 | 36,9 | 36,9 | 37,0 | 37,2 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 36,2 | 36,2 | 36,6 | 36,8 | 37,2                 |  |
| 9                | 27100 | 36,7 | 36,4 | 36,8 | 37,3 | 37,0 | 37,3 | 37,3 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | 37,2                 | Суть, ктл., 2 н. и. н.                                   |
| 10               | 27300 | 37,2 | 37,5 | 37,0 | 37,8 | 37,5 | 37,9 | 37,7 | 37,5 | 37,0 | 37,1 | 37,2 | 37,1                 |  |
| 11               | 27100 | 37,5 | 37,7 | 37,8 | 38,0 | 38,0 | 38,5 | 38,6 | 38,3 | 37,2 | 37,8 | 37,2 | 37,6                 | Суть, ктл., 2 н. и. н.                                   |
| 12               | 27300 | 37,8 | 37,9 | 38,1 | 38,0 | 38,4 | 39,3 | 39,1 | 38,9 | 38,4 | 39,0 | 38,0 | 38,0                 |  |
| 13               | 27000 | 38,0 | 37,9 | 39,1 | 38,2 | 38,4 | 38,7 | 39,2 | 38,6 | 38,6 | 38,9 | 38,3 | 38,5                 | Суть, ктл., 2 н. и. н.                                   |
| 14               | 27100 | 38,2 | 38,3 | 38,2 | 38,4 | 38,4 | 39,0 | 38,0 | 38,1 | 37,8 | 37,5 | 37,4 | 37,2                 |  |
| 15               | 27000 | 37,3 | 37,8 | 37,6 | 38,0 | 37,5 | 37,7 | 38,3 | 37,8 | 37,0 | 36,4 | 36,9 | 37,0                 | Буз., клесть, 1800 кс. молка.                            |
| 16               | 26600 | 36,6 | 37,0 | 37,5 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 37,3 | 37,4 | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 37,0                 |  |
| 17               | 26800 | 36,7 | 37,1 | 37,2 | 37,0 | 36,9 | 37,3 | 37,3 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,8 | 36,6                 | Буз., клесть, 1800 кс. молка.                            |
| 18               | 27000 | 36,8 | 36,8 | 37,1 | 37,0 | 36,7 | 37,0 | 37,3 | 37,0 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,9                 |  |
| 19               | 26800 | 36,6 | 36,7 | 36,9 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 36,3 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 37,0                 | Буз., клесть, 1800 кс. молка.                            |
| 20               | 26800 | 36,3 | 36,7 | 37,0 | 36,8 | 37,2 | 36,7 | 36,5 | 36,0 | 36,0 | 36,4 | 36,4 | 37,1                 |  |
| 21               | 26900 | 36,4 | 36,8 | 37,1 | 37,1 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,5 | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 37,0                 | Буз., 2 айна, 2 м. к., 1200 кс. м. 1 ф. бей к.           |
| 22               | 27000 | 37,0 | 36,8 | 36,9 | 36,5 | 36,6 | 36,8 | 37,1 | 36,8 | 36,2 | 36,4 | 36,1 | 36,0                 |  |
| 23               | 27000 | 36,5 | 37,1 | 37,1 | 36,8 | 37,4 | 36,5 | 37,3 | 36,5 | 36,6 | 36,9 | 36,0 | 36,8                 | 1000 кс. м. 1 ф. бей к.                                  |
| 24               | 27200 | 36,5 | 36,6 | 37,2 | 37,4 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,4 | 36,2 | 36,1 | 36,0 | 36,5                 |  |
| 25               | 27400 | 36,9 | 36,7 | 37,3 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 36,2 | 36,8 | 37,8                 | Суть, 2 айна, 2 м. к., 1000 кс. м. 1/2 ф. б.             |
| 26               | 27400 | 36,6 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 36,7 | 37,0 | 36,8 | 36,7 | 36,2 | 36,0 | 36,4 | 36,0                 |  |
| 27               | 27800 | 36,6 | 37,1 | 36,9 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 36,9 | 36,3 | 36,8                 | Суть, 1/2 ктл., 2 м. к., 800 кс. м., 1 ф. б.             |
| 28               | 28200 | 36,9 | 37,0 | 37,0 | 37,3 | 37,1 | 36,0 | 36,0 | 36,8 | 36,2 | 36,2 | 36,3 | 36,1                 |  |
| 29               | 28200 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 37,0 | 36,5 | 36,9 | 36,9 | 36,6 | 36,0 | 36,0 | 36,5 | 36,5                 | Суть, козлет, 2 ман. каша, 400 кс. мол., 1 ф. бля.       |

| Объективными и субъективными явлениями.  |  |
|--|--|
| Студя 1 р. утр. жидко. Ч. по 400 кс. Твф. сост. нйтв. Яв. облож. Селез. на 1 палв. в. молж. на спивн. Вг. фр. следк. влаж. храни при веткух. дышани. М. 1600 кс. Уд. в. 1,008, 6 нйтв. | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 1 р. вечер и 1 р. утр. жидко. Ч. по 800 кс. М. 2200 кс. Уд. в. 1,007, 6 нйтв.</li> <li>&gt; не баша. Ч. утр. 400 кс. Селез.—прай гр. нйтв. М. 1800 кс. Уд. в. 1,005, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вч. днем 1 р. и утр. 1 р. ввидт гугт. каш. желт. нйтв. Ч. по 800 кс.</li> <li>&gt; утр. 2 кашн. (такимъ же). М. 2400 кс. Уд. в. 1,006, 6 нйтв. Ч. утр. 800 кс. и вечер. 1200 кс.</li> <li>&gt; вчра 1 р. и утр. 1 р. оформано желтоват. Ч. по 1200 кс. Селез. на 1/2 шампа вь положени на спивн. М. 2100 кс. Уд. в. 1,006, 6 нйтв.</li> <li>&gt; 1 р. вчра вечер не жидко. Ч. по 1200 кс. Селез.—прай гр. глуб. влохъ вь положени на спивн. М. 2600 кс. Уд. в. 1,005, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вчра 1 р. не жидко—оформлено и окранию вь тевний нйтв. Явмъ слетла обложени по краям. М. 2600 кс. Уд. в. 1,005, 6 нйтв. Ч. по 1200 кс.</li> <li>&gt; вчра веч. 1 р. и утр. 1 р. такимъ же. Ч. по 1200 кс. М. 3100 кс. Уд. в. 1,005, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вчра днем 1 р. и утр. 1 р. такимъ же. Ч. по 1200 кс. М. 2400 кс. Уд. в. 1,005, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вчра 1 р. и утр. 1 р. такимъ же. Ч. утр. 1200 и веч. 1600 кс. М. 3700 кс. Уд. в. 1,006, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вчра 1 р. и утр. 1 р. такимъ же. Ч. по 1600 кс. Явмъ чвста. Селезенна—прай вь положени на спивн. М. 3000 кс. Уд. в. 1,008, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вчра 1 р. и утр. 1 р. оформано желтоватое. Ч. по 1600 кс. М. 3300 кс. Уд. в. 1,005, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вчра 1 р. и утр. 1 р. такое же, какъ вчра. Ч. по 1600 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,004, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вч. 1 р. и утр. 1 р. так. же. Ч. по 2000 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,004, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вч. днем 1 р. и утр. 1 р. ввидт густой кашни—желтов. Ч. утр. 1600 кс. и вч. 2000 кс. Яв. сл. бдл. по краям. М. 5500 кс. Уд. в. 1,005, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вч. веч. 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 2000 кс. Жал. на б. вь подреб. Слаб. твф. сост. Селез. при покой. дмх. на 1/2 пал. гр. глуб. на 1 пал. Яв. каш. вч.</li> <li>&gt; вчра 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 2000 кс. Яв. облож. больша. Отсутствие анигата. М. 5000 кс. Уд. в. 1,006, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вчра 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 2000 кс. Твфон. сост. нйтв. Селез. при покой. дмхани на 1 палвм. М. 4500 кс. Уд. в. 1,006, 6 нйтв.</li> <li>&gt; веч. 1 р. и утр. 1 р. кашни. Ч. по 2000 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,005, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вчра 1 р. и утр. 1 р. маншворе. Ч. по 2000 кс. Потаг. нч. и сегодня дн. Яв. облож. только сзад. Селез. на 1/2 пал. тверда. М. 4700 кс. Уд. в. 1,004, 6 нйтв.</li> <li>&gt; только вчра 1 р. ввидт густой кашни. Ч. по 2000 кс. Ногт. нчюм. М. 4600 кс. Уд. в. 1,004, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вчра 1 р. и 1 р. Утр. такимъ же. Ч. по 1200 кс. М. 4100 кс. Уд. в. 1,005, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вчра 1 р. и утр. 1 р. такимъ же. Ч. по 2000 кс. Селез. — край вь положени на спивн. М. 4800 кс. Уд. в. 1,004, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вчра 1 р. и утр. 1 р. оформано желтоватое. Ч. по 2000 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,005, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вч. 1 р. и утр. 1 р. так. же. Ч. по 2000 кс. М. 4100 кс. Уд. в. 1,004, 6 нйтв.</li> <li>&gt; только утр. 1 р. такимъ же. Ч. по 2000 кс. М. 4700 кс. Уд. в. 1,005, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вч. 1 р. и утр. 1 р. Ч. по 2000 кс. Яв. чвста. М. 5100 кс. Уд. в. 1,004, 6 нйтв.</li> <li>&gt; только утр. 1 р. Ч. по 2000 кс. М. 4400 кс. Уд. в. 1,005, 6 нйтв.</li> <li>&gt; 1 р. утр. такимъ же. Ч. по 2000 кс. М. 4900 кс. Уд. в. 1,004, 6 нйтв.</li> <li>&gt; 1 р. утр. такимъ же. Ч. по 1600 кс. М. 4300 кс. Уд. в. 1,005, 6 нйтв.</li> <li>&gt; 1 р. веч. и 1 р. утр. так. же. Ч. по 2000 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,006, 6 нйтв.</li> <li>&gt; 1 р. веч. и 1 р. утр. оформано, нйтв. гавни. Селез. промучати не удаста. М. 3000 кс. Уд. в. 1,008, 6 нйтв.</li> <li>&gt; вч. 1 р. и утр. 1 р. так. же. Ч. по 2000 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,007, 6 нйтв.</li> </ul> |

| Число<br>месяца | Въс.  | П И Ц А. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 |       | 8        | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |
| 30/VI           | 28600 | 36,8     | 37,0 | 36,8 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 36,7 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,4 | Тож. |
| 1/VII           | 28700 | 36,2     | 37,1 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 36,5 | 36,2 | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 36,3 |      |
| 2               | 29400 | 36,8     | 37,1 | 36,7 | 36,9 | 37,0 | 37,2 | 36,4 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,8 |      |
| 3               | 29400 | 37,0     | 36,6 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 36,8 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 37,3 | 37,1 |      |
| 4               | 29100 | 37,1     | 37,1 | 37,1 | 37,3 | 37,2 | 37,2 | 36,8 | 36,5 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |      |
| 5               | 29400 | 37,1     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

**Вывод.** По продолжительности лихорадки до 21-го дня слух этот относится к средним; по клиническим же данным тяжелый. Для диагноза брюшного тифа были все данные; не хватает лишь розеолы. Пищеву во время лихорадки служило молоко 600—1800 куб. сант. Блок в мочу держался в незначительном количестве до 18-го дня; реакция Эриха до 17-го дня боляни. Понос до 20-го дня боляни. Потеря в весе с 9-го дня боляни до 21 дня равна 2000 грм или 7,1% Высшая температура конца лихорадки первой основной волны на 1 день не совпадает при двухчасовом измерении круглые сутки с высшей температурой обычной кривой. Безлихорадочный промежуток продолжался, судя по обычной кривой (запись т-ры в 8 ч. утра и 6 час. вечера), 11 дней; если же сравнить обычную кривую с кривую, полученную при двухчасовом измерении температуры, то продолжительность его равна 10-ти дням, так как на 22-ой день боляни высшая т-ра была 37,6, а не 37,5, как на обычной кривой. В эти 10 дней (с 23 до 32 дня) происходит очищение языка до полной его чистоты; уменьшение селезенки до того, что она стала прощупываться краем, а не на 1 палец, как раньше; в первые три дня происходит падение веса на 500 грам или на 1,9%; в следующие восемь дней вес поднимается и к 32 дню прибавил равна 1600 грам или 6,3%. Словом все идет хорошо и лишь изменение цвета испражнения, которое с вечера 25 до утра 30-го дня было оформлено и хорошо окрашено снова в желтый цвет вечером 30-го дня нарушает правильность хода выздоровления. На 33-й день боляни наступает возврат брюшного тифа, продолжающийся 6 дней—до 38 дня боляни. Температура поднимается лестинцеобразно, язык становится снова обложенным, увеличивается опухоль селезенки до прощупывания ее на 1 палец; на третий и четвертый дни возврата имеется тифозное состояние; с 3-го дня и до 6-го дня понос. С поя-

Объективные и субъективные явления.

- > вчера 1 р. оформлено и хорошо окрашено. Ч. 2000 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1,006, 6. втв.
  - > только вчера днем 1 р. такая же. Ч. утр. 1600 кс. и вечер. 2000 кс. М. 3500 кс. Уд. в. 1,006, 6. втв.
  - > 1 р. утр. таж. же. Ч. утр. 1600 и веч. 2000 кс. М. 3500 кс. Уд. в. 1,006, 6. втв.
  - > не было. Ч. по 2000 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1,006, 6. втв.
  - > вчера 1 р. днем и 1 р. утр. Ч. по 1600 кс. М. 3000 кс. Уд. в. 1,006, 6. втв.
- Выводы: со стороны внутренних органов никаких изменений.

влияемь возврата и в течении его вес, то поднимаясь на 200—300 грам, то падая на 200—300 грам в общем за все 6 дней падает на 100 грам или 0,4%. По прекращении лихорадки возврата вес падает еще один день на 400 грам или на 1,5%. Следов. общая потеря веса под влиянием возврата = 1,8%, тогда как общая потеря за первую основную волну = 8,9%. С 40 дня боляни вес снова подымается и к 58 дню прибавил послѣ возврата равн. 2800 или 10,5%. Общая же прибавь в весе равн. 3900 грам или 15,3%,

Мышаннъ Иванъ Л.—на, 22 лѣтъ, поступилъ въ больницу 2/IV 93 г. на 8 день заболѣванія, съ жалобою на головную боль, слабость, поносъ. № пр. журн. 2578.

2/IV. 38,5—38,3. Высокого роста. Хорошаго тѣлосложенія. Подкожный жирный слой развитъ умеренно. Небольшо тифозное состояніе. Обложенный по краямъ языкъ; конецъ его чистъ. На кожѣ живота и груди розеола въ порядочномъ количествѣ. Животъ нѣсколько вздутъ. При перкусіи груди звукъ всяю ясный. Дыханіе везикулярное съ выдохомъ. Серд. тупость въ предѣлахъ нормъ. Тоны чисты. Gargoulement въ правой подвздошной. Селезеночная тупость съ 8 ребра. Верхняя граница печени не изменена. Ни пупъ, ни селезенку прощупать не удается. 3/IV. 38,3—39,6. Тѣ же явленія. М. Уд. в. 1,020, 6. слѣды.

4. 38,6—39,4. 67000. Стулъ 1 р. утр. жидко. Розеола блѣдная. Носовое небольшое кровотеченіе ночью. М. Уд. в. 1,020 при 500 к. с.; 6. слѣды, р. по Эрл. положит.

5. 38,5—39,4. 66400. Стулъ 1 р. утр. жидко. Розеола нѣтъ. Небольшое носовое кровотеченіе утромъ. М. Уд. в. 1,020, при 500 к. с.; 6. слѣды, р. по Эрл. положит.

6. 38,4—39,6. 67000. Стулъ вчера днемъ 3 р. и утр. 1 р.

жидко. М. Уд. в. 1,022 при 500 к. с.; б. слѣды, р. по Эрл. положит.

7. 38,8—39,8. 66000. Стулъ 1 р. вчера вечер. и 1 р. утр. жидко. Ч. только утр. 400 к. с. *Кое-что въ груди от-дельные свисты при везикулярномъ дыханіи съ выдохомъ.* М. 1200 к. с. Уд. в. 1,018; б. нѣтъ, р. по Эрл. слабая положительная.

Давалось: 1700 к. с. молока. Ванна 28° вечер.

8. 38,3—39,0. 65400. Стулъ вчера вечер. 1 р. жидко. Ч. только утр. 800 к. с. М. 2300 к. с. Уд. в. 1,013; б. нѣтъ, р. по Эрл. положит. Дано 2200 к. с. молока. Ванна 28° вечер.

9. 38,8—39,4. 64800. Стулъ вчера 2 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 400 к. с. Потъ утромъ. Позывъ на пишу довольно сильный. М. 1000 к. с. Уд. в. 1,014; б. нѣтъ, р. по Эрл. слабая полож. Дано: 2500 к. с. молока. Ванна 28° вечер.

| Число мя-са. | Вѣсъ. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | П И Ц А.                                    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|              |       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |   |
| 14           | 62900 | 37,3 | —    | 37,7 | 38,3 | 38,4 | 39,0 | 39,0 | 38,3 | 38,2 | 36,4 | 36,7 | 37,7 | Бульонъ, 1 яйцо, 3000 кс. мол. Тоже—кисель. |
| 15           | 62300 | 37,4 | 37,7 | 38,0 | 38,0 | 38,1 | 38,7 | 38,4 | 37,8 | 37,7 | 37,3 | 37,7 | 37,8 |   |
| 16           | 62500 | 36,5 | 36,8 | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 38,5 | 38,1 | 38,0 | 37,9 | 37,9 | 37,1 | 36,8 |   |
| 17           | 62300 | 37,0 | 36,5 | 37,2 | 37,3 | 37,8 | 38,8 | 38,9 | 37,9 | 37,5 | 36,9 | 37,2 | 37,0 |   |
| 18           | 62400 | 37,0 | 36,5 | 37,3 | 37,4 | 37,6 | 37,5 | 38,0 | 37,9 | 38,3 | 38,1 | 37,5 | 36,8 | Буз., вис., ман. каша, 3000 кс. мол.        |
| 19           | 62100 | 36,7 | 36,8 | 37,1 | 37,2 | 37,0 | 38,3 | 38,4 | 38,1 | 37,2 | 37,4 | 36,3 | 37,2 |   |
| 20           | 62100 | 36,4 | 36,8 | 37,2 | 37,1 | 37,4 | 37,8 | 38,2 | 38,0 | 37,3 | 36,9 | 37,3 | 36,7 | Бульонъ 3000 кс. Уд. в. 3 манья каша.       |
| 21           | 62500 | 37,0 | 36,3 | 37,1 | 37,1 | 37,2 | 37,4 | 37,9 | 37,7 | 37,8 | 37,1 | 36,8 | 36,5 |   |
| 22           | 62400 | 36,2 | 36,1 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 37,4 | 36,8 | 36,6 | 36,7 | 36,4 | 37,2 |   |
| 23           | 62100 | 36,2 | 36,0 | 36,5 | 36,6 | 36,8 | 36,5 | 37,0 | 36,8 | 36,2 | 36,1 | 36,4 | 36,8 |   |
| 24           | 62500 | 36,6 | 37,1 | 37,6 | 38,2 | 38,1 | 39,5 | 38,6 | 38,4 | 37,2 | 37,4 | 37,3 | 36,9 | Супъ 3000 кс. мол. 2 ман. каша.             |
| 25           | 62600 | 36,9 | 37,4 | 37,8 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 37,9 | 38,4 | 38,0 | 38,8 | 37,3 | 37,0 |   |
| 26           | 62300 | 37,0 | 36,3 | 37,4 | 37,0 | 37,6 | 37,7 | 38,0 | 37,5 | 37,2 | 37,0 | 36,9 | 36,7 |   |
| 27           | 62600 | 36,4 | 36,4 | 36,7 | 36,5 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 36,8 | 36,5 | 36,2 | 36,4 | 36,8 |   |
| 28           | 63000 | 36,6 | 36,4 | 36,8 | 37,1 | 36,9 | 37,1 | 37,2 | 37,2 | 37,3 | 36,7 | 36,0 | 36,9 |   |
| 29           | 63000 | 36,5 | 36,6 | 37,2 | 37,1 | 37,2 | 37,0 | 36,7 | 36,3 | 36,2 | 36,2 | 36,3 | 37,0 |   |
| 30           | 62800 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 37,1 | 37,0 | 36,6 | 36,4 | 36,8 | 36,7 | 36,1 | 36,6 | Супъ, 1/2 ктл., 2 м. в. 2700 кс. мол.       |
| 1/3          | 63700 | 36,6 | 36,4 | 36,5 | 36,9 | 37,0 | 36,8 | 36,8 | 36,5 | 36,4 | 36,5 | 36,4 | 37,0 | Супъ, ктл. 2 ман. в. 2200 кс. мол.          |
| 2            | 62500 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 36,9 | 36,4 | 37,2 | 36,0 | 36,2 | 36,7 |   |
| 3            | 62700 | 36,6 | 36,6 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 37,0 | 36,6 | 36,8 | 36,6 | 36,1 | 36,2 | 36,4 | Тоже—1 б. безъ кор.                         |

10. 38,4—39,4. 63800. Стулъ вчера 2 р. жидко. Ч. утр. 800 к. с., вечер. 400 к. с. Пота не было. М. 1600 к. с. Уд. в. 1,015; б. нѣтъ, р. по Эрл. слабая положит. Дано: бульонъ, 1 яйцо, 2700 к. с. молока. Ванна 28° вечер.

11. 37,5—39,7. 64200. Стулъ вчера днемъ 2 р. жидко. Ч. утр. 800 к. с., вечер. 400 к. с. *Свистовъ въ груди не замѣтно.* М. 3000 к. с. Уд. в. 1,010; б. нѣтъ, р. по Эрл. отрицательная.

12. 38,4—39,2. 63600. Стулъ вчера вечер. 1 р. жидко. Ч. по 800 к. с. Потъ ночью сильный. Головная боль значительно меньше. М. 3900 к. с. Уд. в. 1,010; б. нѣтъ.

13. 37,8—38,3. 63000. Стулъ вчера днемъ 2 р. жидко. Ч. утр. 400 к. с., вечер. 800 к. с. Тифознаго состоянія почти нѣтъ. М. 3400 к. с. Уд. в. 1,010; б. нѣтъ.

Дано: бульонъ, 1 яйцо, 3000 к. с. мол. Ванна 28° вечер.

Объективными и субъективными явленія.

Стулъ 1 р. вч. вѣч. жидко. Ч. по 800 кс. Тѣл. состояніе нѣтъ. На слегка обложен. Слезъ не промучивается. Въ легкихъ везикулъ дыханіе. Тоны чисты. М. 3600 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.

- » 1 р. вечер. вчера жидко. Ч. утр. 800 кс. и вѣч. 1200 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1,009, б. нѣтъ. Головокруженіе.
- » 1 р. утр. кашнеобразно. Ч. по 1200 кс. М. 3600 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.
- » 1 р. вечер. вчера в 1 р. утр. кашнеобразно. Ч. по 1200 кс. М. 3700 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.
- » вч 1 р. вѣч. и 2 р. у. жидко. Ч. по 1200 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ.
- » вч. днемъ 1 р. и 2 р. жидко. Ч. по 1200 кс. М. 2900 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.
- » вч. дн. 3 р. жидко. Ч. по 1200 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.
- » вчера 1 р. с. утр. 1 р. вѣздъ густой кашни. Ч. утр. 1200 кс. и вѣч. 1600 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.
- » вчера 1 р. и утр. 1 р. тапкин же. Ч. утр. 1600 кс. и вѣч. 2000 кс. М. 4900 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.
- » вчера 1 р. и утр. 1 р. оформлено желтое. Ч. утр. 1600 кс. и вечер. 1200 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.
- » вчера днемъ 1 р. оформлено, в 2-ой р. вѣздъ жидкой кашни. Ч. утр. 1600 кс. вѣч. 800 кс. М. 3900 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ.
- » вчера 2 р. дн и утр. 1 р. вѣздъ жидкой кашни. Ч. утр. 1600 кс. и вѣч. 1200 кс. М. 3800 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ.
- » вчера дн. 2 р. кашнеобразно и утр. 2 р. жидко. Ч. по 2000 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.
- » вчера днемъ 2 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. утр. 2000 кс. и вечер. 1200 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.
- » вчера 1 р. и утр. 2 р. кашнеобразно, Ч. по 200 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,009, б. нѣтъ.
- » вчера. дн. 1 р. и утр. 1 р. кашнеобразно. Ч. утр. 2400 кс. и вѣч. 2000 кс. Головокруж. нѣтъ. М. 5500 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ.
- » вч. дн. 2 р. кашнеобразно, густо. Ч. по 2000 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣтъ.
- » вчера 2 р. дн. и 1 р. утр. тапкин же. Ч. по 2000 кс. М. 4400 Уд. в. 1,005, б. нѣтъ.
- » вч. днемъ 1 р. и утр. 1 р. оформлено. Ч. по 2000 кс. Только слегка обложен. языкъ. М. 4100 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣтъ.

| Число<br>ящика. | Въс.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         | П И Ц А.  |
|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|---|
|                 |       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6                       |   |
| 4               | 62300 | 36,3 | 36,4 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 36,8 | 36,6 | 36,3 | 36,0 | 36,1 | 36,6                    | Супп, котл., 2 м. кашн.   |
| 5               | 62500 | 36,5 | 36,3 | 36,6 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 36,7 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 2200 кс. мол., 1/2 бля. |   |
| 6               | 63500 | 36,5 | 36,3 | 36,6 | 37,0 | 36,9 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,3 | 36,3 | 36,5 | 36,9                    | Супп, котл., 2 м. кашн.<br>1700 кс. мол., 1 ф. бля.               |
| 7               | 64400 | 36,7 | 36,9 | 37,1 | 37,3 | 37,3 | 37,7 | 37,7 | 38,1 | 38,4 | 38,4 | 38,1 | 37,4                    |   |
| 8               | 64300 | 37,1 | 37,3 | 37,7 | 38,6 | 38,9 | 39,5 | 39,3 | 38,5 | 38,4 | 38,7 | 39,0 | 38,8                    | Буд., 1 айно, 3000<br>кс. молока, кисель.                         |
| 9               | 65000 | 38,5 | 38,6 | 38,9 | 38,9 | 39,2 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,1 | 39,2 | 39,4                    |   |
| 10              | 65300 | 38,7 | 39,1 | 39,4 | 39,4 | 39,6 | 39,8 | 39,4 | 39,6 | 40,0 | 39,3 | 39,0 | 39,4                    |   |
| 11              | 65700 | 39,3 | 39,6 | 39,5 | 39,1 | 39,0 | 40,0 | 39,3 | 39,2 | 38,4 | 38,0 | 38,6 | 39,5                    |   |
| 12              | 65800 | 38,7 | 38,2 | 37,8 | 38,5 | 38,9 | 39,1 | 39,3 | 38,7 | 38,0 | 38,3 | 38,6 | 38,5                    |   |
| 13              | 66300 | 38,0 | 37,6 | 37,7 | 37,8 | 38,3 | 38,2 | 38,1 | 38,0 | 37,6 | 37,5 | 37,7 | 37,6                    | Бульон, 3000 кс. мол.,<br>кисель.                                 |
| 14              | 66100 | 37,5 | 37,1 | 37,2 | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 37,1 | 36,8 | 36,6 | 36,7 | 36,4 | 36,8                    |   |
| 15              | 65800 | 36,4 | 36,5 | 36,5 | 36,6 | 36,5 | 36,6 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0                    |   |
| 16              | 65500 | 36,2 | 36,2 | 36,3 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 36,4                    | 3000 кс. мол., 1 айно,<br>1 манн. каша.                           |
| 17              | 66000 | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 36,5 | 36,6 | 36,7 | 36,4 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,2 | 36,2                    |   |
| 18              | 65500 | 36,3 | 36,1 | 36,4 | 36,5 | 36,5 | 36,4 | 36,3 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,4                    | 3000 кс. м., 2 м. кашн.<br>Супп, 2 айно, 2 кашн,<br>1600 кс. мол. |
| 19              | 65800 | 36,0 | 36,1 | 36,3 | 36,5 | 36,6 | 36,6 | 36,4 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,3                    |   |
| 20              | 64700 | 36,1 | 36,2 | 36,4 | 36,4 | 36,5 | 36,3 | 36,2 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,4                    | Тоже+1 б. безъ кор.   |
| 21              | 64700 | 36,1 | 36,3 | 36,4 | 36,3 | 36,4 | 36,4 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 36,4                    | Супп, котл., 2 м. кашн,<br>1000 кс. м., 1 б. безъ к.              |
| 22              | 64700 | 36,5 | 36,5 | 36,8 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,6 | 37,5 | 37,5 | 37,0 | 36,8                    |   |
| 23              | 65000 | 36,8 | 36,3 | 36,7 | 36,9 | 37,0 | 36,9 | 37,0 | 36,9 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,6                    | Супп, котл., 2 м. кашн,<br>1 ф. бляго.                            |
| 24              | 64500 | 36,2 | 36,2 | 36,3 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,6 | 36,5 | 36,0 | 36,2 | 36,7                    | Тоже+1/2 ф. чер.  |
| 25              | 64400 | 36,0 | 36,2 | 36,5 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,1 | 36,2 | 36,1                    | Тоже+1/2 ф. черн.   |
| 26              | 64900 | 36,4 | 36,3 | 36,6 | 36,8 | 36,9 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,5 | 36,4 | 36,3 | 37,2                    |   |
| 27              | 65300 | 36,6 | 36,7 | 37,0 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 36,9 | 36,7 | 36,4 | 36,0 | 36,0 | 36,4                    | Тоже.   |
| 28              | 66000 | 36,5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |   |

**Вывод.** По продолжительности лихорадки основной волны до 26 дня болѣзни этотъ случай относится къ тяжелымъ, по клиническому же течению это былъ средний случай брышного тифа, имѣвшій для своего діагноза все кромѣ процнупываемой нечени и селезенки. Поносъ продолжался до 26 дня болѣзни. Слѣды бѣлыя въ мочѣ были до 12 дня болѣзни; реакція Эрлиха въ мочѣ до 16 дня

Объективные и субъективные явленія.

- 1 р. утр. таинъ же желтое. Ч. по 2400 кс. М. 5800 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣт.
- вчера днемъ 1 р. и утр. 1 р. таинъ же. Ч. по 2400 кс. М. 5000 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣт.
- вчера днемъ 1 р. и утр. 1 р. таинъ же. Ч. утр. 2400 кс. и веч. 2000 кс. М. 4900 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣт.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. таинъ же. Ч. по 2400 кс. М. 4500 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣт.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. таинъ же. Ч. утр. 2400, веч. 1600 кс. М. 4500 кс. Уд. в. 1,009, б. нѣт.
- 1 р. утр. жидко. Ч. утр. 2400, веч. 1600 кс. Тяжесть въ области подреберій. М. 3400 кс. Уд. в. 1,017, б. нѣт.
- 1 р. утр. жидко. Ч. утр. 2000, веч. 1200 кс. Головная боль. М. 3400 кс. Уд. в. 1,012, б. нѣт.
- вч. дн. 2 р., ночью 1 р. и у. 1 р. жидко. Ч. только утр. 1200 кс. Языкъ обл. вѣс. Аннет. нѣт. М. 3900 кс. Уд. в. 1,006, б. нѣт.
- вч. 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. у. 1200, в. 400 кс. Голови. боль меньше. Головор. М. 1200 кс. Уд. в. 1,010, б. незнач. под.
- вч. 1 р. днемъ и 1 р. утр. жидко. Ч. у. 1200, в. 800 кс. М. 2800 кс. Уд. в. 1,010, б. незнач. колюч.
- вчера веч. 1 р. и утр. 1 р. жидко. Ч. по 1200 кс. М. 2500 кс. Уд. в. 1,009, б. незнач. колюч.
- вч. дн. 1 р. и у. 1 р. жидко. Ч. у. 2400, в. 2000 кс. Головной боли нѣт. Головоружение. М. 3200 кс. Уд. в. 1,005, б. слѣды.
- вч. 2 р. и у. 1 р. жидко. Ч. у. 2800, в. 2000 кс. Языкъ слегка обложенъ въ задней половинѣ. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣт.
- вч. веч. 1 р. и у. 1 р. жидко. Ч. утр. 2800, в. 1600 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣт.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. кашнеобразно. Ч. утр. 2800, веч. 2000 кс. Моча угтерана. Амстеть хороши.
- вчера 2 р. и утр. 1 р. таинъ же. Ч. по 2800 кс. М. 5800 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣт.
- 1 р. утр. оформлено. Ч. по 2800 кс. Головоружение нѣт. М. 6200 кс. Уд. в. 1,004, бляка нѣт.
- 1 р. утр. таинъ же. Ч. по 2800 кс. Языкъ чистъ. М. 6100 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣт.
- вч. веч. 1 р. и утр. 1 р. таинъ же. Ч. по 2800 кс. Селезен. туность съ 9-го ребра. М. 5100 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣт.
- вчера днемъ 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. у. 2800, в. 2400 кс. М. 7000 кс. Уд. в. 1,004, б. нѣт.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. утр. 2800, веч. 2400 кс. Моча угтерана.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. утр. 2800 кс, веч. 2400 кс. М. 4800 кс. Уд. в. 1,007, б. нѣт.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. утр. 2800 кс, веч. 2400 кс. М. 5100 кс. Уд. в. 1,005, б. нѣт.
- вчера 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. по 2400 кс. Выпалъ по собственному желанію: со стороны внутреннихъ органовъ никакихъ изменений не замѣтно.

болѣзни. Явленія бронхита отъ 13 до 16 дня болѣзни. Паденіе въ вѣсѣ съ 10 дня до 26 болѣзни равно 4900 гтп. или 7,3%. По прекращеніи лихорадки на обычной кривой температуры вѣсѣ падаетъ еще одинъ день на 600 гтп. или на 1%. Слѣдовательно общая потеря вѣсѣ равна 8,2%. Высшая температура конца лихорадки основной волны на обычной кривой температуры

три дня не совпадает с высшею температурою полученною при двухчасовом измерении ее круглые сутки. Через три дня по прекращении лихорадки основной волны на обычной кривой температуры наступает новая малая волна, длиющаяся три дня. Промежуток этот между основною волною лихорадки и первою маюю при двухчасовом измерении температуры круглые сутки оказывается равным двум дням, так как на 27 день болезни высшая температура была не 37,4 как на обычной кривой, а 37,9. Высшая температура последних двух дней этой малой волны не совпадает с высшею температурою обычной кривой: тогда как при двухчасовом измерении температуры высшими цифрами ее являются: 39,5; 38,8; 38; в это время на обычной кривой температуры 39,5; 38; 37,7.

В первые два с половиною дня промежутка (27, 28 и утро 29 дня) испражнение было кашнеобразно-густо; вечером 29 дня и весь 30 день оформлено, желтое; на 31 день болезни и на 2 день 1 малой волны оно становится жидким и остается таким до утра 34 дня болезни. Как в безлихорадочный промежуток, так и во время первой малой волны язык остается слегка обложенным, а субъективно головокружение. Всье большого со второго дня безлихорадочного промежутка и до второго дня 1 малой волны подымается на 1100 гтм. или на 1,7%. На третий день первой малой волны всье падает на 300 гтм. или на 0,4%.

Промежуток между этою первою маюю волною и возвратом болезни был в действительности безлихорадочным и продолжался десять дней. В продолжении его язык все время был слегка обложен; первые полтора дня стула был жидкий (33 и утро 34 дня); следующие четыре с половиною дня испражнение кашнеобразно — густо и, наконец, последние четыре дня оформлено — желтое. Всье большого восемь первых дней оставался собственно без перемены, так как, подыавшись было в первые пять дней этого промежутка на 1400 гтм., в следующие три дня упал снова на 1400 гтм. На девятый и на десятый день промежутка всье подымается на 1200 гтм. или 1,9%. На 43 день болезни наступает возврат. При нем происходит действительное повышение температуры, на третий день появляется снова понос, длющийся и по прекращении возврата четыре дня; на пятый день появляется блок в моче в незначительном количестве, державшийся еще два дня по прекращении лихорадки; язык ставший было ошущаться, снова покрылся весь бляжам налетом. Субъективно же в это время головная боль и тяжесть в области подреберий. Что касается всье большого, то он,

не смотря на все только что указанное, продолжал расти до последняго дня возврата, продолжавшагося 7 дней: прибавь в всье за эти 7 дней равна 2800 гтм. или 4,4%. По прекращении лихорадки возврата всье начинает падать и в течении следующих за возвратом 12 дней падает на 1900 гтм. или на 2,9%; а в следующие три дня (отъ 62 до 64 дня болезни) подымается снова на 1600 гтм. или на 2,5%. Общая прибавь в всье с 28 дня болезни до 64 дня—4500 гтм. или 7,3%. Периодъ отъ 50 до 64 не представляется однако вполне безлихорадочным, так как при двухчасовом измерении температуры на 58 день болезни максимум температуры есть 37,6, а не 37°, как на обычной кривой температуры.

Крестьянин Осипъ Л—въ, 18 лтъ, поступилъ 22/X 93 г. на 8 день заболванія: головная боль, общее недомоганіе, стулъ жидко. № пр. журн. 9018. 22/X 39,0—40,0. Средняго роста, хорошаго тълосложения и питания. Порядочно тифозное состояние. Обложенный по краямъ языкъ. Конецъ его чистъ. Кожа чиста. При перкусіи груди звукъ всюду ясный. Дыханіе везикулярное. Сердечная тупость въ предѣлахъ нормы. Тоны чьты. Верхнія границы тупости печени и селезенки не измѣнены. Край печени. Селезенка на 1 палецъ, тверда. 23 38,6—40,2. *Вреда ночью*. Стулъ 1 р. жидко. М. уд. в. 1,020 б. незначит. колич.

24. 38,5—39,5 55100. Стула не было. Ч. утр. 400, вечер. 200 к. с. М. 400 к. с. Уд. в. 1,025 б. незначит. колич. р. по Эрлиху слабая пожит.

25. 39,0—39,2. 54600. Стулъ вчера днемъ 2 р. и ночью 2 р., жидко. Ч. по 200 к. с. *Вреда не было, Небольшое тифозное состояние. Больничность селезенки. М. 800 к. с. Уд. в. 1,025 б. незнач. колич. р. по Эрл. слабая пожит.*

26. 38,0—38,4. 53300. Стулъ вчера днемъ 2 р. жидко. Ч. только вечер. 400 к. с. *Тифозное состояние выражено слабо.*

27. 37,0—38,3. 52900. Стулъ вчера днемъ 2 р., ночью и утр. по 1 р., жидко. Ч. утр. 200 к. с., вечер. 600 к. с. Потъ къ утру. *Тифозное состояние почти. Больничности селезенки нтъ.* Головная боль меньше. М. уд. в. 1,015; б. незнач. колич. р. по Эрл. отрицательная. 1800 к. с. молока. 2 ванны 28° ежедневно.

| Число<br>месяца | Всех  | П и щ а . |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-----------------|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                 |       | 8         | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |   |
| 28/x            | 52700 | 37,5      | —    | —    | —    | —    | 36,7 | 38,4 | 38,4 | 38,0 | 37,1 | 38,8 | —    | Бульон, 1700 кс.<br>молока.                 |
| 29              | 52300 | 36,4      | 36,2 | 36,7 | 37,6 | 37,2 | 38,4 | 38,2 | 38,6 | 38,5 | 38,5 | 37,2 | 36,5 |   |
| 30              | 52200 | 36,0      | 36,0 | 36,6 | 36,6 | 37,2 | 37,7 | 38,3 | 38,4 | 37,8 | 37,6 | 36,9 | 36,8 |   |
| 31              | 51900 | 36,3      | 36,0 | 36,1 | 36,2 | 37,8 | 37,2 | 37,1 | 37,2 | 37,3 | 37,0 | 37,0 | 36,8 |   |
| 1/x             | 51300 | 36,0      | 36,0 | 36,1 | 36,3 | 36,0 | 36,4 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 37,2 | 37,0 | 36,8 |   |
| 2               | 50900 | 36,0      | 36,0 | 36,2 | 36,3 | 36,2 | 36,5 | 36,9 | 36,9 | 37,0 | 36,5 | 36,5 | 36,7 |   |
| 3               | 50800 | 36,7      | 36,7 | 36,3 | 36,0 | 36,9 | 37,3 | 37,4 | 38,0 | 38,2 | 36,9 | 36,0 | 36,4 | Бульон, 1 яйцо,<br>1700 кс. молока.         |
| 4               | 51000 | 36,0      | 36,1 | 36,4 | 36,5 | 36,7 | 36,7 | 37,4 | 37,1 | 37,3 | 37,1 | 36,5 | 36,4 | Бульон, 2 яйца,<br>1600 кс. молока.         |
| 5               | 50800 | 36,2      | 36,0 | 36,4 | 36,1 | 36,3 | 36,7 | 37,3 | 36,7 | 36,6 | 36,2 | 36,4 | 36,5 |   |
| 6               | 50700 | 36,2      | 36,0 | 36,1 | 37,2 | 36,2 | 36,3 | 36,9 | 36,7 | 36,3 | 36,1 | 36,2 | 36,7 |   |
| 7               | 50400 | 36,3      | 36,2 | 36,1 | 36,2 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,5 | 36,4 | 36,1 | 36,0 |   |
| 8               | 50300 | 36,2      | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 36,6 | 36,3 | 36,4 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,1 |   |
| 9               | 50400 | 36,4      | 36,1 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,4 | 36,5 | 36,3 | 36,2 | 36,2 | 36,0 | 36,1 |   |
| 10              | 50400 | 36,1      | 36,2 | 36,0 | 36,2 | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 36,3 | 36,4 | 36,5 | 36,0 | 36,2 | Бул., 1 яйцо, 2 ман.                        |
| 11              | 50800 | 36,0      | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 36,1 | 36,1 | 36,7 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | каша, 1600 кс. маж.                         |
| 12              | 50400 | 36,2      | 36,2 | 36,0 | 36,3 | 36,3 | 36,2 | 36,3 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |   |
| 13              | 50600 | 36,4      | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | Бул., 2 яйца, 3 ман.                        |
| 14              | 50700 | 36,2      | 36,1 | 36,3 | 36,1 | 36,5 | 36,3 | 36,2 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | каша, 1200 кс. молока.                      |
| 15              | 51000 | 36,3      | 36,2 | 36,7 | 36,6 | 36,3 | 36,3 | 36,4 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,4 |   |
| 16              | 51000 | 36,2      | 36,0 | 36,6 | 37,3 | 37,3 | 36,5 | 36,0 | 36,2 | 36,2 | 36,3 | 36,5 | 36,4 |   |
| 17              | 51300 | 36,4      | 36,2 | 36,8 | 37,4 | 36,8 | 36,7 | 36,9 | 37,1 | 37,1 | 36,8 | 36,4 | 36,6 | Стуж, 1/2 шт., 3 м. к.                      |
| 18              | 51900 | 36,4      | 36,3 | 36,5 | 37,9 | 37,7 | 37,6 | 37,8 | 37,5 | 37,4 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 1000 кс. мол., 16. 6. к.                    |
| 19              | 51800 | 36,7      | 36,5 | 36,6 | 37,7 | 37,4 | 37,7 | 38,2 | 37,8 | 37,3 | 36,6 | 36,3 | 36,8 | Бульон, 2 м. каша.                          |
| 20              | 51000 | 36,8      | 36,9 | 36,9 | 37,7 | 37,4 | 37,6 | 37,7 | 37,0 | 36,0 | 36,3 | 36,2 | 36,6 | 1700 кс. маж.                               |
| 21              | 51600 | 36,7      | 36,7 | 36,9 | 37,2 | 36,8 | 37,2 | 37,5 | 37,0 | 37,0 | 37,1 | 36,2 | 36,8 |   |
| 22              | 51700 | 36,8      | 36,7 | 37,2 | 37,9 | 37,4 | 37,2 | 37,6 | 37,0 | 37,0 | 36,7 | 36,6 | 37,0 |   |
| 23              | 51500 | 36,8      | 37,1 | 37,7 | 37,7 | 37,8 | 38,4 | 38,3 | 38,0 | 37,7 | 37,4 | 36,7 | 37,8 |   |
| 24              | 51500 | 37,4      | 37,5 | 37,8 | 38,5 | 38,5 | 39,0 | 39,0 | 38,9 | 38,0 | 37,5 | 37,6 | 37,7 | Бульон, 2200 кс.<br>молока.                 |
| 25              | 51400 | 37,2      | 37,5 | 37,6 | 38,1 | 37,9 | 38,4 | 38,1 | 36,3 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,6 |   |
| 26              | 50800 | 36,8      | 36,5 | 37,3 | 37,3 | 36,4 | 36,8 | 37,3 | 37,6 | 36,4 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |   |
| 27              | 50800 | 36,0      | 36,0 | 36,3 | 36,7 | 36,4 | 36,6 | 36,4 | 36,3 | 36,4 | 36,3 | 36,0 | 36,0 |   |
| 28              | 50400 | 36,0      | 36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,0 | 36,5 | 36,2 | 36,0 | 36,2 | 36,1 | 36,1 | 36,3 |   |
| 29              | 50300 | 36,0      | 36,0 | 36,5 | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 36,3 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |   |
| 30              | 50000 | 36,0      | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | Бульон, 1800 кс.<br>молока, 1 м. каша.      |
| 1/xii           | 50300 | 36,0      | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 36,0 | 36,3 |   |
| 2               | 50500 | 36,0      | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,0 | 36,3 | 36,3 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |   |
| 3               | 50400 | 36,3      | 36,0 | 36,0 | 36,6 | 36,2 | 36,0 | 36,4 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,0 | Бульон, 1 яйцо, 2 м.<br>каша, 1600 кс. мол. |
| 4               | 50600 | 36,0      | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 1 бул. безъ корки.                          |

Объективные и субъективные явления.

- Стуж вчера 2 р. и утр. 1 р. жарко. Ч. утр. 400, веч. 800 кс. Путь къ утру.  
Обла. туман. Край селен. въ полях на свитъ.
- вчера 2 р., ночью 1 р. и утр. 1 р. жарко. Ч. утр. 400, веч. 800 кс. Путь ночью. М. 1000 кс. Уд. в. 1,015, 6. салды.
  - вчера днем 2 р. жарко. Ч. утр. 400, вечер. 1200 кс. Пота на полях. Печеня не прощупывается.
  - вчера днем 2 р. жарко. Ч. утр. 400, вечер. 1200 кс. Край селенца въ болот. влажн. М. 3000 кс. Уд. в. 1,008 6. нѣтъ.
  - вч. дн. 3 р. жарко. Ч. утр. 400, веч. 1600 кс. М. 1600 кс. Уд. в. 1,012, 6. нѣтъ.
  - вчера 2 р. и утр. 1 р. жарко. Ч. утр. 800, веч. 1600 кс. Аппетитъ хороший. М. 2800 кс. Уд. в. 1,006, 6. нѣтъ.
  - вчера днем 2 р. жарко. Ч. утр. 1200 кс., веч. 1600 кс. М. 1800 кс. Уд. в. 1,008, 6. нѣтъ.
  - вчера 2 р. жарко. Ч. по 1600 кс. М. 2500 кс. Уд. в. 1,006, 6. нѣтъ.
  - вч. дн. 3 р. жарко. Ч. по 1600 кс. М. 3500 кс. Уд. в. 1,005, 6. нѣтъ.
  - вчера 2 р. жарко. Ч. по 2000 кс. Селенца не прощупывается. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005, 6. нѣтъ.
  - вчера днем 3 р. жарко. Ч. по 2000 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,005, 6. нѣтъ.
  - вчера 2 р. и утр. 1 р. жарко. Ч. по 2400 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,006, 6. нѣтъ.
  - вч. 2 р. жарко. Ч. по 2400 кс. М. 4300 кс. Уд. в. 1,005, 6. нѣтъ.
  - вч. 2 р. и утр. 1 р. жарко. Ч. по 2400 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,005, 6. нѣтъ.
  - вчера 2 р. жарко. Ч. по 2400 кс. М. 3600 кс. Уд. в. 1,005, 6. нѣтъ.
  - вчера днем 2 р. и утр. 1 р. жарко. Ч. по 2400 кс. М. 5200 кс. Уд. в. 1,005, 6. нѣтъ.
  - вчера днем 2 р. жарко. Ч. по 2400 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005, 6. нѣтъ.
  - не было. Ч. по 2400 кс. М. 6000 кс. Уд. в. 1,005, 6. нѣтъ.
  - не было. Ч. по 2400 кс. Из. слегка облож. въ задней полов. М. 5300 кс. Уд. в. 1,005, 6. нѣтъ.
  - вчера днем 2 р. оформлено, желт. Ч. по 2400 кс. М. 6200 кс. Уд. в. 1,005 6. нѣтъ.
  - вч. днем 1 р. туманъ же. Ч. по 2400 кс. М. 5800 кс. Уд. в. 1,005, 6. нѣтъ.
  - не было. Ч. по 2400 кс. М. 5700 кс. Уд. в. 1005, 6. нѣтъ.
  - 1 р. утр. туманъ же. Ч. по 2400 кс. М. 6300 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣтъ.
  - вчера днем 1 р. и утр. 1 р. туманъ же. Ч. по 2400 кс. Путь ночью. М. 5400 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣтъ.
  - 1 р. утр. холодна видѣл густой туманца, холодна жарко. Ч. по 2400 кс. Край селенца въ болотн. влажн. М. 4300 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣтъ.
  - 1 р. веч. туманъ же. Ч. по 2400 кс. М. 5700 кс. Уд. в. 1,006, 6. нѣтъ.
  - вчера днем 2 р. жарко. Ч. по 2400 кс. М. 6600 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣтъ.
  - не было. Ч. по 2400 кс. Измъ слегка обложнен вѣс. Головная боль. М. 4700 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣтъ.
  - вчера днем 3 р. жарко. Ч. утр. 1600, в. 2400 кс. М. 4200 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣтъ.
  - вчера 2 р. жарко. Ч. по 2400 кс. Головная боль меньше. Головокруженіе. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣтъ.
  - вчера 2 р. жарко. Ч. по 2400 кс. Головной боли нѣтъ. М. 4500 кс. Уд. в. 1,005, 6. нѣтъ.
  - вчера 1 р. и утр. 1 р. жарко. Ч. по 2400 кс. М. 4800 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣтъ.
  - вчера дн. 2 р. жарко. Ч. по 2400 кс. Селенца не прощупывается. М. 4600 кс. Уд. в. 1,007; 6. нѣтъ.
  - вчера 2 р. жарко. Ч. по 2400 кс. М. 4600 кс. Уд. в. 1,006; 6. нѣтъ.
  - 1 р. вечера видѣл густ. каш. Ч. по 2400 кс. Головокруженіе нѣтъ. М. 4300 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣтъ.
  - вчера 2 р. туманъ же. Ч. по 2400 кс. М. 5000 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣтъ.
  - вчера 2 р. туманъ же. Ч. утр. 2800, веч. 2400 кс. М. 5600 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣтъ.
  - вчера 2 р. туманъ же. Ч. по 2400 кс. М. 5500 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣтъ.

| Число<br>месяца. | Въсь. | П И Ц А. |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |  |
|------------------|-------|----------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
|                  |       | 8        | 10                             | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |       |  |
| 5                | 50200 | 36,0     | 36,0                           | 36,0 | 36,1 | 36,3 | 36,2 | 36,7 | 36,1 | 36,1 | 36,0 | 36,7 | 36,2 | Тоже. |  |
| 6                | 51000 | 36,3     | 36,1                           | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,5 | 36,6 | 36,5 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |       |  |
| 7                | 51100 | 36,2     | 36,0                           | 36,2 | 36,9 | 36,7 | 36,4 | 37,2 | 36,4 | 36,3 | 36,9 | 36,6 | 36,5 |       |  |
| 8                | 52000 | 36,5     | 36,7                           | 36,4 | 36,5 | 36,7 | 36,4 | 36,8 | 36,2 | 36,0 | 36,3 | 36,4 | 36,3 |       |  |
| 9                | 52600 | 36,7     | 36,7                           | 36,3 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 37,0 |       |  |
| 10               | 54200 | 36,6     | 36,5                           | 36,4 | 36,7 | 36,7 | 36,9 | 36,7 | 36,9 | 36,6 | 36,5 | 36,1 | 36,4 |       |  |
| 11               | 54700 | 36,7     | 36,7                           | 36,6 | 37,0 | 36,4 | 36,8 | 36,7 | 36,4 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |       |  |
| 12               | 54700 | 36,3     | 36,4                           | 36,3 | 37,0 | 36,0 | 36,4 | 36,5 | 37,1 | 36,8 | 36,5 | 36,3 | 36,4 |       |  |
| 13               | 55000 | 36,5     | 36,5                           | 36,6 | 36,9 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,6 | 36,0 | 36,0 | 36,3 | 36,7 |       |  |
| 14               | 55800 | 36,7     | ноч., 1 ф. блз. + 1/2 ф. черн. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |  |

*Вывод.* По продолжительности лихорадки основной волны — до 16 дня болѣзни случай легкій, клинически же средней. Ходъ температуры, тифозное состояние, обложенный языкъ, опухоль печени и селезенки, поносъ, все такія данныя, которыя заставляютъ признать брюшной тифъ; но хватало лишь розеолъ. Поносъ продолжался до 29 дня болѣзни. Бляшекъ въ мочѣ до 13 дня, а реакция Эрлиха до 11 дня болѣзни. Падение въса съ 10 дня до 16 дня болѣзни равно 2900 гтм. или 5,3%. Высшая температура конца лихорадки основной волны не совпадаетъ три дня при сравненіи обычной кривой (запись въ 8 ч. утра и 6 ч. вечера) съ данными, полученными при двухчасовомъ измѣреніи температуры круглые сутки. Если имѣть только обычную кривую температуры, то промежутокъ съ семнадцати до тридцати четвертаго дня болѣзни можно считать безлихорадочнымъ т. е. 18 дней. На самомъ же дѣлѣ онъ не былъ вполнѣ безлихорадочнымъ, такъ какъ при двухчасовомъ измѣреніи температуры высшая температура на 17 день болѣзни была 37,8, а не 37,2, какъ на обычной кривой; также и на 20 день болѣзни высшая температура была 38,2, а не 37,3, какъ на обычной кривой. Первые тринадцать дней этого промежутка сшествуетъ поносъ; первые шесть дней опухоль селезенки. Языкъ, очищаясь, оставался однако обложеннымъ въ задней своей половинѣ. Съ 15 дня до 18 испражнение было оформлено, но не было окрашено (желтое). Первые девять дней въса падаетъ на 1900 гтм. или 3,6%; слѣдующіе же девять дней медленно поднимается на 1000 гтм. или 2%. На 35 день болѣзни — день начала возврата — въса подымается еще на 600 гтм. или на 1,2%. Возвратъ въ данномъ случаѣ является ввидѣ двухъ волнъ, каждая продолжительностью по три дня, какъ это видно на обычной кривой, раздѣленныхъ промежуткомъ въ два дня. При двухчасовомъ измѣреніи температуры имѣемъ тоже двѣ волны, но съ промежуткомъ въ одинъ день, когда въс-

Объективные и субъективные явления.

- » вчера 2 р. такъ же же. Ч. по 2400 кс. М. 5800 кс. Уд. в. 1,005; 6. нѣтъ.
- » вчера 2 р. такъ же же. Ч. по 2400 кс. М. 6300 кс. Уд. в. 1,006; 6. нѣтъ.
- » вчера 1 р. такъ же же. Ч. по 2400 кс. Языкъ слегка обложенъ следи.
- » вчера 2 р. такъ же же. Ч. по 2400 кс.
- » вчера 1 р. оформлено, штыа галмы. Ч. по 2400 кс. Языкъ чистъ.
- » вчера 1 р. такъ же же. Ч. по 2400 кс. До измѣнлива събъ 1 блку.
- » вчера 1 р. и утр. 1 р. оформлено и хорошо окрашено. Ч. по 2400 кс.
- » вчера 1 р. и утр. 1 р. такъ же же. Ч. по 2400 кс.
- » 1 р. утр. такъ же же. Ч. 2400 кс.
- » 1 р. утр. такъ же же. Ч. по 2400 кс. Выписанъ: со стороны внутреннихъ органовъ измѣненій не замѣно.

шая температура была 37,5. Если и при двухчасовомъ измѣреніи температуры продолжительность первой волны возврата равна тоже тремъ днямъ, зато высшая температура ея была не 37,7, какъ на обычной кривой, а 38,2; высшія температуры второй волны совпадаютъ, но продолжительность ея на самомъ дѣлѣ была четыре дня, а не три, какъ на обычной кривой. При первой волнѣ возврата только въса падаетъ на 300 гтм. или на 0,5%; но какъ бы подъ ея вліяніемъ происходитъ измѣнение консистенціи испражнянія изъ оформленнаго въ кашицеобразное, появляется припухлость селезенки, держалась всю вторую волну и еще затѣмъ въ теченіи трехъ дней. Въ первый же день второй волны начинается поносъ, на третій день ея языкъ весь обложенъ, а субъективно въ это время головная боль. Въсѣ большого въ промежутокъ двухъ волнъ остается безъ перемены, если не считать поднятія на 100 гтм. въ первый день второй волны (39 день болѣзни); затѣмъ въса падаетъ и во время второй волны терается 200 гтм. или 0,4%. Общая же потеря за обѣ волны возврата равна 500 гтм. или 1%. Съ прекращеніемъ лихорадки второй волны возврата въса падаетъ еще 5 дней. на 1400 гтм. или на 2,7%. Слѣдовательно общая потеря въ всѣхъ подъ вліяніемъ возврата равна 1900 гтм. или 3,7%; Общая же потеря въ всѣхъ съ 10 дня болѣзни равна 5100 гтм. или 9,3%. Съ 48 дня болѣзни въса начинаетъ подыматься сначала медленно, а затѣмъ быстро и къ 61 дню болѣзни достигаетъ 55800 гтм. т. е. прибылъ равна 5800 гтм. или 11,6%.

Врестяниинъ Пльа Семъ — въ 21 года поступилъ въ больницу 25—VII 93 г. на 8-й день заболѣванія Первые четыре дня болѣла голова и стулъ жидкій, но перемогался; послѣдніе же три дня ослабъ, усилилась головная боль, отсутствие аппетита, слегъ. № пр. журн. 6332. 25—VII. Средняго роста. Хорошаго тѣлосложенія и

питания. Небольшое тифозное состояние. Обложенный характерно язык. Кожа чиста. При перкуссии груди заглушения звука нет. Дыхание везикулярное с выдохом и слышны разбросанные в порядочном количестве высокие свисты. Серд. тугость в пределах нормы. Тоны чисты. Селезеночная тугость маскирована. Селезенка, тверда, прощупывается на 1½ пальца. Верхняя граница печени не изменена. Печень прощупать не удается.

26—VII. Стул 1 р. жидко. М. Уд. в. 1,020; б/ла нет. молока 1000 куб. сант.

27—VII. 56600 Стул вчера дн. 1 р. жидко. Ч. по 200 куб. сант.

28—VII. 55900 Стула небыло. Ч. не пилъ. М. 400 к. с. Уд. в. 1,030; б. с/бды, р. по Эрланку положительны.

29—VII. 54700. Стул 1 р. у. жидко. Ч. не пилъ. Тифозное

состояние выражено слабо. Свистов в груди почти нет. М. 600 к. с. Уд. в. 1,024; б. с/бды р. по Эрл. положит.

30—VII. 53600. Стул вчера вечер. 1 р. жидко. Ч. по 800 к. с. Селезенка тверда на 1 палец. М. Уд. в. 1,025 б. с/бды р. по Эрл. полож.

31—VII. 53300. Стула не было. Ч. утр. 400 и вечер. 800. Погть небольшой под утр. Головной боли почти нет; головокружение. Тиф. состояние нет.

1—VIII. 53700. Стула небыло. Ч. по 800 к. с. Свистов в груди нет. М. 1400 к. с. Уд. в. 1,020 б. с/бды р. по Эрл. слабая полож. Давалось молока 1800 куб. сант. 2 ваины по 28°.

Ходъ т-рым утр. 39,5 38,3 38,0 39,6 38,1 38,7 38,0 38,3 37,4  
веч. 39,8 40,3 39,5 39,8 38,8 38,5 39,5 38,7 37,0

Объективные и субъективные явления.

Стула не было. Ч. по 800 к. Яз. слегка обложен. Селез. тверда на 1 пал. Небольш. шум в ушах. М. 1800 кс. Уд. в. 1,009, б. с/бды р. Эрл. отрицательна.

- 1 р. утр. жидко (веч. ввара дано Ol. Ricini 15 gm.). М. 1500 кс. Уд. в. 1,008, б. нетъ. Ч. по 800 кс.
- не было. Ч. утр. 1200 кс. и веч. 1600 кс. Уд. в. 1,011, б. нетъ.
- не было. Ч. по 1600 кс. М. 3400 кс. Уд. в. 1,005, б. нетъ.
- не было. Ч. утр. 1600 кс. и вечер. 2000 кс. Шум в ушах и головокружение нетъ. М. 4500 кс. Уд. в. 1,005, б. нетъ.
- 1 р. ввара днем выдъ густой кашими. Ч. по 2000 кс. М. 5000 кс. Уд. в. 1,004, б. нетъ.
- 1 р. утр. тинки, же Ч. по 2000 кс. М. 6000 кс. Уд. в. 1,004, б. нетъ.
- не было. Ч. по 2000 кс. М. 4500 кс. Уд. в. 1,006, б. нетъ.
- не было. Ч. по 2000 кс. М. 4500 кс. Уд. в. 1,005, б. нетъ.
- 1 р. утрома оформлено и хорошо окрашено въ темный цвѣтъ. М. 4000 кс. Уд. в. 1,005, б. нетъ. Ч. по 2000 кс.
- не было. Ч. по 2000 кс. М. 4500 кс. Уд. в. 1,005, б. нетъ.
- 1 утр. не жидко. Ч. утр. 2000 кс. и веч. 2400 кс. М. 4900 кс. Уд. в. 1,005, б. нетъ.
- 1 р. утр. не жидко. Ч. по 2000 кс. М. 5500 кс. Уд. в. 1,004, б. нетъ.
- не было. Ч. утр. 2000 кс. и веч. 2400 кс. М. 4800 кс. Уд. в. 1,005, б. нетъ.
- ввара днем 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. утр. 2000 кс. и вечер. 2400 кс. М. 5800 кс. Уд. в. 1,005, б. нетъ.
- 1 р. утр. не жидко. Ч. по 2400 кс. М. 5300 кс. Уд. в. 1,005, б. нетъ.
- 1 р. утр. не жидко. Ч. утр. 2000 кс. и вечер. 2400 кс. М. 5200 кс. Уд. в. 1,005, б. нетъ.
- 1 р. утр. не жидко. Ч. утр. 2000 кс. и веч. 2400 кс. Язык слегка обложен только свадн. М. 5000 кс. Уд. в. 1,006, б. нетъ.
- 1 р. утр. не жидко. Ч. утр. 2000 кс. и веч. 2400 кс. М. 5700 кс. Уд. в. 1,005, б. нетъ.
- 1 р. ввара вечер. не жидко. Ч. утр. 2800 кс. и вечер. 2400 кс. М. 5300 кс. Уд. в. 1,005, б. нетъ.

Стула 1 р. ночью не жидко. Ч. утр. 2000 кс. и вечер. 2400 кс. Яз. чистъ. М. 5700 кс. Уд. в. 1,005, б. нетъ.

- ввара днем 1 р. и утр. 1 р. не жидко. Ч. по 2400 кс. М. 5200 кс. Уд. в. 1,005, б. нетъ.
- ввара вечер. не жидко. Ч. по 2400 кс. Яз. слегка облож. сладн. М. 5700 кс. Уд. в. 1,005, б. нетъ.

| Число<br>н/бсана. | Ввек. | П И Ц А. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-------------------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                   |       | 8        | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |   |
| 2/гш              | 53200 | 37,4     | —    | —    | —    | —    | 37,0 | 37,1 | 37,3 | 37,1 | 36,7 | 37,2 | 36,5 | 1800 куб. сант. мол.                          |
| 3                 | 52400 | 36,0     | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,7 | 36,7 | 36,6 | 36,2 | 36,5 | 36,8 | 36,8 | Бульонъ, клас. 1800 куб. сант. молока.        |
| 4                 | 52300 | 36,4     | 36,1 | 36,2 | 36,1 | 36,4 | 36,0 | 36,2 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | Бульонъ, 2 яйца 2 яйца к., 1200 кс. мол. 1 б. |
| 5                 | 52500 | 36,0     | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,4 | 36,6 | 36,7 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | безъ порки.                                   |
| 6                 | 53000 | 36,1     | 36,0 | 36,1 | 36,1 | 36,4 | 36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,1 | 36,2 | 36,2 | 36,1 | Стул, 2 яйца, 2 н. к.                         |
| 7                 | 52000 | 36,0     | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,5 | 1200 н. 1/2 ф. б/л.                           |
| 8                 | 52600 | 36,2     | 38,2 | 36,4 | 36,7 | 36,7 | 36,4 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,5 | Стул, 1/2 втд. 2 н. к.                        |
| 9                 | 52800 | 36,2     | 36,6 | 36,6 | 36,8 | 36,9 | 36,8 | 36,6 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 1000 кс. м. 1/2 ф. б.                         |
| 10                | 52800 | 36,4     | 36,1 | 36,4 | 36,8 | 36,8 | 37,0 | 36,0 | 36,5 | 36,6 | 36,2 | 36,3 | 36,9 | Стул, 2 яйца, 2 н. к.                         |
| 11                | 52700 | 36,5     | 36,4 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 36,7 | 36,4 | 36,0 | 36,2 | 36,1 | 36,4 | 1200 н. 1/2 ф. б/л.                           |
| 12                | 53000 | 36,6     | 36,3 | 36,7 | 36,9 | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 36,4 | 36,1 | 36,0 | 36,2 | 36,2 | Стул, 1/2 втд. 2 н. к.                        |
| 13                | 53100 | 37,1     | 36,4 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,7 | 36,5 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 1000 кс. м. 1/2 ф. б.                         |
| 14                | 52500 | 36,6     | 36,5 | 36,2 | 37,0 | 36,9 | 37,2 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 36,7 | 36,2 | 36,4 | Стул, втд. 2 н. к.                            |
| 15                | 52800 | 36,9     | 36,6 | 36,8 | 36,9 | 36,7 | 37,1 | 36,6 | 36,7 | 36,2 | 36,1 | 36,0 | 36,3 | 1000 кс. м. 1/2 ф. б.                         |
| 16                | 52800 | 36,8     | 36,4 | 36,7 | 36,9 | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 36,6 | 36,5 | 36,2 | —    | —    | —   |
| 17                | 53000 | 36,6     | 36,5 | 36,9 | 37,2 | 37,0 | 37,1 | 37,1 | 36,5 | 36,5 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | Стул, втд. 2 н. к., 600 кс. мол. 1 ф. б.      |
| 18                | 53500 | 36,9     | 36,6 | 36,7 | 36,6 | 37,1 | 37,1 | 37,0 | 36,8 | 36,4 | 36,2 | 36,3 | 36,7 | —   |
| 19                | 53900 | 36,9     | 36,8 | 37,1 | 37,1 | 37,2 | 36,8 | 37,0 | 36,8 | 36,1 | 36,0 | 36,1 | 37,1 | —   |
| 20                | 53500 | 36,8     | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 36,5 | 36,6 | 36,4 | 36,2 | 36,4 | —   |
| 21                | 54700 | 37,0     | 36,5 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 37,1 | 36,9 | 36,5 | 36,4 | 36,2 | 36,3 | 36,7 | Тоже + 1/2 ф. черн.                           |
| 22                | 54600 | 37,3     | 36,7 | 36,9 | 37,4 | 37,2 | 37,2 | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,2 | 36,1 | 37,1 | Тоже.   |
| 23                | 55200 | 37,1     | 36,8 | 36,6 | 37,1 | 37,1 | 37,2 | 36,8 | 36,7 | 36,4 | 36,0 | 36,7 | 38,0 | —   |
| 24                | 55400 | 37,1     | 36,9 | 36,8 | 37,3 | 37,2 | 37,6 | 37,2 | 36,9 | 36,4 | 36,8 | 36,6 | 38,0 | —   |


| Число<br>мш.ц. | Всех  | П    |      |      |      |      |      | И Ц А. |      |      |      |      |      |  |
|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--|
|                |       | 8    | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    | 8      | 10   | 12   | 2    | 4    | 6    |  |
| 26             | 55300 | 37,6 | 37,3 | 37,5 | 37,8 | 37,8 | 38,2 | 37,9   | 37,8 | 37,8 | 37,4 | 37,3 | 37,0 | Бульон, 1600 кс. м.  |
| 25             | 55500 | 37,5 | 37,5 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 38,6 | 38,2   | 37,8 | 37,8 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |  |
| 27             | 55500 | 37,6 | 37,2 | 37,1 | 37,8 | 37,7 | 38,3 | 38,5   | 37,8 | 37,5 | 37,0 | 37,4 | 38,0 |  |
| 28             | 55500 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,4 | 37,5 | 38,1 | 38,0   | 38,0 | 37,8 | 37,0 | 37,1 | 38,9 | Бульон, ягель 180 куб. сант. молока.                       |
| 29             | 55000 | 37,3 | 37,4 | 37,5 | 37,7 | 37,6 | 38,0 | 38,0   | 37,8 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,2 |  |
| 30             | 55100 | 37,7 | 37,0 | 37,4 | 37,6 | 37,6 | 38,2 | 38,7   | 37,4 | 37,2 | 37,2 | 38,9 | 37,2 |  |
| 31             | 55000 | 37,5 | 37,1 | 37,3 | 37,5 | 37,6 | 37,6 | 37,0   | 36,7 | 37,1 | 37,2 | 37,1 | 37,3 | Бульон 2200 кс. м.   |
| 1/x            | 54600 | 36,9 | 36,7 | 37,0 | 36,5 | 36,8 | 37,4 | 37,6   | 37,5 | 36,5 | 36,3 | 36,6 | 36,8 |  |
| 2              | 54500 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 37,2 | 36,9   | 36,7 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 37,6 | Бульон ягель 2500 кс. мол.                                 |
| 3              | 54600 | 36,4 | 36,5 | 36,8 | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 36,7   | 36,6 | 36,7 | —    | 36,5 | 36,6 |  |
| 4              | 54500 | 36,3 | 36,5 | 36,6 | 36,3 | 36,6 | 36,0 | 36,0   | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,1 | 36,2 |  |
| 5              | 54300 | 36,0 | 36,3 | 36,4 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | 36,7   | 36,4 | 36,6 | 36,2 | 36,0 | 36,4 |  |
| 6              | 54300 | 36,4 | 36,3 | 36,6 | 36,9 | 36,9 | 36,8 | 36,9   | 36,5 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,2 |  |
| 7              | 54300 | 36,6 | 36,3 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6   | 36,6 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,5 | Бульон, ягель 1 ма к. 2200 куб. сант.                      |
| 8              | 54700 | 36,4 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 37,5   | 36,0 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,4 |  |
| 9              | 54800 | 36,4 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,6   | 36,5 | 36,4 | 36,2 | 36,1 | 38,3 |  |
| 10             | 54500 | 36,8 | 36,5 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 36,0 | 36,4   | 36,7 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,8 | Бульон 2 яйца 2 ма каша, 1600 кс. мол.                     |
| 11             | 53900 | 36,8 | 36,8 | 37,3 | 37,5 | 37,4 | 37,2 | 37,4   | 37,3 | 36,5 | 36,3 | 36,4 | 36,5 |  |
| 12             | 53900 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 36,6 | 36,3   | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,3 |  |
| 13             | 53800 | 36,5 | 36,2 | 36,9 | 37,0 | 36,5 | 36,4 | 36,3   | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,1 |  |
| 14             | 53700 | 36,3 | 36,3 | 36,5 | 36,3 | 36,3 | 36,8 | 36,2   | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,1 | 36,2 | Тоже +1 б. безь кор.                                       |
| 15             | 54000 | 36,2 | 36,4 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,3 | 36,1   | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,2 | Буль. 1 ма, 2 ма каша, 1600 кс. мол.                       |
| 16             | 54100 | 36,3 | 36,5 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,3 | 36,2   | 36,2 | 36,0 | 36,5 | 36,0 | 36,0 |  |
| 17             | 53800 | 36,1 | 36,4 | 36,7 | 36,4 | 36,7 | 36,3 | 36,1   | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,5 | 1 булга безь корня   |
| 18             | 54000 | 36,2 | 36,3 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 36,6 | 36,3   | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,4 | Супь, ягл., 2 ма каша                                      |
| 19             | 54000 | 36,5 | 36,4 | 36,7 | 36,4 | 36,4 | 36,8 | 36,5   | 36,2 | 36,2 | 36,3 | 36,1 | 36,2 | 1200 кс. мол., 1 булга безь корня.                         |
| 20             | 53800 | 36,3 | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,8 | 36,8 | 36,2   | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,3 |  |
| 21             | 53400 | 36,3 | 36,5 | 36,6 | 36,8 | 37,0 | 36,7 | 36,9   | 36,2 | 36,4 | 36,0 | 36,0 | 36,5 | Тоже, но булга ст. корной.                                 |
| 22             | 34000 | 36,7 | 36,9 | 36,8 | 37,0 | 36,7 | 36,9 | 36,7   | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,2 |  |
| 23             | 54100 | 36,2 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 36,5 | 36,8 | 36,5   | 36,7 | 36,3 | 36,2 | 36,4 | 36,7 | Супь, котлета, 2 ма каша, 1000 куб. са мол., 1 ф. булга.   |
| 24             | 54700 | 36,5 | 36,3 | 36,4 | 36,9 | 36,9 | 36,7 | 36,5   | 36,6 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,3 |  |
| 25             | 54900 | 36,2 | 36,4 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,8   | 36,7 | 36,5 | 36,0 | 36,2 | 36,5 |  |
| 26             | 55400 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 37,3 | 37,0 | 36,8 | 36,8   | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 36,4 |  |
| 27             | 55700 | 36,7 | 36,5 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 36,7   | 36,2 | 36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,5 |  |
| 28             | 55400 | 36,7 | 36,6 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,2   | 36,0 | 36,1 | 36,3 | 36,4 | 36,4 |  |
| 29             | 55900 | 36,7 | 36,3 | 36,2 | 36,8 | 37,0 | 37,2 | 36,8   | 36,5 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,3 | Супь, котлета, 2 ма 600 куб. сант. мол. 1 ф. 6-1/2 ф. чел. |
| 30             | 56200 | 36,5 | 36,7 | 36,6 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 36,5   | 36,4 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,7 |  |
| 1/x            | 56700 | 36,5 | 36,7 | 36,7 | 37,1 | 37,0 | 37,9 | 36,5   | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,6 |  |
| 2              | 57000 | 36,8 |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |  |

Объективные и субъективные явления.

- > вчера день не жарко. Ч. утр. 2400 кс. и веч. 2000 кс. Гол. боль. Из. слегка облож. вест. Селаз. по пржи. на 1 ма. М. 4300 кс. Уд. в. 1,007, 6. нвть.
- > 1 р. утр. ввдт жид. каш. Ч. утр. 2000 кс. и веч. 2400 кс. Тоже. М. 4600 кс. Уд. в. 1,007, 6. нвть.
- > вчера веч. 1 р. жарко. Ч. по 2400 кс. Голови. боль. сильнйе. Тоже. М. 4100 кс. Уд. в. 1,006 6. нвть.
- > вчера веч. 1 р. жарко. Ч. по 2400 кс. Голови. боль. меньше, порадочное голово-кружение. М. 4800 кс. Уд. в. 1,006 6. нвть.
- > 1 р. вчера вечер. жарко. Ч. по 2400 кс. Тоже. М. 3500 кс. Уд. в. 1,007, 6. нвть.
- > вчера веч. 1 р. жарко. Ч. по 2400 кс. Голови. боли почти нвть; головожр. Сильн. потъ номо. М. 3300 кс. Уд. в. 1,005 6. нвть.
- > 1 р. вечер. ввдт жид. каш. Ч. по 2000 кс. Потъ вчера вечер. М. 5600 кс. Уд. в. 1,006, 6. нвть.
- > вчера 1 р. и утр. 1 р. тапнй же. Ч. по 1600 кс. Потъ ночью. М. 5400 кс. Уд. в. 1,005, 6. нвть.
- > вчера днем 1 р. тапнй же. Ч. по 2000 кс. Голови. боли нвть; легкое голово-кружение. М. 4700 кс. Уд. в. 1,006, 6. нвть.
- > вчера день ввдт туг. каш. Ч. по 2000 кс. М. 5000 кс. Уд. в. 1,005 6. нвть.
- > 1 р. утр. оформлено. Ч. утр. 2000 кс. и вечер. 2400 кс. М. 5900 кс. Уд. в. 1,004 6. нвть.
- > вчера днем 1 р. тапнй же. Ч. утр. 2400 кс. и веч. 2800 кс. Головокружение нвть. М. 6800 кс. Уд. в. 1,003, 6. нвть.
- > вчера веч. 1 р. не жарко. Ч. утр. 2800 кс. и вечер. 2400 кс.
- > вчера днем 1 р. и утр. 1 р. не жарко. Ч. утр. 1600 кс. и веч. 2000 кс. М. 6400 кс. Уд. в. 1,003 6. нвть.
- > вчера веч. 1 р. не жарко. Ч. утр. 2400 кс. и вечер. 2000 кс. Из. слегка обложнй садн.
- > вчера днем 1 р. не жарко. Ч. утр. 2400 кс. и веч. 2800 кс. М. 5200 кс. Уд. в. 1,005 6. нвть.
- > вчера 1 р. оформлено темн. цвта. Ч. по 2000 кс. Из. часть. М. 5100 кс. Уд. в. 1,005, 6. нвть.
- > вчера днем 1 р. тапнй же. Ч. по 2000 кс. М. 4800 кс. Уд. в. 1,005, 6. нвть.
- > 1 р. утр. не жарко. Ч. по 2400 кс. М. 5800 кс. Уд. в. 1,005; 6. нвть. Только селазенка тверда на 1 налет.
- > 1 р. утр. не жарко. Ч. утр. 2400, веч. 2000 кс. М. 5800 кс. Уд. в. 1,005, 6. нвть.
- > вч. днем 1 р. не жарко. Ч. утр. 2400, в. 2800 кс. Селазенка только из. положен. на боку на 1/2 пальца. тверда. М. 6000 кс. Уд. в. 1,004; 6. нвть.
- > вчера днем 1 р. не жарко. Ч. по 2000 кс. М. 5500 кс. Уд. в. 1,004; 6. нвть.
- > вчера 1 р. не жарко. Ч. утр. 2400, веч. 1800 кс.
- > вчера 1 р. не жарко. Ч. по 2000, кс. М. 6400 кс. Уд. в. 1,004, 6. нвть.
- > вчера 1 р. не жарко. Ч. утр. 2400, в. 2000 кс.
- > не было. Ч. по 2400 кс. Край селазенки из. положен на боку тверда. М. 4300 кс. Уд. в. 1,006, 6. нвть.
- > 1 р. утр. оформ. и окрашено в темн. цвта. Ч. утр. 2000, в. 2800 кс. М. 6100 кс. Уд. в. 1,004, 6. нвть.
- > вчера веч. не жарко. Ч. по 2400 кс. М. 6100 кс. Уд. в. 1,004, 6. нвть.
- > не было. Ч. по 2400 кс. М. 5400 кс. Уд. в. 1,006; 6. нвть.
- > 1 р. утр. не жарко. Ч. по 2400 кс. М. 5500 кс. Уд. в. 1,006, 6. нвть.
- > не было. Ч. утр. 2400 кс. и веч. 2800 кс. М. 4300 кс. Уд. в. 1,007; 6. нвть.
- > 1 р. утр. не жарко. Ч. утр. 2800 кс. и веч. 2400 кс. М. 6300 кс. Уд. в. 1,004 6. нвть.
- > не было. Ч. по 2400 кс. М. 3500 кс. Уд. в. 1,007, 6. нвть.
- > 1 р. вч. веч. не жарко. Ч. по 2400 кс. М. 4000 кс. Уд. в. 1,010; 6. нвть.
- > утр. 2 р. не жарко. Ч. утр. 2000 кс. веч. 2400 кс. М. 6400 кс. Уд. в. 1,004, 6. нвть.
- > вчера 1 р. и утр. 1 р. не жарко. Ч. утр. 2400 кс. и веч. 2000 кс. М. 5600 кс. Уд. в. 1,005, 6. нвть.
- > 1 р. утр. не жарко. Ч. по 2400 кс. М. 5100 кс. Уд. в. 1,006; 6. нвть.
- > 1 р. утр. тапнй же, какъ 20/x. Ч. по 2400 кс. Выпнлнз: со стороны внутрннх органовъ только твердый край селазенки вь боковом. положенн.

*Вывод.* Как по продолжительности лихорадки—до 15-го дня болезни, так и клинически—случай легкий. Температура, тифозное состояние, обложенный язык, опухоль селезенки, понос заставляют признать брюшной тиф. Как во время первой основной волны, так и после нея существует наклонность к запорам. Явления бронхита до 14-го дня; блок слезы в моче до 16-го дня, реакция Эрлиха в моче до 15-го дня болезни. Потеря в весе с 10-го дня до 15-го дня болезни равна 3300 грам или 5,8%. Высшая температура конца лихорадки на обычной кривой совпадает с цифрами ее при двухчасовом измерении. Безлихорадочный промежуток, существовавший все время, продолжался с 16-го дня до 37-го дня болезни т. е. 22 дня. Первые 6 дней его вес больного падает на 1300 грам или на 2,4%. След. общая потеря веса—4600 грам или 8,1%. В следующие 16 дней безлихорадочного промежутка вес, хотя и медленно, но поднимается скачками и к 37 дню болезни (последний день безлихорадочного состояния) достигает 55200 грам, т. е. прибыль в вес=3200 грам или 6,2%. Язык к этому дню становится чистым; испражнение оформлено и хорошо окрашено; самочувствие больного хорошее и лишь не сокращающаяся опухоль селезенки заставляет ожидать возврата, который и наступает на 38 день болезни. Уже с утра этого дня язык снова становится обложенным в задней своей половине, на второй день возврата язык слегка обложен, вес, появляется головная боль; температура нарастает ступенчато и на третий день достигает своего maximum 38,6°. На третий же день возврата появляется понос, продолжающийся все время возврата, опухоль же селезенки держится по прежнему (а что это не была старая от прежней какой либо болезни селезенка, то в пользу этого говорить ее состояние на 77-ой день болезни: лишь в боковом положении больного прощупывался в 77 день край селезенки, тогда как раньше она была на 1—1½ пальца из за края ребер.). Продолжительность лихорадки возврата по обычной кривой равна 8 дням (от 38 до 45 дня болезни), но, так как при двухчасовом измерении температуры на 46 и 47 дни болезни высшая температура была 37,6°, то продолжитель-

ность возврата на самом деле равняется десяти дням. Весь больного первые три дня возврата подымается еще на 300 грам или на 0,5%, четвертый и пятый день возврата остается без перемены и лишь с 6-го дня возврата начинается падение веса, и к концу возврата по *обычной кривой температуры* потеря веса равна 500 грам или 0,9%. По прекращении лихорадки возврата по обычной кривой температуры вес продолжает в общем падать в течение двадцати одного дня и падение это равно 1500 грам или 2,7%. Следовательно за возврат болезни и под его влиянием больной теряет в вес всего 2000 грам или 3,6%. С 67-го дня болезни вес снова начинает подниматься и к 77 дню достигает 57000 грам, т. е. прибыль в вес после возврата—3500 грам или 6,5%. Общая же прибыль с 22-го дня болезни—5000 грам или 9,6%.



8

| № по порядку пути. | Дата болыаца.                         |                                      |      | Объективный<br>явления <sup>1)</sup> . | До какого дня болыаца по-<br>лнсь. | До какого дня болыаца Р.<br>Эрхана. | До какого дня бо-<br>лныа бляоць. |                         |             | Оформленое<br>вспраждение<br>желатое. |                   | Оформлен. по-<br>пражж. хороо<br>опраниеое. |                   | Высота °С<br>поиди алпор.<br>при сравнении<br>кравных. |                         | Высота °С<br>период выдо-<br>решения. | Вьса при мавьт<br>наблюд. | % наденя вьса. |                        | % наденя вьса без пе-<br>решения. |                                       | % поднятя вьса. |          |          | Вьса при мавьт. |        |                        |       |               |       |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|--------|------------------------|-------|---------------|-------|
|                    | Чего<br>не хватало.                   |                                      |      |  |                                    |                                     | Порядоч.                          | Невылат.<br>солочество. | Склады.     | Отъ. какого<br>дня.                   | До какого<br>дня. | Отъ. какого<br>дня.                         | До какого<br>дня. | Сончалат.  | Итга в соал-<br>но днй. |                                       |                           | За алпорал.    | По са пр-<br>кращения. | 0 в м и в.                        | Сколько дней вьса без пе-<br>решения. | Равноднр.       | Снегана. | Меленно. |                 | Вьстр. |                        |       |               |       |
|                    | На какой день болыаца по-<br>ступала. | До какого дня болыаца ли-<br>чорада. | Всв. |  |                                    |                                     |                                   |                         |             |                                       |                   |   |                   |  |                         |                                       |                           |                |                        |                                   |                                       |                 |          |          |                 |        | Съ какого дня болыаца. | %     | Сколько дней. | %     |
| 1                  | 13                                    | 7                                    | 17   | розсол, печени.                        | 16                                 | 12                                  | —                                 | —                       | 25          | —                                     | 37                | —   | 3                 | 37,5   | 55100                   | 8                                     | 6,5                       | —              | —                      | 6,5                               | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 55000         |       |
| 2                  | 14                                    | 7                                    | 16   | розсол, пель, бронх.                   | 17                                 | 12                                  | —                                 | —                       | не в м а в. | —                                     | 30                | 41  | 2                 | 37,2   | 30800                   | 9                                     | 4,3                       | 1              | 0,3                    | 4,6                               | 8                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 38000         |       |
| 3                  | 15                                    | 5(3)                                 | 14   | печени.                                | 24                                 | 9                                   | —                                 | —                       | 26          | 32                                    | 32                | 29  | 4                 | 37,3   | 41500                   | 6                                     | 5,8                       | 6              | 1,0                    | 6,7                               | 4                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 42500         |       |
| 4                  | 17                                    | 12                                   | 15   | розсол, печени.                        | 16                                 | 12                                  | —                                 | —                       | (11)        | (7)                                   | 22                | 29  | —                 | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 61100         |       |
| 5                  | 17                                    | 12                                   | 15   | ро, селес, печени.                     | 18                                 | 15                                  | —                                 | —                       | (15)        | (18)                                  | —                 | 33  | 37                | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 60100         |       |
| 6                  | 19                                    | 5(7)                                 | 17   | ро, печени.                            | 17                                 | отри.                               | —                                 | —                       | 23          | 30                                    | 31                | 43  | —                 | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | 58700 |               |       |
| 7                  | 20                                    | 7                                    | 18   | розсол.                                | 25                                 | 14                                  | —                                 | —                       | (15)        | (17)                                  | 29                | 40  | 49                | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 54200         |       |
| 8                  | 21                                    | 7                                    | 16   | розсол, печени.                        | 18                                 | 13                                  | —                                 | —                       | (12)        | (14)                                  | 26                | 35  | 35                | 40   | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 64000         |       |
| 9                  | 23                                    | 8                                    | 12   | ро, селес, печени.                     | 18                                 | 11                                  | —                                 | —                       | (9)         | (12)                                  | 29                | —   | —                 | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 70300         |       |
| 10                 | 25                                    | 10                                   | 14   | ро, печени.                            | 22                                 | 13                                  | —                                 | —                       | (13)        | (16)                                  | 27                | 34  | 35                | 42   | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 65800         |       |
| 11                 | 28                                    | 10                                   | 15   | ро, печени.                            | 16                                 | 13                                  | —                                 | —                       | (13)        | (14)                                  | 20                | —   | —                 | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 72500         |       |
| 12                 | 15                                    | 5(7)                                 | 22   | розсол.                                | 29                                 | 9                                   | —                                 | —                       | (9)         | —                                     | —                 | 40  | 61                | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 45200         |       |
| 13                 | 17                                    | 9(7)                                 | 19   | розсол, печени.                        | 31                                 | 11                                  | —                                 | —                       | (12)        | не в м а в.                           | 56                | 62  | —                 | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 45200         |       |
| 14                 | 18                                    | 11                                   | 22   | ро, печени, бронх.                     | 21                                 | 14                                  | —                                 | —                       | (14)        | (17)                                  | 31                | 40  | 41                | 52   | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 53400         |       |
| 15                 | 19                                    | 5(7)                                 | 21   | ро, селес, печени.                     | 21                                 | 16                                  | —                                 | —                       | —           | —                                     | 43                | 48  | —                 | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 44500         |       |
| 16                 | 19                                    | 8                                    | 20   | —                                      | 23                                 | 15                                  | —                                 | —                       | (17)        | (18)                                  | 35                | 41  | 41                | 51   | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 57000         |       |
| 17                 | 19                                    | 7                                    | 20   | ро, печени, бронх.                     | 25                                 | 14                                  | +                                 | (11)                    | (16)        | (18)                                  | 31                | 39  | 39                | 45   | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 48600         |       |
| 18                 | 20                                    | 10                                   | 21   | ро, печени, бронх.                     | 18                                 | 13                                  | —                                 | —                       | (15)        | (18)                                  | 40                | —   | 48                | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 63500         |       |
| 19                 | 20                                    | 4(7)                                 | 22   | розсол, печени.                        | 26                                 | 15                                  | —                                 | —                       | (13)        | (21)                                  | 30                | 40  | 40                | 43   | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 59000         |       |
| 20                 | 20                                    | 9                                    | 20   | печени.                                | 26                                 | отри.                               | —                                 | —                       | —           | —                                     | 35                | 38  | 39                | 44   | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 44500         |       |
| 21                 | 27                                    | 6                                    | 22   | розсол, печени.                        | 24                                 | отри.                               | —                                 | —                       | (12)        | (19)                                  | 32                | —   | 43                | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 67800         |       |
| 22                 | 14                                    | 11                                   | 25   | бронхит.                               | 24                                 | —                                   | —                                 | —                       | —           | —                                     | 29                | —   | —                 | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 33200         |       |
| 23                 | 16                                    | 8                                    | 27   | розсол, печени.                        | 30                                 | 20                                  | —                                 | —                       | (24)        | (26)                                  | 43                | 46  | 46                | 65   | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 40000         |       |
| 24                 | 17                                    | 9                                    | 25   | розсол.                                | 25                                 | —                                   | —                                 | —                       | —           | —                                     | 32                | —   | 66                | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 55900         |       |
| 25                 | 17                                    | 9                                    | 25   | ро, селес, печени.                     | 24                                 | отри.                               | —                                 | —                       | —           | —                                     | 28                | 40  | 40                | 47   | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 54300         |       |
| 26                 | 17                                    | 8                                    | 23   | ро, селес, печени.                     | 38                                 | 14                                  | —                                 | —                       | (23)        | (40)                                  | 69                | —   | 72                | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 46400         |       |
| 27                 | 17                                    | 6                                    | 31   | ро, селес, печени.                     | 26                                 | 14                                  | —                                 | —                       | (19)        | (16)                                  | 43                | —   | 52                | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | 38500         |       |
| 28                 | 18                                    | 7                                    | 24   | розсол, печени.                        | 34                                 | —                                   | —                                 | —                       | —           | —                                     | 46                | —   | —                 | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | —             | 50100 |
| 29                 | 18                                    | 6                                    | 35   | ро, селес, печени.                     | 20                                 | —                                   | —                                 | —                       | —           | —                                     | —                 | —   | —                 | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | —             | 54600 |
| 30                 | 18                                    | 6                                    | 30   | салезки.                               | 29                                 | 15                                  | —                                 | —                       | —           | —                                     | 56                | —   | 60                | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | —             | 64000 |
| 31                 | 19                                    | 8                                    | 23   | ро, селес, печени.                     | 21                                 | 16                                  | —                                 | —                       | —           | (10)                                  | 39                | —   | —                 | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | —             | 58500 |
| 32                 | 22                                    | 8                                    | 26   | розсол.                                | 30                                 | 20                                  | —                                 | —                       | (17)        | (20)                                  | 31                | —   | —                 | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | —             | 53500 |
| 33                 | 26                                    | 7                                    | 23   | розсол, печени.                        | 26                                 | 18                                  | —                                 | —                       | (17)        | (19)                                  | 34                | —   | 47                | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | —             | 65700 |
| 34                 | 27                                    | 18                                   | 29   | ро, печени, селес.                     | 29                                 | 26                                  | —                                 | —                       | (22)        | (24)                                  | 35                | —   | 53                | —  | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | —             | 55900 |
| 35                 | 28                                    | 10                                   | 25   | розсол, печени.                        | 31                                 | 17                                  | —                                 | —                       | (17)        | (20)                                  | 34                | 45  | 45                | 49   | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | —             | 56400 |
| 36                 | 20                                    | 8                                    | 33   | ро, печени, селес.                     | 33                                 | 15                                  | —                                 | —                       | —           | (13)                                  | 36                | 54  | 64                | 68   | —                       | —                                     | —                         | —              | —                      | —                                 | —                                     | —               | —        | —        | —               | —      | —                      | —     | —             | 54300 |

<sup>1)</sup> Явление в графе «объективный явления» означает, что на него были все характерные признаки.  
<sup>2)</sup> Эта графа означает, что при сравнении вышей температуры на сутки при двухчасовом ее изме-  
<sup>3)</sup> т. е. вышая 1-ра, наблюдалась при двухчасовом измерении на период выдохновения по выдоху,

тифа; которого же из них не было, указано рядом.  
 реиш съ вышете температурой обычной кравой наблюдалось совпадение или несопадение их.  
 прекращения лихорадки.



| № по порядку группы. |    |           |    | Дата болезни.  |                  |         |        | До какого дня болели инкубационно или болями инкубационно. |      |                     |       | Объективные явления. |      | До какого дня болели инкубационно. |       |                                      |    | До какого дня болели объективно. |       |               |      | Оформление испражнений. |    |                      |  | 1) Высшая точка лихор. кривой.                    |                                | 2) Падение из высш. до 1-го лихорад. |      | Безлихорадочный промежуток на обычной кривой т-ры. |         |  |  |   |                             |                   |      | Вторая волна.      |       |            |       |                               |    |                  |  |                       |  |
|----------------------|----|-----------|----|----------------|------------------|---------|--------|--|------|---------------------|-------|----------------------|------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|----|----------------------------------|-------|---------------|------|-------------------------|----|----------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|------|--|---------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|------|--------------------|-------|------------|-------|-------------------------------|----|------------------|--|-----------------------|--|
| Чего не хватало.     |    | Порочные. |    | Ненорм. выдел. |                  | Слабые. |        | Жесток.  |      | Хорошо оформленные. |       | Сопливатость.        |      | Нужд в сполноднев.                 |       | Всех при поступлении под наблюдение. |    | Сх. наметен для болани.          |       | Существовала. |      | Нужд в сполноднев.      |    | Объективные явления. |  | Сколько дней прерывалось на объективных явлениях. |                                | Общий % падения.                     |      | % падения в день.                                  |         | Сколько дней продолжалось на объективной кривой. |  | Объективные явления.                              |                             | % падения в день. |      | Нужд в сполноднев. |       | После нее. |       | Высшая точка лихорад. кривой. |    | Общий % падения. |  | Всех при наступлении. |  |
| Отъ                  | До | Отъ       | До | Отъ            | До               | Отъ     | До     | Отъ  | До   | Отъ                 | До    | Отъ                  | До   | Отъ                                | До    | Отъ                                  | До | Отъ                              | До    | Отъ           | До   | Отъ                     | До | Отъ                  | До   | Отъ   | До                             | Отъ                                  | До   | Отъ  | До      | Отъ  | До   | Отъ   | До                          | Отъ               | До   | Отъ                | До    | Отъ        | До    | Отъ                           | До |                  |  |                       |  |
| 1                    | 16 | 8         | 17 | +              | печня.           | 18      | 12     | -  | +    | (12)                | +     | (15)                 | 23   | 31                                 | 46    | 53                                   | -  | 1                                | 58200 | 9             | 5    | 6                       | 6  | 12                   | 37,7   | слегка обожж. змьмж, желтый язык.                 | -                              | 1,4                                  | 6,4  | 1,8  | 4       | (30-35)  | 39,6   | сильно обожж. змьмж, слеза селезенки, стул жидко. | 4,4                         | 2,7               | 6,1  | 37,2               | 6,1   | 57800      |       |                               |    |                  |  |                       |  |
| 2                    | 17 | 7         | 18 | +              |                  | 40      | 17     | +  | (15) | +                   | (23)  | +                    | (30) | 54                                 | 61    | 65                                   | 72 | -                                | 2     | 49600         | 8    | 12,1                    | -  | нбтв                 | 2  | 39,4  | вонос, селезенк, обожж. змьмж. | -                                    | 1,6  | 16,9   | -       | 11   | (21-31)  | 39,2  | обожж. змьмж, слеза, вонос. | 4                 | -    | 21,1               | 37,3  | 21,1       | 50000 |                               |    |                  |  |                       |  |
| 3                    | 22 | 8         | 15 | +              | печ, сел., брши. | 24      | отрап. | -  | -    | -                   | -     | 29                   | -    | -                                  | 42    | +                                    | -  | 62500                            | 11    | 1,6           | 4    | 1                       | 5  | 37,6                 | вонос, обожж. змьмж.                             | -   | 2,9                            | 4,5                                  | -    | 1  | (21)    | 38,2   | вонос, обожж. змьмж.                                   | 0,7   | -                           | -                 | 37,4 | 8,6                | 64800 |            |       |                               |    |                  |  |                       |  |
| 4                    | 25 | 12        | 18 | +              | роз., печня.     | 16      | -      | -  | -    | -                   | 25-29 | -                    | -    | -                                  | 40-45 | +                                    | -  | 68800                            | 13    | 4,1           | 10   | -                       | 10 | 10                   | 37,4   | слегка обожж. змьмж, слеза, стул кашцеобразный.   | -                              | 2,9                                  | 6,8  | 3,7  | 4       | (29-32)  | 38,8   | обожж. змьмж, стул кашцеобразный.                 | 3,6                         | 3,2               | -    | 37,3               | 8,6   | 69600      |       |                               |    |                  |  |                       |  |
| 5                    | 17 | 5         | 23 | +              |                  | 14      | 12     | -  | -    | +                   | (10)  | 46                   | -    | -                                  | 56    | -                                    | -  | 58900                            | 7     | 10,4          | 10   | 3                       | 13 | 38,0                 | слегка обожж. змьмж, слеза, стул кашце.          | -   | 2,1                            | 12,3                                 | 3,7  | 2  | (36-37) | 39,8   | обожж. змьмж, слеза, стул кашце.                       | 1,1   | -                           | 10,5              | 37,3 | 10,5               | 56800 |            |       |                               |    |                  |  |                       |  |
| 6                    | 19 | 8         | 33 | +              | роз., печня.     | 41      | 28     | -  | +    | (28)                | +     | (29)                 | 65   | 72                                 | 73    | 76                                   | -  | 9                                | 45500 | 9             | 20,9 | 6                       | 6  | 12                   | 38,3   | слегка обожж. змьмж, жидк. и кашцеобразн.         | -                              | 1,7                                  | 22,4 | -  | 3       | (48-50)  | 38,4   | обожж. змьмж, вонос.                              | 0,3                         | 0,8               | 10,3 | 37,5               | 10,3  | 39000      |       |                               |    |                  |  |                       |  |
| 7                    | 30 | 10        | 24 | +              | роз., печня.     | 22      | отрап. | -  | -    | -                   | 27    | 30                   | 40   | 52                                 | +     | -                                    | -  | 50000                            | 12    | 4,8           | 7    | 1                       | 8  | 37,7                 | слегка обожж. змьмж, стул 2 последние дни жидко. | -   | 1,1                            | 5,8                                  | 0,7  | 1  | (33-33) | 38,3   | обожж. змьмж, вонос, чувствительность прямой подложки. | -   | 0,7                         | 5,8               | 37,3 | 7,4                | 56600 |            |       |                               |    |                  |  |                       |  |

1) т. е. лихорадка основной волны тифа.

2) т. е. за лихорадку основной волны тифа.


3) «Существовала» — при двухдневном падении температуры сколько дней было безлихорадочных; а

4) т. е. селезенка прощупывается.


5) Цифры в скобках означают дни болезни.

«нбтв» показывает, сколько дней с лихорадкой. Остальными обозначениями т. же, что в первых двух таблицах.

В—въ № 5333.



Г—ВЪ № 2650.







## ПОЛОЖЕНІЯ.

1) Theobromin natrio-salicyl. есть слабое и невѣрное мочегонное средство.

2) Ни альбуминиметръ Esbach'a, ни другіе предложенныя взаимно въсового способы опредѣленія бѣлка въ мочѣ количественно не удовлетворяютъ своему назначенію.

3) Возможность перенесенія больнымъ возврата брюшнаго тифа на ноги, а также возможность помѣщенія больного при возвратѣ въ другую больницу не должно быть упускаемо изъ виду при вычисленіи процента возвратовъ брюшнаго тифа.

4) Слѣдуетъ отказаться отъ названія «холерный тифозъ» при азіатской холерѣ, такъ какъ явленія, описываемыя подъ этимъ именемъ, есть явленія уремии.

5) При сердечныхъ порокахъ въ періодѣ сильнаго расстройства компенсаціи назначеніе большихъ дозъ digitalis'a (видѣ infusum digit. с. 0,72—1,0 на 90—120 воды, сначала 2 стол. ложки, а затѣмъ по одной стол. чрезъ 1 часъ) дѣйствуетъ во многихъ случаяхъ благотворно, уменьшая чрезъ 4—5 часовъ рѣзкія явленія застоя крови; а послѣдующее назначеніе такихъ же дозъ въ теченіи 3—4 дней уничтожаетъ отеки и дѣлаетъ больного способнымъ работать.

6) Разница въ пульсѣ на лучевыхъ и сонныхъ артеріяхъ той и другой стороны тѣла какъ признакъ аневризмы восходящей части дуги аорты долженъ быть принимаемъ съ осторожностью, такъ какъ такое явленіе въ пульсѣ получается и при stenosis ostii atrioventr. sin., и даже просто при arterioscleros'ъ.

## Curriculum vitae.

Павелъ Игнатьевичъ Дроздовскій, православнаго вѣроисповѣданія, сынъ чиновника, родился въ 1863 г. въ Петербургѣ. Въ 1884 г. окончилъ курсъ классической гимназіи при Императорскомъ Историко-Филологическомъ Институтѣ въ Петербургѣ. Въ томъ же году поступилъ на приготовительный (1-й) курсъ Императорской Военно-Медицинской Академіи. Въ 1888 году за сочиненіе «О вліяніи бодрствованія и сна на выдѣленіе и пищеварительную способность желудочнаго сока» Конференціей Императорской Военно-Медицинской Академіи награжденъ дипломомъ на золотую медаль. Въ 1889 году утвержденъ въ званіи лекаря. Въ октябрь 1891 года окончилъ экзаменъ на степень доктора медицины. Съ декабря 1889 г. по августъ 1890 г. состоялъ сверхштатнымъ ординаторомъ въ Александровской въ память 19 февраля 1861 г. больницѣ; съ августа же 1890 г. состоитъ врачомъ-ассистентомъ въ той же больницѣ.

Кромѣ настоящей работы «Къ вопросу о возвратахъ брюшнаго тифа», представленной для полученія степени доктора медицины, имъ напечатано:

- 1) О количественномъ опредѣленіи бѣлка въ мочѣ косвенными способами (Больничная газета Боткина 1890—1891 г.).
- 2) Наблюденія надъ дѣйствиемъ theobrominum natrio-salicyl. на нефритиковъ и сердечныхъ больныхъ. (Больничная газета Боткина 1891 г.)-