


**Міністерство освіти і науки України
Харківський національний медичний університет
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології**



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕЙРОНАУК ЗБІРНИК ТЕЗ

Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів



Харків, 2018

УДК 616.89

A43 Актуальні питання нейронаук: Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів (Харків 27 квітня 2018 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний медичний університет – Харків: – 2018. – 61 с.

Відповідальний за випуск професор Г.М. Кожина

Відповідальність за якість та достовірність матеріалів несуть автори публікацій.

показник. Також майже 50 % серед опитаних студентів є абсолютно здоровими. Але з 46 % осіб, що набрали мінімальну кількість балів і не мають симптомів депресії, 20% респондентів відповіли, що дуже часто думають про самогубство, але не будуть його скоювати. Дійсно, серед респондентів не було спроб суїциду.

Шаповал В.В

ПРОВІДНІ ЧИННИКИ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ АДДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Харківський національний медичний університет

Кафедра психіатрії, наркології, та медичної психології

м.Харків, Україна

Науковий керівник - к.мед.н. Зеленська К.О.

Актуальність. Кожного року людство стикається з проблемою смертності від алкоголізму чи наркоманії в мільйонних масштабах по всьому світі. В рейтингу смертності від алкоголізму ВОЗ Україна посідає друге місце (ВОЗ 2012р.) а за даними вітчизняних соціологів, що до вживання канабіоїдів, то майже 2.5 мільйони працездатного населення зловживають марихуаною. Ще одним не малозначним фактом є те, що починають зловживання психоактивним речовинами здебільшого люди молодого віку, а це ставить під удар культурний та соціально-економічний потенціал нації. Студенти-медики, на жаль теж входять до можливої групи ризику тому це питання потребує вивчення.

Мета. З'ясувати вплив основних чинників на формування аддиктивної поведінки серед студентів-медиків. Скласти уявлення про типаж найбільш схильного до аддикції студента.

Матеріали та методи: було проведено дослідження учасниками якого стали 88 студентів-медиків. Дослідження включало такі опитувальники Alcohol Use Disorder Indification Test (AUDIT), Tabacoo Use Disorder Indification Test (TUDIT), Canabis Use Disorder Indification Test (CUDIT), та питання що стосуються студентського мікросоціуму.

Результати: результати опитування були наступні: за даними тесту AUDIT не вживають алкоголь (або вживають 1-2 рази на місяць) – 73.8 %, вживають алкогольні напої час від часу – 20.6%, знаходяться в групі близькій до залежності – 5.6%, залежні - 0%. Відповідно CUDIT ніколи не вживали марихуану – 86.6%, вживають час від часу – 9.1%, група, вживання яких знаходиться на шляху до формування залежності – 4.3%, залежні - 0%. За TUDIT вживання тютюну серед респондентів розподілилось наступним чином. Не курять – 50%, курять не часто (кілька разів на місяць) – 9.1%, знаходяться на шляху до формування залежності (курять часто) – 7.9%, залежні - 33%.

Висновки: таким чином, можна сказати, що проблема аддиктивної поведінки також актуальна і для студентів медичного вишу. Більшу частину респондентів складають люди рівень вживання ПАВ для яких, не є

критичним, та вже зараз у деяких можна відмітити схильність до розвитку залежності і вже зараз необхідно вдатися до заходів, які попередять цю проблему. Що до формування типу студента найбільш схильного до розвитку залежності то він є наступний: частіше за все це хлопці віком 23+/-5 років які проживають самотійно або у гуртожитку, та не проявляють особливої зацікавленості у навчальному процесі чи в інших видах діяльності. Отримані нами данні слід урахувувати під час надання психологічної підтримки студентам на всіх етапах навчання у будь якому вищому навчальному закладі.

Щебетенко В.О.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕМАНТИНУ ГІДРОХЛОРИДУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МОВНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ІШЕМІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ

Харківський національний медичний університет

Кафедра неврології №1

м.Харків, Україна

Науковий керівник – доц., к.мед.н. Різниченко О.К.

Актуальність. Гострі порушення мозкового кровобігу (ГПМК) займають третє місце в списку причин смерті і є однією з провідних причин інвалідизації населення: лише у 20% осіб, після перенесеного ішемічного інсульту, повністю відновлюється працездатність. Разом з руховим або чутливим дефектом у більшості пацієнтів розвиваються і когнітивні порушення. До найбільш значущих постінсультних когнітивних дефектів належать мовні порушення. Мовний дефект веде до соціальної дезадаптації пацієнтів, значно знижує їх комунікативні можливості, повсякденну життєву активність, сприяє ізоляції. На жаль, часто мовний дефект носить досить стійкий характер. У більшості випадків за умови тривалих систематичних корекційних занять з логопедом вдається досягти лише незначного поліпшення мовної функції.

Метою роботи є вивчення впливу мемантину гідрохлориду (М) на ефективність відновлення вищих психічних функцій, в тому числі мови, у пацієнтів з лівопівкульними інсультами.

Матеріали та методи: у дослідження були включені 11 пацієнтів у ранньому відновному періоді після ішемічного інсульту в басейні лівої середньо-мозкової артерії з неврологічними розладами легкої і середньої інтенсивності, із елементами моторної афазії та постінсультними когнітивними порушеннями. Вік хворих – від 62 до 74 років, з них 4 жінки та 7 чоловіків. Усім пацієнтам на тлі комплексної нейрореабілітації призначався М на 90 днів у початковій дозі 5-10 мг / добу з поступовим збільшенням до 20 мг / добу. Контрольну групу склали 8 пацієнтів, які пройшли курс терапії та нейрореабілітації без призначення М. Також враховувалися дані нейропсихологічного тестування. Результати: У більшості пацієнтів на 3-4 тиждень прийому препарату логопеди реєстрували якісну зміну мовного дефекту. Найбільший приріст балів спостерігався при

РІВЕНЬ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ	49
Федоренко Т.В.	50
ОСОБЛИВОСТІ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДАХ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ	50
Федорченко С.В.	50
ВІКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХВОРИХ ІЗ ЗАПАМОРОЧЕННЯМ	50
Цибенко Д. С.	52
ОЦІНКА ДИНАМІКИ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ ВДНЗУ “УМСА”	52
Шакірова О.О.	53
СУЇЦИД І ДЕПРЕСІЯ У МОЛОДИХ ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ОСІБ.....	53
Шаповал В.В.	54
ПРОВІДНІ ЧИННИКИ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ АДДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ.....	54
Щебетенко В.О.....	55
ЗАСТОСУВАННЯ МЕМАНТИНУ ГІДРОХЛОРІДУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МОВНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ІШЕМІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ	55
Ярмоленко М.Я.	56
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВИНИКНЕННЯМ СИНДРОМУ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АЛКОГОЛЮ У ХВОРИХ НА ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД	56