Серія докторскихъ диссертацій, допущенныхъ къ защитѣ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ военно-медицинской академіи въ 1910—1911 учебномъ году.

7 НОЯ 2012

БИБЛІОТЕКА
Кафедры Общей Гигиены
1-го Харьковскаго Медицинскаго Института

№ 9.

КЪ ВОПРОСУ О СКОРОПОСТИЖНОЙ СМЕРТИ

по даннымъ Судебно-медицинскаго кабинета ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-медицинской академіи за 10 лѣтъ (1900—1909 гг.).

992

ДИССЕРТАЦІЯ

НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

Л. Л. Плешкова.

Цензорами диссертаціи, по порученію Конференціи, были: ординарные профессора Д. П. Косоротовъ и А. И. Моисеевъ и приватъ-доцентъ А. А. Липскій.

Переучет 1966 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Ю. Н. Эрлихъ (влад. А. Э. Коллинсъ). Мал. Дворянская, 19.
1910.

1950
Переучет-60

Докторскую диссертацію врача Л. Л. Плешкова подъ заглавіемъ: «Къ вопросу о скоропостижной смерти по даннымъ судебно-медицинскаго кабинета Императорской военно-медицинской академіи за 10 лѣтъ (1900—1909 гг.)» печатать разрѣшается съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи было представлено въ Императорскую военно-медицинскую академію 500 экземпляровъ самой диссертаціи и 300 экземпляровъ краткаго резюмэ ея (выводовъ), причемъ 150 экземпляровъ диссертаціи и выводы должны быть доставлены въ канцелярію академіи, а остальные 350 экземпляровъ диссертаціи—въ библіотеку академіи.

С.-Петербургъ. 16 октября 1910 года.

Ученый секретарь,
академикъ *А. Діанинъ.*

Харк. Мед. Інститут
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Опредѣленіе понятія о скоропостижной смерти.

Понятіе о скоропостижной смерти давно существуетъ въ медицинской литературѣ. Уже двѣсти лѣтъ назадъ въ классическомъ произведеніи Lancisi (1709) «De subitaneis mortibus» дается такое толкованіе этому понятію: «Subitanea seu repentina mors, siquidem appellari solet quae per morbum celerrimi motus homines ut plurimum sanos, vel morbis inducias permittentibus detentos, absque ullo vel certe breviori agone de viventium numero tollit; et cum plerunque inopinato imperitis adveniat, terribile facit moriendi compendium». Черезъ полтораста лѣтъ Aran отмѣчаетъ большую справедливость этихъ словъ и въ своемъ сочиненіи «Des morts subites» (1853) даетъ такое-же опредѣленіе, отмѣчающее быстроту и неожиданность смерти, въ состояніи ли здоровья или болѣзни: «toutes les morts qui, survenant dans un temps très-court, presque toujours d'une manière imprévue, frappent l'homme en santé ou en maladie». Тѣ же положенія высказываетъ и Vibert въ своемъ «Précis de médecine légale» (1886): «On comprend en médecine légale sous le nom de mort subite les cas où la mort survient plus ou moins rapidement, en quelques secondes, quelques heures ou même quelques jours, mais d'une façon imprévue, frappant sans cause apparente un sujet jusquelà bien portant ou n'ayant présenté que des troubles de la santé très légers ou du moins paraissant tels aux personnes de son entourage». Точнѣе въ судебно-медицинскомъ смыслѣ опредѣляетъ скоропостижную смерть prof. Tourdes: «la cessation soudaine ou très rapide de la vie, par suite de causes internes ou pathologiques, en dehors de toute action mécanique ou toxique, survenant inopinément chez une personne, qui paraissait en bonne santé ou dont l'état de maladie ne faisait pas actuellement prévoir une issue fatale». Въ своемъ извѣстномъ сочиненіи «La mort et la mort subite» (1895) prof. Brouardel опредѣляетъ скоропостижную смерть,

64252

Інститут
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

какъ «la terminaison rapide et imprévue d'une maladie aiguë ou chronique qui le plus souvent a évolué d'une façon latente. Pour nous (médecins-légistes), la mort subite vraie est un accident imprévu dans une maladie inconnue qui a évolué sans éveiller l'attention». Или же, какъ коротко характеризуетъ скоропостижную смерть Stoenescu: «absence d'une action traumatique ou toxique, état de santé apparente et brusquerie avec laquelle elle se produit». «Скоропостижною смертью мы будемъ называть такую, которая является быстро, почти мгновенно, безъ предшествовавшихъ какихъ-либо измѣненій въ организмѣ, замѣтныхъ окружающимъ, или о которыхъ говорилъ бы самъ умершій. Скоропостижная смерть несомнѣнно обусловливается патологическими причинами, которыя протекали медленно и скрыто, такъ что не были замѣтны для больного и окружающихъ.» (Игнатовскій, Судебная медицина. Юр. 1910).

Значеніе изученія причинъ скоропостижной смерти.

Изученіе причинъ скоропостижной смерти имѣетъ большой интересъ для врача. Обстановка смерти иногда вызываетъ подозрѣніе въ самоубійствѣ; часто самоубійства были скрываемы окружающими и имъ придавался видъ скоропостижной естественной смерти; правильное разрѣшеніе этого вопроса имѣетъ значеніе при страхованіи жизни, такъ какъ въ случаѣ самоубійства обязательства страховыхъ обществъ прекращаются. Непредвидѣнное, болѣе или менѣе быстрое, наступленіе смерти заставляетъ иногда подозрѣвать насильственную смерть, отравленіе, при видѣ, напр., предсмертныхъ припадковъ, тошноты, рвоты и пр., въ особенности если смерть наступаетъ внезапно послѣ принятія пищи, питья, лекарства, да еще если при жизни умершій находился въ дурныхъ отношеніяхъ съ окружающими. Иногда незначительныя поврежденія, полученныя въ борьбѣ или въ дракѣ съ товарищами, или какой-нибудь толчокъ, ударъ со стороны ставится въ связь со смертельнымъ исходомъ, тогда какъ ни то, ни другое не стояли ни какой-либо логической связи. Только точный разборъ обстоятельствъ дѣла и тщательное изслѣдованіе трупа даютъ возможность установить точную причину естественной скодопостижной смерти и разсѣять всякія подозрѣнія, а это возможно только при точномъ знакомствѣ съ причинами скоропостижной смерти.

Аганъ, отмѣчая, что въ его время изученіе скоропостижной

смерти гораздо больше занимаетъ судебныхъ врачей, чѣмъ патологовъ, прибавляетъ: какой большой интересъ для патолога, когда онъ сразу можетъ найти ясныя указанія о различныхъ причинахъ этого рода смерти, объ обстоятельствахъ, способствующихъ ей, и дать терапевтическія показанія, съ которыми онъ можетъ противостоять этимъ случайностямъ.

Исторія развитія взглядовъ на причины скоропостижной смерти.

Взгляды врачей на причины скоропостижной смерти мѣнялись въ зависимости отъ господствующихъ въ медицинѣ взглядовъ. Долгое время врачи, на подобіе публики, приписывали поврежденіямъ нервныхъ центровъ, въ особенности апоплексіи, происхожденіе большинства внезапныхъ смертей. По William A. Guy, въ статистикѣ Ferrario (1834), обнимающей случаи скоропостижной смерти болѣе чѣмъ за 50 лѣтъ съ 1774 по 1830 г. въ Миланѣ и его окрестностяхъ, указаны причины смерти

отъ мозга («including apoplexy, cerebral concussion, vertigo and coma»)	879	случаевъ.
„ сердца «including diseases of the heart, angina pectoris, aneurysm and haemorrhage»)	150	„
„ легкихъ («including asphyxia, suffocative catarrh, and pulmonary apoplexy»)	14	„
тяжелая работа	5	„
	1048	случаевъ.

Позднѣе скоропостижную смерть стали связывать съ разрывами сердца или большихъ сосудовъ. Противъ этого мнѣнія выступилъ Devergie въ своей работѣ «De la mort subite de ses causes, de sa fréquence suivant l'âge, le sexe et les saisons» (1830). На 40 случаевъ внезапной смерти, причины которой онъ могъ отыскать, на долю «congestion pulmonaire» отдѣльно или въ связи съ «congestion cérébrale» приходится больше половины, и только два случая—отъ разрыва сердца и сосудовъ, и три—отъ «syncope». Къ тому же результаты приняли Francis (Guy's hospital reports, 1845). Наконецъ Farre въ «Recherches sur les morts subites» (Lond. med. gaz., t. XXIX стр. 632) на 1087 случаевъ скоропостижной смерти нашелъ 36 разрывовъ сердца и большихъ сосудовъ, и Herrich и Popp (1848) («Der plötzliche Tod aus inneren Ursachen») на 96 случаевъ—три разрыва. Такъ передъ фактами падаетъ мнѣніе, приписывавшее частоту смерти разрыву сердца и большихъ сосудовъ, мнѣніе, основанное

болѣе всего на часто цитируемой статистикѣ Quain'a, насчитывавшей на 68 случаевъ жирно-перерожденнаго сердца 28 разрывовъ сердца. Но взглядъ продолжалъ еще долго жить, и еще теперь обычное выраженіе въ публикѣ и въ прессѣ—смерть отъ разрыва сердца.

Въ 1849 выходитъ работа Aran'a. Herrich и Popp. и Aran показали, что наиболѣе частая причина скоропостижной смерти—болѣзненныя измѣненія сердца и большихъ сосудовъ. Aran изъ 202 наблюденій, почерпнутыхъ наудачу изъ разныхъ работъ по общей и частной патологіи, изъ разныхъ французскихъ и иностранныхъ журналовъ, нашелъ 114 случаевъ патологическихъ измѣненій сердца и сосудовъ безъ разрыва. «Если искать условій, предрасполагающихъ къ приливамъ крови къ легкимъ и къ мозгу или вызывающихъ ихъ даже при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, то надо признать, что въ большомъ числѣ случаевъ эти приливы вызваны предшествовавшими болѣзнями, часто скрытными, сосудистой системы». Разсматривая нѣкоторые случаи Devergie, онъ отмѣчаетъ, что сердце было увеличено въ объемѣ, если не гипертрофировано. За 30 лѣтъ до Aran'a prof. Testa писалъ: «удивительно, какъ со времени опубликованія славной книги Lancisi о внезапныхъ смертяхъ и со времени наблюденій Valsalva, Santorini и Morgagni, не упомянули только о тѣхъ апоплексіяхъ и тѣхъ внезапныхъ смертяхъ, которыя поражаютъ людей, одержимыхъ болѣзнями сердца. Я увѣренъ, что еслибы вскрытія производились съ большею тщательностью, то давно убѣдились бы въ томъ, что болѣзни сердца въ произведеніи этихъ такъ называемыхъ апоплексій, быстро ведущихъ къ смерти, играютъ болѣе важную роль, чѣмъ обыкновенно полагаютъ». Дѣйствительно, Laacisi первый указалъ на заболѣванія сердца и сосудовъ, какъ на причину внезапной смерти. Начиная съ Lancisi, во всѣхъ работахъ, трактующихъ о болѣзняхъ сердца, занимаетъ мѣсто отношеніе послѣднихъ къ скоропостижной смерти. Kreyzig идетъ дальше и опредѣленно указываетъ, какія заболѣванія въ особенности могутъ вызвать внезапную смерть при наружномъ хорошемъ здоровьи: истончение стѣнокъ сердца и *измѣненія отверстій сердца*, главнымъ образомъ *тѣ, которыя допускаютъ возвращеніе крови въ полость, только что ею оставленную.* (Die Krankheiten des Herzens, Berlin 1814).

Большія завоеванія, которыя сдѣлала патологическая анатомія со времени этихъ работъ по отношенію къ сосудистой системѣ, изслѣдованія Virchow'a болѣзненнаго процесса, извѣстнаго прежде подъ именемъ атероматознаго или артеріосклероза и названнаго Virchow'мъ Endarteriitis chronica deformans, дали возможность точнѣе установить зависимость скоропостижной смерти отъ анатомическихъ измѣненій сосудистой системы.

Новѣйшія статистики о наибольшей частотѣ скоропостижной смерти отъ заболѣваній сосудистой системы.

Изученіе новѣйшихъ статистикъ приводитъ насъ къ общему заключенію, что самая частая причина скоропостижной смерти зависитъ отъ патологическаго состоянія сосудистой системы и особенно сердца и аорты.

У Herrich'a и Popp'a (1848) на 96 случаевъ скоропостижной смерти, собранныхъ ими лично, приходится 42% на измѣненія сердца и сосудистой системы.

Lacassagne и Coutagne при 26 случаяхъ скоропостижной смерти въ 14-и нашли смерть въ прямой зависимости отъ заболѣваній сердца, въ 9-и отъ пораженія легкихъ, въ 5-и изъ послѣднихъ также констатированы важныя измѣненія сердца и сосудовъ.

E. Hofmann («Über den plötzlichen Tod aus natürlichen Ursachen» 1884) изъ 375 случаевъ скоропостижной смерти (дѣтей и взрослыхъ) въ 116 случаяхъ нашелъ причину смерти отъ паралича сердца въ зависимости отъ патологическаго состоянія сосудистой системы.

A. Lesser (1888) приводитъ 171 случай внезапной смерти, въ большинствѣ взятые изъ судебнаго института въ Берлинѣ и отчасти въ Бреславлѣ; изъ нихъ 101 случай смерти вызваны нарушеніями сердечно-сосудистой системы. Хронический эндартеріитъ выраженъ былъ въ 75 случаяхъ: въ 45 случаяхъ смерть произошла отъ паралича сердца, въ 10-и—отъ кровоизліянія въ мозгъ, въ 8-и отъ разрыва аневризмы базальныхъ сосудовъ, 1 разъ—отъ разрыва аневризмы сердца и 10 разъ отъ разрыва аневризмы аорты, 1 разъ—отъ hydrothorax'a вслѣдствіе порока сердца.

A. Key-Åberg (1886) сообщилъ статистику скоропостижной смерти у лицъ выше 14 лѣтъ за 5-лѣтіе съ 1881—1886 изъ Судебно-медицинскаго Института проф. Hofmann'a въ Вѣнѣ, гдѣ изъ 852 случаевъ 634 случая смерти зависятъ отъ Endarteriitidis chron. deform.

Wynn Westcott (1891 Лондонъ), разсматриваетъ 303 случая изъ 1000, которые нужно обозначить какъ скоропостижные;

изъ нихъ 149 принадлежатъ пораженіямъ сердца и аорты. Разрывъ аневризмы аорты наблюдался 15 разъ, разрывъ сердца—3 раза.

Kleinberg (1892) обработалъ матеріалъ Дерптскаго Судебно-Медицинскаго Института за 12 лѣтъ и матеріалъ Рижскаго городового врача Ф. Шульца. Всѣхъ случаевъ—277; въ 133 изъ нихъ причиною скоропостижной смерти былъ Endarteriitis chronica deformans со всѣми его послѣдствіями.

Э. Беллинъ (1893) приводитъ результатъ своихъ 14-лѣтнихъ вскрытій по городу Харькову съ 1879 г. Изъ 1230 вскрытій на долю скоропостижной смерти приходится 388; исключивъ изъ нихъ 68, умершихъ въ больницѣ раньше 24 часовъ по поступленіи, подвергается изслѣдованію 320 случаевъ. Въ 162 случаяхъ летальный исходъ находился въ зависимости отъ заболѣваній сосудистой системы, resp. Endarteriitis chronica deformans.

Vibert (1895) сообщаетъ въ своей статистикѣ за 14 лѣтъ судебно-медицинской практики 112 случаевъ скоропостижной смерти у взрослыхъ; случаи всѣ были судебно-медицинскаго характера въ строгомъ смыслѣ слова. Изъ нихъ сердечно-аортальныхъ случаевъ было 31.

В. Александровъ (1901) выдѣляетъ 162 случая скоропостижной смерти за 16 лѣтъ своихъ вскрытій по Мелитопольскому уѣзду. Разстройства органовъ кровообращенія составляли причину смерти въ 94 случаяхъ, причемъ въ 68 случаяхъ былъ ясно выраженъ артеріосклерозъ и въ 12 случаяхъ была недостаточность заслонокъ и клапановъ сердца. Изъ своего матеріала исключаетъ 35 случаевъ смерти отъ острого отравленія алкоголемъ, во всѣхъ почти случаяхъ этого рода смерти встрѣчался артеріосклерозъ.

Lochte (1904) въ Гамбургѣ изъ 101 случая внезапной смерти опредѣляетъ пораженія сердца 31 разъ, аневризмы и болѣзни сосудовъ—7, хронический алкоголизмъ—25 разъ. Разрывъ аневризмы наблюдался имъ 3 раза, разрывъ сердца—1 разъ, кровоизліяніе въ мозгъ—7 разъ. Артеріосклерозъ, какъ причина смерти, фигурируетъ 31 разъ; болѣе высокія степени артеріосклероза констатированы имъ 44 раза.

Для нашей работы мы пользовались протоколами вскрытій, произведенныхъ при судебно-медицинскомъ кабинетѣ Императорской Военно-Медицинской Академіи за 10 лѣтъ, а именно съ января 1900 г. до января 1910 года. Трупы доставлялись изъ различныхъ полицейскихъ участковъ и нѣкоторыхъ больницъ Петербурга и изъ Клиническаго военнаго госпиталя, въ

теченіе холоднаго времени года. Разсматриваемый нами матеріалъ касается только случаевъ, носящихъ характеръ естественной скоропостижной смерти: отсутствіе травматическаго и токсическаго дѣйствія, состояніе кажущагося здоровья и внезапность наступленія смерти. Принципъ этотъ не выдержанъ строго, такъ сюда вошли случаи, касающіеся больныхъ, умершихъ вскорѣ по поступленіи (раньше 24 часовъ) ихъ въ лечебное заведеніе; согласно существующимъ законоположеніямъ, они признаются скоропостижно умершими, подлежащими вскрытію для выясненія болѣзни и причины смерти ихъ; они и дома могли лежать больными, и смерть ихъ не являлась неожиданной, внезапной. Вообще имѣющіяся статистики скоропостижной смерти не отличаются какимъ-нибудь однимъ, общимъ имъ всѣмъ принципомъ, авторы не рѣдко не даютъ опредѣленія понятія о скоропостижной смерти; но всѣ же эти различія не такъ существенны и въ общемъ приводятъ къ довольно сходнымъ выводамъ.

При распредѣленіи анатомическаго матеріала мы придерживались группировки, проведенной въ диссертаціи Ѳ. Ушакова «Трупный матеріалъ судебно-медицинской каѳедры Императорской Военно-Медицинской Академіи за 1885—1900 гг.», въ основу которой положенъ планъ работы проф. Lesser'a; такимъ образомъ наша работа, что касается трупнаго матеріала скоропостижно-умершихъ, является въ этой части продолженіемъ названной работы, и въ дальнѣйшемъ мы подвергали и ее статистической обработкѣ. Матеріалъ разбитъ на три группы: въ первую вошли случаи, гдѣ причина скоропостижной смерти не могла быть строго установлена, во вторую—случаи, въ которыхъ причина смерти точно доказана вскрытіемъ, и въ третью—случайная смерть.

Случаи первой группы раздѣлены на слѣдующія категоріи:

а) Случаи, гдѣ всѣ органы при вскрытіи найдены безъ видимыхъ уклоненій отъ нормы, или, по крайней мѣрѣ, въ нихъ не было замѣтно такихъ измѣненій, которыя можно было бы признать за причину смерти.

2 случая смерти отъ падучей болѣзни.

b) Случаи, гдѣ находились анатомически доказанныя хроническія пораженія важныхъ для жизни органовъ; эти измѣненія можно было бы признать за причину скоропостижной смерти, но они были такого свойства, что не смотря на сильное развитіе, часто при жизни ничѣмъ не проявлялись.

344 случаевъ пораженія сердца и сосудовъ.

7 случаевъ пораженія мозга.

Въ 91 случаяхъ наблюдался органическій порокъ сердца или одинъ, или одновременно съ другими измѣненіями въ сердцѣ или въ его сосудахъ:

Въ 13 случаяхъ была недостаточность сердечныхъ клапановъ,
Въ 61 случаѣ недостаточность сердечныхъ клапановъ и endoarteriitis deformans chronica аорты или вѣнечныхъ сосудовъ сердца,
Въ 12 случаяхъ недостаточность сердечныхъ клапановъ и ожирѣніе сердца,
Въ 5 случаяхъ недостаточность сердечныхъ клапановъ, endoarter. deform. chron. аорты или вѣнечныхъ сосудовъ сердца и расширеніе аорты.

Въ 183 случаяхъ былъ найденъ endoarteriitis deformans chronica аорты или вѣнечныхъ сосудовъ сердца одинъ или въ соединеніи съ другими измѣненіями сердца:

Въ 105 случаяхъ—endoarteriitis deformans chronica аорты или вѣнечныхъ сосудовъ сердца,
Въ 60 случаяхъ endoarteriitis deformans chronica и endocarditis chronica,
Въ 5 случаяхъ endoarteriitis deform. chron. и расширеніе аорты,
Въ 13 случаяхъ endoarter. def. chron., endocarditis chron. и расширеніе аорты.

Въ 31 случаѣ было ожирѣніе сердца, большею частю соединенное съ жировымъ перерожденіемъ сердечной мышцы,
въ 7 случаяхъ хронической эндокардитъ и
въ 32 случаяхъ дегенеративныя измѣненія сердечной мышцы.
Случаевъ паралича головного мозга было 7, изъ нихъ 3 было вслѣдствіе опухолей головного мозга, 1 — гнойника въ мозгу, 2—размягченія головного мозга и 1—водянки его.

c) Случаи, гдѣ существовали острыя или хроническія пораженія важныхъ для жизни органовъ, въ большей или меньшей степени своего развитія, при чемъ, однако, эти пораженія не въ состояніи объяснить наступленія скоропостижной смерти (185 случаевъ).

31 случай крупознаго воспаленія легкихъ,
19 случаевъ катарральной пневмоніи,
1 случай гриппозной пневмоніи,
26 случаевъ туберкулеза легкихъ,
7 случаевъ капиллярнаго бронхита,
4 случая плеврита,
2 случая острaго воспаленія верхнихъ дыхательныхъ путей,
1 случай отека гортани,
1 случай рака гортани,
15 случаевъ перитонита,
6 случаевъ катарра кишекъ,
9 случаевъ заворота кишекъ,
1 случай цирроза печени,

1 случай рака пищевода,
1 случай рака матки,
7 случаевъ воспаленія почекъ,
9 случаевъ воспаленія мозговыхъ оболочекъ,
30 случаевъ инфекціонныхъ заболѣваній:
17 случаевъ брюшного тифа,
3 случая септицеміи,
1 случай холеры (?),
1 случай сибирской язвы,
1 случай столбняка,
1 случай инфлюэнцы,
1 случай оспы,
1 случай скарлатины,
5 случаевъ дифтеріи,
1 случай гнойнаго воспаленія средняго уха,
3 случая ракита,
1 случай эклампсіи,
2 случая истощенія,
1 случай лейкеміи,
1 случай purpurae haemorrhagicae,
4 случая смерти отъ хлороформнаго наркоза.

Во второй группѣ смертельный исходъ былъ обусловленъ 102 раза:

a) давленіемъ на мозгъ,
63 случая кровоизліянія въ мозгъ и его оболочки,

b) давленіемъ на сердце,
4 раза вслѣдствіе разрыва сердца,
6 разъ вслѣдствіе разрыва аневризмы аорты,
8 разъ вслѣдствіе разрыва аорты (изъ нихъ 4—aneurisma dissecans),

c) задушеніемъ,
5 разъ вслѣдствіе кровотеченія изъ легкихъ и
6 разъ вслѣдствіе кровотеченія изъ разрыва аневризмы аорты,

d) острымъ малокровіемъ,
4 раза вслѣдствіе маточнаго кровотеченія во время и послѣ родовъ,
1 разъ вслѣдствіе кровотеченія изъ пупка,
1 разъ вслѣдствіе кровотеченія изъ варикозныхъ язвъ голени,
1 разъ вслѣдствіе кровотеченія изъ распавшагося рака пищевода,
1 разъ вслѣдствіе кровотеченія изъ саркомы забрюшинныхъ железъ,
1 разъ вслѣдствіе кровотеченія изъ разрыва сосуда въ брюшную полость,
1 разъ вслѣдствіе кровотеченія изъ разрыва аневризмы аорты въ пищевод.

Въ третью группу включена случайная смерть, наблюдавшаяся 101 разъ:

42 случая чрезмѣрнаго опьяненія,
55 случаевъ задушенія:
43 раза рвотными массами,
5 разъ инородными тѣлами въ дыхательномъ горлѣ,
7 разъ мягкими предметами,
4 случая mors thymica.

Такъ какъ въ большинствѣ случаевъ заболѣваній сердца и сосудовъ на первомъ планѣ имѣются ясно и сильно выраженныя артеріосклеротическія измѣненія сосудовъ и сердца, которыя должны быть отнесены къ endarteriitis chronica, являющейся наиболѣе близкой патологоанатомической причиной смерти, то въ дальнѣйшемъ при обзорѣ литературы мы параллельно приводимъ и свои данныя, полученныя при разсмотрѣніи нашихъ случаевъ исхода хроническаго эндартеріита. Въ нашу статистику хроническаго эндартеріита вошли 346 случаевъ (4, 5, 12, 14—76, 83, 85, 88—276, 540—621, 624, 626—629, 640 и 641) за послѣдніе 10 лѣтъ, и за предшествующіе 15 лѣтъ изъ работы Ѳ. Ушакова—333 случая (6—8, 16, 18—72, 75, 76, 79—214, 264, 266, 268, 271, 277, 279—282, 583—688, 695—700, 711, 716, 756, 765, 767, 770, 785, 791, 797, 803—809, 810, 814, 819, 838).

Артеріосклерозъ, сопровождаемый атрофіей почекъ, на ряду съ діабетомъ, приводитъ Brouardel какъ образецъ болѣзней, которыя «развиваются медленно, скрытно, не привлекая вниманія больного болью, слишкомъ значительнымъ недомоганіемъ, не заставляя обращаться къ врачу, и которыя оканчиваются естественно быстрою смертью. Артеріосклерозъ изъ всѣхъ пораженій артерій чаще всего является причиной скоропостижной смерти. Подъ этимъ именемъ разумѣютъ особое перерожденіе артеріальныхъ стѣнокъ, которое начинается съ дуги аорты и можетъ распространиться часто по всей артеріальной системѣ. Излюбленныя мѣста для этихъ измѣненій—артеріи мозга и почекъ». «Когда артеріосклерозъ занимаетъ собственные сосуды сердца, то его роль представляется значительной; то же можно сказать объ измѣненіяхъ аорты. Но роль артеріосклероза распространеннаго, даже когда затронуты въ значительной степени сосуды мозговыхъ и бульбарныхъ центровъ, намъ кажется пока еще сомнительной или по крайней мѣрѣ довольно ограниченной» (Vibert).

Классификація летальныхъ исходовъ Endarteriit. chron. deform.

Въ своемъ изслѣдованіи «Ueber die Bedeutung der Endarteriitis chronica deformans als Ursache plötzlichen Todes» A. Key-Åberg изъ всего числа случаевъ скоропостижной смерти исключилъ относящіеся къ дѣтскому возрасту, заявши предѣломъ конецъ 14 года, и нашелъ, что хронической эндартеріитъ по отношенію къ другимъ естественнымъ причинамъ скоропостижной смерти у взрослыхъ даетъ 74,5%. Затѣмъ авторъ опредѣляетъ, въ какомъ отношеніи стоитъ другъ къ другу различные способы наступленія скоропостижной смерти, обусловленной хроническимъ эндартеріитомъ, и для этого дѣлитъ всѣ случаи на пять группъ. Въ первую относимы случаи смерти отъ паралича сердца, гдѣ измѣненія, вызванныя хроническимъ эндартеріитомъ, можно было отмѣтить, какъ причину этого паралича; къ этой группѣ присоединены и случаи съ недостаточностью аортальныхъ клапановъ, такъ какъ измѣненія сосудистой стѣнки аорты однородны съ измѣненіями, часто встрѣчающимися на клапанахъ аорты и рѣже на клапанахъ двустворки. Вторая группа обнимаетъ случаи разрыва сердца, гдѣ можно было признать зависимость такового отъ хроническихъ эндартеріитическихъ измѣненій въ вѣнечныхъ артеріяхъ сердца. Къ третьей группѣ принадлежатъ всѣ случаи разрывовъ (не травматическихъ) аневризмъ аорты или вѣтвей ея, основанныхъ на хроническомъ эндартеріитѣ. Въ четвертой группѣ приведены вмѣстѣ случаи т. наз. самопроизвольнаго разрыва аорты, включая aneurisma dissecans, при одновременномъ существованіи хроническихъ эндартеріитическихъ измѣненій, по крайней мѣрѣ, на мѣстѣ разрыва. Пятая группа заключаетъ всѣ самопроизвольныя кровоизліянія въ вещество мозга и, при одновременномъ пораженіи артеріосклерозомъ сосудовъ мозга, въ мягкую мозговую оболочку. Въ первой группѣ преобладающее значеніе, какъ причина паралича сердца, имѣетъ склерозъ вѣнечныхъ артерій со включеніемъ склеротическихъ измѣненій въ отверстіяхъ этихъ артерій въ аортѣ и склерозъ клапановъ аорты. При отсутствіи ихъ бываютъ два часто встрѣчающіяся состоянія: съ одной стороны, распространенный периферическій артеріосклерозъ и, съ другой, значительное, обыкновенно, диффузное расширеніе aort. arcend., ведущее нерѣдко къ очень значительной сравнительной недостаточности клапановъ аорты, не говоря уже объ измѣненіи положенія отверстія вѣнечныхъ артерій.

На 634 сл. Key-Åberg'а скоропостижной смерти отъ хроническаго эндартеріита причина смерти была въ 451 сл. или 71,1% параличъ сердца.

15 „ „ 2,4% разрывъ сердца.

Академическая статистика на 337 случаевъ хрон. эндартеріита за 1885—1899 и 346 сл. за 1900—1909 даетъ слѣдующія цифры:
219 (65,8%) и 257 (74,3%) параличъ сердца.
6 (1,8%) и 4 (1,1%) разрывъ сердца.

55 сл. или 8,7% разрывъ аневризмы аорты.	20 (6%) и 13 (3,8%) разр. аневр. аорты.
16 „ „ 2,5% разрывъ аорты.	4 (1,2%) и 9 (2,6%) разрывъ аорты.
37 „ „ 15,3% внутричерепное кровоизліяніе.	84 (25,2%) и 63 (18,2%) кровоизліяніе въ мозгъ.

Въ приводимой ниже таблицѣ представлено въ процентахъ отношеніе Endarteriit. chron. deform., его послѣдствій и исходовъ, къ общему количеству случаевъ скоропостижной смерти у разныхъ авторовъ:

	Lesser. 171 сл.	Key-Åberg. 852 сл.	Klein-berg. 277 сл.	Белявь. 320 сл.	Академическая статист. 1885—1899. 868 сл.	Академическая статист. 1900—1909. 672 сл.
Параличъ сердца. . .	26,9%	52,9%	30,3%	31,8%	25%	38,2%
Разрывъ сердца . . .	0,6%	1,7%	0,4%	0,0%	0,7%	0,6%
Разрывъ аорты . . .	—	1,9%	3,9%	0,31%	0,5%	1,3%
Разрывъ аневризмы аорты	5,8%	6,4%		1,5%	2,2%	2%
Внутричереп. кровоизліяніе	10,5%	11,3%	13,3%	16,2%	9,7%	9,3%
Всего . . .	43,8%	74,4%	48%	50,6%	38,1%	51,4%

Такимъ образомъ, половина лицъ, умирающихъ скоропостижно, погибаютъ въ зависимости отъ заболѣваній сосудистой системы и сердца, resp. endarteriit. chron. deform.

Что касается умершихъ отъ кровоизліянія въ мозгъ, то въ большинствѣ нашихъ случаевъ, гдѣ имѣются предварительныя свѣдѣнія, смерть наступала не внезапно, а въ теченіе 1—2—3 часовъ послѣ инсульта.

Цифры всѣхъ авторовъ показываютъ, что разрывъ сердца бываетъ очень рѣдкой причиной скоропостижной смерти. Изъ нашихъ четырехъ случаевъ разрыва сердца въ одномъ изъ нихъ имѣлась аневризма лѣваго желудочка. Разрывъ въ двухъ случаяхъ находился на передней сторонѣ лѣваго желудочка, (одинъ у верхушки сердца, причемъ имѣлось до 7 щелеобразныхъ разрывовъ), въ одномъ случаѣ на задней поверхности лѣваго желудочка и въ одномъ на передней сторонѣ праваго желудочка, причемъ разрывъ имѣлъ сообщеніе съ лѣвымъ желудочкомъ; всѣ разрывы были на границѣ или вблизи перегородки желудочковъ.

Аневризмы имѣли слѣдующую локализацію:

Aorta ascendens	5
Arcus aortae	3
Ascend. et arcus	2
Arcus et descend.	1
Aorta thorac. descend.	1
Ramus aort. thorac.	1

Сопоставляя позднѣйшія статистики о локализаціи разрывовъ аневризмы,

	Lesser.	Key-Åberg.	Белявь.	Kleinberg.	Академическая стат. 1884—1899	Академическая стат. 1900—1909
Aorta ascend. . .	6	47	4	7	11	5
Arcus aortae. . .	2	6	1	3	4	3
Ascend. et arc. . .	1	3	—	—	1	2
Arcus et descend.	—	—	—	—	—	1
Aort. descend. . .	1	15	—	1	4	1

мы видимъ, что наичаще встрѣчается разрывъ аневризмы восходящей части аорты. Аневризма не достигаетъ сколько-нибудь значительной величины, часто не даетъ ничѣмъ о себѣ знать больному, и въ такой ранней стадіи развитія ведетъ къ разрыву, что не возникаетъ и подозрѣнія о существованіи ея, а потому и діагнозъ ея затруднителенъ, а подчасъ и невозможенъ.

Приводимъ величину ограниченныхъ аневризмъ въ 26-ти случаяхъ за послѣдніе 25 лѣтъ.

Приблизительная величина аневризмы.	Два кулака.	Кулакъ.	Гусин. яйцо.	Куриц. яйцо.	Грецк. орѣхъ.	Лѣсн. орѣхъ.	Бобъ.
Количество случаевъ . .	2	10	4	2	3	2	3

Key-Åberg замѣчаетъ, что за единственнымъ исключеніемъ, аневризма всюду, гдѣ величина не превосходила голубинаго яйца, имѣла мѣсто на aorta ascend. и по близости полулунныхъ клапановъ. Тоже отмѣчено и въ академическихъ статистикахъ; исключеніе было въ двухъ случаяхъ аневризмъ, исходившихъ изъ дуги аорты и нисходящей части.

Что касается локализаціи самопроизвольныхъ разрывовъ аорты, то за 10-лѣтіе въ 6-и изъ 9 случаевъ положеніе разрыва было въ нижнихъ частяхъ ascendens, и по одному

случаю—ниже отхожденія безымянной артеріи, на дугѣ и въ одной изъ вѣтвей брюшной аорты. За 15-лѣтіе во всѣхъ 4-хъ случаяхъ разрыва аорты послѣдній помѣщался на ascendens. Это отношеніе согласуется съ наблюденіями, сдѣланными Key-Åberg'омъ (въ 17 изъ 19—разрывъ на ascendens), Rokitansky'мъ (между 20 случаями—18 разрывъ ascendens и 2—arcus), Peacock'омъ (изъ 35 случаевъ—разрывъ въ ascendens 24 раза).

Напъ матеріалъ подтверждаетъ также господствующее мнѣніе, что хроническій эндартеріитъ встрѣчается у мужского пола значительно чаще, чѣмъ у женскаго. Изъ 257 случаевъ скоропостижной смерти вслѣдствіе паралича сердца приходится на мужской полъ 191 и только 66 на женскій, или 74,3% на мужчинъ и только 25,7% на женщинъ, у Ушакова—136 мужчины и 56 женщинъ или 74,4% и 25,6%, у Key-Åberg'а—64,5% и 35,5%, у Lesser'а—62,7% и 37,3%. Еще въ болѣе высокой степени это незавидное преимущество мужчинъ передъ женщинами замѣчается при разрывахъ аорты. Соединяя вмѣстѣ количество случаевъ разрыва аневризмы за послѣдніе 10 лѣтъ (12 и 1) и предшествующіе 15 лѣтъ (15 и 5), мы находимъ, что на мужчинъ приходится 81,1% противъ 18,2% на женщинъ (у Key-Åberg 79% и 21%). То же мы находимъ и въ старыхъ статистикахъ Hodgson'а (1817) и Lebert'а (1855), гдѣ на долю женщинъ падаетъ 20,7% и 23,4%. Разница въ числѣ случаевъ самопроизвольнаго разрыва сердца между полами довольно незначительна: за 25 лѣтъ приходится 6 у мужчинъ и 4 у женщинъ (4 и 2, 2 и 2), у Key-Åberg'а 11 у мужчинъ и 7 у женщинъ.

Что касается самопроизвольныхъ разрывовъ аорты, то у Key-Åberg'а приходится 11 на мужской полъ и 8 на женскій, еще меньше различіе между полами въ статистикѣ Peacock'а и Rokitansk'аго, у которыхъ вмѣстѣ на 23 мужчинъ приходится 22 женщины, у Vogt'а aneurisma dissecans у женщинъ встрѣчалась вдвое чаще, чѣмъ у мужчинъ. Наши данныя представляютъ, напротивъ, еще болѣе поразительную разницу въ сторону мужчинъ, чѣмъ прежде разсмотрѣнныя формы исхода хроническаго эндартеріита: изъ 9 случаевъ разрыва аорты за 10-лѣтіе, за единственнымъ исключеніемъ, всѣ принадлежатъ мужчинамъ, за 15-лѣтіе отмѣчены всего 4 случая разрывовъ аорты, и всѣ у мужчинъ. Aneurisma dissecans наблюдалась пять разъ, четыре раза—за послѣдніе 10 лѣтъ.

Вертоградовъ, собравши статистику «разслоняющей аневризмы», нашелъ, что мужчины подвержены разрывамъ чаще, и въ болѣе раннемъ возрастѣ; въ нашемъ матеріалѣ возрастъ былъ 17 и 19 лѣтъ. Разрывы наичаще встрѣчаются въ восходящей части дуги аорты, преобладающее направленіе разрыва—поперечное. Механизмъ разрывовъ авторъ объясняетъ тѣмъ, что при усиліи и внезапномъ душевномъ волненіи, обычно сопровождающихся усиленнымъ сокращеніемъ діафрагмы, т. е. наичаще—выраженнымъ вдохомъ, сердце нисходитъ, а началъная часть аорты также пассивно вытягивается книзу; болѣзненно измѣненная аорта, укрѣпленная болѣе или менѣе вверху, при сильномъ быстромъ оттягиваніи сердца діафрагмою книзу и благодаря толкательной силѣ сердца, часто гипертрофированаго, не выдерживаетъ этихъ силъ, дѣйствующихъ въ противоположномъ направленіи, этого внезапнаго натяженія, и разрывается. Для доказательства того, что поперечные надрывы не есть результатъ повышенія внутрисосудистаго давленія, авторъ производилъ опыты съ разрываніемъ резиновыхъ трубокъ, а затѣмъ и артерій, которыя при постепенномъ повышеніи давленія давали продольный разрывъ. При потягиваніи за конецъ эластической трубки, уже подвергнутой давленію, кромѣ удлиненія и истонченія ея, образуется еще и веретенообразная раздутость, отсюда понятно участіе «вдыхательнаго» натяженія аорты въ произведеніи и продольныхъ надрывовъ.

Наши данныя относительно распредѣленія внутричерепныхъ кровоизліяній между двумя полами соотвѣтствуютъ позднѣйшимъ статистикамъ Nothnagel'а, Niemeyer-Seitz'а, Eichhorst'а, Jaccoud, Obernier и др., которые указываютъ, что мужчины даютъ рѣшительно большій контингентъ для этихъ кровоизліяній, чѣмъ женщины. Gintrac даетъ цифры для мужчинъ 56,7%, для женщинъ 43,3%. У Kleinberg'а на 37 случаевъ кровоизліяній, зависѣвшихъ отъ артеріосклероза, приходится 26 мужчинъ и только 11 женщинъ, т. е. 70% и 30%. У насъ за 10 лѣтъ—63% у мужчинъ и 37% у женщинъ, за 15-лѣтіе—70% и 30%. Все же изъ всѣхъ смертельныхъ исходовъ хроническаго эндартеріита мозговыя кровоизліянія у женщинъ даютъ въ сравненіи съ другими исходами наибольшій процентъ. Въ статистикѣ Key-Åberg'а женскій полъ выраженъ сильнѣе мужского, при кровоизліяніяхъ въ мозгъ насчитывается у женщинъ 44 случая противъ 37 у мужчинъ, а при менингеальныхъ кровоизліяніяхъ даже — 22 противъ 7. Въ статистикахъ Oesterlen'а (1849—1859) для Англіи и кантона Женевы апоплексія распредѣляется почти равномѣрно между обоими полами.

Разсмотримъ теперь отношеніе случаевъ скоропостижной смерти отъ паралича сердца, обусловленныхъ хроническимъ эндартеріитомъ, къ возрасту умершихъ и полу.

Количество смертныхъ случаевъ отъ паралича сердца.	Возрастъ.										Всего.	Академич. статист.
	До 25 л.	25—29.	30—34.	35—39.	40—44.	45—49.	50—54.	55—59.	60—64.	65—69.	70—74.	75 и болѣе.		
Мужчинъ . .	2	12	16	24	45	32	27	24	7	1	1	—	191	1900—1909.
Женщинъ . .	2	3	5	10	8	8	6	6	10	5	2	1	66	
Всего . .	4	15	21	34	53	40	33	30	17	6	3	1	257	

Количество смертныхъ случаевъ отъ паралича сердца.	Возрастъ.										Всего.	Академич. статист.
	До 25 л.	25—29.	30—34.	35—39.	40—44.	45—49.	50—54.	55—59.	60—64.	65—69.	70—74.	75 и болѣе.		
Мужчинъ . .	2	10	17	24	26	21	18	18	11	9	2	2	160	1885—1899.
Женщинъ . .	1	1	8	9	7	4	5	4	11	3	1	2	56	
Всего . .	3	11	25	33	33	25	23	22	22	12	3	4	216	

Изъ приведенной таблицы видно, что большинство случаевъ принадлежитъ высшимъ возрастнымъ группамъ. Въ возрастѣ меньше 25 лѣтъ въ первой половинѣ таблицы было 4 случая, съ наименьшимъ возрастомъ 18 у женщинъ и 19 у мужчинъ, во второй—3 случая съ наименьшимъ возрастомъ у женщинъ—19 и у мужчинъ—23. Съ 25—29 лѣтъ смертность постепенно растетъ и достигаетъ своего maximum'а въ періодѣ 40—44 л., медленно уменьшается до 60 лѣтняго возраста, съ какого паденіе идетъ довольно быстро. Что же касается женщинъ, то у нихъ самое высокое количество смертныхъ случаевъ приходится на возрастную группу 60—64 л. Мы видимъ, что летальный исходъ хроническаго эндартеріита, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, именно параличъ сердца у мужчинъ наиболѣе встрѣчается въ другомъ и болѣе раннемъ возрастѣ, чѣмъ у женщинъ, приходясь на возрастъ 40—44 л. Сравнивая съ таблицею смертныхъ случаевъ отъ паралича сердца у Key-Åberg'a, приводимою здѣсь, мы видимъ, что параллельно съ болѣе раннимъ maximum'омъ

БИБЛІОТЕКА
Кафедры Общей Гигіены
Женскаго Медицинскаго Института

смертности у женщинъ (наступающимъ на возрастѣ 60—64 л., у Key-Åberg'a — на 65 — 69 л.), у насъ начинается и болѣе ранній подъемъ смертности у женщинъ (у насъ 30—34, у К.-Å.—35 — 39), подъемъ смертности у мужчинъ также у насъ начинается на пятилѣтіе раньше (25—29 и 30—34). Такимъ образомъ, теченіе хроническаго эндартеріита существенно

Количество смертныхъ случаевъ отъ паралича сердца.	Возрастъ.										Всего.	Key-Åberg.
	До 25 л.	25—29.	30—34.	35—39.	40—44.	45—49.	50—54.	55—59.	60—64.	65—69.	70—74.	75 и болѣе.		
Мужчинъ . .	3	1	12	28	52	32	40	34	33	24	17	8	284	
Женщинъ . .	—	5	6	17	10	12	19	25	21	28	8	7	158	
Всего . .	3	6	18	45	62	44	59	59	54	52	25	15	442	

отличается у женщинъ болѣе замедленнымъ темпомъ, что стоитъ, повидимому, въ связи съ существенными физіологическими отличіями женщины, дающими ей большую жизнеупорность. Кромѣ того на возрастъ меньше 50 лѣтъ у насъ приходится смертныхъ случаевъ 167, а послѣ 50-ти 90 (и 130 и 86), тогда какъ въ Вѣнѣ 178 и 264, иными словами, процентное отношеніе

Количество смертныхъ случаевъ отъ аневризмы.	Возрастъ.						Всего.
	30—34.	35—39.	40—44.	45—49.	50—54.	55—59.	
Мужчинъ	2	10	6	5	2	—	25
Женщинъ	2	—	1	—	1	1	5
Всего . . .	4	10	7	5	3	1	30

между этими періодами у насъ 1,85 : 1 или 1,51 : 1, а въ Европѣ (по К.-Å.) обратно — 1 : 1,48. Этимъ подтверждается только общеизвѣстный фактъ, что продолжительность жизни въ Россіи короче, чѣмъ заграницей.

Въ отношеніи разрывовъ внѣ черепа находящихся аневризмъ, по малочисленности таковыхъ за весь 25-лѣтній періодъ, трудно сдѣлать какой либо выводъ, и можно только указать на тотъ фактъ, что у мужчинъ maximum смертности при раз-

рывахъ аневризмъ падаетъ на пятилѣтіе раньше сравнительно съ параличемъ сердца.

Въ сравненіи съ статистиками аневризмъ Lebert'а (324 случая) и Lidell'я (New-Iork, 243 случая), гдѣ первое мѣсто по числу случаевъ смерти отъ аневризмы занимаетъ 4-е десятилѣтіе жизни, а второе—5-е, затѣмъ у Lebert'а—6-е, а у Lidell'я—напротивъ 3-е, наша совершенно сходна съ обѣими сводками въ первой половинѣ. Въ статистикѣ Key-Åberg'а, сходной съ Richter'овской для San-Francisco (280 аневризмъ аорты) въ отношеніи только возрастной декады, насчитывающей наибольшее смертныхъ случаевъ, первое мѣсто занимаетъ 5-я декада, второе — 6-я, третье—4-я и четвертое—7-я декада (24, 21, 14 и 11 случаевъ).

Количество мозговыхъ кровоизліяній.		Возрастъ.										Всего.
		до 25 л.	25—29.	30—34.	35—39.	40—44.	45—49.	50—54.	55—59.	60—64.	65—69.	70—74.	75—0.	
1900—1909.	Мужчинъ	3	—	3	6	9	6	7	2	3	1	1	—	41
	Женщинъ	1	—	4	3	—	2	4	3	1	3	1	—	22
	Всего . . .	4	—	7	9	9	8	11	5	4	4	2	—	63
1885—1899.	Мужчинъ	5	2	1	7	11	6	13	6	3	2	—	1	37
	Женщинъ	1	1	4	4	2	3	2	5	—	1	2	—	25
	Всего . . .	6	3	5	11	13	9	15	11	3	3	2	1	82

Статистики распредѣленія мозговыхъ кровоизліяній по различнымъ возрастнымъ группамъ Burrow'а (211 случаевъ) и Gintrac'а (601 случай) показываютъ, что кровоизліянія эти являются отъ 20 до 80 лѣтъ постоянно въ перемѣнномъ количествѣ по отношенію къ разнымъ возрастнымъ группамъ, и что увеличеніе кровоизліяній къ 70 году неизмѣнно. По Key-Åberg'у самая высшая цифра апоплексій приходится не на 7-е десятилѣтіе, а на вторую часть 6-го десятилѣтія, и притомъ одинаково какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ. Наша статистика по двумъ періодамъ даетъ во 1-хъ, довольно значительное число случаевъ въ ранніе годы у мужчинъ, (по одному случаю въ 18 лѣтъ у каждаго пола и въ 19 два у мужчинъ и 1 у женщинъ), во 2-хъ, два максимума у мужчинъ въ первую половину 5-го и 6-го десятилѣтія, въ 3-хъ, показываетъ

наибольшее количество случаевъ въ возрастѣ 35 — 55, вдвое большее, чѣмъ въ остальные возрастные періоды вмѣстѣ. Апоплексій у женщинъ приходится вдвое меньше, чѣмъ у мужчинъ; распредѣлены онѣ болѣе или менѣе равномѣрно въ возрастѣ 30—60 лѣтъ, а въ возрастѣ за 65 л. даютъ даже больше случаевъ, чѣмъ у мужчинъ.

Приведемъ краткія свѣдѣнія о возрастѣ въ случаяхъ разрыва сердца и аорты, которые произошли за 25 лѣтъ. Первыхъ случаевъ, какъ уже было приведено,—10, 6 у мужчинъ и 4 у женщинъ, а вторыхъ—15, 14 у мужчинъ и 1 у женщинъ.

Количество случаевъ.	Возрастъ.						Сумма.
	До 30 л.	30—39.	40—49.	50—59.	60—69.	70—79.	
Разрывъ сердца . .	—	—	2	2	5	1	10
Разрывъ аорты . . .	3	2	4	4	—	2	15

Какъ и въ сводкѣ Key-Åberga, до 5-го десятилѣтія не наблюдалось ни одного случая разрыва сердца (во второй половинѣ пятаго десятка), и наибольшее число случаевъ приходится у насъ на 7-е десятилѣтіе, у К.-Å.—на 7-е и 8-е.

Переходя къ распредѣленію случаевъ скоропостижной смерти, обусловленной хроническимъ эндартеріитомъ, по классамъ и занятіямъ, Key-Åberg, въ противоположность Richter'у, объявлявшему аневризму аорты за «специфическую» болѣзнь рабочаго класса, указываетъ, что «правящій классъ» доставляетъ довольно большую долю случаевъ смерти, именно 21% паралича сердца и 30% аневризмъ. Замѣтно представленъ классъ прислуги, полицейскихъ, швейцаровъ и др. сторожевого персонала, также, принимая во вниманіе узкій предѣлъ его, классъ извозчиковъ, доставляющій непропорціонально большой контингентъ, что, по мнѣнію К.-Å., надо поставить въ причинную связь не съ профессіей, какъ таковой, но преимущественно съ неправильной жизнью, располагающей къ болѣзнямъ всякаго рода. Общее впечатлѣніе, полученное авторомъ изъ приводимой имъ сводки, говоритъ за то, что классъ или занятіе, какъ таковые, не имѣютъ никакого или все же только второстепенное этіологическое значеніе. Lebert о значеніи занятій для возникновенія аневризмъ аорты говоритъ слѣдующее: «Вліяніе занятія требуетъ нѣкотораго

объясненія. Наши наблюденія относятся одинаково какъ къ рабочимъ съ сидячимъ образомъ жизни,—какъ портные и сапожники, такъ и такимъ, которые хотя дѣлаютъ больше движенія, но въ общемъ употребляютъ мало напряженія силъ,

ЗАНЯТІЯ.	Причина смерти.		
	Параличъ сердца.	Разрывъ сердца, аорты, аневризмы.	Мозговое кровоизліяніе.
1. Фабрични. и завод. рабочіе	14	1	1
2. Чернорабочіе	12	2	6
3. Извозчики	8	1	5
4. Кучера	1	1	1
5. Кучера конки	2	—	—
6. Форейторы конки	1	—	—
7. Столяры	10	—	1
8. Плотники	2	—	—
9. Слесари	2	—	—
10. Сапожники	10	2	1
11. Портные	4	—	—
12. Шисцы	3	—	—
13. Торговцы	5	—	2
14. Прикащики въ мясной лавкѣ	2	—	—
15. Повара	1	1	—
16. Пекари	2	1	—
17. Кровельщики	1	1	1
18. Маляры	2	—	—
19. Штукатуры	2	—	—
20. Каменщики	2	—	—
21. Печники	2	—	—
22. Каменотесы	1	1	—
23. Лодочники	1	—	1
24. Кушцы	—	1	—
25. На пенсіи	4	—	—
26. Неизвѣстные	2	—	—
27. Безъ опр. мѣстожит. и занятій, нищіе.	6	2	1
28. Сторожа	2	—	—
29. Чернорабочіе	3	—	—
30. Прачки	9	—	—
31. Безъ опр. мѣстожит., нищія	2	1	—
32. Проститутки	4	—	—
33. Мелкія торговки	2	—	—
34. Прислуга	3	1	1

какъ повара, слуги, разносчики, маляры etc. Болѣе напряженныя профессіи, какъ плотники, столяры, солдаты, поденщики не образуютъ соотвѣтственно болѣе сильнаго контингента, чѣмъ прежде упомянутые. Такимъ образомъ мы констатируемъ едва замѣтное вліяніе занятія».

Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ возможности привести здѣсь

съ своей стороны полную таблицу распредѣленія случаевъ по занятіямъ, такъ какъ не всегда оставались протоколы полицейскихъ дознаній, и во многихъ случаяхъ не обозначено занятіе, хотя сословіе указывалось обязательно (крестьянинъ или мѣщанинъ), да нерѣдко прибавлялось о состояніи въ запасѣ или отставкѣ, свѣдѣнія для насъ мало поучительныя; но все же наполовину справки о занятіяхъ приведены, но относительно фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ нѣтъ данныхъ о родѣ ихъ работы. Трупный матеріалъ судебно-медицинской каѳедры Академіи относится за рѣдкими исключеніями къ низшимъ классамъ населенія. Нѣсколько единичныхъ случаевъ не приведены, какъ малохарактерные, и чтобы не дробить черезчуръ рубрикъ.

При первомъ взглядѣ на таблицу, нельзя не отмѣтить и здѣсь, дѣйствительно, поражающаго числа смертныхъ случаевъ у извозчиковъ, кучеровъ etc., столяровъ и сапожниковъ, портныхъ и торговцевъ, прачекъ и женской прислуги. Key-Aberg не поясняетъ, въ чемъ онъ видитъ у извозчиковъ «неправильный образъ жизни, располагающій къ болѣзнямъ всякаго рода». Едва ли безпрерывная тряска при постоянно сидячемъ и согнутомъ положеніи можетъ оставаться безъ вліянія на сосудистую систему. «Аневризма гораздо чаще бываетъ у мужчинъ, чѣмъ у женщинъ — обстоятельство, наводящее на мысль, что тяжелая работа или родъ занятій играютъ не послѣднюю роль въ этіологіи аневризмы. Часто встрѣчается аневризма у солдатъ и рудокоповъ; продолжительное и большое напряженіе силъ у первыхъ, во время маневровъ и форсированныхъ маршей, вмѣстѣ со стѣсненіемъ грудной клѣтки аммуниціей, а у вторыхъ—тяжелая работа, требующая пребыванія въ согбенномъ и неловкомъ положеніи, объясняютъ въ достаточной мѣрѣ частоту аневризмы при этихъ профессіяхъ. Это же объясненіе приложимо, безъ сомнѣнія, къ большому числу случаевъ, гдѣ напряженіе стѣнокъ сосудовъ — будь оно перемежающимся, какъ при сильномъ физическомъ напряженіи, или постояннымъ, какъ при высокомъ артеріальномъ давленіи — ведетъ къ артеріосклерозу и дегенеративнымъ измѣненіямъ въ стѣнкахъ артерій». (W. H. & I. F. H. Broadbent. Болѣзни сердца, русскій переводъ, 1904). «Служащіе въ канцеляріяхъ больше всего болѣютъ отъ болѣзней сердца и сосудовъ. Послѣдняя категорія болѣзней вообще единственная, отъ которой канцеляристы въ дѣйствительности болѣютъ чаще, чѣмъ слѣдовало бы ожидать по разсчету». (Эрисманъ, Кр. уч. по гигіенѣ. М. 1902).

Алкоголизму Key-Åberg, какъ и Lancereaux, не приписываетъ существеннаго значенія для возникновенія хроническаго эндартеріита, на 100 вскрытій алкоголиковъ онъ не можетъ указать болѣе одного случая артеріосклероза въ значительномъ развитіи. Но другіе авторы признаютъ, что хроническая интоксикація алкоголемъ оказываетъ въ весьма значительной степени вредное дѣйствіе. По Wynn Westcott'у въ 303 случаяхъ скоропостижной смерти, въ 29% общей суммы причина смерти была выяснена прямо или косвенно отъ чрезмѣрнаго употребленія спиртныхъ напитковъ. Kleinberg, разсматривая случаи остраго алкоголизма, говоритъ: «хотя этотъ родъ смерти, строго говоря, какъ отравленіе причисляется къ насильственнымъ, но я помѣстилъ его въ свою статистику, потому что изъ полицейскихъ протоколовъ я могъ убѣдиться, что ни въ одномъ случаѣ не было выпито такого количества алкоголя, что рѣчь могла идти о дѣйствительномъ отравленіи. Именно, въ большинствѣ помѣщенныхъ случаевъ заболѣванія органовъ, которыя съ своей стороны при количествѣ алкоголя самомъ по себѣ не смертельномъ, не могли способствовать летальному исходу, въ этомъ случаѣ уже ставили повышенныя требованія къ дѣятельности сердца. Алкоголь дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ только какъ благопріятствующій моментъ повышеніемъ дѣятельности сердца такъ же, какъ и всякая тяжелая работа могла бы имѣть тѣ же самыя послѣдствія. Между 42 случаями остраго алкоголизма нашлось 16 случаевъ съ сильноразвитымъ артеріосклерозомъ и послѣдовательными его измѣненіями (въ 4 случаяхъ и склерозъ вѣнечныхъ артерій)». Злоупотребленіе алкоголемъ ускоряетъ наступленіе дегенеративныхъ измѣненій въ кровеносныхъ сосудахъ. Съ давнихъ поръ сифилису принадлежитъ видное мѣсто въ этіологіи склероза сосудовъ, въ особенности въ этіологіи раннихъ формъ его. Сифилитическая природа аневризмъ доказывается въ 65—90%. Злоупотребленіе алкоголемъ и сифилисъ ведутъ и къ перерожденію міокардія, фиброзному и жировому. Алкоголизмъ и сифилисъ обыкновенно идутъ рядомъ. «Кривая венерическихъ болѣзней (сифилиса, перелоя, мягкаго шанкра) и бугорчатки идетъ у насъ въ соотвѣтствіи съ высотою душевого потребленія водки: чѣмъ выше душевое потребленіе водки, тѣмъ соотвѣтственно чаще зараженіе. По даннымъ одной англійской рабочей кассы, смертность трезвенниковъ во всѣхъ возрастахъ меньшая, чѣмъ у потребляющихъ спиртные напитки. Болѣе раннее употребленіе спиртныхъ напитковъ вызываетъ болѣе частое заболѣваніе

бугорчаткой и малокровіемъ, другими словами, недоѣданіе и алкоголизмъ являются двумя равноцѣнными причинами изнашиванія организма рабочаго. Начинающихъ пить въ возрастѣ 8—25 лѣтъ 93%—99% мужчинъ и 64,6% женщинъ. Юношескій возрастъ служитъ исключительной полосой для зарожденія и формировки алкоголизма. По фабричнымъ отчетамъ, вторичный мужской сифилисъ обнаруживаетъ стремленіе слѣдовать колебаніямъ алкоголизма по производствамъ». (Коровинъ. Борьба съ алкоголизмомъ какъ необходимое условіе при улучшеніи рабочаго быта. Вр. Газ. 1910. №№ 19, 21—23).

С. Новосельскій, разсматривая «Профессіональную смертность въ Англіи за 1900 — 1901 г.г.» (В. Общ. Гиг., 1909) приходитъ къ такому заключенію:

«Если вспомнить, что наивысшую смертность среди всѣхъ профессіональныхъ группъ имѣютъ профессіи по продажѣ и изготовленію спиртныхъ напитковъ, тѣмъ самымъ дающія поводъ къ злоупотребленію алкоголемъ, что въ большинствѣ профессій, отличающихся высокою общею смертностью, высока и смертность отъ алкоголизма и наоборотъ, и что высокая смертность отъ цѣлаго ряда болѣзней обычно сопутствуется высокою смертностью и отъ алкоголизма, то нельзя не прійти къ заключенію, что, пожалуй, никакія самыя вредныя профессіональныя условія не могутъ сравниться по степени вредоносности съ алкоголизмомъ, которому во всѣхъ почти профессіяхъ принадлежитъ роль главнаго фактора, сокращающаго жизнь людей».

О вліяніи наслѣдственности на развитіе артеріосклероза.— Многими авторами, и особенно французскими, болѣзни сердца ставятся въ связь съ артритическимъ діатезомъ и расположеніемъ къ почечнымъ разстройствамъ; хроническія же инфекціи являются далеко недостаточными для заболѣванія порокомъ сердца, нужна наклонность къ сердечно-сосудистымъ заболѣваніямъ, въ качествѣ рѣзко выраженной родовой особенности. Тяжелыя жизненныя условія и рѣзкія злоупотребленія сами по себѣ недостаточны, чтобы вызывать сердечно-сосудистыя заболѣванія, они въ большинствѣ случаевъ лишь ускоряютъ процессъ развитія сердечно-сосудистыхъ разстройствъ въ ряду поколѣній—процессъ, начавшійся на почвѣ нейрартритизма,—притомъ дѣйствуя, въ большинствѣ случаевъ, въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній. (Кабановъ. Роль наслѣдственности въ этіологіи болѣзней внутреннихъ органовъ. М. 1899. Дисс.).

О значеніи «фиброматознаго» сложенія при артеріосклерозѣ.— У насъ создано было покойнымъ профессоромъ Харьковскаго

университета В. П. Крыловымъ ученіе, объясняющее личныя особенности при болѣзняхъ конституціональными неправильностями. «Крыловъ различалъ особую неправильность — fibromatosis. фиброматозное сложеніе, сущность которой состоитъ въ избыточномъ развитіи фибриллярной и фасцикулярной ткани въ организмѣ въ ущербъ болѣе рыхлой ареолярной. Это—люди безусловно высокаго или выше средняго роста, съ хорошо развитой костной и мышечной системой. Голова у нихъ обыкновенно овальная; шея, грудь и конечности длинныя; туловище плотное; стопа и кисть плоскія и широкія; пальцы 4-гранные. Внутренніе органы имѣютъ слѣдующій видъ: сердце малое; аорта и легочная артерія широкія, толстостѣнныя, органы брюшной полости небольшіе. Невыгодныя стороны фиброматознаго тѣлосложенія заключаются въ томъ, что физіологическое сморщиваніе, уплотненіе соединительной ткани наступаетъ у этихъ лицъ раньше нормы. Соотвѣтственно этому у лицъ даннаго типа конституціи легко возникаютъ хроническія воспалительныя измѣненія внутреннихъ органовъ, а заболѣваніе сосудовъ, извѣстное подъ именемъ артеріосклероза, составляетъ какъ-бы ихъ привилегію; равнымъ образомъ у такихъ лицъ быстро падаетъ кровотвореніе, и при лихорадочныхъ и другихъ острыхъ заболѣваніяхъ правильность обмѣна веществъ разстраивается быстрѣе и глубже, чѣмъ у не имѣющихъ такой конституціональной неправильности. Отсюда становится до нѣкоторой степени понятнымъ тотъ давно извѣстный фактъ, что у людей крѣпкаго сложенія острыя заболѣванія протекаютъ болѣе тяжело и что число смертей отъ нихъ среди фиброматозныхъ больше. Съ фиброматозомъ связано то, что люди очень крѣпкаго сложенія, пользующіеся прекраснымъ здоровьемъ, умираютъ отъ кровоизліянія въ мозгъ или отъ рака. Кровоизліяніе въ мозгъ происходитъ вслѣдствіе того, что, какъ сказано, кровеносные сосуды у такихъ людей особенно склонны къ заболѣванію—склерозу, а ракъ часто развивается потому, что уплотненная соединительная ткань въ силу плохого питанія теряетъ противустойкость. эпителій же, изъ котораго развивается ракъ, при различныхъ раздраженіяхъ, легко прорастаетъ въ нее и, въ свою очередь, плохо питаясь, получаетъ неправильное развитіе и даетъ злокачественную опухоль. Фиброматозное сложеніе нерѣдко сочетается съ узкой аортой и съ разными другими неправильностями, напр., съ удлиненіемъ кишекъ, чему иногда соотвѣтствуетъ внѣшній признакъ въ видѣ низкаго стоянія пупка. Удлиненіе кишекъ ведетъ къ затрудненію передвиженія

содержимаго и скопленію его въ нижнихъ отдѣлахъ кишечника. Подобная неправильность даетъ поводъ къ привычному вздутію кишекъ, высокому стоянію грудобрюшной преграды и ослабленію присасывающей силы грудной клѣтки. Все это обусловливаетъ вялость притока артеріальной крови. Поэтому, тифозное начало, попавъ случайно въ такой кишечникъ, вызоветъ усиленное пораженіе, и тяжесть заболѣванія увеличится. (Пожарискій. О задачахъ патологической анатоміи. Р. Вр. 1910. № 40).

Вліяніе времени года на появленіе случаевъ скоропостижной смерти давно отмѣчалось въ литературѣ. Въ большой сводкѣ Durand-Fardel'я (502 случая) относительно апоплексій случаи распредѣлены по различнымъ временамъ года такъ: декабрь—февраль 146, мартъ—май 135, іюль—августъ 124 и сентябрь—ноябрь 97 случаевъ. Относительно вообще скоропостижной смерти Berger приходитъ къ выводу, «что случаи скоропостижной смерти въ общемъ идутъ отъ зимы къ лѣту внизъ и отсюда опять увеличиваются», и Falk находитъ постояннымъ отмѣченное Casper'омъ въ особенности для случаевъ «геморрагій или гиперемій» отношеніе, что случаи скоропостижной смерти зимою многочисленнѣе, чѣмъ въ другое время года, съ весны наступаетъ уменьшеніе ихъ къ лѣту, а съ лѣта слѣдуетъ усиленіе. Въ статистикѣ Магеvéry случаевъ скоропостижной смерти Парижскаго морга 1871—1884 гг. (1001 случай) случаи распредѣлялись по временамъ года слѣдующимъ образомъ: зима—315, весна—222, лѣто—217, осень—247. Key-Åberg нашелъ для случаевъ смерти отъ паралича сердца, что они за три первые и три послѣдніе мѣсяца года вмѣстѣ постоянно многочисленнѣе, чѣмъ въ прочіе шесть, и изъ естественныхъ временъ года зима вообще, декабрь—февраль, показываетъ относительно самое большое количество смертныхъ случаевъ, затѣмъ идетъ осень, и потомъ весна и лѣто, съ одинаковымъ почти числомъ случаевъ; въ метеорологическихъ же наблюденіяхъ не нашелъ подтвержденія общаго положенія Berger'а о вліяніи болѣе значительныхъ колебаній барометра и термометра на появленіе и число случаевъ скоропостижной смерти. У Key-Åberg'а большинство случаевъ падаетъ на февраль и декабрь и меньшинство на августъ и сентябрь, въ іюлѣ кривая смертности достигаетъ значительной высоты, какая была въ мартѣ, октябрѣ и ноябрѣ. У Magevéry большинство смертныхъ случаевъ падало на январь и февраль, мень-

шинство на августъ и сентябрь, кривая въ іюлѣ достигаетъ той же высоты, что и въ октябрѣ и ноябрѣ.

Движеніе скоропостижныхъ смертей. Legros даетъ нѣсколько графическихъ изображеній, составленныхъ по статистикамъ министерства юстиціи, съ 1835 по 1889. Движеніе скоропостижныхъ смертей во Франціи прогрессивно растетъ съ 1835 до 1889. Если сравнить теперь скоропостижныя смерти со случайными, то и послѣднія слѣдуютъ совершенно аналогично движенію скоропостижныхъ смертей. Скоропостижная смерть не представляетъ одной и той же степени частоты по различнымъ областямъ Франціи. Въ Парижѣ она чаще, чѣмъ въ остальной Франціи.

Статистики большинства авторовъ согласны всѣ въ томъ, что существуетъ значительное различіе между мужчинами и женщинами въ частотѣ случаевъ скоропостижной смерти. На 459 случаевъ внезапной смерти, зарегистрированныхъ въ Ліонскомъ моргѣ отъ 1854 до 1880, приходится 365 мужчинъ и 94 женщины, т. е. 79,5% . На 69,200 случаевъ внезапной смерти, констатированныхъ во Франціи съ 1854 до 1889 включительно, мы насчитываемъ 52,971 мужчинъ и 16,229 женщинъ, что даетъ для мужского пола 76,5% .

«Эта значительная разница зависитъ, безъ сомнѣнія, отъ того, что, съ одной стороны, мужчины по самой натурѣ своего труда и занятій болѣе женщинъ подвержены усталости, напряженію, переутомленію физическому такъ же, какъ и неустойчивостямъ погоды; съ другой стороны, мужчины чаще женщинъ предаются пьянству,—причинѣ, въ высшей степени предрасполагающей къ внезапной смерти. Правда, слѣдуетъ прибавить, что періоды менструальный, беременности, пуэрперальный занимаютъ важное мѣсто и совершенно особенное въ этіологіи внезапной смерти у женщины, на которое нельзя не обратить вниманія» (Legros).

Центральный Статистическій Комитетъ обработалъ данныя о насильственныхъ и внезапныхъ смертяхъ за періодъ 1870—1893. На 100 случаевъ естественной смерти приходится вообще въ Европейской Россіи 1,2% насильственной и внезапной для обоего пола жителей, 1,9% для мужского пола и 0,5% для женскаго пола. За періодъ 1870—1874 изъ всѣхъ видовъ неестественной смерти въ 49 губерніяхъ Европейской Россіи скоропостижно умершіе отъ болѣзней и болѣзненныхъ припадковъ составляютъ 40,7% . Случаи скоропостижно умершихъ отъ болѣзней являются наиболѣе въ

городахъ, чѣмъ въ селеніяхъ, что объясняется неодинаковымъ родомъ жизни и жизненныхъ условій; особенно наибольшій процентъ скоропостижно умершихъ находится въ столицахъ и въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ города имѣютъ густое населеніе и тергово-промышленное значеніе.

Если принять во вниманіе отношеніе городского населенія къ уѣздному, которое для всей Имперіи равно 16,67% , то неестественная смертность городского населенія выразится по отношенію къ таковой же смертности уѣднаго населенія, принятой за 100, числомъ 128,3, т. е. неестественная смертность въ городахъ на 28,3% больше таковой же въ уѣздахъ.

«За 13-лѣтній періодъ 1875—1887 гг. отъ начала его къ концу, отношеніе числа женщинъ къ числу мужчинъ, умиравшихъ неестественной смертью, измѣнялось, хотя и слабо, но имѣло замѣтную наклонность къ повышенію. Имѣющіе этого отношенія въ указанномъ направленіи позволяетъ заключить, что число случаевъ неестественной смерти среди женщинъ имѣетъ наклонность къ постепенному возрастанію. Въ 49 губерніяхъ Европейской Россіи это отношеніе въ пятилѣтіе 1870—1874 гг., равнялось 27,1 женщинъ на 100 мужчинъ, было значительно ниже, чѣмъ, въ среднемъ, за періодъ 1875—1887-гг., когда оно было 29,5 женщинъ на 100 мужчинъ; въ отдѣльности же по 10 Привислинскимъ губерніямъ оно выше въ полтора раза, достигая 44,3 женщинъ на 100 мужчинъ.

	Женщинъ на 100 мужчинъ, умершихъ неестественною смертью.			
	Евр. Россія.		Привисл. край.	
1888	33,3	32,8	45,1	42,4
1889	32,3		40,2	
1890	34,8	34,7	44,7	46,2
1891	34,6		47,9	
1892	34,8	35,0	41,3	43,0
1893	35,1		44,6	

Отсюда видно, что данное отношеніе по Европ. Россіи имѣетъ наклонность къ возрастанію и это становится еще очевиднѣе при разсмотрѣніи этого отношенія по тремъ двухлѣтіямъ. Въ Привислинскомъ краѣ то-же отношеніе какъ бы дошло до высшаго предѣла и отклоняется отъ него въ ту и другую сторону.

Наименьшая разность между числами умершихъ неесте-

ственною смертью того и другого пола оказывается въ 8 изъ 10-ти привислинскихъ губерній, за исключеніемъ Сѣдлецкой и Ломжинской, въ которыхъ эта разность значительно выше; въ среднемъ, по этимъ 8 привислинскимъ губерніямъ приходится 45,6 женщинъ на 100 мужчинъ, умершихъ неестественною смертью. Наибольшая разность оказывается въ двухъ прибалтійскихъ губерніямъ, Курляндской и Лифляндской (на 100 муж-

Женщинъ на 100 мужчинъ умершихъ отъ

По губерніямъ.	Отъ болѣзней.	Всего отъ неестеств. причинъ.		Отъ болѣзней.	Всего отъ неестеств. причинъ.		Отъ болѣзней.	Всего отъ неестеств. причинъ.
1. Кур. . .	18,9	18,7	21. Уфим. .	24,1	26,5	41. Ковенск.	30,4	33,2
2. Лифл. .	16,2	19,5	22. Арханг. .	20,4	26,5	42. Воронеж.	34,0	33,8
3. Псков. .	12,0	19,5	23. Моск. .	29,4	27,6	43. Волын.	32,7	34,6
4. С.-Петерб.	20,4	19,6	24. Перм. .	28,0	27,6	44. Тамбов.	33,5	34,7
5. Витеб. .	15,2	20,3	25. Симбир. .	20,6	27,8	45. Ломжин.	42,2	35,6
6. Таир. . .	17,7	20,6	26. Костр. .	24,2	28,9	46. Курск. .	36,7	36,0
7. Твер. . .	17,6	21,6	27. Сарат. .	26,3	29,0	47. Сѣдлецк.	38,2	36,9
8. Новгор. .	19,7	23,6	28. Вятск. .	32,9	29,0	48. Кіевск. .	34,6	38,2
9. Олонец. .	18,7	24,1	29. Рязан. .	25,2	29,5	49. Харьков.	38,9	40,6
10. Ижегор.	18,8	24,7	30. Волог. .	25,8	29,5	50. Полтав. .	34,0	41,3
11. Самар. .	17,1	24,7	31. Вятск. .	24,1	30,6	51. Подольск.	39,2	41,3
12. Екатер. .	22,3	25,0	32. Могилев.	28,0	30,6	52. Люблинск.	51,2	41,4
13. Астрах. .	28,1	25,1	33. Минск. .	31,9	30,7	53. Радомск.	41,7	43,0
14. Перм. . .	21,8	25,2	34. Херс. . .	23,6	30,8	54. Сувалк. .	43,5	43,5
15. Смолен. .	22,8	25,2	35. Бессар. .	28,6	31,0	55. Варшав. .	53,0	43,7
16. Владим. .	23,5	25,5	36. Орлов. .	31,5	31,0	56. Плоцк. .	53,7	47,0
17. Калуж. .	23,6	26,0	37. Тульск. .	29,8	31,6	57. Петроков.	62,7	47,9
18. Эстл. . .	35,5	26,0	38. Чернігов.	28,5	31,6	58. Калиш. .	47,9	48,1
19. Оренб. .	21,4	26,0	39. Казанск. .	31,1	31,8	59. Кѣлецк. .	55,4	50,7
20. Яросл. .	26,2	26,1	40. Грод. .	35,0	33,1			

чинъ, умершихъ отъ болѣзней, женщинъ—18,9 и — 16,2); въ губерніяхъ пріозерныхъ, крайняго сѣвера, новороссійскихъ, центрально-промышленныхъ и земледѣльческихъ, волжскихъ, пріуральскихъ, бѣлорусскихъ и литовскихъ неестественною смертью умершихъ мужчинъ отъ $5^1/_2$ до 3 разъ больше, чѣмъ женщинъ; губерніи малороссійскія, три изъ центрально-земледѣльческихъ, Воронежская, Тамбовская и Курская, и югозападныя имѣютъ значительно меньшую разность между числами умирающихъ неестественною смертью того и другого пола, причемъ губерніи Подольская, Полтавская, Харьковская и Кіевская приближаются къ губерніямъ Привислинскимъ. Вообще можно

замѣтить, что отношеніе числа женщинъ къ числу мужчинъ, умирающихъ неестественною смертью, въ большинствѣ значительно выше въ губерніяхъ съ болѣе густымъ населеніемъ, чѣмъ въ губерніяхъ слабо населенныхъ. Достаточно бѣглаго взгляда на таблицу, чтобы заключить, что распредѣленіе губерній въ порядкѣ, соотвѣтствующемъ возрастанію отношенія числа женщинъ къ числу мужчинъ, умершихъ скоропостижно отъ болѣзней, очень мало отличалось-бы отъ вышеприведеннаго, различіе было бы нѣсколько болѣе при распредѣленіи губерній по отношеніямъ, соотвѣтствующимъ категоріямъ несчастныхъ случайностей и убійствъ (которыя нами здѣсь опущены), но тѣмъ не менѣе и въ этихъ случаяхъ общій порядокъ, за частными исключеніями, остался бы неизмѣннымъ».

ВОЗРАСТЪ

Количество случаевъ скоропостижной смерти (1900—1909).	До 1 г.	1 — 4	5 — 9	10 — 14	15 — 19	20 — 24	25 — 29	30 — 34	35 — 39	40 — 44	45 — 49	50 — 54	55 — 59	60 — 64	65 — 69	70 — 74	75 — 79	Всего
Мужчины. .	28	5	3	6	25	24	44	51	69	92	73	55	42	16	6	5	1	545
Женщины. .	20	—	4	5	3	9	14	20	25	14	12	20	17	16	12	4	2	197
Всего. . .	48	5	7	11	28	33	58	71	94	106	85	75	59	32	18	9	3	742

Приводимыя Legros'омъ данныя Devergie, Tourdes'а, Lacassagne'я о вліяніи возраста на скоропостижную смерть, показываютъ, что наибольшее число смертныхъ случаевъ прихо-

ВОЗРАСТЪ

Количество случаевъ скоропостижной смерти (1885—1889).	До 1 г.	1 — 4	5 — 9	10 — 14	15 — 19	20 — 24	25 — 29	30 — 34	35 — 39	40 — 44	45 — 49	50 — 54	55 — 59	60 — 64	65 — 69	70 — 74	75 — 79	80 — 84	85 и выш.	Неизв. возр.	Всего
Мужчины .	10	4	1	3	21	51	71	79	92	90	58	59	45	20	19	3	2	2	1	18	649
Женщины .	8	3	2	2	8	12	24	34	26	33	27	18	14	20	9	4	3	—	1	5	252
Всего . .	18	7	3	5	29	63	95	113	118	123	85	77	59	40	28	7	5	2	1	23	901

дится на возрастъ 40 — 70 лѣтъ, Lochte — на 30—70 лѣтъ. Приводимыя нами таблицы смертности по пятилѣтіямъ за 25 лѣтъ

даютъ maximum смертности въ возрастѣ 25 — 60, и даже 20—60, причемъ у мужчинъ maximum падаетъ на 40—44 г., у женщинъ же случаи распредѣляются болѣе или менѣе равномѣрно, съ тенденціей не ослабѣвать и въ болѣе позднемъ возрастѣ отъ 60 до 70 л. До 15 лѣтъ смертность незначительна, за исключеніемъ самаго ранняго дѣтскаго возраста (до 1 года).

Очень часто встрѣчается между сердечно-сосудистыми почти всегда сложными пораженіями **суженіе или облитерація вѣнечныхъ сосудовъ**, которыя по мнѣнію авторовъ (Huber, Huchard etc.) вслѣдствіе ослабленнаго питанія сердца, до поры до времени справляющагося съ своей задачей при умѣренной работѣ, при усиленномъ запросѣ на его работу приводятъ къ смерти. Но факты показываютъ, что часто умираютъ безъ случайнаго вліянія усталости, напряженія или волненія и пр. условій, повышающихъ артеріальное давленіе, между тѣмъ какъ не задолго передъ тѣмъ могли безнаказанно исполнять работы, требовавшія извѣстнаго напряженія. Key-Åberg, который изслѣдовалъ 13 чистыхъ случаевъ склероза вѣнечныхъ артерій, не сопровождавшихся пораженіями клапановъ или міокарда, нашелъ, что жировое перерожденіе мускулатуры сердца встрѣчается въ такихъ случаяхъ относительно рѣдко въ такомъ распространеніи и силѣ, чтобы съ полнымъ правомъ видѣть въ немъ ближайшую причину паралича сердца. Образовавшійся некрозъ, даже довольно большой, «переходитъ въ исцѣленіе», и потеря въ мышечномъ веществѣ нерѣдко возстановляется викаріирующей мышечной гипертрофіей. Какъ предполагаетъ Key-Åberg, опасность наступленія паралича сердца, при значительномъ некрозѣ въ сердцѣ, стоитъ въ прямомъ отношеніи къ скорости, съ которою развились измѣненія въ сосудѣ, которыми былъ вызванъ некрозъ. Во многихъ же случаяхъ анатомическія отношенія, гдѣ въ сердцѣ нѣтъ ни замѣтнаго жирового перерожденія, гдѣ не было свѣжихъ некротическихъ измѣненій, и вѣнечныя артеріи представляютъ только старыя измѣненія, въ удовлетворительной степени не объясняютъ внезапнаго наступленія паралича сердца. Общее же всѣмъ случаямъ—образованіе въ обширной области сердца препятствій для циркуляціи въ собственныхъ сосудахъ органа. Общее суженіе артерій или разсѣянное тяжелѣе, чѣмъ облитерація одной вѣтви, вслѣдствіе трудности или невозможности коллятеральнаго кровообращенія.

Въ 1832 г. Corrigan, говоря **о недостаточности клапановъ**

аорты, писалъ: «Сердечные больные вообще боятся внезапно умереть. Необходимо бороться съ этою боязнью, и это можно сдѣлать съ чистой совѣстью, потому что до сихъ поръ неизвѣстно ни одного примѣра внезапнаго гибельнаго исхода аортальной недостаточности». Въ 1849 г. Aran выступаетъ противъ этого мнѣнія съ своей сборной статистикой 113 случаевъ сердечно-сосудистыхъ пораженій, въ которой нашлось 25 случаевъ, гдѣ единственнымъ пораженіемъ была недостаточность клапановъ аорты; «изъ всѣхъ причинъ внезапной смерти самыя частыя—болѣзни клапановъ, и главнымъ образомъ клапановъ аорты». Какъ до Aran'a учитель его Gendrin, такъ и другой ученикъ послѣдняго Mauriac («De la mort subite dans l'insuffisance des valvules sigmoïdes de l'aorte», thèse 1860) говорили о важности этого пораженія, причиняющаго внезапную смерть. Между тѣмъ, этотъ порокъ встрѣчается рѣже другихъ и почти исключительно въ сопровожденіи другихъ пораженій сердца. «Между всѣми хроническими пораженіями сердца или аорты, которыя могутъ причинить скоропостижную смерть, недостаточность аорты есть, напротивъ, одно изъ тѣхъ, которыя встрѣчаютъ рѣже всего» (Vibert). И вообще, говоритъ дальше Vibert, хроническія пораженія клапановъ вызываютъ рѣдко скоропостижную смерть. Когда они существуютъ (менѣе, чѣмъ въ половинѣ опубликованныхъ случаевъ въ статистикахъ), то почти всегда сопровождаются другими поврежденіями: хроническими міокардитами, суженіемъ вѣнечныхъ сосудовъ, атероматозомъ и расширеніемъ аорты, сердечными сращеніями и др.

Въ статистикѣ Lesser'a на 71 случай хроническихъ пораженій сердца и аорты недостаточность клапановъ аорты встрѣчается 3 раза, mitralis — 10, mitralis и valv. aortae—13,—въ связи съ другими измѣненіями сердца. Въ статистикѣ Wynn Westcott'a въ 149 случаяхъ пораженія хроническаго сосудовъ и сердца недостаточность сердечныхъ клапановъ отмѣчена 20 разъ. У насъ среди 90 случаевъ съ пораженіями клапановъ встрѣчается на ряду съ другими сердечно-сосудистыми пораженіями 24 раза недостаточность valv. aortae, 25—mitralis, 30 valv. mitralis и aortae, 5—valv. bi- и tricusp., 1 разъ—valv. tricusp. и 5 разъ—valv. mitr. + aort. + tricusp.

При **недостаточности митральныхъ клапановъ**, «достаточно гипереміи легкихъ, даже у молодого человѣка, чтобы вызвать внезапную смерть; обильный обѣдъ съ возліяніями—обстоятельство, наиболѣе благопріятствующее гипереміи. Англійскіе авторы приписываютъ митральной недостаточности большое количество

скоропостижныхъ смертей» (Brouardel). При этомъ пораженіи вообще существуетъ небольшая гиперемія легкихъ; когда же имѣется еще суженіе, кровообращеніе въ легкихъ совершается съ трудомъ; стоитъ только присоединиться бронхиту, какъ немедленно появятся припадки удушья и въ очень сильной степени. При разстройствѣ же почечной функціи при незначительной альбуминуріи можетъ очень быстро послѣдовать отекъ легкихъ, и сердечный больной, имѣющій бронхитъ, умираетъ отъ удушья въ нѣсколько часовъ.

Vibert считаетъ сомнительнымъ, чтобы чрезмѣрное обложеніе сердца жиромъ съ значительнымъ въ то же время истощеніемъ мышечныхъ стѣнокъ, не превышающихъ толщиною въ правомъ желудочкѣ одного миллиметра, составляло частую причину смерти, жировая же дегенерація сердца, обычно ограничивающаяся малымъ числомъ клѣтокъ и случающаяся одновременно съ другими поврежденіями и въ особенности съ суженіемъ вѣнечныхъ сосудовъ, какъ причина внезапной смерти должна быть разсматриваема, какъ очень незначительная. Склерозъ, наблюдаемый въ половинѣ случаевъ, почти всегда или мало выраженъ, или мало распространенъ. Въ концѣ концовъ, Vibert приходитъ къ заключенію, что причиною скоропостижной смерти являются въ большинствѣ случаевъ многочисленныя и сложныя поврежденія сердечно-сосудистой системы, почти всегда связанныя другъ съ другомъ, и трудно различить, какое изъ нихъ играетъ главную роль въ механизмѣ смерти; единственно же, суженіе вѣнечныхъ сосудовъ способно само по себѣ вызвать внезапную смерть, а встрѣчаемое въ большинствѣ случаевъ рядомъ съ другими пораженіями, кажущимися менѣе важными, вѣроятно, составляетъ причину достаточно частую скоропостижной смерти отъ сердца.

Lochte главное значеніе въ вопросѣ о скоропостижной смерти у сердечныхъ больныхъ въ большинствѣ случаевъ приписываетъ пораженію міокарда и заболѣванію начальной части аорты, resp. всѣмъ степенямъ отъ стеноза до почти полной атрезіи вѣнечныхъ сосудовъ.

«Сердце, говоритъ Lacassagne, играетъ рѣшающую роль при внезапной смерти столько же какъ причина производящая, сколько и предрасполагающая. Несомнѣнно, что большое число гиперемій или легочныхъ апоплексій были подготовлены предшествующими болѣзнями и часто скрытыми сердечно-сосудистаго аппарата, или что онѣ находятся въ зависимости отъ другой причины, еще не указанной авторами: мы

хотимъ сказать **о вліяніи превральныхъ сращеній и переполненія желудка.** Превральныя сращенія, на самомъ дѣлѣ, крайне часты у лицъ, которые умираютъ внезапно. Ихъ встрѣчаютъ въ отношеніи 80 : 100. Люди, у которыхъ легкія заключены какъ въ корсетѣ, находятся подъ угрозой внезапной смерти. Стѣсненіемъ, причиняемымъ свободному движенію грудной клѣтки, эти сращенія въ особенности благопріятствуютъ параличу сердца. Тоже относится къ состоянію переполненія желудка, которое препятствуетъ кровообращенію и можетъ вызывать легочныя или мозговыя гипереміи». (Mallen. De l'estomac au point de vue médico-légal. Thèse de Lyon, 1883).

«Я думаю, прибавляетъ Lacassagne, что желудокъ заслуживаетъ все болѣе и болѣе наименованія четвертой полости, которое я ему далъ по причинѣ его судебно-медицинскаго значенія. Это центръ явленій отраженныхъ и сосудо-двигательныхъ перваго разряда. Подъ вліяніемъ замедленнаго переваренія пищи, которая застаивается въ желудочно-кишечномъ каналѣ, является судорожный кашель, стѣсненіе въ груди, одышка и другіе астматическіе припадки или даже судороги. Желудокъ есть точка отправленія рефлекса, который, при посредствѣ служащаго нерва, обусловливаетъ измѣненія въ легочномъ кровообращеніи, и у лицъ съ плевральными сращеніями происходятъ тогда гиперемія и отекъ. Я думаю даже, что признаютъ, что случаи скоропостижной смерти легочнаго происхожденія первичные—рѣдки и они—только вторичные».

Lochte также обращаетъ вниманіе на недостаточно оцѣненныя двусторонніе превральныя сращенія, какъ на причину внезапной смерти.

Brouardel, говоря о случайныхъ причинахъ смерти, о напряженіи, наблюдающемся при родахъ, пароксизмахъ коклюша, во время дефекаціи и даже coïtus, во время работы пищеваренія, когда часто наблюдаются геморрагіи въ концѣ обильной ѣды съ возліяніями, останавливается на вліяніи тепла и холода, какъ причинахъ, способствующихъ скоропостижной смерти при существованіи причины основной. Благодаря расширенію капиляровъ подъ вліяніемъ тепла, сосудистое давленіе падаетъ. Если расширеніе сосудовъ значительное, а сердце ослаблено какою-нибудь причиною, можетъ произойти у лицъ, страдающихъ, напр., недостаточностью клапановъ аорты, смерть. Подъ дѣйствіемъ холода, сосуды сжимаются, сосудистое давленіе увеличивается, кровь устремляется къ внутреннимъ органамъ, и если какой-нибудь сосудъ измѣненъ, то онъ разры-

вается. Это случается съ лицами, страдающими аневризмой, особенно миліарной аневризмой. Въ нашихъ случаяхъ можно отнести къ послѣдней категоріи случаевъ № 593, когда нетрезвый человѣкъ помѣщенъ былъ въ нетопленую квартиру и утромъ умеръ отъ кровоизліянія въ оболочки мозга, и № 293, когда субъектъ, явившись въ сильно нетрезвомъ видѣ домой, залѣзъ спать въ жарко натопленную сушильню и умеръ отъ паралича жирно-перерожденнаго сердца. Во время дефекаціи умерло 6 человѣкъ (241, 265, 296, 540, 564, 609). Въ банѣ, которая, какъ извѣстно, благодаря своей высокой температурѣ, дѣйствуетъ утомляющимъ образомъ на сердце, умерло 11 человѣкъ (37, 43, 64, 104, 126, 218, 223, 244, 274, 585, 640), вскорѣ послѣ бани—5 (7, 92, 185, 322, 653). Беременныя, въ большинствѣ въ послѣднихъ дняхъ, умерли: 1 — отъ заворота кишекъ (477), 1—отъ нефрита (480), 1—отъ нефрита и кровоизліянія въ мозгъ (484), 3—отъ мозгового кровоизліянія (549, 555, 566), 4—отъ кровотеченія при родахъ (635, 637—639), 1—отъ выкидыша въ началѣ брюшного тифа (510). Въ припадкѣ падучей болѣзни умерло двое (686, 720) отъ задушенія рвотными массами.

В. А. Таранухинъ на XI Пироговскомъ съѣздѣ (1910) сдѣлалъ докладъ о своихъ наблюденіяхъ надъ 6 случаями скоропостижной смерти у беременныхъ. Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ другихъ измѣненій, было констатировано суженіе отверстія двустворчатаго клапана и отекъ легкихъ; при жизни же это заболѣваніе трудно констатируется изъ-за отсутствія при немъ гипертрофіи лѣваго желудочка (Цит. по отчету «Практ. Медиц.»).

Вторую по важности группу скоропостижной смерти занимаютъ **измѣненія мышцы сердца**, 70 случаевъ. Эти измѣненія—ожирѣніе сердца, жировое перерожденіе сердца, фиброзное перерожденіе сердца. «Человѣкъ, имѣющій ожирѣвшее сердце, не считаетъ себя больнымъ; онъ имѣетъ хорошій видъ, быть можетъ, нѣсколько задыхается, но онъ никогда не имѣлъ ни признака удушья, ни симптомовъ грудной жабы, которые давали бы ему предостереженіе. И однако это лицо одержимо страданіемъ, которое подвергаетъ его опасности внезапной смерти». (Brouardel). «Жировое перерожденіе развивается медленно и скрытно, оно поражаетъ часто сердца гипертрофированныя и представляетъ тѣ же опасности, что и ожирѣніе сердца». Въ эту группу вошли случаи съ ожирѣніемъ сердца (31 случай), съ эндокардитомъ (7) и съ дегенеративными изм

мѣненіями мышцы сердца (32 случая), всего 70 случаевъ, или 11% всѣхъ случаевъ смерти, начиная съ 15-ти лѣтняго возраста. Дѣйствительно, въ сравненіи съ группой эндоартеріита сердце въ большинствѣ случаевъ было увеличено, значительно—въ половинѣ случаевъ, въ 30% была гипертрофія стѣнокъ сердца, и почти въ половинѣ случаевъ сложеніе было крѣпкое.

Третья важнѣйшая по численности группа причинъ скоропостижной смерти въ нашей статистикѣ — **закрытіе просвѣта дыхательныхъ путей** (зѣва, входа въ гортань, гортани, дыхательнаго горла) инородными тѣлами, а именно, исключительно пищевыми веществами, или запруженіе дыхательныхъ путей аспирированнымъ содержимымъ желудка, извергнутымъ рвотою. Запираніе дыхательныхъ путей здѣсь происходило вслѣдствіе проглатыванія большихъ кусковъ пищи, застрявшихъ во входѣ въ гортань, или же попадавшихъ частью въ пищеводъ, частью въ гортань, плотно закрывавшихъ входъ въ дыхательные пути: въ двухъ случаяхъ это было связано съ алкоголизмомъ, съ глубокимъ опьяненіемъ и сильною потерею чувствительности, одинъ случай наблюдался, повидимому, у эпилептика; одинъ случай былъ у ребенка 1 г. 3 мѣс., подавившагося кускомъ яблока, который былъ найденъ при вскрытіи у развѣтвленія трахеи, величиною съ лѣсной орѣхъ, и одинъ—у женщины за ужиномъ, которая вдругъ упала безъ сознанія на полъ. Въ большинствѣ случаевъ задушеніе обусловливалось рвотою въ почти безсознательномъ состояніи отъ опьяненія, втягиваніемъ рвотныхъ изверженій въ дыхательные пути. 9 лицъ изъ нихъ найдено поутру мертвыми въ постели, двое — на лѣстницѣ; трое умерли въ припадкѣ падучей болѣзни. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ у сильно опьянѣвшихъ лицъ была рвота, смерть слѣдовала не моментально, а минутъ черезъ пять, четверть часа или даже часъ. У 8 грудныхъ ребятъ отъ 3 недѣль и до 5 мѣсяцевъ отмѣчены или желудочно-кишечный катарръ, или значительная слабость и исхуданіе; у 8-лѣтняго мальчика—дифтеритъ съ свѣжимъ эндокардитомъ. Дѣти гораздо легче, сравнительно со взрослыми, умираютъ отъ задушенія пищею, попадающею въ дыхательные пути при рвотѣ или даже иногда во время ѣды. Въ большинствѣ случаевъ отмѣчены или измѣненія хроническихъ клапановъ сердца, склерозъ аорты (№№ 689, 691, 695, 701, 704, 706, 708, 721), склерозъ вѣнечныхъ артерій (689, 714—716, 721, 726) въ различныхъ степеняхъ, ожирѣніе сердца (688, 689, 691, 692, 694, 698—700, 704, 709, 710, 714, 715, 718, 721, 722, 724), міокар-

дить, благопріятствовавшіе смерти и ослаблявшіе противодѣйствіе организма или парализовавшія способность его преодолѣть причину внезапно наступившихъ препятствій дыханію. Въ одномъ случаѣ сердце на небольшомъ протяженіи было сращено съ сумкой рыхлыми перепонками.

Thiemich держится того мнѣнія, что даже у тяжело больныхъ грудныхъ младенцевъ, если только они не погружены въ глубокую спячку, рефлексъ при подаваніи пищеи и передъ смертью функціонируетъ исправно, что прониканіе незначительной массы содержимаго желудка можетъ произойти и дать поводъ къ возникновенію пневмоніи, но запуженіе всего бронхіальнаго дерева и обусловленное этимъ задушеніе невозможно. Дѣло идетъ здѣсь обыкновенно о простомъ изліяніи содержимаго желудка въ трахею, непосредственно ante mortem, послѣ того какъ всѣ рефлексы и рефлекторное замыканіе cardia прекратились.

Lesser приводитъ 9 случаевъ этого вида скоропостижной смерти, замѣчая, что ни въ одномъ изъ случаевъ не разсказывается чего-либо о наступленіи общихъ судорогъ; то же ему подтвердилъ Stenger, сообщившій 4 аналогичныхъ случая внезапной смерти, которые произошли въ его присутствіи; въ наблюденіяхъ Stenger'a, также какъ у самого автора, наступило безсознательное состояніе и смерть «апоплексическая», въ теченіе секундъ. На это обстоятельство обращалъ вниманіе и Беллинъ. Въ трехъ случаяхъ задушенія рвотными массами найденъ былъ одинъ разъ (№ 700) при развѣтвленіи бронховъ кусокъ мяса $4 \times 2 \times 1{,}5$ стм., плотно вколоченный въ дыхательное горло и сидѣвшій сѣдлообразно на развѣтвленіи бронховъ, другой разъ (№ 705)—входъ въ гортань и дыхательная щель были забиты совершенно плотно большимъ кускомъ мяса $4 \times 2{,}5$ снт., и въ третьемъ (№ 718) случаѣ—у мѣста развѣтвленія бронховъ находился пищевой комокъ $8 \times 1{,}5$ снт., закупоривавшій вполнѣ трахею и нижнимъ концомъ заходившій въ правый бронхъ.

Въ этой же группѣ есть 7 случаевъ скоропостижной смерти маленькихъ дѣтей въ возрастѣ отъ одного дня до $2^1/_2$ лѣтъ; смерть послѣдовала отъ неосторожности матерей, придавившихъ ребенка во время сна или отъ чрезмѣрнаго укутыванія съ головой (Vibert нѣсколько скептически относится къ такого рода «объясненію внезапной смерти у дѣтей). У дѣтей съ особенною легкостью происходятъ приливы крови къ легкимъ или отекъ легкихъ, которые могутъ появиться неожиданно и пріобрѣсти очень быстро большую интенсивность.

Mors thymica.—Сюда также причислены 4 случая смерти, гдѣ на вскрытіи оказалась увеличенной вилочковая железа. Большинство авторовъ ставятъ въ связь наступающую внезапно смерть съ существованіемъ больной железы thymus, считая за ближайшую причину смерти асфиксію отъ давленія увеличенной gl. thymus на трахею.

Проф. Дм. Соколовъ, пользуясь матеріалами по вопросу о роли железы въ физіологическомъ и патологическомъ состояніи, собранными имъ болѣе чѣмъ за десять лѣтъ въ лабораторіи, на вскрытіяхъ и въ клиникѣ, подвергаетъ оцѣнкѣ существующую литературу и теоріи «mors thymica». Извѣстно, что всякое задушеніе не можетъ произойти сразу: у дифтерійныхъ больныхъ, съ пораженіемъ гортани, бываетъ сравнительно огромная gl. thymus, и все же одной ея недостаточно для появленія внезапной смерти; обыкновенно бываетъ долго длящаяся агонія, и задушеніе происходитъ постепенно. При такъ наз. mors thymica дѣтей находятъ мертвыми въ совершенно спокойномъ положеніи, сильный и крѣпкій ребенокъ такимъ образомъ совершенно не реагировалъ на недостатокъ воздуха. Внезапной mors thymica не можетъ быть отъ сдавленія трахеи. Приводятъ въ доказательство запрокидываніе головы ребенка, но во время запрокидыванія головы происходитъ потягиваніе за гортань, ведущее къ раздраженію рефлекторному центровъ, и за раздраженіемъ ихъ является вздохъ. Железа не можетъ оказывать вліянія на сосѣдніе органы и своимъ вѣсомъ, такъ какъ въ опытахъ для сдавленія гортани или уменьшенія ея просвѣта нужна тяжесть отъ 200 до 1000 грм. Кромѣ того, железа лежитъ въ закрытой грудной полости и движется вслѣдъ за движеніемъ грудной клѣтки, тяжесть органа не можетъ играть роли. На шеѣ же лежитъ только небольшая часть thymus, а смерти не бываетъ и при давленіи зоба въ 500 грм. Если же на секціи мы видимъ сдавленной трахею подъ gl. thymus, то вслѣдствіе попаданія воздуха при вскрытіи въ переднее средостѣніе мы приводимъ въ дѣйствіе законы тяжести, отчего и сдавливаются дыхательные пути.

Проф. Соколовъ причину смерти видитъ здѣсь въ «хлоротическо-лимфатической конституціи»: «при извѣстномъ нарушеніи обмѣна веществъ наступаетъ постепенное переполненіе организма тѣми или другими вредными продуктами этого обмѣна. Начинаютъ усиленно функціонировать всѣ железистые органы, направленные къ поддержанію химическаго и статическаго равновѣсія тканей, и когда наконецъ функція этихъ

вспомогательныхъ аппаратовъ окажется недостаточной, то и наступаетъ быстрый конецъ отъ паралича сердца или паралича нервныхъ центровъ. Поэтому-то и понятно нахожденіе при этомъ увеличенія лимфатическихъ железъ, селезенки, thyreoideae, а особенно часто — thymus, но здѣсь thymus является только слѣдствіемъ дѣйствія одной общей причины, а отнюдь не самой причиной».

Thiemich смотритъ на status lymphaticus какъ на констатируемыя на трупѣ оставшіяся послѣдствія тѣхъ вредныхъ моментовъ, связанныхъ съ питаніемъ и съ разстройствами питанія, которые дѣйствовали во время грудного возраста. Благодаря неестественному и нецѣлесообразному питанію возникаетъ патологическое состояніе, ненормальная раздражительность нервной системы, которая даетъ главное условіе для внезапной смерти—безъ анатомической причины. У дѣтей въ возрастѣ отъ 6 мѣсяцевъ почти до 2 лѣтъ скоропостижные случаи смерти, для которыхъ не найдено никакихъ смертельныхъ измѣненій въ органахъ, всегда происходятъ на основѣ «неврозовъ» (конвульсій и ларинго-спазма), которые зависятъ отъ хроническихъ разстройствъ обмѣна веществъ при искусственномъ вскармливаніи: исключительно грудью вскармливаемыя дѣти остаются защищенными этими страданіями.

Въ нашихъ случаяхъ въ возрастѣ 2—4 мѣсяцевъ, въ одномъ ребенокъ часа три ночью кричалъ и успокоился подъ утро, спеленутый и положенный рядомъ съ матерью на кровать, найденъ утромъ мертвымъ; на вскрытіи сердце съ желтоватымъ оттѣнкомъ, въ развѣтвленіяхъ мелкихъ бронховъ бѣловатая слизистая жидкость, состоящая изъ эпителія и бѣлыхъ и красныхъ кровяныхъ шариковъ; во второмъ случаѣ—значительное увеличеніе въ кишкахъ солитарныхъ фоликуловъ, селезенка 6 × 8 снт.; въ третьемъ ребенокъ при переѣздѣ былъ завернутъ въ одѣяло, и оказался по пріѣздѣ мертвымъ; селезенка была увеличена вдвое, солитарныя железки и Пейеровы бляшки рѣзко увеличены, набухшія; въ четвертомъ случаѣ, ребенокъ лежалъ уткнувшись лицомъ въ подушку съ слабыми признаками жизни, изъ вѣточекъ дыхательныхъ путей выступала жидкость, подобная содержимому желудка.

Бугорчатка легкихъ. «Кровохарканья смертельныя чаще всего слѣдуютъ за хроническимъ измѣненіемъ сосудистыхъ стѣнокъ. Туберкулезъ легкихъ, особенно въ третьемъ періодѣ, именно каверноэзномъ, безспорно, самая важная и самая частая причина. Если изслѣдовать стѣнку легочной каверны, то можно

часто констатировать тамъ присутствіе многочисленныхъ сосудовъ разнаго калибра и еще полныхъ кровью: нѣкоторые изъ нихъ пересѣкаютъ даже каверну отъ одной стѣнки къ другой, и поддерживаются только нѣсколькими клѣточными тяжами (tractus). Къ этимъ сосудамъ какъ бы привѣшены маленькіе дивертикулы, извѣстные подъ именемъ аневризмъ Rasmussen'a и которые являются послѣдствіемъ частичнаго разрушенія туберкулезнымъ процессомъ сосудистой стѣнки. Стѣнка эта, такимъ образомъ измѣненная, растягивается подъ вліяніемъ давленія крови и, весьма понятно, что достаточно легкаго усилія, припадка кашля, чтобы вызвать ея разрывъ и причинить кровохарканье болѣе или менѣе тяжелое, смотря по калибру поврежденнаго сосуда, и способное повлечь за собою быстро смерть въ большомъ числѣ случаевъ». «Расширеніе бронховъ можетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, правда, рѣдкихъ, вызвать смертельное кровохарканье, вслѣдствіе особенныхъ измѣненій сосудовъ, расположенныхъ въ стѣнкѣ расширенныхъ бронховъ» (Legros).

Такихъ смертельныхъ легочныхъ кровотеченій въ нашей статистикѣ насчитывается пять случаевъ (622, 623, 625, 630, 631). Въ одномъ случаѣ кровохарканье было при хроническомъ межуточномъ воспаленіи легкаго и бронхоэктазіяхъ, съ рѣзко выраженнымъ артеріосклерозомъ; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ въ легкихъ находились каверны. Въ одномъ случаѣ (623) сердце на всемъ протяженіи было сращено со своею сумкою старыми перепонками. Два раза отмѣчено умѣренное питаніе. Въ одномъ изъ слѣдующихъ случаевъ (408) бугорки были на брюшинѣ, сальникѣ и брыжейкѣ, на слизистой гортани, и язвы въ подвздошной кишкѣ, въ другомъ (сл. 417)—была острая просовидная бугорчатка, кромѣ бугорковъ въ легкихъ и язвъ въ тонкихъ и толстыхъ кишкахъ, бугорки констатированы на печени, мочевомъ пузырѣ, прямой кишкѣ и яичникѣ съ трубою и на мягкой мозговой оболочкѣ. Въ случаѣ 407 при значительной водянкѣ въ брюшной полости находилась въ нижней долѣ праваго легкаго гнойная полость, сообщавшаяся съ полостью плевры и пробившая ходъ въ сердечную сумку, въ которой оказалось 400 грм. гнойной жидкости. Въ двухъ случаяхъ поражено было одно легкое, правое, а въ остальныхъ—оба легкія; въ 12 случаяхъ каверны были отъ лѣсного до грецкаго орѣха и куринаго яйца, а въ двухъ случаяхъ даже до небольшого яблока и кулака. Одинъ разъ бугорки наблюдались въ селезенкѣ и почкахъ (№ 414); въ пяти случаяхъ—бугорчатыя язвы въ тонкихъ и толстыхъ кишкахъ (№№ 411, 415, 419, 422, 426); въ

четырехъ—язвы на голосовыхъ связкахъ (№№ 416, 424, 425, 428), причемъ въ одномъ случаѣ (424) связки были почти уничтожены туберкулезнымъ процессомъ. За исключеніемъ четырехъ случаевъ (409, 423, 426, 430), въ которыхъ питаніе было умѣренное, во всѣхъ остальныхъ случаяхъ были различныя степени истощенія; въ семи случаяхъ замѣчался отекъ голеней и стопъ (№№ 407, 411, 412, 414, 416, 418, 423), причемъ въ одномъ (411)—съ брюшною водянкой. Въ 14 случаяхъ констатировано въ разныхъ видахъ и формахъ артеріосклерозъ; сердце во всѣхъ почти случаяхъ было сильно обложено жиромъ и мышца сердца жирно-перерождена. 9 человѣкъ вели петревую жизнь, а одинъ кромѣ того и пилъ запоемъ.

Крупозная пневмонія по численности случаевъ скоропостижной смерти занимаетъ довольно высокое мѣсто. У Kleinberg'а на 277 случаевъ смерти она наблюдалась 32 раза, причемъ въ Ригѣ было 25 случаевъ, а въ Дерптѣ—7; эта разница авторомъ объясняется тѣмъ, что въ Ригѣ матеріалъ даетъ городское населеніе, а въ Дерптѣ—и деревенское; Lesser на 171 случай нашелъ смерть отъ крупозной пневмоніи 7 разъ, Беллинъ наблюдалъ ее 24 раза на 320 случаевъ, наша статистика даетъ 31 случай. Смерть нерѣдко слѣдуетъ неожиданно, у повидимому здороваго или во всякомъ случаѣ не тяжело больного или на улицѣ, или за работою. Hofmann говоритъ: «достойно вниманія, что иногда и тяжкія воспалительныя и инфекціонныя заболѣванія могутъ протекать скрытно и привести къ неожиданной и даже внезапной смерти послѣ того, какъ болѣзнь уже просуществовала болѣе или менѣе продолжительное время. Давно уже намъ извѣстно это насчетъ тифа; согласно нашимъ наблюденіямъ, наравнѣ съ амбулаторнымъ тифомъ существуютъ и амбулаторныя формы пневмоніи, перитонита и даже менингита; намъ встрѣчались подвинувшіеся стадіи всѣхъ этихъ заболѣваній у лицъ среди дѣла и обычныхъ занятій скончавшихся. Такое скрытное теченіе, повидимому, чаще всего принимаетъ пневмонія».

«У стариковъ, у алкоголиковъ, у лицъ находящихся въ состояніи промежуточномъ между здоровьемъ и болѣзнью, какъ напр., у беременныхъ женщинъ, пневмонія, даже гнойныя, развиваются совершенно скрытнымъ образомъ». (Brouardel).

«Умираютъ въ коматозномъ состояніи совершенно неожиданно лица, которыя передъ тѣмъ лежали нѣсколько часовъ, въ теченіе трехъ или четырехъ предшествующихъ дней жалуясь только на неопредѣленное недомоганіе съ ознобомъ, не нарушая ни въ чемъ своей обычной жизни». (Sallard, цит

по Legros'y). Тѣ же явленія наблюдались и въ нашихъ случаяхъ: очень часто падали на улицѣ и вскорѣ умирали, и очень часто не прекращали своихъ обычныхъ привычекъ—пьянства. Пневмонія была у 15 алкоголиковъ; одинъ разъ (358) у рожденицы съ недостаточностью двустворки, жировымъ перерожденіемъ почекъ и увеличенной щитовидной железой. Четверо обладали сложеніемъ крѣпкимъ, 21—умѣреннымъ и 6—слабымъ.

Правое легкое было поражено воспалительнымъ процессомъ 20 разъ, лѣвое—9, оба легкія—3 раза. При воспаленіи праваго легкаго поражена была верхняя доля 8 разъ, средняя—2, нижняя—4, верхняя и нижняя, верхняя и средняя и средняя и нижняя—по 1 разу, все легкое—2 раза; въ лѣвомъ легкомъ верхняя доля поражена была 2 раза, нижняя—6, и все легкое 1 разъ. Смерть наступила въ періодѣ краснаго опеченѣнія 7 разъ, при переходѣ краснаго въ сѣрое—12 разъ, въ сѣромъ—6, при переходѣ въ желтое—2, въ желтомъ—2 и въ различныхъ періодахъ—2. Изъ осложненій наблюдались различныя формы артеріосклероза 16 разъ, со стороны плевры 10 разъ, брюшины—2 раза и почекъ 3 раза, въ одномъ случаѣ были явленія менингита. Въ одномъ случаѣ (365) въ лѣвой лобной долѣ найдено было варжавѣлое лезвіе малаго перочинаго ножа, при чемъ рубца на кожѣ черепа на соотвѣтственномъ мѣстѣ не замѣтно.

Kleinberg обращаетъ вниманіе на то обстоятельство, что, какъ извѣстно изъ ежедневнаго опыта, въ большинствѣ случаевъ пневмонія поражаетъ предпочтительно нижнюю долю, между тѣмъ въ его статистикѣ изолированное заболѣваніе верхней доли встрѣчалось почти столь же часто, какъ и нижней (11 : 13), а также отмѣчаетъ и то, что пневмонія въ моментъ смерти была уже въ далеко зашедшемъ періодѣ. Поражается чаще правое легкое, и именно его нижняя доля. Въ нашей статистикѣ выступаетъ противоположное отношеніе: причиной внезапной смерти чаще было поражение нижней доли лѣваго легкаго (6 : 2), а въ правомъ легкомъ—верхней доли (8 : 4); такимъ образомъ изолированное поражение одной доли, верхней или нижней, встрѣчалось одинаково часто (10 : 10). Смерть наступила въ 1-мъ періодѣ 7 разъ, въ остальныхъ періодахъ—22 раза. Въ данныхъ Беллина чаще всего значится нижняя доля (8 случ.), въ 3-хъ случаяхъ—средняя, въ 4-хъ—все лѣвое легкое; относительно 9 случаевъ нѣтъ отмѣтокъ. По даннымъ Александрова чаще поражалась одна доля лѣваго легкаго.

«Иногда наблюдаются какъ бы эпидеміи пневмоніи, не

сопровождающейся ни высокой t°, ни ржавой мокротой, и Kleinberg говоритъ, что пневмонія, поражающая по преимуществу верхнія доли легкихъ, протекаетъ безъ повышенія t° и безъ ржавой мокроты, выражается же только небольшимъ недомоганіемъ, на которое и сами больные не обращаютъ вниманія» (Игнатовскій).

Катаральная пневмонія вскрытіемъ была обнаружена у 9 дѣтей въ возрастѣ отъ 9 дней до 4 мѣсяцевъ, и у 10 взрослыхъ отъ 16 до 78 лѣтъ. Изъ послѣднихъ 6 постоянно пьянствовали. Смерть у всѣхъ была совершенно неожиданная. Пятеро сложенія были умѣреннаго, четверо—слабаго. У 8 были измѣненія въ сердечно-сосудистой системѣ: двое были съ ожирѣлымъ и жирнопереродженнымъ сердцемъ, шесть—съ артеріосклерозомъ, причемъ у двоихъ была аневризма аорта, а у одного изъ нихъ пневмонія осложнялась еще экссудативнымъ плевритомъ.

Одинъ разъ наблюдалась **гриппозная пневмонія** у 20-лѣтняго мужчины, за нѣсколько дней передъ тѣмъ выписавшагося изъ больницы.

Капиллярный бронхитъ у дѣтей. Болѣзни легкихъ имѣютъ большое значеніе въ дѣтскомъ возрастѣ. Очень часты въ грудномъ возрастѣ лобулярныя пневмоніи, которыя, присоединяясь къ тяжелымъ желудочно-кишечнымъ разстройствамъ у дѣтей, и безъ того уже подвергающимъ ихъ жизнь опасности, ведутъ къ смерти. Очень часто ведетъ къ неожиданной смерти капиллярный бронхитъ: «когда ребенокъ имѣетъ не больше 1—6 мѣсяцевъ, онъ можетъ умереть при первомъ приливѣ крови къ легкимъ» (Broardel). Большая часть маленькихъ дѣтей, которыя находимы были мертвыми въ постели матери или кормилицы и по поводу смерти которыхъ постоянно возникаетъ подозрѣніе, что они умышленно или неумышленно были задушены спящею, умерли, какъ показываетъ вскрытіе, отъ капиллярнаго бронхита (Broardel, Thiemich). Бронхитъ у дѣтей очень опасенъ: ребенокъ не умѣетъ кашлять, онъ не умѣетъ выплевывать. При закупориваніи самыхъ тонкихъ бронхіальныхъ вѣточекъ, дѣти часто даже не кричатъ. Дѣти, повидимому, совершенно здоровыя, неожиданно умираютъ въ результатѣ этого часто очень быстро протекающаго страданія. Paltauf приводитъ цифры вскрытыхъ имъ дѣтей, у которыхъ не было видимыхъ заболѣваній, и не было никакихъ данныхъ, и придаетъ большое значеніе скопленію слизи въ бронхахъ и въ подтвержденіе цитируетъ Schlemmer'а, который изъ 158 своихъ вскрытій дѣтей, умершихъ отъ бронхита, въ 18 констатировалъ наступленіе смерти совер-

шенно внезапно, безъ какого-либо предварительнаго нарушенія благосостоянія погибшаго (Соколовъ).

Случаевъ смерти съ капиллярнымъ бронхитомъ было 7 въ возрастѣ отъ нѣсколькихъ дней до 4 мѣсяцевъ.

Плевритъ. Скоропостижная смерть—явленіе довольно частое при плевритѣ у стариковъ, развивается почти постоянно скрытнымъ образомъ, коварно и безъ лихорадки. Выпотъ образуется мало-по-малу, бываетъ только незначительная одышка. Часто больной умираетъ при самыхъ удовлетворительныхъ симптомахъ. Broardel объясняетъ механизмъ смерти такъ, что если въ здоровомъ легкомъ, вынужденномъ работать за двое, произойдетъ какое-нибудь разстройство кровообращенія, явится гиперемія, приливъ, то можетъ произойти внезапная смерть: при вскрытіи находятъ апоплектическіе очаги въ здоровомъ легкомъ.

Наши случаи принадлежатъ одному (440) старику 55 лѣтъ, у котораго въ полости правой плевры находилось больше двухъ литровъ гнойной жидкости съ хлопьями фибрина, сердце ожирѣвшее, клапаны аорты и двустворки измѣнены; второй (441)—старику 60 лѣтъ, страдавшему одышкой, и найденному мертвымъ на улицѣ, въ лѣвой плевральной полости было около 800 ксм. хлопчатаго гною, нижняя доля праваго легкаго уплотнена и пронизана множествомъ полостей, сердце ожирѣвшее и жирно-перерожденное, съ измѣненными клапанами дву-и трехстворки, съ бляшками въ аортѣ и суженіемъ вѣнечныхъ сосудовъ, третій случай (442) принадлежитъ женщинѣ 24 лѣтъ съ жирнымъ сердцемъ, съ выпотомъ около 200 к.с. въ лѣвой плеврѣ и съ перепонками на легочной плеврѣ праваго легкаго, и четвертый случай (443) наблюдался у найденнаго мертвымъ въ ночлежномъ домѣ мужчины 32 лѣтъ, съ выпотомъ въ полости правой плевры около литра кровянистой жидкости съ хлопьями, при жирномъ сердцѣ.

Одинъ случай скоропостижной смерти наблюдался у мужчины 18 лѣтъ съ острымъ **воспаленіемъ верхнихъ воздухоносныхъ путей**, наканунѣ знобило, болѣла грудь; страдалъ одышкою съ малыхъ лѣтъ; на вскрытіи найдено значительное искривленіе позвоночника въ грудной и поясничной частяхъ впередъ и вправо, и жировое перерожденіе сердца; слизистая оболочка зѣва, входа въ гортань, дыхательнаго горла и бронховъ была набухшая и содержала большое количество кровянистой пѣнистой жидкости; при застояхъ въ маломъ кругу всѣдѣтель искривленія позвоночника, дегенерированное сердце не могло выдержать присоединившагося катарра, усилившаго еще болѣе

основное страданіе (случай 438). Другой случай скоропостижной смерти наблюдался у 9-лѣтней дѣвочки (445) отъ асфиксіи вслѣдствіе остраго отека зѣва и входа въ гортань, и еще одинъ (439) у крайне истощенной дѣвочки 12 лѣтъ, умершей по дорогѣ въ больницу, страдавшей нарывомъ миндалевидныхъ железъ, который прорвавшись заполнилъ полость зѣва, гортани, дыхательнаго горла.

Отмѣченъ одинъ случай внезапной смерти въ пріемной у врача мужчины 57 лѣтъ, два года страдавшаго **ракомъ гортани**, сердце было ожирѣвшее, съ склеротическими измѣненіями двустворки, полулунныхъ клапановъ, аорты и вѣнечныхъ сосудовъ.

Обоюдосторонее гнойное воспаленіе средняго уха. Одинъ случай скоропостижной смерти принадлежитъ очень истощенному ребенку 2 мѣсяцевъ, у котораго въ обѣихъ барабанныхъ полостяхъ находился желтый довольно густой гной; сосуды мягкой мозговой оболочки наполнены были кровью вплоть до мельчайшихъ развѣтвленій; слои почекъ различались съ трудомъ.

На долю **воспаленія брюшины** приходится 16 случаевъ, у 10 мужчинъ въ возрастѣ 21—65 лѣтъ и у 6 женщинъ отъ 23 до 34 лѣтъ. Причины происхожденія воспаленія брюшины точно извѣстны только въ 8 случаяхъ, а именно: 2 произошло отъ прободенія червеобразнаго отростка, 1 отъ прободающей язвы желудка, 3 отъ прободенія язвы тонкихъ кишекъ, (въ одномъ случаѣ — туберкулезнаго характера), 1—вслѣдствіе хавеннаго катарра толстой кишки, 1—отъ прободенія тонкихъ кишекъ. По качеству экссудата перитонитъ былъ: серозный—1 разъ, серозно-фибринозный—6, фибринозно-гнойный—7, гнойный—1. Во всѣхъ случаяхъ у женщинъ воспалительный процессъ имѣлъ началомъ половой аппаратъ. Нашъ случай прободенія язвы желудка развивался, повидимому, скрытнымъ образомъ у алкоголика. «Прободеніе желудка вслѣдствіе язвы происходитъ довольно рѣдко; по Lebert'у, наблюдали его только въ 3—5% случаевъ. Происходя подъ вліяніемъ прогрессирующаго теченія язвы, иногда вызывается безъ всякой случайной причины, или, напротивъ, вслѣдствіе рѣзкаго движенія, сильнаго кашля или рвоты, или вслѣдствіе удара въ подложечную область» (Legros).

«Прободенія тонкихъ кишекъ обязаны чаще всего присутствію инородныхъ тѣлъ (плодовыхъ косточекъ), изъязвленію Пейеровыхъ бляшекъ въ теченіе брюшного тифа, и даже кишечнымъ глистамъ, но утвержденію нѣкоторыхъ авторовъ».

Интереснымъ является случай, въ которомъ у старика 65 лѣтъ произошло прободеніе тонкихъ кишекъ, представлявшихъ блѣдную истонченную слизистую оболочку, на мѣстахъ Пейеровыхъ бляшекъ замѣчались нѣкоторая пигментація и истонченіе. Здѣсь, повидимому, перенесенный брюшной тифъ, оставившій послѣ себя locus minoris resistentiae, встрѣтился съ основнымъ процессомъ—старческой атрофіей въ слизистой оболочкѣ.

Изъ осложненій въ одномъ случаѣ (459) встрѣтилась недостаточность и суженіе mitralis, въ другомъ (461) — сплошное сращеніе около-сердечной сумки съ сердцемъ и артеріосклерозъ.

Острое и хроническое воспаленіе желудочно-кишечнаго канала при вскрытіи найдено въ 6 случаяхъ, въ одномъ случаѣ у мужчины 30 лѣтъ, въ остальныхъ—у дѣтей отъ 5 недѣль до 6 мѣсяцевъ. Въ четырехъ случаяхъ на почвѣ катарра кишекъ наблюдалось крайнее истощеніе тѣла, въ одномъ случаѣ поносы были у ребенка съ туберкулезомъ легкаго.

Заворотъ кишекъ наблюдался 9 разъ, у мужчинъ въ возрастѣ отъ 7 до 55 лѣтъ и у 2 женщинъ 23 и 27. Въ одномъ случаѣ слѣпая кишка и часть восходящей имѣли удлиненную брыжжейку, вокругъ которой были перекручены болѣе чѣмъ на полный поворотъ, причемъ въ восходящей части на 2 снт. отъ Баугиніевой заслонки образовалось проводное отверстіе.

Воспаленіе почекъ. Большую часть скоропостижныхъ смертей Brouardel приписываетъ почкамъ. Но этотъ взглядъ не раздѣляется другими авторами (Lacassagne). «Анатомическій характеръ поврежденія при болѣзняхъ почекъ отступаетъ на второй планъ, и суть дѣла сводится къ состоянію выдѣлительной функціи. У насъ имѣется сравнительно со нормальными нуждами большой избытокъ почечной паренхимы, и потому даже глубокія пораженія отдѣльныхъ частей почки вполнѣ совмѣстимы съ хорошимъ общимъ состояніемъ, тогда какъ даже ничтожныя поврежденія, если они отличаются разлитымъ характеромъ, могутъ быть смертельными, такъ какъ ведутъ къ выпаденію функціи». (Тарасевичъ, Общая патологія). «Брайтова болѣзнь въ обѣихъ формахъ,—острой и хронической,—иногда причиняетъ внезапную смерть, безъ всякихъ признаковъ уреміи или апоплексіи. Debove и Capitan приводятъ два случая интерстиціальнаго нефрита у лицъ, имѣвшихъ здоровый видъ до самаго момента смерти, наступившей внезапно въ состояніи обморока (syncope), безъ всякихъ предшествовавшихъ симптомовъ болѣзни; въ обоихъ случаяхъ при вскрытіи не обнаружено никакихъ признаковъ пороковъ клапановъ сердца, но найденъ лишь незначительный склерозъ сердечной мышцы. Въ позднѣйшемъ періодѣ такъ называемой малой сморщенной почки съ послѣдо-

вательной гипертрофіей лѣваго желудочка можетъ случиться внезапная смерть безъ какихъ-либо указаній при вскрытіи на окончательную причину смерти какъ со стороны мозга, такъ равно и другихъ органовъ» (Dixon Mann, реф. The Lancet, June 26—th. 1897).

Внезапная смерть вслѣдствіе почечныхъ разстройствъ занимаетъ важное мѣсто въ Румыніи: статистика морга въ Бухарестѣ даетъ 50% всѣхъ причинъ внезапной смерти. «Поврежденія макроскопическія и микроскопическія представляютъ съ другой стороны измѣнчивую интенсивность; при внезапной смерти почечнаго происхожденія поврежденія сердечныя встрѣчаются въ большинствѣ случаевъ. Иногда поврежденія до того зашли впередъ, что нельзя утверждать, почечныя или сердечныя играли рѣшающую роль въ механизмѣ смерти» (Stoenescu).

У Kleinberg'a имѣется только 6 случаевъ нефрита, у Беллина—8, у Lesser'a—хроническій нефритъ встрѣчается 10 разъ, а въ соединеніи съ пораженіями сердца—37 разъ, у Упакова—28 разъ, у насъ—7 разъ. Наши случаи относились къ двумъ мужчинамъ въ возрастѣ 45 и 49 л., остальныя—къ женщинамъ 8, 20, 22, 27 и 55 л. Молодыя женщины всѣ умерли въ припадкѣ эклампсіи въ послѣдніе дни беременности и во время или послѣ родовъ. У одного мужчины были рѣзко выражены симптомы мозговой формы уреміи. Отеки нижнихъ конечностей отмѣчены пять разъ, одинъ разъ—ascites вмѣстѣ съ hydrothorax'омъ. Сопутствующія пораженія по порядку случаевъ были слѣдующія: язва желудка и endoaortitis; жировая дегенерація сердца; гипертрофія сердца, склеротическія полосы и бляшки снаружи; измѣненія двустворки; гипертрофія; небольшая гипертрофія и незначительное утолщеніе полулунныхъ заслонокъ; со стороны сердца—ничего; endoarter. deform. chron. Въ предпослѣднемъ случаѣ было еще кровоизліяніе въ мозгъ. «Эклампсія, болѣзнь характеризующаяся судорогами и потерей сознанія, развивается исключительно у беременныхъ и ведетъ большею частью къ смерти, если не прервать своевременно беременности. Въ большинствѣ случаевъ эклампсія развивается у страдающихъ альбуминуріей и нефритомъ, отчего многіе отождествляютъ ее съ уреміей. Наблюденія надъ случаями тяжелой эклампсіи при здоровыхъ почкахъ заставляютъ отвергнуть подобный взглядъ. Многіе авторы принимаютъ отравленіе ядовитыми продуктами изъ плаценты. Въ настоящее время у насъ имѣется рядъ данныхъ, говорящихъ въ пользу плацентарнаго, а не плодового происхожденія. Такъ, извѣстны случаи эклампсіи при очень маленькомъ плодѣ и послѣ смерти плода, когда значитъ о плодовомъ обмѣнѣ не можетъ быть и рѣчи, случаи эклампсіи безъ плода (при mola hydatidosa, пузырномъ заносѣ) и т. п. Сопоставляя клиническія наблюденія и экспериментальныя данныя относительно вліянія вприскиванія плацентарной ткани и ея различныхъ экстрактовъ, можно прійти къ заключенію, что наблюдаемыя при эклампсіи измѣненія со стороны почекъ, печени и мозга являются вторичными, послѣдовательными, или же носятъ непостоянный, необязательный характеръ, и что источникомъ отравленія является дѣтское мѣсто, заключающее нѣкоторыя ядовитыя вещества съ характеромъ ферментовъ или токсиновъ, вещества, связанныя съ бѣлковыми тѣлами» (Тарасевичъ. Общая патологія. 1910).

Наблюдался одинъ случай у 55-лѣтней женщины **цирроза печени** и перитонита съ большимъ асцитомъ (около 7 литровъ), сопутствовавшагося недостаточностью двустворки и склеротическими измѣненіями на легочной плеврѣ, въ почкахъ и сосудахъ основанія мозга (478).

Отмѣченъ одинъ случай **рака матки** (486) въ возрастѣ 56 лѣтъ при крайнемъ истощеніи тѣла, нефритѣ и измѣненіяхъ въ двустворкѣ и клапанахъ аорты.

Найденъ былъ при вскрытіи у 28-лѣтняго мужчины **рака пищевода**, въ средней трети на задней стѣнкѣ, съ прободеніемъ въ трахею и послѣдовательною пневмоніей (444).

Инфекціонныя болѣзни. Смерть отъ **брюшного тифа**, по наблюденіямъ Dieulafoy, чаще всего случается между 17 и 24 днями болѣзни. «По статистикѣ Dewèvre'а максимумъ внезапной смерти отъ тифозной горячки приходится на возрастъ отъ 20 до 25 лѣтъ, причемъ оказывается, что мужчины подвержены такой смерти чаще, нежели женщины. У дѣтей внезапная смерть можетъ случиться въ раннемъ періодѣ тифозной горячки, именно въ началѣ припуханія кишечныхъ фолликуловъ».

Брюшной тифъ опредѣленъ при вскрытіи въ 17 случаяхъ, у 13 мужчинъ въ возрастѣ отъ 16 до 60 лѣтъ, и у 4 лицъ женскаго пола, 10, 21, 27 и 65 лѣтъ. Почти во всѣхъ нашихъ случаяхъ брюшного тифа больные все время оставались до послѣдняго дня на ногахъ, испытывая лишь нѣкоторое недомоганіе, и продолжая работать. Половина случаевъ смерти у насъ приходится на возрастъ 16—25 лѣтъ. Главныя анатомическія измѣненія сосредоточивались въ тонкихъ кишкахъ, состоя, за исключеніемъ одного случая, гдѣ наблюдались поверх-

ностныя изъязвленія, въ набухапіи лимфатическаго аппарата и увеличеніи брыжжеечныхъ железъ. Фолликулы толстыхъ кишекъ были поражены 5 разъ, лимфатическій аппарать миндалика и корня языка—2 раза. Въ одномъ случаѣ брюшной тифъ осложнился крупознымъ воспаленіемъ верхней доли праваго легкаго (496), а въ другомъ (510)—смерть произошла отъ остраго малокровія послѣ аборта въ теченіе брюшного тифа. Измѣненія со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдались 8 разъ. въ трехъ случаяхъ—рѣзко выраженный эндартеріитъ хроническій, въ одномъ изъ нихъ съ аневризмой аорты и недостаточностью клапановъ аорты и двустворки, по одному разу—недостаточность двустворки, измѣненія клапановъ аорты и двустворки, двустворки, значительная гипертрофія съ ожирѣніемъ сердца. У 10-лѣтней дѣвочки отмѣчены довольно объемистыя бѣловатыя бляшки надъ клапанами аорты. Алкоголиковъ было двое.

Наблюдалось по одному случаю **холеры**, **сибирской язвы** въ кишечной формѣ, **столбняка** послѣ ушиба лошадью съ переломомъ костей носа, **оспы**, **скарлатины**, **инфлюэнцы** съ осложненіемъ катарральной пневмоніей.

Умершихъ отъ **септицеміи** было двое мужчинъ 40 и 42 лѣтъ, и одна женщина 24 лѣтъ. Женщина заболѣла послѣ родовъ, у одного мужчины септическое заболѣваніе развилось вслѣдствіе флегмоны голени, у другого—имѣлись въ желудкѣ многочисленныя мягковатыя бугристыя припухлости, отчасти поверхностно изъязвленныя, заключавшія въ себѣ значительное количество кругловатыхъ эпителіоидныхъ клѣтокъ,—гнойныя гнѣзда въ поджелудочной железѣ, перитонитъ и гнойный плевритъ.

Дифтерія наблюдалась у 3 лицъ мужского пола въ возрастѣ 12, 24 и 35 лѣтъ и у двухъ дѣвочекъ 9 и 10 лѣтъ. Во всѣхъ случаяхъ налеты были трудно снимающіеся; въ двухъ случаяхъ входъ въ гортань былъ сильно сужень; въ одномъ случаѣ былъ отекъ клѣтчатки шеи, въ глубокихъ частяхъ по сторонамъ гортани и пищевода пропитанной гноемъ. Налеты, кромѣ зѣва, занимали еще по одному разу слизистую гортани съ голосовыми связками, слизистую гортани до голосовыхъ связокъ и слизистую отъ надгортанника до крупныхъ бронхъ включительно (въ послѣднемъ случаѣ—пленки, легко снимающіяся).

Менингитъ, подобно нѣкоторымъ другимъ заразнымъ болѣзнямъ, какъ напр., крупозная пневмонія, брюшной тифъ, можетъ протекать въ скрытной или въ амбулаторной формѣ и оканчиваться внезапной смертью; даже присутствіе гноя можетъ иногда не обнаруживаться никакими симптомами до самого момента смерти. Въ нашихъ первыхъ двухъ и послѣднемъ случаѣ, гдѣ имѣются предварительныя свѣдѣнія, ходили на работу, въ школу, въ гости, хотя и чувствовали сильную головную боль, ложились наконецъ и черезъ нѣсколько часовъ умирали. Въ числѣ 9 случаевъ менингита двое вызвано гнойнымъ процессомъ въ среднемъ ухѣ—у мужчины 45 лѣтъ и дѣвочки 3 мѣс., въ одномъ случаѣ—менингитъ туберкулезный у 43-лѣтняго мужчины, страдавшаго бугорчатымъ процессомъ обѣихъ легочныхъ верхушекъ, и скоропостижно умершаго на пристани. И туберкулезный менингитъ развивается въ тѣхъ же условіяхъ, что и гнойный.

Опухоли мозга могутъ также развиваться, не возбуждая вниманія ни больного, ни врача, ни окружающихъ. Такъ, въ нашемъ случаѣ больная около трехъ недѣль жаловалась на сильную головную боль, съ нею бывали судороги, но въ двухъ больницахъ ей отказали въ пріемѣ по несерьезности болѣзни. Maschka считаетъ алкогольные эксцессы, усталость всякаго рода, танцы какъ конечную причину смерти во время развитія этихъ опухолей. Безразличіе, съ какимъ мозгъ относится иногда къ присутствію опухолей, доказывается съ очевидностью терпимостью этого органа къ инородньмъ тѣламъ, какъ напр. въ одномъ изъ приведенныхъ раньше случаевъ, къ лезвію перочиннаго ножа. При вскрытіи найдено было въ лѣвой теменной области, на 3 поперечныхъ пальца надъ лѣвой скуловой дугой и на 2 поперечныхъ кзади отъ вертикали лѣваго скулового отростка лобной кости выстоящее внутрь черепа заражавлое лезвіе малаго перочиннаго ножа, проникающее черезъ мозговыя оболочки, существо лѣвой лобной доли, на границѣ между средней и нижней извилинами этой доли и впереди извилины Broca. Опухоли помѣщались въ области передняго конца мозолистаго тѣла величиною въ грецкій орѣхъ,—въ бороздѣ между Вароліевымъ мостомъ и продолговатымъ мозгомъ съ одной стороны и правымъ полушаріемъ мозжечка съ другой величиною въ лѣсной орѣхъ,—и въ правой лобной долѣ величиною съ куриное яйцо. Наблюдался однажды у 20-лѣтняго мужчины, въ продолженіе четырехъ лѣтъ страдавшаго головными болями и припадками рвоты, инкапсулированный гнойникъ величиною въ куриное яйцо въ затылочной долѣ лѣваго полушарія большого мозга. Боли особенно сильны были послѣдній мѣсяцъ, а въ день смерти утромъ съ больнымъ сдѣлалось дурно, и онъ въ тотъ же день умеръ.

Въ двухъ случаяхъ наблюдалось **размягченіе мозга.** У 35-лѣтней проститутки, постоянно пьянствовавшей, найденъ обширный фокусъ размягченія въ области затылочной и теменной долей праваго полушарія величиною въ кулакъ взрослаго человѣка; размягченіе касалось также наружныхъ участковъ праваго полосатаго тѣла и зрительнаго бугра; отверстія вѣнечныхъ артерій были замѣтно сужены, на почкахъ много рубцовыхъ вдавленій. У другой женщины въ возрастѣ 25 лѣтъ найденъ размягченный фокусъ въ передней части правой лобной доли у самой поверхности, величиною въ мѣсной орѣхъ; лѣвый зрительный бугоръ былъ вдвое увеличенъ въ объемѣ противъ праваго, вещество его въ разрѣзѣ мягковато, безъ яснаго рисунка; сосуды основанія мозга были неизмѣнены.

Одинъ случай представлялъ **водянку мозга.** У 49-лѣтняго мужчины боковые желудочки мозга были сильно растянуты прозрачной жидкостью въ количествѣ около 2 стакановъ; имѣлся хронический эндартеритъ.

Параличъ сердца вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ. Къ этой группѣ случаевъ скоропостижной смерти принадлежатъ три женщины въ возрастѣ 30, 30 и 55 лѣтъ и 10 мужчинъ, въ возрастѣ 19—55 лѣтъ, изъ которыхъ половина старше 40 лѣтъ. 8 разъ наблюдались измѣненія въ двустворчатомъ клапанѣ (3, 6—11, 13), изъ нихъ въ двухъ случаяхъ—и въ трехстворкѣ (3, 7), 2 раза—въ клапанахъ аорты (12, 14) (одинъ (14)—съ суженіемъ отверстія), и 3 раза—въ двустворкѣ и полулунныхъ (4, 5, 15) одновременно (одинъ разъ—съ суженіемъ устья); въ 6 случаяхъ вмѣстѣ съ недостаточностью двустворки было обнаружено и суженіе лѣваго венознаго отверстія (5, 8, 10, 11, 13, 15); 1 разъ (15) найдена была язва—на двустворчатомъ клапанѣ со сверткомъ фибрина. Сердце было увеличено въ 11 случаяхъ, причемъ въ трехъ изъ нихъ—въ $1^1/_2$ раза; въ 4 найдена гипертрофія стѣнки праваго желудочка, въ 2—обоихъ желудочковъ; въ одномъ случаѣ стѣнка правая была гипертрофирована, въ другомъ истончена, полость праваго желудочка отмѣчена растянутой 4 раза; полость лѣваго расширенной—одинъ разъ. Въ 7 случаяхъ мышца сердечная найдена желтоватою, въ одномъ—съ бѣловатыми островками. На эпикардѣ перламутровыя пятна отмѣчены три раза, эндокардъ мутно-бѣловатаго цвѣта—два раза. Измѣненія въ почкахъ отмѣчены шесть разъ, склерозъ сосудовъ основанія мозга—4 раза. Въ одномъ случаѣ (7) въ легочныхъ верхушкахъ найдены были казеозные узелки, въ толстыхъ кишкахъ и слѣпой—многочисленныя язвы и звѣздчатые рубцы. Въ двухъ случаяхъ кромѣ этого были уплотнены верхушки. Въ одномъ случаѣ былъ отекъ голеней и стопъ и водянка брюшной полости. Подъятыя въ безчувственно-пьяномъ видѣ или легли спать въ сильномъ опьяненіи 7 человѣкъ, изъ нихъ въ 5 случаяхъ имѣются свѣдѣнія, что сильно предавались пьянству, а въ одномъ—водку пилъ умѣренно; при вскрытіи запахъ спирта—6 разъ. Въ одномъ случаѣ найдено расширеніе желудка, вмѣщавшаго въ себѣ около литра жидкости, въ другомъ случаѣ жидкости было $1^1/_2$ литра. Крѣпкаго сложенія былъ 1, умѣреннаго—7, слабаго—5.

Параличъ сердца вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ, endoarteriitidis deform. chron. аорты и вѣнечныхъ сосудовъ сердца. Къ этой группѣ отнесены 61 случай, изъ которыхъ 43 принадлежатъ мужчинамъ отъ 27 до 67 лѣтъ (большинство умершихъ на 6-мъ и 5-мъ десяткѣ) и 18 женщинамъ отъ 29 до 75 лѣтъ (большинство умершихъ на 7-мъ и 5-мъ десяткѣ). Недостаточность двустворки наблюдалась 23 раза, недостаточность клапановъ аорты 22 раза (съ суженіемъ устья—7 разъ), двустворки и клапановъ аорты вмѣстѣ—11 разъ, двуи трехстворки—2 раза, двух-, трехстворки и клапановъ аорты—2 раза, трехстворки — 1 разъ. Сердце увеличено было во всѣхъ случаяхъ, причемъ въ 48-и значительно, и почти всегда было значительно ожирѣвшимъ. 3 раза отмѣчены бляшки на перикардіи, 2 раза было сплошное сращеніе листковъ перикардія (39,50). Сердечная мышца во всѣхъ почти случаяхъ найдена желтоватою, въ 8 случаяхъ—съ сѣроватыми прослойками, въ 27 случаяхъ была гипертрофія стѣнокъ желудочковъ, 9 разъ—одного лѣваго желудочка, 3 раза—съ истончешемъ стѣнки праваго, 3 раза—истончена стѣнка лѣваго и утолщена праваго, 1 разъ—истончены стѣнки обоихъ желудочковъ. Расширеніе полостей обоихъ желудочковъ отмѣчено 2 раза, одного лѣваго—2 раза, и одного праваго—4 раза. Въ 2 случаяхъ было помутнѣніе эндокарда и бляшки. 3 раза на ряду съ бляшками въ аортѣ найдены были и язвы; въ 7 случаяхъ вѣнечныя артеріи были сужены или на протяженіи или въ устьѣ безъ измѣненій въ стѣнкахъ аорты (35, 40, 44, 49, 50, 58, 64), 18 разъ устья вѣнечныхъ артерій были сужены замѣтно, рѣзко и одинъ разъ (24) совершенно закрыты. Въ половинѣ случаевъ артеріи основанія мозга были склерозированы; въ большинствѣ случаевъ отмѣчены измѣненія въ почкахъ; отеки нижнихъ конечностей отмѣчены 10 разъ, genitalia—2 раза, ascites—3 раза,

запахъ спирта при вскрытіи—11 разъ, 9 разъ въ желудкѣ найдено было содержимаго отъ $^1/_2$ до 1 литра. Одинъ разъ (49) найденъ былъ въ правой Сильвіевой артеріи небольшой вѣтвистый сгустокъ. 4 раза отмѣчена эмфизема легкихъ, уплотненія въ легкихъ—2 раза, творожистые узелки—2 раза, 2 раза—каверны, 2 раза—хронической бронхитъ, при чемъ въ одномъ случаѣ были полости съ распадомъ; 1 разъ—расширеніе желудка. Вели нетревызный образъ жизни 31 человѣкъ. Въ 3 случаяхъ смерть произошла въ банѣ. въ одномъ—вскорѣ послѣ бани. Крѣпкаго сложенія было 4, хорошаго—17, средняго—33, слабаго—7.

Параличъ сердца вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ и ожирѣнія сердца. Сюда принадлежатъ 12 случаевъ скоропостижной смерти: 9 мужчинъ въ возрастѣ отъ 25 до 56 лѣтъ и 3 женщины 35, 50 и 53 лѣтъ. Во всѣхъ случаяхъ найдены обильныя жировыя отложенія на поверхности сердца и во всѣхъ почти случаяхъ значительное увеличеніе самого органа. Въ 8 случаяхъ мышца отмѣчена съ желтоватымъ оттѣнкомъ; пять разъ—гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ, одинъ разъ—одного лѣваго, одинъ разъ—истончение обѣихъ стѣнокъ, одинъ разъ—истончение стѣнки праваго желудочка и расширеніе его полости, съ прорастаніемъ жира въ стѣнку; въ одномъ случаѣ стѣнка праваго желудочка прорашена была жиромъ, а лѣвааго пронизана прослойками соединительной ткани. Недостаточность клапановъ аорты была 2 раза (одинъ разъ—съ сужеиіемъ); недостаточность двустворки—8 разъ, 1 разъ—двустворки и клапановъ аорты съ рѣзкимъ сужеиіемъ ихъ, и 1 разъ—дву- и трехстворки. Эндокардій былъ мутенъ или утолщенъ въ 2 случаяхъ, 2 раза были отеки нижнихъ конечностей, 1 разъ—асцитъ, почти во всѣхъ случаяхъ почки были измѣнены; 1 разъ—склерозъ сосудовъ основанія мозга, 1 разъ при вскрытіи—запахъ спирта. Въ двухъ случаяхъ въ легкихъ были каверны, въ одномъ—узелки. 9 человѣкъ вели нетрезвую жизнь. Хорошаго сложенія было—1, средняго—7, слабаго—4. Въ одномъ случаѣ у поднятаго совершенно пьянымъ оказался переломъ голени, ночью въ припадкѣ бѣлой горячки выскочилъ на одной ногѣ въ корридоръ, а черезъ два дня умеръ.

Параличъ сердца вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ. endoarteriitidis deform. chron. и расширенія аорты. Сюда принадлежатъ 5 случаевъ внезапной смерти, 3 мужчины 41, 55 и 58 лѣтъ и 2 женщины 45 и 60 лѣтъ. Сердце

въ 2 случаяхъ отмѣчено значительно увеличеннымъ, въ одномъ увеличеніе доходило до $3^1/_2$ кулаковъ съ громаднымъ отложеніемъ жира; сложеніе въ этихъ случаяхъ было крѣпкое, въ остальныхъ—среднее. Мышца сердца отмѣчена 4 раза желтоватою, 2 раза пропоспею жиромъ, гипертрофія стѣнки лѣваго желудочка—1 разъ и обоихъ желудковъ—1 разъ, 2 раза—расширеніе полостей обоихъ желудочковъ. Въ одномъ случаѣ на наружномъ покровѣ сердца имѣлись молочныя пятна и склейки съ наружнымъ листкомъ околосердія и склейки на серозномъ покровѣ аорты, вдѣсь имѣлась недостаточность клапановъ аорты, дву- и трехстворки, смерть произошла вскорѣ послѣ бани, при вскрытіи былъ спиртный запахъ; въ желудкѣ $^1/_2$ литра жидкости. Въ остальныхъ случаяхъ одинъ разъ была недостаточность клапановъ аорты, одинъ разъ дву- и трехстворки и 2 раза — клапановъ аорты и двустворки одновременно. Два раза отмѣчены отеки нижнихъ конечностей, 3 раза—склерозъ артерій основанія мозга и 3 раза—сужеиіе вѣнечныхъ артерій сердца, въ одномъ случаѣ вмѣстѣ съ бляшками были изъязвленія; одинъ разъ наблюдалась эмфизема. Расширеніе аорты отмѣчено въ 2 случаяхъ восходящей части аорты, по одному разу—значительное въ начальной части, дуги аорты—въ кулакъ, восходящей и дуги аорты въ 2 кулака (окружность—17 снт.).

Параличъ сердца вслѣдствіе endoarteriitidis deform. chron. аорты или вѣнечныхъ артерій сердца. Къ этой группѣ случаевъ скоропостижной смерти относятся 105 человѣкъ—80 мужчинъ и 25 женщинъ; возрастъ первыхъ былъ отъ 19 до 64, вторыхъ—отъ 18 до 72. Въ трехъ случаяхъ на перикардіи были бѣлыя бляшки. Во всѣхъ почти случаяхъ сердце найдено увеличеннымъ, причемъ въ 36 случаяхъ значительно, въ 75 случаяхъ отмѣчено значительно ожирѣвшимъ. Гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ найдена 6 разъ, одного лѣваго — 23; въ 5 случаяхъ стѣнки обоихъ желудочковъ были сильно истончены, истончена стѣнка одного праваго желудочка—3 раза. Во всѣхъ почти случаяхъ мышца сердца найдена желтоватою. Оба желудочка были растянуты 4 раза, одинъ лѣвый — 2 раза и одинъ правый—1 разъ. Въ 33 случаяхъ стѣнка мышечная была прорашена жиромъ, 17 разъ она была пронизана сѣровато-бѣловатыми островками. Въ 38 случаяхъ бляшки отмѣчены только въ аортѣ; въ 12 случаяхъ были склерозированы одиѣ вѣнечныя артеріи сердца (104, 121, 133, 147, 158, 161, 163, 165, 173, 183, 190, 194), а въ

3 случаяхъ—вмѣстѣ съ незначительнымъ утолщеніемъ клапановъ аорты (136, 162) или двустворки (128); въ остальныхъ случаяхъ пораженіе занимало стѣнку аорты и вѣнечныхъ сосудовъ. Въ 4 случаяхъ вмѣстѣ съ бляшками наблюдались изъязвленія въ аортѣ, въ 1 случаѣ — въ вѣнечной артеріи. Въ одномъ случаѣ найденъ тромбъ передней вѣнечной артеріи на пространствѣ 1,5 снт. отъ устья. Склерозъ артерій основанія мозга найденъ былъ 58 разъ. Измѣненія въ почкахъ наблюдались 42 раза, отекъ нижнихъ конечностей отмѣченъ 5 разъ, нижнихъ конечностей и genitalium—1 разъ. Запахъ спирта при вскрытіи констатированъ былъ 35 разъ. Вели нетрезвую жизнь 72 человѣка. Въ одномъ случаѣ наблюдались бляшки также въ легочной артеріи. Въ 4 случаяхъ въ желчномъ пузырѣ найдены камни. 9 разъ отмѣченъ хроническій бронхитъ, 1 разъ расширеніе бронховъ, 1 разъ — эмфизема, 9 разъ рубцы въ легкихъ, казеозные бугорки—2 раза, каверны—1 разъ. Въ одномъ случаѣ у 26-лѣтняго мужчины отмѣчено сильное расширеніе желудка; въ одномъ случаѣ было омертвѣніе прямой кишки. Въ банѣ умерло 2 человѣка и вскорѣ послѣ бани—1. Въ двухъ случаяхъ (99, 105) отмѣчено, что умершіе страдали припадками падучей, причемъ въ одномъ (105) на днѣ ромбовидной ямки найдено три экхимоза подъ эпендиму величиною въ просяное зерно. Въ одномъ случаѣ отмѣчена плевропневмонія правой верхней доли. 15 разъ найдено содержимое желудка отъ $^1/_2$ литра до 1 литра.

Особо надо отмѣтить случай смерти (109) въ состояніи чрезмѣрнаго опьяненія у 19-лѣтняго, у котораго внутренняя оболочка покрыта была значительнымъ количествомъ мелкихъ въ просяное зерно плотныхъ бляшекъ, стѣнка лѣваго желудочка была толщиною 1,8 снт., а просвѣтъ аорты 1,5 снт. Крѣпкаго сложенія было 17, хорошаго—6, умѣреннаго—57, слабаго—5.

Параличъ сердца вслѣдствіе endoarteriitidis deform. chron. et art. coronar. cordis и endocarditidis chronicae. Къ этой группѣ принадлежатъ 60 случаевъ: 47 мужского пола въ возрастѣ отъ 26 до 74 лѣтъ и 13 женскаго—отъ 28 до 70 лѣтъ. Въ 4 случаяхъ кромѣ измѣненій въ клапанахъ были склеротическія измѣненія въ вѣнечныхъ артеріяхъ сердца безъ измѣненій на внутренней оболочкѣ стѣнки аорты (206, 212, 242, 253). Перикардій въ 6 случаяхъ имѣлъ на своей поверхности бѣловатыя бляшки, одинъ разъ наблюдалось сращеніе листковъ его (210). Болѣе или менѣе значительное увеличеніе сердца отмѣчено 36 разъ, въ боль-

шинствѣ случаевъ значительно ожирѣвшее, гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ была 8 разъ, одного лѣваго—13 разъ, праваго — 1 разъ, истонченіе обѣихъ стѣнокъ 5 разъ, одной лѣвой—1 разъ, правой—2 раза, расширеніе обоихъ желудочковъ—2 раза, одного лѣваго—3 раза и одного праваго—2 раза. Во всѣхъ почти случаяхъ мышца отмѣчена желтоватою или глинистою, проросшею жиромъ — 18 разъ, соединительной тканью—5 разъ. Эндокардій въ одномъ случаѣ былъ мутенъ; помутнѣнія и утолщенія клапановъ сердца наблюдались: одного двустворчатаго — 21 разъ, полулунныхъ аорты—13 разъ, обоихъ вмѣстѣ—22, дву- и трехстворки—1 разъ, дву-, трехстворки и аортальныхъ—3 раза. Въ трехъ случаяхъ найденъ отекъ нижнихъ конечностей, въ одномъ—genitalium. Склерозъ сосудовъ основанія мозга наблюдался 34 раза, измѣненія въ почкахъ—24, причемъ въ одномъ случаѣ—склерозъ почечныхъ сосудовъ. Одинъ разъ найдены въ желчномъ пузырѣ камни. Въ одномъ случаѣ наблюдалось сильное растяженіе желудка. Эмфизема отмѣчена—1 разъ, хроническій бронхитъ—1 разъ, рубцы въ легкихъ—3 раза, узелки—5 разъ, 1 разъ—каверны. Въ одномъ случаѣ дыхательное горло было сплюснуто съ боковъ увеличенною щитовидною железою въ видѣ сабельныхъ ноженъ (204). Въ одномъ случаѣ найдено было выпячиваніе въ перегородкѣ желудочковъ со стороны лѣваго величиною въ куриное яйцо, съ утолщенной и мутнобѣлой внутренней оболочкой и известковыми отложеніями на ней (226). У одного 39-лѣтняго мужчины просвѣтъ аорты, у ея начала имѣлъ только 2 снт. въ поперечникѣ (216). Двое страдали при жизни падучей, у одного (219) при вскрытіи найдено было сильное расширеніе кровью сосудовъ на днѣ 4-го желудочка, у другого (246) въ области праваго полосатаго тѣла полость въ голубиное яйцо, выполненная желтоватымъ густоватымъ содержимымъ. Въ банѣ умерло трое, и одинъ вскорѣ по приходѣ изъ бани; въ одномъ случаѣ смерть произошла при дефекаціи. 32 человѣка вели нетрезвую жизнь. Крѣпкаго сложенія было 12, хорошаго—8, умѣреннаго—31, слабаго—9.

Параличъ сердца вслѣдствіе endoarteriitidis deform. chronicae и расширенія аорты наблюдался пять разъ: у 2 мужчинъ въ возрастѣ 54 и 64 лѣтъ и у 3 женщинъ 42, 45 и 55 лѣтъ. Въ одномъ случаѣ было суженіе устья вѣнечныхъ артерій сердца, а въ трехъ—значительной степени склерозъ ихъ. Въ трехъ случаяхъ было небольшое расширеніе начальной части аорты, въ одномъ рас-

ширеніе восходящей части доходило до кулака и въ одномъ расширеніе восходящей и дуги было величиною въ дѣтскую головку (въ окружности—26 сит.). Въ послѣднемъ случаѣ была плевропневмонія нижней доли праваго легкаго съ содержаніемъ 400 к. с. экссудата. Въ одномъ случаѣ на перикардіи были молочно-бѣлыя пятна. Сердце во всѣхъ случаяхъ отмѣчено увеличеннымъ значительно, въ одномъ—втрое, мышца—глинистаго цвѣта, въ трехъ случаяхъ проращенной жиромъ; въ одномъ случаѣ было утолщеніе стѣнки лѣваго желудочка. Отекъ нижнихъ конечностей былъ въ одномъ случаѣ. Сосуды основанія мозга въ трехъ случаяхъ оказались склерозированными.

Параличъ сердца вслѣдствіе endoarteriitidis deform. chronicae, endocarditidis chron. и расширенія аорты. Къ этой группѣ принадлежатъ 13 человѣкъ, 9 мужчинъ въ возрастѣ отъ 34 до 53 лѣтъ и 4 женщины 34, 37, 39 и 67 лѣтъ. Во всѣхъ случаяхъ сердце было увеличено, въ 7 случаяхъ—значительно; въ 7 случаяхъ сердце отмѣчено ожирѣлымъ. Сердечная мышца въ 8 случаяхъ была глинистаго цвѣта; три раза пропоснею жиромъ и три раза съ соединительнотканными прослойками; лѣвый желудочекъ былъ гипертрофированъ 6 разъ, истончень — 1 разъ; 1 разъ былъ истончень правый желудочекъ; 3 раза былъ расширенъ лѣвый желудочекъ. Всѣ клапаны сердца были уплотнены 2 раза, одинъ двустворчатый—3 раза, одни аортальные — 7 разъ и 1 разъ — двустворки и аорты. Устья вѣнечныхъ артерій въ 10 случаяхъ были значительно сужены; въ одномъ случаѣ эндокардій былъ утолщенъ и мутенъ, перикардій одинъ разъ имѣлъ бѣлесоватыя пятна. Въ одномъ случаѣ было расширеніе дуги аорты, въ другомъ—на дугѣ были аневризматическія выпячиванія въ лѣсной орѣхъ, въ 11 случаяхъ было расширеніе восходящей части аорты, причемъ 4 раза—небольшое, три раза отмѣчено значительное и еще — въ кулакъ ребенка, большое яблоко, 11 сит. и вдвое. Въ одномъ случаѣ найденъ отекъ нижнихъ конечностей и genitalium и въ одномъ—ascites. Сосуды основанія мозга 8 разъ были склерозированы. Въ одномъ случаѣ имѣлись въ правомъ легкомъ бугорки и на брюшинѣ и язвы въ тонкихъ кишкахъ, а въ другомъ — казеозные узлы въ лѣвой верхней долѣ. Содержимое желудка въ трехъ случаяхъ отмѣчено 500,0, 800 и 1000,0. 4 раза при вскрытіи былъ спиртный запахъ. Нетрезвую жизнь вели 5 человѣкъ.

Параличъ сердца вслѣдствіе ожирѣнія его. Сюда принадлежитъ 31 случай, изъ нихъ 6 женщинъ въ возрастѣ

31, 31, 32, 54, 56, 59 лѣтъ и 29 мужчинъ въ возрастѣ отъ 23 до 67 лѣтъ. Сердце во всѣхъ почти случаяхъ было увеличено, изъ нихъ въ 13-и значительно; во всѣхъ случаяхъ мышца сердца отмѣчена желтоватою или глинистою. Въ одномъ случаѣ наблюдалась гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ, одного лѣваго—4 раза и одного праваго—2 раза; въ 4 случаяхъ стѣнки обоихъ желудочковъ были истончены, въ 1 случаѣ одного праваго; расширеніе полостей обоихъ желудочковъ наблюдалось 1 разъ, одного лѣваго—5 разъ, и одного праваго—1 разъ. На перикардіи въ одномъ случаѣ отмѣчены сухожильныя пятна; утолщеніе 1 разъ—на трехстворкѣ и 1 разъ—на клапанахъ аорты. Въ 11 случаяхъ былъ артеріосклерозъ сосудовъ основанія мозга; измѣненія въ почкахъ наблюдались 14 разъ. Спиртный запахъ при вскрытіи полостей—15 разъ. Вели нетрезвую жизнь—22 человѣка. Въ одномъ случаѣ отмѣченъ большой желудокъ съ содержимымъ 600,0; содержимое желудка въ двухъ случаяхъ было 700,0, 2 раза по 1 литру и 1 разъ—1700,0. Отекъ нижнихъ конечностей наблюдался 2 раза. Въ одномъ случаѣ найдена въ правой лобной пазухѣ довольно большая гнойная полость. Въ одномъ случаѣ отмѣчаются частые припадки, по краямъ языка имѣлись рубцы. Одинъ случай смерти произошелъ при дефекаціи. Сложеніе было крѣпкое 16 разъ, хорошее—1 и умѣренное—14 разъ.

Параличъ сердца вслѣдствіе хроническаго эндокардита. Въ эту рубрику входитъ 7 случаевъ, двѣ женщины 42 и 52 лѣтъ и 5 мужчинъ 21, 33, 34, 45, 45 лѣтъ. Сердце въ 6 случаяхъ было увеличено, въ 5 случаяхъ значительно; одинъ разъ наблюдалась гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ, и одинъ разъ — одного лѣваго, одинъ разъ — истончене стѣнокъ обоихъ желудочковъ и одинъ разъ—одного праваго; одинъ разъ было расширеніе стѣнки лѣваго желудочка, а въ другомъ(309) полость желудочка была увеличена вдвое вслѣдствіе полушаровиднаго выпячиванія стѣнки, крѣпко приращенной къ сердечной сумкѣ и имѣвшей снутри двѣ язвенныя поверхности. Въ двухъ случаяхъ сердечная мышца отмѣчена глинистаго цвѣта, въ одномъ тусклою; въ одномъ случаѣ—съ желтоватыми прослойками, въ другомъ—пропоснею жиромъ. Внутренняя оболочка сердца въ двухъ случаяхъ была утолщена и мутноѣлоповатаго цвѣта; на клапанахъ утолщенія, помутнѣнія и разращенія были выражены одинъ разъ на дву- и трехстворкѣ, 2 раза—на двустворкѣ и клапанахъ аорты, 2 раза—на кла-

напахъ аорты, 2 раза—на двустворкѣ. Въ одномъ случаѣ (314) правое легкое было сплошь сращено съ плевроі старыми перепонками, съ отложеніемъ въ нихъ извести. Измѣненія въ почкахъ наблюдались три раза, склерозъ сосудовъ основанія мозга—1 разъ. Запахъ спирта при вскрытіи—4 раза. Нетрезвую жизнь вели 5. Сложенія въ одномъ случаѣ крѣпкаго, въ остальныхъ—умѣреннаго.

Параличъ сердца вслѣдствіе перерожденія сердечной мышцы. Въ этой группѣ находится 32 случая, изъ которыхъ на долю женщинъ приходится 5 (14, 30, 38, 48, 53 лѣтъ) и 27—на долю мужчинъ (23—55 лѣтъ). Въ 10 случаяхъ сердце было нѣсколько увеличено, въ 17 случаяхъ наблюдалось значительное увеличеніе сердца; 3 раза наблюдалась гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ, 8 разъ только лѣваго; истончніе стѣнокъ обоихъ желудочковъ отмѣчено 2 раза, одного праваго—5 разъ, лѣваго—1 разъ. Оба желудочка сердца были расширены 2 раза, одного лѣваго—3 раза. Въ 24 случаяхъ мышца сердца была болѣе или менѣе рѣзко желтоватая, въ четырехъ случаяхъ была пропоснего жиромъ, въ 12 случаяхъ пронизана бѣловато-сѣроватыми рубцовыми полосками и пятнами. Въ 5 случаяхъ перикардій имѣлъ перламутровыя сухожильныя пятна, въ одномъ изъ нихъ съ выпячиваніемъ стѣнки желудочка, одинъ разъ (344)—было полное сращеніе листковъ перикардія; въ 1 случаѣ (315) было гнойное воспаленіе околосердечной сумки и перикарлія, сращеннаго съ сумкою во многихъ мѣстахъ старыми перепонками; тамъ же былъ отекъ нижнихъ конечностей и genitalium, и асцитъ, язва желудка и пневмонія верхней доли лѣваго легкаго съ гнойными полостями. Кромѣ того еще въ одномъ случаѣ былъ отекъ нижнихъ конечностей. При вскрытіи полостей 10 разъ — запахъ спирта. Въ одномъ случаѣ содержимое желудка имѣло около литра, въ 5-ти—$^1/_2$ литра, 2 раза найдены въ желчномъ пузырѣ камни. Въ двухъ случаяхъ въ легкихъ были казеозные узелки. Въ 17 случаяхъ были измѣненія въ почкахъ, въ 6-и—склерозъ сосудовъ основанія мозга. Въ 6-и было незначительное количество фиброзныхъ бляшекъ на внутренней оболочкѣ аорты. Въ одномъ случаѣ эндокардъ былъ мутнобѣловатаго цвѣта. Въ одномъ случаѣ 45-лѣтній мужчина умеръ вскорѣ послѣ бани, чувствуя боли въ груди, которыя появились у него за два дня передъ тѣмъ послѣ того, какъ его спинбъ съ ногъ извозчикъ. Нетрезвую жизнь вели 21 человѣкъ. Сложенія крѣпкаго было 8, хорошаго 6, умѣреннаго—11, слабаго—4, въ трехъ случаяхъ—не отмѣчено.

Кровоизліяніе въ мозгъ и его оболочки найдено при вскрытіи у 41 мужчины въ возрастѣ отъ 18 до 73 лѣтъ и у 22 женщинъ въ возрастѣ отъ 19 до 73 лѣтъ. Наибольшее число умершихъ приходится на возрасть свыше 40 лѣтъ, именно 29 мужчинъ и 14 женщинъ. У лицъ моложе 25 лѣтъ кровоизліяніе въ мозгъ наблюдалось 4 раза, у 3 мужчинъ 18, 19 и 24 лѣтъ и у одной беременной женщины 19 лѣтъ. У 18-лѣтняго мужчины найдено суженіе и склерозъ сосудовъ основанія мозга, у 24-лѣтняго нѣкоторая извитость, а у 19-лѣтнихъ мужчины и женщины измѣненій стѣнокъ сосудовъ не найдено. По мѣсту нахожденія кровоизліянія распредѣлялись: подъ твердою мозговою оболочкою—4, подъ мягкою мозговою оболочкою, въ лобной и теменной областяхъ—1, подъ мягкою и въ височной долѣ—1, подъ мягкой мозговой оболочкой и въ желудочкахъ—10, подъ мягкой, въ желудочкахъ и большихъ мозговыхъ узлахъ—1, въ доляхъ полушарій и желудочкахъ—3, въ большихъ мозговыхъ узлахъ—1, въ большихъ мозговыхъ узлахъ и желудочкахъ—15, въ больш. мозг. узлахъ и затыл. долѣ—1, въ больш. мозг. узл., Варол. мосту и жел.—1, въ желудочкахъ мозга—4, въ Варолиевомъ мосту, четверохолміи, мозжечкѣ, продолговатомъ мозгу и желудочкахъ—1, въ Варолиевомъ мосту, мозжечкѣ, продолговатомъ мозгу и желудочкахъ—1, въ Варолиевомъ мосту, продолговатомъ мозгу и желудочкахъ—4, въ мозжечкѣ и желудочкахъ—4, въ продолговатомъ мозгу и желудочкахъ — 6, въ продолговатомъ мозгу — 1, въ большихъ мозговыхъ узлахъ, Варолиевомъ мосту, продолговатомъ мозгу и желудочкахъ—2, въ большихъ мозг. узлахъ, Варол. м. и желудочкахъ—1, въ лѣвомъ Реніевомъ островкѣ и правой лобной долѣ — 1. Въ большинствѣ случаевъ (55) отмѣчены дегенеративныя измѣненія въ стѣнкахъ артерій основанія мозга, въ одномъ случаѣ найдена аневризма въ сосудахъ мозга, въ другомъ—фибринозный свертокъ, въ 35 случаяхъ наблюдались измѣненія внутренней оболочки аорты и въ 23 — въ вѣнечныхъ артеріяхъ сердца. Въ одномъ случаѣ была замѣтно расширена восходящая часть аорты, въ другомъ — дуга аорты; въ одномъ случаѣ просвѣтъ аорты былъ замѣтно узокъ. Въ 30 случаяхъ отмѣчены измѣненія клапановъ сердца, причемъ 3 раза была недостаточность двустворки, 5 разъ—недостаточность аортальныхъ клапановъ, обоихъ вмѣстѣ—2 раза, дву- и трехстворки—1 разъ и всѣхъ трехъ отверстій—1 разъ. Въ 5 случаяхъ отмѣчены перламутровыя бляшки на перикардіи, въ 1—измѣненія эндокардія. Въ одномъ случаѣ

найдена въ мозгу киста величиною въ вишню. Въ двухъ случаяхъ было расширеніе желудка. Въ одномъ случаѣ было воспаленіе нижней доли лѣваго легкаго; въ одномъ—каверны въ легкихъ, въ другомъ — бугорки и каверны въ легкихъ съ язвами въ тонкихъ кишкахъ и бугорчаткой придатка яичка. Въ двухъ случаяхъ найдены въ желчномъ пузырѣ камни. Въ одномъ случаѣ найдены кости черепа тонкими и ребра чрезмѣрно хрупкими. Въ 5 случаяхъ стѣнки желудочковъ были истончены, болѣе же чѣмъ въ половинѣ случаевъ (36) стѣнки желудочковъ были значительно утолщены, часто вдвое и болѣе; сердце въ 26 случаяхъ было увеличено значительно. Въ 31 случаѣ мышца сердца отмѣчена желтоватаго цвѣта, въ 6 случаяхъ пороссшею жиромъ, въ 4 — съ соединительно-тканными прослойками. Крѣпкаго сложенія было 11, хорошаго—6, умѣреннаго—39, слабаго—5. Нетрезвую жизнь вели 25 человѣкъ. Смерть произошла въ состояніи сильнаго опьяненія въ 15 случаяхъ, въ одномъ случаѣ—въ банѣ, въ одномъ — при дефекаціи; въ одномъ случаѣ замѣченъ былъ укусъ на языкѣ, беременныхъ было 6, причемъ 5—въ послѣднихъ дняхъ.

Случай у 17-лѣтняго мужчины съ кровоизліяніемъ въ лобную долю и желудочки, гдѣ былъ подрытъ зрительный бугоръ и разрушено полосатое тѣло, и въ то же время произошелъ разрывъ аневризмы съ кровоизліяніемъ въ сердечную сумку, отнесенъ въ рубрику давленія на сердце.

Умершихъ отъ **давленія на сердце** было вскрыто 18 человѣкъ, изъ которыхъ 15 мужчинъ въ возрастѣ отъ 17 до 79 лѣтъ и 3 женщины—35, 61 и 64 лѣтъ. Давленіе на сердце въ 5 случаяхъ произошло отъ излившейся въ околосердечную сумку крови вслѣдствіе разрыва аневризмы аорты (606, 615, 616, 617, 620), въ 4—вслѣдствіе разрыва aneurism. dissec. (607, 609, 610, 618), въ 5—вслѣдствіе разрыва аорты (603, 605, 611, 614, 619) и въ 4—вслѣдствіе разрыва мышцы сердца (604, 608, 612, 613), причемъ въ 3 случаяхъ былъ разрывъ лѣваго желудочка и въ одномъ — праваго. Въ двухъ случаяхъ разрыва аорты (у 17- и 19-лѣтняго) внутренняя стѣнка аорты была гладкая. Сердце было нѣсколько увеличено, только въ 4 случаяхъ—значительно, ожирѣлое въ 7 случаяхъ, мышца почти всегда дряблая, желтоватая. Лѣвый желудочекъ былъ гипертрофированъ 8 разъ, оба желудочка—3 раза, стѣнки обоихъ желудочковъ были истончены—4 раза, одного праваго — 5 разъ. Обстоятельства и мѣсто, при которыхъ послѣдовала смерть, были слѣдующія: 4—умерло въ

постели, 2—въ клозетѣ на полу и выйдя изъ него, 2—на улицѣ, 2—во время работы, 1—во время разговора, 1—сидя на стулѣ, 1—найденъ мертвымъ на дворѣ. Количество излившейся крови чаще всего было 500—600 гр., дойдя въ одномъ случаѣ до 700,0.

Механизмъ смерти при разрывѣ сердца и большихъ сосудовъ.—«Размѣры и емкость околосердечной сумки не на столько значительны, чтобы даже при наибольшемъ растяженіи сумки, вмѣщающемъ приблизительно 600—800 ксм. крови, обусловить смерть отъ внутренняго кровотеченія. Поэтому то, дѣйствительный характеръ такихъ поврежденій сердца и большихъ его сосудовъ, которые происходятъ въ предѣлахъ чистой, покрытыхъ еще внутреннимъ листкомъ сумки, зависитъ отъ послѣдствій возрастающаго напряженія въ сумкѣ и давленія на сердце и большіе сосуды. Напряженіе въ сумкѣ, постепенно увеличиваясь, достигаетъ наконецъ такой степени, что пересиливаетъ давленіе въ приводящихъ кровь къ сердцу венозныхъ сосудахъ; безъ того ничтожное давленіе въ нихъ дѣлается недостаточнымъ для діастолическаго расширенія и наполненія предсердій. Съ каждымъ послѣдующимъ расширеніемъ все меньше и меньше доставляется крови сердцу, кровообращеніе разстраивается, происходитъ застой въ большихъ венахъ тѣла и въ маломъ кругѣ кровообращенія, ведущій постепенно къ смерти отъ асфиксіи. Изъ этого механизма кровообращенія вытекаютъ важнѣйшія находки на трупѣ въ такихъ случаяхъ: напряженно растянутая кровью околосердечная сумка, безкровіе полостей сердца и большихъ артерій, переполненіе венъ большого и малаго круговъ обращенія сердца». (Беллинъ. Къ суд.-мед. казуистикѣ поврежденій сердца и большихъ сосудовъ. Р. Мед. 1888. №№ 27, 28).

Задушеніе излившейся кровью въ дыхательные пути или въ полость плевры найдено было при вскрытіи 11 разъ, у 9 мужчинъ 28 — 73 лѣтъ и у 2 женщинъ 37 и 65 лѣтъ. Въ четырехъ случаяхъ задушеніе произошло вслѣдствіе кровотеченія изъ пораженныхъ чахоткою легкихъ (каверны) (622, 623, 630, 631), въ одномъ случаѣ—при хроническомъ межуточномъ воспаленіи легкихъ (625), и въ 6 случаяхъ вслѣдствіе кровотеченія изъ разрыва аневризмы (621, 624, 626 — 629): въ 1 случаѣ — въ лѣвый бронхъ, въ другомъ —въ трахею, въ третьемъ—въ лѣвый бронхъ и полость плевры и въ остальныхъ трехъ—въ полость плевры.

Острое малокровіе послужило причиною смерти 10 разъ: у 4 лицъ мужского пола въ возрастѣ отъ 2 недѣль до 54 лѣтъ и у 6 женщинъ 35—50 лѣтъ.

4 женщины умерли отъ маточнаго кровотеченія при родахъ, двѣ при предлежаніи послѣда, одна — отъ преждевременнаго отдѣленія послѣда, одна — отъ кровотеченія изъ приращеннаго дѣтскаго мѣста послѣ родовъ; 1 женщина умерла отъ кровотеченія изъ варикозной язвы голени, 1 — отъ кровотеченія изъ разрыва аневризмы аорты въ узурированный ею пищеводъ. Изъ 4 лицъ мужского пола у ребенка смерть послѣдовала отъ кровотеченія послѣ ранняго отпаденія пуповины; у 1 мужчины — отъ кровотеченія изъ раковой опухоли пищевода, разрушившей стѣнку аорты, у 1 — изъ злокачественной опухоли брюшной полости (саркомы забрюшинныхъ железъ?), прорвавшейся въ тонкія кишки, у 1 — вслѣдствіе разрыва артеріальнаго сосуда въ забрюшинную клѣтчатку, около правой почки.

Отъ **чрезмѣрнаго опьяненія** умерло 42 человѣка, изъ нихъ 37 мужчинъ 17 — 52 лѣтъ и 5 женщинъ 23—38 лѣтъ. Мужчины по преимуществу принадлежатъ къ возрасту отъ 20 до 40 лѣтъ. Почти всѣ они злоупотребляли спиртными напитками, много лѣтъ пьянствовали, пили часто по нѣсколько дней сряду, изрѣдка сразу выпивали по стакану и больше. При вскрытіи находили переполненіе сосудовъ и пазухъ мозговыхъ оболочекъ кровью, въ одномъ случаѣ наблюдалось сильное расширеніе кровью сосудовъ на днѣ 4-го желудочка, одинъ разъ было кровоизліяніе величиною въ бобъ подъ мягкую оболочку мозжечка. Сердце было нѣсколько увеличено, ожирѣвшее, 11 разъ увеличеніе было значительное, 8 разъ отмѣчена гипертрофія стѣнокъ желудочковъ; въ 13 случаяхъ мышца сердца имѣла желтоватый оттѣнокъ, 1 разъ на сердцѣ были молочныя пятна; въ двухъ случаяхъ обнаружены пятна Tardieu подъ наружнымъ покровомъ сердца. Въ легкихъ часто переполненіе кровью, какъ и въ другихъ внутреннихъ органахъ; въ четырехъ случаяхъ въ верхушкахъ легкихъ — бугорчатый процессъ; въ одномъ случаѣ на поверхности легкихъ были найдены мелкія кровоизліянія. Слизистая оболочка желудка часто бывала набухшей, складчатой, зернистой, сѣро-асфицнаго цвѣта, истонченной; содержимое въ двухъ случаяхъ равнялось $1^1/_2$ литрамъ. Мочевой пузырь часто былъ переполненъ мочею. Запахъ спирта при вскрытіи болѣе или менѣе рѣзко ощущался въ 32 случаяхъ: изъ желудка — 5 разъ, желудка и мозга — 12, брюшной и грудной полостей — 2, мозга и полостей — 2, изъ всѣхъ полостей — 1, брюшной полости и желудка — 1, крови легкихъ — 1, желудка и крови сердца — 2, крови сердца и мозга — 2, крови сердца и легкихъ — 1, мозга, легкихъ и крови сердца — 1.

Кромѣ упомянутыхъ 42 случаевъ смерти отъ чрезмѣрнаго опьяненія, гдѣ не было рѣзко выраженныхъ хроническихъ измѣненій сердца, наша статистика насчитываетъ еще 132 случая (101 мужч. и 31 женщ.), въ которыхъ чрезмѣрное опьяненіе было способствующей причиной смерти при различныхъ органическихъ пораженіяхъ сердца и сосудовъ. Чрезмѣрное опьяненіе послужило также причиной смерти при задушеніи рвотными массами въ 28 случаяхъ, изъ которыхъ принадлежало женщинамъ только 2 случая. Такимъ образомъ, чрезмѣрное опьяненіе послужило главной или способствующей причиной смерти почти въ трети всѣхъ случаевъ вскрытій у взрослыхъ.

Lochte отмѣчаетъ, что если исключить случаи, въ которыхъ увеличеніе сердца существуетъ при общемъ ожирѣніи, или обусловлено гипертрофіей праваго желудочка вслѣдствіе сращенія плевръ или осложнено стенозомъ аорты, то бросается въ глаза встрѣчающіяся въ отдѣльныхъ случаяхъ у пьяницъ поразительно низкій вѣсъ сердца, 270 — 340 gr. Также встрѣчается довольно часто у относительно еще молодыхъ пьяницъ прорастаніе жиромъ праваго желудочка. Этимъ можетъ быть объяснена нѣкоторая слабость потаторовъ.

Смерть во время хлороформированія. Самая незначительная травма, самое легкое насиліе можетъ вызвать внезапную, мгновенную смерть. Есть очень чувствительныя мѣста въ организмѣ, какъ подложечная область hypogastrii, гортань. При раздраженіи этихъ областей, рефлекторныя движенія могутъ остановиться; раздражаемый центръ парализуетъ дѣйствіе другихъ центровъ, которые уже функціонировали, и этотъ параличъ есть торможеніе (inhibition). «Все зависитъ отъ органическаго состоянія лица, т. е. отъ личнаго предрасположенія, не въ смыслѣ идіосинкразіи, но какъ случайнаго и недавняго предрасположенія: усталость всякаго рода, эксцессъ, страхъ, предшествующій въ большей или въ меньшей степени послѣднему моменту, когда произошелъ несчастный случай. Предрасположеніе, невѣдомое врачу, въ случаѣ хлороформированія, совершенно невѣдомое ни виновнику, ни жертвѣ. Второе необходимое условіе — это интенсивность шока или впечатлѣнія». Хлороформъ, примѣненіе котораго, повидимому, такъ легко, очень опасенъ, между же анэстетическими хлороформъ наиболѣе опасенъ. Flourens (1897), сообщая Академіи наукъ о результатѣ своихъ опытовъ по отношенію къ нервной системѣ животныхъ съ эфиромъ, выразился о немъ такъ: «это дѣйствительно удивительный и страшный», относительно же своихъ изслѣ-

дованій о хлороформѣ прибавилъ: «это дѣятель удивительный и еще болѣе страшный». Brouardel говоритъ: «Анэстезирующія средства, дѣйствующія посредствомъ прониканія своихъ паровъ къ первамъ на глотку, гортань, возбуждаютъ эти области, особенно чувствительныя, и могутъ выяснить чувствительность, до тѣхъ поръ неизвѣстную». Lacassagne говоритъ: «лица, подвергаемыя анэстезіи, умираютъ отъ остановки сердца или отъ асфиксіи. Если смерть происходитъ въ началѣ анэстезіи или въ теченіе ея, когда сознаніе еще не утрачено, она должна быть приписана остановкѣ сердца. Если смерть наступаетъ позже, можно всегда почти винить асфиксію». (Visoin-Cornatcano). Наши 4 случая, въ которыхъ смерть произошла при хлороформированіи, принадлежатъ мальчику 13 лѣтъ, съ гипертрофіей стѣнки лѣваго желудочка (1,8 снт.) и желтоватымъ оттѣнкомъ мышцы сердца; мужчинѣ 43 лѣтъ съ гипертрофіей ожирѣвшаго сердца и лѣваго желудочка, съ измѣненіями клапановъ аорты и двустворки, съ рѣзко выраженными эндартеритомъ аорты и вѣнечныхъ сосудовъ и сильнымъ суженіемъ послѣднихъ; мужчинѣ 16 лѣтъ съ гипертрофіей ожирѣвшаго сердца, съ истонченными мышечными стѣнками, бляшками на перикардіи, съ растяженіемъ праваго желудочка; и мужчинѣ 27 лѣтъ съ ожирѣвшимъ и жирно-перерожденнымъ сердцемъ и артеріосклерозомъ аорты и вѣнечныхъ сосудовъ сердца.

Изъ **болѣзней крови** при вскрытіи наблюдался одинъ случай **purpurae haemorrhagicae** у дѣвочки 12 лѣтъ, съ кровоизліяніями на лѣвой плеврѣ и слизистой твердаго и мягкаго неба, съ серознымъ экссудатомъ въ полости лѣвой плевры, и одинъ случай **лейкеміи** у 15-лѣтняго съ громадной до $3^1/_2$ kilo селезенкой, съ гноевидной гиперплазіей костнаго мозга, съ гиперплазіей лимфатическихъ железъ и селезенки, съ cor bovinum, съ серозно-фибринознымъ плевритомъ и воспаленіемъ нижней доли лѣваго легкаго, скопленіемъ аскаридъ въ тонкихъ кишкахъ.

При аутопсіи встрѣтилось три случая рахита въ возрастѣ отъ 8 мѣс. до 1 г. 8 мѣс., въ которыхъ смерть произошла вслѣдствіе судорожнаго закрытія голосовой щели; въ одномъ случаѣ наблюдался эндокардитъ при гипертрофированномъ сердцѣ; во второмъ найдены на плеврѣ пятна Tardieu; въ третьемъ отекъ нижней конечностей и genitalium, гипертрофія сердца съ расширеніемъ правой его половины, съ творожистыми фокусами въ gl. thymus и уплотненіемъ бронхіальныхъ железъ.

Отъ **истощенія** умерло 2 человѣка, мужчина 54 л. и женщина 60 л. У перваго были глубокія язвы большеберцовой кости съ распадающимися грануляціями, омертвѣніе покрововъ голени, ограниченная подвижность колѣнныхъ суставовъ, съ втянутыми и приращенными къ кости рубцами, молочныя пятна на перикардіи, недостаточность двустворки; катарръ желудка, амилоидъ печени, селезенки, почекъ. У второй найдены: колтунъ на головѣ, на пальцахъ ногъ и стопахъ язвы со струпьями, недостаточность и суженіе двустворки, фиброзное перерожденіе сердечной мышцы; гнойный бронхитъ, катарръ желудка, цирротическія измѣненія въ печени, селезенкѣ, почкахъ; камни желчнаго пузыря.

Эпилепсія. «Какіе признаки смерти можно найти при истинной эпилепсіи? Послѣ припадка мы часто констатируемъ, что шея, плечи покрыты точечными пятнышками, что конъюнктива инъецирована, что языкъ прикушенъ въ одномъ или въ нѣсколькихъ мѣстахъ, что бронхи наполнены пѣною; эти признаки мы встрѣчаемъ на трупѣ эпилептика, умершаго во время припадка, мы не имѣемъ другихъ для подтвержденія своихъ заключеній, и эти признаки почти тѣ же, что и при смерти отъ задушенія». (Brouardel).

Мы имѣемъ два случая смерти отъ эпилепсіи, гдѣ при вскрытіи не было видимыхъ измѣненій въ органахъ,— одинъ у мужчины 44 лѣтъ, у котораго на эпендимѣ дна 4-го желудочка замѣчались переполненные сосуды, слизистая дыхательныхъ путей была насыщенно-фіолетоваго цвѣта и покрыта пѣнистой слизью, на языкѣ — свѣжій прикусъ; другой случай принадлежитъ женщинѣ 32 лѣтъ, у которой мягкая мозговая оболочка на сводѣ была мутная, толстоватая; щитовидная железа увеличена почти вдвое; на языкѣ слѣды недавняго прикусыванія.

Приношу свою искреннюю благодарность и признательность глубокоуважаемому профессору Дмитрію Петровичу Косоротову за предложенную интересную тему и постоянные совѣты и указанія при исполненіи настоящей работы, глубокоуважаемому приватъ-доценту Александру Александровичу Липскому за совѣты и содѣйствіе въ работѣ.

Благодарю также и. д. прозектора многоуважаемаго А. П. Петрова и ассистента многоуважаемаго С. П. Вертоградова за ихъ содѣйствіе и постоянное товарищеское отношеніе.

Литература.

1) F.-A.-Aran. Recherches sur les maladies du coeur et des gros vaisseaux considérées comme causes de mort subite. Archives générales de médecine, 4-e série, T. XIX. 1849. P. 46—60; 302—315.

2) L. Matevérÿ. De la mort subite. Statistique de la morgue de 1871 à 1884. Causes et observations. Thèse à Paris. 1885. p. 7—80.

3) A. Lesser. Die wichtigsten Sectionsergebnisse in 171 Fällen plötzlichen Todes. Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin. N. F. B. XLVIII. S. 1—67. 1888.

4) Algot Key-Åberg. Ueber die Bedeutung der Endarteritis chronica deformans als Ursache plötzlichen Todes. Viert. f. ger. Med. N. F. XLVIII B. S. 113—146, 404—430.

5) — Ueber die Sklerose der Kranzarterien des Herzens als Ursache plötzlichen Todes. V. f. g. M. 1889, I. B. S. 29—47, 240—254. (B. LI). Bd. LII, S. 57—66.

6) A. Kleinberg. Todesursachen bei plötzlichem Tode. Gerichtsärztliche Studien auf Grundlage von 277 Beobachtungen aus Dorpat und Riga. Diss. 1892. Mitau. S. 7—41.

7) Э. Ф. Беллинъ. Къ вопросу о причинахъ скоропостижной смерти. «Вѣстн. Общ. Гиг., Суд. и Практ. Медиц.» Т. XIX. 1893. 27—43.

8) A. Kühner. Ueber plötzliche Todesfälle. V. f. ger. Med. 3. F. VI. B. 1893. S. 263—279.

9) A. Legros. Étude sur la pathogénie des morts subites au point de vue médico-légal. Thèse à Lyon. 1893. P. 1—88.

10) Ch. Vibert. De la mort subite dans les affections chroniques du coeur et de l'aorte. Ann. d'Hygiène publ. et de méd. lég. 3-e série. T. XXXIII. 1895. P. 193—210, 294—304.

11) — Une cause de mort subite chez les petits enfants. Id. P. 48—60.

12) P. Brouardel. La mort et la mort subite. Paris. 1895. P. V—VII, 1—450.

13) Dixon Mann. О внезапной или неожиданной смерти отъ естественныхъ причинъ. Рефератъ въ «Зѣ. Общ. Гиг., Суд. и Пр. Мед.». 1897. VIII. 166—176.

14) О. С. Ушаковъ. Трупный матеріалъ судебно-медицинской камеры Императорской Военно-Медицинской Академіи за 15 лѣтъ (1895—1900 г.). Спб. 1900. Дисс. Стр. 1—306.

15) В. Александровъ. Къ вопросу о причинахъ скоропостижной смерти. «В. О. Г., Суд. и Пр. Медиц.» 1901. Стр. 788—794.

16) M. Thiemich. Ueber plötzliche Todesfälle im Kindesalter. V. f. ger. Med. 3 F. XXI B. 1901. S. 301—314.

17) N. Stoenescu. Considérations sur quelques cas de mort subite. Annales d'hygiène publique et de médecine légale. 3-e s. T. XLVIII. 1902. P. 289—313.

18) Lochte. Beobachtungen über den plötzlichen Tod aus inneren Ursachen. V. f. ger. Med. 3 F. XXVII B. 1904.

19) J. Vissoni-Cornateano. La mort par inhibition. Paris. 1906. P. V—VIII, 1—124.

20) Вертоградовъ, С. П. Къ изученію особенностей смерти отъ разрыва аорты (aneurysma dissecans). «Изв. В.-Мед. Акад.» 1909. Стр. 155—174.

21) Соколовъ, Дм., проф. Тѣлица у человѣка. Спб. 1910. Стр. 1—178.

22) Статистическій временникъ Россійской Имперіи. Изд. Центр. Стат. Ком. м-ва внутр. дѣлъ. Сер. II. Вып. XIX. Спб. 1882. Статистическія свѣдѣнія о насильственныхъ и внезапныхъ смертяхъ въ періодѣ 1870—74 годовъ.

23) Временникъ Центр. Статист. Комит. м-ва внутр. дѣлъ. № 35. 1894. Умершіе насильственно и внезапно въ Европ. Россіи въ 1875—1887 гг.

24) — № 41. 1897. Умершіе насильственно и внезапно въ Россійской Имперіи въ 1888—1893 гг.

Выводы.

1) Въ половинѣ или больше всѣхъ случаевъ скоропостижной смерти исходъ обусловливается параличомъ или разрывомъ сердца, разрывами аневризмы аорты или самой аорты и внутричерепнымъ кровоизліяніемъ, имѣющими своимъ источникомъ endarteriit. chron. deform.

2) Параличъ сердца при хроническомъ эндартеріитѣ встрѣчается у мужского пола значительно чаще ($74{,}3^0/_0$), чѣмъ у женскаго ($25{,}7^0/_0$), еще болѣе часты у мужчинъ разрывы аневризмы аорты ($80{,}7^0/_0$); самопроизвольные разрывы аорты и aneurism. dissec.—почти исключительный удѣлъ мужчины ($93{,}3^0/_0$); мозговыя кровоизліянія у женщинъ даютъ бо́льшій процентъ сравнительно съ другими исходами хроническаго эндартеріита ($37^0/_0$, у Ушакова—$30^0/_0$); разрывы сердца почти одинаковы у обѣихъ пола.

3) Разрывъ сердца очень рѣдкая причина скоропостижной смерти ($0{,}6^0/_0$).

4) Maximum смертности отъ паралича сердца при хроническомъ эндартеріитѣ у мужчинъ приходится на возрастъ 40—44 лѣтъ, а у женщинъ— 60—64 лѣтъ. Замѣтный подъемъ смертности у мужчинъ наблюдается уже въ возрастѣ 25—29 лѣтъ, а у женщинъ — 30—34 (въ Вѣнѣ, по Key-Aberg'y, на 5 лѣтъ позже для каждаго пола).

5) Количество смертныхъ случаевъ отъ паралича сердца для лицъ обоего пола до 50 лѣтъ относится къ таковому послѣ 50 лѣтъ, какъ 1,98 къ 1, въ Вѣнѣ отношеніе обратное—1 : 1,48.

6) Наибольшая смертность отъ аневризмы аорты приходится на возрастъ 35 — 39 лѣтъ, на 5-лѣтіе раньше сравнительно съ параличемъ сердца.

7) Разрывъ аневризмы аорты чаще всего происходитъ въ восходящей части; при этомъ величина аневризмы, за немногими исключеніями, не превосходитъ величины голубинаго яйца.

8) Самопроизвольные разрывы аорты чаще всего встрѣчаются въ нижнихъ трехъ четвертяхъ восходящей части аорты.

9) Мозговыя кровоизліянія у мужчинъ довольно часты въ возрастѣ до 25 лѣтъ; даютъ два maximum'а отъ 40 до 44 лѣтъ и 50—54; въ возрастѣ 35 — 54 даютъ вдвое большее число, чѣмъ въ остальные возрастные періоды вмѣстѣ. У женщинъ апоплексіи распредѣлены по возрастнымъ группамъ болѣе или менѣе равномѣрно; за тотъ же возрастный періодъ. что у мужчинъ, даютъ почти въ $1^1/_2$ раза меньше (1,2 и 1,4) случаевъ, чѣмъ за болѣе ранній и болѣе поздній періоды вмѣстѣ: здѣсь отражается неблагопріятно вліяніе беременности. Послѣ 60 лѣтъ женщины даютъ больше случаевъ, чѣмъ мужчины.

10) Смерть при мозговыхъ кровоизліяніяхъ рѣдко бывала внезапной, чаще бывала длительной.

11) До 45-лѣтняго возраста не наблюдалось ни одного случая разрыва сердца, наибольшее число ихъ приходится на возрастъ свыше 60 лѣтъ. Разрывъ сердца—удѣлъ старости.

12) Aneurisma dissecans встрѣчалась въ наиболѣе раннемъ возрастѣ (въ двухъ случаяхъ изъ четырехъ—до 20 лѣтъ).

13) Значеніе Endarteriit. chron. deform. для скоропостижной смерти усиливается тѣмъ, что въ комбинаціи съ другими ближайшими патолого-анатомическими причинами смерти (воспаленія легкихъ, чахотка, задушеніе), въ половинѣ случаевъ имѣлось и существованіе эндартеріита (болѣе 50 случаевъ), способствовавшаго быстрому летальному исходу

14) Ближайшей причиной смерти у сердечныхъ больныхъ въ 11 случаяхъ была баня; въ 5 случаяхъ смерть произошла вскорѣ послѣ бани; въ 6 случаяхъ смерть произошла при дефекаціи.

15) Занятія, требующія пребыванія въ согбенномъ или неловкомъ положеніи (извозчики, прачки etc.) отражаются неблагопріятно на сосудистой системѣ, ведя къ дегенеративнымъ измѣненіямъ стѣнокъ артерій, и сказываются увеличеніемъ смертности у этихъ профессій сравнительно съ другими занятіями рабочаго класса.

16) Вторую по численности за хроническимъ эндартеріитомъ группу занимаетъ скоропостижная смерть при измѣненіяхъ мышцы сердца, соединенныхъ или съ ожирѣніемъ сердца, или съ эндокардитомъ, или же самихъ по себѣ. Для этой группы, обнимающей $^1/_3$ часть всѣхъ случаевъ у взрослыхъ, характерно крѣпкое или хорошее сложеніе (около половины), значительное увеличеніе сердца (въ половинѣ) и гипертрофія стѣнокъ сердца (около $30^0/_0$).

17) Воспаленія легкихъ (крупозное, катарральное), плевры, брюшной тифъ, перитонитъ и менингитъ, опухоли мозга развивались скрытнымъ, мало замѣтнымъ образомъ, особенно у алкоголиковъ.

18) Крупозное воспаленіе верхней доли легкаго, повидимому, угрожаетъ жизни въ гораздо большей степени, чѣмъ нижней.

19) Въ трети всѣхъ случаевъ скоропостижной смерти у взрослыхъ чрезмѣрное опьяненіе служило главной или способствующей причиной смерти.

20) Три четверти всѣхъ случаевъ внезапной смерти принадлежитъ мужскому полу.

21) Женщины болѣе противостоятъ различнымъ болѣзнямъ, въ томъ числѣ и заразнымъ (брюшной тифъ, крупозное воспаленіе легкихъ, — но не катарральное, — туберкулезъ легкихъ, заворотъ кишекъ, задушеніе рвотными массами), гибнутъ скоропостижно отъ нихъ въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ мужчины.

23) До 15 лѣтъ скоропостижная смерть очень рѣдка, за исключеніемъ самаго ранняго дѣтскаго возраста (до 1 года); наибольшая смертность приходится на возрастъ 25—60, причемъ у мужчинъ на 40—44 г. падаетъ maximum, кривая смертности поднимается и падаетъ круто, у женщинъ же смертность распредѣляется равномѣрно, съ тенденціей не ослабѣвать и въ болѣе позднемъ возрастѣ.

23) Въ Россіи съ 1875 замѣтна наклонность къ постепенному возрастанію числа женщинъ, умирающихъ скоропостижною смертію. Женская смертность въ нѣкоторыхъ губерніяхъ доходитъ до $45,6^0/_0$.

Положенія.

1. При распространенности бытового сифилиса въ деревнѣ и неизбѣжномъ пополненіи контингента больными сифилисомъ, вызывающимъ атероматозъ артеріальной системы, ведущій часто къ внезапной смерти, и при теперешнемъ увлеченіи въ арміи сокольской гимнастикой съ ея излишнимъ форсированіемъ работы сердца, можно ожидать увеличенія числа случаевъ скоропостижной смерти въ арміи.

2. Какъ одну изъ профилактическихъ мѣръ противъ вредностей, сопряженныхъ съ нѣкоторыми профессіями, надо привить въ низшей и средней школѣ пріемы единственной рациональной системы гимнастики — шведской, щадящей сердце и коррегирующей и недостатокъ движенія и односторонность движеній, присущіе большинству профессій.

3. Дальнѣйшимъ шагомъ въ улучшеніи санитарнаго дѣла въ арміи является необходимость возложить таковое всецѣло на врача части. Двоевластіе особенно печально сказывалось въ минувшую кампанію.

4. Для всесторонняго освѣщенія военно-санитарнаго дѣла желательно изданіе военно-санитарнаго обозрѣнія.

5. Необходимо предоставить младшему врачу полную свободу и независимость, даруемыя ему наукою, въ дѣлѣ леченія больныхъ и не превращать его въ фельдшера, которому старшій врачъ диктуетъ леченіе.

6. Пріемные покои должны пользоваться правами лазаретовъ; стѣснять врача въ дѣлѣ леченія излишней регламентаціей — вредно для дѣла.

7. Система обязательнаго каталога медикаментовъ очень громоздка. Проще и продуктивнѣе было бы ассигновывать опредѣленную сумму врачу для пріобрѣтенія медикаментовъ.

8. Для дѣйствительнаго усовершенствованія необходимы научныя командировки, 2—3-мѣсячныя, какъ это принято въ земствахъ; для той же цѣли желательно облегчить отпуски, чтобы право это не обращалось въ фикцію.

9. Желательно не стѣснять нижнихъ чиновъ купаться въ одиночку и въ свободное время въ отведенныхъ мѣстахъ, такъ какъ предписаніе купаться непремѣнно командами и большая отвѣтственность за несчастные случаи ведутъ къ тому, что купаньемъ не пользуются въ должной мѣрѣ и лагери не исполняютъ своего гигіеническаго назначенія.

10. Въ лагеряхъ возможно было бы отвести площадки, огородивши ихъ, для воздушно-солнечныхъ ваннъ, представляющихъ могущественное средство для закаливанія и укрѣпленія организма, въ особенности въ періодѣ роста.

11. In dubiis suspice luem — этого правила не долженъ забывать военный врачъ, ибо весьма не рѣдко встрѣчается въ арміи нелеченный бытовой сифилисъ деревенскаго происхожденія въ третичномъ періодѣ, когда дѣйствительна только ртуть.

12. При безсонницѣ часто прекрасное дѣйствіе оказываютъ медленныя и глубокія дыхательныя движенія.

13. Воздушно-солнечныя ванны хорошо дѣйствуютъ при обопрѣлости ногъ.

14. Черника — хорошее лекарственное и діететическое средство при поносахъ.

15. Въ началѣ мягкошанкернаго бубона часто обрывающимъ образомъ дѣйствуетъ высасываніе Правацемъ гноя и промываніе полости, заживленіе протекаетъ очень быстро подъ давящей повязкой.

16. Военный врачъ въ воинскомъ присутствіи долженъ быть не только экспертомъ, а и полноправнымъ членомъ для того, чтобы работа присутствія могла совершаться правильно. Дѣятельность присутствій нуждается въ ревизіи.

Curriculum vitae.

Леонидъ Львовичъ Плешковъ, сынъ полковника, православнаго исповѣданія, родился въ 1869 г. въ Рогачевѣ, учился въ Глуховской прогимназіи и Коллегіи Павла Галагана, по окончаніи которой въ 1887 г. поступилъ на юридическій факультетъ университета св. Владиміра. Въ 1900 г. перешелъ въ Харьковскій университетъ на медицинскій факультетъ, который окончилъ со степенью лекаря въ 1895 г. Въ 1896 г. назначенъ былъ младшимъ врачемъ летучихъ парковъ въ Тирасполѣ, съ 1899 г. переведенъ въ 53 пѣх. Волынскій полкъ, гдѣ состоитъ и теперь. Съ полкомъ же участвовалъ въ Русско-Японской кампаніи (Сандепу и Мукденъ) въ должности старшаго врача. Въ 1908 г. прикомандированъ къ Императорской Военно-Медицинской Академіи для усовершенствованія. Экзамены на степень доктора медицины сдалъ въ 1908—1909 гг.

Настоящую работу подъ заглавіемъ «Къ вопросу о скоропостижной смерти по даннымъ Судебно-медицинскаго кабинета Императорской Военно-Медицинской Академіи за 10 лѣтъ (1900—1909 гг.)» представляетъ въ качествѣ диссертаціи на степень доктора медицины.

Судебно-медицинскіе протоколы

съ предварительными свѣдѣніями.

НБ ХНМУ

I.

Смерть отъ эпилепсіи.

1. Иванъ *Шаровъ*, 44 л., кресть. 1 нбр. 1901 во время рубки капусты почувствовалъ себя дурно, свалился около чана и умеръ.

Вскрытіе 4 нбр. 1901. Средняго роста, умѣреннаго сложенія и питанія. На эпендимѣ дна 4-го желудочка замѣтны переполненные сосуды. Правая половина сердца переполнена темною жидкою кровью, въ лѣвой—кровь въ небольшомъ количествѣ; сердечная мышца темно-красная, дряблая и тусклая. Синюшная оболочка входа въ гортань сильно набухшая, синевато-красная; на кончикѣ языка замѣтна горизонтальная темно-багровая полоска, при разрѣзѣ ткани на этомъ мѣстѣ она оказалась пронитанной кровью на глубину около миллиметра. Синюшная оболочка дыхательныхъ путей насыщенно-фіолетоваго цвѣта, покрыта пѣнистой слизью. При разсматриваніи плевры между долями оказалось нѣсколько отдѣльныхъ темно-красныхъ пятнышекъ величиною отъ маковаго до просяного зерна. Селезенка сокращена.

2. Евдокія *Климова*, 82 л., мѣщ., рабочая на трикотажной фабрикѣ. Страдала припадками падучей болѣзни. Утромъ 29 янв. 1903 ее трясло и спустя нѣсколько минутъ умерла.

Вскрытіе 4 фвр. 1903. Небольшого роста, умѣреннаго тѣлосложенія. Мягкая оболочка на сводѣ мутная, толстоватая, покрытая небольшимъ количествомъ зернистыхъ возвышеній. Въ мозгу значительное содержаніе крови. Щитовидная железа увеличена почти вдвое. Корковый слой почекъ толщиною 0,5—0,7 снт. При осмотрѣ языка на немъ кромѣ слѣдовъ недавняго прикусыванія, другихъ измѣненій, напр., старыхъ рубцовъ не обнаружено.

II.

Пораженія сердца.

Параличъ сердца вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ.

3. Неизвѣстнаго званія *женщина*, 30 л. Подобранная на улицѣ въ безчувственно-пьяномъ видѣ, по доставленіи въ пріемный покой умерла 11 нбр. 1900.

Вскрытіе 7 нбр. 1900. Роста средняго, слабаго тѣлосложенія и весьма худощава, тѣло грязное и покрыто массой вшей. Обѣ голени и стопы отечны. Стѣнки сосудовъ основанія мозга довольно плотны, вѣнотъ.

Въ тазовой полости порядочное количество водяночной жидкости. Сердце увеличено въ объемѣ, всѣ его полости переполнены кровью со сгустками; стѣнка праваго желудочка нѣсколько истончена, мышцы сердца буро-краснаго цвѣта, плотны, съ бѣловатыми прослойками; трехстворчатый клапанъ утолщенъ и мутенъ; двустворчатый также утолщенъ, мутенъ и сморщенъ, папиллярныя и сосковыя мышцы уплотнены, съ большимъ количествомъ соединительной ткани. Легкія эмфизематозны. На сводѣ печени бѣловатые втянутые рубцы; ткань довольно плотна. Капсула почекъ снимается съ большимъ трудомъ; ткань плотна, корковый слой истонченъ, съ сальнымъ блескомъ, желтоватаго цвѣта, пирамидки укорочены.

4. Петръ *Лукьяновъ*, 26 л., мѣщ. Велъ жизнь трезвую, былъ слабаго здоровья. 26 нбр. 1900 внезапно упалъ, на полу бился, схватился обѣими руками за бокъ и сердце, и умеръ. Послѣднее время жаловался на боль въ груди.

Вскрытіе 1 дек. 1900. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія и питанія. Сердце $15 \times 15 \times 6^1/_2$ снт.; на передней поверхности большія бѣловатыя бляшки съ отходящими отъ нихъ разращеніями плотной соединительной ткани въ видѣ тяжей; всѣ полости сердца переполнены кровью съ плотными сгустками; стѣнки лѣваго желудочка толщиною 2 снт., праваго—1 снт., мышцы съ желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно плотны; внутрисердечная оболочка мутно-бѣлаго цвѣта съ плотными бѣловатыми пятнами; двустворчатый клапанъ утолщенъ и укороченъ, клапаны аорты сильно утолщены и сморщены.

5. Иванъ *Евдокимовъ*, 37 л., крест. 13 фвр. 1900 поднятъ пьянымъ на берегу р. Невы въ безсознательномъ состояніи и по дорогѣ въ пріемный покой умеръ. Жизнь велъ нетрезвую.

Вскрытіе 17 фвр. 1901. Невысокаго роста, слабаго сложенія, умѣреннаго питанія. Въ брюшной и грудной полости, въ желудкѣ ясный спиртный запахъ. Правая половина сердца и лѣвое предсердіе растянуты большимъ количествомъ темной жидкой крови; клапаны аорты при гидростатической пробѣ оказались недостаточными; лѣвое венозное кольцо съ трудомъ пропускаетъ 2 пальца; мускулатура ясно-желтоватаго цвѣта; по краямъ двустворчатаго клапана бѣловатыя бугристыя, плотныя и болѣе мягкія сѣроватыя утолщенія; утолщены также, не вполнѣ равномѣрно узловаты сухожильныя нити двустворчатаго клапана; толщина лѣваго желудочка достигаетъ 1,6 снт. Аорта на уровнѣ клапановъ рѣзко и замѣтно сужена въ силу сморщиванія и сращенія сосѣдственныхъ участковъ клапановъ, въ видѣ бѣловатыхъ неправильной формы узловъ величиной до горошины, съ отложеніями въ центрѣ ихъ извести. Поверхность печени не вполнѣ ровная вслѣдствіе углубленныхъ и фиброзно-утолщенныхъ участковъ. Сосуды основанія мозга нѣсколько утолщены, на разрѣзахъ зіяютъ. Корковый слой почекъ истонченъ, мѣстами рѣзко выражены желтоватыя полоски; верхушки нѣкоторыхъ пирамидъ блѣдны, плотны, фиброзно перерождены.

6. Дмитрій *Обрядинъ*, 29 л., крест., кровельщикъ. Страдалъ сильнымъ удушьемъ, около семи лѣтъ предавался пьянству, ежедневно почти былъ въ нетрезвомъ видѣ. Легъ спать сильно пьянымъ, по утру 28 окт. 1901 найденъ былъ мертвымъ.

Вскрытіе 30 окт. 1901. Высокаго роста, средняго сложенія и питанія. Сердце немного увеличено; во всѣхъ полостяхъ имѣется немного темной, жидкой пѣнистой крови; наибольшее количество содержатъ предсердія, наименьшее — лѣвый желудочекъ; полость праваго желудочка представляется растянутой, а эндокардій его грязновато-буро-красноватый, толщина стѣнки 0,3 сант., мускулатура дряблая, мѣстами ясно желтовата; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,3 сант., мускулатура желтовата и въ высшей степени дрябла; верхушки папиллярныхъ

мышцъ двустворки сухожильно перерождены, желтоваты, мускулатура ихъ желтовата; эндокардій лѣваго желудочка буроватъ, но менѣе, чѣмъ въ предсердіяхъ. При вскрытіи брюшной полости и сердечной сумки замѣтенъ спиртный запахъ.

7. Иванъ *Гавриловъ*, 44 л., крест. извозчикъ. Водку пилъ умѣренно. Съ недѣлю болѣла голова и грудь, но, боясь потерять мѣсто, хозяину о томъ не заявлялъ. 18-го боли усилились, а 19-го уже не работалъ, былъ въ банѣ, ночью 20 нбр. 1902 сходя съ русской печи, упалъ отъ слабости и дурноты и черезъ нѣсколько минутъ умеръ.

Вскрытіе 26 нбр. 1902. Высокаго роста, средняго сложенія, ослабленнаго питанія. На лѣвой голени вдоль гребешка большеберцовой кости имѣется цѣлый рядъ блѣдныхъ приросшихъ углубленныхъ рубцовъ, а на границѣ верхняго эпифиза большеберцовой кости съ діафизомъ ея имѣется неправильнаго вида утолщеніе кости. Утолщенъ также правый локтевой суставъ по сравненію съ лѣвымъ, подвижность его въ смыслѣ крайняго разгибанія ограничена. Сердце немного увеличено; въ полостяхъ его содержится жидкая кровь и немного сгустковъ, мускулатура довольно дряблая, желтовата, правый желудочекъ сильно растянутъ; по краю трехстворчатаго клапана имѣются полупросвѣчивающіе узелки въ видѣ бородавчатыхъ возвышеній, болѣе обильные по краю сморщеннаго и утолщеннаго двустворчатаго клапана; мускулатура праваго желудочка мѣстами пророщена жиромъ до полнаго истонченія мышечной пластинки. Въ верхушкахъ обоихъ легкихъ имѣются узловатыя сморщиванія вокругъ участковъ сыровиднаго распада. Почки увеличены, ткань блѣдновата съ желтизной, границы слоевъ неясны, корковый слой сильно истонченъ. Въ тонкихъ кишкахъ одиночныя железы увеличены; въ толстыхъ темно-аспидная окраска слизистой оболочки и многочисленные язвы и рубцы звѣздчатой формы, язвы поверхностныя съ бѣловатымъ инфильтрированнымъ, утолщеннымъ дномъ съ незначительной реакціей въ окружности; такія же язвы въ изобиліи встрѣчаются и на слизистой слѣпой кишки, имѣющей темно-аспидное окрашиваніе; нижній отдѣлъ тонкихъ кишекъ не имѣетъ никакихъ язвенныхъ пораженій, слизистая его блѣдновата. Забрюшинныя железы увеличены, плотноваты, на разрѣзѣ свѣтло-сѣры. Въ прямой кишкѣ и S-образной наблюдаются многочисленныя съ утолщеннымъ бѣловатымъ дномъ изъязвленія.

8. Александра *Плотицына*, 30 л., крест., проститутка. Поднятая въ безсознательномъ отъ опьяненія состояніи была доставлена въ пріемный покой. Утромъ 30 янв. 1903, собираясь уходить, вдругъ почувствовала себя дурно и упавъ, стала метаться, а черезъ 3—4 минуты, не приходя въ сознаніе, умерла.

Вскрытіе 3 фвр. 1903. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Всѣ полости сердца, въ особенности правыя, переполнены кровью съ плотными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 сант., праваго—0,6; мышцы ихъ блѣдно-краснаго цвѣта съ рѣзко-желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно дряблы; лѣвое венозное отверстіе едва пропускаетъ палецъ; задняя заслонка двустворчатаго клапана рѣзко утолщена и сморщена, уплотнена, у основанія ея большія известковыя отложенія. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой утолщенъ, пирамидки укорочены, ткань плотна.

9. Семенъ *Каруновъ*, 52 л., крест., поваръ чайной и закусочной лавки. Три дня подрядъ пьянствовалъ, съ утра 2 фвр. 1903 жаловался на боль въ груди, часто требовалъ пить, а въ 6 ч. умеръ.

Вскрытіе 7 фвр. 1903. Высокаго роста, средняго сложенія, слабаго питанія. Въ желудкѣ имѣется около 1 литра жидкости; полость расширена. Сердце нѣсколько увеличено; во всѣхъ полостяхъ его содержится

темная со сгустками крови; на наружной его поверхности имѣется довольно большія перламутроваго цвѣта гладкія пятна; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,1 сант., праваго—0,25; мускулатура сердца нѣсколько плотнѣе нормы и съ буроватымъ оттѣнкомъ; двустворчатый клапанъ по краю слегка сморщенъ. Ткань легкихъ въ верхушкахъ уплотнена съ отложеніемъ известковыхъ солей въ оплотнѣвшихъ сяровидныхъ участкахъ и съ развитіемъ соединительной ткани около бронховъ. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой мѣстами истонченъ до 0,4 сант. Отъ мозга исходитъ весьма замѣтный спиртный запахъ.

10. Неизвѣстнаго званія *женщина*, 55 л. Напившись чаю въ чайномъ заведеніи, осталась сидѣть какъ будто бы въ сонномъ положеніи; принятая за пьяную, была отправлена въ часть, но по дорогѣ умерла 10 мрт. 1903.

Вскрытіе 14 мрт. 1903. Средняго роста и сложенія, хорошаго питанія. Сердце немного увеличено. Во всѣхъ полостяхъ его, но преимущественно въ предсердіяхъ, содержится въ изобиліи темная жидкая кровь; лѣвое венозное кольцо свободно пропускаетъ одинъ палецъ; толщина стѣнки праваго желудочка 0,5 сант., мускулатура его мѣстами желтовата, дряблая; мускулатура лѣваго желудочка жесткована, съ буроватымъ оттѣнкомъ; двустворчатый клапанъ по краю рѣзко утолщенъ, мѣстами хрящевой плотности; клапаны на сосѣдственныхъ мѣстахъ срощены.

11. Иванъ *Тимофѣевъ*, 53 л., крест., столяръ. Поведеніи былъ нетрезваго, ежедневно былъ пьянъ. Совершенно пьяный, поужиналъ, легъ спать, на утро 19 окт. 1903 найденъ мертвымъ.

Вскрытіе 22 окт. 1903. Высокаго роста, средняго сложенія, плохого питанія. При вскрытіи живота исходитъ гнилостно-спиртный запахъ. Полости праваго сердца сильно растянуты темною жидкою кровью; лѣвый желудочекъ пустъ, а въ лѣвомъ предсердіи немного темной со сгустками крови; сердце увеличено, съ перламутровыми пятнами на серозномъ покровѣ; стѣнка праваго желудочка утолщена до 0,6 сант., лѣвое венозное кольцо не пропускаетъ двухъ пальцевъ, стѣнка лѣваго желудочка толщиною въ 1,0 сант.; мышца сердца буро-красна, жестковата; двустворчатый клапанъ сморщенъ, утолщенъ, сосѣдственные края клапановъ срощены. Содержимое желудка и тонкихъ кишекъ имѣетъ спиртный запахъ. Въ аортѣ много темной съ рыхлыми сгустками крови. Отъ мозга исходитъ слѣдъ спиртный запахъ.

12. Иванъ *Ильинъ*, 55 л., крест. Послѣднее время велъ жизнь трезвую, былъ записавшись въ обществѣ трезвости около 4 мѣсяцевъ тому назадъ, раньше порядочно выпивалъ. Около трехъ мѣсяцевъ назадъ заболѣлъ на боль въ груди и головѣ. Упалъ во дворѣ и въ безсознательномъ состояніи вскорѣ умеръ 7 мрт. 1904.

Вскрытіе 9 мрт. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце замѣтно увеличено; обѣ его половины переполнены темною жидкою кровью съ рыхлыми сгустками въ лѣвомъ сердцѣ, стѣнка лѣваго желудочка у средины и верхушки значительно истончена, внутрисердечная оболочка въ лѣвой половинѣ утолщена, мутно-бѣловатаго цвѣта, сердечная мышца блѣдно-красная съ бѣловатыми плотными остроконцами; клапаны аорты утолщены, сморщены и сращены, мутно-бѣловатаго цвѣта. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго орѣха, сѣровато-бѣловатаго цвѣта въ разрѣзѣ. Стѣнки сосудовъ основанія мозга утолщены, на протяженіи ихъ имѣются бѣловатыя плотныя бляшки.

13. Дмитрій *Фоминъ*, 19 л., крестьян., пекарь. 18 мрт. былъ разсчитанъ хозяиномъ за пьянство и напился очень пьянъ. 21 мрт. 1907 былъ найденъ въ подвалѣ его трупъ.

Вскрытіе 27 мрт. 1907. Довольно нѣжнаго сложенія, средняго питанія. Сосуды и назухи мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью. Отъ мозга исходитъ очень легкій спиртный запахъ. Сердце увеличено, во всѣхъ полостяхъ его содержится темная со сгустками кровь; лѣвое венозное кольцо не пропускаетъ двухъ пальцевъ; мускулатура сердца темно-буро-красная, плотнѣе нормы, на разрѣзахъ пестрая; по краю двустворчатаго клапана имѣются отложенія, а верхушки сосочковыхъ мышцъ туповаты и плотны.

14. Павелъ *Васильевъ*, 37 л., крест., умеръ 12 дек. 1908.

Вскрытіе 16 дек. 1908. Роста немного выше средняго, умѣреннаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце раза въ полтора больше кулака покойнаго, дряблозато; во всѣхъ полостяхъ сердца находится много полужидкой, довольно густой крови съ обильными рыхлыми темно-красными свертками; сгустками и довольно плотными сѣровато-бѣлыми бородавчатыми на полулунныхъ клапанахъ аорты находятся обильныя бородавчатыя плотныя разрастанія, клапаны аорты по краямъ отчасти сращены другъ съ другомъ такъ, что устье аорты представляется нѣсколько суженнымъ; съ другой также, что устье аорты представляется нѣсколько суженнымъ; съ другой также, что устье аорты представляется нѣсколько суженнымъ; стѣнка праваго желудочка около 0,5 сант., лѣваго—около толщина стѣнки праваго желудочка около 0,5 сант., лѣваго—около толщина стѣнки праваго желудочка около 0,5 сант., лѣваго—около 1,5 сант., мышца сердца глинистаго цвѣта, дряблая, пропускаетъ ногтемъ. Въ желудкѣ около $\frac{1}{2}$ литра жидкости Сосуды основанія мозга извиты, Въ желудкѣ около $\frac{1}{2}$ литра жидкости Сосуды основанія мозга извиты, жесткожаты.

15. Андрей *Никитинъ*, 41 г., крест., легковой извозчикъ. Жаловался на боль въ груди, страдалъ сильной одышкой и кашлемъ. Придя домой, на боль въ груди, страдалъ сильной одышкой и кашлемъ. Придя домой, на боль въ груди, страдалъ сильной одышкой и кашлемъ. Придя домой, на боль въ груди, страдалъ сильной одышкой и кашлемъ. Придя домой, сѣлъ у стола на скамейку, сказалъ, что сильно заболѣло сердце, упалъ сѣлъ у стола на скамейку, сказалъ, что сильно заболѣло сердце, упалъ сѣлъ у стола на скамейку, сказалъ, что сильно заболѣло сердце, упалъ и тутъ же умеръ 11 дек. 1909.

Вскрытіе 13 дек. 1909. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, всѣ полости его переполнены темно-свернувшейся кровью; по извлеченіи сердца въ околосердіи осталось около 700 к. с. крови, толщина стѣнки праваго желудочка 0,5; лѣваго—1,0; полость лѣваго желудочка замѣтно расширена, лѣвое венозное кольцо съ трудомъ пропускаетъ одинъ палецъ, двустворчатый клапанъ сморщенъ, утолщенъ и пропитанъ известковыми отложеніями, на внутренней поверхности клапана имѣется язва величиною въ 10 коп. монету и на ней крупныя плотно сидящія свертокъ волокнистыя, мышца сердца буро-красна, плотнѣе нормы, на разрѣзахъ пестрая; сердечная мышца дряблая. Капсула почекъ сращена съ ними, корковый слой истонченъ до 0,4 сант. Отъ мозга исходитъ слѣдъ спиртный запахъ.

16. Семенъ *Горбуновъ*, 42 л., крест., фабричный, ткачъ. Ранѣе велъ образъ жизни нетрезвый, послѣдніе полгода состоялъ членомъ общества трезвости. Съ 1 января по 7 пьянствовалъ и на работу не ходилъ. 9-го былъ сильно пьянъ. Жаловался прежде на боль въ груди и подъ ложечкой и затрудненіе дыханія. Въ 12 часовъ ночи почувствовалъ себя дурно и черезъ четверть часа умеръ 10 янв. 1910.

Вскрытіе 15 янв. 1910. Небольшого роста, умѣреннаго сложенія и питанія. Сердце нѣсколько больше кулака покойнаго; подъ наружнымъ покровомъ обильное отложеніе жира; въ обѣихъ половинахъ содержится довольно много совершенно жидкой темной крови; толщина стѣнки лѣваго желудочка достигаетъ 1,5 сант., полость его явно расши-

Параличъ сердца, вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ, endoarteriitidis deform. chron. аорты и вѣнечныхъ сосудовъ сердца.

рена, сердечная мышца блѣдная; въ толщѣ стѣнки лѣваго желудочка найденъ рубецъ съ горошину; полулунныя заслонки аорты шероховаты, утолщены, сморщены; вся внутренняя поверхность аорты неровная, покрыта отчасти плоскими мозолистыми утолщеніями, отчасти мелкими известковыми бляшками; устья вѣнечныхъ артерій сужены въ высокой степени.

17. Сергѣй *Тихановскій*, 52 л., отставной кондитерскій помощникъ Высочайшаго Двора; найденъ мертвымъ въ постели 7 февр. 1900, вернулся домой наканунѣ пьянымъ. Всегда предавался сильному пьянству, былъ старчески слабъ и всегда жаловался на боль въ груди и страдалъ сильной безсонницей.

Вскрытіе 9 февр. 1900. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Ступни отечны. Сердце значительно увеличено въ размѣрѣ; на передней поверхности его находятся большія отложенія жира; всѣ полости его переполнены кровью, причемъ въ правой половинѣ находится совершенно жидкая кровь, а въ лѣвой съ рыхлыми объемистыми сгустками; стѣнки желудочковъ утолщены болѣе, чѣмъ втрое, мышца ихъ блѣдно-краснаго цвѣта съ ясно желтымъ оттѣнкомъ, довольно плотная; двустворчатый клапанъ утолщенъ и мутенъ; клапаны аорты не спадаются, утолщены и заключаютъ въ себѣ плотныя известковыя бляшки; устья вѣнечныхъ артерій расширены; внутренняя оболочка аорты надъ ними шероховата и бугриста. Сосуды основанія мозга склерозированы.

18. Иванъ *Мишановъ*, 41 г., крест., сапожникъ. Скоропостижно умеръ 6 марта 1900. Велъ жизнь нетрезвую. Послѣднюю недѣлю не работалъ, все пилъ. Только наканунѣ смерти жаловался на боль въ груди.

Вскрытіе 4 марта 1900. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце значительно увеличено; полости его переполнены темною кровью съ красными и бѣлыми сгустками; стѣнка праваго желудочка истончена, а лѣваго утолщена; мышца ихъ блѣдно-краснаго цвѣта съ сильно желтоватымъ оттѣнкомъ; двустворчатый клапанъ утолщенъ, мутенъ и замѣтно сморщенъ; на внутренней оболочкѣ аорты находятся мелкія поверхностныя бѣлыя бляшки. Почки нѣсколько уменьшены въ объемѣ, плотны, имѣютъ сальный видъ, значительное развитіе корковаго вещества. Стѣнки сосудовъ основанія мозга утолщены, мутно-бѣлаго цвѣта.

19. Степанъ *Каминкинъ*, 42 л., крест., фабричный. Скоропостижно умеръ 10 окт. 1900, жалуясь на сильную боль въ груди. Пилъ сильно водку.

Вскрытіе 12 окт. 1900. Ниже средняго роста, средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира снаружи; всѣ его полости переполнены темною кровью съ плотными сгустками, мышцы дряблы, буро-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, стѣнка праваго желудочка утолщена, лѣваго—истончена; двустворчатый клапанъ утолщенъ и слегка сморщенъ; на внутренней оболочкѣ аорты замѣтны мелкія, блѣдноватыя, плотныя бляшки. Почки нѣсколько уменьшены, корковый слой истонченъ, пирамиды стиснуты, ткань плотна, съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Сосуды основанія мозга склерозированы.

20. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, 35 л., чернорабочій. Поднятъ 17 окт. 1900, на улицѣ пьянымъ въ безсознательномъ состояніи, по доставленіи въ часть умеръ.

Вскрытіе 22 окт. 1900. Роста ниже средняго, средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце 13×13 снт., съ большими отложеніями жира спереди; всѣ полости, особенно правыя, переполнены кровью со сгустками, мышцы дряблы съ желтоватымъ оттѣнкомъ; стѣнки желудочковъ утолщены; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сильно сморщенъ; на внутренней оболочкѣ аорты

находится множество плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ. Верхушки легкихъ уплотнены, плохо проходимы для воздуха, въ разрѣзахъ заключаютъ бѣловато-сѣроватые узелки. Почки увеличены, ткань почти желтаго цвѣта.

21. Прасковья *Халина*, 36 л., прачка. Жизнь вела трезвую, на болѣзни не жаловалась. 17 нояб. 1900, возвратившись съ работы, легла спать, черезъ часъ стала жаловаться, что ей нечѣмъ дышать; отправлена въ пріемный покой, гдѣ вскорѣ умерла.

Вскрытіе 22 нояб. 1900. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Большія и малыя срамныя губы замѣтно набухли и какъ бы отечны. Сосуды основанія мозга склерозированы. Въ желудкѣ находится около 700 кб. снт. пищевой смѣси. Сердце 15×15 снт., съ большими отложеніями жира спереди; всѣ полости заключаютъ большое количество жидкой темной крови, стѣнка праваго желудочка толщиною въ 0,2 снт., а лѣваго въ 2 снт., мышцы блѣдно-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно плотны; двустворчатый клапанъ значительно утолщенъ и сморщенъ, мутно-бѣлаго цвѣта, папиллярныя мышцы сильно утолщены и плотны; клапаны аорты слегка утолщены и мутны; внутренняя оболочка аорты слегка бугриста и заключаетъ мелкія бѣловатыя плотныя бляшки. Легкія эмфизематозны. Почки уменьшены, корковый слой утолщенъ, пирамиды укорочены.

22. Василій *Красновъ*, 27 л., крест., столяръ. Постоянно злоупотреблялъ спиртными напитками. Послѣдніе два дня не работалъ и пьянствовалъ, 21 нояб. 1900 почувствовалъ себя худо и, доставленный въ безсознательномъ состояніи въ больницу, умеръ. Постоянно кашлялъ и жаловался на боль въ груди.

Вскрытіе 27 нояб. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце значительно увеличено, 14×14 снт., съ значительными отложеніями жира снаружи; на передней поверхности имѣются бѣловатыя плотныя бляшки; толщина стѣнки праваго желудочка 1,2 снт., лѣваго—2 снт.; всѣ его полости переполнены кровью съ плотными сгустками; мышца буро-краснаго цвѣта съ желтымъ оттѣнкомъ, довольно плотная; двустворчатый клапанъ утолщенъ и укороченъ; трехстворчатый нѣсколько сморщенъ и утолщенъ, бѣловатаго цвѣта; на внутренней оболочкѣ аорты замѣтны мелкія бѣловатыя фиброзныя бляшки. Въ правомъ легкомъ замѣчаются полости величиною съ лѣсной орѣхъ съ гладкими стѣнками, выполненныя гноевидной жидкостью, въ окружности этихъ полостей ткань легкихъ уплотнена.

23. Домна *Нестерова*, 40 л., крест. Скоропостижно умерла 27 нояб. 1900, больна годъ параличемъ, происшедшимъ послѣ бани,—ходила все время лечиться въ больницу.

Вскрытіе 2 дек. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, хорошаго питанія. Весь трупъ сильно вздутъ гнилостными газами и представляетъ т. наз. «гигантскій видъ». Сердце увеличено въ объемѣ, съ большимъ отложеніемъ жира спереди; всѣ его полости пусты и вздуты газами; стѣнки желудочковъ истончены; мышцы ихъ дряблы, сѣро-желтоватаго цвѣта; клапаны аорты утолщены и на свободныхъ краяхъ сморщены, внутренняя оболочка аорты бугриста и покрыта множествомъ красноватыхъ и возвышающихся язвенныхъ поверхностей, а также бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ; такія измѣненія распространяются и на грудную аорту; отверстія вѣнечныхъ артерій значительно сужены.

24. Вѣра *Яковлева*, 29 л., мѣщ., прислуга, 2 дек. 1900 въ безчувственно-пьяномъ видѣ отправлена была съ конки въ пріемный покой, по дорогѣ умерла. Послѣднее время вела нетрезвую жизнь.

Вскрытіе 8 дек. 1900. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Содержимое желудка пахнетъ спиртомъ. Сердце 13×13½ снт., съ большими отложеніями жира спереди; всѣ его полости, въ особен-

ности правыи, переполнена темною кровью съ рыхлыми сгусткаи; стѣнка праваго желудочка 0,3 снт., лѣваго—2 снт.; мышцы ихъ бѣдно-краснаго цвѣта съ сѣро-желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно плотныя; двустворчатый клапанъ утолщенъ и мутенъ; клапаны аорты утолщены, сморщены и мутны; внутренняя оболочка аорты бугриста, шероховата и покрыта множествомъ неправильныхъ рубцовъ и бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ; отверстія вѣнечныхъ артерій совершенно закрыты.

25. Александръ *Ураевъ*, 57 л., мѣщ., 6 дек. 1900 ушелъ на почту и минутъ черезъ 5 умеръ. Передъ смертью и ранѣе жаловался на боль въ груди и стѣсненіе дыханіи.

Вскрытіе 9 дек. 1900. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце 14×13 снт. съ большимъ отложеніемъ жира спереди; правая половина и лѣвое предсердіе переполнены кровью съ рыхлыми сгусткаи, стѣнка лѣваго желудочка—1,2 снт., а праваго—0,7 снт.; мышцы ихъ дряблы, сѣро-краснаго цвѣта съ ясно-желтымъ оттѣнкомъ; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ; клапаны аорты слегка утолщены и мутны; на внутренней оболочкѣ аорты значительное количество мелкихъ бѣловатыхъ плотныхъ фиброзныхъ бляшекъ. Ткань почекъ плотна, корковый слой утолщенъ.

26. Василиса *Павлова*, 45 л., кресть., 8 дек. 1900 найдена мертвой на полу. Страдала одышкой и сердцебіеніемъ, образъ жизни вела трезвый и тихій.

Вскрытіе 13 дек. 1900. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Сердце 15×14 снт.; спереди большое отложеніе жира; правая половина и лѣвое предсердіе переполнены темною кровью съ весьма рыхлыми сгусткаи; толщина лѣваго желудочка 1,4 снт., праваго—0,4; мышцы ихъ буро-краснаго цвѣта съ желтымъ оттѣнкомъ, довольно дряблы; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ; клапаны аорты сморщены и покрыты бѣловатыми рубцаи; внутренняя оболочка аорты шероховата, бугриста, покрыта множествомъ бѣловатыхъ рубцовъ и объемистыхъ плотныхъ бляшекъ. Отверстія вѣнечныхъ артерій сильно сужены, сами онѣ нѣсколько уплотнены.

27. Акулина *Карпова*, 60 л., мѣщ. Опредѣленнаго мѣста жительства не имѣла, вела крайне нетрезвую жизнь. 12 дек. 1900 найдена на огородѣ мертвой.

Вскрытіе 15 дек. 1900. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія и питанія. Сосуды основанія мозга уплотнены, мутно-бѣловатаго цвѣта. Отъ мозга, содержимаго желудка и грудной полости чувствуется сильный запахъ спирта. Сердце 11 × 12 снт., съ большимъ отложеніемъ жира спереди, всѣ его полости переполнены темною кровью съ рыхлыми сгусткаи; стѣнки желудочковъ нормальной толщины, мышцы ихъ желтаго цвѣта, довольно плотны; двустворчатый клапанъ утолщенъ и неплотно сомкнутъ, трехстворчатый также утолщенъ и мутно-бѣлаго цвѣта; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами объемистыя бѣловатыя плотныя бляшки. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, ткань зерниста, желтоватаго цвѣта, съ сальнымъ блескомъ.

28. Василій *Иванов*, 47 л., кресть., послѣ обѣда легъ отдохнуть и черезъ нѣсколько минутъ услышали храпѣніе; подойдя увидѣли лежащимъ безъ признаковъ жизни.

Вскрытіе 29 янв. 1901. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, слабаго питанія. Нижніе конечности отечны.

Въ полости желудка находится 900 к. с. пищевой смѣси, имѣющей запахъ спирта. Сердце значительно увеличено, съ значительнымъ отложеніемъ жира спереди; правая его половина переполнена темной жидкой кровью съ рыхлыми сгусткаи, а лѣвая заключаетъ небольшое количество плотныхъ сгустковъ; мышца сердца бѣдно-краснаго цвѣта, дряблa, съ яснымъ желтымъ оттѣнкомъ; стѣнки желудочковъ утолщены; двустворчатый клапанъ утолщенъ, мутно-бѣловатаго цвѣта, слегка сморщенъ, съ отложеніемъ на немъ плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ; клапаны аорты значительно и измѣнены, сморщены и сращены другъ съ другомъ, утолщены, на нихъ находится отложеніе весьма плотныхъ известковыхъ бляшекъ; внутренняя поверхность дуги аорты бугриста, истончена, на ней попеременно находятся отложенія известковыхъ и фиброзныхъ бляшекъ. Почки увеличены, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой утолщенъ, желтоватаго цвѣта; ткань довольно плотна. Стѣнки сосудовъ основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта.

29. Никита *Григорьев*, 52 л., мѣщ. Найденъ мертвымъ въ постели 2 фев. 1901. Ни на что никогда не жаловался.

Вскрытіе 5 фев. 1901. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, плохого питанія. Лицо ассиметрично, правая сторона носа и лѣвая

бѣловатыхъ блестящихъ бляшекъ; всѣ его полости переполнены кровью съ плотными сгустками; стѣнка праваго желудочка толщиной 0,8 стн., стѣнка лѣваго—1,5 стн., мышцы ихъ буро-краснаго цвѣта, довольно дряблы, съ ясно выраженными тонкими желтоватыми полосками въ разрѣзахъ; трехстворчатый клапанъ мутно-бѣловатаго цвѣта со множествомъ плотныхъ бѣлыхъ узловъ; двустворчатый клапанъ утолщенъ и значительно сморщенъ; клапаны аорты утолщены и мутны; на внутренней оболочкѣ аорты довольно значительное количество плотныхъ и известковыхъ бляшекъ. Корковый слой почекъ истонченъ, пирамидки укорочены, ткань блѣдно-краснаго цвѣта съ сальнымъ блескомъ, довольно плотна, въ корковомъ веществѣ находится нѣсколько—до 5 кистовидныхъ расширеній отъ горошины до лѣсного орѣха, наполненныхъ желтоватой прозрачной жидкостью. Сосуды основанія мозга склерозированы.

32. Яковъ *Матвѣевъ* 54 л., крест., рабочій на заводѣ. Въ послѣднее время не пилъ, въ молодыхъ лѣтахъ пилъ. Жаловался на боль въ груди. Скоропостижно умеръ 15 окт. 1901.

Вскрытіе 17 окт. 1901. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 13×12 стн.; въ лѣвой половинѣ его находится незначительное количество крови съ рыхлыми сгустками, правое предсердіе переполнено такою же кровью, въ правомъ желудочкѣ—умѣренное количество; значительное отложеніе жира спереди; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,2 стн., праваго немного менѣе 0,2; мышца сердца блѣдно-красная съ яснымъ желтымъ оттѣнкомъ, дряблая; двустворчатый клапанъ утолщенъ и слегка сморщенъ; на внутренней оболочкѣ аорты и на клапанахъ ея бѣловатыя плотныя бляшки съ известковыми отложеніями. Легкія эмфизематозны. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, желтоватаго цвѣта, пирамидки укорочены.

33. Михаилъ *Голышкинъ*, 52 л., крест. Задержанный за нищенство, 29 окт. 1901, почувствовалъ себя худо, отправленный въ лазаретъ вскорѣ умеръ, не приходя въ сознаніе. Страдалъ сильной слабостью и кашлялъ; лежалъ въ больницѣ съ хроническимъ воспаленіемъ почекъ.

Вскрытіе 1 нояб. 1901. Средняго роста, средняго тѣлосложенія, крайне истощенъ. Лицо блѣдное, слегка отечное. Голени и стопы отечны; на тылѣ стопъ и пальцевъ находится множество темно-фіолетовыхъ пятнышекъ отъ булавочной головки до горошины; по разрѣзѣ кожи на мѣстѣ ихъ оказались поверхностныя подкожныя кровоизліянія. Въ полости брюшины небольшое количество желтоватой, прозрачной водянистой жидкости. Въ полостяхъ плевры, не смотря на срощеніе легкихъ, находится большое количество прозрачной водяночной жидкости. Сердце $13^1/_2 \times 14 \times 7^1/_2$ стн.; снаружи множество бѣловатыхъ объемистыхъ бляшекъ, особенно, по направленію сосудовъ; всѣ полости сердца, особенно, правыя, переполнены блѣдною кровью съ плотными бѣлыми и темно-красными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2 стн., праваго—1 стн., мышцы ихъ блѣдно-буро-краснаго цвѣта съ ясными красноватыми прослойками, довольно плотны; внутрисердечная оболочка мутно-бѣловатаго цвѣта съ большимъ количествомъ объемистыхъ бѣлыхъ бляшекъ; двустворчатый клапанъ укороченъ, сморщенъ и утолщенъ, клапаны аорты также сморщены и утолщены; внутренняя оболочка аорты морщиниста, бугриста, съ большимъ количествомъ плотныхъ фиброзныхъ и известковыхъ бляшекъ; отверстія вѣнечныхъ артерій сильно сужены. Нижняя доля праваго легкаго уплотнена и непроходима для воздуха; лѣвое легкое эмфизематозно. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, пирамидки стиснуты и укорочены, ткань плотна, желтовата, съ сальнымъ блескомъ. Стѣнки сосудовъ основанія мозга склерозированы.

34. Федоръ *Астафьевъ* 60 л., мѣщ. Жилъ на пенсіи около 9 лѣтъ,

раньше былъ поваромъ; иногда жаловался на боль въ груди, а послѣднее время на ноги. Сидя въ магазинѣ, вдругъ сталъ захлебываться и моментально умеръ 22 нояб. 1901.

Вскрытіе 24 нояб. 1901. Выше средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце $13^1/_2 \times 13^1/_2$ стн., снаружи обложено значительнымъ количествомъ жира, правая половина его и лѣвое предсердіе наполнены кровью съ довольно плотными сгустками; стѣнка лѣваго желудочка 1,5 стн. толщины, праваго—около 0,2; мышцы ихъ темно-краснаго цвѣта съ желтоватыми прослойками, дряблы; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ, на немъ множество бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ, на свободномъ краѣ достигающихъ известковой плотности; клапаны аорты утолщены, мутно-бѣловатаго цвѣта; внутренняя оболочка аорты слегка шероховата; стѣнки вѣнечныхъ артерій сердца утолщены и уплотнены, не спадаются. Въ желудкѣ около 500 к. с. пищевой смѣси.

35. Марія *Жукова*, 36 л., мѣщ., прачка. Скоропостижно умерла 24 нбр. 1901. Жизнь вела трезвую, жаловалась на боль въ ногахъ.

Вскрытіе 27 нбр. 1901. Высокаго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце значительно увеличено, сильно обложено жиромъ; во всѣхъ полостяхъ сердца имѣется темная со сгустками кровь; правый желудочекъ растянутъ, толщина его 0,15 снт., у верхушки почти отсутствуетъ мышечный слой и преобладаетъ явно жировой слой; мускулатура лѣваго желудочка толщиною 0,9 снт., желтовата; на краю двухстворчатаго клапана умѣренное сморщиваніе и жесткая бородавчатость; одна изъ вѣнечныхъ артерій рѣзко сужена плотной бѣловатой бляшкой на протяженіи 1,0 снт.; въ грудной аортѣ много жидкой темной со сгустками крови. Содержимое желудка имѣетъ рѣзко спиртный запахъ.

36. Неизвѣстнаго званія *женщина*, 30 л., 28 нбр. 1901 поднята на улицѣ пьяной и въ безсознательномъ состояніи по дорогѣ въ пріемный покой умерла.

Вскрытіе 29 нбр. 1901. Роста выше средняго, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Сердце 12×13 снт., обложенное спереди значительнымъ слоемъ жира; всѣ его полости переполнены темной, жидкой кровью съ рыхлыми сгустками; толщина праваго желудочка 0,4 снт., лѣваго—2 снт.; двустворчатый клапанъ на свободныхъ краяхъ утолщенъ и слегка сморщенъ; на внутренней поверхности аорты надъ клапанами незначительная шероховатость отъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ; отверстія вѣнечныхъ артерій довольно узки, но стѣнки ихъ безъ измѣненій. Отъ содержимаго желудка, сердца, легкихъ и отъ крови сердца чувствуется запахъ спирта.

37. Филатъ *Царьковъ*, 55 л., крест., чернораб. Ничѣмъ почти не занимался и постоянно предавался пьянству; послѣдній мѣсяцъ не пилъ. 5 дек. 1901 былъ въ банѣ, гдѣ $1^1/_2$ часа мылся самъ и стиралъ бѣлье; одѣвшись, почувствовалъ себя дурно, потерялъ сознаніе и по дорогѣ въ пріемный покой умеръ.

Вскрытіе 8 дек. 1901. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сосуды основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта, но стѣнки ихъ эластичны. Сердце 12×12 снт., правая его половина переполнена темной жидкой кровью, въ лѣвой—крови немного; толщина стѣнки лѣваго желудочка—1,7 снт.. праваго—0,5 снт.; мышцы ихъ буро-красныя съ желтоватыми прослойками; дву- и трехстворчатый клапаны утолщены и сморщены; на первомъ находятся бѣловатыя плотныя бляшки; клапаны аорты также утолщены и сморщены, не спадаются; внутренняя оболочка аорты шероховата и покрыта множествомъ бѣловатыхъ бляшекъ. Почки уменьшены, слои истончены.

38. Ѳеоктистъ *Кашицынъ*, 28 л., крест., рабочій на волосяной фабрикѣ.

Былъ слабъ здоровьемъ, 17 янв. почувствовалъ себя больнымъ, 18-го полдня проработалъ, жалуясь, что у него болитъ голова и животъ. Отправленный 20 янв. 1902 въ больницу, тамъ умеръ.

Вскрытіе 25 янв. 1902. Выше средняго роста, средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Въ полости брюшины находится около 200 к. с. желтовато-красноватой, почти прозрачной жидкости. Брыжжеечныя железы увеличены до лѣсного орѣха, а нѣкоторыя даже до величины малаго грецкаго; ткань ихъ мягка, темнокрасна; въ центральныхъ частяхъ замѣтенъ рыхлый распадъ железистой ткани; какъ въ толщѣ самихъ железъ, такъ и въ окружности клѣтчатки между листками брыжжейки находится обширное кровоизліяніе изъ темной жидкой крови. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, снаружи покрыто большимъ отложеніемъ жира, правая его половина переполнена темною кровью съ рыхлыми сгустками, а въ лѣвой—крови немного; стѣнки желудочковъ утолщены вдвое, мышцы ихъ буро-красно-желтоваты, довольно дряблы; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ, мутно-бѣловатаго цвѣта; утолщены также клапаны аорты; отверстія вѣнечныхъ артерій сужены и вокругъ нихъ на оболочкѣ аорты находятся мелкія плотныя бѣловатыя бляшки. Бронхіальныя железы сильно увеличены, уплотнены, темно-красны; въ центральныхъ частяхъ представляютъ темно-красный распадъ. Солитарныя железы въ подвздошной кишкѣ увеличены до просяного зерна; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ находятся поперечныя язвенныя поверхности темно-краснаго цвѣта, расположенныя на уплотненной, увеличенной железистой ткани, которая также темно-краснаго цвѣта и въ центральныхъ частяхъ представляетъ сѣроватый распадъ. Слизистая оболочка толстыхъ кишекъ красновата, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ солитарныя железки увеличены до чечевичнаго зерна, темно-красны, въ разрѣзахъ мягки и съ кровоизліяніями.

39. Дарья *Андріянова*, 60 л., крест., торговала въ разносъ платьемъ, полотномъ и т. п.; образъ жизни вела крайне нетрезвый, пьянствовала года 3, ежедневно напиваясь до безпамятства. Пришла вечеромъ сильно пьяная, принесла съ собою 2 сороковки, которыя потихоньку и выпила, поужинала и легла спать, на утро найдена мертвой 23 янв. 1902.

Вскрытіе 25 янв. 1902. Средняго роста, сложенія и питанія. Сердце прирощено къ сердечной сорочкѣ сплошными, но очень нѣжными старыми перепонками, такъ что полости вовсе не существуетъ; сердце увеличено, во всѣхъ полостяхъ его содержится много жидкой съ немногими сгустками крови; толщина стѣнки праваго желудочка 0,15—0,20 снт.; мышца ясно желтовата, значительно пророщена жиромъ, дряблая; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,3—1,4 снт., мышца плотна, даже жестковата, въ стѣнкѣ есть бѣловатыя прослойки; двустворчатый клапанъ по краю значительно сморщенъ, утолщенъ въ видѣ жесткихъ узловъ; вѣнечныя артеріи рѣзко зіяютъ, мѣстами сужены; внутренняя оболочка надъ клапанами жестковата съ бляшками. Корковый слой почекъ мѣстами истонченъ рѣзко, пирамидки уплощены и жестковаты.

40. Анна *Хализова*, 75 л., мѣщанка. Не имѣла опредѣленныхъ занятій и нищенствовала, жила у своего племянника. Часто жаловалась на боль въ груди. Вернувшись изъ бани 25 февр. стала жаловаться на сильную боль въ груди и легла въ постель не раздѣваясь; на улицу не выходила, ничего не ѣла и не пила; ночью найдена свалившейся съ кровати и мертвой 27 февр. 1902.

Вскрытіе 3 марта 1092. Небольшого роста, слабаго тѣлосложенія, достаточнаго питанія. Нижняя часть голеней и ступни отечны. Сердце значительно увеличено съ обильными отложеніями жира на поверхности; обѣ половины переполнены кровяными и обезцвѣченными свертками; мышца рѣзко желтоватая и дряблая; полость лѣваго желудочка нѣсколько расширена; двустворчатый клапанъ сердца утолщенъ

и сморщенъ; полулунныя заслонки аорты также сморщены и утолщены, у основанія ихъ прощупываются известковыя отложенія; устья вѣнечныхъ артерій сужены. Корковый слой почекъ тонокъ, пирамидки низки.

41. Федоръ *Соловьевъ*, 35 л., крест., печникъ. Предавался пьянству. Напившись чаю, собирался уходить, вдругъ почувствовалъ себя дурно, упалъ и вслѣдъ за этимъ умеръ 28 марта 1902.

Вскрытіе 30 марта 1902. Средняго роста, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Мочевой пузырь переполненъ, дно его на ладонь выше лонныхъ костей. Въ обѣихъ половинахъ сердца находится темная жидкая кровь съ небольшою примѣсью свертковъ; мышца блѣдная и дряблая; полулунныя заслонки аорты слегка утолщены, морщинисты; внутренняя поверхность ея покрыта бугристыми, какъ бы изъѣденными фиброзными утолщеніями, которыя въ высокой степени суживаютъ устье вѣнечныхъ артерій. Въ верхушкѣ праваго легкаго небольшое рубцевое уплотненіе и сморщиваніе ткани.

42. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, 50 л., поднятъ на кладбищѣ.

Вскрытіе 12 окт. 1902. Роста средняго, тѣлосложенія умѣреннаго, плохого питанія. Голени и стопы отечны. Сердце 11 × 12,5 снт.; всѣ его полости переполнены темною жидкою кровью съ рыхлыми сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,4; дву- и трехстворчатый клапаны утолщены, слегка сморщены, мутно-бѣловатаго цвѣта; клапаны аорты также утолщены, съ плотными бѣловатыми бляшками; внутренняя оболочка аорты шероховата и бугриста, на ней множество плотныхъ объемистыхъ бѣловатыхъ бляшекъ. Ткань легкихъ эмфизематозна. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ; корковый слой утолщенъ, пирамиды укорочены, ткань значительно уплотнена.

43. Сергѣй *Павловъ*, 60 л., мѣщ., призрѣваемый богадѣльни. Въ парильной съ нимъ сдѣлалось худо, онъ легъ на полъ и тутъ же умеръ 17 окт. 1902.

Вскрытіе 23 окт. 1902. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 13 × 13 снт., съ большими отложеніями жира снаружи, всѣ его полости переполнены темною кровью съ рыхлымя сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,0 снт., а праваго—0,1 снт.; мышцы ихъ блѣднокрасны съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблы; клапаны аорты утолщены и не прилегаютъ къ стѣнкѣ ея, въ нихъ находятся твердыя объемистыя известковыя бляшки, внутренняя оболочка аорты слегка шероховата съ мелкими плотными бѣловатыми бляшками; отверстія вѣнечныхъ артерій нѣсколько сужены. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой утонченъ, пирамидки укорочены, лоханки расширены и заполнены жиромъ, ткань плотна.

44. Неизвѣстнаго званія *женщина*, 45 л., найдена мертвой въ мѣстности Стекляннаго завода 25 окт. 1902.

Вскрытіе 29 окт. 1902. Средняго роста и сложенія, хорошаго питанія. Изъ полости брюха исходитъ окисло-спиртный ясный запахъ. Сердце нѣсколько увеличено; во всѣхъ полостяхъ сердца много темной жидкой крови съ весьма рыхлыми сгустками; лѣвое венозное отверстіе съ трудомъ пропускаетъ концы двухъ пальцевъ; мускулатура съ замѣтно желтоватымъ оттѣнкомъ; стѣнка праваго желудочка мѣстами сплошь пророщена жиромъ; по краю двустворчатаго клапана, рѣзко сморщеннаго, имѣются узловатыя плотныя отложенія; верхушки сосочковыхъ мышцъ рѣзко блѣдны, сухожильнаго вида, тупы, плотны. При осмотрѣ клапановъ аорты замѣчается незначительное уплотненіе; устья вѣнечныхъ артерій сужены, стѣнки ихъ плотноваты. Почки увеличены въ объемѣ, границы слоевъ не замѣтны; верхушки пирамидокъ тупы. Отъ желудка и мозга исходитъ спиртный запахъ.

45. Павелъ *Прокофьевъ*, 41 г., крест., извозчикъ. Сильно пьянствовалъ. Скоропостижно умеръ 31 окт. 1902, жаловался на боль въ груди.

Вскрытіе 4 нбр. 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 13×14×5 снт., съ довольно значительнымъ отложеніемъ жира спереди; всѣ его полости переполнены кровью съ довольно плотными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,0 снт., праваго—0,6; мышцы блѣдно-красны съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, тусклы, дряблы; двустворчатый клапанъ утолщенъ, задняя его заслонка мутно-бѣловата; клапаны аорты также утолщены и сморщены; внутренняя оболочка аорты бугриста, шероховата и покрыта множествомъ объемистыхъ известковыхъ бляшекъ. Почки уменьшены въ объемѣ, капсулы ихъ снимаются съ большимъ трудомъ, ткань плотна, блѣдно-красна. Сосуды основанія мозга склерозированы.

46. Манеѳа *Еремѣева*, 43 л., крест., прачка. Ходила поденно гладить бѣлье и всегда жаловалась на боль въ груди; подъ утро 6 нбр. 1902 найдена лежавшею на полу въ безсознательномъ состояніи, по дорогѣ въ больницу умерла.

Вскрытіе 13 нбр. 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Голени и стопы отечны. Въ полости брюшины находится около литра красноватой водяночной жидкости. Въ плевральныхъ мѣшкахъ большое количество такой же водяночной жидкости. Сердце 12×12 снт.; въ полостяхъ его большое количество крови съ плотными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., а праваго—0,6; мышцы ихъ блѣднокрасны съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблы; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ, мутно-бѣловатаго цвѣта, заслонки его въ задней части сращены между собою; на внутренней оболочкѣ аорты небольшія бѣловатыя бляшки. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ; корковый и пирамидальный слой истончены, ткань темнокраснаго цвѣта, плотна.

47. Петръ *Вейдель*, 57 л., мѣщ., рабочій фабричный. Болѣлъ грудною жабою. 5 дек. 1902 доставленъ былъ въ пріемный покой съ синюхой лица, едва ощутимымъ пульсомъ, одышкой и отекомъ легкихъ; черезъ нѣсколько минутъ, не приходя въ сознаніе, умеръ.

Вскрытіе 9 дек. 1902. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Сердце 12×13×7 снт., обложено большимъ количествомъ жира; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,0 снт., праваго—0,5; мышца ихъ блѣдно-краснаго цвѣта съ рѣзкой желтизной, весьма дряблая; всѣ полости сердца, въ особенности правыя, переполнены темной жидкой кровью съ рыхлыми сгустками; дву- и трехстворчатый клапанъ, а также клапаны аорты утолщены и слегка сморщены; на внутренней оболочкѣ аорты довольно много бѣловатыхъ мелкихъ плотныхъ бляшекъ; отверстія вѣнечныхъ отверстій сужены, стѣнки ихъ уплотнены и утолщены. Почки уменьшены въ объемѣ; капсула ихъ снимается съ трудомъ, ткань довольно плотна. Сосуды основанія мозга склерозированы.

48. Егоръ *Новиковъ*, 38 л., крест., сапожникъ. Предавался сильному пьянству. Скоропостижно умеръ 10 дек. 1902.

Вскрытіе 13 дек. 1902. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце $12^1/_2$ × 13 × 6 снт., значительно обложено жиромъ; всѣ его полости сильно переполнены и растянуты кровью съ плотными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка—2,0 снт., праваго—0,4; мышцы ихъ блѣдно-краснаго цвѣта, съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблы; двустворчатый клапанъ, а также клапаны аорты утолщены и сморщены; внутренняя оболочка аорты шероховата и бугриста отъ присутствія на ней объемистыхъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ; отверстія вѣнечныхъ артерій крайне сужены и не пропускаютъ зонда. Капсула почекъ снимается съ большимъ трудомъ, въ правой

корковый и пирамидальный слой истончены, въ лѣвой—не различимы, блѣдно-красны.

49. Татьяна *Николаева*, 67 л., мѣщ. Торговала въ разносъ игрушками. 1 февр. 1904 поужинала и легла въ постель, появились судороги, колотье въ поясницѣ, вздохнувъ 2—3 раза, умерла. Раньше также страдала судорогами и параличемъ; жизнь вела трезвую, трудовую.

Вскрытіе 4 февр. 1903. Невысокаго роста, нѣжнаго сложенія, умѣреннаго питанія. Артеріи Виллизіева круга и вѣтви позвоночной артеріи мѣстами утолщены въ видѣ бляшекъ; вѣтви артерій Сильвіевой борозды мѣстами совершенно закрыты плотными желтоватыми бляшками, а въ правой артеріи кромѣ того имѣется небольшой вѣтвистый кровяной сгустокъ. Сердце значительно увеличено; во всѣхъ отдѣлахъ его имѣется жидкая кровь съ двуцвѣтными сгустками; лѣвое венозное кольцо пропускаетъ 3 пальца; мускулатура сердца плотнѣе нормальнаго, въ лѣвомъ желудочкѣ мѣстами видны сѣроватые участки болѣе плотные; по краю двустворчатаго клапана имѣются желтоватыя плотныя отложенія; двустворчатый клапанъ мѣстами меньшей противъ нормы ширины вслѣдствіе сморщиванія; въ вѣнечныхъ артеріяхъ внутренняя оболочка мѣстами утолщена. Поверхность корковаго вещества почекъ зерниста и мѣстами углублена, мѣстами истончена до 0,2 снт.; пирамидки туповаты, высота ихъ уменьшена.

50. Николай *Мургинъ* 54 л., крест. Жалуется на общую слабость и одышку; боленъ около двухъ мѣсяцевъ; одышка и ціанозъ стали увеличиваться, развились явленія колляпса и черезъ $2^1/_2$ часа по прибытіи въ госпиталь умеръ 15 февр. 1903.

Вскрытіе 18 фев. 1903. Высокаго роста, средняго сложенія, очень истощенный. Во всѣхъ полостяхъ сердца, наружная поверхность котораго припаяна на всемъ протяженіи старыми перепонками къ пристѣночнымъ листкамъ, имѣются въ изобиліи двуцвѣтные сгустки крови; сердце значительно увеличено; лѣвое венозное кольцо пропускаетъ 3 пальца; двустворчатый клапанъ по краямъ сморщенъ; мускулатура праваго желудочка, растянутаго, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, мѣстами истончена до 0,1—0,15 снт., мускулатура лѣваго—довольно дряблая съ желтизной, на разрѣзѣ видны полоски сѣроватой соединительной ткани; устья вѣнечныхъ артерій сужены бляшками, стволы ихъ расширены. Ткань легкихъ въ верхнихъ доляхъ жестка, бронхи всѣхъ порядковъ расширены и переходятъ въ извилистыя съ гладкими стѣнками полости съ сѣроватымъ распадомъ. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой мѣстами истонченъ, пирамидки туповаты, ткань плотнѣе нормальной, желтовата.

51. Петръ *Автономовъ*, 54 л., портной. Жизнь въ послѣднее время велъ трезвую. Придя домой 15 фев. 1903, сильно стоналъ и жаловался, что съ нимъ худо и сжимаетъ горло; легши на диванъ, черезъ $^1/_4$ часа умеръ.

Вскрытіе 19 фев. 1903. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено почти вдвое, обложено толстымъ слоемъ жира, въ полостяхъ его находится умѣренное количество крови со сгустками, толщина стѣнки лѣваго желудочка вдвое болѣе нормальнаго, праваго — 0,7 снт., мышцы ихъ тусклы, блѣднокрасны съ желтоватыми островками, довольно дряблы; двустворчатый клапанъ утолщенъ и слегка сморщенъ; клапаны аорты—также; внутренняя оболочка аорты бугриста, шероховата, темно-краснаго цвѣта, на ней множество бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ и язвенныхъ темно-красныхъ поверхностей; отверстія вѣнечныхъ артерій значительно сужены, стѣнки ихъ значительно утолщены и уплотнены до хрящевой плотности. Содержимое желудка съ бродильнымъ запахомъ. Почки уменьшены, корковый слой ихъ истонченъ, пирамидки укорочены, ткань плотна. Сосуды основанія мозга склерозированы.

52. Михаилъ *Наумовъ*, 33 л., мѣщ. Всегда былъ болѣзненный. Ранѣе злоупотреблялъ спиртными напитками, въ послѣднее время совершенно не пилъ, жаловался часто на боль груди. Утромъ 3 марта 1903 найденъ въ ночлежномъ домѣ мертвымъ.

Вскрытіе 6 марта 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 13 × 13 × 6 снт., обложено толстымъ слоемъ жира, всѣ его полости переполнены кровью съ довольно плотными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 0,5 снт., мышцы его блѣдно-красны съ рѣзкой желтизной, значительно уплотнены на ощупь; толщина праваго желудочка 0,8 снт., мышцы его въ такомъ же состояніи; внутрисердечная оболочка въ лѣвой половинѣ мѣстами мутнобѣловатаго цвѣта; двустворчатый клапанъ и клапаны аорты утолщены и слегка сморщены; внутренняя оболочка аорты бугриста, шероховата, покрыта множествомъ плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ; отверстія вѣнечныхъ артерій сужены до непроходимости, стѣнки ихъ утолщены и на внутренней поверхности ихъ имѣются плотныя бѣловатыя бляшки. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, сильно уплотнена. Сосуды основанія мозга утолщены, мутно-бѣловатаго цвѣта.

53. Алексѣй *Силинъ*, 47 л., крест., фабричный рабочій. Раньше велъ жизнь нетрезвую, около полгода не пьетъ. Играя на билліардѣ 15 февр. 1903 пошатнулся и упалъ, и черезъ нѣсколько минутъ умеръ.

Вскрытіе 19 фев. 1903. Средняго роста; хорошаго тѣлосложенія и питанія. Стѣнки сосудовъ основанія мозга склерозированы. Сердце увеличено почти вдвое, обложено толстымъ слоемъ жира; всѣ его полости за исключеніемъ лѣваго желудочка переполнены кровью съ плотными сгустками; стѣнки желудочковъ утолщены почти вдвое, мышцы ихъ блѣдно-красны съ желтизной, довольно плотны; двустворчатый клапанъ утолщенъ, мутно-бѣловатаго цвѣта и сморщенъ; клапаны аорты также утолщены и покрыты бѣловатыми бляшками; на внутренней оболочкѣ аорты довольно много бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ; отверстія вѣнечныхъ артерій замѣтно сужены и окружены бѣловатыми плотными бляшками, стѣнки ихъ уплотнены и утолщены.

54. Михаилъ *Тимофеевъ*, 45 л., ремесленникъ. Былъ боленъ отъ Пасхи; вечеромъ 13 мая 1903 ему сдѣлалось дурно, отправленный въ пріемный покой по дорогѣ умеръ.

Вскрытіе 16 мая 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, слабаго питанія. Нижнія конечности отечны. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, всѣ его полости переполнены кровью со сгустками; полости желудочковъ сильно расширены, стѣнки утолщены, мышцы блѣдно-красно-желтоватаго цвѣта, довольно дряблы; клапаны аорты утолщены и сморщены, шероховаты; на внутренней оболочкѣ аорты множество твердыхъ шероховатыхъ бляшекъ известковой плотности. Внутренняя оболочка подключичныхъ артерій и сонныхъ шероховата, бугриста, покрыта множествомъ плотныхъ бляшекъ. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, ткань плотна.

55. Матвѣй *Адамовъ*, 55 л., крест., легковой извозчикъ. 20 окт. 1903 въ трактирѣ, съѣвши селянку и напившись чаю, сталъ жаловаться, что онъ простудился и страдаетъ воспаленіемъ легкихъ, отчего сильно потѣетъ, откинулъ вдругъ голову и сталъ задыхаться и черезъ пять минутъ умеръ.

Вскрытіе 24 окт. 1903. Средняго роста и сложенія, хорошаго питанія. Сердце увеличено, всѣ полости его растянуты массой крови съ темными сгустками, мускулатура въ высшей степени дряблая съ желтоватымъ оттѣнкомъ; двустворчатый клапанъ по краямъ сильно сморщенъ; вѣнечные сосуды мѣстами сильно сужены жестковатыми бѣлыми бляшками, послѣднія также имѣются на внутренней оболочкѣ луковицы аорты. Въ желудкѣ имѣется около 700 к. с. пищевой смѣси. Печень глинистаго цвѣта, рѣжется съ хрустомъ. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, пирамидки туповаты.

56. Спиридонъ *Лозутовъ*, 55 л., мѣщ., легковой извозчикъ. Свои обязанности исполнялъ аккуратно, совершенно пьянымъ никогда не былъ, но къ спиртнымъ напиткамъ ежедневно пристрастіе имѣлъ. 27 окт. 1903 замѣтили его на козлахъ совершенно пьянымъ, по доставленіи въ часть оказался мертвымъ.

Вскрытіе 31 окт. 1903. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 13 × 13 × 6 снт., обложено снаружи толстымъ слоемъ жира; во всѣхъ его полостяхъ много темной жидкой крови, пахнущей спиртомъ; толщина лѣваго желудочка 2,0 снт., а праваго—0,6; мышцы ихъ дряблы, несократившіяся, красновато-коричневаго цвѣта; на двустворчатомъ клапанѣ находятся довольно плотныя объемистыя бѣловатыя бляшки; клапаны аорты утолщены и слегка сморщены; на внутренней поверхности аорты довольно много плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ. Въ желудкѣ найдено около 800 к. с. пищевой смѣси. Сосуды основанія мозга склерозированы.

57. Александра *Петрова*, 64 л., мѣщ., жена домовладѣльца. Постоянно жаловалась на одышку и головную боль, часто съ ней случались припадки. Найдена мертвой въ квартирѣ 28 окт. 1903.

Вскрытіе 1 ноября 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, снаружи обложено большимъ количествомъ жира, во всѣхъ его полостяхъ находится довольно много крови съ рыхлыми сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,0 снт., а праваго—0,5; мышцы ихъ блѣдно-красно-желтоватыя, дряблыя; двустворчатый клапанъ утолщенъ, укороченъ и сморщенъ; клапаны аорты также утолщены, мутно-бѣловатаго цвѣта; на внутренней оболочкѣ аорты множество бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Капсула почекъ снимается съ большимъ трудомъ, ткань блѣдно-красно-желтоватая, довольно плотная, корковый слой утолщенъ. Сосуды основанія мозга склерозированы.

58. Ефимъ *Андреевъ*, 45 л., крест. Сильно пьянствовалъ и велъ разгульную жизнь. Былъ вечеромъ 12 янв. 1904 въ чайной сильно пьянъ и вышелъ на улицу, гдѣ и найденъ былъ спустя два часа мертвымъ.

Вскрытіе 20 янв. 1904. Роста, сложенія и питанія средняго. Голени и стопы нѣсколько отечны. Изъ брюшной полости, содержимаго желудка, крови серца и мозга исходитъ спиртный запахъ. Сердце немного увеличено, во всѣхъ полостяхъ его содержится темная жидкая съ немногими темными сгустками кровь, но преимущество въ правой половинѣ; лѣвое венозное кольцо пропускаетъ 3 пальца; мускулатура стѣнки праваго желудочка съ желтизной, полость нѣсколько расширена; мускулатура лѣваго желудочка жестка, двустворчатый клапанъ по краю сморщенъ, въ видѣ плотноватыхъ узелковъ; одна изъ вѣнечныхъ артерій у устья сужена бляшкой. Въ желудкѣ около 700 к. с. пищевой смѣси. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, на выпуклой поверхности видны мелкія кисты, корковый слой мѣстами истонченъ до 0,3 снт., пирамидки туповаты, ткань плотновата.

59. Анна *Мочулина*, 64 л., мѣщ. Сильно пила, а за послѣдній мѣсяцъ и дни въ особенности. 6 фев. 1904 цѣлый день пила, не выходя изъ квартиры; въ состояніи сильнаго опьяненія, собираясь спать, сѣла на табуретъ, внезапно черезъ нѣсколько минутъ упала и вскорѣ умерла. Послѣднее время еле ходила отъ слабости.

Вскрытіе 11 фев. 1904. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія, весьма слабаго питанія. Сердце 11,5 × 12,5 × 6 снт., съ большимъ количествомъ жира снаружи; во всѣхъ полостяхъ находится весьма много темной жидкой крови, пахнущей спиртомъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,8 снт., праваго—0,5; мышцы ихъ блѣдно-красно-желтоваты,

драбзы; двустворчатый клапанъ и клапаны аорты утолщены и сморщены; на внутренней оболочкѣ аорты, въ особенности у отверстія вѣнечныхъ артерій бѣловатыя плотныя бляшки. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый и пирамидальный слой истончены, въ корковомъ слоѣ значительное количество кистозныхъ расширеній отъ просяного зерна до горошины; лоханки расширены и заполнены жировою тканью. Печень желто-глинистаго цвѣта. Сосуды основанія мозга склерозированы.

60. Василій *Иванов*, 50 л., мѣщ., столярь. Выписанный нѣсколько дней назадъ изъ больницы, 19 фев. 1904 почувствовалъ себя дурно и по пути въ больницу умеръ.

Вскрытіе 21 фев. 1904. Небольшого роста, слабаго тѣлосложенія и питанія. Печень, большой сальникъ и петли тонкихъ кишекъ сращены старыми перепонками съ брюшной стѣнкой, въ полости брюшины большое количество желтоватой прозрачной водянистой жидкости. Сердце 10,5×12 снт., утолщено, снаружи большое количество объемистыхъ бѣлокрасноватыхъ пятнышекъ (экстравазаты); всѣ полости переполнены кровью съ рыхлыми сгустками; стѣнка праваго желудочка утолщена, а листикъ отѣчкомъ, драбзы; трехстворчатый клапанъ утолщенъ и слегка сморщенъ; на внутренней оболочкѣ аорты небольшое количество мелкихъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Въ перешлакахъ легкихъ ткань заполненная гноевидными массами. Почки уменьшены, плотны, бѣлокистозно-желтоваты, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой истончень. Сосуды основанія мозга склерозированы.

61. Яковъ *Иванов*, 37 л., крест. кучеръ конки. Жизнь велъ трезвую, 2 недѣли назадъ съ нимъ былъ сердечный припадокъ ночью, минутъ сдѣлалось дурно и минутъ черезъ пять умеръ.

Вскрытіе 1 окт. 1904. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣренно питанія. Сердце 12×12,5×7,5 снт., сильно обложено спереди темной кровью со сгустками, лѣвая—почти пуста, за исключеніемъ передняго, гдѣ имѣется немного крови; толщина стѣнки лѣваго желудочка тамъ отѣчкомъ, мѣстами въ нихъ встрѣчаются плотные бѣловатые островки; клапаны аорты утолщены и сморщены, внутренняя оболочка аорты бугриста, шероховата, на всемъ пространствѣ покрыта множествомъ бѣловатыхъ бляшекъ известковой плотности, кромѣ того на ней находится множество бѣловатыхъ рубцовъ и красноватыхъ изъязвленныхъ поверхностей. Почки уменьшены, сморщены, капсула ихъ снимается съ трудомъ, слой утолщенъ; въ почечной ткани находится нѣсколько орѣха полостей, наполненныхъ мутно-желтоватой жидкостью. Стѣнки сосудовъ основанія мозга нѣсколько утолщены.

62. Константинъ *Земскій*, 37 л., крест., строгаль. Раньше жизнь велъ общество трезвости и спиртныхъ напитковъ не употреблялъ. Жалѣлъ, что у него болитъ въ груди и что только, какъ срокъ выйдетъ скучно. Тайно отъ хозяина употребилъ передъ чаемъ и обѣдомъ капли „Жюрнй Пенъ Экселерэ“. Ночью тяжело дышалъ, выпилъ предложенную бутылку молока, но послѣ этого его вырвало. Утромъ 13 окт. 1904 обнаруженъ былъ мертвымъ.

Вскрытіе 16 окт. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣренно

питаній. Сердце 13×14×5 снт., съ большимъ отложеніемъ спереди жира; всѣ его полости переполнены и растянуты кровью съ плотными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго — 0,4; мышцы ихъ бѣдно-красныя съ рѣзкими желтоватымъ отѣчкомъ, драбзы; клапаны аорты утолщены, мутно-бѣловатаго цвѣта, сморщены; на внутренней поверхности аорты большое количество плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ; отверстія вѣнечныхъ артерій сужены до непроходимости, сами они утолщены и извилисты. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, пирамиды укорочены, ткань плотна. Сосуды основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта.

63. Михаилъ *Тяпкинъ*, 40 л., крест., сапожникъ. Найденъ 17 окт. 1904 на полѣ близъ дачи мертвымъ.

Вскрытіе 19 окт. 1904. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Сердце 12×12,5 снт., обложено толстымъ слоемъ жира, всѣ его полости переполнены кровью съ плотными темно-красными жилистыми сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,0 снт., праваго—0,8; мышцы ихъ темно-краснаго цвѣта съ рѣзко-желтоватымъ отѣчкомъ, драбзы; сосочковыя мышцы плотныя, мутно-бѣловатаго цвѣта; двустворчатый клапанъ и клапаны аорты утолщены и слегка сморщены, на нихъ имѣются бѣловатыя плотныя бляшки; внутренняя оболочка аорты шероховата, бугриста, со множествомъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ; отверстія вѣнечныхъ артерій замѣтно сужены. Почки уменьшены, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой мѣстами истонченъ. Стѣнки сосудовъ основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта, утолщены.

64. Григорій *Заяцкевъ*, 49 л. 18 окт. 1904 былъ въ банѣ въ теченіе часа и скоропостижно умеръ тамъ.

Вскрытіе 22 окт. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, плохого питанія. Въ желудокъ 500 к. с. пищевой смѣси, объемъ желудка замѣтно увеличенъ. Сердце немного увеличено, мышечно обложено снаружи жиромъ, передняя вѣнечная артерія прощупывается въ видѣ плотнаго шнурка, полости сердца и аорты содержатъ нѣсколько капель жидкой крови, внутренній покровъ ихъ особенности въ области лѣваго предсердія окрашенъ въ темно-красный цвѣтъ, всюду просвѣчивающій, сердечная мышца дряблая, глинистаго цвѣта; заслонки аорты слегка сморщены, у основанія утолщены и покрыты известковыми отложеніями; внутренняя оболочка аорты темно-красная всѣдствіе пропитыванія; на вышеупомянутой передней вѣнечной артеріи найдены въ стѣнкахъ отложенія извести, значительно суживающія просвѣтъ сосуда. Почки замѣтно уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается, корка тонкая, пирамиды вязки, лоханки большія, ожирѣлыя.

65. Вениаминъ *Сахаровъ*, 55 л. Часто предавался запоямъ, запой продолжался недѣлю и болѣе съ перерывами въ мѣсяцъ и два. Послѣдній запой начался 21 окт. Ночью спалъ неспокойно, ложился нѣсколько разъ съ дивана на полъ, въ 7 час. утра разговаривалъ, разсуждалъ и часъ черезъ 5, когда стали его будить, былъ уже въ безсознательномъ состояніи, немного спустя умеръ 24 окт. 1904.

Вскрытіе 27 окт. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, достаточнаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, мускулистое, ясно увеличеное въ передне-заднемъ размѣрѣ; лѣвая половина содержитъ немного темно-жидкой крови, правая переполнена такою же кровью; стѣнка лѣваго желудочка толщиною до 1,5 снт., праваго—0,5; сердечная мышца темно-красная, при разрѣзѣ ея наступаютъ многочисленныя кровяныя капельки; заслонки аорты морщинисты, у основанія ихъ найдено крупное фиброзное утолщеніе съ отложеніемъ извести, величиною почти въ бобъ, обусловливающее неподатливость заслонокъ и частичное ихъ въ

просвѣтъ сосуда, по крайней мѣрѣ, на 0,5 снт.; внутренняя оболочка аорты усѣяна мелкими фиброзными утолщеніями: на протяженіи передней вѣнечной артеріи замѣчаются такія же утолщенія. Капсула почекъ трудно снимается, ткань плотновата, границы слоевъ не вездѣ ясныя, пирамидки низкія, лоханки довольно широкія и отчасти ожирѣвшія.

66. Карлъ *Нюлундъ*, 59 л., Финляндск. урожен., башмачникъ. 15 дек. 1906 легъ на кровать и черезъ нѣсколько минутъ замѣченъ былъ мертвымъ; былъ выпивши.

Вскрытіе 18 дек. 1906. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце значительно увеличено, очень дряблое, сильно обложено жиромъ; во всѣхъ его полостяхъ находится много темной, имѣющей лаковый видъ, крови съ рыхлыми сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты находится нѣсколько плотноватыхъ бѣловатыхъ бляшекъ; лѣвое атріовентрикулярное отверстіе сужено; въ толщѣ двустворчатаго клапана, особенно у его основанія прощупываются известковыя отложенія; клапаны аорты жестковаты, у ихъ основаній известковыя бляшки; на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій находятся бѣловатыя плотныя бляшки величиною до коноплянаго зерна; мышца сердца очень дряблая, тусклая, сѣровато-краснаго цвѣта съ глинистымъ оттѣнкомъ; мѣстами въ ней замѣтны болѣе свѣтлые желтоватые участки величиною до большой горошины; по мѣстамъ мышца проросла полосками жира. Капсула почекъ снимается съ нѣкоторымъ трудомъ, корковый слой нѣсколько утонченъ, плохо различимъ, лоханки сильно обложены жиромъ. Въ обѣихъ верхушкахъ легкихъ прощупываются плотные узлы, величиною въ яблоко, на разрѣзахъ выполненные желтоватыми творожистыми массами, окруженными соединительно-тканными капсулами. Сосуды основанія мозга склерозированы.

67. Петръ *Ярославцевъ*, 58 л., крест. Постоянно злоупотреблялъ спиртными напитками. Найденъ 14 дек. 1906 въ безсознательномъ состояніи на тротуарѣ, по дорогѣ въ часть умеръ.

Вскрытіе 19 дек. 1906. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце значительно увеличено, сильно обложено жиромъ, дрябловато; во всѣхъ его полостяхъ находится жидкая темная кровь; клапаны аорты уплотнены, мѣстами съ значительными отложеніями извести, устье аорты нѣсколько сужено, на внутренней оболочкѣ аорты нѣсколько плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ величиной до чечевичнаго зерна; мышца сердца буровата, тускла, дрябловата; вѣнечныя артеріи жестковаты и извиты. Содержимое желудка съ рѣзко-спиртнымъ запахомъ. Сосуды основанія мозга склерозированы. На плоскости разрѣза легкихъ торчатъ утолщенные бронхи, въ просвѣтѣ которыхъ находятся слизисто-гноевидныя массы. Ткань почекъ желто-краснаго цвѣта, плотновата, слои плохо различимы.

68. Прасковья *Прокина*, 39 л., крест. „Страдала чахоткой". 18 мар. 1907 въ безчувственномъ состояніи отправлена въ пріемный покой и по дорогѣ умерла.

Вскрытіе 28 мрт. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце довольно значительно увеличено, дрябловато; во всѣхъ его полостяхъ находится темная жидкая кровь; внутренняя оболочка аорты шероховата, вся покрыта различной величины плотными бѣловатыми бляшками; устье аорты нѣсколько сужено, клапаны ея утолщены, нѣсколько сморщены; устья вѣнечныхъ артерій сужены почти до полнаго уничтоженія просвѣта, съ трудомъ пропускаютъ самый тонкій зондъ; стѣнка лѣваго желудочка около 1,5 снт., а праваго — около 0,6 снт., мышца сердца очень дряблая, блѣднаго сѣровато-красноватаго цвѣта, съ глинистаго цвѣта островками. Сосуды основанія мозга жестковаты.

69. Марина *Иванова*, 60 л., крест., призрѣвалась въ богадѣльнѣ. Пришла вечеромъ въ гости къ сестрѣ, чтобы успокоиться послѣ непріятности, происшедшей между нею и дочерью. Проснувшись поутру почувствовала себя нехорошо, глаза были помутившись, и указывала рукою на грудь; лежа въ постели хрипѣла и ничего уже не говорила. Въ 5 часу 31 мар. 1907 умерла.

Вскрытіе 3 апр. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, дрябловато; полости его выполнены темною кровью съ рыхлыми темно-красными сгустками; клапаны аорты слегка утолщены и сморщены; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся плотновато-желтоватыя бляшки величиной съ горошину; мышца сердца буроватаго цвѣта, проросла полосками жира. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, ткань ихъ плотновата. Въ тонкихъ кишкахъ находится ленточная глиста. Сосуды основанія мозга склерозированы.

70. Василій *Маіоровъ*, 43 л., крест., заводскій рабочій. Жизнь велъ неразгульную, но выпивалъ водку. 17 нояб. 1907 внезапно упалъ въ корридорѣ и черезъ нѣсколько минутъ умеръ.

Вскрытіе 19 нояб. 1907. Роста немного выше средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце раза въ полтора больше кулака покойнаго, довольно сильно обложено жиромъ. дрябловато; во всѣхъ его полостяхъ находится много темной крови, съ обильными рыхлыми темно-красными сгустками и сѣроватыми студенистыми свертками; клапаны аорты нѣсколько утолщены, немного сращены своими концами, такъ что входъ въ аорту представляется нѣсколько суженнымъ; на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца сердца дрябловата, буроватаго цвѣта; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,4 снт., лѣваго—около 1,0. Сосуды основанія мозга склерозированы.

71. Алексѣй *Курдюмовъ*, 59 л., мѣщ. столяръ. Всегда пьянствовалъ, отчего часто болѣлъ и находился на излеченіи въ больницѣ. Внезапно во время работы упалъ и умеръ 21 нояб. 1907.

Вскрытіе 26 нояб. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце раза въ полтора больше кулака покойнаго, сильно обложено жиромъ, сосуды его переполнены темною кровью, во всѣхъ его полостяхъ находится много темной крови съ обильными сгустками; на двустворчатомъ клапанѣ замѣтны весьма плотныя бородавчатыя разращенія величиною до горошины; основаніе клапановъ аорты представляется довольно значительно утолщеннымъ и объизвествленнымъ, устье аорты слегка сужено; внутренняя оболочка покрыта бѣловатыми плотноватыми бляшками, величиною до чечевицы; вѣнечныя артеріи жестковаты; на внутренней ихъ оболочкѣ такія же бляшки величиною до коноплянаго зерна; мышца сердца блѣдно-мясного цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, на плоскости разрѣза замѣтны многочисленныя сѣроватыя пятна и полоски. Почки немного уменьшены, капсула ихъ снимается съ трудомъ, ткань почекъ плотновата, корковый слой ихъ слегка истонченъ, пирамидки темно-краснаго цвѣта. Сосуды основанія мозга склерозированы.

72. Ольга *Титова*, 58 л., крест., прислуга. Скоропостижно умерла отъ грудной жабы 2 дек. 1907.

Вскрытіе 4 дек. 1907. Средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце раза въ полтора больше кулака покойной; сильно обложено жиромъ, дряблое; всѣ его полости выполнены темною густою кровью; на двустворчатомъ клапанѣ имѣются бѣловатыя плотноватыя утолщенія величиною до горошины; устье аорты довольно сильно сужено; клапаны ея немного утолщены, особенно у основанія, нѣсколько сморщены; внутренняя оболочка аорты почти сплошь по-

крыта бѣловатыми, плотноватыми бляшками; вѣнечныя артеріи жестковаты, устья ихъ сужены почти до полнаго уничтоженія ихъ просвѣта; мышца сердца дрябловата, съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Сосуды основанія мозга склерозированы. Въ желчномъ пузырѣ находится много многогранныхъ камешковъ, величиной до небольшой горошины.

73. Неизвѣстнаго званія *женщина*, 40 л., 23 дек. 1907 поднята въ безсознательномъ состояніи и отправлена въ больницу, гдѣ не приходя въ сознаніе умерла.

Вскрытіе 27 дек. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце раза въ $1^1/_2$ больше кулака покойной, сильно обложено жиромъ; во всѣхъ его полостяхъ, но особенно въ правой половинѣ, находится темная жидкая кровь; лѣвое венозное отверстіе съ трудомъ пропускаетъ верхушки двухъ пальцевъ; двустворчатый клапанъ представляется утолщеннымъ, а по краямъ покрытъ плотноватыми бородавчатыми утолщеніями; на внутренней оболочкѣ аорты имѣются плотноватыя бѣловатыя бляшки величиной до чечевицы; мышца сердца буроватаго цвѣта, мѣстами на разрѣзѣ замѣтны сѣроватыя прослойки; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 1,5 снт., праваго — 0,5. Сосуды основанія мозга склерозированы. Печень сильно обезображена, съ значительными сильно втянутыми рубцами, ткань ея плотная, капсула ея утолщена.

74. Никаноръ *Савинъ*, 35 л., санитаръ Город. Изоляц. Дома. Много пилъ. Пришелъ 28 дек. 1907 сильно пьяный въ 1 ч. дня и тотчасъ завалился спать и не просыпаясь спалъ до 11 ч. вечера, когда началъ храпѣть и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 31 дек. 1907. Выше средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія и умѣреннаго питанія. Сердце раза въ $1^1/_2$ больше кулака покойнаго, сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находится много темной крови съ рыхлыми темно-красными сгустками; клапаны аорты нѣсколько сморщены, а устье ея немного сужено; внутренняя ея оболочка какъ бы изрыта, обильно покрыта бѣловатыми плотноватыми бляшками различной величины; устья вѣнечныхъ артерій сужены почти до полнаго уничтоженія ихъ просвѣта; мышца сердца дрябловата, имѣетъ пестрый видъ вслѣдствіе многочисленныхъ сѣроватыхъ пятенъ и полосъ, по мѣстамъ она проросла полосками жира. Въ желудкѣ около 500 с. с. жидкости съ запахомъ бродящаго тѣста. Сосуды основанія мозга жестковаты.

75. Василій *Ширяевъ*, на видъ 40 л., башмачникъ. 1 мар. 1908 упалъ на панели и потерялъ сознаніе, по дорогѣ умеръ.

Вскрытіе 5 мар. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено раза въ 2, сильно обложено жиромъ, дряблое, особенно у верхушки; во всѣхъ его полостяхъ много темной густой крови, съ рыхлыми сгустками; полость лѣваго желудочка расширена; толщина стѣнокъ праваго желудочка около 0,6 снт., лѣваго—около 1,0, у верхушки около 0,5; устье аорты нѣсколько сужено, основаніе полулунныхъ клапановъ утолщено; внутренняя оболочка аорты почти сплошь покрыта бѣловатыми бляшками; вѣнечныя артеріи жестки, устья ихъ сужены почти до полнаго уничтоженія просвѣта. Въ желудкѣ около литра пищевой смѣси. Сосуды основанія мозга жестковаты.

76. Николай *Щепотьевъ*, 32 л., крест. Скоропостижно умеръ въ Клин. В. Госп. 1 окт. 1908.

Вскрытіе 3 окт. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Голени и стопы сильно отечны. Брюшина, обѣ плевры и сердечная сорочка гладки, блестящи, но утолщены, непрозрачны. Въ брюшной полости находится около литра прозрачной желтоватой жидкости съ плавающими въ ней хлопьями фибрина; въ плевральныхъ полостяхъ по 800,0, въ околосердечной сорочкѣ около 100,0. Сердце увеличено

раза въ 2; во всѣхъ его полостяхъ много темно-красныхъ рыхлыхъ кровяныхъ сгустковъ и сѣровато-желтоватыхъ довольно плотныхъ фибринозныхъ свертковъ; мышца сѣровато-красноватаго цвѣта, по мѣстамъ на плоскости разрѣза замѣтны бѣловато-сѣроватыя плотныя бляшки; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 1,5 снт., праваго—около 0,5; полости ихъ нѣсколько расширены; клапаны аорты нѣсколько утолщены, сморщены, по мѣстамъ разрушены, мѣстами на нихъ замѣтны весьма значительныя бородавчатыя разращенія; на внутренней оболочкѣ аорты замѣтны бѣловатыя плотноватыя бляшки. Сосуды основанія мозга слегка извиты.

Параличъ сердца, вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ и ожирѣнія сердца.

77. Иванъ *Гуровъ*, 35 лѣтъ, крест., чернорабочій, пилъ запоемъ. 17 янв. 1900 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе 20 янв. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце значительно увеличено въ объемѣ; на всей его поверхности находится обильное отложеніе жира; правая половина переполнена темною кровью съ плотными сгустками, а также и лѣвое предсердіе, въ лѣвомъ желудочкѣ заключаются сгустки въ умѣренномъ количествѣ; стѣнки желудочковъ истончены, мышцы ихъ дряблы, блѣдно-краснаго цвѣта, съ яснымъ желтоватымъ оттѣнкомъ; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ. Почки уменьшены въ объемѣ, корковый слой значительно развитъ; пирамиды стиснуты и укорочены.

78. Антонъ *Гукъ*, 25 лѣтъ, крест., заводскій рабочій. 6 нояб. 1900 во время работы сдѣлалось дурно; доставленный въ безсознательномъ состояніи въ больницу умеръ.

Вскрытіе 16 нояб. 1900. Высокаго роста, слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 12 × 11 снт., съ большими отложеніями жира спереди; во всѣхъ полостяхъ большое количество темной крови со сгустками; толщина лѣваго желудочка 1,4 снт., праваго — 0,6 снт.; мышцы ихъ буро-краснаго цвѣта, дряблыя; дву- и трехстворчатый клапаны утолщены, слегка сморщены. Въ верхушкахъ легкихъ замѣтны мелкіе сѣроватые и бѣловатые узелки, плотные. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, ткань плотна, блѣдно-краснаго цвѣта, съ яснымъ желтымъ оттѣнкомъ.

79. Николай *Логиновъ*, 38 лѣтъ, мѣщ., 13 мар. 1901 поднятъ на улицѣ и по доставленіи въ пріемный покой умеръ.

Вскрытіе 16 мар. 1901. Высокаго роста, правильнаго тѣлосложенія, средняго питанія. Сердце обильно обложено жиромъ, увеличено; во всѣхъ полостяхъ его въ изобиліи содержится темно-жидкая съ немногими крайне рыхлыми сгустками кровь; мускулатура стѣнокъ праваго желудочка съ желтоватымъ оттѣнкомъ; лѣвое венозное кольцо свободно пропускаетъ три пальца; верхушки папиллярныхъ мышцъ укорочены; эндокардій ихъ мутный; по краю двустворчатаго клапана имѣются желтоватаго цвѣта утолщенія. Слизистая оболочка слѣпой кишки и восходящей сѣро-аспиднаго цвѣта; на ней имѣются двѣ язвы; одна поперечно расположена съ подрытыми краями, другая, почти зажившая—въ видѣ лучистаго буроватаго рубца.

80. Александръ *Ивановъ*, 35 лѣтъ, мѣщ., не имѣвшій опредѣленныхъ занятій и мѣстожительства, поднятъ 27 сент. 1901 въ корридорѣ чайной въ безсознательномъ состояніи, отправленный въ больницу, черезъ нѣсколько часовъ умеръ.

Вскрытіе 3 окт. 1901. Выше средняго роста, средняго тѣлосложенія,

въ крайней степени истощенъ. Голени и стопы отечны. Въ полости брюшины находится громадное количество желтоватой водянистой жидкости такъ, что кишки въ ней плаваютъ. Сердце 12 × 12 снт., всѣ его полости, особенно правыя, переполнены кровью съ плотными красными и бѣлыми сгустками, снаружи большое отложеніе жира; стѣнка лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,7 снт., мышцы ихъ буро-краснаго цвѣта съ желтымъ оттѣнкомъ; двустворчатый клапанъ утолщенъ, сморщенъ и укорченъ. Правая верхушка легкаго уплотнена, грязно-сіроватаго цвѣта и заключаетъ нѣсколько полостей отъ боба до лѣсного орѣха, заполненныхъ грязно-краснова тымъ распадомъ. Почки желтоватаго цвѣта. Селезенка 1,5 снт., мякоть ея нетрезвую, напивалась до безпамятства. Утромъ 5 сент. 1901 пила водку, а потомъ все время спала, вечеромъ умерла.

Вскрытіе 8 окт. 1901. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія, удовлетворительно питанія. Стѣнки сосудовъ основанія мозга склерозированы. Содержимое желудка кислое, запахъ спиртомъ. Сердце увеличено, съ значительнымъ отложеніемъ жира снаружи; всѣ его полости, особенно правыя, переполнены темною кровью съ плотными сгустками; стѣнки желудочковъ сердца утолщены, мышцы ихъ дряблы съ желтымъ оттѣнкомъ; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ. Правая почка уменьшена, лѣвая увеличена, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, желтоватаго цвѣта, съ сальнымъ блескомъ, ткань плотна.

82. Марія *Николаева*, 50 л., крест., 6 дек. 1901 почувствовала дурноту, упала на мостовой и вскорѣ умерла. Жизнь вела нетрезвую.

Вскрытіе 8 дек. 1901. Невысокаго роста, нѣжнаго сложенія, крайне исхудавшая. Сердце значительно увеличено, значительно обложено жиромъ; во всѣхъ его полостяхъ содержится темная кровь и бѣлыми сгустками кровь въ значительномъ количествѣ; лѣвое венозное отверстіе съ трудомъ пропускаетъ конецъ 2 пальцевъ, правый желудочекъ растянутъ, мышца его рѣзко-бѣдная, цвѣта желтоватаго и истончена до 0,1 снт., снаружи въ немъ просвѣчаетъ обильный жировой узоръ; двустворчатый клапанъ рѣзко утолщенъ, въ особенности по краю, гдѣ имѣется нѣсколько хрящеватой плотности крупныхъ узелковъ; клапаны сморщены по краю. Ткань легкихъ на ощупь значительно плотна; въ верхнихъ долякъ имѣются нѣсколько крупныхъ полостей съ довольно гладкими и бѣлыми, напоминающихъ гноевидный распадомъ; ткань по окружности ихъ желтовата и съ узлами многочисленными сѣроватыми узелками съ просяное зерно.

83. Карлъ *Яна*, 35 л., подпор. запасн. Часто злоупотреблялъ спиртными напитками, отчего около 2 года назадъ психически болѣнъ, съ годъ не пилъ, опять принялся за старое, захворалъ порокомъ сердца и водянкой. По выходѣ изъ больницы, долго крѣпился, но въ послѣдніе дни опять сталъ пить. Найденъ въ сидячемъ положеніи на кровати мертвымъ 1 мар. 1902.

Вскрытіе 5 мар. 1902. Высокаго роста, слабаго сложенія и питанія. Сердце очень большой величины, 14 × 13½ снт. и очень значительно обложено жиромъ по бороздамъ; во всѣхъ полостяхъ его содержится очень много со сгустками крови; аорта на видъ узкова, клапаны ея жестки на ощупь; правое венозное кольцо пропускаетъ 4 пальца, лѣвое не допускаетъ двухъ; полость праваго желудочка сильно растянута, мускулатура его дряблая, толщина стѣнки 0,3 снт., лѣваго—1,0; мускулатура всюду желтаго цвѣта; клапаны двустворки и портальные рѣзко утолщены съ отложеніемъ въ нихъ крупныхъ известковыхъ массъ и бородавчатыхъ сильныхъ воспалительныхъ разращеній; то и другое отверстіе сужено въ рѣзкой степени; стѣнка лѣваго предсердія утолщена. Капсула почекъ снимается съ трудомъ; ткань коры мѣстами истончена.

84. Осипъ *Видякъ*, 42 л., крест., ломовой извощикъ. Спиртные напитки употреблялъ, но послѣдніе дни не пилъ. 1 нояб. 1902 почувствовалъ

тошноту, боль въ животѣ и въ сердцѣ, былъ отправленъ въ больницу и черезъ 2 часа тамъ умеръ.

Вскрытіе 7 нояб. 1902. Ниже средняго роста, средняго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце 10 × 12 снт., спереди значительно обложено жиромъ, въ полостяхъ его находятся объемистые сгустки крови; на эндокардѣ

88. Евгенія *Авдѣева*, 35 л., крест. Послѣднее время жизнь вела развратную, была въ связи, ее часто колотилъ мужъ, отбыла недѣлю назадъ 6 мѣсячное тюремное заключеніе за участіе; изрядно выпивала. Утромъ 13 мар. 1907 стала жаловаться, что трудно ей становится дышать, легла въ постель, стала храпѣть, появилась пѣна изо рта, на вопросы не стала отвѣчать и тутъ-же умерла.

Вскрытіе 16 мар. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сосуды основанія мозга слегка измѣнены. Сердце значительно увеличено и сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ полостяхъ находится много темной жидкой крови, съ темными рыхлыми сгустками; клапаны аорты представляются утолщенными, нѣсколько сморщенными, устье аорты нѣсколько сужено; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., мышца сердца сѣровато-красноватаго цвѣта, на ней замѣтны болѣе свѣтлыя желтоватыя пятна. Почки слегка уменьшены, капсула ихъ снимается съ трудомъ; ткань ихъ плотновата, корковый слой истонченъ нѣсколько.

Параличъ сердца, вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ, endoarteriitidis deform. chronicae и расширенія аорты.

89. Игнатій *Матвѣевъ*, 58 лѣтъ, крест. Страдалъ головокруженіемъ и общею слабостью. Наканунѣ жаловался на сильную боль въ груди, утромъ 17 янв. 1900 придя изъ трактира легъ, черезъ часъ пошелъ къ раковинѣ набрать воды, пошатнулся, упалъ и умеръ.

Вскрытіе 19 янв. 1900. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, на наружной его поверхности находятся большія отложенія жира; правая половина переполнена темной жидкой кровью со сгустками; лѣвое предсердіе также переполнено такою же кровью; мышцы буро-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно дряблы; клапаны дву-и трехстворчатые утолщены и сморщены, мутно-бѣлаго цвѣта; клапаны аорты утолщены; начало аорты значительно расширено, внутренняя ея оболочка сильно бугриста съ значительными отложеніями плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ; внутренняя оболочка грудной аорты также бугриста и заключаетъ большія плотныя известковыя бляшки. Почки немного увеличены, корковый слой нѣсколько утолщенъ, пирамиды укорочены.

90. Іосифъ *Ляхъ*, около 55 л., чин., скоропостижно умеръ 25 янв. 1900 во время пріема въ Клинич. Воен. Госпиталѣ.

Вскрытіе 28 янв. 1900. Высокаго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Нижнія конечности отъ колѣнъ до низу отечны. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце величиною въ $3^1/_2$ кулака покойнаго; на наружной его поверхности находятся громадныя отложенія жира; всѣ его полости переполнены темною кровью съ красными и бѣлыми плотными сгустками; стѣнки желудочковъ утолщены, мышца блѣдно-краснаго цвѣта съ яснымъ желтымъ оттѣнкомъ, довольно плотна; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ, мутно-бѣлаго цвѣта; дуга аорты расширена до кулака взрослаго человѣка; клапаны аорты утолщены и сморщены, стѣнка ея уплотнена, внутренняя оболочка бугриста и шероховата и покрыта множествомъ желтоватыхъ плотныхъ, а также твердыхъ известковыхъ бляшекъ; устья вѣнечныхъ артерій значительно сужены. Легкія эмфизематозны. Почки нѣсколько увеличены, слои истончены.

91. Харитина *Гаврилова*, 60 л., жена ремесл., найдена мертвой въ ночлежномъ домѣ 7 мар. 1901.

Вскрытіе 14 мар. 1901. Роста нижесредняго, правильнаго сложенія, средняго питанія. Сердце увеличено, мускулатура сердца съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ и въ высшей степени дряблая; восходящая часть аорты расширена; при гидростатической пробѣ клапаны аорты оказались въ значительной мѣрѣ недостаточными; сосѣдственные края двухъ клапановъ срослись въ видѣ толстаго узелка съ отложеніемъ въ центрѣ его извести; въ центрѣ на мѣстѣ схожденія всѣхъ клапановъ остается неправильный треугольный дефектъ; свободные края двухъ клапановъ сморщены и утолщены; во всѣхъ полостяхъ сердца содержится много темной со сгустками крови; въ восходящей части аорты въ стѣнкѣ ея имѣются плотныя ломкія известковыя крупныя бляшки. Капсула почекъ снимается съ трудомъ; мѣстами видны подъ капсулой и на разрѣзѣ небольшія кругловатыя кисты; корковый слой почекъ истонченъ и желтоватаго цвѣта. Артеріи основанія мозга склерозированы.

92. Иванъ *Буриловъ*, 41 г., крест., фабричный. Часто жаловался на боль въ груди, постоянно сильно кашлялъ, лечился. 15 нояб. 1903 придя изъ бани, почувствовалъ себя дурно, упалъ на полъ и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 18 нояб. 1903. Невысокаго роста, крѣпкаго сложенія, средняго питанія. Изъ брюшной полости исходитъ спиртный запахъ. Сердце значительно увеличено; на наружномъ покровѣ его имѣются молочныя пятна и склейки съ наружнымъ листкомъ околосердія; подобныя же склейки имѣются также въ изобиліи на сердечномъ покровѣ аорты, сильно расширенной; дуга аорты и восходящая ея часть растянуты до величины двухъ кулаковъ; во всѣхъ полостяхъ сердца имѣется темная жидкая съ немногими рыхлыми сгустками кровь; при наливаніи воды въ аорту, клапаны ея медленно пропускаютъ воду; лѣвое венозное кольцо пропускаетъ 3 пальца; правый желудочекъ растянутъ, мускулатура его при верхушкѣ проращена жиромъ; края трехстворчатаго и въ большей степени двустворчатаго клапана сморщены са отложеніемъ плотноватыхъ узелковъ; лѣвый желудочекъ нѣсколько растянутъ, стѣнка его толщиной 1,3 снт.; заслонки аорты нѣсколько утолщены, двѣ изъ нихъ срослись сосѣдними краями; внутренняя поверхность аорты крупнозерниста, мѣстами жестка и съ изъязвленіями, покрытыми фибриномъ; окружность на 3 снт. надъ заслонками около 17,0 снт.; устья вѣнечныхъ артерій нѣсколько сужены бляшками. Въ желудкѣ около 500 к. с. пищевой смѣси, со слабымъ спиртнымъ запахомъ. Капсула почекъ снимается съ нѣкоторымъ усиліемъ, корковый слой мѣстами истонченъ, пирамидки тупы; окололоханочный жиръ разросся; ткань почекъ неравномѣрной плотности.

93. Настасья *Копысова*, 45 л., жена цехов. ремесл., скоропостижно умерла въ клиникѣ 22 окт. 1909. Принята на излѣченіе съ порокомъ сердца.

Вскрытіе 24 окт. 1909. Средняго роста и сложенія, достаточнаго питанія. На голеняхъ и стопахъ незначительная отечность. Сердце значительно увеличено, изрядно обложено жиромъ; восходящая аорта расширена, съ поперечникомъ не менѣе 4,0 снт., стѣнка ея внутри покрыта жесткими бѣлыми обильными бляшками, коими въ значительной степени сужены и устья вѣнечныхъ артерій; мускулатура сердца на разрѣзѣ пестрая съ желтыми гнѣздами, дряблая; желудочки растянуты, двустворчатый клапанъ мѣстами узловатъ отъ сморщиваній въ видѣ узелковъ, сосочковыя мышцы на разрѣзѣ полосчаты съ желтизной; клапаны аорты утолщены по краю, плохо прилегаютъ, при наливаніи пропускали воду.

Параличъ сердца, вслѣдствіе endoarteriitidis deform. chron. аорты и вѣнечныхъ артерій сердца.

94. Семенъ *Горшковъ*, 30 лѣтъ, крест., лѣпщикъ. 14 янв. 1900 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ. Велъ нетрезвую жизнь. Ложась спать, жаловался на боль въ сердцѣ и сильную слабость.

Вскрытіе 21 янв. 1900. Выше средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія, питанія слабаго. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, съ большимъ отложеніемъ жира на наружной поверхности; въ правомъ желудочкѣ и предсердіи находится незначительное количество темножидкой крови, а также и въ лѣвомъ предсердіи; стѣнки желудочковъ истончены, мышцы ихъ дряблы, блѣднокраснаго цвѣта съ сильнымъ желтоватымъ оттѣнкомъ; внутренняя поверхность аорты имѣетъ шероховатыя краснобѣлыя бляшки, около $^1/_2$ снт. въ діаметрѣ, довольно плотныя. Почки увеличены въ объемѣ, капсула ихъ снимается легко, корковый слой утолщенъ, пирамиды укорочены, ткань довольно плотная. Въ желчномъ пузырѣ находится 6 кругловатыхъ камней, величиною въ горошину, темныхъ, шипообразныхъ.

95. Пелагея *Филиппова*, 61 г., крест. 3 марта 1900 найдена мертвой въ постели, легла спать сильно пьяной. Жизнь вела нетрезвую; послѣднее время сильно кашляла.

Вскрытіе 7 марта 1900. Выше средняго роста, средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце увеличено въ объемѣ, спереди большія отложенія жира; всѣ полости переполнены темной жидкою кровью, слегка пахнущей спиртомъ; стѣнки желудочковъ истончены, мышцы ихъ дряблы, сѣрожелтоватаго цвѣта; на внутренней поверхности аорты надъ клапанами находятся довольно большія плотныя бѣловатыя бляшки. Почки уменьшены въ объемѣ, корковый слой утолщенъ, пирамиды укорочены; ткань плотна. Отъ мозга и содержимаго желудка чувствуется запахъ спирта.

96. Александръ *Мордашевъ*, 30 л., крест. Умеръ 18 февр. 1900, жалуясь на боль въ сердцѣ и стѣсненіе въ груди, сидя на табуреткѣ. Давно страдаетъ болѣзнью сердца и суставнымъ ревматизмомъ. Велъ крайне нетрезвый образъ жизни.

Вскрытіе 23 февр. 1900. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, съ большими отложеніями жира спереди; стѣнки желудочковъ истончены, дряблы, желтоватаго цвѣта; на внутренней поверхности оболочки аорты надъ клапанами замѣчается незначительная шероховатость изъ мелкихъ бѣловатыхъ бляшекъ.

97. Сергѣй *Воронинъ*, 36 лѣтъ, мѣщ., писецъ. Велъ жизнь крайне нетрезвую. Въ состояніи сильнаго опьяненія скоропостижно скончался во время сна 21 февр. 1900.

Вскрытіе 26 февр. 1900. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце величиною въ кулакъ покойнаго съ обильнымъ отложеніемъ жира; мышца блѣдная и дряблая; въ обѣихъ половинахъ немного крови; на внутренней оболочкѣ аорты и въ окружности устья вѣнечныхъ артерій многочисленныя мелкія фиброзныя утолщенія. Капсула почекъ легко снимается, ткань въ разрѣзѣ имѣетъ темно-красный цвѣтъ, особенно пирамидки; корковый слой набухшій, достигаетъ мѣстами 1,0 снт., границы его съ пирамидами не вездѣ различимы. При снятіи черепной крышки былъ ощущаемъ ясный спиртный запахъ.

98. Иванъ *Родіоновъ*, 45 л., крест., слесарь. Найденъ мертвымъ въ

постели 21 февр. 1900. Наканунѣ легъ спать сильно пьянымъ. Жизнь велъ очень нетрезвую.

Вскрытіе 27 февр. 1900. Вышесредняго роста, средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце значительно увеличено въ объемѣ; въ полости его находится умѣренное количество жидкой темной крови; спереди большія отложенія жира; стѣнки желудочковъ истончены, бурокраснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, весьма дряблы; на внутренней поверхности аорты находятся мелкія бѣловатыя фиброзныя бляшки. Корковый слой почекъ истонченъ, ткань плотна.

99. Пелагея *Двиницкая*, 51 г., мѣщ., призрѣваемая. По дорогѣ въ больницу умерла 12 марта 1900. Послѣднюю недѣлю жаловалась на сильную головную боль и говорила о своей смерти. Страдала припадками падучей 1—2 раза въ мѣсяцъ.

Вскрытіе 18 марта 1900. Нижесредняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, съ большими отложеніями жира снаружи; всѣ его полости переполнены темною жидкою кровью; мышца сердца бурокраснаго цвѣта, довольно дрябла, стѣнка лѣваго желудочка утолщена; на внутренней оболочкѣ аорты находится множество обширныхъ бляшекъ съ отложеніемъ извести. Слои почекъ нѣсколько истончены.

100. Ульяна *Ильина*, 72 л., мѣщ. На улицѣ 16 окт. 1900 съ ней случился «ударъ», приведенная домой минутъ черезъ 10 скончалась; и ранѣе случались съ ней удары, страдала сильнымъ сердцебіеніемъ.

Вскрытіе 19 окт. 1900. Нижесредняго роста, средняго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце значительно увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира; въ полостяхъ сердца небольшое количество темножидкой крови; мышцы весьма дряблы, бурокраснаго цвѣта съ ясно желтымъ оттѣнкомъ; стѣнки желудочковъ истончены; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами замѣчаются плотныя бѣловатыя бляшки. Верхушки легкихъ уплотнены, сѣроватаго цвѣта, съ бѣлыми плотными узелками. Сосуды основанія мозга безъ измѣненій.

101. Акиндинъ *Алексѣевъ*, 41 г., крест., чернорабочій. Заснулъ сильно пьяный и найденъ мертвымъ 16 окт. 1900. Въ 1899 году лежалъ въ больницѣ 2 мѣсяца съ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ, послѣ этого все жаловался на боль въ боку и груди. Всегда сильно пьянствовалъ. Послѣднее время пилъ цѣлыми стаканами.

Вскрытіе 20 окт. 1900. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце увеличено значительно, особенно въ поперечникѣ, съ большимъ отложеніемъ жира спереди; всѣ его полости переполнены темной жидкой кровью; стѣнка лѣваго желудочка утолщена; мышца съ грязноватымъ оттѣнкомъ, дрябла; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами замѣчаются бѣловатыя плотныя бляшки величиною до горошины. Оба слоя почекъ истончены, трудно различимы, темнокраснаго цвѣта.

102. Григорій *Монаховъ*, 42 л., крест., сторожъ. Часто жаловался на боль въ груди, часто случались рвоты по утрамъ. Ночью 24 апр. 1901, когда онъ сидѣлъ на постели, стало тошнить и рвать, черезъ нѣсколько минутъ вдругъ упалъ на кровать и умеръ. Спиртные напитки употреблялъ въ незначительномъ количествѣ.

Вскрытіе 26 апр. 1901. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце $13^1/_2 \times 15$ снт., правая половина его переполнена кровью со сгустками, а въ лѣвой половинѣ небольшое количество жидкой крови; стѣнка лѣваго желудочка въ 2,5 снт. толщиною, а праваго—0,3; мышца съ яснымъ желтоватымъ оттѣнкомъ, дрябла; на внутренней оболочкѣ аорты множество язвенныхъ поверхностей неправильной формы съ красноватымъ дномъ и бѣловатыя объемистыя плотныя бляшки, вслѣдствіе чего внутренняя оболочка аорты представляется

утолщенной, изрытой и бугристой. Въ верхушкѣ праваго легкаго плотные сѣроватые узлы, изъ которыхъ одинъ въ лѣсной орѣхъ, непроходимые для воздуха.

103. Анна *Лукина*, 60 лѣтъ, крест. Около года жалуется на боли въ груди, подъ ложечкой, головную боль; послѣ ѣды часто рвало. Раньше часто выпивала. Около 10 часовъ утра 11 сент. 1901 стала жаловаться на головную боль и боль подъ ложечкой, въ 1 часъ легла на кровать и умерла.

Вскрытіе 14 сент. 1901. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, съ обильнымъ отложеніемъ жира; въ обѣихъ половинахъ содержалось немного жидкой крови съ примѣсью рыхлыхъ свертковъ; стѣнка праваго желудочка состоитъ почти цѣликомъ изъ жировой ткани, стѣнка лѣваго толщиною около 1,0 снт.; мышечное вещество блѣдно и дрябло; у основанія полулунныхъ заслонокъ аорты довольно много известковыхъ отложеній, отчасти суживающихъ просвѣтъ сосуда. Стѣнки артерій основанія мозга толстоваты, мѣстами на нихъ замѣтны известковыя отложенія въ видѣ бляшекъ.

104. Осипъ *Ивановъ*, 43 л., мѣщ., не имѣлъ опредѣленныхъ занятій и мѣстожительства. Имѣлъ пристрастіе къ спиртнымъ напиткамъ. 27 сент. 1901 въ мыльномъ отдѣленіи бани съ нимъ сдѣлалось дурно, судорожно затрясся и упалъ со скамейки на асфальтовый полъ и немного спустя умеръ.

Вскрытіе 30 сент. 1901. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце 15×11 снт., съ большимъ отложеніемъ жира снаружи; въ желудочкахъ незначительное количество крови, въ предсердіяхъ—умѣренное; мышца буро-краснаго цвѣта, съ мелкими тонкими желтоватыми прослойками, довольно дряблая; вѣнечныя артеріи сердца расширены, стѣнки ихъ уплотнены, мутно-бѣловатаго цвѣта, зіяютъ. Слои почекъ истончены, ткань довольно плотна.

105. Иванъ *Бровинъ*, 46 л., крест., чернорабочій. Десять лѣтъ страдалъ падучей болѣзнью и сильнымъ удушьемъ. Ложась спать, жаловался на сильное недомоганіе и ознобъ, подъ утро 3 нояб. 1901 найденъ былъ мертвымъ.

Вскрытіе 4 нояб. 1901. Средняго роста, умѣреннаго сложенія и питанія. Сердце увеличено, подъ наружнымъ покровомъ весьма обильныя отложенія жира, обѣ половины содержали кровь, но преимущественно правая, кровь—жидкая съ примѣсью рыхлыхъ свертковъ; мышца блѣдная, дряблая; внутренняя оболочка аорты сплошь утолщенная, бугристая, мѣстами покрыта известковыми отложеніями; устья вѣнечныхъ артерій весьма сужены рубцевыми утолщеніями, стѣнки этихъ сосудовъ мѣстами также утолщены. На днѣ ромбовидной ямки найдено три экхимоза подъ эпендиму величиною до просяного зерна, ткань продолговатаго мозга блѣдна.

106. Константинъ *Васильевъ*, 42 л., мѣщ., чернорабочій. Послѣднее время сильно пьянствовалъ и страдалъ болѣзнью рукъ, ногъ и груди. Умеръ 9 нояб. 1901.

Вскрытіе 12 нояб. 1901. Средняго роста и тѣлосложенія, значительное истощеніе. Голени и стопы отечны. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце увеличено въ объемѣ, обложено значительнымъ количествомъ жира, перикардій мутнобѣловатаго цвѣта съ объемистыми сухожильными бляшками; въ полостяхъ сердца умѣренное количество плотныхъ темно-красныхъ сгустковъ, особенно въ предсердіяхъ; стѣнка праваго желудочка значительно истончена; мышца блѣднокрасна, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дрябла; на внутренней оболочкѣ аорты мелкія бѣловатыя плотныя бляшки. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, пирамидки укорочены, ткань блѣдно-желтоватаго цвѣта. Нижній конецъ прямой кишки на высоту 10 снт. отъ наружнаго отверстія на всемъ пространствѣ кишки представляется грязно-сѣроватымъ, клочковатымъ, измѣненіе это касается какъ слизистой оболочки, такъ и окружающей клѣтчатки; клочья легко рвутся и отпадаютъ, сильно гнилостнаго запаха.

107. Степанъ *Никитинъ*, 45 л., крест., кучеръ конки. Жаловался на боль въ груди. 29 янв. 1902 въ конкѣ ему стало дурно и по доставленіи въ больницу оказался мертвымъ.

Вскрытіе 1 февр. 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце $12^1/_2$×12 снт., правая его половина заполнена темною кровью съ рыхлыми сгустками, въ лѣвомъ желудочкѣ находится такое же количество крови, а лѣвое предсердіе и аорта заполнены кровью; толщина лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,3; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами находятся объемистыя бѣловатыя плотныя бляшки; отверстія вѣнечныхъ артерій нѣсколько сужены.

108. Марфа *Копѣйкина*, 34 л., крест., прачка. Въ послѣднее время вела нетрезвый образъ жизни. Была сильно выпивши и легла спать, а утромъ 16 фев. 1902 нашли ее мертвой.

Вскрытіе 25 фев. 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце 11×10×5 снт., снаружи обложено значительнымъ слоемъ жира; всѣ его полости наполнены темною жидкою кровью; толщина лѣваго желудочка 1,4 стн., праваго—0,2; мышца ихъ буро-красно-желтоватая на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами находятся довольно объемистыя плотныя бѣловатыя бляшки. Отъ содержимаго желудка и кишекъ, а также отъ крови въ легкихъ и сердцѣ и отъ мозга чувствуется ясный специфическій кислый запахъ.

109. Сергѣй *Калининъ*, 19 л., крест., маляръ. Пилъ сильно водку, до безчувствія. 23 фев. 1902, втроемъ выпили двѣ бутылки водки, К. сильно опьянѣлъ, облокотился на столъ и сталъ храпѣть, и немного спустя умеръ.

Вскрытіе 28 фев. 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 11×12×6 снт., всѣ его полости переполнены темною жидкою кровью съ рыхлыми сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочке 1,8 снт., праваго—0,3; просвѣтъ аорты 1,5 снт. въ діаметрѣ; внутренняя ея оболочка покрыта значительнымъ количествомъ мелкихъ въ просяное зерно бѣловатыхъ бляшекъ, плотныхъ на ощупь. Содержимое желудка съ запахомъ спирта.

110. Алексѣй *Косякъ*, 57 л., фельдфебель тюрьмы. 15 окт. 1902 на дворѣ почувствовалъ себя дурно и упалъ, немного спустя умеръ. Послѣднее время чувствовалъ слабость; имѣлъ замѣтно выраженное известковое перерожденіе артерій.

Вскрытіе 17 окт. 1902. Высокаго роста, средняго тѣлосложенія, слабаго питанія. Голени и стопы значительно отечны. Стѣнки сосудовъ основанія мозга склерозированы. Сердце 13×13 стн.; всѣ его полости значительно заполнены кровью съ плотными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,0 стн., праваго 1,0 стн.; мышца блѣднокрасна съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, дрябла; внутренняя оболочка аорты надъ клапанами бугриста и шероховата, на ней замѣтны плотныя и объемистыя бѣловатыя бляшки. Ткань легкихъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уплотнена въ окружности бронховъ; бронхи во многихъ мѣстахъ представляютъ расширенія, заполненныя гноевидной слизью. Почки увеличены, капсула ихъ снимается съ трудомъ, ткань плотна, корковый слой утолщенъ.

111. Яковъ *Любимовъ*, 51 г., крестьянинъ, торговецъ кожами. Пилъ запоемъ. Пришелъ домой пьянымъ и легъ спать; подъ утро жаловался на боль въ желудкѣ и вскорѣ умеръ, 20 нояб. 1902 г.

Вскрытіе 23 нояб. 1902. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и

питанія. Стѣнки сосудовъ основанія мозга толстоваты. Сердце 12×12 сит., снаружи значительно обложено жиромъ. Правая половина его и лѣвое предсердіе переполнены кровью съ плотными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,0 сит.; а праваго—0,6; мышцы ихъ блѣдно-красны съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблы; двустворчатый клапанъ слегка утолщенъ; внутренняя оболочка аорты слегка шероховата отъ присутствія небольшихъ плотныхъ бляшекъ. Почки уменьшены въ ширину, корковый слой утолщенъ, желтоватаго цвѣта, пирамидки укорочены, лоханки расширены. При вскрытіи черепной плости и желудка ощущается спиртный запахъ.

112. Петръ *Яковлевъ*, 41 г., мѣщ., контрошикъ. Жизнь велъ трезвую, послѣднее время часто кашлялъ. Найденъ утромъ въ постели мертвымъ 24 ноя6. 1902.

Вскрытіе 27 ноя6. 1902. Средняго тѣлосложенія, умѣренно питанія. Правая половина лица какъ-бы приплюснута, блѣдная, правый уголъ рта кажется опущеннымъ. Сердце 11×12 сит.; правая половина его растянута и переполнена кровью съ плотными сгустками, въ лѣвой—тоже; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,0 сти., а праваго—0,4; сердечная мышца блѣдно-краснаго цвѣта съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблая, на внутренней оболочкѣ аорты находятся мелкія бѣловатыя бляшки. Сосуды основанія мозга склерозированы.

113. Артуръ *Шонъ*, 40 л., призрѣваемый дома трудолюбія. Около 4 лѣтъ за время жизни въ домѣ трудолюбія не пилъ вовсе, до поступленія былъ алкоголикомъ и долго лечился въ Ревелѣ, около 3 лѣтъ. Послѣдніе дни болѣлъ разстройствомъ желудка. 17 янв. 1903 шелъ въ спальню, на лѣстницѣ упалъ и умеръ.

Вскрытіе 19 янв. 1903. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣренно питанія. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце 13×13 сти., обложено значительно жиромъ; правая его половина переполнена кровью съ плотными сгустками, а въ лѣвой полоинѣ находится умѣренное количество такихъ же сгустковъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,8 сит., а праваго—0,5; мышца блѣдно-краснаго цвѣта съ яснымъ желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно дрябла, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣются бѣловатые плотные островки неправильной формы; на внутренней оболочкѣ аорты множество довольно обсихшихъ плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ. Въ желчномъ пузырѣ 20 многогранныхъ бѣлдножелтоватыхъ камней, величиною въ бобъ каждый. Почки нѣсколько увеличены, корковый слой утолщенъ, пирамидки укорочены.

114. Серафима *Николаева*, 18 л., крест., проститутка. Сильно злоупотребляла спиртными напитками. 23 янв. 1903 легла отдохнуть пьяной и черезъ нѣсколько часовъ найдена мертвой.

Вскрытіе 27 янв. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце немного увеличено, всѣ его полости сильно наполнены темножидкою кровью съ объемистыми рыхлыми сгустками, внутренняя оболочка аорты шероховата отъ бѣловатыхъ мелкихъ бляшекъ. Отъ мозга, крови сердца и легкихъ чувствуется спиртный запахъ.

115. Иванъ *Орловъ*, мѣщ., 44 лѣтъ.

Вскрытіе 13 февр. 1903. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, съ обильнымъ отложеніемъ жира, въ стѣнкахъ полостныхъ содержится порядочное количество темной жидкой крови, особенно въ правой; на аортѣ немного желтоватыхъ бляшекъ; въ стѣнкахъ вѣнечныхъ артерій сердца многочисленное отложеніе извести, особенно въ передней продольной бороздѣ. Корковый слой почекъ слегка набухшій, пирамидки окрашены темнѣе, нѣкоторыя изъ нихъ довольно низки. Въ грудной аортѣ на внутренней оболочкѣ довольно много желтоватыхъ бляшекъ.

116. Иванъ *Журавлевъ*, 29 л., крест. 21 февр. 1903 поднятъ въ сильно нетрезвомъ видѣ на улицѣ, по доставленіи въ часть оказался мертвымъ.

Вскрытіе 26 февр. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, съ большими отложеніями жира спереди; всѣ его полости растянуты темною кровью съ довольно плотными сгустками; стѣнки желудочковъ немного утолщены; на внутренней оболочкѣ аорты у отверстія вѣнечныхъ артерій мелкія бѣловатыя бляшки. Почки немного уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, ткань уплотнена. Отъ содержимаго желудка, мозга, легкихъ, крови сердца и отъ печени чувствуется сильный запахъ спирта.

117. Іосифъ *Пригоровъ*, 42 л., крест., куперъ. Часто пьянствовалъ, жаловался на боль въ груди, постоянно кашлялъ. Наканунѣ пришелъ выпивши и легъ спать въ конюшнѣ, а утромъ усмотрѣнъ мертвымъ, 13 марта 1903.

Вскрытіе 16 марта 1903. Средняго роста, крѣпкаго сложенія, умѣреннаго питанія. Сердце раза въ $1^1/_2$ больше кулака покойнаго, съ большимъ отложеніемъ жира спереди; всѣ его полости наполнены темною жидкою кровью со спутанными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,8 сит., праваго—0,8; мышцы ихъ блѣдно-красны съ желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно дряблы; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами небольшое количество бѣловатыхъ мелкихъ плотныхъ бляшекъ. Содержимое желудка пахнетъ спиртомъ. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой утолщенъ, пирамидки укорочены. Сосуды основанія мозга склерозированы. Отъ мозга чувствуется запахъ спирта.

118. Анисья *Филиппова*, 23 л., крест., проститутка, сильно предавалась пьянству. Пьяная легла спать, а утромъ 22 сент. 1903 найдена мертвою.

Вскрытіе 25 сент. 1903. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце значительно увеличено, съ большими отложеніями жира снаружи; всѣ его полости переполнены темной кровью съ довольно плотными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 сит. праваго—0,7; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами находятся бѣловатые плотные шероховатыя бляшки. Въ тонкихъ кишкахъ ленточная глиста. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой нѣсколько утолщенъ, пирамидки укорочены, ткань плотна, мѣстами какъ бы смерщена.

119. Степанида *Федорова*, 58 л., крест., прачка. Злоупотребляла спиртными напитками, ежедневно была пьяна. Утромъ 27 сент. 1903 найдена въ постели мертвой.

Вскрытіе 30 сент. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце 12×13 сит., значительно обложено жиромъ снаружи; всѣ его полости пусты; внутренняя оболочка сердца въ правой половинѣ и въ лѣвомъ предсердіи пропитана темно-красными цвѣтомъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 2,0 сит., праваго—0,5; мышца грязно-желтоватаго цвѣта, довольно дрябла; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами и выше находятся объемистыя бѣловатыя бляшки, имѣющія известковую плотность и видъ; отверстія вѣнечныхъ артерій сильно сужены и окружены такими же бляшками.

120. Алексѣй *Иванов*, 22 л., крест., чернорабочій. Велъ жизнь нетрезвую, часто жаловался на головную боль. 31 окт. 1903 въ домѣ терпимости внезапно упалъ на полъ и, не приходя въ сознаніе, черезъ нѣсколько минутъ умеръ.

Вскрытіе 3 ноя6.1903. Средняго роста, тѣлосложенія и питанія хорошаго. Сердце увеличено въ объемѣ, съ большимъ отложеніемъ жира на поверхности, во всѣхъ его полостяхъ, въ особенности въ лѣвомъ и

въ правомъ предсердіи, большое количество жидкой темнокрасной крови; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., полость его расширена, мышцы сердца блѣдно-красно-желтоватыя, довольно дряблыя; на внутренней оболочкѣ аорты 2—3 бѣловатыя плотныя мелкія бляшки. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой утолщенъ, пирамидки укорочены.

121. Владиміръ *Дмитріевъ*, 42 л., регентъ. Болѣе трехъ лѣтъ страдалъ болѣзнью груди и горла,—чахоткою; неоднократно шла кровь изъ горла. Скоропостижно умеръ 13 дек. 1903.

Вскрытіе 16 дек. 1903. Вышесредняго роста, средняго сложенія, плохого питанія. Сердце нѣсколько увеличено, въ предсердіяхъ и въ правомъ желудочкѣ имѣется темная жидкая и съ темными сгустками кровь, лѣвый желудочекъ пустъ; мускулатура сердца дряблая, съ желтизной, полости расширены; вѣнечныя артеріи при устьяхъ и на протяженіи сужены желтыми жесткими бляшками. Верхушки легкихъ сморщены втянутыми рубцами; въ верхней долѣ лѣваго легкаго имѣются узлы величиною съ горошину, желтоватые, съ отложеніемъ извести, а также мѣстами имѣются оплотненія въ видѣ звѣздчатыхъ втянутыхъ сѣроватыхъ рубцовъ; ткань праваго легкаго съ такими же измѣненіями, но безъ гнѣздныхъ известковыхъ фокусовъ. Въ тонкихъ кишкахъ имѣются ленточныя глисты. Правая почка нѣсколько толще, капсула съ нея снимается съ трудомъ, въ расширенной лоханкѣ имѣется выполняющій ее древовидно-развѣтвленный камень, плотность ткани неравномѣрная, нѣкоторыя пирамиды уплощены и рубцово-сморщены.

122. Иванъ *Штатскій*, 51 г., крест., чернорабочій. Изрѣдка жаловался на головную боль. Съ утра 19 янв. 1904 чувствуя головную боль, пошелъ къ дверямъ, но сдѣлалось дурно и черезъ нѣсколько минутъ умеръ.

Вскрытіе 21 янв. 1904. Нижесредняго роста, средняго тѣлосложенія, слабаго питанія. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце нѣсколько увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира снаружи; всѣ его полости пусты, внутренняя оболочка сердца на клапанахъ и правомъ предсердіи, а также на аортѣ густо окрашена въ темнокрасный цвѣтъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка—1,8 снт. праваго—0,4; мышца блѣдно-красно-желтовата, дрябла; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами находятся плотныя бѣловатыя бляшки; отверстія вѣнечныхъ артерій замѣтно сужены, такъ что едва пропускаютъ зондъ. Верхушки легкихъ уплотнены и заключаютъ плотныя рубцовыя измѣненія. Капсула почекъ снимается легко, слои истончены, ткань плотна.

123. Иванъ *Шаминъ*, 52 л., крест., 23 янв. 1904 возвратясь откуда-то со службы въ 10 ч. утра, свалился съ ногъ на полъ и не приходя въ сознаніе умеръ. За 40 лѣтъ только два раза подвергался „припадочному состоянію", причемъ послѣдній разъ около мѣсяца тому назадъ.

Вскрытіе 26 янв. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, слабаго питанія. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, дряблое, несократившееся, въ лѣвомъ предсердіи находится довольно значительное количество крови съ плотными сгустками; снаружи значительно обложено жиромъ; толщина стѣнокъ лѣваго желудочка 2,5 снт., праваго—0,4, мышцы ихъ блѣднокрасны, тусклы, дряблы, съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ; внутрисердечная оболочка въ лѣвой половинѣ и въ правомъ предсердіи густо окрашена темнокраснымъ цвѣтомъ; на двустворчатомъ клапанѣ и на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами находятся бѣловатыя плотныя бляшки. Сосуды основанія мозга склерозированы.

124. Антонъ *Семеновъ*, 55 л., крест., носилъ гробы на кладбище. Велъ нетрезвую жизнь. 25 янв. 1904 выпивши сидѣлъ въ чайной за столомъ и уснулъ, и найденъ мертвымъ.

Вскрытіе 28 янв. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, слабаго питанія. Сердце немного увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира снаружи, несокращенное, дряблое; всѣ его полости заключаютъ большое количество крови съ плотными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,4; мышца ихъ блѣдно-красна съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблая; на двустворчатомъ клапанѣ находятся бѣловатыя плотныя бляшки; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами имѣются шероховатости отъ бѣловатыхъ мелкихъ бляшекъ. Въ желудкѣ 400 к. с. пищевой смѣси, пахнущей спиртомъ. Въ верхушкахъ легкихъ имѣются уплотненныя мѣста, въ которыхъ заключаются полости, заполненныя сѣроватыми казеозными массами.

125. Александръ *Сисинъ*, 33 л., сынъ лакея, не имѣлъ опредѣленнаго мѣста жительства; водку хотя и пилъ, но очень мало. Послѣднее время жаловался на сильную боль въ груди. 4 февр. 1904 утромъ найденъ въ ночлежкѣ мертвымъ.

Вскрытіе 5 февр. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено, съ довольно объемистыми бѣловатыми бляшками снаружи; во всѣхъ его полостяхъ, въ особенности въ правыхъ, большое количество крови съ плотными сгустками; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,4 снт., лѣваго—1,5; мышца блѣдно-краснаго цвѣта съ слабымъ желтоватымъ оттѣнкомъ, умѣренной плотности; на двустворчатомъ клапанѣ небольшое количество бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ; на внутренней поверхности аорты надъ клапанами незначительная бѣловатая шероховатость; стѣнки вѣнечныхъ артерій утолщены, на ощупь плотны, на внутренней оболочкѣ находятся плотныя бѣловато-мутноватыя бляшки. Въ верхнихъ доляхъ легкихъ повсюду ощупываются весьма плотные узловатые участки; въ разрѣзахъ ткань сѣровато-краснаго цвѣта съ большими распространенными бѣловатыми полосами въ верхушкахъ.

126. Мартинъ *Парамоновъ*, 33 л., крест., портной. Мѣсяца четыре жаловался на боль въ груди, страдалъ одышкой. Послѣдніе три дня лежалъ въ постели; почувствовавъ себя лучше, 14 февр. 1904 пошелъ въ баню, въ мыльной сдѣлалось дурно, вышелъ въ раздѣвальную и умеръ.

Вскрытіе 17 февр. 1904. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Сердце немного увеличено, съ большимъ количествомъ жира снаружи; всѣ полости сердца, въ особенности правыя, переполнены темной жидкой кровью; мышца довольно плотна на ощупь, въ толщѣ заключается множество сѣровато-бѣловатыхъ островковъ, плотныхъ на ощупь, въ разрѣзѣ мышца имѣетъ пестрый видъ; внутренняя оболочка аорты шероховата, бугриста, съ большимъ количествомъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ и старыхъ втянутыхъ рубцовъ; отверстія вѣнечныхъ артерій сужены до непроходимости.

127. Сергѣй *Шукаевъ*, 29 л., крест., торговецъ-сливочникъ. Раньше пилъ много водки. Въ селѣ 19 фев. 1904 утромъ съ нимъ случился припадокъ; когда онъ оправился и вмѣстѣ съ другими отправился въ СПБ. пѣшкомъ, то вскорѣ припадокъ съ нимъ повторился; его повезли и дорогою онъ умеръ.

Вскрытіе 23 фев. 1904. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце замѣтно увеличено, на наружной поверхности какъ спереди, такъ и сзади въ области праваго желудочка находятся мелкія рѣзко-ограниченныя темно-красныя пятнышки, около 20 штукъ, отъ маковаго до просяного зерна; во всѣхъ полостяхъ сердца находится темнокрасная кровь въ умѣренномъ количествѣ, въ лѣвой половинѣ замѣтно больше, чѣмъ въ правой; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,3; мышцы ихъ блѣдно-красны съ глинистымъ оттѣнкомъ, дряблыя; на внутренней оболочкѣ аорты нѣсколько бѣловатыхъ бляшекъ.

128. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, 35 л., 22 фев. 1904 упалъ на бульварѣ и умеръ.

Вскрытіе 24 фев. 1904. Средняго роста, крѣпкаго сложенія, средняго питанія. Изъ брюшной полости исходитъ слабый спиртный запахъ. Сердце величиною въ два кулака покойнаго; во всѣхъ полостяхъ сердца имѣется въ изобиліи темная съ темными сгустками кровь; правый желудочекъ растянутъ, стѣнка его—до 0,3 толщины, прорѣзана мѣстами жиромъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка—1,2 сит.; по краю двустворчатаго клапана имѣются бѣловатыя утолщенія; мускулатура съ желтизной, довольно дряблая; вѣнечныя артеріи недалеко отъ истоковъ почти совершенно закрыты плотными желтоватыми бляшками. Содержимое желудка имѣетъ слабо-спиртный запахъ.

129. Татьяна *Алексѣева*, 28 л., крест. Жизнь вела нетрезвую, опредѣленныхъ занятій и мѣстожительства не имѣла, часто напивалась до безпамятства. 24 фев. 1904 найдена въ подвалѣ для дровъ мертвой.

Вскрытіе 28 фев. 1904. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Всѣ полости сердца переполнены темною жидкою кровью, пахнущей спиртомъ; на внутренней оболочкѣ аорты большое количество бѣловатыхъ шероховатыхъ плотныхъ бляшекъ; стѣнки дуги аорты сильно истончены; отверстія вѣнечныхъ артерій значительно сужены и окружены бляшками, въ стѣнкахъ вѣнечныхъ артерій мелкія плотныя бляшки. Содержимое желудка имѣетъ спиртный запахъ. Въ верхушкѣ праваго легкаго находится уплотненіе величиною въ лѣсной орѣхъ, въ разрѣзѣ представляющее рубцовую бѣловатую ткань, окруженную мелкими бѣловатыми узелками.

130. Андрей *Макаровъ*, 48 л., крест., бомжъ на городской скотобойнѣ. Жизнь велъ нетрезвую, временами, въ особенности послѣ получки, сильно пьянствовалъ. 28 фев. получилъ жалованье, запилъ и на работу не выходилъ; возвратился домой пьянымъ и легъ спать, а на утро 3 марта 1904 найденъ мертвымъ.

Вскрытіе 6 марта 1904. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце значительно увеличено и обложено жиромъ; въ лѣвой его половинѣ довольно много жидкой темнокрасной крови, въ правой немного; внутренняя оболочка сердца и особенно ея клапаны грубо окрашена въ темно-красный цвѣтъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 сит., а праваго—0,3; мышцы ихъ бѣдножелезны, тусклы, съ рѣзкими желтоватыми оттѣнками; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣются довольно объемистые плотные участки, въ разрѣзахъ бѣловатаго цвѣта; сосочковыя мышцы рѣзко уплотнены, также въ разрѣзахъ бѣловаты; внутренняя оболочка аорты бугриста, шероховата, во многихъ мѣстахъ на ней находятся бѣловатыя плотныя бляшки и старыя рубцовыя вдавливанія, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мелкія язвенныя поверхности, въ одну изъ которыхъ пристало рыхлое новообразованіе величиною съ лѣсной орѣхъ, сидящее какъ бы на ножкѣ; въ разрѣзѣ оно дряблое, темнокрасноватое, съ бѣловатыми рыхлыми полосками и съ шероховатой поверхностью; отверстія вѣнечныхъ артерій сужены, стѣнки ихъ уплотнены. Въ верхушкѣ лѣваго легкаго пропущивается уплотненіе, въ разрѣзахъ сѣровато цвѣта. Почки уменьшены, капсула снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, пирамиды укорочены, слой. Въ брюшной полости и вообще отъ всѣхъ внутренностей чувствуется кислый запахъ.

131. Афанасій *Хорезъ*, 41 г., тит. сов. Съ 27 сен. пилъ 3—4 полуштофа водки въ день, но закусывая. Часто страдалъ запоемъ. Наканунѣ заболѣлъ и ничего не пилъ, а 7 янв. 1904 вечеромъ умеръ.

Вскрытіе 10 янв. 1904. Высокаго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, чрезмѣрно ожирѣлый. Сердце дряблое, обложено толстымъ слоемъ жира, 15×15 сит., всѣ его полости переполнены кровью съ плотными

сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка—1,0 сит., праваго 0,3; мышца ихъ бѣдно-красная съ рѣзкими желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблая; на внутренней оболочкѣ аорты небольшое количество бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, желтоватаго цвѣта, пирамидки темнокрасны; въ лѣвой почкѣ въ корковомъ веществѣ находятся кистовидныя расширенія величиной отъ просянаго зерна до куринаго яйца, заполнены они желтоватою прозрачной жидкостью, въ которой плаваютъ мелкія сѣрдало-желтою прозрачной жидкостью, въ которой плаваютъ мелкія бѣловатыя крупинки. Въ мочевомъ пузырѣ около 2 чайныхъ ложекъ гнеобразной густой бѣло-желтоватой жидкости.

132. Кузьма *Скороходовъ*, 54 л., крест., столяръ. Пьянствовалъ, 14 окт. 1904 на улицѣ сдѣлалось дурно, упалъ на землю и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 20 окт. 1904. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, довольно дряблое, значительно обложено жиромъ; во всѣхъ его полостяхъ находится жидкая кровь; вѣнечныя артеріи очень толстыя и плотныя, просвѣтъ ихъ мѣстами вѣнечныя артеріи почти до полнаго уничтоженія; на внутренней оболочкѣ аорты находятся много сѣровато-желтоватыхъ плотныхъ бляшекъ различной величины; мышца сердца дряблозата, бѣловатаго цвѣта съ различной величины; мышца сердца дряблозата, бѣловатаго цвѣта съ глянцистымъ оттѣнкомъ. Въ желудкѣ около 4000 к. с. довольно густой глянцистымъ оттѣнкомъ. Въ желудкѣ около 4000 к. с. довольно густой глянцистымъ оттѣнкомъ. Въ желудкѣ около 4000 к. с. довольно густой пищевой кашицы, слизистая истончена. Слои почекъ плохо различимы. Сосуды основанія мозга склерозированы.

133. Степанъ *Абрунинъ*, 49 л., крест., рабочій на дровяной баркѣ. Весьма часто сильно пьянствовалъ, но ни на какую болѣзнь не жаловался. Ночью 18 окт. 1904 обнаруженъ бывшимъ мертвымъ.

Вскрытіе 23 окт. 1904. Средняго роста, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Сѣтчатыя сосуды основанія мозга утолщены. Сердце сосуды основанія мозга утолщены. Сердце сосуды основанія мозга утолщены. Сердце

тучная. Содержимое желудка имѣетъ рѣзко кисловатую реакцію и острый запахъ бродящаго тѣста. Сердце увеличено, 13×13 снт., обильно обложено по бороздамъ жиромъ, передняя вѣнечная артерія на ощупь плотновата; въ обѣихъ половинахъ, но особенно въ правой содержалось довольно много свернувшейся крови, въ легочной артеріи довольно плотный слегка обезцвѣченный свертокъ; сердечная мышца дряблая, желтоватая; на свободномъ краѣ двустворки небольшія утолщенія, на внутренней оболочкѣ аорты въ области устья нѣсколько небольшихъ бѣловатыхъ бляшекъ; такая же бляшка найдена въ стѣнкѣ передней вѣнечной артеріи. Капсула почекъ трудно отдѣляется, корковый слой блѣдный, толщиною нѣсколько болѣе 0,5 снт.; пирамидки грязно-краснаго цвѣта. Сосуды основанія мозга склерозированы.

136. Николай *Демидовъ*, 52 л., сынъ тит. сов. Скоропостижно умеръ 15 сен. 1906.

Вскрытіе 16 сен. 1906. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Изъ задняго прохода выпячивается шишка величиной съ лѣсной орѣхъ; окружность его испачкана красной кровью. Сердце нѣсколько увеличено, дрябловато, сильно обложено жиромъ; лѣвый желудочекъ плотноватъ, почти пустъ, правый—зыблется, содержитъ темную кровь съ небольшимъ количествомъ рыхлыхъ свертковъ; вѣнечныя артеріи сердца очень жестки, просвѣтъ ихъ сильно суженъ; основанія клапановъ аорты немного уплотнены; мышца сердца буровато-желтоватаго цвѣта, дрябловата, отчасти проросла полосками жира. Въ желудкѣ около 700 к. с. пищевой смѣси. Слои почекъ различимы съ трудомъ. Сосуды основанія мозга немного уплотнены и извиты.

137. Петръ *Сѣровъ*, 48 л., крест., печникъ. Около 7 лѣтъ велъ жизнь крайне нетрезвую. Найденъ мертвымъ на откосѣ канала 8 нбр. 1906.

Вскрытіе 10 нбр. 1906. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, очень дряблое, особенно правый желудочекъ; во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь съ рыхлыми сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся сѣровато-желтоватыя плотныя бляшки величиной до чечевичнаго зерна; мышца сердца съ буроватымъ оттѣнкомъ, мѣстами проросла полосками жира; на сосочковыхъ мышцахъ замѣтны сѣроватыя плотныя полоски, повидимому, соединительной ткани, сухожильныя нити нѣсколько утолщены и укорочены. Содержимое желудка, повидимому, съ запахомъ спирта. Сосуды основанія мозга склерозированы. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, слои плохо различимы. При извлеченіи мозга былъ слышенъ спиртный запахъ.

138. Александръ *Михайловъ*, 50 л., сапожникъ, жизнь велъ крайне нетрезвую. Продавъ подушку, напился до безпамятства и свалившись на кровать уснулъ, а спустя немного времени усмотрѣнъ мертвымъ, 8 нбр. 1906.

Вскрытіе 11 нбр. 1906. Роста ниже средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ, особенно въ правомъ желудочкѣ, находится жидкая темная, какъ бы лаковая кровь; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся плоскія сѣровато-желтоватыя, но мѣстами объизвествленныя бляшки, величиной до чечевичнаго зерна; мышца сердца дряблая, желтовато-сѣроватаго цвѣта. Содержимое желудка съ запахомъ спирта. Сосуды основанія мозга склерозированы.

139. Осипъ *Снигиръ*, 49 л., крест., сапожникъ. Жаловался, что болитъ грудь. 12 нояб. 1906 скоропостижно умеръ въ пивной, сидя за столомъ; былъ трезвъ.

Вскрытіе 16 нояб. 1906. Средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосло-

женія, умѣреннаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, значительно обложено жиромъ, очень дряблое; всѣ его полости содержатъ кровь съ рыхлыми свертками; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся плотноватыя, сѣровато-желтоватыя, по мѣстамъ объизвествленныя бляшки, величиною до чечевичнаго зерна; просвѣтъ вѣнечныхъ артерій мѣстами суженъ почти до полнаго уничтоженія; мышца сердца очень дряблая, сѣровато-желтоватаго цвѣта. Сосуды основанія мозга склерозированы. Слои почекъ различимы съ трудомъ.

140. Михаилъ *Шиляковъ*, л. 40, мѣщ. Все время болѣлъ, кашлялъ и жаловался на боль въ груди. Шелъ изъ аптеки, присѣлъ на тумбу, пошелъ дальше, упалъ и тутъ же умеръ. 11 дек. 1906.

Вскрытіе 14 дек. 1906. Выше средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце нѣсколько увеличено, лѣвый желудочекъ очень дряблый; правый же—гораздо плотнѣе; во всѣхъ полостяхъ его находится темная кровь; на внутренней оболочкѣ аорты, отчасти и легочной артеріи находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки различной величины; мышца сердца лѣваго желудочка мясо-краснаго цвѣта, дряблая, тусклая; толщина стѣнки его 1,3 сант., праваго — 0,6; вѣнечныя артеріи сердца жестковаты, зіяютъ. На плоскости разрѣза легкихъ торчатъ сильно утолщенные бронхи и зіяютъ уплотненныя вѣтви легочной артеріи; просвѣты бронховъ закупорены слизистой гноевидной массой. Сосуды основанія мозга склерозированы.

141. Анна *Микфельдтъ*, 68 л., крест. Занималась поденно стиркой бѣлья. Не болѣла, образъ жизни вела нетрезвый. Вечеромъ 17 дек. 1906 на лѣстницѣ сдѣлалось дурно, привели ее въ квартиру, пила чай, потомъ легла въ кровать, черезъ нѣсколько минутъ стала сильно храпѣть, показывала только на грудь, ничего не отвѣчая на вопросы, и вскорѣ умерла.

Вскрытіе 20 дек. 1906. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Пальцы рукъ нѣсколько обезображены вслѣдствіе утолщеній въ суставахъ, особенно ногтевой фаланги со средней; измѣненія эти особенно рѣзко выражены на большомъ, указательномъ и среднемъ пальцахъ. По разрѣзѣ кожныхъ покрововъ шеи, мягкія ткани, окружающія гортань, представляются пропитанными кровью; въ кожѣ же и верхнихъ слояхъ подкожной клѣтчатки крови нѣтъ; въ клѣтчаткѣ, окружающей гортань и сосудисто-нервные пучки, замѣтно пропитываніе свернувшейся, отчасти жидкой кровью внизъ почти до шейныхъ позвонковъ и кверху до подъязычной кости; на щитовидномъ хрящѣ находится опухоль, величиной больше голубинаго яйца, неправильно яйцевидной формы, бугристая, костной плотности почти повсюду; при разрѣзѣ болѣе мягкихъ бугровъ этой опухоли они оказались выполненными коллоидными желтоватыми массами; опухоль эта находится въ соединеніи съ боковыми долями щитовидной железы, по удаленіи этой опухоли, щитовидный хрящъ оказался сломаннымъ; отверстіе, ведущее черезъ него въ полость гортани, имѣетъ неправильную форму; продольный діаметръ этого отверстія около 2,0 сант. а вѣтвь, идущая поперечно влѣво, около 1,0 снт. Сердце дрябловато; во всѣхъ его полостяхъ находится темная жидкая кровь; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся плотноватыя бѣловатыя бляшки различной величины; мышца сердца дрябловата, тусклая, буроватаго цвѣта. Содержимое желудка съ запахомъ спирта. Полость рта, глотки, гортани и пищевода содержитъ немного кровянистой жидкости; щитовидный хрящъ представляется разломаннымъ на 3 части; надхрящница его по мѣстамъ отслоена кровью; въ области щито-и перстневиднаго хрящей слизистая пропитана частью жидкой, частью свернувшейся кровью. Сосуды основанія мозга извиты, зіяютъ, покрыты бѣловатыми плотноватыми бляшками. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, ткань плот-

новата, корковый слой нѣсколько истончѣнъ. Въ желчномъ пузырѣ много многогранныхъ желчныхъ камней желтаго цвѣта.

142. Михаилъ *Бондаренковъ*, 35 л., крест., опредѣленныхъ занятій не имѣлъ, все время предавался сильному пьянству, пилъ по нѣсколько дней безъ просыпа, и почти каждый день приводили его на квартиру чуть-ли не въ безсознательномъ состояніи. Въ ночи на 24 дек. 1906 былъ доставленъ дворникомъ въ безсознательно-пьяномъ состояніи и уложенъ на кровать, спустя нѣкоторое время замѣчень былъ мертвымъ.

Вскрытіе 27 дек. 1906. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь, главнымъ же образомъ правая половина сердца переполнена темной кровью съ обильнымъ количествомъ рыхлыхъ темно-красныхъ сгустковъ; на внутренней оболочкѣ аорты находятся бѣловатыя плотныя бляшки величиною до чечевичнаго зерна; вѣнечныя артеріи жесткія, зіяютъ; мышца сердца очень дряблая, гланистаго цвѣта, мѣстами пророста полосками жира, мѣстами на ней замѣтны плотныя блестяще-бѣлыя полоски. Сосуды основанія мозга склерозированы.

143. Михаилъ *Луневъ*, 46 л., мѣщ., накладчикъ въ типографіи. Образъ жизни велъ нетрезвый, каждый день былъ пьянъ. Принесенъ 20 дек. 1906 домой въ сильно нетрезвомъ видѣ, легъ спать, захрапѣлъ, а спустя около часу умеръ.

Вскрытіе 29 дек. 1906. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, значительно обложено жиромъ; во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь съ рыхлыми темно-красными сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты имѣется нѣсколько бѣловатыхъ бляшекъ; вѣнечныя артеріи зіяютъ, жестковаты; мышца сердца бураго цвѣта, на ней замѣтны бѣловатыя полоски. Сосуды основанія мозга склерозированы. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, слои ихъ различимы.

144. Татьяна *Терпугова*, 39 л., финляндк. урож. Безъ занятій. Больна нога лѣвая, вся въ язвахъ, лечилась въ общинѣ, тамъ ее кормили и помогали ей, жизнь вела нетрезвую, какъ только появлялись деньги, она ихъ пропивала. Выпила вечеромъ двѣ сотки и легла спать, утромъ 29 дек. 1906 оказалась мертвой.

Вскрытіе 30 дек. 1906. Средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце значительно увеличено, сильно обложено жиромъ, очень дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь съ рыхлыми сгустками; мышца сердца очень дряблая, тусклая, гланистаго цвѣта, мѣстами пророста полосками жира; на внутренней оболочкѣ аорты находятся нѣсколько плотноватыхъ бѣловатыхъ бляшекъ, величиною до горошины. Содержимое желудка съ запахомъ спирта. Вокругъ почечныхъ лоханокъ замѣтно значительное отложеніе жира, пирамидки темно-красны, корковый слой бѣдный. Сосуды основанія мозга мягки, эластичны, слегка извиты.

145. Ольга *Иванова*, 46 л., жена кол. асс. По временамъ жаловалась на боль въ груди и кашляла, злоупотребляла спиртными напитками. Возвращаясь домой 1 янв. 1907 почувствовала себя дурно и не приходя въ себя умерла.

Вскрытіе 4 янв. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь; на внутренней оболочкѣ аорты находятся много плотноватыхъ бѣловатыхъ бляшекъ, величиной до чечевичнаго зерна; просвѣтъ вѣнечныхъ артерій мѣстами сильно суженъ; мышца сердца дряблота, туска, мясо-краснаго цвѣта съ гланистымъ оттѣнкомъ. Въ желудкѣ около 700 к. с. пищевой кашицы. Ткань почекъ мутновата, слои различимы съ трудомъ; лоханки сильно обложены жиромъ. Сосуды основанія мозга склерозированы.

146. Агафья *Ротникова*, 37 л., мѣщ., умерла 5 янв. 1907.

Вскрытіе 9 янв. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Вокругъ задняго прохода замѣтны геморроидальныя шишки. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находится много темной крови съ рыхлыми темно-красными сгустками; мышца сердца блѣдна, съ гланистымъ оттѣнкомъ; на внутренней оболочкѣ аорты, а также вѣнечныхъ артерій нѣсколько плотноватыхъ желтоватыхъ бляшекъ величиной до чечевичнаго зерна. Корковый слой почекъ блѣдноватый, мозговое вещество мясо-краснаго цвѣта, лоханки значительно обложены жиромъ. Сосуды основанія мозга склерозированы.

147. Николай *Горюнинъ*, на видъ около 35 л., умеръ 12 янв. 1907.

Вскрытіе 17 янв. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Голени и стопы нѣсколько отечны. Сердце немного увеличено, сильно обложено значительно жиромъ, дряблото, во всѣхъ его полостяхъ находится много темной жидкой крови съ рыхлыми темно-красными сгустками; на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій замѣтна небольшія бѣловатыя бляшки; мышца сердца дряблота, блѣдновата, жестковатого оттѣнка, по мѣстамъ пророста полосками жира. Въ желудкѣ около 800 к. с. пищевой кашицы съ запахомъ спирта. Сосуды основанія мозга склерозированы. При вынимании мозга, повидимому, былъ слышенъ спиртный запахъ.

148. Евдокія *Зелепухина*, 50 л., крест., скоропостижно умерла 7 фев. 1907.

Вскрытіе 12 фев 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, дряблое, сильно обложено жиромъ, во всѣхъ его полостяхъ находится частью жидкая, частью свернувшаяся кровь; на внутренней оболочкѣ аорты находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки величиною до боба; такія же бляшки находятся на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій, сухиная ихъ просѣчь почти совершенно или очень уничтожена; передняя вѣтвь нисходящаго разнокалѣберъ сверткомъ, начиная отъ устья на протяженіе около 1,5 сант.; мышца сердца дряблая, съ гланистымъ оттѣнкомъ, мѣстами пророста жировыми полосками. На артеріяхъ Сильвіевыхъ бороздъ извѣстна нѣсколько бѣловатыхъ бляшекъ величиною до конопляного зерна. На плоскости разрѣза легкихъ торчатъ бронхи съ утолщенными стѣнками; изъ просѣча бронховъ выдавливаются слизистыя, гноевидныя массы. Ткани темнаго сморщены, капсула почекъ снимается съ трудомъ, поверхность ихъ неровная, ткань плотноватая, слои плохо различимы.

149. Иванъ *Шаровъ*, 34 л., крест., плотникъ. Сильно пилъ водку. Пьяный пришелъ вечеромъ 9 фев. 1907 въ трактиръ и найденъ тамъ мертвымъ въ ремонтируемой комнатѣ.

Вскрытіе 14 фев. 1907. Средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія и умѣреннаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблотато; во всѣхъ его полостяхъ — жидкая темная кровь; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣется нѣсколько бѣловатыхъ бляшекъ величиною отъ чечевичнаго зерна; мышца сердца дряблотата, съ желтизной. Въ желудкѣ около литра пищевой смѣси съ рѣзкимъ запахомъ спирта. Почечныя лоханки сильно обложены жиромъ, слои плохо различимы. Сосуды основанія мозга склеза извиты.

150. Ида *Генкель*, 35 л., крест., нигдѣ не занималась. Вела образъ жизни нетрезвый, послѣднее время прекратила пить водку. Очень часто страдала припадками падучей. 16 фев. 1907 жаловалась съ утра на головную боль, а ночью услышали паденіе тѣла съ кровати и стоны, нашли Г. хрипящей, черезъ нѣсколько минутъ умерла.

Вскрытіе 19 фев. 1907. Средняго роста и тѣлосложенія, достаточнаго питанія. Лицо не вполнѣ симметричное, лѣвый уголъ рта немного опущенъ. Больная половыя губы, голени и стопы отечны. Въ обѣихъ по-

ловинахъ сердца порядочное количество совершенно жидкой крови, сердечная мышца блѣдна, желтовата, дряблая, заслонки аорты слегка утолщены, на внутренней ея оболочкѣ замѣтны небольшія фиброзныя утолщенія. Почки слегка уменьшены, при сниманіи капсулы отходятъ частицы корковаго слоя, который представляется довольно тонкимъ, пирамидки мѣстами низки, цвѣтъ ткани блѣдный, плотность замѣтно повышена.

151. Илья *Севастьяновъ*, 32 л., крест. 15 фев. 1907 съѣвши пирога почувствовалъ себя дурно, была рвота раза три; днемъ работалъ, вечеромъ на улицѣ упалъ и отправленный въ больницу по дорогѣ умеръ. Спиртныхъ напитковъ въ послѣднее время не употреблялъ.

Вскрытіе 20 фев. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце значительно увеличено, дрябло; во всѣхъ его полостяхъ находится много темной жидкой крови; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются плотноватыя бѣловатыя точки величиною до чечевичнаго зерна; вѣнечныя артеріи жестковаты, зіяютъ; просвѣтъ ихъ мѣстами сильно суженъ; мышца сердца дряблая, кое-гдѣ на немъ замѣтны болѣе свѣтлыя части съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Сосуды основанія мозга нѣсколько извиты.

152. Михаилъ *Васильевъ*, 50 л., ремесл. Убился при паденіи съ лѣстницы 17 фев. 1907.

Вскрытіе 24 фев. 1907. Роста немного выше средняго, тѣлосложенія слабаго и плохого питанія. Сердце нѣсколько увеличено, дрябло, значительно обложено жиромъ. во всѣхъ его полостяхъ находится много жидкой темноватой крови. На внутренней оболочкѣ аорты имѣется нѣсколько бѣловатыхъ бляшекъ, величиною до горошины; мышца съ желтоватымъ оттѣнкомъ, по мѣстамъ проросла полосками жира, дрябловата. Содержимое желудка съ рѣзкимъ спиртнымъ запахомъ. Отъ мозга исходитъ рѣзкій спиртный запахъ. Сосуды основанія мозга плотноваты. Въ верхушкахъ легкихъ прощупывается нѣсколько плотноватыхъ узелковъ величиною до голубинаго яйца.

153. Мавра *Казанцева*, 58 л., крест., чернорабочая. Утромъ 4 марта 1907 найдена мертвой.

Вскрытіе 9 марта 1907. Роста ниже средняго, умѣреннаго сложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, дряблое, сильно обложено жиромъ; полости его почти пусты; лѣвое венозное отверстіе съ трудомъ пропускаетъ верхушки двухъ пальцевъ; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются плотновато-бѣловатыя бляшки, величиною до чечевичнаго зерна; устье вѣнечныхъ артерій нѣсколько сужено; мышца сердца дрябловата, съ глинистымъ оттѣнкомъ. Сосуды основанія мозга нѣсколько извиты.

154. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, 45 л., рабочій. 5 марта 1907 въ сильно пьяномъ видѣ отправленъ былъ въ пріемный покой, гдѣ часа черезъ 3 умеръ, не приходя въ сознаніе

Вскрытіе 14 марта 1907. Роста выше средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Кожа на голеняхъ и стопахъ отечна. Сердце нѣсколько увеличено, довольно сильно обложено жиромъ, дрябловато; во всѣхъ его полостяхъ находится много темной крови съ рыхлыми темно-красными сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты нѣсколько плотноватыхъ бѣловатыхъ бляшекъ, величиною до горошины; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 1,5 сант.; мышца сердца сѣро-краснаго цвѣта, дрябловата, проросла полосками жира. Сосуды основанія мозга слегка извиты.

155. Никифоръ *Евстифѣевъ*, 33 л., мѣщ. Скоропостижно умеръ 23 марта 1907. Пьянствовалъ и не работалъ.

Вскрытіе 29 марта 1907. Средняго роста. умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, дряблое, довольно сильно об-

ложено жиромъ; во всѣхъ его полостяхъ, особенно въ правой половинѣ находится темная кровь съ обильными рыхлыми темно-красными сгустками; на внутреней оболочкѣ аорты нѣсколько маленькихъ бѣловатыхъ плоскихъ бляшекъ; мышца сердца дряблая, глинистаго цвѣта, легко рвется. Сосуды основанія мозга склерозированы.

156. Никита *Богдановъ*, 29 л., крестьянинъ, портной. Найденъ мертвымъ на улицѣ 26 марта 1907.

Вскрытіе 2 апр. 1907. Роста выше средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено, довольно значительно обложено жиромъ, дрябловато; всѣ его полости переполнены темной жидкой кровью; мышца сердца сѣро-краснаго цвѣта, въ ея толщѣ замѣтны многочисленныя сѣроватыя плотныя точки и полоски; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются мутноватыя бѣловатыя бляшки отъ маковаго зерна до небольшой горошины. Сосуды основанія мозга слегка извиты.

157. Евдокія *Трофимова*, 67 л., мѣщ. Ходила она медленно, страдала одышкой, изо рта текла слюна; часто пила вино. Найдена была мертвой на диванѣ 10 сент. 1907.

Вскрытіе 13 сент. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце значительно увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблое, всѣ полости его выполнены обильными рыхлыми темнокрасными кровяными сгустками; внутренняя оболочка аорты представляется почти вся очень плотной, обильно покрытой объизвествленными бородавчатыми разращеніями; мышца сердца очень дрябла, глинистаго цвѣта; вѣнечныя артеріи очень жестки, внутренняя ихъ оболочка покрыта большимъ количествомъ плотныхъ объизвествленныхъ бляшекъ, суживающихъ просвѣтъ артеріи почти до полнаго уничтоженія. Сосуды основанія мозга склерозированы.

158. Филиппъ *Михайловъ*, 43 л., крест., полотеръ. Сильно пьянствовалъ, пилъ не переставая по цѣлому мѣсяцу. Послѣдній разъ запилъ съ 14 сент., выпивалъ чуть-ли не по цѣлой четверти въ день; жаловался на сильный кашель и одышку. Ночью ему сдѣлалось дурно, стало сильно рвать, жаловался на сильную боль въ груди, утромъ стало легче, уснулъ и спустя немного былъ найденъ мертвымъ, 26 сент. 1907.

Вскрытіе 30 сент. 1907. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце раза въ $1^1/_2$ больше кулака покойнаго, очень дряблое, сильно обложено жиромъ, во всѣхъ его полостяхъ находится много темной крови съ обильными темнокрасными рыхлыми сгустками, мышца сердца очень дряблая, глинистаго цвѣта, тусклая, легко рвется; на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки. Пищевая смѣсь въ желудкѣ имѣетъ запахъ бродящаго тѣста. Сосуды основанія мозга жестковаты и нѣсколько извиты.

159. Александръ *Шестаковъ*, 58 л., мѣщ., кучеръ. Изрѣдка злоупотреблялъ спиртными напитками. Найденъ мертвымъ 4 нояб. 1907 лежавшимъ на полу.

Вскрытіе 8 нояб. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, довольно сильно обложено жиромъ, дрябло, полости его почти пусты; на внутренней оболочкѣ аорты находится нѣсколько плотноватыхъ бѣловатыхъ бляшекъ величиною до чечевичнаго зерна; основаніе полулунныхъ клапановъ аорты нѣсколько утолщено; мышца сердца дрябловата, глинистаго цвѣта; устье вѣнечныхъ артерій довольно сильно сужено. Въ лѣвой верхней долѣ легкихъ находится уплотненіе величиной съ небольшое яблоко, состоящее изъ сѣровато-желтоватыхъ сыровидныхъ массъ. Сосуды основанія мозга жестковаты, извиты.

160. Александръ *Ремизовъ*, 40 л., крест. Въ сильно нетрезвомъ видѣ 10 нояб. 1907 прилегъ на полъ и часа черезъ два былъ замѣченъ мертвымъ.

Вскрытіе 13 ноябр. 1907. Средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь съ рыхлыми сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты имѣется нѣсколько плотноватыхъ бѣловатыхъ бляшекъ, величиной до чечевичнаго зерна; вѣнечныя артеріи жестковаты; мышца сердца дрябловата, глинистаго цвѣта, проросла полосками жира. Въ желудкѣ около 600 к. с. жидкости, съ запахомъ,бродящаго тѣста. Сосуды основанія мозга склерозированы. При выниманіи мозга былъ слышенъ спиртный запахъ.

161. Яковъ *Линдъ*, 53 л., слесарь. Часто кашлялъ, и часто тошнило. Послѣ обѣда 10 дек. 1907 чувствовалъ тошноту, нашли его лежащимъ на улицѣ, по дорогѣ въ пріемный покой умеръ.

Вскрытіе 12 дек. 1907. Роста выше средняго, крѣпкаго сложенія, средняго питанія. Сердце увеличено; во всѣхъ его полостяхъ имѣется въ изобиліи темная жидкая кровь съ темными рыхлыми сгустками; мускулатура сердца жесткая мѣстами, а мѣстами пятнисто-желтовата и мягка; стѣнка праваго желудочка истончена прорастающимъ жиромъ до 0,15 снт.; въ вѣнечныхъ артеріяхъ, извилистыхъ и широко зіяющихъ, мѣстами встрѣчаются желтыя суживающія просвѣтъ бляшки, а на нѣкоторыхъ, видимо, изъязвленныхъ замѣчаются красноватыя отложенія фибрина. Почки много жестче нормы.

162. Иванъ *Леонтьевъ*, 61 г., крест., столяръ. Страдалъ сильной одышкой. Утромъ 8 дек. 1907 найденъ на своей кровати мертвымъ.

Вскрытіе 13 дек. 1907. Роста выше средняго, умѣреннаго тѣлосложенія, питанія слабаго. Сердце раза въ $1^1/_2$ больше кулака покойнаго, сильно обложено желтоватымъ жиромъ, очень дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находится много темной крови съ обильными темнокрасными рыхлыми сгустками и сѣровато-желтоватыми студенистыми плотноватыми свертками; основаніе клапановъ аорты нѣсколько утолщено; вѣнечныя артеріи представляются въ видѣ очень жесткихъ трубокъ съ довольно толстыми объизвествленными стѣнками, которыя даже не рѣжутся ножницами; просвѣтъ артерій мѣстами суженъ до полнаго уничтоженія; мышца сердца на разрѣзѣ имѣетъ пестрый видъ вслѣдствіе многочисленныхъ сѣровато-бѣловатыхъ пятенъ и полосъ, разсѣянныхъ по буровато-желтоватому полю; мѣстами мышца сердца проросла полосками жира. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, поверхность ихъ зерниста, ткань плотновата, корковый слой нѣсколько истонченъ. На плоскости разрѣза легкихъ торчатъ по мѣстамъ нѣсколько расширенные съ утолщенными стѣнками бронхи; въ ихъ просвѣтѣ замѣтны слизистыя гноевидныя массы. Сосуды основанія мозга склерозированы.

163. Василій *Харьковъ*, 39 л., крест. умеръ 2 янв. 1908.

Вскрытіе 9 янв. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, мышца сердца дряблая, глинистаго цвѣта, по мѣстамъ проросла полосками жира; вѣнечныя артеріи жестковаты; на ихъ внутренней оболочкѣ находится немного бѣловатыхъ бляшекъ. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста. Сосуды основанія мозга жестковаты.

164. Васса *Грознова*, 52 л., крест., чернорабочая. Вела жизнь нетрезвую, весь заработокъ пропивала. Найдена мертвой 28 дек. 1907.

Вскрытіе 6 янв. 1908. Роста ниже средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. На правой сторонѣ надломы реберъ 3—6, на лѣвой 3—7, почти у мѣстъ соединенія съ хрящами, мягкія ткани въ окружности надломовъ пропитаны темною кровью; ребра вообще довольно

тонки и хрупки. Сердце увеличено, довольно сильно обложено жиромъ, дрябловато; во всѣхъ его полостяхъ находится много темной крови съ обильными рыхлыми сгустками и съ студенистыми довольно плотными свертками; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся плотноватыя бѣловатыя бляшки; мышца сердца дрябловата, съ глинистымъ оттѣнкомъ, по мѣстамъ проросла полосками жира. Содержимое желудка съ запахомъ спирта. Сосуды основанія мозга склерозированы.

165. Иванъ *Наумовъ*, 30 л., крест., сгонщикъ скота. Жизнь велъ крайне нетрезвую, пьянствовалъ безпрестанно. 5 янв. 1908 внезапно упалъ и умеръ.

Вскрытіе 10 янв. 1908. Роста выше средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце раза въ $1^1/_2$ больше кулака покойнаго, дряблое, сильно обложено жиромъ; во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь съ рыхлыми сгустками; вѣнечныя артеріи очень жестки вслѣдствіе значительнаго отложенія извести; мышца сердца очень дрябла, глинистаго цвѣта. На костяхъ черепа двѣ трещины зигзагообразныя: одна, начавшись у большого затылочнаго отверстія, направляется по задней лѣвой черепной ямкѣ кнаружи и затѣмъ кверху и немного не доходитъ до лѣваго теменнаго бугра, другая, начавшись на чешуѣ лѣвой височной кости надъ пирамидой, направляется почти горизонтально кпереди и оканчивается въ передней черепной ямѣ надъ глазницей. Между твердой мозговой оболочкой и мягкой въ правой средней черепной ямѣ находится слой темной отчасти свернувшейся крови, толщиною около 0,1 сант., занимающей пространство немного больше серебрянаго рубля; на лѣвой же сторонѣ только на небольшомъ пространствѣ величиной съ копѣечную монету мягкая мозговая оболочка оказалась пропитанной темной кровью. Сосуды основанія мозга склерозированы. Верхняя доля праваго легкаго плотновата, на разрѣзѣ имѣетъ мраморный видъ: на темно-красномъ фонѣ замѣтны слегка возвышающіеся сѣровато-желтоватые немного зернистые островки; кусочки ткани изъ этого мѣста легко тонутъ въ водѣ. Плевра соотвѣтственно этому мѣсту представляется матовою, покрытой небольшимъ легко снимающимся налетомъ. Ткань почекъ нѣсколько тускловата, сѣровато-красноватаго цвѣта.

166. Янъ *Гляватикъ*, 50 л., австрійскій подданный, проволочникъ. Часто жаловался на боль въ лѣвомъ боку. Послѣднія двѣ недѣли сильно пилъ водку, каждый день былъ пьянъ. Скоропостижно умеръ 7 янв. 1908.

Вскрытіе 14 янв. 1908. Выше средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце раза въ два больше кулака покойнаго, очень дряблое, сильно обложено жиромъ; во всѣхъ его полостяхъ находится много темной крови съ обильными свертками; мышца сердца очень дряблая, глинистаго цвѣта, легко рвется; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,3 снт., лѣваго около 0,8; полости желудочковъ значительно расширены; на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій и аорты находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки. Сосуды основанія мозга склерозированы. Слизистая оболочка толстыхъ кишекъ и прилегающей части подвздошной кишки блѣдно-красноватаго цвѣта, нѣсколько утолщена, на ней встрѣчаются въ довольно большомъ количествѣ катарральныя язвы величиной до большой горошины.

167. Петръ *Ивановъ*, 46 л., крест., столяръ Прежде велъ жизнь сильно нетрезвую, но около года какъ водки не пилъ. Второй мѣсяцъ ежедневно жаловался на боль въ груди и одышку. 12 янв. 1908 прилегъ утромъ на постель и незамѣтно для окружающихъ умеръ.

Вскрытіе 16 янв. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, довольно сильно обложено жи-

ромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находится густая темная кровь съ рыхлыми сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки, мышца сердца тускловата. Въ желудкѣ около 600 к. с. пищевой кашицы. Изъ перерѣзанныхъ нѣсколько утолщеныхъ и торчащихъ съ плоскости разрѣза бронховъ выдавливаются гноевидныя массы. Лоханки почечныя обложены жиромъ. Сосуды основанія мозга склерозированы.

168. Михаилъ *Васильевъ*, 45 л., парикмахеръ. Алкоголикъ. Чувствуя себя плохо ночью, утромъ совсѣмъ занемогъ, а часа черезъ 2 въ страшныхъ мученіяхъ умеръ, 22 фев. 1908.

Вскрытіе 27 фев. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, довольно сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ много темной крови съ обильными темнокрасными свертками; толщина стѣнокъ лѣваго желудочка около 1,0 снт., праваго 0,5; мышца дряблая, глинистаго цвѣта; внутренняя поверхность аорты окрашена въ сплошной темнокрасный цвѣтъ; на ней довольно много бѣловатыхъ плотноватыхъ бляшекъ. Сосуды основанія мозга склерозированы. Отъ мозга и содержимаго желудка исходитъ спиртный запахъ.

169. Анна *Бычкова*, 40 л., крест. Съ января сильно предавалась пьянству, ежедневно была пьяная. Пьяная легла спать, утромъ не вставала и около часа дня умерла, 25 фев. 1908.

Вскрытіе 28 фев. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, очень дряблое, полости его почти пусты, внутренняя оболочка сплошного грязно-краснаго цвѣта; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца очень дряблая, глинистаго цвѣта, проросла полосками жира. Содержимое желудка съ запахомъ спирта. Лѣвая почка очень дряблая, правая увеличена раза въ полтора, капсула ея снимается съ трудомъ, ткань плотновата, корка слегка истончена. Сосуды основанія мозга жестковаты. При выниманіи мозга слышенъ спиртный запахъ.

170. Мартъ *Рабба*, 46 л. крест., слесарь—водопроводчикъ. Послѣднее время находился безъ всякихъ занятій, образъ жизни велъ нетрезвый. 2 Марта 1908 въ сильно-нетрезвомъ видѣ проходя по панели, упалъ; по дорогѣ въ часть умеръ.

Вскрытіе 6 марта 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце немного увеличено, довольно сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находится много темной крови; мышца сердца имѣетъ пестрый видъ; на буроватомъ фонѣ замѣтны многочисленныя бѣловатыя полоски и бляшки; мѣстами мышца проросла полосками жира; на внутренней оболочкѣ аорты находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки; вѣнечныя артеріи жестковаты. Отъ содержимаго желудка и мозга—спиртный запахъ. Сосуды основанія мозга жестковаты, зіяютъ.

171. Прасковья *Громова*, 30 л., крест. Злоупотребляла спиртными напитками. Легла пьяная, ночью обнаружена была мертвой, 13 марта 1908.

Вскрытіе 15 марта 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблое, въ его полостяхъ темная кровь; мышца дрябловата, пестрая, мѣстами буроватаго, мѣстами желтовато-глинистаго цвѣта, а мѣстами покрыта бѣловато-сѣроватыми пятнами и полосками; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій замѣтны бѣловатыя плотноватыя бляшки; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,3, а лѣваго—около 0,7; полости обоихъ желудочковъ расширены. Содержимое желудка съ запахомъ спирта, при выниманіи мозга слышенъ спиртный запахъ. Сосуды основанія мозга извиты.

172. Александра *Додонова*, 40 л., крест., занималась вязаніемъ мете-

локъ въ лѣсу. Постоянно пьянствовала и была на излеченіи въ больницѣ, откуда выписалась 7 сент., а 9 сент. сильно пьяная пришла къ товаркамъ по ремеслу въ лѣсъ, гдѣ еще выпила и закусила жареными грибами, ее вырвало; съ этого времени стала болѣть, жаловалась на болѣзнь во всѣмъ тѣлѣ, ничего не ѣла, только постоянно пила, а 14 сент. 1908 была найдена въ лѣсу мертвой.

Вскрытіе 17 сент., 1908. Средняго роста, слабаго сложенія, плохого питанія. Сердце нѣсколько увеличено, почти сплошь обложено жиромъ, дряблое; полости его выполнены темною кровью съ темно-красными рыхлыми сгустками и сѣровато-желтоватыми довольно плотными свертками; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца сердца дряблая, легко рвется, глинистаго цвѣта; мѣстами проросла полосками жира. Въ верхушкахъ легкихъ прощупываются небольшіе плотноватые узелки; изъ перерѣзанныхъ бронховъ выдавливается гноевидная слизистая жидкость. Ткань почекъ дрябловата, тусклая, корковый слой слегка утолщенъ.

173. Константинъ *Семеновъ*, 59 л., крест. Страдалъ сильной одышкой и даже по ночамъ не спалъ, при томъ любилъ выпить. Работать по дряхлости и болѣзни года 3—4 не работалъ. Скоропостижно умеръ 15 сент. 1908.

Вскрытіе 18 сент. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія, плохого питанія. Лѣвое колѣнное сочленіе неправильно шарообразной формы вслѣдствіе болѣзненнаго разростанія суставныхъ концовъ костей; правое голеностопное тоже нѣсколько обезображено вслѣдствіе измѣненія костей. Сердце нѣсколько увеличено, довольно сильно обложено жиромъ, дряблое; всѣ его полости растянуты темною кровью съ темнокрасными сгустками; на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій имѣются обильныя бѣловатыя плотноватыя бляшки, мѣстами суживающія ихъ просвѣтъ почти до полнаго уничтоженія; мышца серца дряблая, съ глинистымъ оттѣнкомъ, мѣстами проросла жиромъ. Легкія довольно объемисты; въ переднихъ отдѣлахъ ткань сѣроватая, суховатая (эмфизематозна); бронхи утолщены, выполнены гноевидными слизистыми массами. Въ желчномъ пузырѣ немного темной густой желчи съ 5 маленькими камешками Сосуды основанія мозга склерозированы.

174. Григорій *Романовъ*, 42 л., басонщикъ. Сильно предавался пьянству. Вечеромъ былъ сильно пьянъ, ночью свалился съ постели и умеръ, 16 сент. 1908. Часто падалъ и раньше съ кровати, когда пьяный ложился.

Вскрытіе 20 сент. 1908. По виду старше своихъ лѣтъ, средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, довольно сильно обложено жиромъ, очень дряблое, во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь съ рыхлыми сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты имѣются бѣловатыя бляшки; мышца сердца очень дряблая, глинистаго цвѣта, на разрѣзѣ имѣетъ слабо выраженный пестрый видъ, по мѣстамъ проросла полосками жира. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста. Сосуды основанія мозга зіяютъ, извиты.

175. Михаилъ *Севастьяновъ*, 42 л. Страдая болѣзнью живота и катарромъ желудка 18 сент. 1908 обратился вмѣстѣ съ женой къ Евдокіи Быстровой—женѣ заводскаго рабочаго, которая давно уже лечитъ отъ всякихъ болѣзней и была нѣсколько разъ привлекаема за это къ отвѣтственности, но оправдывалась мировымъ судьей 6-го участка. Б. предложила пить смѣсь изъ 2 бутылокъ водки, одной бытылки пива и бутылки меду. Жена выпила стаканъ, С. три стакана, а Быстрова остальное; при этомъ крестила каждый стаканъ и шептала молитвы. Съ С. сдѣлалось дурно, онъ ослабъ, вышелъ на крыльцо, гдѣ его рвало, легъ тамъ на полу и немного спустя умеръ.

Вскрытіе 23 сент. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце довольно сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ

его полостяхъ довольно много темной крови съ рыхлыми сгустками; внутренняя оболочка аорты вся какъ-бы изрыта, покрыта почти сплошь плотными бляшками; подобныя же бляшки меньшей величины находятся на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій; мышца сердца дряблая, на разрѣзѣ имѣетъ пестрый видъ; на болѣе темномъ фонѣ глинистаго цвѣта находятся болѣе свѣтлыя пятна и полоски; мѣстами мышца проросла жиромъ.

176. Купріянъ *Козловъ*, 53 л., крест., торговецъ. Постоянно сильно пьянствовалъ. 18 сент. 1908 пришелъ сильно выпивши въ гости и попросилъ лечь, и уснулъ, чрезъ два часа обнаруженъ былъ мертвымъ.

Вскрытіе 24 сент. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, дряблое, во всѣхъ его полостяхъ темная кровь съ рыхлыми темнокрасными сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца сердца глинистаго цвѣта, очень дряблая. Сосуды основанія мозга склерозированы.

177. Михаилъ *Бычковъ*. 46 л., крест. Велъ нетрезвый образъ жизни, въ особенности въ послѣднее время предавался сильному пьянству. Въ сильно нетрезвомъ видѣ 23 сент. 1908 вернулся домой и легъ спать; ночью обнаруженъ былъ мертвымъ.

Вскрытіе 27 сент. 1908. Средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ, очень дряблое, полость его растянута темной густой кровью съ рыхлыми темнокрасными сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки; просвѣтъ вѣнечныхъ артерій слегка суженъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 0,7 снт., праваго около 0,3; полости довольно сильно растянуты; мышца дряблая, съ глинистымъ оттѣнкомъ. Въ желудкѣ около 600 к. с. жидкости съ запахомъ бродящаго тѣста. Сосуды основанія мозга склерозированы.

178. Иванъ *Зеленцовъ*, 57 л., крест., служ. въ мясной лавкѣ. Злоупотреблялъ прежде спиртными напитками, но недѣли двѣ назадъ пересталъ пить. Вечеромъ жаловался на боль подъ ложечкой и спать ложился, чувствуя себя не совсѣмъ здоровымъ. Около 5 часовъ утра во снѣ вскрикнулъ, впалъ въ безсознательное состояніе и по дорогѣ въ больницу умеръ. 1 окт. 1908.

Вскрытіе 6 окт. 1908. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, довольно сильно обложено жиромъ, дрябловато, во всѣхъ его полостяхъ много темной крови съ рыхлыми сгустками; вѣнечныя артеріи жестки, прощупываются какъ плотные шнуры; просвѣтъ ихъ мѣстами суженъ почти до полнаго уничтоженія; клапаны слегка утолщены; на внутренней поверхности аорты находится много плотныхъ, мѣстами объизвествленныхъ, мѣстами изъязвившихся бляшекъ; мышца сердца буроватаго цвѣта, на плоскости разрѣза замѣтны бѣловатыя плотноватыя бляшки; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 1,5 снт., праваго—0,4. Сосуды основанія мозга склерозированы. На плоскости разрѣза легкихъ торчатъ утолщенные бронхи съ выполняющими ихъ слизисто-гноевидными массами.

179. Семенъ *Журкинъ*, 39 л., крест., штукатуръ. Изрѣдка пилъ водку. Пришелъ въ нетрезвомъ видѣ и легъ спать. Утромъ напившись чаю снова легъ въ постель, около 8 часовъ утра сталъ кряхтѣть и тяжело дышать, и вскорѣ умеръ, 7 окт. 1908. Былъ все время здоровъ и никогда ни на что не жаловался.

Вскрытіе 11 окт. 1908. Роста выше средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено, довольно сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ много темной крови; на внутренней оболочкѣ аорты очень много плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ, мѣстами изъязвившихся; отверстія вѣнечныхъ артерій

едва замѣтны, мѣстами просвѣтъ ихъ суженъ почти до полнаго уничтоженія; мышца сердца дряблая, глинистаго цвѣта, проросла жиромъ. Почки слегка уменьшены, капсула ихъ снимается съ трудомъ, поверхность ихъ зерниста, корковый слой нѣсколько истонченъ, плохо отличимъ отъ мозгового; пирамидки укорочены, лоханки сильно обложены жиромъ. Сосуды основанія мозга жестковаты.

180. Евдокія *Кашина*, 40 л., крест., почти ничѣмъ не занималась, питалась подаяніями. Все время пьянствовала. Найдена мертвой на полѣ, 7 окт. 1908.

Вскрытіе 11 окт. 1908. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, во всѣхъ его полостяхъ много темной густой крови; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки величиной до чечевичнаго зерна; мышца сердца буроватаго цвѣта, проросла жиромъ. Сосуды основанія мозга жестки, извиты, зіяютъ.

181. Феликсъ *Сухаревскій*, 35 л., электротехникъ. Долгое время пьянствовалъ, послѣднюю недѣлю ежедневно былъ мертвецки пьянъ, и его каждый день вечеромъ приводили домой. Обнаруженъ мертвымъ утромъ 8 окт. 1908.

Вскрытіе 13 окт. 1908. Роста средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, довольно сильно обложено жиромъ, дрябло; во всѣхъ его полостяхъ довольно много темной густой крови; на внутренней оболочкѣ аорты имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца сердца очень дряблая, глинистаго цвѣта, проросла жиромъ. Въ желудкѣ около 700 к. с. пищевой смѣси съ запахомъ бродящаго тѣста. Сосуды основанія мозга извиты, жестковаты.

182. Николай *Рябовъ*, 51 г., крест., каменотесъ. Всегда пьянъ, найденъ мертвымъ на лѣстницѣ 12 окт. 1908.

Вскрытіе 16 окт. 1908. Роста немного выше средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ; во всѣхъ полостяхъ его много темной крови съ темно-красными рыхлыми сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца сѣро-краснаго цвѣта, на разрѣзѣ замѣтны бѣловатыя прослойки, у верхушки мышца сильно проросла жиромъ. Отъ желудка и мозга исходитъ запахъ спирта. Изъ перерѣзанныхъ сильно торчащихъ бронховъ выдавливаются слизистыя гноевидныя массы. Сосуды основанія мозга склерозированы.

183. Иванъ *Антоновъ*, 42 л., крест., каменщикъ. Водки пилъ очень мало, ничѣмъ не болѣлъ. 14 окт. 1908 утромъ во время чая почувствовалъ головную боль, повязалъ голову полотенцемъ, смоченнымъ теплой водой, и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 17 окт. 1908. Роста выше средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, очень дряблое, полости его сильно растянуты рыхлыми темно-красными кровяными сгустками; на наружной поверхности сердца имѣются три молочно-бѣлыхъ пятна величиною съ двугривенный; на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій имѣются бѣловатыя бляшки; мышца сердца глинистаго цвѣта, дряблая, проросла полосками жира, толщина стѣнки праваго желудочка около 0,3 снт., лѣваго—0,7. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, поверхность имѣетъ неравномѣрно-зернистый видъ, ткань плотновата, корковый слой толщиною 0,7 снт., лоханки довольно сильно обложены жиромъ; въ лѣвой почкѣ, въ корковомъ слоѣ находится полость величиною съ большую горошину съ довольно плотными стѣнками, выполненная жидкимъ прозрачнымъ содержимымъ. Сосуды основанія мозга склерозированы.

184. Александръ *Лобановъ*, 27 л., кресть., чернорабочій. Разъ три лежалъ въ больницѣ, гдѣ его лечили отъ чрезмѣрнаго употребленія спиртныхъ напитковъ; два мѣсяца не пилъ, а затѣмъ въ теченіе послѣднихъ двухъ недѣль постоянно являлся домой въ пьяномъ видѣ. Былъ слабаго здоровья и каждый разъ послѣ пьянства сильно болѣлъ. Придя 19 окт. 1908 въ нетрезвомъ видѣ, легъ спать по обыкновенію на полу, и черезъ два часа замѣчено былъ мертвымъ.

Вскрытіе 22 окт. 1908. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце немного увеличено, во всѣхъ его полостяхъ много темной густой крови; на внутренней оболочкѣ аорты имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца сердца имѣетъ пестрый видъ; на буроватомъ фонѣ замѣтны бѣловатыя полоски и бляшки; у верхушки сердца мышца проросла жиромъ. Содержимое желудка и кишекъ—съ запахомъ спирта. Ткань почекъ плотновата. Сосуды основанія мозга извиты, жестковаты.

185. Григорій *Иоанновъ*, 54 л., кресть., плотникъ. Постоянно пьющій занятій не имѣлъ, неоднократно приходилъ домой въ нетрезвомъ видѣ. 29 окт. 1908 былъ въ баняхъ утромъ, затѣмъ пошелъ въ чайную, гдѣ жаловался на головную боль; часа черезъ 4 легъ въ чайной на полу и тутъ же умеръ.

Вскрытіе 28 окт. 1908. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, дряблое; вѣнечныя артеріи на немъ прощупываются какъ плотные шнурки; во всѣхъ полостяхъ сердца много крови съ темно-красными рыхлыми свертками; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій много бѣловатыхъ плотноватыхъ бляшекъ; мѣстами просвѣтъ вѣнечныхъ артерій суженъ почти до полнаго уничтоженія; мышца сердца имѣетъ пестрый видъ; на буроватомъ фонѣ многочисленными сѣровато-бѣловатыя пятна и прослойки. Сосуды основанія мозга склерозированы.

186. Алексѣй *Александровъ*, 33 л., кресть., содержатель галантерейнаго магазина. Около 3 лѣтъ сильно злоупотреблялъ спиртными напитками. 25 окт. 1908 былъ сильно пьянъ и придя домой легъ спать въ корридорѣ на полу, гдѣ и обнаруженъ былъ мертвымъ.

Вскрытіе 29 окт. 1908. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено разъ въ $1^1/_2$, у верхушки особенно обложено жиромъ, дряблое, во всѣхъ его полостяхъ много темной крови съ рыхлыми темно-красными сгустками; внутренняя оболочка сердца окрашена въ сплошной довольно интенсивный темно-красный цвѣтъ; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки; толщина стѣнки праваго желудочка 0,5 сант., вѣраго—около 1,0; мышца очень дряблая, темно-глинистаго цвѣта, легко рвется, мѣстами проросла жиромъ. Лохаини почекъ сильно обложены жиромъ. Сосуды основанія мозга жестковаты, извиты, зіяютъ.

187. Павелъ *Евграфовъ*, 50 л., кресть. Послѣднее время сильно пьянствовалъ, кашлялъ. Скоропостижно умеръ 7 фев. 1909.

Вскрытіе 13 фев. 1909. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Стопы отечны. Сердце нѣсколько увеличено, дряблое; полости сердца переполнены темною густою кровью съ обильными рыхлыми темно-красными сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца сердца имѣетъ пестрый видъ: на красновато-буроватомъ фонѣ жестковатые островки, мѣстами проросла жировыми полосками. Ткань почекъ плотновата, лохаини обложены жиромъ. На плоскости разрѣза легкихъ торчатъ утолщенные бронхи, просвѣтъ которыхъ выполненъ слизистыми гнойными массами. Сосуды основанія мозга склерозированы.

188. Настасья *Ничтожна*, 30 л., кресть., проститутка. Все время пьянствовала. Скоропостижно умерла на улицѣ 9 окт. 1909.

Вскрытіе 10 окт. 1909. Роста средняго, тѣлосложенія довольно крѣпкаго, питанія умѣреннаго. Сердце немного увеличено, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ темная густая кровь; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются бѣловатыя бляшки. Въ желудкѣ около 500 к. с. пищевой массы съ запахомъ спирта. При выниманіи мозга слышенъ спиртный запахъ.

189. Семенъ *Крыловъ*, 26 л., кресть., приказчикъ въ пивной лавкѣ. Пришелъ 7 окт. 1909 на квартиру въ началѣ 11-го ч. вечера и легъ спать, спустя минутъ 20 началъ стонать, а потомъ его стало трясти и часовъ въ 11 умеръ.

Вскрытіе 13 окт. 1909. Роста выше средняго, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено, дряблое, во всѣхъ его полостяхъ темная кровь со свертками; на внутренней оболочкѣ аорты замѣчаются бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца сердца дряблая, легко рвется, сѣро-краснаго цвѣта съ единичными отложеніями; вѣнечныя артеріи жестковаты. Желудокъ очень объемистый, доходитъ почти до пупка, содержитъ около 300 к. с.

190. Егоръ *Новиковъ*, 46 л., кресть., ломовой извозчикъ. Возвратился съ базы по городу около 3 ч. дня и сталъ жаловаться на сильную боль въ животѣ, утромъ найденъ въ стойлѣ конюшни лежащимъ на рогожахъ мертвымъ, 23 окт. 1909.

Вскрытіе 26 окт. 1909. Средняго роста и сложенія, исхудалый. Сердце значительно увеличено, во всѣхъ полостяхъ содержится темная кровь съ двуцвѣтными сгустками; мускулатура дряблая съ желтоватымъ оттѣнкомъ, а въ предѣлахъ праваго желудочка, будучи пропитана жиромъ, истончена до 0,1 сант.; въ вѣнечныхъ артеріяхъ попадаются участки суженные плотными бѣлыми бляшками. Въ желудкѣ около 600 к. с. жидкости съ запахомъ гнилыхъ яицъ слабой щелочной реакціи. Въ тонкихъ кишкахъ довольно обильное водянисто-сбросистое содержимое; слизистыя набухшія, но бѣлдноватыя; расширеніе гиздрое осуществъ наблюдается только около бѣлесоватыхъ слегка набухшихъ Пейеровыхъ бляшекъ. Въ толстыхъ кишкахъ подобное же содержимое, слизистая слегка набухшая. Въ верхушкахъ легкихъ старые рубцы.

191. Василій *Черепановъ*, 64 л., кресть. Всегда нетрезвый образъ жизни. 31 окт. 1909 съ утра жаловался на общее недомоганіе, потомъ прилегъ и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 4 нояб. 1909. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце немного увеличено, сильно обложено жиромъ, во всѣхъ его полостяхъ много темной крови; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій плотноватыя бѣловатыя бляшки; мышца буровато-красноватая, плотная. Сосуды основанія мозга жестки и извиты.

192. Анна *Якеля*, 49 л., герман. подданн. Умерла 31 окт. 1909.

Вскрытіе 4 нояб. 1909. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено разъ въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ, вѣнечныя артеріи прощупываются въ видѣ плотныхъ шнурковъ; во всѣхъ полостяхъ много темной крови; на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій многочисленныя плотныя бѣловатыя бляшки, суживающія просвѣтъ артерій почти до полнаго уничтоженія; внутренняя оболочка аорты кажъ-бы изрыта, покрыта плотными, по мѣстамъ обызвествленными бляшками; устье аорты вѣсколько сужено; мышца плотная, буровато-красная. Сосуды основанія мозга жестковаты. Корковый слой почекъ слегка истончент.

193. Михаилъ *Никодровъ*, 35 л., кресть., портной. Послѣднее время предавался пьянству. Пьяный легъ спать и около 9 часовъ вечера обнаруженъ былъ мертвымъ 2 нояб. 1909.

Вскрытіе 7 нояб. 1909. Роста средняго, тѣлосложенія питанія умѣреннаго. Сердце немного увеличено, во всѣхъ его полостяхъ много

темной жидкой крови; мышца сердца плотновата на ощупь, мѣстами пронизана бѣловатыми плотными прослойками; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются плотноватыя блящки. Въ желудкѣ около 500 к. с. пищевой кашицы съ запахомъ бродящаго тѣста. При выниианіи мозга слышенъ спиртный запахъ.

194. Яковъ *Филипповъ*, 27 л., крест., чериорабочій. Нерѣдко жаловался на боль въ сердцѣ. 2 нояб. 1909 утромъ, вставая съ постели, жаловался, что съ нимъ худо, и поднявшись на ноги тутъ же свалился на полъ и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 7 нояб. 1909. Роста выше средняго, тѣлосложенія крѣпкаго, питанія удовлетворительнаго. Сердце немного увеличено, дряблозато; во всѣхъ его полостяхъ много темной крови съ рыхлыми темно-красными сгустками; на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій имѣются бѣловатыя блящки; мышца дряблозата. Сосуды основанія мозга извилисты. Въ боковыхъ кишкахъ одинъ круглый гинстъ.

195. Андрей *Алексѣевъ*, 44 лѣтъ, рабочій въ литейной мастерской. Жаловался на общую слабость, боль въ правой рукѣ и груди. 5 нояб. 1909 ида на работу говорилъ, что сильно болитъ грудь; придя на работу въ 7 час. утра, черезъ нѣсколько минутъ покачнулся и упалъ, и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 9 нояб. 1909. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце немного увеличено, во всѣхъ его полостяхъ темная кровь съ рыхлыми темно-красными сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся бѣловатыя плотноватыя блящки; мышца сердца дряблозата, имѣетъ гинистый цвѣтъ, толщина стѣнки праваго желудочка около 0,4, а лѣваго—1,2. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, поверхность почекъ неравномѣрно бугриста, корковый слой слегка истончепъ. На поверхности печени замѣтно мѣстами втянутыхъ рубцовъ. Сосуды основанія мозга жестковаты, извиты.

196. Петръ *Антоновъ*, 38 л., крест. Скоропостижно умеръ 15 нояб. 1909.

Вскрытіе 18 нояб. 1909. Роста выше средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сосуды основанія мозга жестки, извиты, на разрѣзахъ звоютъ. Сердце увеличено вдвое, сильно обложено жиромъ, очень дряблое, всѣ его полости переполнены темною кровью съ рыхлыми темно-красными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка у основанія сердца около 2,0 снт., а у верхушки около 1,0, тогда какъ у верхушки толщина собственно мышечнаго слоя всего 0,2, а остальная часть стѣнки состоитъ изъ жировой ткани; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,5; мышца очень дряблая, легко рвется, гинистаго цвѣта; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются бѣловатыя плотноватыя блящки. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, ткань плотновата, пирамидки синевато-красноватаго цвѣта, корковый слой слегка истончепъ.

197. Василій *Кузнецовъ*, 44 л., крест., булочникъ. Послѣдній мѣсяцъ сильно пьянствовалъ. Въ ночь съ 1 на 2 ноября домой жаловался, что ему нездоровится съ похмѣлья, около 10 часовъ легъ съ нимъ и легъ на полу около печки, сказавъ, что его знобитъ. 27 нояб. 1909 утромъ былъ обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 3 дек. 1909. Роста выше средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Сердце немного увеличено, дряблое, во всѣхъ его полостяхъ много темной крови съ обильными темно-красными сгустками; мышца хушкѣ; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,4, лѣваго—около 0,8; величиною до четверицы. Сосуды основанія мозга извиты.

198. Михаилъ *Ванюковъ*, 44 л., мѣщ., скоропостижно умеръ 14 дек. 1909.

Вскрытіе 18 дек. 1909. Роста средняго, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце вялое, во всѣхъ его полостяхъ находится темная густая кровь; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 0,7, праваго—0,4; внутренняя оболочка сердца красноватаго цвѣта; на внутренней оболочкѣ аорты имѣются бѣловатыя плотноватыя блящки, мышца сердца гинистаго цвѣта, дряблa, легко рвется. Въ верхушкахъ легкихъ прощупываются уэелки, величиной до голубинаго яйца, довольно рѣзко ограниченные, плотные на ощупь, на разрѣзѣ сыровидно измѣненные, желтоватаго цвѣта. Сосуды основанія мозга жестковаты, извиты.

Параличъ сердца вслѣдствіе endoarteriitidis deform. chronicæ aortæ et art. coronar. cordis et endocarditidis chronicæ.

199. Степанъ *Чижовъ*, 46 л., крест., портной. Жаловался на сердцебіеніе, при ходьбѣ въ больницѣ умеръ 15 янв. 1900.

Вскрытіе 20 янв. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце значительно увеличено, съ большими отложеніями на наружной поверхности аорты; полости его, особенно правыя, переполнены темной жидкой кровью съ рыхлыми сгустками; стѣнки желудочковъ истончены, дряблы, бѣдно-краснаго цвѣта съ замѣтными желтоватыми отпѣчками; двустворчатый клапанъ утолщенъ и мутенъ; внутренняя оболочка аорты надъ клапанами бугриста и шероховата. Печени уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, и имѣютъ бѣлыя рубцовыя измѣненія; корковый и пирамидальный слой истончены, плотны.

200. Ѳедиміръ *Миронов*ъ, 43 л., крест. Весь жизнь крайне нетерпячъ, послѣднее время страдалъ сильными кашлемъ и болью въ груди. Ночью 9 февр. 1900 появилась рвота, и тутъ же скончался.

Вскрытіе 12 февр. 1900. Высокаго роста, умѣреннаго сложенія, худощавъ. Мозговая оболочка отечна. Сердце слегка увеличено, мышца дряблa, дряблая; полости сердца почти совершенно пусты, полость лѣваго желудочка немного увеличена; на свободномъ краѣ двустворки небольшія мозолистыя утолщенія, у основанія заслонокъ аорты прощупываются отложенія извести въ небольшой степени; на внутренней оболочкѣ аорты мелкія фиброзныя утолщенія, расположенныя преимущественно около устья вѣнечныхъ артерій, прощупываемыхъ въ видѣ плотныхъ снурковъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ превращенныхъ въ известковую какъ бы насѣченную трубку съ узкимъ просвѣтомъ. Въ верхушкахъ легкихъ прощупываются многочисленныя мелкія рубцовыя затвердѣнія, въ правой найдено творожистое гнѣздо величиною въ лѣсной орѣхъ. Сосуды основанія мозга утолщены.

201. Никита *Спиридоновъ* (*Поспѣловъ*), 42 л., крест., заводскій рабочій. Скоропостижно умеръ 12 февр. 1900. Иногда говорилъ, что у него побаливаетъ грудь.

Вскрытіе 16 февр. 1900. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, съ большимъ отложеніемъ жира снаружи; полости желудочковъ пусты, а въ предсердіяхъ находится умѣренное количество темной крови съ кровянымъ сгустками; стѣнки желудочковъ истончены, полости ихъ расширены, мышца дряблa, желтоватаго цвѣта; клапаны аорты утолщены и уплотнены, шероховаты, внутренняя оболочка аорты бугриста съ большимъ количествомъ плотныхъ возвышающихся фиброзныхъ блящекъ; устье задней вѣнечной артеріи закрыто такими блящками. Подъ капсулой печени находится множество неправильной формы бѣловатыхъ вдавленныхъ полосъ. Такіе же полосы находятся и въ почкахъ, уменьшенныхъ въ объемѣ; капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый и пирамидальный слой истончены, плотны.

202. Ефремъ *Петровъ*, крест., 34 л., ледоколъ, лѣтомъ—рыболовъ. 16 фев. 1900 умеръ скоропостижно на льду р. Невы; 13-го и 14-го много пилъ водки съ товарищами, 15-го не пилъ, чувствовалъ себя плохо. Велъ жизнь нетрезвую, послѣ загула всегда хворалъ, жалуясь на боль живота, головы и общую слабость.

Вскрытіе 19 фев. 1900. Высокаго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, на наружныхъ его поверхностяхъ находятся большія отложенія жира, а на передней поверхности обширное бѣловатое рубцевое измѣненіе, всѣ полости сердца переполнены темною жидкою кровью съ рыхлыми сгустками; стѣнки желудочковъ истончены, мышцы ихъ дряблы, желтоватаго цвѣта, а въ передней стѣнкѣ лѣваго желудочка находится нѣсколько бѣловатыхъ рубцовъ; дву- и трехстворчатый клапаны утолщены и мутны; клапаны аорты также утолщены и плотны; внутренняя оболочка аорты надъ клапанами на значительномъ пространствѣ шероховата и бугриста съ присутствіемъ на ней мелкихъ бѣловатыхъ фиброзныхъ бляшекъ; вѣнечныя артеріи уплотнены и утолщены, просвѣтъ ихъ суженъ. Подъ капсулой печени на передней поверхности множество бѣловатыхъ неправильной формы рубцовъ.

203. Василій *Сараевъ*, 40 л., 23 фев. 1900 поднятъ на панели пьянымъ и отправленъ для вытрезвленія въ часть, гдѣ скоропостижно умеръ.

Вскрытіе 29 фев. 1900. Роста средняго, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Крайняя плоть вздута и отечна. Отъ брюшной полости, желудка и мозга исходитъ ясный запахъ спирта. Сердце значительно увеличено, съ большими отложеніями жира снаружи; правая его половина и лѣвое предсердіе переполнены кровью съ рыхлыми сгустками, пахнутъ спиртомъ; стѣнки желудочковъ истончены, мышцы ихъ блѣдно-красны съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблы; дву- и трехстворчатый клапаны утолщены и мутны; на внутренней поверхности аорты находится множество бѣловатыхъ фиброзныхъ бляшекъ. Почки уменьшены въ объемѣ, слои истончены, плотны, малокровны. Стѣнки сосудовъ основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта.

204. Анна *Андреева*, 50 л., прачка. Скоропостижно умерла 1 марта 1900. Много пила, и въ день смерти тоже.

Вскрытіе 6 марта 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, слабаго питанія. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, съ большими отложеніями жира спереди, всѣ полости переполнены темной жидкой кровью; стѣнки желудочковъ утолщены, мышцы ихъ буро-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ; дву- и трехстворчатый клапаны утолщены, мутно-бѣлаго цвѣта; клапаны аорты утолщены, на нихъ, а также на внутренней оболочкѣ аорты находятся бѣловатыя плотныя бляшки. Дыхательное горло сплюснуто съ боковъ увеличенною щитовидною железою и имѣетъ форму такъ называемыхъ сабельныхъ ноженъ. Слои почекъ истончены, капсула снимается съ трудомъ, ткань плотна.

205. Василій *Петровъ*, 47 л., крест., найденъ мертвымъ въ артельномъ помѣщеніи, облокотившимся на столъ, 10 нбр. 1900. Жаловался на сильную слабость; былъ склоненъ къ спиртнымъ напиткамъ.

Вскрытіе 13 нбр. 1900. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено, съ большими отложеніями жира спереди; всѣ его полости заключаютъ большое количество крови съ рыхлыми сгустками; на наружной поверхности замѣтны бѣлыя блестящія пятна разнообразной величины; мышца буро-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дрябла; стѣнка праваго желудочка истончена; на двустворчатомъ клапанѣ находятся бѣловатыя пятна, клапаны эти нѣсколько утолщены; на внутренней поверхности аорты надъ клапанами замѣтны мелкія бѣловатыя твердыя бляшки. На капсулѣ печени много бѣловатыхъ полосъ и пятенъ.

206. Михаилъ *Зайцевъ*, 29 л., крест., штукатуръ. Скоропостижно умеръ 10 нбр. 1900. Часто жаловался на боль въ груди, жизнь велъ не совсѣмъ трезвую.

Вскрытіе 13 нбр. 1900. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 12 × 14 снт., съ большимъ отложеніемъ жира спереди; правая половина переполнена темной жидкой кровью, въ лѣвой половинѣ умѣренное количество темной крови съ рыхлыми сгустками; стѣнки желудочковъ истончены; мышцы дряблы съ желтоватымъ оттѣнкомъ; клапаны аорты утолщены, съ большими бѣловатыми известковыми бляшками; отверстія вѣнечныхъ артерій сужены до того, что переднее представляется величиною въ просяное зерно, а заднее—въ маковое. Подъ капсулой печени бѣловатыя полосы. Отъ внутренностей тѣла чувствуется ясный запахъ спирта.

207. Василій *Зеленковъ*, 40 л., крест. Жаловался на боль въ груди и сильно кашлялъ. Сильно пьянствовалъ. Легъ спать пьянымъ, и на утро былъ найденъ мертвымъ, 8 дек. 1900.

Вскрытіе 12 дек. 1900. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 12×12 снт., съ значительнымъ отложеніемъ жира спереди; всѣ его полости переполнены темной кровью съ рыхлыми сгустками; стѣнка лѣваго желудочка—1 снт., праваго—0,2; мышца довольно дрябла съ яснымъ желтымъ оттѣнкомъ; на свободныхъ краяхъ двустворчатаго клапана имѣются утолщенія довольно плотныя; на внутренней оболочкѣ аорты замѣтны мелкія плотныя бѣловатыя бляшки въ незначительномъ количествѣ. Содержимое желудка имѣетъ кислый запахъ.

208. Дмитрій *Бахваловъ*, 44 л., крест., приказчикъ. Выпилъ шесть рюмокъ водки въ гостяхъ, и сидя на стулѣ внезапно умеръ, 9 фев. 1901.

Вскрытіе 15 фев. 1901. Выше средняго роста, средняго тѣлосложенія, худощавъ. Въ желудкѣ около 600 к. с. жидкой пищевой смѣси. Сердце увеличено раза въ полтора, сильно обложено жиромъ снаружи; всѣ его полости переполнены темной жидкой кровью съ рыхлыми сгустками; стѣнки желудочковъ утолщены вдвое, мышцы съ желтоватыми прослойками, двустворчатый клапанъ утолщенъ и мутенъ, также и клапаны аорты. На внутренней оболочкѣ аорты разбросано множество бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ отъ просяного зерна до горошины. Ткань обѣихъ верхушекъ легкихъ уплотнена въ видѣ узловъ, въ разрѣзѣ представляющихся пропитанными множествомъ сѣроватыхъ и бѣловатыхъ узелковъ. Сосуды основанія мозга склерозированы. Отъ мозга и крови сердца чувствуется запахъ спирта.

209. Прасковья *Епифанова*, 63 л., мѣщ. Пьянствовала. 19 фев. 1901 на улицѣ сдѣлалось дурно, отправленная въ безчувственномъ состояніи въ больницу по дорогѣ умерла. При сильномъ опьяненіи съ нею дѣлались припадки, во время коихъ мѣшалась и какъ бы переживала послѣдніе часы (?).

Вскрытіе 24 фев. 1901. Средняго роста и тѣлосложенія, ожирѣвшая. Въ обѣихъ половинахъ сердца находится совершенно жидкая темная кровь; мышца весьма дряблая, въ разрѣзѣ тусклая, съ замѣтною желтоватостью; въ основаніи заслонокъ аорты и также двустворки небольшія отложенія извести; внутренній покровъ въ лѣвой половинѣ сплошного темно-краснаго цвѣта вслѣдствіе пропитыванія; полость лѣваго желудочка слегка расширена, стѣнка его толстовата; на внутренней оболочкѣ аорты около устья вѣнечныхъ артерій довольно многочисленныя мелкія фиброзныя утолщенія. Легкія мало спадаются; ткань ихъ мраморно-розоваго цвѣта; въ толщѣ ея прощупывается безчисленное количество плотныхъ узелковъ, величиною отъ чечевичнаго зерна до гороховаго. Въ желудкѣ найдено 400 к. с. пищевой смѣси съ запахомъ, напоминающимъ бродящее тѣсто; объемъ желудка увеличенъ прибли-

зительно вдвое, стѣнки тонкія. Корковый слой почекъ тонокъ, пирамидки темно-красныя. Артеріи основанія мозга склерозированы. Содержимое тонкихъ кишекъ издаетъ замѣтный спиртный запахъ.

210. Анна *Иванова*, 64 л., крест. Всегда жаловалась на боль въ груди и кашляла. Найдена въ постели мертвой 23 фев. 1901.

Вскрытіе 26 фев. 1901. Средняго роста и тѣлосложенія, слабаго питанія. Сердце въ области лѣваго желудочка повсюду сращено съ околосердечной сумкой старыми ложными перепонками; увеличено въ объемѣ; всѣ полости, въ особенности лѣвыя, переполнены кровью съ плотными сгустками; стѣнки желудочковъ утолщены раза въ полтора; мышца сѣровато-желтоватаго цвѣта, довольно дрябла; двустворчатый клапанъ и клапаны аорты утолщены, мутно-бѣловатаго цвѣта; внутренняя оболочка аорты шероховата вслѣдствіе присутствія мелкихъ плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ; отверстія вѣнечныхъ артерій сужены. Легкія эмфизематозны. Ткань печени съ большимъ количествомъ желтоватыхъ и бѣловатыхъ островковъ. Почки уменьшены, корковый слой истонченъ, пирамидки укорочены; ткань плотна. Стѣнки сосудовъ основанія мозга извилисты, плотны, не спадаются, заключаютъ известковыя и соединительно-тканныя плотныя бляшки.

211. Иванъ *Желѣзновъ*, 40 л., крест., каменщикъ. Постоянно сильно пьянствовалъ, послѣ пьянства у него часто показывалась горломъ кровь, жаловался на боль въ груди. Ночью 13 окт. 1901 проснувшись сталъ храпѣть, упалъ на полъ, сталъ стонать, изо рта появилась пѣна, и тутъ же и умеръ.

Вскрытіе 15 окт. 1901. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. На днѣ четвертаго желудочка замѣтно ненормальное расширеніе сосудовъ. Сердце 13 × 12 снт.; въ правой половинѣ его находится значительное количество темной крови, въ лѣвой только въ предсердіи незначительное количество; стѣнки желудочковъ утолщены, мышцы ихъ дряблы, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, двустворчатый клапанъ утолщенъ на свободныхъ краяхъ; на внутренней оболочкѣ аорты и устьевъ вѣнечныхъ артерій находятся мелкія бѣловатыя плотныя бляшки. Верхушка праваго легкаго содержитъ уплотненіе въ грецкій орѣхъ, въ разрѣзахъ представляющее множество сѣроватыхъ плотныхъ узелковъ.

212. Павелъ *Паппине*, 56 л., финляндскій уроженецъ; возилъ на продажу картофель. Крѣпкіе напитки употреблялъ мало, часто жаловался на боль въ груди и одышку. Внезапно упалъ и умеръ 8 окт. 1901.

Вскрытіе 16 окт. 1901. Высокаго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, средняго питанія. Шея короткая, толстая. Сердце нѣсколько увеличено; въ полостяхъ праваго сердца имѣется темная кровь; въ области праваго желудочка на сорочкѣ его имѣются старыя перламутровыя пятна; полость праваго желудочка сильно растянута; мускулатура его очень дряблая, истончена, мѣстами почти до полнаго исчезновенія мускулатуры; по краю двустворчатаго клапана имѣются небольшія плотноватыя утолщенія, верхушки папиллярныхъ мышцъ укорочены, плотны, желтовато-бѣлы; мускулатура стѣнки лѣваго желудочка дрябла, желтовата; вѣнечныя артеріи мѣстами костной плотности и просвѣтъ ихъ рѣзко суженъ.

213. Марья *Андреева*, 38 л., крест., чернорабочая. Пила много водки, цѣлыми чайными чашками, никогда не закусывая. Вечеромъ была сильно пьяна и легла спать въ 11-мъ часу, въ 4-мъ часу охнула два раза и утихла, и утромъ 31 окт. 1901 была найдена мертвой.

Вскрытіе 2 нояб. 1901. Невысокаго роста, средняго сложенія, средняго питанія. Сердце немного увеличено; на наружной его поверхности имѣются мутноватыя утолщенія; лѣвое венозное кольцо съ большимъ излишкомъ пропускаетъ два пальца; во всѣхъ полостяхъ сердца имѣется темная жидкая кровь; правый желудочекъ представляется растянутымъ,

мускулатура его дряблая, блѣдно-желтовата; толщина стѣнки 0,35 снт.; лѣваго — 1,0 снт., мускулатура та же, что и въ правомъ; по краю двустворчатаго клапана имѣются небольшія утолщенія; внутренняя оболочка аорты бугриста, то въ видѣ желтоватыхъ, то въ видѣ черноватыхъ бляшекъ, мѣстами очень жесткихъ; клапаны аорты рѣзко утолщены, сращены по краю; окружность аорты на уровнѣ клапановъ 6,0 снт., легочной артеріи—7,0 снт.; устье одной изъ вѣнечныхъ артерій совершенно сжато большой хрящеватой бляшкой. Пирамидки почекъ уплотнены, корковый слой мѣстами истонченъ до 0,4 снт. Въ тонкихъ кишкахъ имѣются ленточныя глисты. При микроскопированіи кусочковъ сердечной мышцы въ волоконцахъ ихъ замѣчается много жировыхъ зернышекъ. При вскрытіи сердечной сорочки чувствуется едва замѣтный спиртный запахъ.

214. Иванъ *Марнышевъ*, 47 л., крест., башмачникъ. 30 нояб. 1901 остановившись на улицѣ и прислонившись къ стѣнѣ, началъ шататься и упалъ на тротуаръ, ударившись затылкомъ о камень; въ безсознательномъ состояніи и издавая лишь храпъ, доставленъ въ пріемный покой, гдѣ и умеръ.

Вскрытіе 3 дек. 1901. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 13×14 снт., обложено снаружи толстымъ слоемъ жира; правая половина переполнена темною жидкою кровью съ рыхлыми сгустками, въ лѣвой—крови незначительное количество; стѣнка лѣваго желудочка толщиною—2 снт., а праваго—0,3; мышцы блѣдно-красно-желтоваты, довольно дряблы; дву- и трехстворчатый клапаны и клапаны аорты на свободныхъ краяхъ утолщены, мутно-бѣловатаго цвѣта; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами большое количество бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ; устья вѣнечныхъ артерій сужены, стѣнки утолщены, мутно-бѣловатаго цвѣта. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой значительно утолщенъ, пирамиды укорочены, повсюду замѣтно значительное разращеніе соединительной ткани въ видѣ бѣловатыхъ полосокъ. Отъ мозга, легкихъ и крови сердца чувствуется ясный запахъ спирта.

215. Андріанъ *Кошелевъ*, 40 л., отст. канц. служ., злоупотреблялъ спиртными напитками, ежедневно возвращался на квартиру сильно пьянымъ. 1 дек. 1901 поднятъ въ безсознательномъ состояніи на мостовой и по доставленіи въ пріемный покой умеръ.

Вскрытіе 5 дек. 1901. Выше средняго роста, слабаго тѣлосложенія и плохого питанія. Изъ брюшной полости чувствуется ясно запахъ спирта. Сердце 12 × 11 снт., снаружи обложено толстымъ слоемъ жира и имѣетъ распространенныя бѣловатыя плотныя бляшки; всѣ его полости, въ особенности лѣвыя, переполнены темною жидкою кровью съ незначительнымъ количествомъ сгустковъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,0 снт., праваго 0,2; мышцы ихъ темно-краснаго цвѣта съ желтоватыми прослойками; двустворчатый клапанъ на свободныхъ концахъ утолщенъ, клапаны аорты шероховаты и также утолщены; на внутренней оболочкѣ надъ клапанами находятся бляшки и старыя рубцовыя измѣненія въ видѣ пятенъ величиною съ 5 коп. серебряную монету. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый и пирамидальный слои истончены, въ послѣднемъ замѣтно большое развитіе соединительной ткани въ видѣ плотныхъ бѣловатыхъ полосъ; лоханки расширены. Отъ мозга, легкихъ и крови сердца чувствуется ясный запахъ спирта.

216. Донатъ *Гага*, 39 л., крест., сапожникъ. Послѣдніе три дня жаловался, что ему не хватаетъ воздуха; ночью 22 янв. 1902 съ нимъ стало худо, была рвота, а спустя $^1/_2$ часа умеръ. Жизнь велъ трезвую.

Вскрытіе 26 янв. 1902. Высокаго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, худощавъ. Сердце нѣсколько увеличено, 13 × $12^1/_2$ × 6 снт., стѣнка пра-

ваго желудочка достигаетъ 0,5 снт., а лѣваго почти 1,5. Внутренняя оболочка аорты бугриста, фиброзно утолщена; просвѣтъ сосуда у его начала имѣетъ только 2 снт. въ поперечникѣ; устья вѣнечныхъ артерій сильно сужены фиброзными утолщеніями, полулунныя заслонки также нѣсколько утолщены. Въ верхушкахъ обоихъ легкихъ прощупываются многочисленные сливающіеся узелки, имѣющіе въ разрѣзѣ рубцовый, отчасти омѣлотворенный видъ.

217. Иванъ *Молевъ-младшій*, 58 л., крест., жизнь велъ нетрезвую, ежедневно былъ пьянъ, жаловался постоянно на боль въ груди, сильное удушье, одно время вслѣдствіе болѣзни бросилъ пить водку. Возвратился домой въ нетрезвомъ видѣ и опять пилъ, на утро 29 янв. 1902 усмотрѣнъ былъ мертвымъ.

Вскрытіе 31 янв. 1902 Средняго роста и тѣлосложенія, слабаго питанія. Сердце 11 × 12 снт.; спереди обложено значительнымъ слоемъ жира; во всѣхъ его полостяхъ находится темная жидкая кровь въ умѣренномъ количествѣ, въ правой половинѣ—значительно больше; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго — 0,4, мышцы ихъ блѣдно-красно-желтоваты, довольно дряблы; на двустворчатомъ клапанѣ, на внутренней оболочкѣ аорты находятся довольно плотныя бѣловатыя бляшки. Въ околопочечной клѣтчаткѣ находится обширное кровоизліяніе изъ темной крови, капсулы почекъ снимаются съ трудомъ, корковый и пирамидальный слой истончены. Отъ крови въ сердцѣ и легкихъ чувствуется ясный спиртный запахъ.

218. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, 40 л. 27 февр. 1902 выйдя въ 12 ч. ночи изъ жаркаго отдѣленія бани, началъ одѣваться, съ нимъ сдѣлалось дурно, замѣтно сильно ослабѣлъ и черезъ нѣсколько минутъ умеръ.

Вскрытіе 1 марта 1902. Невысокаго роста, средняго сложенія, удовлетворительнаго питанія. Сердце увеличено, по бороздамъ значительно обложено жиромъ, а на задней поверхности вдоль по сосудамъ имѣется много очень мелкихъ точечныхъ кровоизліяній; во всѣхъ полостяхъ сердца содержится темная жидкая кровь въ большомъ количествѣ; правое и лѣвое венозное отверстіе пропускаютъ по три пальца; правый желудочекъ сильно растянутъ, мускулатура его блѣдна, дряблая, съ жировымъ оттѣнкомъ, толщина его около 0,2 снт.; толщина стѣнки лѣваго желудочка, также растянутаго, 0,9 снт., мускулатура дряблая, блѣдная, пестрая, съ желтоватыми гнѣздами; по краямъ двустворчатаго клапана жестковатые узелки; стѣнки начальной части аорты утолщены въ силу развитія въ толщѣ ея бляшекъ, въ значительной степени суживающихъ устья вѣнечныхъ артерій. Въ почечныхъ лоханкахъ слизисто-гнойное содержимое и расширеніе сосудовъ. Слизистая мочевого пузыря значительно гиперемирована, по стѣнкамъ его—гной.

219. Василій *Голенкинъ*, 43 л., мѣщ. Страдалъ припадками падучей. 14 марта 1902 внезапно почувствовалъ себя дурно, сѣлъ и, не приходя въ сознаніе, умеръ.

Вскрытіе 19 марта 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Стѣнки сосудовъ основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта, плотны, не спадаются; сосуды на днѣ 4-го желудочка сильно расширены кровью. Сердце $14^1/_2 \times 11$ снт.; правая половина его переполнена кровью и сгустками, въ лѣвой половинѣ такой же крови меньше; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,8 снт., праваго — 0,6; мышцы ихъ блѣдно-красно-желтоваты, довольно плотны; двустворчатый клапанъ утолщенъ и мутенъ, на немъ имѣются довольно объемистыя плотныя бѣловатыя бляшки; на внутренней оболочкѣ аорты также множество бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ; клапаны аорты утолщены и мутны; отверстія вѣнечныхъ артерій значительно сужены; стѣнки ихъ уплотнены, утолщены и не спадаются.

220. Федоръ *Концевой*, 49 л., потом. почетн. гражд., писарь. Пришелъ 17 марта 1902 немного выпивши, стали угощаться; выпивъ двѣ рюмки водки и два стакана пива, сталъ дремать, сидя на стулѣ, опершись головою о столъ; въ такомъ положеніи немного спустя обнаруженъ былъ мертвымъ.

Вскрытіе 20 марта 1902. Выше средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. У мыщелковъ голеней отечность. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце 12 × 12 снт., съ большими отложеніями жира снаружи; правая половина переполнена темною жидкою кровью, въ лѣвой — значительно меньше; толщина лѣваго желудочка 2,0 снт., праваго—0,7; мышцы ихъ буровато-красны съ желтоватыми прослойками, довольно плотны; двустворчатый клапанъ утолщенъ, мутенъ, съ бѣловатыми плотными бляшками, тоже—и клапаны аорты; на внутренней оболочкѣ аорты объемистыя шероховатыя плотныя бляшки; стѣнки вѣнечныхъ артерій утолщены, просвѣты ихъ зіяютъ.

221. Александръ *Вальтинъ*, 40 л., мѣщ., машинистъ, 19 марта 1902 почувствовалъ себя дурно на паровозѣ, былъ отправленъ въ пріемный покой и вскорѣ въ безсознательномъ состояніи умеръ.

Вскрытіе 27 марта 1902. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Въ желудкѣ 700 к. с. пищевой смѣси; у выхода на стѣнкѣ желудка находится кольцевидное утолщеніе и уплотненіе; на слизистой ему соотвѣтствуетъ бѣлая рубцовая ткань. Сердце 12 × 10 снт., снаружи обложено значительнымъ слоемъ жира; правая половина сердца переполнена темной жидкой кровью, въ лѣвой — ея немного; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,0 снт., праваго—0,8; двустворчатый клапанъ утолщенъ и мутенъ, съ значительнымъ количествомъ мелкихъ плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ, тоже — и клапаны аорты; внутренняя оболочка аорты шероховата, бугриста со множествомъ объемистыхъ плотныхъ и даже известковыхъ бляшекъ; стѣнка аорты утолщена; отверстія вѣнечныхъ артерій сильно сужены, стѣнки ихъ утолщены и покрыты мелкими плотными бляшками; мышцы сердца блѣдно-красны съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблы. Корковый слой почекъ утолщенъ, пирамидки укорочены, лоханки расширены; ткань сильно плотна.

222. Иванъ *Антоновъ*, 40 л., крест. Скоропостижно умеръ въ Спб. пересыльной тюрьмѣ 1 апр. 1902; подлежалъ высылкѣ изъ столицы по распоряженію комитета для призрѣнія и разбора нищихъ. Все время былъ здоровъ.

Вскрытіе 4 апр. 1902. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце 12 × 14 снт., всѣ его полости переполнены темной жидкой кровью, въ особенности правыя; стѣнка лѣваго желудочка толщиною въ 2,5 снт., праваго—0,6; мышцы ихъ блѣдноватаго цвѣта съ рѣзко-желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно дряблы; на двустворчатомъ клапанѣ и клапанахъ аорты множество объемистыхъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ; внутренняя оболочка аорты усѣяна такими же мелкими бляшками; отверстія вѣнечныхъ артерій сильно сужены, такъ что едва пропускаютъ головку обыкновеннаго зонда; стѣнки ихъ утолщены и уплотнены. Почки немного увеличены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ большимъ трудомъ; корковый слой утолщенъ, имѣетъ сальный видъ и блескъ, пирамидки укорочены, темно-краснаго цвѣта; вообще ткань почекъ сильно плотна.

223. Василій *Мальцевъ*, 56 л., крест., чернорабочій на судахъ. 21 окт. 1902 парился на полку въ парной, спустя нѣсколько минутъ его нашли лежащимъ на полу и мертвымъ.

Вскрытіе 26 окт. 1902. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце 12 × 14 × 6 снт., всѣ его полости значительно наполнены кровью съ довольно плотными сгустками; толщина лѣваго

желудочка 2,0 сант., праваго—0,5; мышцы ихъ блѣдно-красновато-желтоваты, дряблы, клапаны сердца утолщены, мутно-бѣловатаго цвѣта, внутренняя оболочка аорты слегка шероховата, на ней замѣтны объемистыя плотныя бѣловатыя бляшки. Почки уменьшены въ объемѣ, капсулы ихъ снимаются съ трудомъ, корковый слой истончень; плотны. Сосуды основанія мозга склерозированы.

224. Константинъ *Иоллосъ*, 53 л., мѣщ., легковой извозчикъ. Жизнь велъ трезвую. 31 окт. 1902 мылъ коляску на дворѣ, внезапно упалъ и тутъ же умеръ.

Вскрытіе 3 ноября 1902. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, умѣренно питанія. Сердце слегка увеличено въ ширину, въ обѣихъ половинахъ содержало темную кровь съ примѣсью рыхлыхъ свертковъ, мышца слегка желтовата, внутренняя поверхность аорты, а также заслонки ея и стѣнки передней и нижней вѣнечныхъ артерій слегка утолщены. Капсула почекъ съ трудомъ отдѣляется, ткань желтоватая, пирамидки окрашены нѣсколько темнѣе корковаго слоя. Сосуды основанія мозга слегка утолщены. На эпендимѣ желудочковъ довольно выступаетъ сѣть довольно напитыхъ сосудовъ.

225. Иванъ *Зиновьевъ*, 26 л., мѣщ., писарь, раньше—пѣвчій. Водку пилъ постоянно и почти всегда былъ пьянъ. Два дня подрядъ пилъ, и найденъ мертвымъ 13 дек. 1902.

Вскрытіе 16 дек. 1902. Выше средняго роста, слабаго тѣлосложенія и питанія. Сердце $10 \times 11 \times 6^1/_2$ сант., всѣ его полости значительно наполнены темною кровью съ рыхлыми сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 2,0 сант., а праваго—0,5, мышцы ихъ темно-красныхъ цвѣтъ, довольно плотны; двустворчатый клапанъ утолщенъ и на слегка шероховата отъ присутствія на ней бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Изъ грудной полости и отъ мозга чувствуется ясный запахъ спирта. Ткань почекъ значительно плотна.

226. Акулина *Лукьянчикова*, 50 л., крест., прачка. Жаловалась на сердцебіеніе. Лѣтомъ минувшаго года пила горломъ кровь. Утромъ 19 февр. 1903 ея работой сказала, что у нея разболѣлась голова, въ это время ноги ея стали подгибаться и она захрапѣла; ее подхватили, положили на лавку и замѣтили, что Л. уже умерла.

Вскрытіе 24 февр. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сосуды основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта, стѣнки ихъ утолщены; на развѣтвленіяхъ Сильвіевой борозды находятся бѣловатыя плотныя бляшки. Сердце $13^1/_2 \times 14 \times 7^1/_2$ сант., обложено толстымъ слоемъ жира; у верхушки на передней поверхности перикардія разрыхлена въ видѣ бѣловатыхъ бляшекъ; въ полостяхъ сердца большое количество крови съ большими сгустками крови; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,5 сант., праваго—1,0; мышцы ихъ блѣдно-красныя цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ; на двустворчатомъ клапанѣ находятся бѣловатыя плотныя бляшки, клапаны аорты утолщены, мутнобѣловатаго цвѣта, на внутренней оболочкѣ аорты бѣловатыя плотныя бляшки; у верхушки сердца въ области перегородки со стороны лѣваго желудочка находится расширеніе въ видѣ яйцевиднаго кармана величиною съ куриное яйцо; внутренняя оболочка этой полости мутно-бѣловатаго цвѣта, утолщена; въ ней находятся известковыя отложенія на большомъ пространствѣ, а въ центрахъ извѣстныя поверхность величиною въ горошину, покрытая кровянымъ сгусткомъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка на мѣстѣ расширенія въ 0,1 сант.

227. Пелагея *Ефремова*, 45 л., крест.

Вскрытіе 7 марта 1903. Средняго роста и сложенія, хорошаго питанія. Изъ полости брюха исходитъ замѣтный спиртный запахъ. Сердце увеличено, во всѣхъ его отдѣлахъ въ изобиліи имѣется жидкая кровь

и немногочисленные темные сгустки; мускулатура сердца съ буроватымъ оттѣнкомъ, плотновата на ощупь, толщина стѣнки праваго желудочка 0,25 сант., лѣваго—0,1. На внутренней оболочкѣ аорты имѣются небольшія бѣловатыя бляшки, а по краю двустворчатаго клапана небольшія старыя плотныя утолщенія.

228. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, 30 л., равночинецъ. 3 окт. 1903 поднятъ въ безсознательномъ состояніи на панели, по доставленіи въ пріемный покой умеръ.

Вскрытіе 6 окт. 1903. Роста средняго, средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце 12×13 сант., обложено большимъ слоемъ жира; всѣ его полости переполнены темною жидкою кровью; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 сант., праваго—0,5; мышцы ихъ блѣдно-красны, дряблы; эндокардій мутенъ, двустворчатый клапанъ и клапаны аорты утолщены, слегка мутны; отверстія вѣнечныхъ артерій сужены до неприходимости; внутренняя оболочка аорты бугриста, шероховата и покрыта множествомъ неправильныхъ мутно-бѣловатыхъ бляшекъ, на бляшкахъ замѣтно отложеніе мелкихъ кровянныхъ сгустковъ.

229. Григорій *Виноградовъ*, 55 л., крест. Наканунѣ немного выпивши и хорошо поужинавъ, легъ спать, утромъ за чаемъ сталъ жаловаться, что ему дурно и чувствуется боль въ груди, немного спустя умеръ, 9 окт. 1903.

Вскрытіе 11 окт. 1903. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце $12 \times 13 \times 6^1/_2$ сант., обложено толстымъ слоемъ жира снаружи; всѣ его полости переполнены кровью со сгустками, толщина лѣваго желудочка 2,0 сант., праваго—0,5; мышца дряблая, не сокращающаяся, блѣдно-красная съ легкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ; на двустворчатомъ клапанѣ объемистыя плотныя бѣловатыя бляшки, на внутренней оболочкѣ аорты такіе бѣловатыя бляшки. Въ желудкѣ около 800 к.с. пищевой смѣси. Капсула почекъ снимается съ большимъ трудомъ, мягкій и пирамидальный слои истончены и плотны. Сосуды основанія мозга склерозированы.

230. Федоръ *Алферовъ*, 36 л., мѣщ., столяръ-бутафорщикъ. Сильно пилъ водку, ежедневно былъ популенъ, жаловался на боль въ боку; лежалъ въ больницѣ отъ пьянства. Умеръ работая около станка 4 дек. 1903.

Вскрытіе 7 дек. 1903. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено, содержитъ въ правой половинѣ много темножидкой крови; сердечная мышца блѣдно-желтоватая, дряблая; толщина стѣнки лѣваго желудочка замѣтно увеличена; на полулунныхъ заслонкахъ аорты и въ особенности на ея внутренней поверхности замѣтны мелкія рубцовыя утолщенія.

231. Эрастъ *Лапинъ*, 56 л., губ. секр., занимался частной адвокатурой въ Петербургѣ, учрежденіяхъ. Жизнь велъ нетрезвую, всегда пилъ ром въ значительномъ количествѣ, много ѣлъ. Часто жаловался себя худо и черезъ много водки. 27 апр. 1904 утромъ почувствовалъ себя худо и черезъ 2 часа умеръ.

Вскрытіе 30 апр. 1904. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 16×12 сант., значительно утолщено, съ большими отложеніями жира по бороздкамъ; во всѣхъ его полостяхъ довольно много темной жидкой крови; стѣнка лѣваго желудочка значительно утолщена, сердечная мышца блѣдно-красно-желтовата, довольно плотная; двустворчатый клапанъ и клапаны аорты нѣсколько утолщены, мутно-бѣловатаго цвѣта; на внутренней оболочкѣ аорты большое количество довольно объемистыхъ шероховатыхъ плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ; отверстія вѣнечныхъ артерій рѣзко сужены и окружены бѣлыми бляшками; отверстія вѣнечныхъ артерій рѣзко сужены и окружены бѣлыми плотными бляшками. Сосуды основанія мозга склерозированы.

232. *Мужчина*, за 60 л., обнаруженъ мертвымъ въ ночлежномъ пріютѣ утромъ 27 нояб. 1906.

Вскрытіе 29 нояб. 1906. Роста средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Сердце значительно увеличено, дряблое. во всѣхъ полостяхъ его жидкая кровь; на внутренней оболочкѣ аорты, а отчасти и на клапанахъ имѣются сѣровато-желтоватыя плоскія бляшки величиною до горошины; вѣнечныя артеріи зіяютъ; просвѣтъ ихъ суженъ мѣстами почти до полнаго уничтоженія сѣроватыми плоскими бляшками; мышца сердца дряблая, съ глинистымъ оттѣнкомъ, по мѣстамъ на ней замѣтны бѣловатыя прослойки. Сосуды основанія мозга склерозированы.

233. Евдокія *Васильева*, 49 л., крест., сильно пила, рѣдко была трезвой. Легла въ пьяномъ видѣ и вскорѣ уснула, причемъ необыкновенно храпѣла, чего ранѣе съ ней не случалось; въ 2 ч. ночи 2 дек. 1906 умерла.

Вскрытіе 4 дек. 1906. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, значительно обложено жиромъ; во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь съ небольшими рыхлыми темно-красными свертками; у основанія полулунныхъ клапановъ аорты, а также и на внутренней оболочкѣ аорты находятся плотноватыя желтовато-бѣловатыя пятна величиною до чечевичнаго зерна; мышца сердца дряблая, съ глинистымъ оттѣнкомъ, мѣстами проросла полосками жира. Сосуды основанія мозга уплотнены. Капсула почекъ снимается съ нѣкоторымъ трудомъ, поверхность ихъ бугриста.

234. Дмитрій *Анучинъ*, 47 л., отставной истопникъ. Занятій не имѣлъ, существовалъ на получаемую пенсію 13 р. 91 к., жизнь велъ нетрезвую, все время пьянствовалъ. Послѣдніе два мѣсяца пилъ безпросыпно. Жаловался на боль въ ногахъ и одышку. 6 дек. 1906 все время лежалъ въ кровати, кричалъ, что его сильно душитъ, и просилъ денегъ на водку; въ 5 часу обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 10 дек. 1906. Высокаго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце значительно увеличено, сильно обложено жиромъ, очень дряблое; всѣ его полости пусты, внутренняя оболочка праваго желудочка окрашена въ болѣе интенсивный темнокрасный цвѣтъ; на двустворчатомъ клапанѣ, а также на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находится нѣсколько плотноватыхъ бѣловатыхъ плоскихъ бляшекъ, величиною отъ просяного до чечевичнаго зерна; мышца сердца очень дряблая, глинистаго цвѣта. Почки увеличены, капсула напряжена, ткань плотновата; корковый слой нѣсколько утолщенъ. Сосуды основанія мозга склерозированы.

235. Петръ *Сизяковъ*, на видъ около 50 л., мѣщ., былъ трезвъ, не болѣлъ. 10 дек. 1906 пилъ чай, внезапно вскрикнулъ, упалъ со стула и умеръ.

Вскрытіе 12 дек. 1906. Роста выше средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце значительно увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находится темная жидкая кровь; на внутренней оболочкѣ аорты, на полулунныхъ аортальныхъ клапанахъ и на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій находятся плотноватыя бѣловатыя бляшки, величиною до чечевичнаго зерна; мышца сердца очень дряблая, сѣровато-красноватаго цвѣта, отчасти проросла жиромъ. Сосуды основанія мозга плотноваты, извиты.

236. Федоръ *Селезневъ*, 74 л., мѣщ., часто болѣлъ, кашлялъ и жаловался на разныя болѣзни. Найденъ мертвымъ въ постели 11 дек. 1906.

Вскрытіе 13 дек. 1906. Роста выше средняго, умѣреннаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце нѣсколько увеличено, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находится кровь, частью жидкая, частью въ видѣ темнокрасныхъ рыхлыхъ свертковъ; на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки величиной до чечевичнаго зерна; мышца сердца буроватаго цвѣта, дрябловата. Капсула

почекъ снимается съ трудомъ, поверхность ихъ бугриста, корковый слой истонченъ, съ трудомъ отличается отъ мозгового; лоханки значительно обложены жиромъ. На плоскости разрѣза легкихъ торчатъ утолщенные бронхи, въ просвѣтѣ которыхъ находится гноевидная слизь. Сосуды основанія мозга склерозированы.

237. Іосифъ *Гриневичъ*, 53 л., умеръ 6 янв. 1907.

Вскрытіе 11 янв. 1907. Роста выше средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце значительно увеличено, сильно обложено жиромъ, очень дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь съ довольно объемистыми сгустками; на двустворчатомъ клапанѣ, на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся плотноватыя желтоватыя бляшки величиной до чечевичнаго зерна; мышца сердца очень дряблая, сѣровато-желтоватаго цвѣта, проросла полосками жира, а мѣстами соединительной ткани. Капсула почекъ снимается съ нѣкоторымъ трудомъ, ткань ихъ плотновата. Сосуды основанія мозга склерозированы.

238. Николай *Кириковъ*, 47 л., ремесл., умеръ 13 янв. 1907.

Вскрытіе 18 янв. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце значительно увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находятся много темной крови съ небольшимъ количествомъ рыхлыхъ темныхъ сгустковъ; на двустворчатомъ клапанѣ и на внутренней оболочкѣ аорты находятся плотноватыя бѣловатыя бляшки величиною до боба; такія же бляшки находятся на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій, суживая ихъ просвѣтъ почти до полнаго его уничтоженія; мышца сердца буровата; на передней стѣнкѣ лѣваго желудочка на пространствѣ величиною съ 5 коп. монету мышца толщиною не болѣе 0,4 сит., плотная, бѣловато-желтоватаго цвѣта съ сухожильнымъ блескомъ. Сосуды основанія мозга склерозированы. Слои почекъ плохо различимы, лоханки значительно обложены жиромъ.

239. Андрей *Юдкинъ*, 41 г., крест., рабочій на конфектной фабрикѣ. Никогда ничѣмъ не болѣлъ. Спиртныхъ напитковъ употреблялъ очень мало. Съ утра жаловался на боль въ груди и сердцебіеніе; вечеромъ возвращаясь домой при входѣ на лѣстницу упалъ и умеръ, 27 янв. 1907.

Вскрытіе 3 фев. 1907. Средняго роста. тѣлосложенія и питанія ниже средняго. Сердце нѣсколько увеличено, значительно обложено жиромъ, дрябловато, во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь съ небольшимъ количествомъ рыхлыхъ темно-красныхъ сгустковъ; лѣвое венозное отверстіе пропускаетъ съ трудомъ 2 пальца; клапаны аорты нѣсколько утолщены, торчатъ въ просвѣтъ аорты; устье аорты нѣсколько сужено; на внутренней оболочкѣ аорты имѣется нѣсколько плоскихъ желтоватыхъ бляшекъ величиною до чечевичнаго зерна; мышца сердца тускловата, полнокровна, мѣстами проросла полосками жира. Въ верхнихъ доляхъ легкихъ прощупываются многочисленные плотноватые узлы различной величины и находится нѣсколько полостей съ рубцовыми стѣнками, выполненныхъ густою гноевидною жидкостью. Капсула почекъ снимается съ нѣкоторымъ трудомъ; лоханки значительно обложены жиромъ. Сосуды основанія мозга слегка извилисты.

240. Любовь *Васильева*, 53 л., крест., жизнь вела нетрезвую, злоупотребляла спиртными напитками, ежедневно цѣлый годъ возвращалась домой пьяная. Всегда жаловалась на сильныя боли подъ ложечкой. Послѣдній день возвратилась домой пьяная и посылала разъ пять за водкой. Ночью стала стонать и жаловаться на сильную боль и ощущеніе жара, подъ утро потеряла сознаніе и вскорѣ умерла, 4 мар. 1907.

Вскрытіе 6 мар. 1907. Роста ниже средняго, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце немного увеличено, довольно значительно

обложено жиромъ; лѣвый желудочекъ слабо сокращенъ, правый зыблется; во всѣхъ полостяхъ сердца находится жидкая кровь, а въ правой половинѣ довольно плотные сѣровато-фибринозные свертки; двустворка жестковата, у основанія довольно значительныя известковыя отложенія; на внутренней оболочкѣ аорты замѣтно нѣсколько плотновато-бѣловатыхъ бляшекъ величиною до чечевичнаго зерна; мышцы сердца буроватаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ; вѣнечныя артеріи жестковаты, зіяютъ. Почки значительно уменьшены; капсула ихъ снимается съ трудомъ, поверхность неравномѣрно бугриста, корковый слой истонченъ. Поверхность печени съ втянутыми рубцами. Сосуды основанія мозга склерозированы.

241. Пелагея *Панина*, 28 л., крест., горничная. По возвращеніи изъ дачи, съ ней былъ сильный припадокъ, такъ что она насилу пришла въ чувство. Утромъ 26 окт. 1907 найдена сидящей на стульчакѣ въ отхожемъ мѣстѣ мертвой.

Вскрытіе 1 нояб. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, дряблое; довольно сильно обложено жиромъ; во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь съ рыхлыми сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты у полулунныхъ клапановъ находятся плотноватыя бѣловатыя бляшки; такія же бляшки находятся на двустворчатомъ клапанѣ и на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій; основанія полулунныхъ клапановъ аорты представляются довольно сильно уплотненными; мышца сердца дрябла, съ глинистымъ оттѣнкомъ. Сосуды основанія мозга слегка извиты.

242. Петръ *Зиновьевъ*, 28 л., крест., служ. въ мясной лавкѣ. Около 3 часовъ ночи 24 янв. 1908 стало плохо, жаловался, что ему подпираетъ подъ ложечку; принявъ валеріановыхъ капель, немного заснулъ, а потомъ сталъ сильно кашлять и немного откашлявшись умеръ.

Вскрытіе 29 янв. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, дрябловато, довольно сильно обложено жиромъ; во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь съ рыхлыми сгустками; на клапанахъ двустворки, а также и у основанія полулунныхъ клапановъ аорты находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки величиной до горошины; мышца сердца дрябловата, сѣровато-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, по мѣстамъ проросла полосками жира; вѣнечныя артеріи жестковаты, извиты, просвѣтъ ихъ по мѣстамъ суженъ довольно сильно бѣловатыми плотноватыми бляшками. Сосуды основанія мозга склерозированы.

243. Пелагея *Ельшина*, 42 л., жена лакея. Утромъ 12 янв. 1908 на улицѣ съ ней сдѣлалось дурно, не въ силахъ была идти, взяла извозчика, въ квартиру ввели подъ руки, при чемъ она жаловалась на сильную боль въ груди, черезъ $^1/_2$—1 ч. умерла.

Вскрытіе 30 янв. 1908. Средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, дряблое, сильно обложено жиромъ; во всѣхъ его полостяхъ находится много темной крови съ довольно плотными фибринозными свертками; на клапанахъ двустворки, на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся бѣловатыя бляшки величиною до горошины; мышца сердца сѣровато-красноватаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, очень дряблая, по мѣстамъ проросла полосками жира. Сосуды основанія мозга склерозированы. Матка съ голову новорожденнаго ребенка, бугриста, плотна; изъ ея наружнаго зѣва выдается красноватая опухоль величиною съ грецкій орѣхъ, при вскрытіи полости матки оказавшаяся полипомъ на длинной тонкой ножкѣ.

244. Василій *Андріановъ*, 62 л., крест., 24 янв. 1908 пришелъ въ баню въ 3—4 ч. дня, мылся въ парильной, съ нимъ тамъ сдѣлалось дурно, и немного спустя умеръ. Находился передъ тѣмъ въ больницѣ на излеченіи.

Вскрытіе 1 февр. 1908. Выше средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ, очень дряблое, полости его почти пусты, внутренняя оболочка обоихъ желудочковъ сплошного темнокраснаго цвѣта; на двустворкѣ и полулунныхъ клапанахъ аорты, особенно у ихъ основаній, а также и на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій замѣтны многочисленныя бѣловатыя бляшки, въ которыхъ по мѣстамъ наблюдаются известковыя отложенія; мышца сердца очень дряблая, глинистаго цвѣта, проросла жиромъ, легко рвется; вѣнечныя артеріи жестки, извиты. Сосуды основанія мозга склерозированы.

245. Константинъ *Ивановъ*, 45 л., мѣщ., пьянствовалъ. Страдалъ органическимъ пораженіемъ мозга и порокомъ сердца, и находился 3 раза на излеченіи въ больницѣ для нервно и душевно-больныхъ. Умеръ скоропостижно 16 нояб. 1908.

Вскрытіе 19 нояб. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце сильно вздуто газами, очень дряблое; во всѣхъ его полостяхъ довольно много рыхлыхъ сгустковъ; на внутренней оболочкѣ аорты, вѣнечныхъ артерій и двустворчатомъ клапанѣ имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца сердца очень дряблая, глинистаго цвѣта, проросла жиромъ. Черепная крышка слегка ассиметрична; твердая мозговая оболочка значительно утолщена; на ея внутренней поверхности съ правой стороны замѣчается почти у продольной пазухи ложная перепонка величеною съ двугривенный; по бокамъ продольной пазухи—большое развитіе Пахіоновыхъ грануляцій; мягкая мозговая оболочка утолщена, по мѣстамъ сращена съ веществомъ мозга; извилины мозга нѣсколько сужены, а борозды между ними расширены. Сосуды основанія мозга извиты, зіяютъ.

246. Алексѣй *Акишинъ*, 38 л., мѣщ. Около 20 лѣтъ сильно употреблялъ спиртные напитки, послѣдніе три года сильно пилъ, два года безъ занятій, раньше служилъ бухгалтеромъ. Былъ болѣзненнаго состоянія, больны почки, сильно кашлялъ съ мокротой, страдалъ припадками, въ августѣ ихъ было 16. Годъ назадъ у него была парализована лѣвая половина тѣла. 21 окт. 1908 былъ въ банѣ утромъ, обѣдалъ, въ 4-мъ часу въ клозетѣ съ нимъ былъ припадокъ, разбилъ лобъ до крови, кровь шла изо рта, изъ носа. Припадки повторились нѣсколько разъ, изо рта шла пѣна, глаза косились,—рвоты, поноса и судорогъ не было. Въ 10 часу констатирована была смерть.

Вскрытіе 26 окт. 1908. Средняго роста, трупъ раздутъ гнилостными газами. Сердце раза въ $1^1/_2$ больше кулака покойнаго, дряблое; внутренняя оболочка сердца и аорты окрашены грязновато-красноватымъ цвѣтомъ; на двустворчатомъ клапанѣ, на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца сердца очень дряблая, глинистаго цвѣта, у верхушки на довольно значительномъ протяженіи замѣнена жировой тканью. Твердая мозговая оболочка нѣсколько напряжена. Мягкая мозговая оболочка нѣсколько утолщена, подъ бороздами студенисто-помутнена, снимается съ нѣкоторымъ трудомъ, увлекая частицы мозгового вещества. Въ правомъ полушаріи мозга соотвѣтственно полосатому тѣлу имѣется полость величиною съ голубиное яйцо, выполненная желтоватымъ густоватымъ содержимымъ; стѣнки полости грязновато-зеленоватаго цвѣта, довольно ровныя. Сосуды основанія мозга склерозированы.

247. Иванъ *Петровъ*, 58 л., мѣщ., чернорабочій. 26 нояб. 1908 поднятъ на улицѣ въ безсознательномъ состояніи и по дорогѣ въ больницу умеръ.

Вскрытіе 2 дек. 1908. Роста средняго, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ много темной крови съ обильными рыхлыми темно-красными

сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются небольшія бѣловатыя бляшки; основанія полулунныхъ клапановъ аорты утолщены, плотны на ощупь; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,4 снт., лѣваго—1,5; мышца очень дряблая, буровато-глинистаго цвѣта, по мѣстамъ проросла полосками жира, а у верхушки мышечная ткань почти сплошь замѣнена жировой. Капсула почекъ снимается съ нѣкоторымъ трудомъ, корковый слой слегка истонченъ, лоханки довольно сильно обложены жиромъ. Ткань легкихъ у верхушекъ представляетъ уплотненія величиной до лѣсного орѣха.

248. Степанъ *Спировъ*, 48 л., крест. Сильно пьянствовалъ; три года жалуется на сильную боль въ груди. Не спалъ всю ночь отъ боли въ лѣвомъ боку, утромъ, сидя на стулѣ, умеръ 15 янв. 1909.

Вскрытіе 18 янв. 1909. Средняго роста и тѣлосложенія, худощавъ. Правая половина и лѣвое предсердіе содержитъ довольно много слегка сгустившейся крови; сердечная мышца желтоватая, дряблая; въ толщѣ двустворчатаго клапана и у основанія полулунныхъ клапановъ аорты замѣчаются небольшія известковыя отложенія; такія же отложенія имѣются и въ стѣнкахъ вѣнечныхъ артерій; на внутренней оболочкѣ аорты небольшія фиброзныя утолщенія. Почки слегка уменьшены въ объемѣ, капсула трудно отдѣляется, корковый слой тонокъ, блѣдно-желтоватъ, пирамидки у основанія темно-красныя.

249. Марья *Гагарина*, 70 л., призрѣваемая въ городской богадѣльнѣ. 15 янв. 1909 свалилась на тротуарѣ, изо рта появилась пѣна, стала съ трудомъ дышать; отправленная въ больницу, по дорогѣ умерла.

Вскрытіе 19 янв. 1909. Роста ниже средняго, тѣлосложенія и питанія хорошаго. У лодыжекъ отеки. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, почти сплошь обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ много темной густой крови; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій, а также и на двустворчатомъ клапанѣ имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца дряблая, глинистаго цвѣта, по мѣстамъ проросла полосками жира. Сосуды основанія мозга склерозированы. Въ желчномъ пузырѣ кромѣ жидкой желчи находится довольно много желчныхъ камешковъ величиною до коноплянаго зерна. Почки уменьшены, плотноваты, капсула ихъ снимается легко, оставляя неравномѣрную бугристую поверхность, корковый слой нѣсколько истонченъ; на плоскости разрѣза замѣтны зіяющіе сосуды съ утолщенными стѣнками; пирамидки синевато-красноватаго цвѣта, лоханки сильно обложены жиромъ.

250. Анна Иванова, 56 л., крест. Съ Рождества работой не занималась, ежедневно была сильно выпивши, 19/I весь день пьянствовала, плясала и пѣла пѣсни, около 11 ч. улеглась спать, не раздѣваясь, утромъ обнаружена мертвой, 20 янв. 1909.

Вскрытіе 26 янв. 1909. Роста средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь; внутренняя оболочка обоихъ желудочковъ окрашена равномѣрно въ сплошной темнокрасный цвѣтъ; на внутренней оболочкѣ аорты, ея полулунныхъ клапанахъ и на двустворчатомъ замѣтны довольно плотныя известковыя отложенія; мышца дряблая, глинистаго цвѣта, проросла жиромъ. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста. Сосуды основанія мозга склерозированы.

251. Иванъ Брюшковъ, 50 л., крест., умеръ 1 февр. 1909.

Вскрытіе 4 февр. 1909. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, во всѣхъ его полостяхъ желтая кровь; внутренняя оболочка сердца, аорты и легочной артеріи окрашена въ сплошной красноватый цвѣтъ; на двустворчатомъ клапанѣ и на внутренней оболочкѣ аорты находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки въ чечевичное зерно; устья вѣнечныхъ артерій незначительно сужены; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго около 0,4; мышца буроватаго цвѣта съ глинистымъ оттѣнкомъ, у верхушки проросла жиромъ, легко рвется. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, ткань плотновата; корковый слой слегка истонченъ, плохо отличимъ отъ мозгового. Сосуды основанія мозга склерозированы.

252. Яковъ Шеферъ, 34 л., крест., сторожъ. Послѣднее время сильно предавался пьянству. Раньше сильно кашлялъ и жаловался на боль въ груди. 3 окт. 1909 былъ все время сильно пьянъ, въ 8 ч. вечера обнаруженъ безъ признаковъ жизни.

Вскрытіе 7 окт. 1909. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ темная кровь; внутренняя оболочка аорты темнокраснаго цвѣта; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся бѣловатыя слегка возвышающіяся плотноватыя пятна; на основаніи клапановъ аорты замѣчается уплотненіе ихъ; мышца сердца очень дряблая, глинистаго цвѣта, легко рвется; вѣнечныя артеріи жестковаты на ощупь. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста.

253. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, на видъ около 45 л., обнаруженъ умершимъ на огородѣ 9 окт. 1909.

Вскрытіе 12 окт. 1909. Роста средняго, тѣлосложенія и питанія слабаго. Сердце немного увеличено, во всѣхъ его полостяхъ темная кровь съ обильными кровяными свертками; мышца сердца на ощупь плотновата, буроватаго цвѣта, на плоскости разрѣза замѣтны плотныя сѣроватыя прослойки; у основанія полулунныхъ клапановъ аорты замѣчается довольно значительное уплотненіе, на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій замѣчаются утолщенія. Въ желудкѣ около 500 к. с. жидкости. Капсула почекъ снимается съ нѣкоторымъ трудомъ, корковый слой слегка истонченъ. Сосуды основанія мозга жестковаты, извиты.

254. Иванъ *Кирьяновъ*, 41 г., крест., торговецъ. Велъ нетрезвый образъ жизни, жаловался на боль въ груди. 10 окт. 1909, придя изъ бани сталъ жаловаться на боль въ груди, легъ на кровать и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 14 окт. 1909. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, во всѣхъ его полостяхъ много темной крови съ кровяными свертками; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца буро-краснаго цвѣта, мѣстами сѣровато-бѣлаго, очень плотная, истонченная; клапаны аорты, а отчасти и двустворки немного утолщены, плотноваты. Сосуды основанія мозга жестковаты.

255. Екатерина *Гаврилова*, 69 л., крест., поденная прачка. Вообще была дряхлой. Скоропостижно умерла днемъ 20 окт. 1909.

Вскрытіе 24 окт. 1909. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце немного увеличено, дряблое, во всѣхъ его полостяхъ темная кровь; внутренняя оболочка сердца сплошного темно-краснаго цвѣта; на внутренней оболочкѣ аорты, въ особенности въ нисходящей ея части имѣется много плотноватыхъ на ощупь, мѣстами объизвествленныхъ бляшекъ величиной до 3 коп. монеты; вѣнечныя артеріи жестковаты; мышца сердца очень дряблая, глинистаго цвѣта; полулунные клапаны аорты и двустворчатый плотноваты на ощупь. Корковый слой почекъ слегка истонченъ, плохо отличимъ отъ мозгового, лоханки обложены жиромъ. Въ верхушкахъ легкихъ прощупываются плотноватые узелки величиною съ горошину. Сосуды основанія мозга жестки, извиты.

256. Николай *Паричовъ*, 39 л., крест., 26 окт. 1909 съ утра жаловался, что ему холодно, полѣзъ на печь, гдѣ вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 31 окт. 1909. Роста выше средняго, тѣлосложенія и питанія

умѣреннаго. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ много крови съ рыхлыми сгустками; на двустворчатомъ клапанѣ замѣтны бородавчатыя разращенія; основаніе клапановъ аорты утолщено; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца сердца дряблая, желтовато-краснаго цвѣта, проросла жиромъ; стѣнка желудочковъ тонкая. Ткань почекъ съ желтоватымъ оттѣнкомъ, на ножѣ остается сальный налетъ; рисунокъ плохо выраженъ; ткань плотновата, лоханки довольно сильно обложены жиромъ.

257. Матвѣй *Осиповъ*, 38 л., мѣщ., сѣдельный мастеръ. Пилъ періодически. Съ недѣлю сталъ сильно пить. 26 окт. 1909 былъ очень пьянъ, уложенъ былъ на полу спать, а черезъ два часа обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 2 нояб. 1909. Роста средняго, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, довольно плотное; во всѣхъ его полостяхъ много темной дегтеобразной крови; на двустворкѣ, на внутренней поверхности аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки; толщина стѣнокъ праваго желудочка около 0,4, лѣваго—около 1,5; передняя стѣнка лѣваго желудочка какъ бы немного выпячена, толщина здѣсь достигаетъ всего 0,5; мышца плотная, на разрѣзѣ имѣетъ пестрый видъ: на темно-буромъ фонѣ многочисленныя сѣроватыя плотныя прослойки. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста. На слизистой тонкихъ кишекъ замѣтны сильно увеличенные отдѣльные железистые мѣшечки, мѣстами съ поверхностными язвочками. Въ ткани легкихъ у верхушки прощупываются плотноватые узлы величиной до голубинаго яйца, на разрѣзѣ сплошь пронизанные сѣровато-желтоватыми узелками въ просяное зерно. Сосуды основанія мозга склерозированы.

258. Петръ *Савельевъ*, 34 л., крест., сапожникъ. Раньше сильно пьянствовалъ, но въ послѣднее время пить пересталъ, жаловался на боль въ груди и сильно кашлялъ. Около 11 ч. вечера былъ чуть замѣтно выпивши и легъ спать, ночью стоналъ и кашлялъ, и къ утру умеръ, 30 нояб. 1909.

Вскрытіе 4 декаб. 1909. Роста средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце увеличено въ $1^1/_2$ раза, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ много темной крови съ обильными плотными сѣроватыми фибринозными свертками; на двустворчатомъ клапанѣ и на внутренней оболочкѣ аорты имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки величиной до небольшой горошины; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,4, лѣваго—1,0 снт.; мышца дряблая, глинистаго цвѣта, по мѣстамъ проросла полосками жира. Въ желудкѣ около $^1/_2$ литра пищевой кашицы.

Параличъ сердца вслѣдствіе endoarteriitidis deform. chronicae и расширенія аорты.

259. Викторъ *Ескинъ*, 64 л., мѣщ., умеръ 25 окт. 1906.

Вскрытіе 27 окт. 1906. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце значительно увеличено, очень дряблое, сильно обложено жиромъ, всѣ полости его переполнены темною кровью со значительными рыхлыми темнокрасными сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты многочисленныя сѣровато-желтоватыя бляшки различной величины; восходящая часть аорты представляетъ нѣкоторое мѣшкообразное расширеніе; на наружной поверхности сердца имѣется нѣсколько молочно-бѣлаго цвѣта округлыхъ пятенъ различной величины; мышца

сердца очень дряблая, тусклая, буроватая съ глинистымъ оттѣнкомъ; вѣнечныя артеріи значительно извиты, утолщены; внутренняя ихъ оболочка покрыта плотными бляшками, въ которыхъ замѣчается значительное отложеніе извести, просвѣтъ артерій мѣстами суженъ почти до полнаго уничтоженія. Сосуды основанія мозга склерозированы. На разрѣзѣ легкихъ торчатъ нѣсколько утолщенные бронхи, изъ нихъ выдавливается бѣловатая гноевидная слизистая жидкость.

260. Лукерья *Васильева*, 42 л., крест., работала на фабрикѣ. Лечилась около $1^1/_2$ года, страдала опухолью ногъ и рукъ, и жаловалась, что нечѣмъ дышать. Вечеромъ 5 марта 1907 стала жаловаться на сильное колотье въ тѣлѣ, закашлялась (захрапѣла) и умерла.

Вскрытіе 8 марта 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Кожа на стопахъ, голеняхъ и кистяхъ рукъ представляется нѣсколько утолщенной и отечной. Сердце значительно увеличено и обложено жиромъ, очень дряблое; въ полостяхъ его находится немного жидкой крови; аорта нѣсколько выше своего устья представляется не сильно мѣшковидно расширенной; на ея внутренней оболочкѣ масса плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ величиною до боба; по мѣстамъ въ этихъ бляшкахъ замѣчается значительное отложеніе извести; вѣнечныя артеріи жестковаты, зіяютъ; мышца сердца сѣровато-красноватаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, очень дряблая. Сосуды основанія мозга слегка извиты, эластичны.

261. Лидія *Гоозъ*, 45 л., поч. гражд. Скоропостижно умерла въ Клин. В. Госп. 21 окт. 1908.

Вскрытіе 24 окт. 1908. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. На правой сторонѣ груди въ области 2—4 реберъ около грудины замѣтно выпячиваніе величиною съ яблоко. По вскрытіи грудной клѣтки, все переднее средостѣніе занимаетъ мѣшкообразно расширенная часть восходящей аорты, величиною съ дѣтскую головку; передняя ея поверхность довольно плотно сращена съ грудной клѣткой; изъ этого мѣшкообразнаго расширенія совершенно правильно отходитъ безыменная артерія, лѣвая сонная и лѣвая подключичная, за мѣстомъ отхожденія послѣдней мѣшокъ этотъ рѣзко переходитъ въ нисходящую грудную аорту. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ; во всѣхъ его полостяхъ много темной крови съ обильными рыхлыми темно-красными кровяными сгустками и довольно плотными фибринозными свертками; мышца сердца дряблая, глинистаго цвѣта, легко рвется, прослоена жиромъ, толщина стѣнки праваго желудочка—0,3, лѣваго—0,7, мѣшкообразное расширеніе аорты въ окружности имѣетъ около 26,0 снт.; внутренняя ея поверхность очень неровная, покрыта многочисленными плотными бляшками, мѣстами онѣ изъязвлены, покрыты плотными фибринозными свертками; внутренняя оболочка нисходящей части аорты также покрыта плотноватыми бляшками. Правая плевра тусклая, шероховатая, покрыта свѣжимъ сѣроватымъ налетомъ и плотными старыми пленками; въ ея полости около 400 к. с. желтоватой жидкости съ плавающими въ ней фибринозными хлопьями. На нижней долѣ праваго легкаго ткань плотновата на ощупь, въ разрѣзѣ грязновато-красноватаго цвѣта; съ плоскости разрѣза выдавливается мутная грязновато-красноватая пѣнистая жидкость; нѣкоторые кусочки изъ этой доли легкаго тонутъ въ водѣ. Сосуды основанія мозга извиты.

262. Федоръ *Юдинъ*, 54 л., крест., торговалъ съ лотка. Больше года страдалъ сильной одышкой, водку пилъ рѣдко. Вечеромъ 18 фев. 1909 закашлялся, сѣлъ на стулъ, а затѣмъ опустился на полъ и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 23 фев. 1909. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено раза въ три (бычачье сердце); во всѣхъ его полостяхъ много темной густой крови; на восходящей части аорты

замѣчается мѣшкообразное расширеніе величиною съ кулакъ; внутренняя поверхность его какъ бы изрыта, сплошь покрыта объизвествленными бляшками; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 1,5 снт., праваго—0,5; мышца по мѣстамъ проросла полосками жира; вѣнечныя артеріи жестки на ощупь и устье ихъ значительно сужено. Сосуды основанія мозга жесткіе, извитые.

263. Пелагея *Дмитріева*, 55 л., крест., кухарка. Страдала одышкой, часто отекало лицо. 3 нояб. 1909 сидя на стулѣ стала тяжело дышать, приняла валеріановыхъ капель, стало ее рвать, скользнула со стула на полъ и черезъ нѣсколько минутъ умерла.

Вскрытіе 5 нояб. 1909. Роста средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ, дряблое, во всѣхъ его полостяхъ много темной крови съ небольшимъ количествомъ темнокрасныхъ рыхлыхъ сгустковъ; восходящая часть аорты представляетъ небольшое мѣшкообразное расширеніе, внутренняя поверхность аорты сплошь покрыта бляшками, по мѣстамъ объизвествленными, а мѣстами изъязвленными; устья вѣнечныхъ артерій сужены почти до полнаго уничтоженія ихъ просвѣта; мышца сердца очень дрябла, съ глинистымъ оттѣнкомъ, толщина стѣнки праваго желудочка около 0,4 снт., лѣваго у основанія сердца—1,0, а къ верхушкѣ стѣнка сильно истончается, достигая только 0,3, причемъ мышечная ткань вытѣснена жировой. Сосуды основанія мозга жестки и извиты.

Параличъ сердца вслѣдствіе endoarteriitidis deform. chron., endocardit. chron. и расширенія аорты.

264. Ирина *Тишкина*, 34 л., крест., прачка. Предавалась сильному пьянству, жаловалась на боль въ груди. Наканунѣ жаловалась на сильную боль подъ ложечкой, цѣлый день пила пиво и водку, утромъ 9 окт. 1901 тоже выпила $^1/_{40}$ водки и отправилась въ прачечную, гдѣ съ ней сдѣлалось дурно, и спустя часъ умерла.

Вскрытіе 12 окт. 1901. Невысокаго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста и легкимъ запахомъ спирта. Сердце значительно увеличено и обложено жиромъ, во всѣхъ полостяхъ сердца имѣется темная жидкая кровь, наибольше—въ правой половинѣ; толщина стѣнки праваго желудочка едва достигаетъ 0,2 снт., сильно проращена жиромъ, мускулатура имѣетъ рѣзко желтоватый оттѣнокъ; стѣнка въ высшей степени дрябла; по краю двустворчатаго клапана, а равно и на нѣкоторыхъ сухожильныхъ нитяхъ имѣются замѣтныя плотныя на ощупь утолщенія и выступы не больше коноплянаго зерна; мускулатура лѣваго желудочка ясно желтовата, очень дрябла, толщиной въ 0,9 снт.; отверстіе одной изъ вѣнечныхъ артерій почти совершенно прикрыто расположенной здѣсь склеротической бляшкой, другая имѣетъ удовлетворительный просвѣтъ; внутренняя оболочка дуги аорты имѣетъ до крайности неровный видъ вслѣдствіе почти сплошного развитія желтоватыхъ и бѣловатыхъ бляшекъ, а также аневризматическихъ выпячиваній до лѣсного орѣха. Сосуды продолговатаго мозга и ромбовидной ямки сильно расширены.

265. Семенъ *Кишонъ*, 36 л., мѣщ., портной. Работалъ періодически около 4 лѣтъ, перерывы работы дѣлалъ во время пьянства, послѣднее время сильно пилъ водку, пять дней какъ сильно пьянъ и за работу не садился. 25 окт. 1901 съ утра жаловался на боль въ груди; вечеромъ вышелъ въ отхожее мѣсто, гдѣ спустя 5—6 минутъ найденъ на полу въ полулежачемъ положеніи уже мертвымъ.

Вскрытіе 26 окт. 1901. Средняго роста и сложенія, умѣреннаго питанія. Шея короткая. На передней поверхности сердца имѣется нѣсколько бѣлесоватыхъ довольно крупныхъ съ гладкой поверхностью пятенъ; сердце нѣсколько увеличено; во всѣхъ полостяхъ сердца имѣется темная жидкая безъ примѣси сгустковъ кровь; особенно много ея въ полостяхъ праваго сердца; лѣвое венозное кольцо съ трудомъ пропускаетъ два пальца, правое—три; эндокардій, отчасти клапаны аорты, дву- и трехстворчатый клапаны слегка утолщены по краю и мутнобѣлы; верхушки всѣхъ папиллярныхъ мышцъ укорочены, утолщены, нѣкоторые изъ нихъ блѣдноваты,—общій цвѣтъ мускулатуры блѣдноватый, плотность ея рѣзко повышена; на широкихъ разрѣзахъ мускулатура представляетъ мѣстами обширныя бѣловатыя плотныя на ощупь пятна; толщина стѣнки праваго желудочка 0,25 снт., лѣваго—1,2; устья вѣнечныхъ артерій очень сужены, въ особенности одной изъ нихъ—не проходимо для тонкаго головчатаго зонда, въ этомъ мѣстѣ артерія ломается; дуга аорты—рѣзко измѣнена: она расширена, стѣнка ея утолщена, плотна, не эластична, внутри вся покрыта бляшками, изъ коихъ нѣкоторыя при перегибаніи ломаются; клапаны аорты выдерживаютъ гидростатическую пробу. Правое легкое на разрѣзахъ во всѣхъ своихъ трехъ доляхъ представляетъ обширные суховатые на ощупь, но проходимые для воздуха участки, занимающіе бо́льшую часть центральныхъ участковъ долей, въ нихъ имѣется весьма обильная высыпь одинаковой величины мелкихъ полу-прозрачныхъ сѣроватыхъ въ маковое зерно узелковъ; въ верхушкахъ легкихъ увеличенное количество соединительной ткани. Въ тонкихъ кишкахъ мѣстами имѣется негладкость брюшинной поверхности на протяженіи пятака, здѣсь брюшина нѣсколько покраснѣвшая, на ней имѣются многочисленныя отложенія въ видѣ сѣроватыхъ узелковъ съ конопляное зерно, мѣстами расположенныхъ четкообразно. Соотвѣтственно этому на слизистой оболочкѣ имѣются язвы, расположенныя преимущественно поперечно, съ подрытыми краями и грязнымъ сѣроватымъ дномъ.

266. Фролъ *Андреевъ*, 53 л., крест., извозчикъ. 20 мар. 1902 сѣлъ за столъ обѣдать, но впалъ въ безчувственное состояніе и умеръ за столомъ.

Вскрытіе 23 мар. 1902. Средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце значительно увеличено; въ обѣихъ половинахъ, особенно въ правой, найдена рыхло свернувшаяся кровь; сердечная мышца дряблая, съ желтизной, толщина стѣнки праваго желудочка до 0,5 снт., лѣваго около 1,0; полость лѣваго желудочка замѣтно расширена, на свободномъ краѣ двустворки небольшія утолщенія; просвѣтъ аорты замѣтно расширенъ у ея начала; вѣнечныя артеріи прощупываются въ бороздахъ въ видѣ плотноватыхъ шнурковъ, по вскрытіи ихъ въ стѣнкахъ обнаруживаются желтоватыя бляшки.

267. Яковъ *Барановъ*, 45 л., мѣщ., не имѣлъ опредѣленнаго мѣстожительства, былъ постояннымъ ночлежникомъ постоялаго двора, занимался сгонкой скота на городскомъ скотопригонномъ дворѣ, жизнь велъ крайне нетрезвую. Послѣднее время сильно пьянствовалъ, пищи же почти не принималъ. Явился на ночлегъ пьяный и улегшись подъ нарами уснулъ, а въ 4 часу 2 февр. 1903 усмотрѣнъ мертвымъ.

Вскрытіе 6 февр. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, плохого питанія. Лѣвое крыло носа, лѣвый уголъ рта опущены. Кожа на половомъ членѣ и мошонка отечны. Голени и стопы отечны. Сердце 12×14 снт., снаружи обложено толстымъ слоемъ жира; всѣ его полости переполнены кровью съ довольно плотными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,0 снт., праваго—0,5; мышцы ихъ сѣровато-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, клапаны сердца и его сосудовъ

мутно-бѣловатаго цвѣта, слегка утолщены; просвѣтъ аорты надъ клапанами до дуги сильно расширенъ; внутренняя ея оболочка шероховата отъ множества объемистыхъ плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ; просвѣтъ вѣнечныхъ артерій замѣтно суженъ. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой утолщенъ, пирамидальный укороченъ, ткань значительно уплотнена. Мягкая мозговая оболочка мутно-бѣловатаго цвѣта, не прозрачна. Сосуды основанія мозга утолщены, изви- листы.

268. Владиміръ *Шарковъ*, 45 л., крест., рабочій цементнаго завода. Жизнь велъ добропорядочную, 30 окт. 1903 внезапно упалъ и минуты черезъ 3, не приходя въ себя, умеръ.

Вскрытіе 2 нояб. 1903. Выше средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, питанія умѣреннаго. Сердце немного увеличено, въ обѣихъ его половинахъ, но особенно въ правой, содержится порядочное количество рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ; внутрисердечный покровъ правой половины сплошного темнокраснаго цвѣта; у основанія полулунныхъ заслонокъ аорты небольшія известковыя отложенія; полость лѣваго желудочка немного расширена; аорта тотчасъ у ея начала представляетъ расширеніе просвѣта приблизительно въ два раза; внутренняя оболочка аорты крайне неровная, бугриста, утолщена, отчасти какъ-бы изъѣдена, покрыта многочисленными известковыми плотными отложеніями; устья вѣнечныхъ артерій сужены. При вскрытіи грудной аорты внутренняя оболочка ея оказалась столь же рѣзко измѣненной на протяженіи всей дуги, какъ и у начала сосуда.

269. Марья *Дмитріева*, 39 л., мѣщ., умерла 16 янв. 1907.

Вскрытіе 19 янв. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. На склерѣ наружнаго угла праваго глаза имѣется темнокрасное пятно величиною съ просяное зерно. Во всѣхъ полостяхъ сердца жидкая темная кровь; устье аорты нѣсколько сужено, клапаны ея нѣсколько утолщены, торчатъ въ просвѣтѣ ея; надъ устьемъ аорта представляетъ небольшое мѣшкообразное расширеніе; внутри оболочка аорты покрыта плотными бѣловатыми бляшками, въ которыхъ мѣстами замѣчается отложеніе извести; вѣнечныя артеріи жестковаты, зіяютъ; мышца сердца дрябловата, толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,2 снт. Въ желудкѣ около 800 к. с. жидкости съ запахомъ спирта. Въ лѣвой верхней долѣ легкаго прощупывается нѣсколько плотноватыхъ узловъ величиною до голубинаго яйца, на разрѣзѣ эти фокусы оказались выполненными сыровидной массой. Сосуды основанія мозга немного плотноваты.

270. Игнатій *Михайловъ*, 50 л., жизнь велъ нетрезвую. Около пяти лѣтъ страдалъ ревматизмомъ ногъ, вслѣдствіе чего послѣднее время нигдѣ не работалъ; нѣсколько лѣтъ тому назадъ очень сильно выпивалъ, а въ послѣднее время пьянство сократилъ за неимѣніемъ средствъ. 18 окт. 1907 явился на работу на баржу съ углемъ, черезъ $^1/_4$ ч. почувствовалъ себя дурно, сталъ метаться въ судорогахъ и немного спустя умеръ.

Вскрытіе 20 окт. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено, сильно обложено жиромъ, вѣнечныя артеріи очень жестки; восходящая аорта представляетъ мѣшковидное расширеніе величиною съ кулакъ ребенка; всѣ полости сердца выполнены темной кровью; на полулунныхъ клапанахъ аорты имѣется нѣсколько плотноватыхъ бляшекъ; мышца сердца дрябловата, съ глинистымъ оттѣнкомъ, у верхушки сердца обильно пронизана сѣроватыми плотноватыми полосками; толщина стѣнокъ праваго желудочка около 0,4 снт., лѣваго около 1,5; внутренняя оболочка аорты на мѣстѣ расширенія представляется сплошь покрытой различной величины объизвествленными бляшками; просвѣтъ вѣнечныхъ артерій, особенно задней, сильно суженъ. Содержимое желудка съ запахомъ спирта. Сосуды основанія мозга плотноваты, зіяютъ.

271. Николай *Кузнецовъ*, 42 л., крест., скоропостижно умеръ на амбулаторномъ пріемѣ въ клиникѣ 30 окт. 1907.

Вскрытіе 2 нояб. 1907. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Брюшина гладкая, блестящая, мѣстами довольно сильно утолщена; въ ея полости находится около литра оранжеваго цвѣта жидкости, уд. вѣса 1020; въ ней плаваютъ хлопья фибрина въ небольшомъ количествѣ. Сердце раза въ два больше кулака покойнаго, довольно сильно обложено жиромъ; вѣнечныя вены выполнены темною кровью; во всѣхъ полостяхъ сердца находится темная кровь съ сѣровато-желтоватыми студенистыми свертками; устье аорты нѣсколько сужено, основанія ея полулунныхъ клапановъ представляются утолщенными; восходящая часть аорты немного мѣшкообразно расширена, ея внутренняя оболочка почти сплошь покрыта плотноватыми бѣловатыми, по мѣстамъ объизвествленными бляшками различной величины; устья вѣнечныхъ артерій представляются суженными почти до полнаго уничтоженія просвѣта; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,5 снт., лѣваго—около 2,0; мышца сердца плотновата, на разрѣзѣ пестрая вслѣдствіе многочисленныхъ сѣроватыхъ плотноватыхъ пятенъ. Сосуды основанія мозга склерозированы.

272. Елена *Федотова*, 67 л., жена дворц. гренадера. Съ нею нѣкогда былъ ударъ. Два раза послѣ обѣда ее тошнило и рвало, было обморочное состояніе, жаловалась на боль подъ ложечкой. Подъ утро 12нояб. 1907 усмотрѣна мертвой.

Вскрытіе 16 нояб. 1907. Правильнаго тѣлосложенія, пониженнаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, дряблое, довольно сильно обложено жиромъ, во всѣхъ полостяхъ его находится темная кровь съ небольшимъ количествомъ сѣроватыхъ свертковъ; аорта въ восходящей своей части представляетъ довольно значительное мѣшкообразное расширеніе, внутренняя оболочка въ этомъ мѣстѣ почти сплошь покрыта бѣловатыми плотноватыми бляшками, по мѣстами объизвествленными и изъязвленными; полулунные клапаны аорты нѣсколько утолщены, особенно у основанія; мышца сердца очень дряблая, глинистаго цвѣта, мѣстами проросла жиромъ; вѣнечныя артеріи жестковаты. Слизистая желудка зерниста; въ области дна на ней замѣтны темнокрасныя, нерѣзко ограниченныя какъ-бы слегка возвышающіяся пятна, величиною до маленькой горошины. Сосуды основанія мозга склерозированы. Почки слегка увеличены; капсула ихъ снимается съ трудомъ, ткань плотновата, корковый слой нѣсколько утонченъ, лоханки довольно сильно обложены жиромъ. Слизистая тонкихъ кишекъ сѣроватаго цвѣта; на ней въ области 12-перстной кишки замѣтна группа темно-красныхъ пятнышекъ величиною до чечевичнаго зерна. Въ верхушкахъ легкихъ прощупываются плотноватые узелки величиною до вишни, выполненные сѣровато-желтоватыми сыровидными массами; ткань легкихъ темнокраснаго цвѣта; на ней замѣтны болѣе свѣтлые слегка возвышающіеся островки въ небольшомъ количествѣ.

273. Пелагея *Попыгина*, 37 л., крест., прачка. Послѣднее время жаловалась на боль подъ ложечкой. Спать легла здоровая, въ 5 час. утра 29 янв. 1908 вскрикнула и умерла.

Вскрытіе 4 фев. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находится много темной крови съ обильными рыхлыми кровяными сгустками; восходящая часть аорты представляетъ небольшое мѣшкообразное расширеніе, внутренняя оболочка котораго представляется покрытой плотными, мѣстами объизвествленными бляшками; полулунные клапаны аорты нѣсколько утолщены, особенно у основанія такъ, что устье аорты нѣсколько сужено; мышца сердца дряблая съ желтоватымъ оттѣнкомъ, проросла полосками жира;

стѣнка лѣваго желудочка истончена и полость желудочка расширена; вѣнечныя артеріи жестковаты, устье ихъ сужено почти до полнаго уничтоженія просвѣта.

274. Романъ *Поляковъ*, 48 л., крест., кузнецъ. 4 дек. 1908. Пробывъ въ мыльномъ и парильномъ отдѣленіи бани около часу, успѣлъ лишь одѣть рубаху, какъ съ нимъ сдѣлался припадокъ, легъ на вещи и умеръ.

Вскрытіе 7 дек. 1908. Средняго роста и сложенія, умѣреннаго питанія. Сердце значительно увеличено, содержитъ въ обѣихъ половинахъ, больше въ правой, почти совершенно жидкую темнокрасную кровь; вѣнечныя артеріи прощупываются въ видѣ твердоватыхъ шнурковъ; стѣнка лѣваго желудочка имѣетъ толщину около 1,5 снт., а праваго—0,5; полулунныя заслонки аорты слегка утолщены; внутренняя оболочка аорты у ея начала неравномѣрно бугриста, какъ-бы изъѣдена, покрыта многочисленными известковыми отложеніями, устья вѣнечныхъ артерій сильно сужены, едва замѣтны; окружность аорты въ этомъ мѣстѣ равняется 11,0 снт.; мышца плотновата, въ разрѣзѣ неравномѣрнаго блѣдномясного цвѣта; въ области дуги аорты такія же измѣненія, какъ и въ началѣ. Капсула почекъ трудно снимается, корка блѣдновата, пирамидки темнокрасны. На днѣ 4-го желудочка, въ области слуховыхъ полосокъ, тотчасъ слѣва у средней линіи, замѣчено два кровоизліянія величиною въ чечевичное зерно, лежащія подъ эпендимою, окрашивающія мозговое вещество въ глубь на 0,05 снт.

275. Александръ *Буяновъ*, на видъ около 45 л., крест., каталь. Сильно выпивалъ, послѣ чего жаловался на боль въ груди. 1 нояб. 1909 былъ сильно пьянъ, съ утра чувствовалъ себя очень скверно, въ 11 ч. умеръ.

Вскрытіе 6 нояб. 1909. Роста средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, во всѣхъ его полостяхъ темная кровь съ рыхлыми темнокрасными сгустками; аорта въ своей восходящей части слегка мѣшковидно расширена, внутренняя ея поверхность сплошь покрыта бѣловатыми бляшками, мѣстами объизвествленными, а мѣстами изъязвленными; такія же бляшки находятся на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій; устья ихъ сильно сужены, звѣздообразны; основаніе аортальныхъ клапановъ утолщено, плотно на ощупь; на двустворкѣ замѣтны плотныя бѣловатыя бородавчатыя утолщенія величиною съ горошину; мышца сердца мясокраснаго цвѣта съ глинистымъ оттѣнкомъ, у верхушки проросла жиромъ. Желудокъ сильно вздутъ газами, почти достигаетъ пупка; въ немъ около литра жидкости. Сосуды основанія мозга жесткіе, извитые.

276. Иванъ *Салинъ*, 45 л., скоропостижно умеръ 15 дек. 1909.

Вскрытіе 17 дек. 1909. Роста выше средняго, крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Отъ мозга и содержимаго желудка слышенъ спиртный запахъ. Сосуды основанія мозга жестковаты, извиты. Сердце немного увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ много темной дегтеобразной крови; восходящая часть аорты представляетъ мѣшковидное расширеніе величиной съ большое яблоко; внутренняя поверхность этого расширенія какъ-бы изрыта, покрыта бѣловатыми бляшками, мѣстами объизвествленными; на двустворчатомъ клапанѣ замѣчаются бѣловатыя бородавчатыя разращенія; устья вѣнечныхъ артерій сужены, имѣютъ звѣздообразный видъ; мышца сердца съ глинистымъ оттѣнкомъ, дряблая, легко рвется.

Параличъ сердца вслѣдствіе ожирѣнія его.

277. Луиза *Симонсонъ*, 56 л., мѣщ., горничная. Съ годъ кашляла и жаловалась на боли въ груди. 16 янв. 1900 упала на улицѣ и въ безсознательномъ состояніи доставлена въ больницу, гдѣ умерла.

Вскрытіе 23 янв. 1900. Высокаго роста, умѣреннаго тѣлосложенія.

Сердце величиною въ кулакъ, покрыто значительными отложеніями жира; въ полостяхъ немного темной жидкой крови, преимущественно въ правой половинѣ; мышца дряблая, блѣдная; полость лѣваго желудочка нѣсколько расширена, стѣнки тонковаты. Артеріи основанія мозга имѣютъ слегка утолщенныя стѣнки.

278. Михаилъ *Семеновъ*, 63 л., крест., найденъ мертвымъ на табуреткѣ 20 февр. 1900. Все время сильно пилъ, легъ спать сильно пьянымъ.

Вскрытіе 25 февр. 1900. Выше средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Стопа правая отечна (лѣвая нога отнята въ нижней трети бедра). Сердце значительно увеличено въ объемѣ, съ большими отложеніями жира снаружи; правая половина и лѣвое предсердіе переполнены темной кровью съ рыхлыми сгустками; стѣнки желудочковъ истончены; мышцы ихъ дряблы, блѣдно-красножелтоватаго цвѣта; внутренняя оболочка аорты надъ клапанами слегка шероховата; кровь сердца пахнетъ спиртомъ. Почки уменьшены въ объемѣ, корковый слой утолщенъ, мѣстами сальнаго цвѣта, плотенъ, пирамидки укорочены. Отъ мозга слышенъ ясный запахъ спирта.

279. Прокофій *Лихановъ*, 49 л., крест., молотобоецъ. Велъ жизнь нетрезвую. Въ теченіе послѣднихъ дней предавался сильному пьянству и не работалъ. Послѣдній день 14 мар. 1900 не вставалъ съ постели, не ѣлъ и не пилъ, и ни съ кѣмъ не говорилъ, отправленный въ больницу, на извозчикѣ умеръ.

Вскрытіе 18 мар. 1900. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія, худощавъ. Сердце нѣсколько увеличено, подъ наружнымъ покровомъ довольно обильное отложеніе жира; оба желудочка наполнены рыхлыми кровяными свертками; сердечная мышца дряблая, желтовато-глинистая, полость лѣваго желудочка нѣсколько увеличена. Капсула почекъ не вполнѣ свободно отдѣляется, ткань съ поверхности темнокрасная съ желтоватыми пятнами; корковый слой слегка утолщенъ, пирамидки рѣзко отдѣляются своимъ густымъ темнокраснымъ цвѣтомъ. Артеріи основанія мозга замѣтно утолщены.

280. Евдокія *Михайлова*, 54 л., крест. 18 окт. 1900 легла спать сильно пьяной и найдена мертвой. Пила много вина и ежедневно, часто жаловалась на сердечную и головную боль.

Вскрытіе 21 окт. 1900. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія, достаточнаго питанія. Артеріи основанія мозга имѣютъ довольно тонкія стѣнки. Сердце нѣсколько увеличено, 12×13 снт., съ обильнымъ отложеніемъ жира подъ наружнымъ покровомъ; полости пусты, внутренній покровъ грязно-краснаго цвѣта; полость лѣваго желудочка замѣтно увеличена. Сердечная мышца весьма дрябла, желтоватая, у основанія полулунныхъ заслонокъ аорты кое-гдѣ прощупываются небольшія отложенія извести.

281. Марія *Лонь*, 32 л., крест., предавалась сильному пьянству. Послѣднюю недѣлю ежедневно съ утра находилась въ сильно нетрезвомъ видѣ. Найдена мертвой лежавшей на полу 14 нояб. 1900.

Вскрытіе 18 ноябр. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, хорошаго питанія. Черепная крышка довольно крѣпко сращена съ твердою мозговою оболочкою. Въ сосудахъ и пазухахъ твердой мозговой оболочки содержится дегтеобразная темная кровь, причемъ на мягкой оболочкѣ можно видѣть переполненіе сосудовъ до мелкихъ развѣтвленій. Артеріи основанія мозга имѣютъ достаточно тонкія стѣнки. При вскрытіи мозга ощущается замѣтный спиртный запахъ. Подъ наружнымъ покровомъ сердца обильное отложеніе жира, въ полостяхъ содержится совершенно жидкая кровь, преимущественно въ лѣвой половинѣ, сердечная мышца рѣзко желтовата, дряблая. Почки плотны, капсула снимается съ трудомъ, слои истончены, съ желтоватымъ оттѣнкомъ и сальнымъ блескомъ.

282. Алексѣй *Пустошкинъ*, 43 л., крест., сторожъ. 18 нояб. 1900 най-

денъ по утру мертвымъ у дверей; наканунѣ пилъ. Пилъ запоемъ, на боль и другіе недуги не жаловался.

Вскрытіе 23 нояб. 1900. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце увеличено въ объемѣ, съ большими отложеніями жира спереди; всѣ полости, въ особенности правыя, переполнены темною кровью съ объемистыми сгустками; стѣнка праваго желудочка утолщена; мышцы ихъ блѣдно-краснаго цвѣта, съ желтоватымъ оттѣнкомъ; трехстворчатый клапанъ нѣсколько утолщенъ и мутенъ. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, пирамидки укорочены, ткань плотна. Сосуды основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта, но спадаются.

283. Петръ *Корчагинъ*, 33 л., крест., изготовлялъ швабры. Найденъ утромъ 19 нояб. 1900 въ постели мертвымъ, наканунѣ за ужиномъ пилъ водку. Часто пьянствовалъ, напивался до безчувствія, пропивалъ съ себя даже всю одежду. Здоровья былъ хорошаго, никогда ни на что не жаловался.

Вскрытіе 24 нояб. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, худощавъ. Сердце увеличено въ объемѣ, съ большимъ отложеніемъ жира спереди; въ полостяхъ его, въ особенности въ лѣвыхъ, находится большое количество темной жидкой крови; стѣнки желудочковъ истончены, мышцы дряблы, съ желтымъ оттѣнкомъ. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой утолщенъ, блѣднокраснаго цвѣта съ желтымъ оттѣнкомъ, пирамидки укорочены. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста.

284. Евдокимъ *Филаретовъ*, 41 г., крест., рабочій. Утромъ 21 нояб. 1900 найденъ мертвымъ. На ночь закусывалъ и выпивалъ. Страдалъ одышкой.

Вскрытіе 26 нояб. 1900. Выше средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Въ полости брюшины находится значительное количество прозрачной желтой красноватой водяночной жидкости. Сердце увеличено, съ значительными отложеніями жира спереди; всѣ его полости переполнены темною кровью, почти жидкою, въ особенности лѣвая половина; стѣнка лѣваго желудочка истончена, а праваго утолщена, мышцы дряблы, сѣроватаго цвѣта съ яснымъ желтымъ оттѣнкомъ. Въ правой лобной пазухѣ довольно большая гнойная полость. Слои почекъ истончены, ткань плотна. Отъ всѣхъ внутренностей трупа слышится ясный запахъ бродящаго тѣста.

285. Иванъ *Яковлевъ*, 37 л., крест., чернорабочій. Жаловался на сильную боль въ груди, выпилъ двѣ сотки водки и легъ спать, утромъ 7 дек. 1900 найденъ мертвымъ. Пилъ.

Вскрытіе 11 дек. 1900. Выше средняго роста, средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сосуды основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта. Содержимое желудка пахнетъ спиртомъ. Сердце увеличено, съ значительнымъ отложеніемъ жира спереди; всѣ полости переполнены темной жидкой кровью, стѣнки желудочковъ истончены, мышцы ихъ дряблы, съ ясно желтымъ оттѣнкомъ. Почки немного уменьшены, корковый слой истонченъ, ткань плотна.

286. Петръ *Михайловъ*, 29 л., крест., чернорабочій. Велъ жизнь нетрезвую. Послѣдніе три дня сильно пьянствовалъ. 29 окт. 1901 легъ спать въ замѣтномъ опьяненіи, не прошло и часу, какъ сталъ сильно храпѣть, упалъ съ кровати и умеръ.

Вскрытіе 3 нояб. 1901. Роста выше средняго, тѣлосложенія крѣпкаго, питанія умѣреннаго. Сердце нѣсколько увеличено, съ порядочнымъ отложеніемъ жира подъ наружнымъ покровомъ; правая половина переполнена кровью съ примѣсью рыхлыхъ свертковъ; такая же кровь находилась въ лѣвомъ предсердіи; стѣнка праваго желудочка тонкая, состоитъ почти изъ жира; стѣнка лѣваго не утолщена, полость его немного увеличена; мышца блѣдная съ желтизною. Въ желудкѣ 700 к. с. густой

смѣси, имѣющей запахъ бродящаго тѣста. Почки немного увеличены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, пирамидки укорочены, ткань плотна. На днѣ 4-го желудочка замѣтно значительное расширеніе сосудовъ.

287. Сергѣй *Фрей*, 45 л., крест., отставной ветер. фельдш. Поведенія нетрезваго. 21 ноября 1901 выйдя изъ чайной ослабѣлъ и упалъ, по дорогѣ въ пріемный покой умеръ.

Вскрытіе 25 ноября 1901. Выше средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Половой членъ, мошонка, голени и стопы сильно отечны. Сердце $13 \times 13^1/_2$ снт., съ большими отложеніями жира спереди, повсюду бѣловатыя объемистыя сухожильныя бляшки; въ правой половинѣ сердца умѣренное количество крови со сгустками, тоже и въ лѣвомъ предсердіи; стѣнка лѣваго желудочка 1,7 снт., а праваго 0,2, мышцы ихъ блѣднокраснаго цвѣта, дряблы, со множествомъ желтоватыхъ полосокъ и островковъ. Верхушки легкихъ уплотнены. Посрединѣ края печени спереди находится дефектъ полулунной формы, окруженный звѣздчатыми рубцами. Слои почекъ истончены. Сосуды основанія мозга склерозированы.

288. Ефимъ *Прокофьевъ*, 47 л., крест., тряпичникъ. Сильно пьянствовалъ, трезвымъ не спалъ по ночамъ и жаловался на недомоганіе, днемъ всегда былъ въ нетрезвомъ видѣ. 19 дек. 1901 пришелъ домой пьяный и легъ спать на кровать, немного спустя упалъ на полъ и былъ обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 21 дек. 1901. Выше средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Содержимое желудка пахнетъ спиртомъ. Сердце 13×15 снт., снаружи сильно обложено жиромъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,0 снт., праваго—0,4, мышцы ихъ буро-красно-желтоваты, сильно дряблы. Почки уменьшены въ объемѣ, корковый слой утолщенъ, пирамидки укорочены.

289. Филиппъ *Баскаковъ*, 57 л., крест., щеточникъ. Жизнь велъ все время нетрезвую. Въ нетрезвомъ видѣ явился вечеромъ въ гости съ сороковкой водки и закуской; на другой день 28 янв. 1903 еще выпили; Б. началъ жаловаться на боль въ груди и на судороги въ ногѣ, и черезъ часъ умеръ.

Вскрытіе 1 февр. 1903. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Подъ наружнымъ покровомъ сердца обильное отложеніе жира, мышца глинистаго цвѣта, весьма дряблая. Корковый слой почекъ тонковатъ и блѣденъ, пирамидки темнокрасны.

290. Иванъ *Дедешинъ*, 47 л., крест. Жизнь велъ нетрезвую, не только пропивалъ заработокъ, но и одежду. Вечеромъ пришелъ въ мастерскую въ сильно нетрезвомъ видѣ и залѣзъ спать въ жарко натопленную сушильню мастерской, гдѣ и былъ найденъ утромъ 26 февр. 1903 мертвымъ.

Вскрытіе 28 февр. 1903. Невысокаго роста, средняго сложенія, плохого питанія. При вскрытіи изъ живота исходитъ замѣтный спиртный запахъ. Сердце значительно увеличено, чрезмѣрно обложено жиромъ; полости содержатъ немного крови, преимущественно газы; правый желудочекъ сильно растянутъ; стѣнка его мѣстами состоитъ сплошь изъ жировой ткани; лѣвое венозное кольцо пропускаетъ 3 поперечныхъ пальца; мускулатура лѣваго желудочка дряблая, блѣдно-глинистаго цвѣта. Ткань почекъ блѣдножелтаго цвѣта, корковый слой мѣстами истонченъ; капсула снимается не вполнѣ гладко. Отъ содержимаго тонкихъ кишекъ исходитъ замѣтный спиртный запахъ.

291. Анна *Никифорова*, 31 г., крест., портниха. Послѣднее время сильно пила; часто страдала припадками. 27 окт. 1903 ложась спать, была выпивши; свалилась на полъ и вскорѣ умерла.

Вскрытіе 31 окт. 1903. Средняго роста, крѣпкаго сложенія, избыточ-

наго питанія. Отъ мозга, изъ брюшной полости исходитъ рѣзкій спиртный запахъ, а также отъ содержимаго желудка. Сердце немного увеличено, сильно обложено жиромъ; лѣвое венозное кольцо пропускаетъ 3 пальца; желудочки растянуты, мускулатура весьма дряблая, съ желтизной; стѣнки праваго желудочка почти сплошь проращены жиромъ. По краямъ языка имѣются блѣдные звѣздчатые рубцы.

292. Адольфъ *Тоберъ*, 23 л., рядовой. 20 янв. 1904 во время обѣда внезапно упалъ и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 22 янв. 1904. Высокаго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце 12,5 × 13 × 6 снт., въ бороздахъ значительно обложено жиромъ; всѣ его полости переполнены темною жидкою кровью; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1.5 снт., праваго—0,6, мышцы блѣднокрасноваты, съ большими островками желтоватобѣлаго цвѣта, нѣсколько плотнѣе на ощупь сердечной мышцы, такими же островками пронизаны и сосочковыя мышцы въ лѣвой половинѣ сердца. Въ желудкѣ 1700 к. с. пищевой смѣси съ запахомъ бродящаго тѣста. Капсула почекъ снимается съ нѣкоторымъ трудомъ, ткань довольно плотная.

293. Фома *Груздевъ*, 40 л., крест., каретникъ по дереву. Жизнь велъ раньше нетрезвую, напивался до безпамятства; съ масляной записался и пить пересталъ. 24 февр. 1904 съ утра чувствовалъ боль въ сердце, слегъ въ постель. вечеромъ умеръ.

Вскрытіе 27 февр. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира; во всѣхъ его полостяхъ, особенно правыхъ, большое количество крови со сгустками; сердечная мышца дряблая, блѣдно-красновато-желтоватая. Въ желудкѣ около одного литра жидкой пищевой смѣси съ запахомъ бродящаго тѣста.

294. Семенъ *Макушинъ*, на видъ около 30 л., крест., ломовой извозчикъ. Пилъ изрѣдка. Все хворалъ, жаловался на боль въ груди. Послѣдніе два дня былъ сильно пьянъ. 4 окт. 1904 бросивъ свою лошадь, ходилъ по улицѣ, падалъ на тротуарѣ отъ опьяненія, потомъ легъ у костра, а черезъ два часа былъ усмотрѣнъ мертвымъ.

Вскрытіе 7 окт. 1904. Выше средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено, по бороздкамъ покрыто довольно большимъ количествомъ жира, всѣ его отдѣлы дряблы на ощупь, въ лѣвой половинѣ небольшое количество темной жидкой крови, а правая почти пуста, внутрисердечная оболочка темно-краснаго цвѣта, толщина стѣнки лѣваго желудочка около 2,0 снт., праваго—около 0,2, мышцы ихъ блѣдно-мясного цвѣта, съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблы.

295. Антонъ *Бородовъ*, 28 л., мѣщ., кузнецъ. Получая въ день 1р. 60 к., все время пилъ вино, каждый день былъ пьянъ. 25 дек. 1906 пришелъ въ гости къ товарищу съ 8 ч. утра съ $^1/_4$ ведра водки; они все время пили; напившись сильно пьянымъ, легъ на полъ; въ 6 ч. вечера замѣченъ былъ мертвымъ.

Вскрытіе 29 дек. 1906. Средняго роста, довольно крѣпкаго сложенія, умѣреннаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, значительно обложено жиромъ, въ его полостяхъ, преимущественно въ правой половинѣ, находится темная густая кровь, внутренняя оболочка обоихъ желудочковъ темно-краснаго цвѣта; мышца сердца дрябловата, съ глинистымъ оттѣнкомъ, мѣстами на ней замѣтны бѣловатыя прослойки. Сосуды основанія мозга жестковаты.

296. Настасья *Рыжова*, 59 л., крест., прислуга. Сильно страдала одышкой и болью подъ ложечкой, на лѣстницѣ не могла подниматься безъ посторонней помощи; пила водку. 29 дек. 1906 найдена мертвой, сидящей на стульчакѣ, упершись обѣими руками въ крышку сидѣнья.

Вскрытіе 2 янв. 1907. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце значительно увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблое, во всѣхъ полостяхъ его находится жидкая темная кровь, съ преобладаніемъ въ правой половинѣ его; мышца сердца очень дряблая, мѣстами буроватаго цвѣта, мѣстами глинистаго, тусклая, проросла полосками жира, легко рвется. Сосуды основанія мозга склерозированы. Капсула почекъ снимается съ нѣкоторымъ трудомъ, ткань ихъ плотновата, слои различимы плохо, лоханки сильно обросли жиромъ.

297. Андрей *Гордѣевъ*, 36 л., крест. Нѣсколько лѣтъ страдалъ головной болью, кашлемъ и болью въ груди. Съ утра 14 янв. 1908 совершенно ослабъ, а въ 4 ч. дня упалъ на полъ и впалъ въ безсознательное состояніе, и вскорѣ не приходя въ сознаніе умеръ.

Вскрытіе 19 янв. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце раза въ $1^1/_2$ больше кулака покойнаго; во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь съ рыхлыми сгустками; мышца сердца очень дряблая, сѣровато-желтоватаго цвѣта, по мѣстамъ проросла полосками жира. Сосуды основанія мозга слегка жестковаты и извиты. Въ верхней долѣ праваго легкаго прощупывается плотноватый узелъ величиною съ небольшое яблоко, состоящій на разрѣзѣ изъ сыровидныхъ, мѣстами объизвествленныхъ массъ.

298. Настасья *Синица*, 31 г., крест., чернорабочая. Часто жаловалась на головную боль. Съ утра 19 сен. 1908 совершенно ослабѣла, а послѣ впала въ безсознательное состояніе и вскорѣ, не приходя въ сознаніе, умерла.

Вскрытіе 24 сен. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и довольно хорошаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, довольно сильно обложено жиромъ, очень дряблое, во всѣхъ его полостяхъ довольно много темной крови съ рыхлыми кровяными сгустками; мышца сердца дряблая, буроглинистаго цвѣта. Желудокъ очень большой, въ немъ находится около 600 к. с. жидкости.

299. Егоръ *Береговъ*, на видъ около 35 л., крест., рабочій по выгрузкѣ судовъ. Предавался сильному пьянству, ежедневно бывалъ пьянъ; ночевалъ въ ночлежныхъ домахъ, а когда загуляетъ, то гдѣ придется, на судахъ и даже подъ заборомъ. Пьянымъ забрался спать въ навозную яму, гдѣ утромъ 27 сен. 1908 и обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 29 сен. 1908. Сильное развитіе гнилостныхъ газовъ. Роста средняго. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, довольно сильно обложено жиромъ, очень дряблое, полости его пусты, внутренняя оболочка сердца темнокраснаго цвѣта; устья вѣнечныхъ артерій нѣсколько сужены; мышца очень дрябла, желтовато-глинистаго цвѣта, на ножѣ остается сальный налетъ. Почечныя лоханки обложены жиромъ.

300. Дмитрій *Горбачевъ*, 43 л., крест., столяръ. Выписавшись изъ больницы, все время жаловался на отеки на ногахъ и напивался до сильнаго опьяненія. Вообще образъ жизни велъ нетрезвый. Легъ пьянымъ и утромъ 3 окт. 1908 былъ обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 7 окт. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Отеки у лодыжекъ. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ, очень дряблое; во всѣхъ его полостяхъ темная кровь; мышца сердца очень дрябла, глинистаго цвѣта, сильно проросла жиромъ, а у верхушки почти сплошь замѣщена жиромъ; внутренняя оболочка сердца окрашена въ сплошной темно-красный цвѣтъ; на полулунныхъ клапанахъ аорты замѣтны небольшія плотноватыя бляшки. Отъ содержимаго желудка и мозга запахъ спирта. Сосуды основанія мозга извиты, жестковаты.

301. Григорій *Петровъ*, 28 л., крест., скоропостижно умеръ 8 окт. 1908.

Вскрытіе 10 окт. 1908. Роста выше средняго, крѣпкаго тѣлосложенія и умѣреннаго питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, очень дрябло,

сильно обложено жиром; во всѣхъ его полостяхъ много темной жидкой крови съ фибринозными темноватыми свертками; мышца сердца дряблая, желтовато-глинистаго цвѣта, проросла жиромъ. Въ желудкѣ больше литра жидкости.

302. Гаврилъ *Ширковъ*, 38 л., крест., содержатель сапожной мастерской. Вель нетрезвый образъ жизни. Найденъ мертвымъ въ канавѣ 14 окт. 1908.

Вскрытіе 17 окт. 1908. Роста средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ темная кровь; мышца очень дряблая, глинистаго цвѣта, проросла жиромъ, легко рвется. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста. Сосуды основанія мозга жестковаты, извиты. Отъ мозга—спиртный запахъ.

303. Федоръ *Пискуновъ*, 47 л., крест., чернорабочій. Злоупотреблялъ спиртными напитками. 5 нояб. 1908 вынвши легъ спать на полу и ночью обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 10 нояб. 1908. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ, очень дряблое; полости его почти пусты, внутренняя оболочка сердца и аорты окрашена въ довольно интенсивный грязновато-красноватый цвѣтъ; мышца сердца дряблая, желтовато-глинистаго цвѣта, сильно проросла жиромъ, особенно на верхушкѣ сердца. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста.

304. Егоръ *Никитинъ*, 26 л., крест., ломовой извозчикъ. Ночью 19 нояб. 1908 сталъ хрипѣть и скоро умеръ.

Вскрытіе 20 нояб. 1908. Роста выше средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено, довольно сильно обложено жиромъ, во всѣхъ его полостяхъ довольно много густой и темной крови; мышца сердца блѣдная, съ легкимъ глинистымъ оттѣнкомъ, дряблая, толщина стѣнки правожелудочка—около 0,4 сит., лѣваго—1,0. Въ желудкѣ около 700 к. с. пищевой кашицы. Твердая мозговая оболочка утолщена; на основаніи правой лобной доли находятся опухоль величиной съ грецкій орѣхъ, мясистой консистенціи красноватаго цвѣта, но периферіи болѣе плотная; опредѣлить, откуда происходитъ эта опухоль, не представляется возможнымъ, такъ какъ твердая мозговая оболочка и мягкая, и вещество мозга тѣсно спаяны съ этой опухоли. Мягкая мозговая оболочка сочная, снимается съ трудомъ, увлекая частицы вещества мозга.

305. Акимъ *Спиридонъ*, 29 л., крест., кондукторъ конки. Жизнь велъ тревожно. Послѣдніе два дня жаловался, что у него болитъ сердце. Утромъ 3 окт. 1909 около 8 часовъ лежалъ на кровати, что-то захворалъ и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 7 окт. 1909. Роста средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце немного увеличено, сильно обложено жиромъ, прорастающимъ въ видѣ полосъ въ мышцу сердца; сердце дряблое, во всѣхъ полостяхъ его темная кровь; внутренняя оболочка сердца темнокрасная цвѣта, мышца очень дряблая, желтоватаго цвѣта, легко рвется.

306. Степанъ *Кузнецовъ*, 33 лѣтъ, крест., дворникъ. Раньше пилъ довольно много, послѣдніе два дня совершенно ничего не пилъ и жаловался на сильную изжогу, и просилъ все пить. Прежде жаловался на боль груди и живота. Легъ въ постели умеръ въ 11-мъ часу дня 12 нояб. 1909.

Вскрытіе 16 нояб. 1909. Роста немного выше средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ, очень дряблое; во всѣхъ его полостяхъ темная кровь; внутренняя оболочка сердца сплошного темно-краснаго

цвѣта; мышца очень дряблая, свѣтло-глинистаго цвѣта, легко рвется; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,5, лѣваго—около 1,5. Сосуды основанія мозга жестковаты и извиты. Въ лѣвой почечной лоханкѣ оказался камень неправильно округлой формы, сѣроватаго цвѣта, величиной съ голубиное яйцо.

307. Федоръ *Кузнецовъ*, 67 лѣтъ, крест., занимался продажей опилокъ, велъ нетрезвый образъ жизни и всегда являлся домой пьянымъ. Вернулся домой 1 дек. 1909 сильно пьянымъ и легъ спать, въ 12 ч. ночи сильно хрипѣлъ и умеръ.

Вскрытіе 7 дек. 1909. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ полостяхъ сердца много темной густой крови; внутренняя оболочка сердца темно-краснаго цвѣта, но въ лѣвомъ желудочкѣ эта окраска нѣсколько темнѣе; толщина стѣнокъ праваго желудочка—0,4, лѣваго—1,0; мышца очень дряблая, легко рвется, глинистаго цвѣта. Сосуды основанія мозга жестковаты, извиты.

Параличъ сердца вслѣдствіе хроническаго эндокардита.

308. Иванъ *Тимофѣевъ*, 33 л., крест., слесарь. Напивался довольно раза 3—4 въ недѣлю. 25 февр. 1901 попросился изъ бани напиться пьянъ, улегшись его въ постель, а черезъ часъ нашли мертвымъ. Жаловался раньше на боль въ желудкѣ и бокахъ.

Вскрытіе 28 февр. 1901. Ниже средняго роста, средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Отъ желудка—запахъ спирта. Сердце немного увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира спереди; стѣнки желудочковъ немного утолщены; мышцы ихъ буро-красныя цвѣта съ желтоватыми прослойками, довольно плотны; всѣ полости сердца, особенно лѣвыя, наполнены кровью, имѣющей свертки, дву- и трехслойные, кладенные мутнобловатаго цвѣта съ небольшими утолщеніями на свободныхъ краяхъ. Въ верхушкахъ легкихъ находятся плотные узлы сѣроватаго цвѣта и полости наполненныя сѣроватымъ распадомъ или известковымъ. Печень уменьшена, бѣловато-краснаго цвѣта, съ жестко-глинистымъ оттѣнкомъ. Капсула въ почкахъ снимается съ трудомъ; корковый слой истончонъ, пирамиды укорочены, съ салянымъ блескомъ. Въ тонкихъ кишкахъ одинъ экземпляръ широкой ленточной гисты. Солитарныя и бляшкеечныя железы увеличены. Отъ мозга и всѣхъ внутренностей чувствуется сильный запахъ спирта.

309. Федоръ *Андріяновъ*, 45 л., крест., легковой извозчикъ. Періодически по долгу пилъ запоемъ, и напивался на столько много, что на слѣдующій день послѣ пьянства онъ страшно мучился и страдалъ сердцемъ, почему не рѣдко приходилось отпаивать его молокомъ. Въ нетрезвомъ видѣ отправился на легковой заказъ въ извозчичьемъ мыслесъ по городу, а въ 4 ч. утра 29 ноябр. 1902 лошадь привезла его мертвымъ.

Вскрытіе 30 ноябр. 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце приблизительно въ поэтора раза больше кулака покойнаго; при вскрытіи околосердечной сумки передняя поверхность этого органа въ области лѣваго желудочка оказалась крѣпко приращенной на пространствѣ приблизительно въ 5 кон. монету; кромѣ того здѣсь замѣчается полуузировидное выпячиваніе стѣнки, имѣющее въ діаметрѣ около 7,0 сит.; объ половины сердца переполнены темной жидкой кровью; стѣнка праваго желудочка довольно обильно покрыта жиромъ, имѣетъ толщину до 0,5 сит.; полость лѣваго желудочка увеличена приблизительно вдвое насчетъ вышеупомянутаго выпячиванія передней стѣнки; общая толщина стѣнки лѣваго желудочка нѣсколько

болѣе 1.0 снт., но на мѣстѣ выпячиванія постепенно уменьшается до 0,1; мышца темно-красная, но въ окружности выпячиванія стѣнки—блѣдная, плотная, какъ бы фиброзно перерожденная; внутренній покровъ лѣвой половины бѣловатый, мутный, а въ центрѣ выпячиванія лишенъ поверхностнаго слоя и представляетъ двѣ какъ-бы язвенныя кровянистыя шероховатыя поверхности, величиной каждая въ копѣечную монету; двустворчатый клапанъ слегка утолщенъ. Желудочное содержимое имѣетъ спиртный запахъ. Почки нѣсколько увеличены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, пирамидальный слой укороченъ, ткань плотна. Сосуды основанія мозга склерозированы. Отъ легкихъ и отъ черепной полости чувствуется ясный запахъ спирта.

310. Дарья *Иванова*, 42 л., крест., прачка. Сильно предавалась пьянству, въ особенности послѣднее время, жаловалась на боль въ бокахъ. Съ самаго утра пила водку и пиво, а вечеромъ ушла, и на другой день утромъ 21 янв. 1903 была найдена мертвой на сѣнѣ въ конюшнѣ.

Вскрытіе 25 янв. 1903. Нижесредняго роста, средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено; лѣвая половина сильно сокращена, правая слегка зыблется; въ лѣвой половинѣ найдено немного крови, правая переполнена такою же темною и совершенно жидкою кровью; на наружной поверхности аорты у ея начала замѣчены два небольшихъ кровоизліянія подъ серозный покровъ въ видѣ пятнышекъ темнокраснаго цвѣта, величиной въ чечевичное и просяное зерно; стѣнка лѣваго желудочка толщиною немного болѣе 1,0 снт., сердечная мышца темнокрасная, нѣсколько тусклая въ разрѣзѣ; двустворка и полулунныя заслонки аорты слегка утолщены.

311. Сергѣй *Орловъ*, 45 л., крест. Существовалъ прошеніемъ милостыни, жилъ въ ночлежныхъ домахъ, велъ жизнь нетрезвую, что́ милостыней соберетъ, то все пропьетъ. 26 мар. 1903 доставленный въ нетрезвомъ видѣ въ пріемный покой, не приходя въ себя умеръ.

Вскрытіе 29 мар. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, худощавъ. Печень, толстыя и петли тонкихъ кишекъ сращены съ брюшною стѣнкою и между собою старыми ложными перепонками. Сердце значительно увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира снаружи; всѣ его полости переполнены кровью съ небольшимъ количествомъ сгустковъ; внутрисердечная оболочка въ лѣвой половинѣ сердца мутнобѣловатаго цвѣта, утолщена; двустворчатый клапанъ и клапаны аорты утолщены, мутнобѣловатаго цвѣта. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста. Почки уменьшены въ объемѣ, корковый слой утолщенъ, пирамидальный укороченъ. Въ желчномъ пузырѣ около десятка неправильной формы камней съ черной поверхностью величиной отъ горошины до боба. Стѣнки сосудовъ основанія мозга склерозированы. Изъ черепной полости и отъ крови сердца пахнетъ спиртомъ.

312. Екатерина *Макарова*, 52 л., мѣщ. Страдала сердечной болѣзнью. Скоропостижно умерла ночью 3 дек. 1908.

Вскрытіе 5 дек. 1908. Выше средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце увеличено раза въ 2, очень дряблое, полости его почти пусты, внутренняя оболочка сердца и аорты окрашены въ красноватый цвѣтъ; основанія клапановъ аорты утолщены; мышца сердца очень дряблая, глинистая, проросла жиромъ. Слои почекъ плохо отличимы, лоханки сильно обложены жиромъ. Въ желчномъ пузырѣ темная густая желчь и нѣсколько желчныхъ камней величиной до горошины.

313. Федоръ *Михалинъ*, 21 г., крест. Послѣднее время часто пилъ. До 3-хъ часовъ въ гостяхъ пилъ водку и пиво; найдя квартиру запертой, направился въ пивную и сѣлъ около стола, былъ сильно пьянъ; утромъ 21 февр. 1909 обнаруженъ на полу около стула мертвымъ.

Вскрытіе 28 февр. 1909. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія

и питанія. Во всѣхъ полостяхъ сердца находится темная кровь съ рыхлыми сгустками, внутренняя оболочка сердца и аорты окрашена въ темно-красный цвѣтъ; по свободному краю двустворчатаго клапана находятся небольшія бородавчатыя утолщенія; тощина праваго желудочка около 0,4, а лѣваго—0,8 снт., мышца дрябловата. Сосуды основанія мозга немного извиты. На языкѣ замѣтны слѣды прикусовъ.

314. Михаилъ *Осиповъ*, 34 л., крест., умеръ 26 окт. 1909.

Вскрытіе 29 окт. 1909. Роста выше средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ, дряблое, всѣ полости его переполнены темною кровью съ обильными кровяными темнокрасными сгустками и сѣроватыми фибринозными свертками; основаніе полулунныхъ клапановъ аорты утолщено, объизвествлено; мышца сердца дряблая, желтовато-глинистаго цвѣта, толщина стѣнки лѣваго желудочка около 1,0 снт., праваго — около 0,4. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста. Правое легкое сплошь сращено съ пристѣночной плеврой старыми ложными перепонками; въ нихъ соотвѣтственно 4 — 7 ребрамъ замѣчается отложеніе извести, занимающее пространство величиной въ игральную карту. При выниманіи мозга слышенъ спиртный запахъ. Сосуды основанія мозга извиты. Въ правой почкѣ мозговой слой истонченъ, лоханка значительно растянута.

Параличъ сердца вслѣдствіе перерожденія сердечной мышцы.

315. Михаилъ *Ипполитовъ*, 51 г., ремесл., скоропостижно умеръ 16 ноября 1900.

Вскрытіе 20 ноября 1910. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія, крайне истощенъ. Крайняя плоть и мошонка слегка отечны; нижнія конечности ниже колѣнъ отечны. Сосуды основанія мозга склерозированы. Въ полости брюшины находится большое количество желто-красноватой водяночной жидкости, такъ что кишки въ ней плаваютъ. Околосердечная сумка напряжена, при разрѣзѣ вытекаетъ большое количество густого бѣлозеленоватаго гноя; сердце во многихъ мѣстахъ, въ особенности въ области лѣваго желудочка, сращено съ сумкою плотными старыми перепонками; на всей поверхности оно покрыто множествомъ язвъ, особенно обширныхъ на передней поверхности праваго желудочка; язвы эти съ подрытыми краями, дно простирается до мышечнаго слоя, покрыто обрывками мягкихъ частей и гноемъ, правая половина сердца заключаетъ много крови со сгустками, мышцы его съ желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно плотны. Желудокъ пустъ, слизистая оболочка его покрыта слоемъ густой красноватой слизи съ примѣсью мелкихъ темныхъ свертковъ крови; она повсюду сильно красна, въ области малой кривизны у выхода находится круглая язвенная поверхность около 6 снт. въ діаметрѣ съ подрытыми утолщенными краями, въ окружности которыхъ замѣтны мелкія кровоизліянія; дно язвы достигаетъ до брюшного покрова, грязно-сѣраго цвѣта, покрыто разбросанными мелкими свертками крови. Верхняя доля лѣваго легкаго уплотнена, повсюду непроходима для воздуха, сѣрогрязнаго цвѣта, заключаетъ язвенныя полости величиною отъ лѣсного орѣха до голубинаго яйца; стѣнки этихъ полостей покрыты распадомъ и густымъ зеленоватымъ гноемъ. Печень значительно уменьшена, бугриста, покрыта множествомъ бѣловатыхъ полосокъ. Почки уменьшены, капсула ихъ снимаются съ трудомъ, пирамидки истончены, ткань плотна.

316. Елена *Муникова*, 30 л., крест., поденно работаетъ. Не отличалась хорошимъ здоровьемъ и часто жаловалась на головныя боли. Въ

4 часу утра 17 ноября 1900 сдѣлалось очень дурно и она впала въ безсознательное состояніе, и не приходя въ себя въ 6 ч. умерла.

Вскрытіе 21 ноября 1900. Средняго роста, хорошаго питанія. Сердце увеличено въ объемѣ; въ правомъ предсердіи незначительное количество плотныхъ сгустковъ и въ полости аорты надъ клапанами; стѣнка праваго желудочка истончена, лѣваго—утолщена, мышцы сердца весьма дряблы, блѣдно-красныя съ ясно-желтоватымъ оттѣнкомъ.

317. Викентій *Дуткевичъ*, 33 л., крест., столяръ 4 дек. 1900 выпилъ послѣ работы водки, не обѣдалъ, опьянѣлъ, легъ на полу и уснулъ, вечеромъ оказался мертвымъ. Жизнь велъ нетрезвую.

Вскрытіе 10 дек. 1900. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце 14 × 9 снт.; всѣ его полости переполнены темной жидкой кровью; стѣнки желудочковъ утолщены, мышцы ихъ довольно дряблы, красно-сѣроватаго цвѣта съ яснымъ желтымъ оттѣнкомъ. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста

318. Петръ *Мироновъ*, 45 л., крест. 6 дек. 1900 послѣ выпивки заснулъ сидя на скамейкѣ и найденъ мертвымъ.

Вскрытіе 11 декабря 1900. Высокаго роста, правильнаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 11×13 снт., мускулатура сердца дряблая, съ ясно-желтымъ оттѣнкомъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,0 сант., праваго у верхушки 0,1. Въ верхушкѣ лѣваго легкаго прощупываются нѣсколько величиною съ горошину плотныхъ узелковъ. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой нѣсколько истонченъ.

319. Александръ *Молочковъ*, 23 л., крест., пекарь. Сильно пьянствовалъ. Легъ спать на печь сильно пьянымъ, утромъ 12 февр. 1901 найденъ мертвымъ.

Вскрытіе 15 февр. 1901. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено; всѣ его полости пусты, мышцы дряблы, желтоватаго цвѣта; внутрисердечная оболочка (не исключая и на клапанахъ) окрашена въ темнокрасный цвѣтъ. Корковый слой почекъ съ желтоватымъ оттѣнкомъ.

320. Владиміръ *Герасимовъ*, 40 л., крест., ломовой извозчикъ. Образъ жизни велъ довольно нетрезвый. Ночью 14 февр. 1901 вскрикнулъ, сталъ сильно задыхаться и черезъ нѣсколько минутъ умеръ.

Вскрытіе 17 февр. 1901. Высокаго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Содержимое желудка издаетъ довольно проницательный запахъ, хотя не имѣющій близкаго сходства со спиртомъ. Нижнія конечности отечны. Сердце немного увеличено; въ полостяхъ его въ порядочномъ количествѣ кровь съ примѣсью рыхлыхъ свертковъ; одинъ изъ такихъ небольшихъ свертковъ извлеченъ изъ устья задней вѣнечной артеріи; сердечная мышца неравномѣрной плотности, мѣстами въ разрѣзѣ плотноватая, какъ бы рубцовая, въ большинствѣ же дряблая, желтоватая; стѣнка праваго желудочка толщиною до 0,1 снт., стѣнка лѣваго мѣстами не достигаетъ 0,5 снт.; полости сердца на взглядъ расширены; на внутренней оболочкѣ аорты немного мелкихъ фиброзныхъ бляшекъ. Почки увеличены въ $1^1/_2$ раза, капсула не вполнѣ свободно отдѣляется; корковый слой утолщенъ, мѣстами до 1,5 снт., блѣдный, мѣстами желтоватый, сальный; пирамидки низкія. Подпаутинныя пространства мягкой оболочки наполнены мутнымъ эксудатомъ

321. Дмитрій *Ивановъ*, 28 л., крест., землекопъ. Поведенія былъ трезваго. Вернувшись изъ гостей домой, легъ спать въ 10 ч., утромъ 17 окт. 1901 найденъ былъ мертвымъ.

Вскрытіе 19 окт. 1901. Выше средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце 10×12 снт.; всѣ полости его пусты, внутрисердечная оболочка въ предсердіяхъ и на клапанахъ темно-краснаго

цвѣта, въ остальныхъ мѣстахъ безцвѣтна и прозрачна; стѣнки желудочковъ утолщены, мышцы ихъ дряблы, блѣднокраснаго цвѣта съ яснымъ желтымъ оттѣнкомъ. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста. Корковый слой почекъ утолщенъ, желтоватаго цвѣта съ сальнымъ блескомъ, пирамиды укорочены.

322. Фридрихъ *Гильдебрандтъ*, 45 л., германскій подданный. Ни на какія болѣзни не жаловался. 25 окт. 1901 послѣ бани сталъ пить чай, чувствуя боли въ груди, легъ на кровать и началъ метаться; призванный врачъ нашелъ его мертвымъ. За два дня передъ тѣмъ былъ сшибленъ съ ногъ легковымъ извозчикомъ, и съ тѣхъ поръ чувствуетъ сильную боль въ груди.

Вскрытіе 28 окт. 1901. Выше средняго роста, тѣлосложенія крѣпкаго, питанія умѣреннаго. Сердце нѣсколько увеличено, содержитъ въ обѣихъ половинахъ свернувшуюся кровь; мышца въ наибольшей части дряблая, желтоватая, въ области передней стѣнки лѣваго желудочка и перегородки ближе къ верхушкѣ мышца пронизана рѣзко-замѣтными бѣловатыми рубцовыми полосками, на ощупь плотноватая, какъ бы мозолистая; на внутренней оболочкѣ аорты немного мелкихъ фиброзныхъ утолщеній. Въ желудкѣ 550 к. с. пищевой смѣси; объемъ желудка нѣсколько увеличенъ. На выпуклой поверхности печени подъ капсулой замѣчается бѣловатый небольшой звѣздообразный рубецъ, довольно поверхностный. Капсула почекъ не вполнѣ свободно отдѣляется, корковый слой тонокъ, тупо отграниченъ отъ пирамидъ; послѣднія мѣстами низки, лоханки широкія и ожирѣвшія. Кости черепа толстоваты, какъ изнутри, такъ и снаружи замѣтны ограниченныя утолщенія. Сосуды основанія мозга имѣютъ слегка утолщенныя стѣнки.

323. Матвѣй *Бѣляковъ*, 36 л., крест., ломовой извозчикъ, велъ жизнь нетрезвую, все жалованье пропивалъ. Наканунѣ вдвоемъ выпилъ одну сороковку, на утро 17 ноября 1901 найденъ былъ мертвымъ.

Вскрытіе 19 ноября 1901. Выше средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 15 × 14 снт.; правая половина его и лѣвое предсердіе переполнены кровью; стѣнка праваго желудочка толщиною 0,3 снт., лѣваго 1,2; мышцы ихъ весьма дряблы, блѣдно-красно-желтоватаго цвѣта. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой утолщенъ, пирамидки укорочены. Отъ крови въ сердцѣ и отъ легкихъ пахнетъ спиртомъ.

324. Людвигъ *Судписъ*, 45 л., крест. Послѣдніе три года предавался сильному пьянству, послѣ сильнаго періодическаго пьянства любилъ уединеніе, являлось желаніе покинуть семью и уѣхать на родину, куда онъ не разъ и уѣзжалъ. Послѣднюю недѣлю сильно пьянствовалъ, допился до сумасшествія, по ночамъ не спалъ и бредилъ, почернѣлъ, очень мало ѣлъ, а все пилъ водку. Жаловался на боль въ груди. 2 мар. 1902 вечеромъ съ нимъ сдѣлалось дурно, сталъ кружиться на мѣстѣ, смѣяться, впалъ въ конвульсивное состояніе, руками началъ царапаться на стѣнку, затѣмъ упалъ на полъ и въ судорогахъ черезъ нѣсколько минутъ умеръ.

Вскрытіе 6 мар. 1902. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 13 × 12 снт.; правая его половина переполнена темною жидкою кровью, въ лѣвой—ея немного; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго 0,3; мышцы ихъ дряблы, блѣдно-красно-желтоваты; на внутренней оболочкѣ аорты, надъ клапанами—незначительное количество мелкихъ плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ. Отъ жидкости грудной полости и содержимаго желудочно-кишечнаго канала пахнетъ спиртомъ.

325. Николай *Горошневъ*, 26 л., крест., чернорабочій. Никогда ничѣмъ не болѣлъ, только иногда отъ сильнаго пьянства чувствовалъ себя нехорошо. Привели въ квартиру въ сильно нетрезвомъ видѣ и уложили

спать; сначала икалъ, а уснувши сталъ храпѣть. Утромъ 2 окт. 1902 обнаружили его мертвымъ.

Вскрытіе 5 окт. 1902. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія, слабаго питанія. Сердце 13 × 12 снт.; въ полостяхъ сердца находится значительное количество темной жидкой крови съ рыхлыми сгустками; стѣнка лѣваго желудочка толщиною 1,3 снт., праваго 0,3, мышцы блѣдно-красно-желтоваты; клапаны и внутрисердечная оболочка густо окрашены въ темно-красный цвѣтъ.

326. Николай *Дорофеевъ*. 48 л., крест., чернорабочій. Жизнь велъ нетрезвую, пилъ запоемъ уже три дня; утромъ 21 янв. 1903 еле всталъ съ постели, а подъ вечеръ умеръ.

Вскрытіе 24 янв. 1903. Высокаго роста, крѣпкаго сложенія, умѣреннаго питанія. Отъ мозга исходитъ замѣтный спиртный запахъ. Въ брюшной полости найдено около 200 к. с. желтоватокрасноватой жидкости; изъ нея также исходитъ неопредѣленный слабый спиртный запахъ. Сердце значительно увеличено (cor bovinum); во всѣхъ полостяхъ его, преимущественно въ правой половинѣ, содержится много темной жидкой крови и темные солидные сгустки; на наружномъ листкѣ обширныя перламутроваго вида пятна; правый желудочекъ растянутъ, мышца его блѣдновата; толщина стѣнки мѣстами не доходитъ до 0,2 снт.; лѣваго—1,0 снт.: мышца его блѣдна, съ желтизной, дряблая.

327. Евгеній *Подовинниковъ*, 40 л., крест., чернорабочій. Сильно пьянствовалъ. Утромъ 19 окт. 1903 ходилъ въ чайную, вернулся пьянымъ, легъ спать, а черезъ 2 часа обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 22 окт. 1903. Выше средняго роста, средняго тѣлосложенія, худощавъ. Сердце 13 × 11,5 снт., въ полостяхъ его немного темной жидкой крови, стѣнка лѣваго желудочка толщиною 1,2 снт., праваго—0,5, мышцы блѣднокрасноваты, дряблыя; эндокардій въ лѣвой половинѣ сердца и въ правомъ предсердіи густо окрашены въ темнокрасный цвѣтъ; внутренняя оболочка гладкая.

328. Петръ *Ершовъ*, 49 л., крест., чернорабочій. Жизнь велъ нетрезвую. 6 нояб. 1903 пришелъ изрядно выпивши, внезапно пошатнувшись упалъ, захрапѣлъ и сейчасъ же умеръ.

Вскрытіе 11 нояб. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Изъ черепной полости и отъ мозга чувствуется ясный запахъ спирта. Сердце 12 × 13 снт., съ довольно значительнымъ отложеніемъ жира спереди, всѣ его полости пусты, на наружной поверхности подъ перикардіемъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ черноватыя неправильной формы пятна, возвышающіяся надъ поверхностью, довольно плотныя на ощупь, величиной отъ горошины до боба; внутренняя оболочка сердца темно окрашена въ красный цвѣтъ на дву- и трехстворчатомъ клапанахъ, а также въ обѣихъ предсердіяхъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,0 снт., праваго—0,3; полость лѣваго желудочка сильно расширена, мышцы его блѣднокрасны, сильно уплотнены на ощупь, въ разрѣзахъ представляются обширные участки бѣловатаго цвѣта, весьма плотные на ощупь; уплотненія эти главнымъ образомъ располагаются у верхушки сердца; на внутренней оболочкѣ аорты немного мелкихъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Почки уменьшены въ объемѣ, какъ бы дольчаты, капсула ихъ снимается легко, корковый слой истонченъ, пирамидки укорочены; въ корковомъ слоѣ кое-гдѣ круглыя съ чечевицу расширенія, наполненныя мутноватою жидкостью.

329. Павелъ *Нестеровъ*, 54 л., крест., садовникъ. Много лѣтъ постоянно жаловался на боль въ груди и въ животѣ, говоря, что у него внутренняя грыжа. Утромъ за работою 9 дек. 1903 внезапно упалъ и въ безсознательномъ состояніи вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 12 дек. 1903. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, слабаго питанія. Сердце 15×15 снт., полости его пусты, толщина

стѣнки лѣваго желудочка 1,0 снт., праваго—0,3; мышцы ихъ блѣдно-красно-желтоваты, дряблы; у перегородки желудочковъ и у верхушки лѣваго желудочка стѣнка истончена до 0,4 снт. и на значительномъ пространствѣ представляется уплотненною въ видѣ бѣловатыхъ довольно широкихъ рубцовъ; полость лѣваго желудочка увеличена; внутрисердечная оболочка въ лѣвой половинѣ праваго предсердія, а также внутренняя оболочка аорты и легочной артеріи густо окрашены въ темно-красный цвѣтъ; на внутренней оболочкѣ аорты, надъ клапанами и у устья вѣнечныхъ артерій, находится небольшое количество бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Въ желчномъ пузырѣ находится нѣсколько величиною съ горошину угловатыхъ камней. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, блѣдно-желтоватаго цвѣта, пирамидки темнокрасныя.

330. Павелъ *Козыревъ*, 43 л., крест., кочегаръ на заводѣ. Употреблялъ часто спиртные напитки. Послѣдніе три дня жаловался на боль въ груди. 24 янв. 1904 стоя въ кочегаркѣ у машины, внезапно упалъ на полъ въ безсознательномъ состояніи и немного спустя умеръ.

Вскрытіе 26 янв. 1904. Высокаго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 14 × 14½ × 5 снт., съ большими отложеніями жира снаружи; на передней поверхности бѣловатыя сухожильныя бляшки; всѣ полости сердца переполнены кровью съ плотными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,8 снт., праваго—0,5; мышцы ихъ блѣдно-красны, довольно плотны, въ разрѣзахъ заключаютъ множество распространенныхъ бѣловатыхъ плотныхъ пятенъ, которыя находятся и въ папиллярныхъ мышцахъ, на внутренней оболочкѣ аорты небольшое количество бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Въ ткани легкихъ, во многихъ мѣстахъ, въ особенности въ верхушкахъ, находятся круглыя полости, величиною отъ горошины до грецкаго орѣха, наполненныя сѣроватыми сыровидными массами. Капсула почекъ снимается съ большимъ трудомъ, корковый слой истонченъ, пирамиды укорочены, лоханки заполнены жировой тканью; почечная ткань плотная, дольчатая.

331. Дмитрій *Монаховъ*, 42 л., крест., дворникъ. 26 февр. 1904 скалывая ледъ, упалъ на мостовую и тутъ же умеръ. Жизнь велъ трезвую, всегда былъ здоровъ.

Вскрытіе 1 мар. 1904. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, слабаго питанія. Сердце значительно увеличено и обложено жиромъ, на наружной поверхности находятся бѣловатыя сухожильныя пятна; во всѣхъ полостяхъ сердца большое количество жидкой крови съ рыхлыми сгустками; полость лѣваго желудочка сильно расширена, у верхушки стѣнка его сильно утончена до 0,2 снт., по срединѣ—2,0 снт., а праваго—0,7; внутренняя оболочка лѣваго желудочка въ нижней половинѣ бѣловатаго цвѣта, мутна, перекладины уплотнены, бѣловаты; истонченіе стѣнокъ лѣваго желудочка занимаетъ всю нижнюю половину его, на разрѣзахъ она уплотнена, пестра съ бѣловатыми островками; на внутренней оболочкѣ аорты мелкія бѣловатыя плотныя бляшки въ значительномъ количествѣ. Въ желудкѣ одинъ литръ пищевой смѣси. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается легко, корковый слой истонченъ, пирамидки укорочены, лоханки заполнены жиромъ.

332. Петръ *Леонтьевъ*, 33 л., крест., чернорабочій. Постоянно сильно злоупотреблялъ крѣпкими напитками. 4 мар. 1904 возвратился домой въ пьяномъ видѣ и легъ спать, и черезъ нѣсколько часовъ былъ обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 7 мар. 1904. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце значительно обложено жиромъ, съ бѣловатыми сухожильными пятнами на наружной поверхности; всѣ его по-

лости переполнены темной жидкой кровью съ кисловатымъ запахомъ; стѣнки лѣваго желудочка утолщены, мышцы въ разрѣзахъ заключаютъ бѣловатыя плотныя полоски. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста.

333. Авдотья *Иванова*, 48 л., крест., прислуга. Слабаго здоровья, злоупотребляла спиртными напитками и курила табакъ. Жаловалась на боль въ груди, утромъ 1 окт. 1904 найдена мертвой.

Вскрытіе 5 окт. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 12×13 снт., снаружи обложено толстымъ слоемъ жира; предсердія переполнены кровью со сгустками, а въ желудочкахъ—немного такой же крови; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,0 снт., а праваго 0,3; мышцы ихъ блѣдно-красноватыя съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ; въ толщѣ лѣваго желудочка на задней стѣнкѣ находятся бѣловатыя рубцовыя измѣненія на обширномъ пространствѣ; на внутренней оболочкѣ аорты мелкія плотныя бѣловатыя бляшки въ умѣренномъ количествѣ. Почки нѣсколько увеличены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ большимъ трудомъ, по наружной поверхности сильно зернисты, корковый слой рѣзко истонченъ, ткань темно-красная, плотная. Сосуды основанія мозга склерозированы.

334. Яковъ *Тарасовъ*, 35 л., крест., мочальщикъ. Часто пилъ запоемъ. Пришелъ вечеромъ сильно пьянымъ и легъ на полу, утромъ 20 фев. 1905 оказался мертвымъ.

Вскрытіе 23 фев. 1905. Невысокаго роста, умѣреннаго сложенія. Спинка носа сѣдловидная, а крылья запавши; изъ брюшной полости исходитъ спиртный запахъ; сердце значительно увеличено; во всѣхъ полостяхъ сердца, кромѣ газа, имѣется немного крови; мускулатура въ высшей степени дряблая, желтовата, особенно на разрѣзахъ сосочковыхъ мышцъ; въ другихъ мѣстахъ встрѣчаются бѣловатыя жесткія пятна. Содержимое желудка имѣетъ отчасти спиртный запахъ. Капсула почекъ снимается легко, но край разрѣза заворачивается, корковый слой мѣстами истонченъ, пирамидки уплощены, темнѣе окрашены, окололоханочный жиръ разросся.

335. Елена *Федорова*, 14 л., крест., башмачница. Часто жаловалась на головную боль. Наканунѣ съ утра сдѣлалось дурно, вечеромъ опять съ ней стало худо; утромъ 16 сент. 1905 нашли ее мертвой.

Вскрытіе 19 сент. 1905. Ростъ 150,0 снт., тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Сердце дряблое, содержитъ небольшое количество крови со свертками; мышца дряблая, буроватаго цвѣта. Почки нѣсколько увеличены, слои различимы съ трудомъ.

336. Алексѣй *Воронинъ*, 35 л., крест. Злоупотреблялъ спиртными напитками, а послѣднее время водку пилъ чайными стаканами. 17 сент. 1906 явился въ нетрезвомъ видѣ на постоялый дворъ, гдѣ выпилъ чайный стаканъ водки, и легъ спать, ночью былъ усмотрѣнъ мертвымъ.

Вскрытіе 21 сент. 1906. Средняго роста, сложенія и питанія. Отъ области желудка, мозга и крови исходитъ спиртный запахъ. Сердце значительно увеличено, на передней поверхности имѣется перламутровая бляшка, величиною въ 10 коп. монету, во всѣхъ полостяхъ сердца содержится въ изобиліи темная жидкая кровь безъ сгустковъ; мускулатура праваго желудочка не толще 0,25 снт., мускулатура лѣваго желудочка нѣсколько желтовата, на разрѣзѣ пестра, съ желтоватыми участками и сѣроватыми полосками и пятнами. Капсула почекъ мѣстами снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, ткань плотновата, пирамидки болѣе темны.

337. Андрей *Бочаровъ*, 36 л., крест., легковой извозчикъ. Болѣе года страдалъ головною болью. 23 дек. 1906 пришелъ къ брату, жаловался на головную боль и рвоту, прилегъ на кровать, черезъ 3—4 часа былъ обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 30 дек. 1906. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и

питанія. Сердце нѣсколько увеличено, дряблое; во всѣхъ полостяхъ его находится темная кровь съ довольно обильными свертками; мышца сердца дрябловата, тусклая, съ глинистымъ оттѣнкомъ. Капсула почекъ снимается съ нѣкоторымъ трудомъ, слои плохо различимы.

338. Осипъ *Симакинъ*, 32 л., крест., ломовой извозчикъ. Любилъ выпивать, а въ послѣднее время сильно злоупотреблялъ спиртными напитками и три дня не выѣзжалъ на промыселъ, напиваясь до безчувствія. Скоропостижно умеръ въ трактирѣ, куда отправился пить чай, 25 фев. 1907.

Вскрытіе 2 мар. 1907. Средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено; во всѣхъ его полостяхъ находится много темной имѣющей лаковый видъ крови; мышца сердца мѣстами плотновата на разрѣзѣ, на ея темнокрасномъ фонѣ замѣтны плотноватыя сѣроватыя пятна и полоски. Содержимое желудка съ запахомъ спирта. Сосуды основанія мозга слегка извиты.

339. Василій *Пантелѣевъ*, 33 л., крест., рабочій гор. жел. дорогъ 6 сент. былъ уволенъ съ работъ за сильное злоупотребленіе спиртными напитками; страдалъ падучей болѣзнью. Въ нетрезвомъ видѣ легъ спать, а утромъ 18 сент. 1908 обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 22 сент. 1908. Роста выше средняго. Сердце нѣсколько увеличено, дряблое, полости его почти пусты, внутренняя оболочка сердца окрашена въ интенсивный темнокрасный цвѣтъ; мышца сердца очень дряблая, какъ бы тусклая, съ глинистымъ оттѣнкомъ цвѣта, проросла жиромъ. Сосуды основанія мозга извиты.

340. Любовь *Семенова*, 53 л., вд. д. ст. сов., скоропостижно умерла 22 сент. 1908.

Вскрытіе 25 сент. 1908. Роста ниже средняго, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Грудь узкая. Сердце дряблое, во всѣхъ его полостяхъ довольно много темной крови съ рыхлыми темнокрасными сгустками; мышца очень дряблая, глинистая, мѣстами, особенно на верхушкѣ совершенно замѣнена жировою тканью. Въ желчномъ пузырѣ кромѣ густой буроватой желчи оказался камень величиной съ лѣсной орѣхъ. Матка бугриста, величиною съ кулакъ взрослаго человѣка, очень плотная, на разрѣзѣ состоитъ изъ бѣловато-сѣроватыхъ узловъ величиной съ грецкій орѣхъ, полость извилиста и сужена почти до полнаго уничтоженія. Ткань легкихъ въ переднихъ отдѣлахъ блѣдно-краснаго цвѣта, суховата. Сосуды основанія мозга извиты.

341. Сергѣй *Смирновъ*, 30 л. 15 окт. 1908 явился въ чайную, повидимому, въ нетрезвомъ видѣ, просидѣлъ около часу, потомъ какъ будто задремалъ, упалъ со стула на полъ и умеръ.

Вскрытіе 18 окт. 1908. Роста средняго, тѣлосложенія и питанія слабаго. Сердце немного увеличено, во всѣхъ его полостяхъ много темной крови съ довольно плотными фибринозными свертками, мышца дрябловата, глинистаго цвѣта. Отъ содержимаго желудка и мозга слышенъ запахъ спирта. Въ верхушкахъ легкихъ прощупываются узелки величиною съ лѣсной орѣхъ; ткань ихъ на разрѣзѣ пронизана сѣроватыми бугорками съ булавочную головку, нѣкоторые изъ нихъ въ центрѣ желтоваты. Сосуды основанія мозга слегка извиты.

342. Сибирзянъ *Абдулла*, 27 л., крест., извозчикъ. Послѣднее время безъ опредѣленныхъ мѣстожительства и занятій, сильно пьянствовалъ. Найденъ мертвымъ на дворѣ нежилого дома 21 окт. 1908.

Вскрытіе 26 окт. 1908. Роста средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Сердце немного увеличено, дрябловато; во всѣхъ его полостяхъ находится много темной густой крови; мышца сердца сѣро-краснаго цвѣта, по мѣстамъ на плоскости разрѣза замѣтны бѣловатыя прослойки. Содержимое желудка съ запахомъ спирта. Въ почкахъ границы между корковымъ и мозговымъ слоемъ нѣсколько сглажены, ло-

ханки довольно сильно обложены жиромъ. Сосуды основанія мозга мягки, эластичны, слегка извиты.

343. Дмитрій *Кулешовъ*, 55 л., крест. Много пилъ водки, но періодически; послѣдніе дни началъ сильно злоупотреблять. 5 нояб. 1908 сильно пьянымъ явился въ гости и остался тамъ ночевать, ночью обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 7 нояб. 1908. Роста выше средняго,—развитіе гнилостныхъ газовъ въ подкожной клѣтчаткѣ. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, очень дряблое; полости его почти пусты, внутренняя оболочка лѣваго желудочка окрашена въ болѣе интенсивный темно-красный цвѣтъ, чѣмъ праваго; мышца дряблая, глинистаго цвѣта, проросла жиромъ, особенно у верхушки. Капсула почекъ снимается съ нѣкоторымъ трудомъ, корковый слой слегка утолщенъ, плохо отличимъ отъ мозгового. Сосуды основанія мозга жестковаты, извиты.

344. Владиміръ *Тюринъ*, 39 л., крест., ломовой извозчикъ. Всегда пилъ, а послѣднее время недѣли двѣ, а въ особенности дня 3—4, по случаю разсчета всѣхъ рабочихъ за лѣтній періодъ ежедневно былъ сильно пьянъ до безчувствія. Безчувственно пьянымъ легъ днемъ спать, а утромъ 16 нояб. 1908 былъ обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 19 нояб. 1908. Средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце своей наружной поверхностью сплошь сращено съ околосердечной сорочкой, такъ что полость сумки совершенно уничтожена; сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, очень дряблое; полость его почти пуста, внутренняя оболочка сердца окрашена въ довольно интенсивный грязновато-красноватый цвѣтъ; мышца сердца очень дрябла, желтоватоглинистаго цвѣта. Сосуды основанія мозга жестковаты, извиты. Ткань почекъ плотновата, темно-краснаго почти чернаго цвѣта, слои трудно отличимы, лоханки сильно обложены жиромъ.

345. Ева *Куроненъ*, 38 л., крест., чернорабочая. Наканунѣ съ утра жаловалась на головную боль и ознобъ, легла въ постель, до вечера не вставала, утромъ 31 янв. 1909 найдена въ постели мертвой.

Вскрытіе 5 февр. 1909. Роста выше средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ много темной густой крови съ рыхлыми темно-красными сгустками; мышца очень дряблая, легко рвется, по мѣстамъ проросла жиромъ. Въ желудкѣ около 600 к. с. жидкости.

346. Антонъ *Максимовъ*, 47 л., крест., машинистъ на городской водокачкѣ. Собираясь на службу, 5 нояб. 1909 почувствовалъ себя дурно отъ боли въ груди, упалъ на полъ въ безсознательномъ состояніи и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 9 нояб. 1909. Роста средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, очень дряблое; во всѣхъ его полостяхъ много темной крови съ кровяными сгустками; мышца очень дряблая, свѣтлоглинистаго цвѣта, легко рвется, толщина стѣнокъ лѣваго желудочка у основанія около 1,0, у верхушки около 0,4. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, ткань плотновата. Сосуды основанія мозга жестковаты.

Параличъ мозга.

Опухоли головного мозга и его оболочекъ.

347. Евфросинья *Николаева*, 48 л., крест. Жаловалась въ послѣднее время на головную боль. Скоропостижно умерла 6 нояб. 1900.

Вскрытіе 9 нояб. 1900. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія,

хорошаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, обильное отложеніе жира подъ наружнымъ покровомъ, сердечная мышца дряблая, тусклая; двустворчатый клапанъ утолщенъ и укороченъ по свободному краю, полулунныя заслонки аорты у основанія также утолщены. Аорта тотчасъ у ея начала представляетъ расширеніе просвѣта до 4 снт. въ діаметрѣ, внутренняя оболочка сосуда отчасти бугристо-утолщена и покрыта отложеніемъ извести, отчасти какъ бы изъѣдена. Грудная аорта на всемъ протяженіи имѣетъ внутреннюю оболочку бугристо-утолщенную и отчасти покрытую известковыми утолщеніями. Ткань мозга крайне малокровна, бѣлаго цвѣта, плотна. Въ правомъ полушаріи, въ лобной долѣ находится большое гнѣздо размягченія, гдѣ ткань представляется молочно-бѣлою, жидко-тѣстоватою; въ области передняго конца мозолистаго тѣла находится опухоль величиною въ грецкій орѣхъ довольно плотной консистенціи. Сосудистыя сплетенія блѣднокрасныя. Стѣнки сосудовъ основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта.

348. Василій *Романовъ*, 49 л., ст. унт.-оф. военной тюрьмы. Скоропостижно умеръ 21 авг. 1903.

Вскрытіе 22 авг. 1903. Ниже средняго роста, средняго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце значительно увеличено, обложено толстымъ слоемъ жира; толщина лѣваго желудочка 1,2 снт., праваго—0,3; мышцы ихъ тусклыя, блѣдно-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблыя; двустворчатый клапанъ и клапаны аорты слегка утолщены, мутно-бѣловатаго цвѣта. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, ткань плотна. Ткань мозга сильно отечна. Съ правой стороны Вароліева моста и продолговатаго мозга, въ бороздѣ между ними и правымъ полушаріемъ находится опухоль неправильно яйцевидной формы, величиною въ лѣсной орѣхъ, бѣловато-желтоватаго цвѣта, рыхлая, какъ бы дольчатая, легко рвется, болѣе плотною своею частью совершенно бѣлаго цвѣта, крѣпко сращена съ мягкой оболочкой, покрывающей эти части мозга. Ткань Вароліева моста, продолговатаго мозга и мозжечка малокровна, значительно отечна; на днѣ 4-го желудочка сосуды умѣренно расширены кровью.

349. Каролина *Вальшевская*, 35 л., мѣщанка, жена лѣсника. Въ двухъ больницахъ отказали по несерьезности болѣзни. Болѣла около трехъ недѣль, и постоянно жаловалась на сильную головную боль, часто появлялись судороги. Ночью 16 фев. 1904 почувствовала себя дурно и жалуясь на головную боль умерла. Три недѣли назадъ разрѣшилась отъ бремени, послѣ чего начала чувствовать сильныя головныя боли.

Вскрытіе 19 фев. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце значительно увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира спереди; во всѣхъ его полостяхъ весьма много жидкой крови съ небольшимъ количествомъ плотныхъ сгустковъ, толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,4; мышцы ихъ блѣднокрасны съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблы; на внутренней оболочкѣ аорты умѣренное количество мелкихъ плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ. Въ верхушкахъ легкихъ находятся мелкія уплотненія въ видѣ узловъ величиною въ горошину, въ разрѣзахъ имѣющіе сѣроватые узелки съ чечевицу. Въ правой лобной долѣ на сводѣ на пространствѣ въ серебряный рубль твердая мозговая оболочка крѣпко сращена съ мягкой и веществомъ мозга; въ послѣднее вдается твердая опухоль, бугристая, величиною въ куриное яйцо, въ разрѣзахъ имѣетъ цвѣтъ сѣраго вещества мозга, по периферіи окружена желто-бѣловатой кашкой, также плотною на ощупь. Подъ опухолью находится гнѣздо размягченія мозговой ткани, величиною также въ куриное яйцо, здѣсь мозговая ткань представляется въ видѣ бѣло-молочной жидкой кашицы. Ткань мозга малокровна.

Мозговой нарывъ.

350. Спиридонъ *Изотовъ*, 20 л., крест., паркетчикъ. Въ продолженіе четырехъ лѣтъ все время былъ боленъ и особенно послѣдній мѣсяцъ, жаловался на головную боль и имѣлъ сильную рвоту. Утромъ 25 янв. 1901 сдѣлалось дурно, отправленный въ больницу умеръ 26 янв. 1901.

Вскрытіе 31 янв. 1901. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія и питанія. Сердце $12 \times 10^1/_2$ снт., стѣнка праваго желудочка 0,5 снт. толщиною, а лѣваго—2,0 снт., мышцы ихъ довольно дряблы, дву- и трехстворчатый клапаны мутно-бѣловатаго цвѣта съ плотными бѣловатыми бляшками. Ткань мозга крайне малокровна. Въ затылочной долѣ лѣваго полушарія большого мозга находится фокусъ размягченія ткани въ видѣ полости величиною въ гусиное яйцо; стѣнки этой полости состоятъ изъ размягченной клочковатой бѣлаго цвѣта ткани, весьма рыхлой. Въ центрѣ этой полости заключается опухоль яйцевидной формы величиною въ куриное яйцо; по разрѣзѣ опухоли она оказалась наполненною густымъ желто-зеленоватымъ гноемъ, а стѣнки довольно плотныя, повидимому, изъ соединительной ткани.

Размягченіе головного мозга.

351. Анна *Смирнова*, 35 л., мѣщанка, проститутка. Ежедневно являлась въ ночлежный домъ пьяной. Послѣдній разъ явилась выпивши и жаловалась на нездоровье, ночью стала прикладывать къ головѣ холодные компрессы, а утромъ 4 дек. 1903 была отправлена въ больницу, гдѣ черезъ $4^1/_2$ ч. умерла.

Вскрытіе 9 дек. 1903. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце увеличено, съ большими отложеніями жира по бороздамъ; отверстія вѣнечныхъ артерій замѣтно сужены. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, онѣ дольчаты; на поверхности имѣется довольно много рубцовыхъ вдавленій; корковый слой истонченъ, пирамидки укорочены. Твердая и мягкая мозговыя оболочки напряжены; вещество праваго полушарія въ области затылочной и теменной долей размягчено въ видѣ обширнаго фокуса величиною въ кулакъ взрослаго человѣка; размягченная масса представляется въ видѣ бѣловато-желтоватой кашицеобразной массы, легко расплывающейся; стѣнки полости нѣсколько уплотнены; размягченіе касается также наружныхъ участковъ праваго полосатаго тѣла и зрительнаго бугра. На поверхности четверохолмія и въ веществѣ Вароліева моста довольно много кровоизліяній величиною въ просяное зерно.

352. Степанида *Варнашова*, 25 л., крест., умерла 3 марта 1909.

Вскрытіе 8 марта 1909. Средняго роста и сложенія, худощава. Сердечная мышца блѣдна и плотновата. Объемъ желудка замѣтно увеличенъ. Твердая мозговая оболочка сильно напряжена, по снятіи ея мозговыя извилины представляются плоскими, а мягкая оболочка матово-блестящею. Сосуды основанія мозга безъ измѣненія. Въ передней части правой лобной доли у самой поверхности имѣется размягченный фокусъ величиною въ лѣсной орѣхъ; лѣвый зрительный бугоръ рѣзко увеличенъ въ объемѣ и представляется въ два раза больше праваго; въ разрѣзѣ его вещества оно мягковато, безъ яснаго рисунка сѣрыхъ и бѣлыхъ частей.

Водянка головного мозга.

353. Николай *Касаткинъ*, 49 л., надв. сов. Умеръ 13 ноября 1909.

Вскрытіе 14 ноября 1909. Роста ниже средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Продольный діаметръ черепной крышки 20,0 снт.,

поперечникъ 17,0; кости черепа мѣстами не болѣе 0,2 снт. толщины; твердая мозговая оболочка очень сильно напряжена, слегка утолщена, извилины мозга значительно уплощены, борозды между ними сглажены; мозговыя полушарія какъ-бы увеличены; боковые мозговые желудочки очень сильно растянуты прозрачной жидкостью въ количествѣ около 2 стакановъ; мозговое вещество плотновато; сосуды основанія мозга жестковаты. Сердце немного увеличено, дрябло, на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца дрябловата, съ глинистымъ оттѣнкомъ. Въ желудкѣ около 700 к. с. пищевой кашицы.

III.

Болѣзни органовъ дыханія.

Крупозное воспаленіе легкихъ.

354. Иванъ *Нагибинъ*, 51 г., мѣщ., позолотчикъ, — нищенствовалъ. Жизнь велъ крайне нетрезвую, часто хворалъ, жалуясь на боль въ груди и лѣвомъ боку. 23 февр. 1900 поднятъ совершенно больнымъ на улицѣ и черезъ четверть часа умеръ.

Вскрытіе 28 февр. 1900. Выше средняго роста, средняго тѣлосложенія, слабаго питанія. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, съ большими отложеніями жира на наружной поверхности; полости его переполнены плотными темными и бѣлыми сгустками крови; стѣнки желудочковъ утолщены, мышцы ихъ довольно плотны, блѣдно-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ; трех- и двустворчатый клапаны утолщены, мутны, нѣсколько сморщены; внутренняя оболочка аорты бугриста и шероховата, покрыта множествомъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ; клапаны аорты утолщены и мутны. Нижняя доля праваго легкаго объемиста, не спадается, ткань ея имѣетъ равномѣрный печеночный видъ, сѣро-краснаго цвѣта, непроходима для воздуха. Почки уменьшены, блѣдно-желтоватаго цвѣта. Сосуды основанія мозга склерозированы.

355. Александръ *Буслаевъ*, 50 л., рабочій патроннаго завода. Поступилъ 26 сен. 1900 въ госпиталь съ тяжелымъ общимъ состояніемъ, рѣзкимъ ціанозомъ. Вечеромъ въ 6 ч. въ безсознательномъ состояніи; около 10 ч. умеръ. Правая носо-губная складка сглажена. Заболѣлъ 23 сен.—кашель, ознобъ.

Вскрытіе 29 сен. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, худощавъ. Артеріи основанія мозга склерозированы. Сердце обильно обложено жиромъ; мышца тусклая въ разрѣзѣ; стѣнка лѣваго желудочка толстовата; на внутренней оболочкѣ аорты у ея начала замѣчено нѣсколько желтоватыхъ фиброзныхъ бляшекъ небольшой величины. Правое легкое по вскрытіи менѣе спадается, чѣмъ лѣвое; въ области верхней доли, а отчасти и прилежащихъ участкахъ нижней прощупываются болѣе плотныя не рѣзко ограниченныя мѣста, дающія ощущеніе консистенціи мяса, на разрѣзѣ окрашенныя въ болѣе густой темно-красный цвѣтъ; въ верхней долѣ лѣваго легкаго имѣются такіе же участки ткани, но въ меньшемъ количествѣ. Селезенка слегка набухшая. Въ подвздошной кишкѣ замѣчаются слегка увеличенныя солитарныя железки и Пейеровы бляшки, послѣднія отчасти пигментированы; нѣкоторыя брыжжеечныя железы увеличены почти до объема горошины, въ разрѣзѣ сѣроваты. Капсула почекъ съ трудомъ снимается, пирамидки довольно низки, корковый слой блѣдный, мѣстами набухшій.

356. Николай *Дремковъ*, 45 л., крест., коммиссіонеръ. 1 дек. 1900 най-

денъ на панели въ сидячемъ положеніи въ судорогахъ; судороги скоро прошли, и въ безсознательномъ состояніи больной былъ доставленъ въ больницу, гдѣ оказался уже мертвымъ. Жизнь велъ весьма нетрезвую. Для четыре забольлъ кашлемъ и сталъ жаловаться на сильную боль въ груди.

Вскрытіе 8 дек. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Стѣнки сосудовъ основанія мозга утолщены. Сердце 13×11 сант., съ большими отложеніями жира и бѣловатыми широкими фиброзными бляшками спереди; мышца съ яснымъ желтымъ отѣкомъ; стѣнки желудочковъ значительно утолщены; двустворчатый клапанъ утолщенъ, мутнобѣлаго цвѣта, клапаны аорты также утолщены и мутны; на внутренней оболочкѣ аорты разбросаны довольно объемистыя фиброзныя бляшки. Вся верхняя доля лѣваго легкаго объемиста, тягжела, плевра ея напряжена, въ разрѣзахъ ткань этой доли сѣро-мраморнаго цвѣта, повсюду непроходима для воздуха, съ разрѣзовъ стекаетъ мутная однообразная сѣрая жидкость. Селезенка увеличена, набухла, капсула ея напряжена. Почки увеличены, корковый слой утолщенъ.

357. Иванъ *Николаевъ*, 57 л., кресть. Ночью жаловался на жажду и кашелъ, утромъ 6 дек. 1900 скоропостижно умеръ. Жизнь велъ нетрезвую.

Вскрытіе 10 дек. 1900. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Артеріи на основаніи мозга значительно утолщены. На днѣ 4-го желудочка въ лѣвой сторонѣ ромба найдено темно-красное пятнышко въ эпендимѣ (экстравазатъ) величиною въ просяное зерно. Сердце немного увеличено, мышца въ разрѣзѣ тусклая, пятнистожелтая. Лѣвое легкое, нижняя доля совершенно не содержитъ воздуха, имѣетъ плотность мяса, въ разрѣзѣ проходитъ съ мѣстами сѣраго цвѣта; нѣкоторые участки замѣтно размягчены. Селезенка имѣетъ морщинистую капсулу, мякоть полнокровна, перекладины сильно развиты. Ткань почекъ блѣдна, корковый слой мѣстами толще 0,5 сант.

358. Марія *Рейхенеръ*, 35 л., кресть. Роженица IV-раз. Жаловалася на головную боль и сильный кашель, мучающій ее 3 мѣсяца. Объ стопы рѣзко отечны. При кашлѣ отдѣляется пѣнистая слегка кровавая мокрота. Въ 12 ч. рѣзкое ослабленіе дѣятельности сердца, и черезъ полчаса смерть, 28 фев. 1901. Извлеченъ мертвый плодъ вѣсомъ 1450 гр.

Вскрытіе 2 марта 1901. Невысокаго роста, слабаго сложенія и питанія. Сердце немного увеличено, по бороздамъ значительно обложено жиромъ; мускулатура лѣваго желудочка въ высшей степени дряблая; ткань на разрѣзѣ съ рѣзко желтоватымъ оттѣнкомъ, какъ въ стѣнкѣ, такъ и въ папиллярныхъ мышцахъ; толщина стѣнки болѣе плотнаго, съ менѣе замѣтнымъ жировымъ перерожденіемъ мускулатуры, правого желудочка—0,45 сант., лѣваго—0,8; по краю двустворчатаго клапана имѣются старыя плотныя утолщенія. Нижняя доля праваго легкаго плотна, мясиста, сѣрокрасноватаго цвѣта, мало проходима для воздуха. Ткань почекъ съ ясно желтоватымъ оттѣнкомъ. Щитовидная железа во всѣхъ своихъ отдѣлахъ значительно увеличена; трахея на протяженіи пріемныя въ ней железы нѣсколько уже и плотнѣе, но болѣе податливы, а нижняя свободная часть трахеи—шире, и хрящевыя кольца ея болѣе плотны.

359. Иванъ *Алексѣевъ*, 35 л., кресть. Ежедневно выпивалъ, здоровья былъ слабаго, жаловался на боль въ груди. Болѣе серьезно заболѣлъ 2 нояб.; утромъ 10 нояб. 1901 вставши пошатнулся и упалъ, въ чувство не приходилъ и умеръ.

Вскрытіе 13 нояб. 1901. Средняго роста и тѣлосложенія, слабаго питанія. Сердце увеличено, съ большими отложеніями жира снаружи, на перикардіи объемистыя бѣловатыя сухожильныя бляшки; стѣнки желудочковъ истончены, мышцы ихъ буро-краснаго цвѣта съ желтоватымъ

оттѣнкомъ, довольно дряблы; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ. Правое легкое объемисто, тяжело, не спадается, въ разрѣзахъ представляется сѣровато-мраморнымъ, стекаетъ большое количество красноватой гноевидной жидкости; ткань этого легкаго повсюду непроходима для воздуха. Сосуды основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта.

360. Полникарпъ *Антоновъ*, 65 л., кресть, извозчикъ. Спиртныхъ напитковъ не употреблялъ, ни на что не жаловался. Наканунѣ былъ пасмуренъ, 24 фев. 1902 утромъ сдѣлалось дурно, и онъ упалъ на полъ; перепеленный на кровать, не произнося ни одного слова, умеръ.

Вскрытіе 26 фев. 1902. Высокаго роста, средняго сложенія, недостаточнаго питанія. Сердце немного увеличено, 12×10 сант., дуга аорты немного расширена, мѣстами на клапанахъ имѣются известковой плотности узелки; лѣвое венозное кольцо пропускаетъ съ трудомъ концы двухъ пальцевъ, двустворчатый клапанъ утолщенъ, сосѣдственныя края сращены значительно, съ отложеніемъ на нихъ извести; мускулатура сердца неотровать съ желтизной, очень дряблая; вѣнечныя артеріи жесткоаты, зіяютъ, мѣстами сужены жесткими бляшками. Центральные участки обѣихъ долей лѣваго легкаго сѣровато-грязно-краснаго цвѣта, значительно влажны; участки, выражающіе отсюда, хотя плаваютъ отъ воздуха, но весьма возвышаются надъ поверхностью воды; изъ разрѣзовъ мелкихъ и мельчайшихъ бронховъ вытекаетъ гнойнаго вида сливистая и крошковатая жидкость. Пирамидки почекъ туповаты, корковый слой мѣстами истончены; ткань сама желтовата.

361. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, 65 л. 13 марта 1902 изъ ночлежнаго дома, гдѣ онъ жаловался, что у него животъ не въ порядкѣ около трехъ недѣль, отправленный въ пріемный покой умеръ.

Вскрытіе 15 марта 1902. Сложенія средняго, питанія недостаточнаго. Голени и стопы отечны. Желудокъ сильно расширенъ; выходное кольцо желудка съ трудомъ пропускаетъ указательный палецъ, утолщено. Сердце немного увеличено, сильно обложено жиромъ; лѣвое венозное кольцо не безъ труда пропускаетъ 2 пальца; правый желудочекъ растянутъ, толщина стѣнокъ его мѣстами не свыше 0,15 сант.; двустворчатый клапанъ рѣзко утолщенъ по краю въ видѣ бѣловато-желтыхъ плотныхъ узелковъ; вѣнечныя артеріи сильно сужены, ломки, мѣстами закупорены новое красными тромбами. На поверхности праваго легкаго имѣются свѣжія фибринозныя утолщенія, удаляемыя соскабливаніемъ; ткань на разрѣзѣ здѣсь сѣро-краснаго цвѣта, плотна, гнетъ. Корковый слой почекъ мѣстами истонченъ, пирамиды утолщены, жестки. Сосуды основанія мозга склерозированы.

362. Кузьма *Ларіоновъ*, 48 л., кресть., маляръ. Послѣднее время сильно пьянствовалъ, по ночамъ кашлялъ и стоналъ, а также жаловался на недомоганіе во всемъ тѣлѣ. Около сутокъ передъ смертью совершенно затихъ, никуда не ходилъ, все лежалъ и говорилъ до самой смерти, которой никто не ожидалъ, 13 октяб. 1902.

Вскрытіе 15 окт. 1902. Невысокаго роста, средняго сложенія, плохого питанія. Брюшная полость поперечно-ободочной кишки, желудка и печени. Сердце значительно увеличено, снаружи имѣется нѣсколько мутноватыхъ островковъ; мускулатура дряблая, желтоватая, особенно лѣваго желудочка; въ лѣвомъ венозномъ отверстіи помѣщается три поперечныхъ пальца, около устья есть вѣнечныхъ артерій имѣются отложенія известкъ. Въ правой верхней долѣ, объемистой и плотной на ощупь, поверхность разрѣза необычайно сочна, красновата и зерниста: отрѣзанные куски при погруженіи въ воду почти совсѣмъ погружаются. Въ нижней долѣ правое легкое также красновато и плотновато, но поверхность разрѣза менѣе сочна и зерниста. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, пирамиды слегка утолщены, корковый слой неравномѣрной толщины, ткань плотнѣе нормальной.

363. Дмитрій *Попечителевъ*, 1 г., кресть. Находился въ пріютѣ, по

слабости все время лежалъ въ кровати; по тѣлу высыпала сыпь; 1 нояб. 1902 взятъ домой и въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе 6 нояб. 1902. Рость 69 снт., вѣсъ 6520,0. Средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. На боковыхъ частяхъ шеи, боковыхъ частяхъ груди и на верхней части бедеръ замѣтна мелкопятнистая краснота въ видѣ пятнышекъ величиною съ булавочную головку и болѣе, ярко краснаго цвѣта, слегка возвышающихся надъ уровнемъ кожи. Сердце величиною въ полтора кулака покойнаго, мышца сердца блѣдно-красная, тусклая. Ткань легкихъ объемиста, не спадается; объ нижнія доли уплотнены, въ разрѣзахъ имѣютъ однообразный блѣдноватый цвѣтъ, соскабливается съ разрѣзовъ кровянистая жидкость, безъ всякихъ пузырьковъ воздуха, частицы тонутъ на дно. Селезенка увеличена вдвое, темно-вишневаго цвѣта, плотна, значительно наполнена кровью.

364. Федоръ *Никитинъ (Томанъ)*, 60 л., крест., черноработн. Чрезмѣрно пилъ водку. Жаловался на боль въ груди и на то, что у него жжетъ сердце. 10 нояб. 1902 вечеромъ упалъ на дворѣ и умеръ.

Вскрытіе 14 нояб. 1902. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія, достаточнаго питанія. Мышца сердца драблая, въ разрѣзѣ глянцеваго цвѣта, полулунныя заслонки аорты слегка утолщены, подъ наружнымъ покровомъ сердца обильныя отложенія жира. Верхняя и средняя доли праваго легкаго имѣютъ на ощупь мясную плотность, ткань ихъ въ разрѣзѣ сѣраго печёночнаго вида, причемъ на поверхность выступаетъ довольно много гноевидной жидкости. Селезенка немного увеличена, темно-красна, полнокровна. Ткань почекъ блѣдно-краснаго цвѣта, границы слоевъ мѣстами неразличимы, корковый слой достигаетъ величины почти 1,0 снт., пирамидки низки.

365. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, скоропостижно умеръ въ ночлежномъ домѣ 19 янв. 1903.

Вскрытіе 21 янв. 1903. Высокаго роста, средняго сложенія, плохого питанія. На правомъ предсѣчномъ листкѣ сердечной сорочки нѣсколько точечныхъ кровоизліяній; сердце болѣе двухъ кулаковъ покойнаго (cor bovinum); правый желудочекъ растянутъ, стѣнка его толщиною 0,2 снт., цвѣтъ мѣстами почти сплошной желтый; при наливаніи въ аорту воды посадняя уходитъ между клапанами; отверстіе выхода аорты шире нормальнаго; внутренняя оболочка покрыта известковыми выступающими бляшками; два клапана сращены почти до средины своей длины; на мѣстѣ сращенія жесткія известковыя отложенія; устья вѣнечныхъ артерій сужены бляшками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,4 снт.; мускулатура мѣстами желтовата. Правое легкое сплошь приращено выпуклою поверхностью къ грудной стѣнкѣ вѣжними свѣтлыми фибринозными отложеніями, мѣстами красноватыми, мѣстами покрытыми гноевиднымъ налетомъ; плевральная поверхность верхней доли праваго легкаго насыщено-краснаго цвѣта; верхняя доля плотна, объемиста, безвоздушна, на разрѣзѣ сплошного сѣро-краснаго цвѣта; при соскабливаніи поверхности разрѣза высасывается сѣровато-темновато-красная мягкая масса безъ пузырьковъ воздуха; при погруженіи въ воду вся доля цѣликомъ и по частямъ тонетъ. По снятіи черепной крышки въ лѣвой теменной области на 3 поперечныхъ пальца назади пальца надъ лѣвой скуловой дугой и на 2 поперечныхъ пальца назади отъ вертикали лѣваго скулового отростка лобной кости помѣщается висящее внутрь черепа *заращеніе легкое малаго перочиннаго ножа*, проникающее черезъ мозговыя оболочки, въ существо *лѣвой лобной доли*, на границѣ между средней и нижней извилинами этой доли и впереди извилины Вгоса; вдоль этого давняго канала имѣется сращеніе мозговыхъ оболочекъ и буроватая окраска прилежащей мозговой ткани на небольшомъ протяженіи. Рубца на покровахъ черепа на мѣстѣ раненія ножомъ не замѣтно.

366. Иванъ *Андрусовъ*, 55 л., крест. Велъ нетрезвый образъ жизни.

26 янв. 1903 попросилъ переночевать, жаловался на недугъ, въ больницѣ объявили принять на другой день, ночью умеръ.

Вскрытіе 29 янв. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія. Въ правомъ легочномъ мѣшкѣ громадное количество красноватой водянистой жидкости. Сердце 11 × 13 снт.; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,0 снт., а праваго 0,2; мышца съ рѣзко-желтымъ оттѣнкомъ, драбла; на внутренней оболочкѣ аорты довольно много объемистыхъ плотныхъ и твердыхъ известковыхъ бляшекъ. Ткань легкихъ сильно переполнена кровью и отека, проходима для воздуха, за исключеніемъ средней доли праваго легкаго, которая объемиста, тяжела, въ разрѣзахъ имѣетъ видъ печеночной ткани, сфокраснаватаго цвѣта. Содержимое желудка съ остатками капусты.

367. Анна *Зюзина*, 5 мѣс., крест. Заболѣла съ 1 нояб., былъ жаръ и колотье, 5 нояб. 1903 умерла.

Вскрытіе 8 нояб. 1903. Ростъ 62 снт., средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце разъ въ полтора больше кулачка покойной; мышца сердца блѣдно-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно плотна. Передніе края легкихъ вздуты, эмфизематозны, красновато-синіе; нижняя доля праваго легкаго объемиста, уплотнена, не спадается, въ разрѣзахъ темно-краснаго цвѣта; имѣетъ однообразную поверхность, съ разрѣзовъ которой соскабливается темно-красная жидкость безъ пузырьковъ воздуха; нижняя доля лѣваго легкаго также трудно спадается, въ разрѣзахъ темно-краснаго цвѣта, мѣстами непроходима для воздуха. Селезенка значительно увеличена въ объемѣ, довольно плотна, значительно наполнена кровью.

368. Никита *Покусай*, 24 л., ефрейторъ. Накануѣ приходилъ въ цѣлевой слободѣ съ жалобой на головную боль и озноб, весь день работалъ; рвало утромъ, 15 марта 1903, отправленный въ лазаретъ, черезъ нѣсколько часовъ умеръ.

Вскрытіе 18 марта 1903. Высокаго роста, весьма крѣпкаго тѣлосложенія, богатырски развитой крѣпкой мускулатурой, средняго питанія. Сердце немного увеличено, мускулатура сердца въ высшей степени драбла, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, толщина стѣнокъ лѣваго желудочка 0,9 снт., а праваго мѣстами —0,15 снт. На выпуклой поверхности средней доли праваго легкаго спереди, а также нижней доли и междудольной бороздѣ имѣется мутный жѣлтый слой сѣжаго фибрина; послѣ соскабливанія ножомъ видна поверхность гладкой плевры. Ткань средней доли праваго легкаго сфокраснаго цвѣта, при соскабливаніи на ножѣ получается довольно равномѣрный слой сѣровато-краснаго жидкости безъ пузырьковъ воздуха, консистенціи ткани довольно плотная, часть этой доли, опущенной въ воду, тонетъ. Селезенка набухшая. Корковый слой почекъ замѣтно истончень, желтоватаго цвѣта, набухшій, пирамидки тупоноты.

369. Анна *Телявичко*, 65 л., финляндская уроженка. 14 лѣтъ страдала катарромъ желудка, по временамъ воспаленіемъ легкихъ, и сильной одышкой. Послѣдніе недѣлю не вставала съ постели, а 15 март. 1903 умерла.

Вскрытіе 18 март. 1903. Небольшого роста, средняго тѣлосложенія, сильно ожирѣвшая. Кожа желтушная, особенно на лицѣ. Сердце нѣсколько увеличено, сильно ожирѣвшее; мышца драбла, бурая; просвѣтъ легочной артеріи и аорты расширенъ; внутренняя оболочка послѣдней неровная, бугристая, отчасти покрыта известковыми бляшками; устье вѣнечныхъ артерій нѣсколько сужено уголщеніями; толщина стѣнокъ неравномѣрна, полости же его сильно расширены. Нижняя доля праваго легкаго на ощупь имѣетъ мясную плотность, для воздуха непроходима, въ разрѣзѣ желтокраснаго цвѣта съ замѣтной сфоватостью; на поверхности разрѣза выступаетъ немного мутной водянистой жидко-

сти. Капсула почекъ свободно отдѣляется, обнаруживая мелкозернистую поверхность съ поверхностными углубленіями, корковый слой тонокъ, пирамидки малы.

370. Михаилъ *Платоновъ*, 12 л., мѣщ. Долгое время страдалъ головною болью, повторяющееся періодически черезъ нѣсколько недѣль въ теченіе 3—4 дней, лежалъ въ больницѣ. Наканунѣ опять жаловался на головную боль, ночью тошнило и спалъ плохо, а днемъ 21 марта. 1903 былъ найденъ мертвымъ.

Вскрытіе 26 марта. 1903. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце разм въ полтора больше кулачка полнаго, стѣнки желудочковъ только нормальнаго, мышцы ихъ бѣдно-краснаго цвѣта съ рѣзкимъ желтымъ оттѣнкомъ. Верхняя доля праваго легкаго уплотнена, объемиста, не спадается, въ разрѣзахъ имѣетъ плотность печеночной ткани, темнокрасваго цвѣта, съ разрѣзовъ ея стекаетъ кровянистая жидкость безъ пузырьковъ воздуха; эта доля по виду непроходима для воздуха. Селезенка замѣтно увеличена, полнокровна, довольно дряблая.

371. Григорій *Иоаннов*, 42 л., крест. Пилъ запоемъ ежедневно, 3 раза лежалъ отъ пьянства въ больницѣ. 11 нояб. 1903 легъ спать пьянымъ и ночью обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 15 нояб. 1903. Роста средняго и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 14×14 снт., обложено спереди толстымъ слоемъ жира, толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., а праваго—0,3; мышцы бѣдно-красно-желтоватыя, дряблы; на внутренней оболочкѣ аорты находится нѣсколько мелкихъ плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ. Верхняя доля праваго легкаго уплотнена, въ разрѣзахъ равномѣрно сѣровато-красная цвѣта, какъ бы опеченѣла, съ разрѣзовъ ея стекаетъ красноватая жидкость безъ пузырьковъ воздуха. Селезенка немного увеличена. Капсула съ почекъ снимается съ нѣкоторымъ трудомъ, корковый и пирамидальный слой истончены, лоханки расширены и заполнены жировой тканью.

372. Владимиръ *Григорьевъ*, 34 л., мѣщ. Около двухъ лѣтъ велъ нетрезвую жизнь, ницценствовалъ, скитался по ночлежныхъ домамъ и притонамъ, и неоднократно высылаемъ былъ изъ столицы. 17 нояб. 1903 внезапно упалъ на улицѣ и черезъ нѣсколько минутъ умеръ.

Вскрытіе 19 нояб. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, спереди обложено толстымъ слоемъ жира, наружная оболочка мутноѣловатаго цвѣта съ объемистыми плотными бѣловатыми бляшками; мышца довольно плотная; на внутренней оболочкѣ аорты нѣсколько плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста. Въ лѣвой плевральной полости находится около 500 к. с. мутнокрасноватой жидкости съ плавающими въ ней бѣловатыми гноевидными перепонками. Нижняя доля лѣваго легкаго объемиста, тяжела, не спадается, на плеврѣ повсюду находится довольно толстая легко рвущаяся бѣловатыя перепонки; ткань этой доли на разрѣзахъ имѣетъ видъ печеночной, повсюду равномѣрно красноватаго цвѣта, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣются сѣрозатые островки, съ разрѣзовъ ея стекаетъ большое количество сѣровато-красноватой жидкости безъ пузырьковъ воздуха. Капсула селезенки слегка сморщена, ткань темнокрасна, дряблая. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, онѣ какъ-бы дольчаты, корковый слой утолщенъ, пирамидки рѣзко укорочены, въ одной почкѣ имѣется кистовидное расширеніе въ лѣсной орѣхъ, наполненное мутноватой жидкостью.

373. Іосифъ *Филичекъ*, 41 г., крест. Жизнь за послѣднее время велъ крайне нетрезвую, почти ежедневно пьянствовалъ и ничего не ѣлъ. Вечеромъ началъ бредить, отправленъ былъ въ больницу, но въ 2-хъ

больницахъ его не приняли и привезли обратно; все время стоналъ, хрипѣлъ и метался на кровати; утромъ свалился на полъ и тутъ же умеръ, 4 дек. 1904.

Вскрытіе 8 дек. 1904. Роста выше средняго, тѣлосложенія довольно крѣпкаго, питанія умѣреннаго. При снятіи черепной крышки ощущается слабый спиртный запахъ. Мягкая мозговая оболочка представляется мутноватой; соотвѣтственно промежутку между извилинами, надъ ними замѣчается скопленіе мутной слегка желтоватой жидкости, то же имѣется и въ области мозжечка и нижней поверхности. Въ правой плеврѣ около 70 к. с. мутной желтоватой жидкости съ примѣсью бѣлыхъ хлопьевъ; плевра тусклая, на ней рыхлыя волокнистыя перепонки, скрѣпляющія поверхность легкаго. Сердце нѣсколько увеличено, 14×12,5 снт.; мышца тусклая, желтоватая. Верхняя доля праваго легкаго содержитъ воздухъ только у верхушки, въ нижней же части ткань плотна на ощупь, въ разрѣзѣ зерниста и желтовата, вырѣзанные отсюда кусочки тонутъ въ водѣ. Селезенка 15 × 10 × 4 снт., ткань плотновата, капсула гладкая, мякоть содержитъ много крови. Капсула почекъ трудно отдѣляется, объемъ ихъ замѣтно увеличенъ; ткань разрѣза бѣдная; корка набухшая до 1,0 снт.; границы слоевъ не ведутъ различимы.

374. Ненавистная авантюра *мужичка*, 50 л., найденъ на улицѣ въ нетрезвомъ видѣ и доставленъ въ пріемный покой; утромъ обнаруженъ мертвымъ, 17 сент. 1905.

Вскрытіе 21 сент. 1905. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Мышца сердца дряблоната, красно-бурого цвѣта, между мышечными волокнами замѣчаются прослойки жира; вѣнечныя артеріи жестковаты, извиты. Въ тонкихъ кишкахъ найдена ленточная гельста. Легкія довольно объемисты; лѣвая нижняя доля уплотнена, на разрѣзѣ оказывается подвергнувшейся сѣрому опеченѣнію; ткань остальныхъ долей гиперемирована и отечна. Сосуды основанія мозга нѣсколько уплотнены.

375. Иванъ *Плакичъ*, 48 л., поденный рабочій, занимался кладкой дровъ на поклажѣ, постоянно нетрезвомъ образомъ жизни, сильно пилъ водку. Около 2 недѣль пить вино бросилъ, сильно кашлялъ и жаловался на боль въ груди. 27 сент. 1906 найденъ мертвымъ въ чайной, сидящимъ на стулѣ у стола.

Вскрытіе 30 сент. 1906. Средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Въ окружности задняго прохода замѣтно нѣсколько темнеющихъ венозныхъ шишекъ. Сердце увеличено, очень дряблое, значительно обложено жиромъ; на внутренней оболочкѣ аорты замѣтны небольшія сѣровато-желтоватыя плоскія немного возвышающіяся бляшки. Нижняя доля лѣваго легкаго плотная, ткань ея на разрѣзѣ сѣровато цвѣта; кусочки этой доли тонутъ въ водѣ. Селезенка нѣсколько увеличена, ткань ея фіолетоваго цвѣта, съ обильнымъ содержаніемъ мякоти. Сосуды основанія мозга жестковаты и извилисты.

376. Иванъ *Коренко*, 35—40 л., крест. 31 дек. 1906 поднятъ въ безсознательномъ состояніи на улицѣ и по доставленіи въ часть умеръ. Изъ записки общины св. Евгеніи, найденной при немъ, видно что К. страдалъ воспаленіемъ легкихъ.

Вскрытіе 3 янв. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено; мышца дряблоната, мутноватая, какъ-бы обварена. Слизистая дыхательныхъ путей покрыта слизистой гноевидной жидкостью. Правое легкое, особенно его нижняя доля представляется довольно объемистой, плотной; кусочки, вырѣзанные изъ этой доли, тонутъ; на разрѣзѣ ткань сѣровато-желтоватаго цвѣта, мѣстами размягчена; съ плоскости разрѣза стекаетъ замутненная гноевидная жидкость въ довольно большомъ количествѣ. Селезенка нѣсколько уве-

личена, ткань дрябловата. Ткань почекъ мутновата, слои различимы съ трудомъ.

377. Петръ *Тимбири*, 46 л., крест., легковой извозчикъ. Послѣднее время сильно злоупотреблялъ спиртными напитками, жаловался на головную боль, удушье, колотье въ бокахъ; наканунѣ ходилъ въ баню, найденъ вечеромъ мертвымъ въ сидячемъ положеніи на кровати, 20 мар. 1907.

Вскрытіе 24 мар. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено и сильно обложено жиромъ; мышца дрябловата, тускла. Въ полости лѣвой плевры находится около чашки мутноватой жидкости, въ которой плаваютъ хлопья фибрина; плевра нижней доли лѣваго легкаго покрыта сѣроватымъ легко снимающимся налетомъ. Ткань нижней доли лѣваго легкаго плотна, тонетъ въ водѣ, грязно-сѣровато-краснаго цвѣта; съ плоскости разрѣза стекаетъ сѣровато-желтоватая довольно густая смѣшанная со слизью жидкость. Слизистая дыхательныхъ путей покрыта слизистой жидкостью съ примѣсью гноевидной. Селезенка слегка увеличена, капсула ея морщиниста, ткань съ обильнымъ содержаніемъ мякоти.

378. Павелъ *Простакъ*, 52 л., мѣщ., чернорабочій. Послѣднее время велъ нетрезвую жизнь. Ложившись спать жаловался на боль въ груди и затрудненное дыханіе; ночью сильно бредилъ и утромъ умеръ, 11 янв. 1808.

Вскрытіе 15 янв. 1908. Роста средняго, тѣлосложенія и питанія слабоватаго. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, мышца очень дряблая, буровато-глинистаго цвѣта. Нижняя доля лѣваго легкаго плотна, мѣстами же размягчена, тонетъ въ водѣ, на разрѣзѣ грязновато-желтоватаго цвѣта, немного зерниста, съ плоскости разрѣза стекаетъ грязноватая эмульсивная жидкость. Верхняя доля лѣваго легкаго плотновата, на ней остаются слѣды отъ давленія, при разрѣзѣ мало хруститъ; плоскость разрѣза интенсивнаго темно-краснаго цвѣта, немного зерниста, съ нея выдавливается много темной крови, почти непѣнистой. Плевра, покрывающая лѣвое легкое, тускловата, покрыта мѣстами тонкими сѣроватыми пленками свернувшагося фибрина. Сосуды основанія мозга жестковаты, зіяютъ.

379. Серафима *Воронина*, 74 л., крест. 9 февр. 1908 утромъ сдѣлалось дурно; доставленная въ пріемный покой въ безсознательномъ состояніи, черезъ полчаса умерла тамъ, не приходя въ сознаніе.

Вскрытіе 13 февр. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, дрябловато; толщина стѣнки праваго желудочка—0,6 снт., лѣваго около 1,5. Правая плевра въ области средней и отчасти верхней доли тускла, покрыта сѣроватымъ легко снимающимся налетомъ; въ области правой плевры находится немного красноватой жидкости, въ которой плаваютъ сѣроватые хлопья. Средняя и нижняя часть верхней доли праваго легкаго на ощупь плотны, на разрѣзѣ ткань ихъ сѣро-краснаго цвѣта, сплошь пронизана сѣроватыми бугорками; съ плоскости разрѣза выдавливается мутная красноватая почти непѣнистая жидкость; кусочки ткани изъ этого мѣста тонутъ въ водѣ. Сосуды основанія мозга склерозированы.

380. Гавріилъ *Митиковъ*, 27 л., крест., скоропостижно умеръ въ Клин. Воен. Госп. 12 февр. 1908.

Вскрытіе 14 февр. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Кожа желтушна, на ногахъ нѣсколько утолщена, отечна. Брюшина гладкая, мѣстами утолщенная, блестящая, въ ея полости около 300 к.с. красноватой слегка мутноватой жидкости, въ которой плаваютъ небольшіе фибринозные свертки. Въ полости правой плевры около 700 к. с. красноватой мутноватой жидкости съ фибринозными свертками; плевра, покрывающая легкое, по мѣстамъ тускла, покрыта сѣроватымъ

снимающимся налетомъ; лѣвая плевра гладкая, блестящая, въ ея полости около 500 к. с. красноватой мутноватой жидкости съ фибринозными хлопьями. Сердце нѣсколько увеличено, дрябловато; на клапанахъ двустворки довольно обильныя бородавчатыя разращенія; сухожильныя нити сильно укорочены; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца сердца на разрѣзѣ имѣетъ пестрый видъ: на сѣровато-красномъ, мѣстами желтоватомъ фонѣ замѣтны сѣроватыя полоски и бляшки. Селезенка увеличена раза въ два, капсула ея гладкая, нѣсколько утолщенная, ткань красноватаго цвѣта, съ небольшимъ содержаніемъ мякоти, на плоскости разрѣза сѣроватыя полоски. Почки увеличены раза въ полтора, капсула ихъ мѣстами снимается съ трудомъ; на поверхности кое-гдѣ неравномѣрныя углубленія, ткань плотновата, пестраго, красноватаго цвѣта; корковый слой мѣстами утолщенъ, а мѣстами утонченъ, пирамидки не рѣзко отъ него отличаются. Средняя и нижняя доля праваго легкаго плотна на ощупь, на разрѣзѣ сѣровато-краснаго цвѣта, по мѣстамъ размягчена; съ плоскости разрѣза соскабливается эмульсиввая гноевидная жидкость; кусочки ткани тонутъ въ водѣ.

381. Любовь *Забродова*, 36 лѣтъ, крест., скоропостижно умерла въ Клин. Воен. Госп. 23 янв. 1909.

Вскрытіе 26 янв. 1909. Средняго роста, слабаго сложенія и питанія. Голени и стопы отечны. Сердце увеличено болѣе, чѣмъ въ 2 раза; во всѣхъ полостяхъ его, особенно въ правыхъ, много темной съ темными сгустками крови; лѣвое венозное кольцо едва пропускаетъ одинъ палецъ; стѣнка праваго желудочка около 0,6 снт., мѣстами желтовата; желудочки мѣстами растянуты; толщина стѣнки лѣваго желудочка едва превышаетъ 0,7—0,8; лѣвое венозное кольцо сужено вслѣдствіе утолщенія съ суженіемъ двустворчатаго клапана; плотность его достигаетъ степени мозоли; сосочковыя мышцы истончены, подтянуты верхушками почти къ самому клапану, сухожильныя нити крайне утолщены и укорочены; края сосѣдственныхъ клапановъ сращены на большомъ протяженіи, по самому свободному краю двустворки имѣется рядъ мелкихъ красноватыхъ зернистыхъ болѣе мелкихъ отложеній; края сосѣднихъ клапановъ аорты на небольшомъ протяженіи сращены другъ съ другомъ, сами клапаны утолщены. Лѣвая верхняя доля легкихъ сплошь массивна, тяжела, желтовато-краснаго цвѣта, на разрѣзѣ напоминаетъ печень, кусочки ея тонутъ въ водѣ, съ разрѣза соскабливается желтовато-красноватая гноевидная густая малопѣнистая жидкость. Въ меньшей степени массивны и еще плавучи нижняя доля лѣваго легкаго и ткань праваго; но ткань также на разрѣзѣ напоминаетъ печеночную, суховата, съ красноватымъ необильнымъ, относительно малопѣнистымъ соскобомъ; болѣе воздуха содержитъ нижняя доля праваго легкаго. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корка зернистая, желтокрасноватаго цвѣта; пирамидки болѣе темны, уменьшены; слои неотчетливо различимы, ткань плотна.

382. Анна *Иванова*, 57 л., крест., нищенка. Ежедневно была пьяна, 7 окт. 1909 жаловалась съ утра на боль въ груди, днемъ лежала, около 4 ч. умерла.

Вскрытіе 9 окт. 1909. Роста нижесредняго, тѣлосложенія умѣреннаго, питанія слабаго. Сердце сильно обложено жиромъ, дряблое; мышца тусклая, дряблая, какъ бы обвареная. Нижняя доля лѣваго легкаго объемиста, плотна на ощупь, покрыта сѣроватыми, нѣжными, легко снимающимися пленками, на разрѣзахъ зернисто-сѣраго цвѣта, съ плоскости разрѣза соскабливается мутноватая гноевидная жидкость. Ткань печени, почекъ, селезенки тусклая, какъ бы обвареная, дряблая.

383. Федосья *Галкина*, 39 л., крест., опредѣленныхъ занятій не имѣла, страдала ревматизмомъ въ ногахъ, жизнь вела крайне нетрезвую. Скоропостижно умерла въ 12 ч. дня 9 нояб. 1909.

Вскрытіе 13 нояб. 1909. Роста средняго, тѣлосложенія умѣреннаго, питанія слабаго. Правая плевра, покрывающая легкое, тускловата, покрыта сѣроватыми пленками; въ полости ея около 2 столовыхъ ложекъ мутноватой жидкости. Верхняя доля праваго легкаго плотна на ощупь, на разрѣзахъ буровато-красноватаго цвѣта, плоскость разрѣза слегка зерниста, съ нея выдавливается мутноватая гноевидная жидкость; кусочки тонутъ въ водѣ. Мышца сердца тусклая, какъ бы обвареная. Почки и селезенка слегка увеличены, ткань ихъ дрябловата.

384. Августа *Ниманъ*, 60 л., швед. поддан., прислуга. Болѣла чахоткой, послѣднее время чувствовала себя очень плохо, страдала сильнымъ удушіемъ. Найдена въ постели мертвой 9 дек. 1909.

Вскрытіе 14 дек. 1909. Роста ниже средняго, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Грудь плоская. Сердце немного увеличено, довольно сильно обложено жиромъ, дряблое; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 0,8, праваго—0,4 снт., на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки. Верхняя доля праваго легкаго плотна на ощупь; на разрѣзѣ сѣровато-желтаго цвѣта, зерниста; съ плоскости разрѣза выдавливается почти нелѣнистая гноевидная жидкость; кусочки легкаго тонутъ въ водѣ.

Гриппозное воспаленіе легкихъ.

385. Федоръ *Кирпичевъ*, 20 л., крест., извозчикъ, 5 окт. выписался изъ больницы, пролежавъ тамъ 9 дней, но все время чувствовалъ себя нездоровымъ, ничего послѣднее время не ѣлъ и питался только молокомъ, крѣпкихъ напитковъ не пилъ совсѣмъ. 10 окт. 1909 пришелъ въ трактиръ, на видъ былъ слабый, выпилъ молока, вышелъ на дворъ на площадку, гдѣ сидѣлъ минутъ пять на лѣстницѣ, и замѣченъ былъ уже мертвый.

Вскрытіе 14 окт. 1909. Роста ниже средняго, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, дряблое; мышца очень дряблая, тусклая, какъ-бы обвареная. Въ желудкѣ около 600 к. с. жидкости. Легкія плотноваты на ощупь, плоскость разрѣза имѣетъ мраморный видъ: на темномъ буровато-красномъ фонѣ замѣтны слегка возвышающіеся свѣтлые островки, при надавливаніи выступаетъ довольно густая буровато-гноевидная жидкость.

Катарральное воспаленіе легкихъ.

386. Василій *Сыропятовъ*, 55 л., крест., работалъ по выгрузкѣ бревенъ изъ рѣки. Жизнь велъ трезвую, жаловался на слабость здоровья и боль въ груди. Проболѣвъ сутки, умеръ скоропостижно 11 окт. 1901.

Вскрытіе 14 окт. 1901. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія, весьма исхудавшій. Мышца сердца блѣдная, желтоватая. При ощупываніи въ легкихъ замѣчаются довольно многочисленныя не рѣзко отграниченныя уплотненія, достигающія иногда величины лѣсного орѣха, при разрѣзѣ въ этихъ мѣстахъ ткань нѣсколько темнѣе окрашена и слегка выдается надъ уровнемъ разрѣза. Капсула почекъ съ трудомъ отдѣляется, корковый слой блѣденъ, толщиною около 0,5 сант., мѣстами границы его съ пирамидами не различимы, послѣднія—грязнокраснаго цвѣта. Сосуды основанія мозга имѣютъ нѣсколько утолщенныя стѣнки.

387. Марія *Деревягина*, 55 л., крест. Заболѣла три дня назадъ, сильный ознобъ, боль въ правомъ боку, кашель. Поступила въ клинику съ тяжко выраженною одышкою и съ жалобою на сильную боль въ боку. Умерла 14 мар. 1904.

Вскрытіе 17 мар. 1904. Нижесредняго роста, средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Края легкихъ почти прикрываютъ сердце; правое легкое повсюду покрыто блѣдно-желтоватыми толстыми рыхлыми перепонками, слегка рвущимися; въ полости правой плевры 300 к. с. мутной красноватой жидкости, въ которой плаваютъ объемистыя бѣловатыя перепонки въ видѣ рыхлыхъ хлопьевъ; легочная плевра во многихъ мѣстахъ склеена съ пристѣночной рыхлыми бѣловатыми перепонками. Сердце значительно обложено жиромъ; мышца весьма дрябла, блѣднокрасна-желтовата; просвѣтъ аорты замѣтно расширенъ, стѣнка ея истончена и въ луковицѣ выпячена; внутренняя оболочка аорты шероховата, бугриста, покрыта множествомъ объемистыхъ бѣло-желтоватыхъ бляшекъ съ известковыми отложеніями. Нижняя половина нижней доли праваго легкаго слегка уплотнена на ощупь въ видѣ узловъ, въ разрѣзахъ сѣровато-красноватаго цвѣта, величиною отъ лѣсного до грецкаго орѣха, съ разрѣзовъ этихъ узловъ соскабливается довольно густая блѣднокрасноватая жидкость безъ пузырьковъ воздуха. Сосуды основанія мозга расширены, стѣнки ихъ мутнобѣловатаго цвѣта.

388. Ребенокъ *мужского* пола, 3—6 мѣс., найденъ мертвымъ на улицѣ 15 янв. 1907.

Вскрытіе 20 янв. 1907. Длина 60 снт., вѣсъ 4750,0 гр.; питанія умѣреннаго. На груди на мѣстѣ соединенія реберъ съ хрящами прощупываются небольшія утолщенія (четки). Мышца сердца немного тускловата и дрябловата. Слизистая дыхательныхъ путей красноватаго цвѣта, особенно въ промежуткѣ между хрящами, покрыта слизистой гноевидной жидкостью. Легкія довольно объемистыя; только верхнія доли ихъ проходимы для воздуха, съ поверхностью свѣтлорозоваго цвѣта; обѣ же нижнія доли, отчасти и средняя доля праваго легкаго синевато-красноватаго цвѣта; плевра мѣстами на нихъ тусклая, ткань не проходима для воздуха, тонетъ; на поверхности разрѣза замѣтны болѣе свѣтлые островки, нѣсколько выдающіеся надъ поверхностью, и нѣсколько западающіе темнокрасные промежутки; при надавливаніи на поверхности разрѣза появляется гноевидная слизистая жидкость.

389. Неизвѣстнаго званія *женщина*, 40 л., 6 нбр. 1907 въ сильно пьяномъ видѣ доставлена была въ часть, а оттуда въ больницу и при пріемѣ умерла.

Вскрытіе 12 нбр. 1907. Роста ниже средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ. Клапаны аорты представляются нѣсколько утолщенными, морщинистыми. Аорта въ восходящей своей части немного мѣшкообразно расширена; внутренняя оболочка почти сплошь покрыта бѣловатыми плотноватыми бляшками, по мѣстамъ объизвествленными; вѣнечныя артеріи жестковаты, устья ихъ значительно сужены; мышца сердца дрябловата, тусклая; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,3 снт., лѣваго—около 2,0. При ощупываніи въ ткани легкихъ обнаруживаются плотноватые узелки величиною до большого яблока; ткань легкихъ на разрѣзѣ пестрая: на общемъ темно-красномъ фонѣ замѣтны различной величины нѣсколько выдающіеся надъ поверхностью разрѣза болѣе свѣтлые участки; съ плоскости разрѣза выдавливается довольно много темнокрасной пѣнистой жидкости, а изъ перерѣзанныхъ бронховъ—пѣнистая слизь, имѣющая отчасти видъ гноя. Почки немного увеличены, ткань ихъ дрябловата, тускловата, слои не особенно хорошо отличимы. Сосуды основанія мозга склеризованы.

390. Младенецъ *женскаго* пола, 2 мѣс., найденъ мертвымъ на кладбищѣ 2 дек. 1907.

Вскрытіе 7 дек. 1907. Длиной 55 снт., вѣсомъ 3350,0 гр. Сердце нѣсколько увеличено, дрябловато; ткань легкихъ неравномѣрнаго мраморнаго пятнисто-краснаго цвѣта; на плоскости разрѣза на болѣе темномъ красномъ фонѣ выступаютъ слегка розоватые островки различной величины; при надавливаніи на поверхности разрѣза появляется довольно много мелко-пѣнистой красноватой жидкости, причемъ жидкость, вы-

давливаемая изъ розоватыхъ слегка выдающихся островковъ, почти безъ пузырьковъ воздуха.

391. Магдалина *Стененекъ*, 10 дн., 4 дек. была выкупана и оставлена въ холодномъ корридорѣ, гдѣ помѣщалась мать, 5 дек. 1907 умерла.

Вскрытіе 11 дек. 1907. Длиною 50 снт., вѣсомъ 3370,0 гр., питанія удовлетворительнаго. Надгортанникъ и надгортанно-черпаловидныя связки нѣсколько утолщены и какъ-бы набухли. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей красноватаго цвѣта, покрыта слизистой гноевидной пѣнистой массой. Ткань легкихъ какъ на поверхности, такъ и на разрѣзѣ представляется мраморнаго вида: на темно-красномъ фонѣ замѣтны слегка возвышающіеся болѣе свѣтлые островки; при давленіи на поверхность разрѣза изъ темныхъ мѣстъ выдавливается довольно много темно-красной пѣнистой жидкости, а изъ перерѣзанныхъ бронховъ слизистыя гноевидныя массы. Корковый слой почекъ съ трудомъ отличается отъ мозгового.

392. Аксинья *Комякова*, 42 л., крест. Вела жизнь нетрезвую; въ началѣ дек. была больна отъ водки и находилась нѣсколько дней въ больницѣ; по выходѣ оттуда, несмотря на запрещеніе, продолжала пить водку ежедневно, а 26 дек. напилась до потери сознанія и легла спать, а въ 3 ч. ночи 27 дек. 1907 умерла.

Вскрытіе 30 дек. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ; мышца очень дряблая, глинистаго цвѣта, мѣстами проросла полосками жира. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста. Ткань легкихъ мѣстами представляетъ увеличенную плотность; на разрѣзѣ имѣетъ мраморный видъ: на темнокрасномъ фонѣ замѣтны слегка возвышающіеся болѣе свѣтлые немного зернистые островки, съ поверхности ихъ соскабливается грязноватая эмульсивная, безъ пузырьковъ воздуха, жидкость. Сосуды основанія мозга жестковаты, зіяютъ.

393. Татьяна *Иванова*, 20 дн., крест. Ночью у ребенка былъ сильный жаръ, по утру усмотрѣна мертвой, 8 янв. 1908.

Вскрытіе 11 янв. 1908. Длина 53 снт., вѣсъ 3580,0 гр., питанія хорошаго. Сердце нѣсколько увеличено. Ткань легкихъ на разрѣзѣ имѣетъ мраморный видъ: на темнокрасномъ фонѣ замѣтны свѣтлые слегка возвышающіеся островки; изъ перерѣзанныхъ бронховъ выдавливаются капельки слизистогноевидной массы. Ткань зобной железы сѣровато-розоватаго цвѣта, съ плоскости разрѣза стекаетъ эмульсивная гноевидная жидкость. Ткань почекъ тускловата.

394. Александра *Пристукина*, 65 л., вдова ремесленника. Страдала старческой дряхлостью. 7 янв. 1908 съ утра чувствовала себя здоровой; внезапно почувствовала себя дурно и умерла.

Вскрытіе 13 янв. 1908. Роста ниже средняго. слабаго тѣлосложенія и плохого питанія. Сердце раза въ два больше кулака покойной, сильно обложено жиромъ; двустворчатый клапанъ и клапаны аорты представляются утолщенными, особенно у основанія, гдѣ замѣчается довольно значительное отложеніе извести; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій замѣтны бѣловатыя плотноватыя бляшки; полости сердца расширены; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,2 снт., а лѣваго—около 0,6; мышца очень дряблая, буровато-глинистаго цвѣта, по мѣстамъ проросла полосками жира. Сосуды основанія мозга склерозированы. Ткань праваго легкаго плотновата, но всплываетъ въ водѣ, на разрѣзѣ грязно-бураго цвѣта, немного зерниста, съ плоскости разрѣза выдавливается грязно-бурая эмульсивная слегка пѣнистая жидкость, а изъ мелкихъ перерѣзанныхъ бронховъ—гноевидныя капельки. Капсула почекъ снимается съ нѣкоторымъ трудомъ, корковый слой слегка истонченъ.

395. Зинаида *Максимова*, 4 мѣс., крест. Наканунѣ сильно плакала и

нѣсколько разъ рвало, больше сутокъ не испражнялась и слабо принимала грудь, утромъ 21 янв. 1908 обнаружена мертвой.

Вскрытіе 26 янв. 1908. Длина 62,0 снт., вѣсъ 5700,0 гр., питанія хорошаго. Мышца сердца тускловата. Ткань легкихъ плотновата, на разрѣзѣ имѣетъ мраморный видъ: на темно-красномъ фонѣ замѣтны небольшіе розоватые. слегка зернистые, немного возвышающіеся островки; при надавливаніи на поверхности разрѣза появляется мутноватая пѣнистая жидкость, а изъ мелкихъ перерѣзанныхъ бронховъ—гноевидныя капли.

396. Петръ *Павловъ*, 43 л., крест., торговецъ въ разносъ. Жизнь велъ сильно нетрезвую, все время пьянствовалъ. Съ 1 фев. бросилъ пить водку и съ этого времени сталъ чувствовать себя очень скверно, жаловался, что ему очень скучно и сильно ноетъ сердце. Здоровья былъ онъ слабаго, очевидно, чахоточный, постоянно кашлялъ и харкалъ, и жаловался на боль въ груди и одышку. Ночью 27 фев. 1908 упалъ въ клозетѣ и черезъ часъ, не приходя въ сознаніе, умеръ.

Вскрытіе 29 фев. 1908. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Грудная клѣтка плоская съ ясно выраженными над- и подключичными ямками. Сердце увеличено; мышца дряблая, тусклая, какъ-бы обвареная. Ткань легкихъ плотновата, особенно въ нижнихъ доляхъ, на разрѣзѣ имѣетъ неравномѣрный мраморный видъ: на темно-красномъ фонѣ замѣтны слегка возвышающіеся болѣе свѣтлые зернистые островки; при надавливаніи съ поверхности разрѣза стекаетъ довольно много темно-красной мутной пѣнистой жидкости, а изъ перерѣзанныхъ бронховъ выдавливается обильная бѣловатая гноевидная масса. Почки слегка увеличены, ткань мутновата. Сосуды основанія мозга жестковаты, извиты, зіяютъ.

397. Иванъ *Бѣляковъ*, 2 мѣс., крест., 5 окт. пріѣхалъ изъ Тверской губ., около 50 верстъ пришлось ѣхать по тряской дорогѣ; послѣднее время отчаянно плакалъ и спустя около сутокъ умеръ 6 окт. 1908.

Вскрытіе 13 окт. 1908. Длина тѣла 57 снт., вѣсъ 3250,0 гр., плохого питанія. Сердце дрябловато. Слизистая дыхательныхъ путей слегка утолщена, блѣдно-краснаго цвѣта, обильно покрыта слизисто-гноевидной жидкостью. Ткань легкихъ имѣетъ мраморный видъ: на темномъ фонѣ замѣтны слегка возвышающіеся болѣе свѣтлые красные островки, слегка зернистые; изъ перерѣзанныхъ мелкихъ бронховъ выдавливаются гноевидныя капельки.

398. Павелъ *Торбинъ*, 3 мѣс., крест., умеръ 15 окт. 1908.

Вскрытіе 20 окт. 1908. Длина тѣла 59 снт., вѣсъ 4550,0 гр., питанія умѣреннаго. Ткань легкихъ на разрѣзѣ имѣетъ мраморный видъ: на болѣе темномъ фонѣ замѣтны мѣстами слегка возвышающіеся болѣе свѣтлые островки; съ плоскости разрѣза выдавливается пѣнистая красноватая жидкость, а изъ мелкихъ бронховъ—гноевидныя капельки.

399. Марья *Разинова*, 10 дн., крест., со дня рожденія была неспокойной, постоянно плакала; 21 окт. 1908 умерла.

Вскрытіе 27 окт. 1908. Длина тѣла 52 снт., вѣсъ 3120,0. Ткань легкихъ на разрѣзѣ имѣетъ мраморный видъ: на темно-красномъ фонѣ замѣтны болѣе свѣтлые, слегка выступающіе надъ поверхностью, островки; изъ перерѣзанныхъ мелкихъ бронховъ выдавливается въ обильномъ количествѣ гноевидняя слизь.

400. Младенецъ *мужского* пола, крест. Татьяны *Павловой*, 9 дн. 27 окт. 1908 выписавшись изъ родильнаго пріюта и возвратившись домой, стала развертывать младенца и обнаружила его мертвымъ.

Вскрытіе 5 нояб. 1908. Длина тѣла 55 снт., вѣсъ 3970,0, питанія достаточнаго. Ткань легкихъ имѣетъ мраморный видъ: на темнокрасномъ фонѣ замѣтны чуть выступающіе, слегка зернистые, болѣе свѣтлые островки; съ поверхности разрѣза выдавливается темнокрасная пѣнистая, слегка мутноватая жидкость, а изъ перерѣзовъ бронховъ—гноевидная пѣнистая слизь.

401. Александръ *Денисовъ*, 78 л., крест., торговала въ разносъ смѣчками. Найдена мертвой въ подвалѣ 7 ноя́б. 1908.

Вскрытіе 11 ноя́б. 1908. Роста ниже средняго, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце нѣсколько увеличено, довольно сильно обложено жиромъ; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки, по мѣстамъ обызвествленныя; мышца бугровато цвѣта, мѣстами пороса жиромъ. Ткань легкихъ мѣстами плотновата, на разрѣзѣ имѣетъ пестрый видъ: на темномъ фонѣ замѣтны чуть-чуть возвышающіеся болѣе свѣтлые островки, слегка зернистые; съ плоскости разрѣза выдавливается очень много пѣнистой жидкости; бронхи какъ больные, такъ и мелкіе почти сплошь закупорены зеленоватой гноевидной слизью, слизистая ихъ сильно набухшая и покраснѣвшая. Капсула почекъ снимается съ нѣкоторымъ трудомъ, ткань плотноватая, корковый слой толщиной около 2 мм. Сосуды основанія мозга склерозированы.

402. Иванъ *Прохоровъ*, 17 л., финляндъ. уроженецъ, все время пребывался пьянству. Послѣдній день былъ также пьянъ; найденъ во дворѣ мертвымъ 16 окт. 1909.

Вскрытіе 23 окт. 1909. Роста ниже средняго, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Полулунные клапаны аорты слегка утолщены; на внутренней оболочкѣ аорты имѣется нѣсколько слегка возвышенныхъ бѣловатыхъ пятенъ; мышца сердца дряблована. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста. Ткань легкихъ плотновата на ощупь, на разрѣзѣ имѣетъ мраморный видъ: на темно-красномъ фонѣ замѣтны возвышающіеся болѣе свѣтлые слегка зернистые островки; съ плоскости разрѣза выдавливается темнокрасная пѣнистая мутноватая жидкость, изъ перерѣзанныхъ мелкихъ бронховъ—гноевидныя капельки.

403. Петръ *Тепловъ*, 16 л., крест., маляръ, не имѣющій опредѣленнаго мѣстожительства и занятій. Часто предавался пьянству. Въ чайномъ заведеніи видѣли его напившуюся въ трезвомъ видѣ; 25 окт. 1909 былъ обнаруженъ мертвымъ въ дровяномъ сараѣ.

Вскрытіе 27 окт. 1909. Роста 140 сант., умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце дряблованно; мышца тусклая, какъ бы обваренная. Ткань легкихъ плотновата на ощупь, на разрѣзѣ имѣетъ мраморный видъ: на темномъ фонѣ замѣтны слегка возвышающіеся болѣе свѣтлые островки; съ плоскости разрѣза выдавливается много пѣнистой мутноватой жидкости, дѣлающей на ножѣ на два слоя; изъ мелкихъ перерѣзанныхъ бронховъ выдавливаются капельки пѣнистой гноевидной слизи.

404. Настасья *Мислова*, 25 л., крест., портниха. Пять лѣтъ назадъ заразилась проституціей. Почти ежедневно выпивала, всегда жаловалась на боль желудка, ногъ и головы; недѣли двѣ назадъ приободрилась и рвота. Совершенно ослабѣшая (отнялись ноги). отправлена была въ больницу, гдѣ черезъ нѣсколько часовъ умерла, 28 окт. 1909.

Вскрытіе 31 окт. 1909. Роста средняго, тѣлосложенія нѣжнаго, питанія слабаго. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ, дряблое; мышца съ глинистымъ оттѣнкомъ, пороса жиромъ, особенно у верхушки. Ткань легкихъ не всюду равномѣрно упруга, мѣстами плотноватая, на разрѣзѣ имѣетъ мраморный видъ: на темномъ фонѣ болѣе свѣтлые слегка зернистые островки; съ плоскости разрѣза выдавливается много пѣнистой мутноватой жидкости и гноевидныя капельки. Корковый слой почекъ нѣсколько утолщенъ, плохо отличимъ отъ мозгового.

Бухорчатка легкихъ.

405. Петръ *Руммукайнен*, 31 г., слесарь, велъ жизнь нетрезвую. Сильно кашлялъ, иногда рвота съ кровью. 24 янв. 1909 утромъ сталъ кашлять съ кровью и къ полудню умеръ.

Вскрытіе 27 янв. 1909. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія и питанія. Сердце раза въ полтора больше кулака покойнаго, на наружной его поверхности находятся большія отложенія жира, мышца драбла, желтоватаго цвѣта, стѣнки желудочковъ истончены; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами замѣчается шероховатость изъ плотныхъ бляшекъ величиной съ горошину. Верхняя доля праваго легкаго на всемъ пространствѣ уплотнена, непроходима для воздуха, въ разрѣзѣ заключаетъ множество сѣроватыхъ узелковъ отъ просянаго зерна до горошины. Правая почка значительно уменьшена; ѣвная нѣсколько увеличена, корковый слой значительно увеличенъ, пирамиды стиснуты; ткань довольно плотна

406. Василій *Шиловъ*, 52 л., крест., легковой извозчикъ. 6 фев. 1900 въ трактирномъ заведеніи жаловался на сильную боль въ груди, отправленный въ пріемный покой, по дорогѣ туда скончался. Часто жаловался на боли и схватки въ груди.

Вскрытіе 11 фев. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, плохого питанія. Голени и стопы отечны. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, съ большими отложеніями снаружи жира; клапаны аорты утолщены, мутны, плохо спадаются; внутренняя оболочка аорты бугриста и шероховата съ плотными фиброзными бѣлыми бляшками. Правое легкое уплотнено, грязнобураго цвѣта, заключаетъ во множествѣ плотные сѣроватые узелки, въ особенности въ верхушкѣ, и почти повсюду непроходимо для воздуха.

407. Алексѣй *Черноборовъ*, 43 л., крест. Велъ жизнь нетрезвую. Страдалъ кашлемъ и удушьемъ. Найденъ мертвымъ въ постели 19 фев. 1900.

Вскрытіе 22 фев. 1900. Высокаго роста, средняго тѣлосложенія, значительная отечность всѣхъ покрововъ. Въ полости брюшины находится значительное количество водяничной жидкости. Въ полости околосердечной сумки находится около 400 к. с. мутной гнойной жидкости съ плотными бѣлаватоселеноватыми кусочками; сердце увеличено въ объемѣ, на всей его поверхности снаружи находятся отложенія гнойныхъ массъ и большого количества жира; стѣнки желудочковъ истончены, мышцы ихъ дряблы, бѣлаговатаго цвѣта; въ правой нижней части околосердечной сумки замѣчается ограниченная форма отложенія желтаго сыра, гороховину, черезъ которое въ полость сумки втекаетъ гной въ большомъ количествѣ; гной этотъ берется изъ полости, находящейся въ нижней долѣ праваго легкаго, ткань которой уплотнена и непроходима для воздуха. Полость эта сообщается также и съ полостью плевры, гдѣ имѣется большое скопленіе густого зеленоватаго гноя. Верхняя доля отечна и слабо проходима для воздуха. Лѣвое легкое эмфизематозно. Почки уменьшены въ объемѣ, ткань плотна, имѣетъ сальный видъ, корковый слой значительно утолщенъ, малокровный.

408. Николай *Дятковъ*, 14 л., крест., горничкъ, скоропостижно умеръ 3 нояб. 1900. Жаловался на боль въ горлѣ, лечился; всегда былъ слабосильнымъ, сильно кашлялъ, страдалъ сильной одышкой.

Вскрытіе 5 нояб. 1900. Длина 128 сант., тѣлосложенія слабаго, питанія недостаточнаго. На брюшинѣ, особенно въ нижней части полости живота, множество мелкихъ узловатыхъ возвышеній сѣраго цвѣта, величиною отъ макового до чечевичнаго зерна, мѣстами сливающихся между собою; такими же утолщеніями усѣянъ сальникъ и брыжжейка. На слизистой оболочкѣ гортани кромѣ сильнаго набуханія синевато-краснаго цвѣта замѣчается нѣсколько узловатыхъ возвышеній, величиной въ просяное зерно, имѣющихъ цвѣтъ сѣрый, съ легкой желтизной, голосовыя связки набухшія, покраснѣвшія. Лимфатическія железы какъ бронхіальныя, такъ и вообще средостѣнія сильно увеличены, въ разрѣзѣ мозговидны. На слизистой оболочкѣ подвздошной кишки имѣются набухшія солитарныя железки и Пейеровы бляшки; на посѣдѣвшихъ

кое-гдѣ замѣчаются поверхностныя изъязвленія. Капсула почекъ не свободно отдѣляется, корковый слой блѣдный, сильно набухшій, пирамидки основанія темнокрасны.

409. Яковъ *Молодцовъ*, 55 л., крест., плотникъ. Съ утра вставши сильно кашлялъ, легъ на кровать, въ 8 ч. усмотрѣнъ мертвымъ. Велъ жизнь нетрезвую. Пилъ запоемъ.

Вскрытіе 3 дек. 1900. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, весьма худощавъ. Сердце увеличено въ объемѣ, съ большими отложеніями жира спереди; стѣнки желудочковъ утолщены, мышца съ желтымъ оттѣнкомъ, дрябла; дву- и трехстворчатый клапаны, а также клапаны аорты и легочной артеріи на свободныхъ краяхъ утолщены и мутны. Ткань лѣваго легкаго и нижняя праваго отечны, эмфизематозны; верхняя и средняя доли праваго легкаго объемисты, не спадаются; ткань ихъ сѣроватаго цвѣта, плотна, какъ бы опеченѣла, непроходима для воздуха, съ разрѣзовъ стекаетъ въ большомъ количествѣ гноевидная жидкость; въ верхушкѣ находятся полости величиною до куринаго яйца, наполненныя распадомъ и гноемъ, въ окружности на разрѣзахъ замѣтны мелкіе сѣроватые узелки. Ткань почекъ съ желтоватымъ оттѣнкомъ, слои трудно различимы. Сосуды основанія мозга склерозированы.

410. Михаилъ *Костинъ*, 40 л., крест. Двѣ недѣли назадъ выписался изъ больницы, все время жаловался на боль въ груди, а 8 дек. 1900 былъ очень слабъ, не могъ встать съ постели и умеръ.

Вскрытіе 12 дек. 1900. Высокаго роста, средняго тѣлосложенія, крайне истощенъ. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце 13×13 снт.; стѣнки желудочковъ истончены, мышца дрябла, желтоватаго цвѣта. Ткань лѣваго легкаго въ нижнихъ доляхъ уплотнена, мало проходима для воздуха, заключаетъ множество сѣроватыхъ узелковъ, отъ просяного зерна до лѣсного орѣха. Въ верхушкѣ праваго легкаго находится полость въ лѣсной орѣхъ, наполненная сѣроватымъ распадомъ; ткань легкихъ сильно отечна и полнокровна. Почки увеличены, ткань сальнаго вида, плотна, малокровна.

411. Аркадій *Алифановъ*, 27 л., крест., рабочій Петербургскаго арсенала. Очень ослабъ, истощенъ, сильный ціанозъ, потъ; сильная одышка. Боленъ уже давно, 2 недѣли назадъ наступило рѣзкое ухудшеніе. Умеръ 5 фев. 1901.

Вскрытіе 8 фев. 1901. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, крайне плохого питанія. Голени и стопы отечны. Въ полости брюшины находится большое количество желтоватой прозрачной водяночной жидкости. Мышца сердца съ желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно плотная; двустворчатый клапанъ на свободныхъ краяхъ утолщенъ, мутно-бѣловатаго цвѣта; на внутренней оболочкѣ аорты замѣчены единичныя бѣловатыя плотныя бляшки до просяного зерна. Легкія объемисты, тяжелы, не спадаются. При разрѣзѣ верхнія доли, а также средняя доля праваго и нижняя лѣваго представляются сѣровато-мраморнаго цвѣта, пронизанными множествомъ полостей шаровидной формы величиною отъ горошины до грецкаго орѣха, наполненныхъ сѣровато-желтымъ гноевиднымъ распадомъ; вокругъ этихъ полостей и вообще по ткани легкихъ разбросано безчисленное множество сѣроватыхъ узелковъ отъ маковаго до просяного зерна, въ означенныхъ мѣстахъ легочная ткань непроходима для воздуха. Ткань почекъ желтоватаго цвѣта съ сальнымъ блескомъ, плотна, малокровна. Въ подвздошномъ отдѣлѣ солитарныя железки увеличены до просяного зерна, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ замѣчаются поперечныя язвенныя поверхности овальнаго очертанія, числомъ до 10, величиною отъ боба до грецкаго орѣха, съ грязно-краснымъ дномъ и подрытыми краями.

412. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, 20 л., умеръ въ ночлежномъ домѣ

16 окт. 1902. Занимался нищенствомъ въ послѣднее время и былъ чѣмъ-то боленъ.

Вскрытіе 19 окт. 1902. Роста и тѣлосложенія средняго, недостаточнаго питанія. Мошонка, голени и стопы сильно отечны. Толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,8 снт., праваго—0,4; мышца сердца съ рѣзкимъ желтымъ оттѣнкомъ, дрябла. Ткань легкихъ объемиста, не спадается, уплотнена, въ особенности въ верхнихъ доляхъ, гдѣ находятся полости величиною отъ лѣсного до грецкаго орѣха, заполненныя грязно-краснымъ сѣроватымъ распадомъ, въ окружности ихъ ткань уплотнена и пронизана сѣроватыми узелками величиною до чечевицы. Ткань легкихъ вообще грязно-краснаго цвѣта въ верхнихъ доляхъ, непроходима для воздуха, а въ нижнихъ—отечна. Брыжжеечныя железы увеличены почти до лѣсного орѣха, сѣровато-бѣлаго цвѣта; ткань ихъ мягка.

413. Младенецъ *женскаго* пола, 2 мѣс., принесенъ на безпоповщинское кладбище для похоронъ 16 нояб. 1902.

Вскрытіе 21 нояб. 1902. Длиною 52 снт., вѣсомъ 2970,0; питанія слабаго. Сердце значительно больше кулачка покойной. Легкія объемисты, не спадаются, плотны на ощупь, уплотненіе это распространяется на всѣ доли праваго легкаго за исключеніемъ верхушки и на нижнюю долю лѣваго легкаго; черезъ легочную плеву просвѣчиваютъ рѣзко-ограниченныя темно-красныя пятна величиною отъ маковаго до просяного зерна, а также сѣровато-бѣлые узелки въ большомъ количествѣ, величиною каждый въ просяное зерно; ткань легкихъ въ разрѣзахъ имѣетъ мясной цвѣтъ и плотность; въ уплотненныхъ мѣстахъ повсюду непроходима для воздуха и сильно переполнена кровью; на фонѣ разрѣзовъ выдѣляется множество сѣровато-бѣлыхъ узелковъ, величиною въ просяное зерно.

414. Сергѣй *Киселевъ*, 22 л., рядовой.

Вскрытіе 18 дек. 1902. Высокаго роста, слабаго сложенія, плохого питанія. Стопы отечны. Сердце увеличено; мускулатура сердца въ высшей степени дряблая, блѣдно-желтовата; правый желудочекъ растянутъ, толщина его стѣнки 0,2 снт., лѣваго—1,0 снт. Поверхность легкихъ мраморнаго вида, мѣстами съ темноватыми, нѣсколько углубленными полями; въ промежуткѣ между ними гнѣздно разбросаны участки бѣловатые, гдѣ простымъ глазомъ можно разсмотрѣть растянутые легочные пузырьки. Въ задней части лѣвой нижней доли имѣется участокъ, гдѣ мелкіе сосуды плевры сильно расширены кровью, гдѣ много мелкихъ точечныхъ кровоизліяній, величиной не свыше чечевичнаго зерна. Поверхность плевры въ этомъ мѣстѣ не совсѣмъ гладкая и ножемъ здѣсь соскабливается тончайшій слой фибрина. Кромѣ того изъ подъ плевры слегка выступаютъ всюду довольно многочисленные сѣроватые узелки величиной съ конопляное зерно; ткань легкихъ на разрѣзѣ всюду густо и равномѣрно пронизана такими узелками. Въ селезенкѣ мякоть выскабливается въ изобиліи, мѣстами на разрѣзѣ видны бугорки. Почки увеличены, капсула снимается съ трудомъ; ткань блѣдно-розовая; рисунокъ неясный, особенно въ корковомъ слоѣ, съ желтоватымъ оттѣнкомъ; на разрѣзѣ довольно много разбросанныхъ блѣдно-желтоватыхъ узелковъ, неправильной формы.

415. Сергѣй *Никитинъ*, 36 л., крест., сапожникъ. Раньше пилъ водку и очень часто. Болѣзненный, нѣсколько лѣтъ боленъ чахоткой. Жаловался всегда на одышку. Умеръ 25 март. 1903.

Вскрытіе 28 март. 1903. Выше средняго роста, средняго тѣлосложенія, худощавъ. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, съ значительнымъ отложеніемъ жира спереди; стѣнка праваго желудочка утолщена, лѣваго—нормальна; мышца съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблая. Ткань легкихъ объемиста, не спадается; при ощупываніи въ

ней множество плотных узловъ до лѣсного орѣха и болѣе величиною; при разрѣзѣ легкихъ ткань ихъ темно-красная, пронизанная множествомъ сѣровато-бѣловатыхъ узелковъ, а въ верхнихъ доляхъ имѣются кругловатыя полости величиною до лѣсного орѣха, наполненныя гноевиднымъ распадомъ. Слизистая въ подвздошномъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ красновата, солитарныя железки увеличены, въ нѣсколькихъ мѣстахъ имѣются язвы, довольно обширныя въ поперечномъ направленіи, съ приподнятыми и подрытыми краями, съ темнокрасными дномъ; въ толстыхъ кишкахъ такія язвенныя поверхности многочисленнѣе и обширнѣе. Сосуды основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта.

416. Василій *Горюновъ*, 20 л., крест., легковой извозчикъ. Послѣдній мѣсяцъ былъ безъ мѣста, ночевалъ по ночлежнымъ домамъ. 1 окт. 1903 поднятъ на панели въ безчувственномъ состояніи и по дорогѣ въ пріемный покой умеръ. Имѣлъ болѣзненный чахоточный видъ.

Вскрытіе 4 окт. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, крайне истощенъ. Голени и стопы отечны. Сердце немного увеличено, на наружной поверхности его въ нѣкоторыхъ мѣстахъ находятся бѣловатыя плотныя бляшки; стѣнки желудочковъ истончены, мышца блѣдно-красновата, дряблая; двустворчатый клапанъ утолщенъ съ значительными разращеніями на свободныхъ краяхъ. Ткань легкихъ объемиста, тяжела, не спадается, въ разрѣзахъ имѣетъ красновато-мраморный видъ со множествомъ мелкихъ сѣроватыхъ узелковъ; въ верхушкахъ обоихъ легкихъ обширныя до кулака возсѣлаго человѣка полости, заполненныя сѣровато-красноватымъ распадомъ; стѣнки полостей неровныя, бахромчатыя, покрытыя сѣровато-бѣловатыми мелкими узелками. На слизистой оболочкѣ гортани у голосовыхъ связокъ довольно обширныя язвенныя поверхности съ подрытыми краями. Почки увеличены, корковый слой утолщенъ, желто-красноватаго цвѣта.

417. Нонна *Воронова*, 15 л., дочь штурмана. Скоропостижно умерла въ госпиталѣ.

Вскрытіе 7 нояб. 1903. Трупъ истощенный, слабаго сложенія. Серозная поверхность легкихъ гладкая, блестящая; на разрѣзахъ ихъ видно много бѣловатыхъ и сѣроватыхъ съ просяное зерно узелковъ, расположенныхъ и одиночно, и группами. Околобронхіальныя железы увеличены, на разрѣзѣ ихъ видны творожистыя массы. Въ нижнемъ отдѣлѣ тонкой кишки имѣется нѣсколько язвъ неправильно кругловатой формы съ набухшими подрытыми краями; подъ этими краями по мѣстамъ видны сѣроватыя творожистыя массы; сывороточный покровъ тонкой кишки на большомъ протяженіи покрытъ сѣроватыми узелками и остатками склеекъ; на слизистой оболочкѣ толстой кишки мѣстами имѣются такіе же язвы. На пристѣночной брюшинѣ, особенно правой боковой стѣнки живота имѣются многочисленные сѣроватые узелки, похожіе на описанные уже. Такіе же узелки, но болѣе желтоватаго цвѣта, имѣются на серозномъ покровѣ небольшого кусочка печени, найденнаго земляными свободно между кишекъ. Узелки имѣются также на мочевомъ пузырѣ, прямой кишкѣ и яичникѣ съ трубою. Сосуды мягкой мозговой оболочки сильно извиты и налиты кровью; мѣстами имѣется кругловатые мозговидныя характера участки съ желтымъ сыровидимымъ распадомъ въ центрѣ; узлы эти углубляются въ вещество коры мозга, но остаются въ связи съ мягкой оболочкой.

418. Александръ *Яковлевъ*, 35 л., мѣщ., скоропостижно умеръ 19 сент. 1906. Страдалъ одышкой, харкалъ кровью и жаловался на боль въ груди.

Вскрытіе 23 сент. 1906. Выше средняго роста, слабаго сложенія. Грудная клѣтка слабо развита. Голени и стопы значительно отечны. Сердце довольно дряблое. Легкія увеличены, съ поверхности цвѣтъ неравномѣрный, плотность ихъ также неравномѣрна, особенно въ верх-

нихъ доляхъ процупывается много плотноватыхъ узловъ и узелковъ, отъ горошины и до грѣцкаго орѣха, на разрѣзѣ бѣловатаго и сѣроватаго цвѣта; большіе изъ нихъ содержатъ въ себѣ полости съ неровными стѣнками, выполненныя красновато-грязноватою жидкостію, мѣстами на разрѣзѣ видны мелкіе просовидные узелки. Границы почечныхъ сосцевъ не ясны.

419. Николай *Чекезій*, 37 л., часто жаловался на боль въ груди. Скоропостижно умеръ въ ночлежкѣ вечеромъ 22 сент. 1906.

Вскрытіе 25 сент. 1906. Средняго роста, слабаго сложенія, крайне пониженнаго питанія. Голени и стопы отечны. Въ сердечной сорочкѣ найдено 85 к. с. желтоватой съ мѣлкими хлопьями жидкости; лѣвое венозное отверстіе съ трудомъ пропускаетъ два пальца, мускулатура бѣдновата, плотнѣе обычнаго, на разрѣзѣ имѣются сѣроватыя полоски, наиболѣе замѣтныя въ верхушкѣ сосочковыхъ мышцъ двустворчатаго клапана; послѣдній представляетъ плотное сращеніе на сосѣдственныхъ участкахъ и сѣровато-розовыя осложенія по краямъ въ видѣ утолщенній. Въ лѣвой плевральной полости имѣется 200 к. с. желтовато-красной съ хлопьями мутноватой жидкости, а въ правой 100 к. с. такого-же содержимаго. Легкія объемисты, плевра мѣстами мутна, шероховата съ желто-сѣроватыми налетами и красноватыми участками; плотность неравномѣрна, мѣстами процупываются плотноватые узлы, величиною до яблока, а мѣстами, особенно у верхушекъ, углубленія; на разрѣзѣ ткань сѣро-желтоватая, почти сплошь пронизанная желто-сѣроватыми узлами; въ большихъ имѣются полости съ неровными какъ бы изъѣденными стѣнками, выполненныя гноевидной жидкостью; такія полости, величиною до куринаго яйца, расположены преимущественно въ верхнихъ доляхъ. Почки бѣдны съ желтоватымъ оттѣнкомъ. На брижейкѣ много увеличенныхъ железъ, на разрѣзѣ корки встрѣчаются бѣлые узлы. Въ тонкихъ кишкахъ внизу находятся кругловатыя съ подрытыми краями и грязнымъ дномъ язвы.

420. Неизвѣстная званія *женщина*, лѣтъ 50, 12 дек. 1906 4халъ въ вагонѣ совершенно больненный и слабый въ больницу; изъ вагона по слабости ногъ былъ вынесенъ на носилкахъ и чуть не умеръ. Занимался нищенствомъ.

Вскрытіе 15 дек. 1906. Роста ниже средняго, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце нѣсколько увеличено, внутренній оболочечный зоорты и на створчатыхъ клапанахъ много бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ различной величины; вѣнечныя артеріи значительно утолщены и уплотнены, просвѣтъ ихъ мѣстами сузенъ почти до полнаго уничтоженія плотными обызвествленными бляшками; мышца дряблована, съ жепіи плотными обызвествленными бляшками; мышца дряблована, съ гнилостнымъ оттѣнкомъ. Сосуды основанія мозга уплотнены. Ткань легкихъ пронизана плотными узлами различной величины, на разрѣзѣ они мѣстами темно-красноваты, мѣстами грязно-сѣраго цвѣта, пронизана массой сѣроватыхъ и желтоватыхъ узелковъ величиною до просянаго зерна; по мѣстамъ ткань легкихъ изрыта полостями различной величины съ неровно-изъѣденными стѣнками, выполненными гноевидной массой.

421. Федоръ *Трофимовъ*, 23 л., крест., ломовой извозчикъ. Жаловался на сильное удушье, лежалъ въ больницѣ. Скоропостижно умеръ 19 дек. 1906.

Вскрытіе 27 дек. 1906. Выше средняго роста, слабаго тѣлосложенія и питанія. Въ полости околосердечной сумки около 200 к. с. прозрачной желтоватой жидкости, въ которой плаваютъ фибриновые сверпки. Мышца сердца дряблована, тусклая, блѣдная. Верхніе доли обоихъ легкихъ плотны, на разрѣзѣ грязно-сѣраго цвѣта, изрыты различной величины полостями, выполненными гноевидной жидкостью въ окружности ихъ ткань пронизана бугорками частью сѣроватаго, частью желтоватаго цвѣта величиной до просянаго зерна.

422. Василій *Макаровъ*, 35 л., крест., кузнецъ. Жизнь велъ нетрезвую, заработокъ свой пропивалъ. Послѣднее время жаловался на боль въ груди. Находился мертвымъ въ квартирѣ 13 февр. 1907.

Вскрытіе 15 февр. 1907. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, довольно значительно обложено жиромъ; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечной артеріи находится довольно много плотноватыхъ бѣловатыхъ бляшекъ, величиной до чечевичнаго зерна; мышца очень дряблая, тусклая, съ сѣровато-желтымъ отт*ѣ*нкомъ. Отъ содержимаго желудка, и можетъ повидимому исходитъ запахъ спирта. Ткань легкихъ, за исключеніемъ нижнихъ частей нижнихъ долей, представляется плотной, на разрѣзахъ пронизанной массой сѣроватыхъ узелковъ величиной съ просяное зерно; мѣстами эти узелки становятся большими и въ центрѣ принимаютъ желтоватый отт*ѣ*нокъ. Въ верхнихъ доляхъ имѣется нѣсколько полостей величиною до грецкаго орѣха съ довольно плотными фиброзными стѣнками, выполненныхъ гноевиднаго массою; на плоскости разрѣза торчатъ утолщенные бронхи, просвѣтъ которыхъ выполненъ гноевидною массою. Въ толстыхъ кишкахъ имѣется нѣсколько неправильно-овальной формы поперечно расположенныхъ дефектовъ слизистой оболочки, слегка съ подрытыми краями.

423. Елена *Манжина*, 61 г., мѣщ., вела нетрезвую жизнь, за послѣднее время была очень слабой. Умерла незамѣтно у себя въ постели 4 дек. 1907.

Вскрытіе 10 дек. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Стопы отечны. Сердце раза въ два больше кулака покойной, почти сплошь обложено жиромъ; на двустворкѣ, на полулунныхъ клапанахъ аорты и на внутренней оболочкѣ аорты находятся многочисленныя плотноватыя бѣловатыя бляшки величиною до бобы; мѣстами онѣ нихъ замѣчаются известковыя отложенія; мышца очень дряблая, глинистаго цвѣта; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 0,7 сит., праваго около 0,2; вѣнечныя артеріи жестки, извиты, устья ихъ сильно сужены. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой истончент, плохо отличается отъ мозговаго. Ткань легкихъ почти сплошь пронизана плотноватыми узлами величиной до яблока, плоскость разрѣза легкихъ грязновато-краснаго цвѣта, по мѣстамъ зернистая, усѣяна сѣроватыми узелками величиной до булавочной головки; въ центрѣ нѣкоторыхъ узелковъ замѣтно пожелтѣніе, съ поверхности разрѣзовъ соскабливается эмульсивная гноевидная жидкость, а изъ перерѣзанныхъ утолщенныхъ бронховъ спинастыя гноевидныя массы. Сосуды основанія мозга склерозированы.

424. Матвѣй *Хломкъ*, 38 л., мѣщ. Скоропостижно умеръ въ Кл. в. госп. 19 янв. 1908.

Вскрытіе 22 янв. 1908. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія и плохого питанія. Мышца сердца глинистаго цвѣта, дряблая. Обѣ голосовыя связки почти совершенно уничтожены неправильно-продолговатой формы плохо замѣтными язвами съ неровнымъ дномъ, съ слегка возвышающимися какъ бы изъѣденными краями; въ окружности язвъ замѣтны сѣроватые бугорки; язвы покрыты слизеобразнымъ легко снимающейся массой. Ткань легкихъ плотновата, на разрѣзѣ усѣяна сѣроватыми бугорками, мѣстами язвы полостями, достигающими величины небольшого яблока и содержащими гноевидныя массы. Сосуды основанія мозга жестковаты, немного извиты.

425. Неизвѣстная звания *мужчина*, за 40 л., ночевалъ въ ночлежномъ домѣ нѣсколько разъ. Утромъ 28 янв. 1908, одѣвшись, вышелъ въ корридоръ и прилегъ на скамейкѣ, жалуясь на недоровье, черезъ нѣсколько минутъ умеръ.

Вскрытіе 31 янв. 1908. Роста выше средняго, умѣреннаго тѣлосло-

женія и питанія. Сердце раза въ $1^1/_2$ увеличено, сильно обложено жиромъ; двустворчатый клапанъ очень плотенъ у основанія, а по свободнымъ краямъ замѣтны бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца очень дряблая, желтоватаго цвѣта, пропитана жиромъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 0,8 сит., праваго около 0,4, полость лѣваго желудочка представляется расширенной. Легкіи довольно объемисты, плотноваты; въ нихъ процупываются плотноватые фокусы величиной до небольшого яблока, плевра по мѣстамъ представляется утолщенной; ткань легкихъ на разрѣзѣ темно-краснаго цвѣта, усѣяна по мѣстамъ сѣроватыми, а мѣстами уже желтоватыми бугорками; у верхушекъ легкихъ замѣтны желтоватые фокусы, величиной до сливы, выполненные сѣровидными массами; въ окружности замѣтны желтоватые бугорки; у верхушекъ же легкихъ ткань нѣкъ по мѣстамъ представляется изрытою полостями съ гноевидными содержимыми; изъ мелкихъ перерѣзанныхъ бронховъ при надавливаніи показываются гноевидныя массы. Въ нижнихъ отдѣлахъ

густая жидкость и темно-красная пѣнистая. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, ткань сѣраго цвѣта, корка слегка утолщена, плохо отличима отъ мозгового слоя. Сосуды основанія мозга пяниты.

428. Ивавъ *Легочекъ*, 41 л., кресть., торговецъ въ разносъ. Болѣлъ 5 лѣтъ, страдалъ чахоткой. До послѣдняго дня не лежалъ: вечеромъ сѣло худо, весь день никуда изъ комнаты не выходилъ, въ 4 ч. ночи умеръ, 30 сент. 1909.

Вскрытіе 3 окт. 1909. Роста средняго, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Грудная клѣтка плоская. Сердце довольно сильно обложено жиромъ, діафрагма, мышца трусковатая. На голосовыхъ связкахъ замѣтны неправильно-округлой формы дѣйствія, покрытыя слизеобразнымъ гноемъ, въ окружности язвъ замѣтны сѣроватыя бугорки. Мѣстами на плоскости разрѣза легкихъ замѣтны группы сѣроватыхъ бугорковъ; въ правой верхушкѣ прощупывается плотный узелъ въ голубиное яйцо, на разрѣзѣ сѣровисто-сѣраго цвѣта, немного зернистъ, въ окружности—группы сѣровато-желтыхъ бугорковъ; остальная ткань легкихъ плотновата на ощупь, съ плоскости разрѣза выдавливаются гноевидныя капельки.

429. Алексѣй *Гусевъ*, 28 л., мѣщ., чернорабочій, умеръ 7 дек. 1909.

Вскрытіе 11 дек. 1909. Роста средняго, слабаго тѣлосложенія и плохого питанія. Сердце немного увеличено, сильно обложено жиромъ, мышца буроватаго цвѣта, мѣстами пророста жиромъ; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,4, лѣваго—1,0, причемъ на мышечный слой идетъ всего 0,5. Въ верхушкѣ праваго легкаго прощупываются узелки величиною до голубинаго яйца, на разрѣзѣ состоящіе изъ желтоватыхъ сыровидныхъ массъ; въ окружности этихъ узелковъ замѣтны отдѣльные сѣроватые бугорки величиной съ булавочную головку.

430. Александръ *Родовой*, 46 л., кресть., парикмахеръ. Постоянно пьянствовалъ, кашлялъ, жаловался на боль въ груди. Умеръ скоропостижно днемъ 8 дек. 1909.

Вскрытіе 12 дек. 1909. Роста выше средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено вдвое, сильно обложено жиромъ; внутренняя оболочка аорты и вѣнечныхъ артерій сплошь покрыта плотноватыми бляшками; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,3 сант., лѣваго—около 1,0; мышца дряблая, тѣнистая, полости желудки, величиною до большого яблока, на разрѣзѣ составляющія изъ желтоватыхъ сыровидныхъ массъ, въ окружности замѣтны сѣроватые узелки величиною до булавочной головки.

Капиллярный бронхитъ.

431. Марья *Иванова*, 4 мѣс., кресть. Вышившіе родители, вставая, 27 ноября 1906 увидѣли, что спавшая между ними ихъ дочь оказалась мертвою. Днемъ ребенокъ былъ здоровъ, а ночью плакалъ.

Вскрытіе 29 ноября 1906. Ростомъ 61 сант., хорошаго питанія. Соединительныя оболочки блѣдны, на правомъ глазу на ея соединительной повязкѣ, несмывающихся пятнышка. На наружной поверхности сердца имѣется нѣсколько темно-красныхъ несмывающихся очень маленькихъ пятнышекъ. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей красноватаго цвѣта, покрыта густою бѣловатою немного пѣнистою слизью. Въ мѣхомъ моргаевомъ желудочкѣ находятся черное, величиною съ березовое зерно, довольно плотное, но распирающееся на пальцахъ пищевое вязкое цвѣта, а возвышенныя—бѣлато-розоваго, въ послѣднихъ подъ лупой замѣтны растянутыя альвеолы; на нижней поверхности легкихъ

и въ бороздахъ между долями замѣтны темнокрасныя очень маленькія несмывающіяся пятнышки.

432. Сергѣй *Курилов*ъ, 6 нед., кресть., обнаруженъ мертвымъ утромъ 30 окт. 1907.

Вскрытіе 3 ноября 1907. Длиною 58 сант., вѣсомъ 5000,0 гр., питанія достаточнаго. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей красноватаго цвѣта, покрыта бѣловато-желтоватой слизистой массой. На діафрагмальной поверхности легкихъ, а также на задней поперечной бороздѣ сердца находится нѣсколько грубыхъ темно-красныхъ точечныхъ пятнышекъ. Изъ мелкихъ перерѣзанныхъ бронховъ выдавливаются капельки гноевидной жидкости. Барабанныя полости выполнены гноевидными массами.

433. Екатерина *Гусева*, 12 дней, кресть. Ребенокъ все время кричалъ и плакалъ, но родители не придавали этому серьезнаго значенія, умеръ 19 ноября 1908.

Вскрытіе 24 ноября 1908. Длина тѣла 48 сант., вѣсъ 2200,0 гр., питанія слабаго. Мышца сердца очень дряблая. Легкіи имѣютъ мраморный видъ: на болѣе свѣтломъ фонѣ замѣтны темно-красные слегка запавшіе островки, изъ мелкихъ перерѣзанныхъ бронховъ при давленіи появляются многочисленныя капельки гноевидной слизи.

434. Ребенокъ *мужского* пола, около 3 мѣс., найденъ мертвымъ въ отхожемъ мѣстѣ 3 дек. 1908.

Вскрытіе 8 дек. 1908. Длина 52 сант., вѣсъ 3250,0 гр., питанія умѣреннаго. Мышца сердца тусклая. Поверхность легкихъ имѣетъ мраморный видъ: на темнокрасномъ фонѣ слегка возвышающіеся розовые островки; на плоскости разрѣза при надавливаніи появляются довольно многочисленныя капельки гноевидной слизи; поверхность разрѣза имѣетъ пестрый видъ: на темномъ фонѣ многочисленные болѣе свѣтлые слегка зернистые островки; ткань легкихъ наощупь плотновата, но легки, опущенныя въ воду, плаваютъ какъ цѣликомъ, такъ и отдѣльными кусочками.

435. Незаконнорожденный младенецъ *мужского* пола, 1 мѣс., мертвый найденъ подкинутымъ въ уборную; шея его перевязана тонкой веревкой, 27 февр. 1909.

Вскрытіе 10 марта 1909. Длина тѣла 51 сант., вѣсъ 2920,0 гр., питанія слабаго. Мышца сердца тусклая, какъ бы обварена. Слизистая дыхательныхъ путей обильно покрыта слизистой гноевидной массой. Поверхность легкихъ имѣетъ неравномѣрный видъ; мѣстами на ней замѣчаются нѣсколько углубленные синевато-красноватые островки; ткань легкихъ плотновата на ощупь; нѣкоторые кусочки легкихъ тонутъ въ водѣ; поверхность разрѣза имѣетъ мраморный видъ: на темномъ фонѣ слегка возвышающіеся болѣе свѣтлые островки; при надавливаніи изъ мелкихъ бронховъ выступаютъ бѣловатыя гноевидныя массы.

436. Михаилъ *Соколов*ъ, 2 мѣс. Родился очень слабымъ, послѣдній мѣсяцъ болѣлъ поносомъ и рвотою, умеръ 19 ноября 1909.

Вскрытіе 23 ноября 1909. Длина тѣла 56,0 сант., вѣсъ 4050,0 гр., тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Мышца сердца тусклая. Ткань легкихъ мѣстами пушиста, эластична, мѣстами какъ бы уплотнена; на разрѣзѣ имѣетъ мраморный видъ: на темно-красномъ фонѣ мѣстами заѣвшія слегка возвышающіеся болѣе свѣтлые островки; поверхность разрѣза этихъ островковъ зерниста, при надавливаніи на ней появляется мутноватая жидкость; мелкіе перерѣзанные бронхи оказались выполненными гноевидною слизью.

437. Младенецъ *мужского* пола, трупъ обнаруженъ въ прорубяхъ Суздальскаго озера 29 ноября 1909.

Вскрытіе 2 дек. 1909. Длина тѣла 52,0 сант., вѣсъ 3900,0, питанія хо-

рошаго. Мышца сердца блѣдная. Легкія довольно объемисты, ткань ихъ на ощупь мѣстами пушиста, а мѣстами плотновата; на рѣзрѣзѣ красноватаго цвѣта. Изъ перерѣзанныхъ бронховъ выдавливается много пѣнистой слизи.

Острое воспаленіе дыхательныхъ путей.

438. Иванъ *Уляхинъ*, 18 л., крест., подручный въ колбасной лавкѣ. Найденъ въ постели мертвымъ 17 февр. 1900, наканунѣ знобило, болѣла грудь; страдалъ одышкой и болью въ груди съ малыхъ лѣтъ.

Вскрытіе 21 февр. 1900. Ростъ 108 снт., позвоночникъ въ грудной и поясничной частяхъ значительно искривленъ впередъ и вправо, голова кажется большой сравнительно съ туловищемъ, грудь бочкообразная, искривлена вправо; питанія слабаго. Сердце немного увеличено въ объемѣ; стѣнки желудочковъ истончены, мышца дрябла, съ яснымъ желтымъ оттѣнкомъ. Изъ гортани и дыхательнаго горла при надавливаніи на легкія выступаетъ въ большомъ количествѣ кровянистая пѣнистая жидкость; слизистая оболочка зѣва, входа въ гортань, гортани и дыхательнаго горла сильно переполнена кровью, набухла; въ полости гортани, дыхательнаго горла и въ развѣтвленіяхъ бронховъ находится большое количество кровянистой пѣнистой жидкости; слизистая оболочка бронховъ также красна и набухла. Почки нѣсколько уменьшены, корковой слой утолщенъ, блѣденъ, пирамидки стиснуты.

439. Александра *Афанасьева*, 12 л., крест. По дорогѣ въ больницу умерла 28 ноября 1900.

Вскрытіе 3 декаб. 1900. Роста 134 снт.; слабаго тѣлосложенія, крайне истощена. Въ полости гортани и дыхательнаго горла, а также въ зѣвѣ находится густая гноевидная жидкость, распространяющаяся до крупныхъ бронховъ; слизистая оболочка довольно блѣдна. Миндалевидныя железы набухли и при надавливаніи выдѣляютъ гноевидную жидкость, которая скопляется въ носоглоточномъ пространствѣ. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой съ желтоватымъ оттѣнкомъ.

Воспаленіе плевры.

440. Александръ *Пономаревъ*, 55 л., отст. капит. Умеръ 16 февр. 1902.

Вскрытіе 19 февр. 1901. Ниже средняго роста, средняго тѣлосложенія, слабаго питанія. Голени и стопы сильно отечны. Съ правой стороны грудобрюшная преграда выпячена ниже края ложныхъ реберъ и зыблется; печень смѣщена на два пальца отъ края реберъ и повернута вокругъ своей оси, причемъ правая доля опущена книзу и сращена съ толстою восходящею кишкою старыми перепонками, такія же сращенія имѣются у лѣвой доли съ сальникомъ, желудокъ расположенъ вертикально, причемъ нижняя его половина находится ниже поперечной ободочной кишки; большая часть петель тонкихъ кишекъ опустилась черезъ открытый паховой каналъ въ правую половину мошонки, откуда при сильномъ потягиваніи не извлекается. Полость желудка сильно растянута. Въ полости правой плевры находится 2100 к. с. бѣловатой гнойной жидкости, въ которой плаваютъ бѣловатые рыхлые хлопья. Сердце увеличено, особенно въ поперечникѣ, обложено значительнымъ слоемъ жира; толщина стѣнки праваго желудочка 0,2 снт., лѣваго—1,5 снт.; мышца буро-краснаго цвѣта, довольно плотна; двустворчатый клапанъ и клапаны аорты утолщены, мутно-бѣловатаго цвѣта. Правое легкое стиснуто и отклонено къ позвоночнику, ткань

его желто-сѣраго цвѣта, непроходима для воздуха и малокровна. Форма печени неправильная, бугристая, перетянутая во многихъ мѣстахъ старыми рубцами. Почки уменьшены, капсула ихъ снимается съ трудомъ, слои истончены. Сосуды основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта.

441. Павелъ *Нефедовъ*, 60 л., крест., судовладѣлецъ. Жизнь велъ нетрезвую; послѣдній мѣсяцъ не пилъ, страдалъ одышкой и разстройствомъ желудка, пищу желудокъ не переваривалъ. Найденъ мертвымъ на улицѣ 24 окт. 1903.

Вскрытіе 27 окт. 1903. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія, крайне истощенъ. Голени и стопы отечны. Сердце немного увеличено, спереди обложено красноватымъ жиромъ; мышца желтовата, дрябла; дву- и трехстворчатый клапаны утолщены, мутно-бѣловатаго цвѣта; внутренняя оболочка аорты бугриста, шероховата со множествомъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ, отверстія вѣнечныхъ артерій сужены подобными же бляшками. Въ лѣвой плевральной полости находится около 800 к. с. бѣловато-зеленоватаго хлопчатаго гноя; лѣвое легкое отчасти сращено ложными пленками съ грудной клѣткою, плевра его утолщена, шероховата, сѣровато-бѣловатаго цвѣта; ткань нижней доли праваго легкаго уплотнена, сѣровато-грязнаго цвѣта, въ разрѣзахъ пронизана множествомъ кругловатыхъ полостей, величиною отъ горошины до грецкаго орѣха, наполненныхъ сѣроватымъ распадомъ; остальныя части легкихъ буро-красны, малокровны, сильно отечны. Сосуды основанія мозга склерозированы.

442. Александра *Бычкова*, 24 л., слушат. Ж. М. Инст. Больная захворала 5—6 дней, t° была 39°—40°, умерла 29 февр. 1904.

Вскрытіе 3 мар. 1904. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 11 × 10 снт., съ большимъ отложеніемъ жира; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,2 снт., праваго—0,3; мышца тусклая, съ желтоватымъ оттѣнкомъ; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами небольшое количество бѣловатыхъ шероховатыхъ плотныхъ бляшекъ. Въ полости лѣвой плевры около 200 к. с. желтоватой прозрачной жидкости, слегка окрашенной въ красноватый цвѣтъ; легочная плева, покрывающая правое легкое, а также реберная плева—шероховата, покрыта бѣловатыми легко рвущимися перепонками. Почки немного увеличены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой утолщенъ, пирамидальный—укороченъ.

443. Алексѣй *Михайловъ*, 32 л., крест., обнаруженъ мертвымъ въ ночлежномъ пріютѣ утромъ 12 окт. 1909.

Вскрытіе 15 окт. 1909. Роста выше средняго, тѣлосложенія крѣпкаго, питанія хорошаго. Правая легочная плевра мѣстами покрыта старыми ложными перепонками, а мѣстами легко снимаемымъ сѣроватымъ налетомъ; въ полости правой плевры находится около литра кровянистой мутноватой жидкости съ плавающими въ ней сѣроватыми хлопьями. Сердце немного увеличено, очень дряблое, сильно обложено жиромъ; мышца дрябла, глинистаго цвѣта.

Ракъ пищевода и воспаленіе легкаго.

444. *Опанкинъ*, 28 л., крест., скоропостижно умеръ въ госпиталѣ 26 дек. 1907.

Вскрытіе 27 дек. 1907. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, весьма плохого питанія. Сердце довольно сильно обложено жиромъ, дрябловато. Средняя треть пищевода представляется утолщенной; при разрѣзѣ задней стѣнки пищевода на мѣстѣ утолщенія оказалась обширная язва съ плотными, возвышающимися, какъ-бы изъѣденными краями, съ неровнымъ покрытымъ грязнобурой распадающейся массой дномъ;

язва эта занимаетъ окружность всего пищевода, причемъ на передней стѣнкѣ пищевода находится округлое отверстіе, величиной съ серебряный полтинникъ, открывающееся въ трахею. Изъ перерѣзанныхъ бронховъ лѣваго легкаго выдавливается бѣловато-гноевидная масса. Правое легкое плотновато, на разрѣзѣ имѣетъ мраморный видъ: на красномъ фонѣ замѣтны слегка выступающіе надъ уровнемъ разрѣза розовато-желтоватые нерѣзко-ограниченные островки со слабо выраженной зернистостью; бронхи выполнены грязновато-бурыми вонючими массами.

Отекъ гортани.

445. Марья *Иванова*, 9 л., крест., дочь кухарки. 13 фев. 1900 жаловалась на боль въ горлѣ, боль при глотаніи и затрудненное дыханіе, по дорогѣ въ больницу умерла. Послѣдній годъ больна фолликулярной ангиной, корью, воспаленіемъ почекъ и дифтеріей.

Вскрытіе 17 фев. 1900. Роста 113 сант., умѣреннаго тѣлосложенія, удовлетворительнаго питанія. Сердце немного увеличено въ объемѣ, съ порядочнымъ отложеніемъ на наружной поверхности жира; стѣнки желудочковъ немного истончены, дряблы, съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Слизистая оболочка зѣва сильно набухла и отекла; миндалевидныя железы и язычекъ сильно увеличены, набухли и отекли; надгортанникъ также сильно припухъ и отекъ, а также и слизистая оболочка входа въ гортань, такъ что при входѣ въ гортань образуется едва замѣтная щель, пропускающая только зондъ; въ полости гортани и дыхательнаго горла находится пѣнистая бѣловатая жидкость, слизистая гортани набухла и отекла. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается легко, корковый слой увеличенъ, блѣдно-краснаго цвѣта съ сальнымъ оттѣнкомъ, пирамиды укорочены, ткань вообще плотна.

Ракъ гортани.

446. Антипатръ *Комаровъ*, 57 л., ремесл., 2 года страдаетъ ракомъ гортани, лечился у проф. Окунева. Послѣднюю недѣлю очень плохо себя чувствовалъ. Умеръ въ пріемной у врача 10 фев. 1901.

Вскрытіе 15 фев. 1901. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія, плохого питанія. По средней линіи шеи соотвѣтственно перстневидному хрящу, находится продольно расположенная линейная рана длиною около 2,0 сант., края ея ровны. Сердце нѣсколько увеличено, очень дряблое, довольно сильно обложено жиромъ; на двустворкѣ, на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій бѣловатыя плотноватыя бляшки, устье аорты нѣсколько сужено, основаніе ея полулунныхъ клапановъ утолщено; мышца сердца очень дряблая, гланистаго цвѣта. Слизистая оболочка, покрывающая черпаловидно-надгортанныя связки и грушевидные синусы, нѣсколько утолщена, морщинится. На правой сторонѣ гортани, соотвѣтственно истиннымъ и ложнымъ голосовымъ связкамъ, Морганьеву желудочку, а отчасти и подъ истинной голосовой связкой находится опухоль въ видѣ цвѣтной капусты величиной съ небольшую сливу, мѣстами на ней замѣтно изъязвленіе, мѣстами же она покрыта обильно бѣловатыми массами; на внутренней поверхности гортани, соотвѣтственно перстневидному хрящу, находится продольная рана, длиною около 1,5 сант., соединенная съ раной, описанной на шеѣ. Перстневидный хрящъ перерѣзанъ. Лимфатическія железы на шеѣ почти не увеличены. Сосуды основанія мозга жестковаты, извиты.

Болѣзни органовъ брюшной полости.

Воспаленіе брюшины.

447. Аспирантъ *Васильевъ*, 45 л., крест. Почувствовалъ тошноту, сталъ жаловаться на боль и стѣсненіе въ груди, отправленъ въ клинику, и черезъ нѣсколько минутъ умеръ, 3 дек. 1900. Велъ нетрезвую жизнь, 10 лѣтъ нигдѣ не занимался и промышлялъ нищенствомъ.

Вскрытіе 5 дек. 1900. Средняго роста, умѣреннаго сложенія, плохого питанія. Въ подкожной клѣтчаткѣ брюшной полости много свѣтло-прозрачной жидкости. Петли кишекъ покрыты темно-землистаго цвѣта крошковатой мажорной массой; въ брюшной полости около литра темно-коричневатой мажорной жидкости. Желудокъ весьма сильно увеличенъ, умѣренно растянутъ газами, въ полости его содержится 2300 кб. сант. темно-землистаго цвѣта жидкости, перемѣшанной съ обильнымъ количествомъ остатковъ неперевареной пищи. Снаружи желудокъ плотно сращенъ съ нижней поверхностью печени; двѣ долей Спигелія внѣ спаекъ обнаружено проведеніе съ утолщенными рубцовыми краемъ. Ткань брюшины въ этомъ мѣстѣ мѣстами темно-аспидного цвѣта, діаметръ этого отверстія 2,5 сант., края не вполнѣ ровны, со стороны слизистой оболочки желудка мѣстами бугристы. Въ области выхода желудка на оболочкѣ желудка мѣстами бугристости. Въ области выхода желудка на оболочкѣ слизистой оболочки отчасти вдоль малой кривизны, отчасти поперечно по задней стѣнкѣ желудка имѣются обширныя давныя съ рубцовыми краями и дномъ язвы, края ихъ утолщены, мѣстами бугристы; дно этихъ язвъ неровно, покрыты слизистой оболочкой, мѣстами блѣдно-рубцовой, мѣстами темно-аспидной пятнистой окраски; на задней стѣнкѣ въ области язвы между вышеописанными проведеніемъ и выходомъ желудка имѣется обширное сообщеніе съ 12-перстной кишкой. Мышца сердца дряблая. Почки уменьшены, капсула снимается съ трудомъ, ткань желтоватаго цвѣта, корковый слой истончент, границы слоевъ и рисунокъ неясно выражены.

448. Антоній *Шпаковъ*, 34 л., крест., кучеръ. 19 ноябр. началъ жаловаться на боль въ животѣ и озноб.; въ ночь на 23 ноябр. съ нимъ сдѣлалось очень худо, появилась сильная рвота въ животѣ, отправленный въ больницу утромъ 24 ноябр. 1900 умеръ тамъ въ тотъ же день.

Вскрытіе 20 ноябр. 1901. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Въ полости брюшины находится 1 литръ кровянистой жидкости, въ которой плаваютъ желтоватыя пленки и связь; пленки рыхлыя и, повидимому, заключаютъ гнойные элементы. Правый нижній край большого сальника сращенъ съ многими петлями тонкихъ кишекъ, а послѣднія между собою, сращенія сальника касаются также кишекъ, а также перепонки, образующія сращенія, весьма рыхлы, легко и сѣпкой кишки; перепонки, покрывающія кишки, находятся рвутся, между ними и брюшиною, покрывающею кишки, находятся значительныя количества бѣловатаго густого гноя. Сердце увеличено въ объемѣ, съ большими отложеніями жира; стѣнка лѣваго желудочка утолщена, съ желтоватыми прослойками. Тонкія кишки переполнены красноватой кровянистой жидкостью, слизистая оболочка верхняго отдѣла сноватой кровянистой переполнена кровью и темно-краснаго цвѣта; блѣдна, а въ подвздошномъ переполнена кровью и темно-краснаго цвѣта; блѣдна, а въ подвздошномъ отдѣлѣ слизистой оболочки множество язвъ съ подрытыми краями, проникающихъ во многихъ мѣстахъ до брюшиннаго слоя; нѣкоторыя изъ нихъ зарубцевались совершенно и покрыты гладкими рубцами, другихъ зарубцевались совершенно и покрыты гладкими рубцами, другихъ зарубцевавшись

величина извѣнныхъ поверхностей въ тонкихъ кишкахъ отъ горошины до 20 коп. монеты. Брыжжеечныя железы увеличены до лѣсного орѣха, мягки, сѣроватаго цвѣта, въ центрѣ наполнены сѣроватымъ распадомъ.

449. Михаилъ *Цундуровъ*, 23 л., крест., деревской извозчикъ. Спиртное напитки употреблялъ очень мало. 5-го почувствовалъ сильную боль въ лѣвомъ боку, изъ дому не выѣзжалъ; а 6 мар. 1902 утромъ умеръ.

Вскрытіе 9 мар. 1902. Небольшого роста, умѣреннаго тѣлосложенія, худощавъ. При вскрытіи брюшной полости, она оказалась переполненной водянисто-волокнистыми массами желто-зеленоватаго цвѣта; внутренняя поверхность брюшныхъ стѣнокъ и кишечныя петли склеены между собою и съ поверхностью брюшныхъ органовъ волокнистыми перепонками, разрывающимися при небольшомъ усиліи. Мышца сердца тусклая. Капсула почекъ не вполнѣ свободно отдѣляется, корковый слой набухшій и бѣдный. Внутренній покровъ кишекъ бѣдный, напухшій мѣстами—ярко-красный.

450. Алексѣй *Волковъ*, 40 л., СПБ. Политехническаго Института статоваритъ. Доставленъ въ госпиталь съ явленіями гнойнаго перитонита на 4-й день болѣзни. Жалобы больного: различныя боли въ области всего живота, особенно въ поясничныхъ, рвота желто-коричневаго цвѣта, съ фекальнымъ запахомъ, общій упадокъ силъ, сильная жажда и постоянная отрыжка, отсутствіе стула. Раньше около 3 лѣтъ страдалъ запорами отъ болей неопредѣленнаго характера въ обѣихъ подвздошныхъ областяхъ. Послѣ произведенной операціи (наведено около 1 литра зловоннаго гноя; удаленъ червеобразный отростокъ, имѣвшій въ 2-хъ мѣстахъ проводенія, кромѣ того, на немъ имѣлось 7 мѣстъ начинающагося проводенія) присоединилось удушье и нарастающая слабость сердца, и больной умеръ 29 нояб. 1903.

Вскрытіе 1 дек. 1903. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Брюшина, покрывающая петли тонкихъ кишекъ, а также при-стѣночная черновато-краснаго цвѣта, покрыта по многихъ мѣстахъ толстымъ слоемъ сѣровато-бѣлозатаго налета; петли тонкихъ кишекъ сильно вздуты газами и соединены между собою рыхлыми, легко разрушимыми бѣловатыми спайками; въ полости брюшины находится довольно много мутно-краснаго жидкости съ хлопьями гноя, большой скопленіе на свободномъ краѣ черновато-краснаго цвѣта, покрытъ налетами изъ гнояющихъ массъ. Брюшина, покрывающая слѣпую кишку, черновато-зеленоватаго цвѣта, покрыта толстымъ слоемъ налета. Сердце нѣсколько увеличено въ объемѣ и обложено толстымъ слоемъ жира; толщина стѣнки лѣваго желудочка—1,5 сит., праваго—0,6; мышца ихъ буро-красная, довольно плотна. На капсулѣ печени находятся гнояющіяся скопленія, съ образовавшимися рыхлыми спайками съ грудобрюшной преградой. Почки нѣсколько увеличены, дольчаты, капсула ихъ снимается съ изъторжимъ трудомъ, корковый слой истончонъ, пирамидки укорочены, граница слоевъ сглажены. Брюшинный покровъ на подвздошной кишкѣ по сосѣдству съ слѣпою и на послѣдней черно-зеленоватаго цвѣта. Сосуды основанія мозга склерозированы.

451. Настасья *Давыдова*, 26 л., мѣщ. Опредѣленныхъ занятій не имѣла, говорила, что работаетъ на пишущей машинѣ. Больна недѣлю, заболѣвалась на головную боль, больше лежала въ постели. 15 март. 1904 сдѣлалось совсѣмъ плохо, по дорогѣ въ больницу умерла.

Вскрытіе 20 март. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, питанія умѣреннаго. Въ полости брюшины около 250 к. с. густой слизеобразной желтовато-бѣлой гнойной жидкости, брюшина шероховата, покрыта повсюду рыхлыми желто-бѣлозатыми хлопьями; брюшинный покровъ матки темно-краснаго цвѣта. Сердце немного увеличено, стѣнки желудочковъ утолщены, мышцы бѣдно-красны, тусклы, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблыя. Почки увеличены въ объемѣ, капсула снимается легко, корковый слой утолщенъ, ткань бѣдно-желтовата, малокровна. Матка 15×11×5 сит., брюшинный покровъ ея и свободныхъ концовъ Фаллопіевыхъ трубъ темно-красный; изъ послѣднихъ при надавливаніи выдѣляется въ большомъ количествѣ гной; на наружныхъ половыхъ органахъ и во влагалищѣ никакихъ поврежденій не имѣется, слизистая влагалища бѣдная, въ полости ея большое количество буровато-зеленоватаго густого гноя, который выдѣляется изъ маточнаго отверстія въ большомъ количествѣ; зѣвъ матки круглый, открытъ, свободно пропускаетъ палецъ, губы зѣва разрѣжаются довольно глубокими сфо-ватыми рыхлыми надрывами; толщина стѣнки матки достигаетъ 2,5 сит., плотность ихъ замѣтно уменьшена, полость матки расширена и заключаетъ гнойныя массы; на задней стѣнкѣ полости матки на пространствѣ 8,0 сит. въ діаметрѣ имѣется разрыхленная и возвышенная сѣроватая поверхность съ остатками плодовыхъ оболочекъ въ видѣ рыхлыхъ сѣро-красноватыхъ перепонокъ.

452. Авдотья *Степанова*, 23 л., кормилица въ воспитательномъ домѣ. 17 нояб. 1904 принята въ гости и сама на кровати ждуть почувствовала себя дурно и легла, и немного спустя умерла.

Вскрытіе 18 нояб. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, достаточнаго питанія. Въ брюшной полости найдено около 200 к. с. мутной жидкости оранжеваго цвѣта; наружный покровъ кишечныхъ петель—сильно полнокровенный всѣдствіе налитія мелкихъ сосудовъ,—на немъ, сильно покрасневшій

454. Анна *Обордонъ*, 29 л., крест., умерла въ госпиталѣ 13 нояб. 1905.

Вскрытіе 15 нояб. 1905. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Наружные половые органы испачканы вытекающей изъ половой щели густоватой гноевидно-сукровичной жидкостью. Брюшина тускловата, шероховата, мѣстами пятнисто-красная; пятна эти при разсматриваніи въ лупу оказываются состоящими изъ расширенныхъ мелкихъ сосудовъ; мѣстами на брюшинѣ имѣется бѣловатый налетъ. Въ полости брюшины около 200 к. с. густоватой желтовато-красноватой гноевидной жидкости, въ которой плаваютъ бѣлые хлопья. Мышца сердца тускловата. Наружный покровъ кишечника пятнисто-красный въ зависимости отъ расширенныхъ мелкихъ сосудовъ, мѣстами покрытъ бѣлымъ налетомъ. На поверхности почекъ замѣтны расширенныя звѣздчатыя вены; на разрѣзѣ ткань почки мутновата съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Въ полости плевры 200 к. с. мутноватой жидкости, въ которой плаваютъ мутноватые хлопья; легочная плевра мѣстами покрыта бѣловатымъ налетомъ. Брюшинный покровъ матки представляется тускловатымъ, шероховатымъ, мѣстами пятнисто-краснымъ въ зависимости отъ расширенныхъ сосудовъ, почти сплошь покрытъ бѣловатымъ налетомъ. Матка величиною съ гусиное яйцо, въ ея полости находятся сгустки крови, смѣшанные съ гноевидною жидкостью; у дна матки на внутренней ея оболочкѣ имѣется неровная поверхность (ворсинчатая); складки влагалища сглажены.

455. Анна *Солькъ*, 32 л., крест. Скоропостижно умерла 24 окт. 1906 въ госпиталѣ.

Вскрытіе 26 окт. 1906. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. На животѣ по средней линіи операціонная рана, изъ нея торчатъ марлевые тампоны, пропитанные гноевидной жидкостью противнаго запаха. Брюшина тусклая, шероховатая, пятнисто-красная, мѣстами покрыта хлопчатымъ налетомъ; внутренніе органы полости живота спаяны между собою во многихъ мѣстахъ хлопчатымъ налетомъ; кишечникъ значительно вздутъ газами, серозный его покровъ пятнисто-грязно-краснаго съ зеленоватымъ оттѣнкомъ цвѣта; въ полости брюшины, а также и между спайками находится гноевидная вонючая жидкость. Мышца сердца тусклая съ буроватымъ оттѣнкомъ. Ткань почекъ тусклая съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Въ заднемъ Дугласовомъ пространствѣ около 75 к. с. гноевидной вонючей жидкости. Слизистая влагалища нѣсколько сглажена, слегка утолщена, сплошного темнокраснаго цвѣта. Матка 9 × 7 × 4,5 снт., отверстіе ея пропускаетъ 1-й суставъ указательнаго пальца, толщина стѣнки матки 2,2 снт.; полость матки расширена, содержитъ довольно густую грязнокрасную смѣшанную со слизью жидкость; слизистая оболочка на передней стѣнкѣ матки представляется немного разрыхленной и утолщенной; трубы толщиною въ мизинецъ, содержатъ грязную гноевидную жидкость.

456. Григорій *Шмитовъ*, 31 г., крест., кладчикъ дровъ и каталь. Лѣтъ 5—6 назадъ при ссорѣ съ рабочими на заводѣ ему были причинены побои и пораненія, на которыя онъ время отъ времени жаловался. Раньше страдалъ солитеромъ, часто подкатывалось подъ вздохи, отчего отъ боли кричалъ, послѣ растиранія живота боль и тошнота проходила. Съ 25 дек. сильно пилъ, а въ ночь на 28 дек. чувствовалъ страшную боль въ животѣ, и его тошнило и рвало; утромъ въ 10 ч. 28 дек. 1906 умеръ.

Вскрытіе 31 дек. 1906. Выше средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Кишечникъ значительно вздутъ газами, серозный покровъ его въ области подвздошной представляется тускловатымъ, розоваго цвѣта вслѣдствіе расширенныхъ сосудовъ, покрытымъ легко снимающимися бѣловатыми пленками; эти измѣненія по направленію къ тощей кишкѣ ослабѣваютъ; въ полости брюшины находится около

250 к. с. кровянистой мутноватой жидкости съ фибринозными свертками; остальная брюшина гладка, блестяща. Сердце значительно увеличено, очень дряблое; мышца сердца очень дряблая, тусклая, мутная, съ сѣровато-желтоватымъ оттѣнкомъ. Въ подвздошной кишкѣ, ближе къ слѣпой, Пейеровы бляшки набухшія, но эти измѣненія по мѣрѣ приближенія къ тощей ослабѣваютъ; брыжжеечныя железы не увеличены. Ткань почекъ мутновата, дрябловатая, въ корковомъ слоѣ замѣтны красноватые лучи.

457. Адріанъ *Акимовъ*, 21 г., крест. Скоропостижно умеръ въ госпиталѣ 5 фев. 1907.

Вскрытіе 7 фев. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Брюшина грязно-зеленоватаго цвѣта, тусклая, мѣстами покрыта сѣроватымъ довольно легко снимающимся налетомъ и гнойною жидкостью. Сальникъ и кишки мѣстами грязно-зеленовато-краснаго цвѣта, по мѣстамъ спаяны другъ съ другомъ хлопчатымъ довольно легко снимающимся налетомъ; въ полости брюшины находится около 100 к. с. желтовато-зеленоватаго гноя. Сердце дрябловато; мышца тусклая, сѣроватаго цвѣта, какъ бы обвареная. Слизистая оболочка слѣпой кишки сѣровато-зеленовато-краснаго цвѣта; такого же цвѣта слизистая прилежащихъ тонкихъ кишекъ; червовидный отростокъ отсутствуетъ, на его мѣстѣ наложены 4 узловатыхъ шва.

458. *Ивановъ*, 35 л., скоропостижно умеръ въ амбулаторіи Клин. воен. госпиталя 16 окт. 1907.

Вскрытіе 18 окт. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Въ брюшной полости около 800 к. с. грязно-бурой жидкости съ обильно плавающими въ ней хлопьями. Брюшина представляется мѣстами покраснѣвшей, тусклой, покрытой сѣроватымъ, довольно легко снимаемымъ налетомъ. Кишки сильно вздуты газами, мѣстами спаяны свѣжими ложными перепонками, брюшинный покровъ кишекъ тусклый, мѣстами красноватаго цвѣта вслѣдствіе расширенія сосудовъ, покрытъ сѣроватымъ налетомъ. На подвздошной кишкѣ четверти на 2 отъ ея соединенія съ толстой кишкой особенно рѣзко выражены эти измѣненія. На мѣстѣ противоположномъ прикрѣпленію брыжжейки замѣтно отверстіе величиною съ конопляное зерно; черезъ это отверстіе при надавливаніи на кишку выходитъ жидкій буроватый калъ въ весьма небольшомъ количествѣ; окружность этого отверстія представляется грязно-краснаго цвѣта, покрыта обильно сѣроватымъ налетомъ; при вскрытіи кишки слизистая ея представляется на пространствѣ величиной съ 3 коп. монету грязно-краснаго цвѣта, утолщенной; почти въ центрѣ этого пятна находится неправильной формы величиною съ большую горошину дефектъ слизистой оболочки, на днѣ котораго находится отверстіе, описанное выше; слизистая тонкихъ кишекъ сѣроватаго цвѣта; на мѣстахъ, соотвѣтствующимъ Пейеровымъ бляшкамъ, стѣнки кишекъ представляются сильно истонченными, эти измѣненія особенно рѣзко выражены въ подвздошной кишкѣ. Брыжжеечныя железы представляются увеличенными, на разрѣзѣ сочными, розоватаго цвѣта. Селезенка значительно увеличена, капсула ея напряжена; ткань красно-фіолетоваго цвѣта, съ обильнымъ содержаніемъ мякоти. Сердце нѣсколько увеличено, очень дряблое.

459. Петръ *Алексѣевъ*, 43 л., крест., скоропостижно умеръ въ Клин. Воен. Госп. 26 март. 1908.

Вскрытіе 28 март. 1908. Средняго роста, правильнаго тѣлосложенія, крайне истощенъ. Грудная клѣтка цилиндро коническая, большого объема. Животъ рѣзко втянутъ ладьеобразно. Половые органы съ крайне вялыми покровомъ и мошонкой, яички малы и мягки. Вокругъ задняго прохода вѣнецъ довольно напряженныхъ шишекъ багрово-фіолетоваго цвѣта. У голеностопныхъ суставовъ отечность. Въ брюшной по-

лости оказалось около 400 к. с. красноватой не совсѣмъ прозрачной съ хлопьями фибрина жидкости; сывороточный покровъ кишекъ съ расширенными и мѣстами налитыми кровью сосудцами; брюшной выпотъ высыхаетъ на рукѣ и даетъ ясное ощущеніе клейкости. Сердце меньше кулака покойнаго, совершенно лишено жира; на немъ много крупныхъ перламутроваго вида бляшекъ, особенно въ области правыхъ желудочка и предсердія; лѣвое венозное кольцо не пропускаетъ двухъ пальцевъ; мышца сердца бураго цвѣта, замѣчается утолщеніе стѣнокъ праваго желудочка и лѣваго предсердія; по краю двустворчатаго клапана есть нѣсколько плотноватыхъ утолщеній; верхушки сосочковыхъ мышцъ тупы, бѣлы, жестки. Привратникъ желудка пропускаетъ одинъ палецъ. Слизистая тонкихъ кишекъ на всемъ протяженіи набухшая, всюду слегка сѣроватая, мѣстами видно расширеніе сосудцевъ. Толстая кишка на всемъ протяженіи сокращена, стѣнка ея утолщена, особенно набухла слизистая, и преимущественно вокругъ цѣлой массы глубокихъ неправильно-кругловатой формы съ сильно подрытыми краями и грязнымъ дномъ язвъ; послѣднія распредѣлены довольно ровно на всемъ протяженіи толстой кишки отъ слѣпой до прямой, слизистая—сѣроватая. Почки блѣдноваты, рисунокъ не отчетливъ.

460. Григорій *Богдановъ*, 41 г., финлянд. урож., столяръ. Сильно пилъ водку и часто жаловался на колотье въ лѣвомъ боку. 16 сент. 1908 пришелъ съ работы днемъ, жаловался, что нездоровится, сильно колетъ въ боку, легъ на кровать и черезъ часъ умеръ.

Вскрытіе 19 сент. 1908. Выше средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Животъ вздутъ газами. Изъ задняго прохода выпячивается прямая кишка сантиметровъ на 5, слизистая сильно утолщена, мѣстами омертвѣвшая. Брюшина, въ особенности покрывающая тонкія кишки, покраснѣвшая, тусклая, покрыта сѣроватыми фибринозными пленками; въ ея полости находится около литра мутноватой кровянистой жидкости съ плавающими въ ней хлопьями; кишечникъ сильно вздутъ газами. Сердце нѣсколько увеличено, мышца дряблая, тусклая, какъ бы обвареная. Въ желудкѣ около 200 к. с. желтовато-буроватой кашицы съ противнымъ каловымъ запахомъ. Въ содержимомъ, находившемся въ полости брюшины, оказалось нѣсколько кусковъ ленточной глисты (повидимому, широкаго лентеца). Въ серединѣ протяженія тонкихъ кишекъ находится отверстіе, ведущее изъ кишекъ въ брюшную полость, величиной съ двугривенный; въ тонкихъ кишкахъ жидковатое содержимое, слизистая блѣдно-сѣрая, по мѣстамъ на ней замѣтны увеличенныя железки; отверстіе въ кишкѣ оказалось расположеннымъ соотвѣтственно Пейеровой бляшкѣ. Ткань почекъ тусклая, какъ бы вареная.

461. Максимъ *Михайловъ*, 65 л., отст. стат. сов., умеръ 6 окт. 1909.

Вскрытіе 9 окт. 1909. Роста средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Въ брюшной полости оказалось около 400 к. с. буровато-красноватой мутной жидкости съ плавающими въ ней хлопьями. Брюшина, особенно покрывающая тонкія кишки, утолщена, тусклая, покраснѣвшая, покрыта сѣроватыми пленочками. Въ подвздошной кишкѣ на 20 снт. отъ слѣпой кишки имѣется отверстіе величиной въ 15 коп. монету. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ блѣдная, истонченная; края отверстія довольно гладки, ровны; на слизистой тонкихъ кишекъ на мѣстахъ Пейеровыхъ бляшекъ замѣчается нѣкоторая пигментація и истонченіе. Слизистая желудка истончена. Околосердечная сорочка сплошь сращена съ сердцемъ; мышца сердца очень дряблая, глинистаго цвѣта; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій, на клапанахъ аорты имѣются обильныя плотноватыя бляшки, по мѣстамъ объизвествленныя. Селезенка слегка увеличена, капсула ея напряжена. Сосуды основанія мозга склерозированы.

462. Анна *Алексѣева*, 25 л., крест.

Вскрытіе 10 дек. 1909. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Въ брюшной полости оказалось около 300 к. с. буровато-грязноватой гноевидной массы густой, съ отвратительнымъ запахомъ. На задней поверхности матки и Фаллопіевыхъ трубъ рыхлыя грязновато-красноватыя пленки, пропитанныя какъ-бы гноемъ; брюшина нѣсколько утолщена, бѣловато-красноватаго цвѣта. Слизистая влагалища маркая, грязно-краснаго цвѣта, слегка набухла, складки плохо выражены; шейка матки укорочена, наружный зѣвъ ея округлый, свободно пропускаетъ палецъ, матка 12 × 9 снт., мускулатура ея дряблая, тусклая, грязно-сѣроватаго цвѣта; на разрѣзѣ зіяютъ сосуды; толщина передней стѣнки 2,0 снт.; слизистая отсутствуетъ, на задней стѣнкѣ замѣчается округлая шероховатая площадка, величиною въ 3 коп. монету; изъ просвѣта лѣвой Фаллопіевой трубы выдавливаются капельки гноевидной жидкости. Сердце дряблое; мышца глинистаго цвѣта.

Воспаленіе желудочно-кишечнаго канала.

463. Александръ *Михайловъ*, 6 мѣс., скоропостижно умеръ 14 янв. 1900, взятъ изъ Воспит. Дома.

Вскрытіе 24 янв. 1900. Роста 64 снт., слабаго тѣлосложенія, плохого питанія, весь трупъ представляетъ значительную степень исхуданія. Слизистая языка по всей поверхности покрыта обширными бѣловатыми бляшками. Печень значительно увеличена въ объемѣ, ткань ея желтоватаго цвѣта, мягка. Селезенка увеличена вдвое, малокровна, плотна. Стѣнки желудка размягчены и легко рвутся, слизистая блѣдна. Стѣнки кишекъ также легко рвутся. Солитарныя железы и Пейеровы бляшки увеличены на всемъ протяженіи. Почки малокровны.

464. Вѣра *Рейконе (Панкова)*, 5 недѣль. Дѣвочка была отдана на воспитаніе здоровою. 14 окт. 1902 ребенокъ съ утра сталъ плакать, а къ вечеру затихъ и скончался.

Вскрытіе 22 окт. 1902. Ростъ 50,0 снт., вѣсъ 2500,0, крайне истощена. Мышца сердца слегка блѣдновата и дрябла. Въ верхнемъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ замѣчается значительное наполненіе сосудовъ кровью, набухлость слизистой оболочки; въ нижнемъ отдѣлѣ древовидное расширеніе сосудовъ Пейеровыхъ бляшекъ, которыя набухли; набухли также и одиночныя железки толстой кишки. Мозговыя оболочки значительно наполнены кровью.

465. Егоръ *Яковлевъ*, 4 л. 9 мѣс., мѣщ. Отецъ—алкоголикъ. На второмъ году перенесъ корь, осложнившуюся пневмоніей, двухъ лѣтъ—натуральную оспу. Мѣсяца два назадъ начались поносы съ сильными тенезмами, необильные, водянистые, по временамъ лихорадилъ. Дня три назадъ пересталъ ходить, 20 янв. поступилъ въ клинику, 21 янв. 1903 умеръ.

Вскрытіе 23 янв. 1903. Роста 94 снт., слабаго тѣлосложенія, крайне истощенъ. Правое легкое повсюду сращено, а лѣвое въ верхней и отчасти въ нижней долѣ съ грудной клѣткой старыми ложными перепонками. Слизистая желудка утолщена и слегка зерниста. Оба легкія объемисты, не спадаются, на ощупь плотноваты, въ особенности верхушка праваго легкаго; на разрѣзѣ верхней доли праваго легкаго встрѣчается нѣсколько сѣровато-бѣловатыхъ узелковъ, плотныхъ, отъ просяного до коноплянаго зерна и болѣе; бронхіальныя железы значительно увеличены, темно-красны, мягки; въ полости бронховъ находится большое количество блѣдно-желтоватой слизисто-гноевидной жидкости. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ въ нижнемъ отдѣлѣ подвздошной кишки значительно красна, а въ остальныхъ мѣстахъ блѣдна; повсюду она утолщена; одиночныя железки увеличены до

просяного зерна, а также встрѣчается нѣсколько увеличенныхъ Пейеровыхъ бляшекъ; въ толстыхъ кишкахъ слизистая повсюду красна, набухла и покрыта густымъ слоемъ слизи.

466. Александръ *Смордовъ*, 30 л., крест., маляръ. Жизнь велъ довольно нормальную, но часто жаловался на боль въ груди. Скоропостижно умеръ 23 янв. 1903.

Вскрытіе 28 янв. 1903. Средняго роста, слабаго сложенія, средняго питанія. Мышца сердца блѣдновата, съ желтизной; по краямъ двустворчатаго клапана имѣются плотные узелки. Слизистая желудка розоватая съ ясно выраженными возвышеніями железокъ. Въ толстыхъ кишкахъ имѣется довольно обильная слизистая пищевая кашица; слизистая въ верхнемъ отдѣлѣ слегка блѣдновата, въ нижнемъ много расширенныхъ сосудовъ, по вершинамъ складокъ мѣстами имѣются кровоизліянія величиной до чечевичнаго зерна; солитарныя железки умѣренно набухшія; слизистая слѣпой кишки истончена, на ней много древовидно расширенныхъ венъ.

467. Неизвѣстнаго званія младенецъ *мужского* пола, $1^1/_2$ мѣс., найденъ 23 нояб. 1903 на полѣ мертвымъ.

Вскрытіе 26 нояб. 1903. Длина 55 снт., вѣсъ 4030,0 гр., средняго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Желудокъ сильно вздутъ и нѣсколько опущенъ. Слизистая желудка покрыта густымъ слоемъ бѣловатой слизи. Печень объемиста, ткань красновато-мраморнаго цвѣта съ массой желтоватыхъ островковъ, довольно плотная; почки малокровны. Тонкія кишки сверху до низу сильно наполнены густою бѣловатою слизью, которая въ подвздошномъ отдѣлѣ принимаетъ желтоватый оттѣнокъ; слизистая повсюду розоватая съ расширенными кровью сосудами; въ тонкихъ кишкахъ много слизистыхъ желто-зеленоватыхъ каловыхъ массъ.

468. Анна *Смирнова*, 2 мѣс., крест. Дѣвочка все время болѣла, слабая отъ рожденія, хирѣла и умерла 30 нояб. 1903.

Вскрытіе 5 дек. 1903. Длина 54 снт., вѣсъ 2845,0, питанія слабаго. Сердце нѣсколько увеличено, стѣнки желудочковъ утолщены, мышцы блѣдно-красныя. Слизистая желудка покрыта густымъ слоемъ бѣловатой слизи, гладкая, блѣдная. Въ тонкихъ кишкахъ жидкій желтый калъ съ объемистыми кусками свернувшагося и непереварившагося молока; слизистая въ подвздошномъ отдѣлѣ слегка красновата, солитарныя железки выступаютъ въ видѣ маковыхъ зеренъ. Толстыя кишки заключаютъ большое количество бѣловатой густой слизи; слизистая ихъ набухла, слегка красновата.

Заворотъ кишекъ.

469. Алексѣй *Іоновъ*, 18 л., крест., заболѣлъ недѣлю назадъ сильными болями въ животѣ, рвотой, продолжавшейся 4 дня; за все это время не было стула, не отходили газы. Умеръ внезапно при явленіяхъ паралича сердца 1 мая 1901.

Вскрытіе 5 мая 1901. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, слабаго питанія. Брюшина шероховата, покрыта довольно толстымъ слоемъ сѣро-желтоватаго налета; въ полости ея находится громадное количество каловыхъ массъ сѣро-желтоватаго цвѣта, имѣющихъ видъ и консистенцію гороховаго супа; всѣ петли кишекъ сильно вздуты газами и склеены другъ съ другомъ легко рвущимися рыхлыми перепонками, которыя принимаютъ болѣе значительную плотность въ области склеиванья слѣпой кишки и восходящей части толстыхъ кишекъ; въ лѣвомъ подреберьи находится расширенная и вздутая слѣпая кишка съ восходящей частью толстыхъ кишекъ, величина этого вздутія доходитъ до величины дѣтской головки; слѣпая кишка и часть

восходящей имѣетъ удлиненную брыжжейку, вокругъ которой перекручены болѣе, чѣмъ на 360°; мѣсто перекручиванья, корень этого узла находится въ лѣвой подвздошной ямкѣ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ перекрутившаяся кишка, была темно-грязнаго багроваго цвѣта, найдено довольно большое перфораціонное отверстіе, лежащее косвенно поперечно, величиною около 5-коп. монеты, съ неправильно фестончатыми краями, грязно-сѣро-красноватаго цвѣта. Прободное отверстіе находится въ восходящей части на 2 снт. отъ Баугиніевой заслонки; слизистая оболочка этой сильно растянутой полости толстой и слѣпой кишки мѣстами имѣетъ небольшія неглубокія потери вещества, то въ видѣ поверхностныхъ правильной формы изъязвленій, то въ видѣ нарушенія цѣлости, повидимому, отъ растяженія. Брыжжейка S—образной кривизны умѣренной длины и ширины и на серозномъ покровѣ между кольцами кишки имѣются бѣловатыя неправильно звѣздчатыя, но гладкія утолщенія (peritonitis mesenterialis chronica).

470. Николай *Твердуновъ*, 7 л., крест. Утромъ жаловался, что у него болитъ животъ, и была у него рвота, а вечеромъ умеръ, 27 фев. 1902.

Вскрытіе 5 мар. 1902. Роста 121 снт., тѣлосложенія средняго, умѣреннаго питанія. Мошонка значительно отечна. Брюшная полость переполнена мутноватой жидкостью желто-коричневаго цвѣта. Съ правой стороны находится вздутая черно-краснаго цвѣта толстая кишка римскаго S; петля эта подымается изъ правой подвздошной области къ правому подреберью и заворачивается внизъ къ началу слѣпой кишки, гдѣ брыжжейка ненормально удлинена, а также и сама слѣпая кишка имѣетъ отдѣльную длинную брыжжейку; брыжжейка тонкихъ кишекъ въ области нижняго отдѣла подвздошной кишки, перекручена вокругъ своей оси, и значительная часть нижняго отдѣла тонкихъ кишекъ также ущемлена этимъ перекручиваніемъ; брюшина, покрывающая ущемленную часть толстой кишки, шероховатая, мутная, покрытая множествомъ ложныхъ перепонокъ, легко рвущихся и склеивающихъ между собою петли этой кишки. Сердце немного увеличено. Въ подвздошномъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ находится красноватая жидкость въ большомъ количествѣ, слизистая его оболочка темно-красна; одиночныя железы и Пейеровы бляшки повсюду увеличены. Въ ущемленной части толстыхъ кишекъ громадное количество жидкости кофейнаго цвѣта; слизистая оболочка черно-краснаго цвѣта.

471. Григорій *Герасимовъ*, 56 л., крест., чернорабочій. Носилъ доски, часто жаловался на боль въ животѣ, которая послѣ чаю затихла, вечеромъ возобновилась опять, а въ 9 ч. внезапно умеръ, 7 нояб. 1902.

Вскрытіе 12 нояб. 1902. Высокаго роста, средняго сложенія, весьма истощенъ. На нѣкоторыхъ петляхъ кишекъ имѣется рѣзкое покраснѣніе серознаго покрова. У корня брыжжейки имѣется перекручиваніе тонкихъ кишекъ по часовой стрѣлкѣ приблизительно на 270° и ущемленіе острымъ краемъ брыжжейки примѣрно въ области отхожденія верхней брыжжеечной артеріи. Брыжжейка представляется значительно длиннѣе нормальной. Въ брюшной полости около стакана красной мутноватой жидкости. Въ области слѣпой кишки и восходящей ободочной имѣется нѣсколько старыхъ плотныхъ склеекъ, притягивающихъ эти части къ началу поперечной ободочной кишки. Стѣнки тонкихъ кишекъ истончены, и увеличены одиночныя железки; мѣстами на слизистой кое-гдѣ имѣются мелкіе точечные кровоподтеки, особливо въ участкѣ кишки, наиболѣе наполненномъ кровью, вблизи наибольшаго ущемленія. Сердце увеличено, мускулатура въ высшей степени дряблая. Корковый слой почекъ истонченъ, рисунокъ неясный, цвѣтъ почекъ блѣдно-розовый. Стѣнка червеобразнаго отростка утолщена, онъ довольно длинный; на слизистой его довольно много утолщенныхъ фолликуловъ; слизистая и стѣнка слѣпой кишки рѣзко истончены.

472. Викторъ *Петровъ*, 40 л., мѣщ. Лѣтомъ на баркахъ чернорабочій, зимой торговалъ яблоками. Около 4 мѣсяцевъ не пьетъ, раньше выпивалъ сильно. 12 янв. 1903 утромъ почувствовалъ сильную боль въ животѣ, рвало и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 14 янв. 1903. Невысокаго роста, крѣпкаго сложенія, средняго питанія. S-образная кривизна, сильно растянутая газами, оказалась повернутой по направленію часовой стрѣлки болѣе, чѣмъ на 90°; брыжжейка у ея корня узка и при упомянутомъ изгибѣ петли даетъ довольно острый край, на которомъ слегка ущемляется верхняя ножка начала петли. Тонкія кишки весьма замѣтно сокращенныя, спавшіяся, а равно и желудокъ; на серозномъ покровѣ послѣдняго слегка расширены сосуды мелкаго и средняго калибра. Сердце нѣсколько увеличено; правый желудочекъ растянутъ, толщина его стѣнки около 0,2 снт.; мускулатура лѣваго желудочка дрябла, сѣровато-буроватаго цвѣта; на разрѣзахъ мѣстами видны плотные сѣроватые и желтоватые участки; по краю двустворчатаго клапана имѣются плотноватыя утолщенія. Сосуды тонкихъ кишекъ и брыжжейки растянуты кровью; на слизистой толстыхъ кишекъ мѣстами увеличены одиночныя железы, болѣе многочисленныя на S-образной кривизнѣ; на продольномъ разрѣзѣ вдоль всей петли слизистая оболочка оказывается весьма гладкой, блѣдноватой. У корня брыжжейки на внутренней поверхности ея замѣчаются старые плотные тяжи, суживающіе ее и сближающіе ея ножки.

473. Анисимъ *Евстигнѣевъ*, 40 л., крест. Три дня до поступленія въ госпиталь—запоръ, ночью—внезапный приступъ болей въ нижней половинѣ живота. Животъ рѣзко вздутъ, сильно болѣзненъ. 17 янв. 1903 приступлено къ операціи. По вскрытіи брюшины вылилось колоссальное количество кровянистой жидкости съ фекальнымъ запахомъ. По осмотрѣ полости брюшины оказалось: S Romanum колоссально вздута, вся гангренесцирована, повернута нѣсколько разъ около брыжжейки, имѣется какой-то тяжъ, подъ которымъ ущемилась большая часть толстыхъ кишекъ. Во время производства exenterationis больной пересталъ дышать, пульсъ упалъ и больной умеръ.

Вскрытіе 20 янв. 1903. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Брюшина какъ пристѣночная, такъ и покрывающая петли кишекъ, оказалась сильно покраснѣвшею, слегка шероховатой, а на нижнемъ отдѣлѣ подвздошной кишки и на вздутой S-образной кривизнѣ—чернокрасной. Большая часть тонкихъ кишекъ, именно подвздошная на протяженіи 3 метровъ сильно вздута, чернокрасная; брыжжейка этихъ кишекъ нѣсколько разъ перекручена вокругъ своей оси, удлинена, образовавши кругловатое отверстіе съ натянутыми краями; черезъ это отверстіе ущемлена перекрученная вокругъ своей оси брыжжейка S-образной кривизны на протяженіи 40 снт. Сердце 11×13 снт., значительно обложено жиромъ; мышца тусклая, блѣднокрасная съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблая. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ въ ущемленной части чернокраснаго цвѣта, разрыхлена и утолщена; слѣпая кишка и поперечная ободочная сильно вздуты газами. Ущемленная часть S-образной кривизны чернаго цвѣта, сильно растянута и переполнена черно-красной жидкостью; части брыжжейки тонкихъ и толстыхъ кишекъ, участвовавшихъ въ перекручиваніи, утолщены, черно-краснаго цвѣта, переполнены кровью.

474. Николай *Семеновъ*, 29 л., крест., комиссіонеръ у сѣноторговцевъ. Велъ жизнь трезвую, а въ послѣднее время совсѣмъ спился, стали появляться припадки, послѣ же припадковъ сильно потѣлъ и пилъ всегда воду. 12 фев. 1903 проходя по панели, хотѣлъ остановиться, оперся на стѣнку и повалился на панель, черезъ $^1/_4$ часа умеръ.

Вскрытіе 17 февр. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго

питанія. S—образная кривизна толстой кишки помѣщается въ правой подвздошной области, брыжжейка ея значительно удлинена и повернута вокругъ своей оси на 90°, причемъ брыжжейка тонкихъ кишекъ обхватываетъ брыжжейку S—образной кривизны и затягиваетъ въ видѣ узла до полной непроходимости толстой кишки; брюшина повсюду гладкая и прозрачная, безъ ненормальнаго содержимаго. Сердце немного увеличено, обложено толстымъ слоемъ жира; стѣнка лѣваго желудочка утолщена, мышца съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дрябла. Слизистая желудка повсюду красновата, утолщена, зерниста, покрыта густымъ слоемъ слизи. Слизистая тонкихъ кишекъ красновата, а въ подвздошномъ отдѣлѣ заключаетъ пятнистыя мелкія кровоизліянія. Толстыя кишки надъ описаннымъ перекручиваніемъ переполнены кашицеобразнымъ желто-зеленоватымъ каломъ, слизистая ихъ оболочка въ нисходящей части ободочной кишки надъ заворотомъ на большомъ пространствѣ утолщена, темнокраснаго цвѣта со множествомъ довольно большихъ пятнистыхъ кровоизліяній; слѣпая кишка, восходящая часть и поперечная также переполнены такимъ же каломъ, слизистая ихъ оболочка безъ особыхъ измѣненій.

475. *Александра*, $6^1/_2$ мѣс., дочь Антонины *Антонайтисъ*, 23 л. проститутки, находилась на воспитаніи, принесена была обратно, а утромъ 16 окт. 1903 замѣчана была больной, по дорогѣ въ больницу умерла. Ребенокъ былъ на излѣченіи отъ болѣзни съ 29 сент. по 14 окт. 1903.

Вскрытіе 19 окт. 1903. Длина 63 снт., вѣсъ 4520,0 гр., слабаго тѣлосложенія и питанія. Отдѣлъ толстыхъ кишекъ, носящій названіе римскаго *S*, помѣщается въ правой подвздошной области, сильно вздутъ газами, брыжжейка его растянута и перекручена справа на лѣво на 90°; брыжжейка тонкихъ кишекъ обхватываетъ это перекручиваніе довольно плотно; сосуды брыжжейки на мѣстѣ перекручиванія толстыхъ кишекъ сильно расширены кровью. Сердце значительно увеличено; толщина стѣнки лѣваго желудочка значительно увеличена, мышца блѣднокрасная, умѣренной плотности. Брыжжеечные сосуды какъ тонкихъ, такъ и толстыхъ кишекъ сильно расширены кровью; брыжжеечныя железы увеличены до боба, темно-красны, въ разрѣзахъ мягкія. Слизистая тонкихъ кишекъ красновата; толстыхъ—и утолщена.

476. Сигизмундъ *Шнабель*, 55 л., австрійскій подданный. Скоропостижно умеръ въ госпиталѣ 11 дек. 1906.

Вскрытіе 13 дек. 1906. Роста вышесредняго, слабаго сложенія, средняго питанія. Мошонка сильно отечна. Весьма сильно вздуты газами слѣпая, восходящая и поперечная часть толстой кишки, а также верхняя часть *S*—образной кривизны; послѣдняя помѣщается въ правой средней половинѣ живота (mesogastrium), а влѣво отъ нея надъ спавшейся нисходящею частью помѣщается большая часть тонкихъ кишекъ; послѣднія, захлестываясь чрезъ острый край брыжжейки *S*—образной кривизны, имѣютъ болѣе спавшійся, сокращенный видъ и нѣсколько красноваты; что̀ зависитъ отъ расширенія налитыхъ кровью сосудцевъ брюшинной поверхности, разлитого покраснѣнія самой стѣнки и растяженія кровью венозныхъ стволовъ въ самой стѣнкѣ и въ ближайшемъ участкѣ брыжжейки; ниже, ближе къ позвоночнику, въ одномъ мѣстѣ довольно острый брыжжеечный край на ограниченномъ мѣстѣ блѣденъ; этотъ участокъ соотвѣтствуетъ такому же ближайшему участку у корня брыжжейки *S*—образной кривизны. На брюшинномъ покровѣ послѣдней замѣчается расширеніе древовидныхъ сосудцевъ кровью; стѣнка ея, растянутая газами, истончена до просвѣчиванія. Слизистая желудка сѣро-аспиднаго цвѣта, умѣренно - набухшая. Въ нижнемъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ (подвергавшемся ущемленію) содержимое красновато, на слизистой имѣется весьма сильное растяженіе кровью древовидныхъ сосудцевъ. Діафрагма стоитъ высоко до 3-го межреберья справа и до 3-го ребра слѣва. Сердце

немного увеличено, значительно обложено жиромъ, лѣвое венозное кольцо не пропускаетъ двухъ пальцевъ вслѣдствіе утолщенія и сращенія сосѣдственныхъ участковъ двустворчатаго клапана; верхушки сосочковыхъ мышцъ тупы, блѣдны, жестки; стѣнка праваго желудочка истончена до 0,15 снт., проращена сильно жиромъ; мускулатура сердца жестка, буровата; на внутренней оболочкѣ аорты и вдоль вѣнечныхъ сосудовъ имѣются плотноватыя бляшки. Нижній отдѣлъ толстой кишки переполненъ слизью, блѣдноватый. Въ прямой кишкѣ подъ слизистой видно много геморроидальныхъ узловъ, синеватыхъ и болѣе темныхъ, почти черныхъ. Выходная (анальная) часть прямой кишки сужена вслѣдствіе сильнаго пропитыванія грязно-бурой жидкостью окружающей клѣтчатки.

477. Устинья *Старкова*, 27 л., жена писаря, скоропостижно умерла въ госпиталѣ 25 мар. 1907.

Вскрытіе 28 мар. 1907. Невысокаго роста, крѣпкаго сложенія, хорошаго питанія. Нижняя правая часть полости живота занята увеличенною довольно плотною на ощупь маткою, выполняющею вмѣстѣ съ прямой кишкой полость малаго таза. *S*—образная кривизна, колосально растянутая газами, въ видѣ узкой длинной подковы, занимаетъ не только лѣвую часть надпупочной области, но далеко заходитъ и вправо. Большая часть тонкихъ кишекъ, сравнительно мало объемистыхъ, помѣщается вправо и ниже отъ той петли. При раздвиганіи этихъ двухъ отдѣловъ кишечника оказалось, что брыжжеечные края ихъ въ видѣ довольно острыхъ плотныхъ выступающихъ тяжей захлестываютъ у корня другъ за друга и на мѣстѣ соприкосновенія ихъ оба края блѣдны. По расправленіи этого узла, видно слѣдующее: сосуды въ видѣ мелкой, по растянутой кровью сѣти особенно выражены на брюшинномъ покровѣ растянутой петли толстой кишки. Брыжжейка ея старыми бѣлесоватыми склейками и пятнами сужена такъ, что петля кишки имѣетъ видъ не подковы, а какъ бы двустволки. Между этими соединительнотканными перемычками есть нѣсколько мелкихъ сгустковъ крови. Выше мѣста наибольшаго давленія брыжжеекъ на нихъ имѣются также сильно налитые кровью сосудцы. Вены въ стѣнкахъ тонкихъ кишекъ и на брыжжейкѣ ихъ значительно налиты кровью. Клѣтчатка малаго таза оказалась умѣренно - пропитанной кровью. Влагалище въ сводахъ вправо, влѣво и назадъ обнаруживаетъ разрывы, зашитые каждый 4—5 швами, служащіе продолженіемъ многихъ глубокихъ надрывовъ въ толщѣ стѣнки и шейки матки; нигдѣ до брюшины они не доходятъ; слизистая оболочка шейки кистовидно перерождена и между надрывами пропитана кровью. Толщина стѣнки матки доходитъ до 2,5 снт.; мускулатура довольно плотная; на разрѣзахъ въ венахъ видна жидкая кровь; прикрѣпленіе послѣда въ видѣ неровной красной поверхности обнаруживается на задней стѣнкѣ и у дна; оставшаяся часть оболочекъ не одинаково легко всюду отдѣляется. Сердце значительно обложено жиромъ; стѣнка праваго желудочка значительно проращена жиромъ, такъ что мѣстами не превышаетъ 0,15 снт. Корковый слой почекъ слегка желтоватый, рисунокъ и границы слоевъ нѣсколько неясны, разрѣзъ нѣсколько блѣденъ.

Циррозъ печени.

478. Ульяна *Тимофеева*, 55 лѣтъ, крест., служила прислугой. Послѣдній годъ ходила на богомолье въ Соловецкій монастырь. Возвращалась съ большимъ трудомъ, останавливаясь по дорогѣ для отдыха на нѣсколько дней и питаясь милостыней; недѣли 4 назадъ появились отеки на ногахъ и быстро сталъ увеличиваться животъ, который и раньше

былъ увеличенъ у нея, при общемъ исхуданіи; вмѣстѣ съ отеками усилилась одышка и общая слабость. Умерла 24 сен. 1903.

Вскрытіе 26 сен. 1903. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, крайне истощена, значительный отекъ голеней и стопъ. Животъ сильно увеличенный. При вскрытіи брюшной полости въ брюшинѣ оказалось около 7 литровъ слабо желтоватой съ зеленоватымъ оттѣнкомъ мутноватой жидкости; въ ней плаваетъ большое количество зеленовато-бѣловатыхъ рыхлыхъ хлопьевъ; петли тонкихъ кишекъ плаваютъ на поверхности жидкости; брюшина, покрывающая петли кишекъ, слегка шероховата и мутна, а на печени покрыта большимъ количествомъ гноевидныхъ хлопьевъ. Сердце немного увеличено въ поперечномъ размѣрѣ, спереди обложено большимъ количествомъ жира; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,4; мышца бурокраснаго цвѣта, умѣренной плотности, задняя заслонка двустворчатаго клапана утолщена и сморщена, въ толщѣ ея находится плотная известковая бляшка. Верхушка праваго легкаго уплотнена, въ разрѣзахъ бурокраснаго цвѣта, непроходима для воздуха; на плевральной части замѣтны обширные вдавленные бѣловатые рубцы. Печень рѣзко бугристая, капсула мутно-бѣловатая, въ разрѣзахъ также бугристая, сѣровато-глинистаго цвѣта, рѣзко уплотнена; на поверхности разрѣзовъ множество плотныхъ бѣловатыхъ соединительнотканныхъ пучковъ. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ утолщена, снимается съ трудомъ; корковый слой истонченъ, пирамидальный укороченъ, ткань плотна. Стѣнки сосудовъ основанія мозга утолщены.

Воспаленіе почекъ.

479. Анна *Дмитріева*, 55 л., крест., домовая хозяйка. Скоропостижно 3 февр. 1900 умерла. Болѣла 4 мѣсяца, жаловалась на боль въ животѣ.

Вскрытіе 6 февр. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, худощава. Genitalia и ступни ногъ отечны. Сердце умѣренной величины, дряблое, мышца глинистаго цвѣта, легко рвется; на внутренней оболочкѣ аорты множество фиброзныхъ утолщеній. Въ желудкѣ найдено около столовой ложки жидкости бураго, почти чернаго цвѣта, на слизистой оболочкѣ около выхода имѣется язва величиной въ 5 коп. монету съ обильнымъ разращеніемъ грануляцій. Правая почка увеличена до объема головы новорожденнаго ребенка вслѣдствіе растяженія лоханки, переполненной зеленоватымъ густымъ гноемъ; почечная ткань блѣдна, весьма плотна и содержитъ множество вѣтвистыхъ камней. Печень въ разрѣзѣ глинистая съ рѣзкой желтизной.

480. Федосья *Макарова*, 20 л., крест., фабричная. Была въ послѣднихъ дняхъ беременности. Съ трехъ часовъ ночи сдѣлался съ ней припадокъ, трясло ее, билась, хрипѣла, плакала и смѣялась; припадокъ продолжался до 12 час. дня 16 дек. 1900, когда она умерла.

Вскрытіе 18 дек. 1900. Выше средняго роста, крѣпкаго сложенія, питанія хорошаго. Въ области обоихъ голеностопныхъ суставовъ—отекъ. Сердце умѣренной величины, мышца дрябла, глинистаго цвѣта. Въ полости матки найденъ плодъ женскаго пола, вѣсомъ въ 2450 гр., длиною 40,0 снт. Почки замѣтно увеличены, корковый слой ихъ блѣдный, набухшій, пирамидки темнокрасны, особенно у основанія. Печень дряблая, желтовато-глинистаго цвѣта. Вещество мозга весьма блѣдное; содержаніе крови въ мозговыхъ оболочкахъ недостаточное.

481. Александра *Спирова*, 8 л., крест. Съ недѣлю назадъ заболѣла, жаловалась, что ей тяжело дышать, была замѣтна на тѣлѣ опухоль, все ходила, умерла 16 янв. 1901.

Вскрытіе 21 янв. 1901. Роста 114 снт., средняго тѣлосложенія, весьма слабаго питанія. Нижнія и верхнія конечности отечны. Сердце увели-

чёно раза въ $1^1/_2$ на наружной поверхности его находятся бѣловатыя полоски и бляшки, особенно по направленію сосудовъ; стѣнки желудочковъ утолщены, мышца съ желтоватымъ оттѣнкомъ; двустворчатый клапанъ слегка утолщенъ и мутенъ. Почки увеличены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ; корковый слой утолщенъ, красно-вишневаго цвѣта, пирамиды насыщенно-краснаго цвѣта; ткань вообще переполнена кровью. Слизистыя тонкихъ кишекъ слегка красновата; солитарныя железки и Пейеровы бляшки увеличены въ подвздошномъ отдѣлѣ. Въ толстыхъ кишкахъ находится связь, слизистыя красноваты. Брыжеечныя железы увеличены до лѣсного орѣха, довольно плотны, темно-краснаго цвѣта.

482. Татьяна *Николаевская*, 22 л., мѣщ. 9 янв. 1903 родила въ первый разъ 7-мѣсячнаго младенца, во время припадковъ эклампсіи; дома было 10 припадковъ; родильница въ безсознательномъ состояніи; отъ мочи значительное количество бѣлку; въ больницѣ наблюдалось 4 припадка. Умерла 11 янв. 1903.

Вскрытіе 16 янв. 1903. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Нижнія конечности отъ колѣнъ до низу отечны. Сердце $10\times10\times5^1/_2$ снт.; толщина стѣнки праваго желудочка 0,6 снт., а лѣваго—1,8 снт., мышца ихъ тусклая, бѣдно-красна, съ слабо-желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно плотная. Печень съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблая. Корковый слой почекъ утолщенъ, желтоватаго цвѣта, и довольно плотный, пирамидальный слой укорученъ, бѣдно-краснаго цвѣта. Мягкія мозговыя оболочки сильно переполнены кровью.

483. Казиміръ *Рустейко*, 49 л., рабочій Спб. патронажнаго завода. Болѣлъ мѣсяцъ, рвало послѣ каждаго пріема пищи минутъ черезъ 10; рвота эта усиливалась особенно при злоупотребленіи спиртными напитками; кромѣ того были сильныя боли подъ ложечкой. Поносовъ недѣлю совершенно переставъ ѣсть. Общее недомоганіе чувствовалъ уже года 2 назадъ, когда тоже бывали рвоты послѣ ѣды и боли подъ ложечкой. Въ госпиталь привезенъ въ коматозномъ состояніи, съ учащенными хрипящимъ дыханіемъ, не прощупывающимся пульсомъ на radialis. Ригидность затылочныхъ и позвоночныхъ мышцъ, судороги мочится и испражняется подъ себя; моча содержитъ большое количество бѣлку и многочисленные цилиндры.

Сильно пилъ. Умеръ 1 дек. 1904.

Вскрытіе 5 дек. 1904. Средняго роста и сложенія, худощавъ. Твердая мозговая оболочка замѣтно напряжена; при разрѣзѣ ея и извлеченіи мозга изливается большое количество водянистой жидкости, окрашенной кровью. Стѣнки артерій основанія мозга толстоваты. Ткань мозга малокровна. Сердце нѣсколько увеличено, мышца бѣдна, плотнована; подкрылныя заслонки слегка утолщены. Почки немного увеличены, особенно правая, при сниманіи капсулы на ней остаются частицы коркн, оставляя зернистую поверхность; границы слоевъ мѣстами неразличимы, мѣстами корка имѣетъ толщину менѣе 0,5 снт., плотность ткани нѣсколько повышена; цвѣтъ ея въ общемъ бѣдный, желтухи нѣсколько окрашенія, пирамидныя пирамиды нѣсколько укорочены въ разрѣзѣ имѣетъ сальный видъ и гинистое-желтоватый цвѣтъ.

484. Анна *Немекина*, 27 л., жена у.-оф., скоропостижно умерла въ Кл. Воен. Госп. 22 марта 1903.

Вскрытіе 23 мар. 1903. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Кожа окрашена въ довольно рѣзкій желтушный цвѣтъ. При вскрытіи брюшной полости замѣчается увеличенная матка, по объему равная головкѣ новорожденнаго младенца. Желудокъ нѣсколько увеличенъ въ объемѣ, содержитъ 300 к. с. кофейнаго цвѣта жидкости; на слизистой оболочкѣ преимущественно передней стѣнки и на днѣ желудка

видны многочисленныя круглыя, отчасти сливающіяся пятна темно-краснаго и шоколаднаго цвѣта, величиною до серебрянаго пятака, занимающія въ общемъ пространство около ладони. Почки замѣтно увеличены, преимущественно въ толщину, ткань сплошного темно-шоколаднаго цвѣта, корковый слой достигаетъ толщины до 1,0 снт., граница его съ пирамидальными неясна, нѣкоторыя пирамидки очень низки, лоханки замѣтно расширены и слегка окрашены. Кожъ подъ капсулою, такъ и въ толщинѣ самой печени замѣчаются многочисленныя кровоизліянія, придающія органу пятнисто-красный цвѣтъ при общемъ бѣдномъ-желтоватомъ цвѣтѣ печеночной паренхимы. На слизистой кишекъ кое-гдѣ замѣтны въ небольшомъ количествѣ маленькія темно-красныя пятнышки. Матка имѣетъ видъ влагалища 24×15 снт., стѣнка толщиною до 1,0 снт. Въ области лѣваго подсатаго тѣла на границѣ съ зрительнымъ бугромъ найденъ плотно-сидящій кровяной сверткомъ величиною въ лѣсной орѣхъ, въ задненъ рогѣ праваго желудочка—кровяной свертокъ величиной въ бобъ и немного жидкой крови; въ 4-мъ желудочкѣ, въ правомъ углу ромбовидной ямки—кровяной свертокъ величиной въ горошину. При трупѣ доставлено мертвое тѣло ребенка женскаго пола, длиною 52,0 снт., и вѣсомъ 2710,0 гр., правильно развитаго. На головкѣ ребенка, на верхнемъ темени имѣется неправильно-круглое отверстіе, проникающее въ полость черепа, величиною около 4,0 снт.; кости черепа на ощупь обнаруживаютъ многочисленные переломы.

485. Иванъ *Трусовъ*, л. 40—45, швейцаръ. Болѣнь около трехъ лѣтъ. 4 окт. 1908 свалился на панели и по дорогѣ въ больницу умеръ.

Вскрытіе 9 окт. 1908. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Въ области поджевъ отекъ. Сердце 15×14 снт., очень дряблое, сильно обложено жиромъ; мышца плотноватая, на разрѣзѣ имѣетъ шестрый видъ отъ смѣси красновато-бураваго бѣдно-краснаго цвѣта съ бляшки; у верхушки сердца мышечная ткань почти совершенно замѣнена жировой; толщина стѣнки праваго желудочка—около 0,6 снт., лѣваго—около 1,0; на внутренней оболочкѣ сердца, аорты и мышечныхъ артерій находятся плотноватыя бляшки; клапаны сердца мѣстами также покрыты плотноватыми бляшками. Въ желудкѣ около 600 к. с. пищевой смѣси. Сосуды основанія мозга склерозированы. Почки нѣсколько увеличены, капсула снимается съ трудомъ; поверхность почекъ равномѣрно зерниста, корковый слой значительно истоненъ, безъ рѣзкихъ границъ переходитъ въ мозговой, пирамидки укорочены, лоханки сильно обложены жиромъ; вещество почекъ плотное.

Ракъ матки.

486. Марія *Васильева*, 56 л., мѣщ., прачка. Жизнь вела трезвую. Послѣдніи три недѣли никуда не выходила и жаловалась на боль въ животѣ. Умерла 6 нояб. 1902.

Вскрытіе 9 нояб. 1902. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія, крайне истощена. Въ области крестца и лѣваго большого вертела находится рѣзко выраженная краснота, на поверхности которой замѣтны темно-красныя язвенныя поверхности. Кисти рукъ и стопы ногъ отечны. Наружный покровъ сердца мутный, покрытъ бѣловатыми утолщеніями; Наружный покровъ сердца мутный, покрытъ бѣловатыми утолщеніями; мышца буро-красноватаго цвѣта; двустворчатый клапанъ и заслонки аорты мутны и немного утолщены; величина сердца меньше кулака покойной. Въ толщѣ легкихъ прощупывается замѣтное утолщеніе по направленію дыхательныхъ путей. Почки нѣсколько увеличены въ объемѣ; капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый и пирамидальный слой истоненъ, бѣдно-красны, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣется зернистая бѣловатая рубцовая ткань; лоханки расширены и наполнены

бѣловатой гноевидной жидкостью. Петли тонкихъ кишекъ отчасти сращены старыми перепонками съ маткою, которая увеличена до гусинаго яйца и прирощена къ правой створкѣ таза; ткань матки въ разрѣзахъ бѣловато-желтаго цвѣта, хрящевато плотности; у дна имѣется полость съ грецкій орѣхъ съ гладкой внутренней оболочкой, наполненная безцвѣтной прозрачной жидкостью; влагалищная часть матки разрыхлена, буро-краснаго цвѣта, легко рвется, клочковата.

Воспаленіе мозговыхъ оболочекъ.

487. Васильй *Сухов*, 13 л., сынъ швейцара. Три дни больной капризенъ, жалуется на головную боль, которая все усиливалась, t° доходила до 39°, ходилъ въ школу и въ гости. Въ послѣдній день передъ смертью была рвота, 6 фев. 1901.

Вскрытіе 13 фев. 1901. Средняго роста, весьма слабаго сложенія, плохого питанія. Мягкая мозговая оболочка утолщена, сочная; сосуды ея сильно расширены кровью; ткань по всей поверхности мозга и мозжечка представляется пропизанной желтоватымъ жидкимъ мутнымъ выпотѣ, скопляющимся въ особенности по направленію сосудовъ и въ подпаутинныхъ пространствахъ. Ткань мозга полнокровна. Мышца сердца блѣдно-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно плотна.

488. Васильй *Егоров*, 45 л., крест. Жизнь велъ трезвую, постоянно работалъ, но возвратился около 2 ч. домой, чувствуя себя худо, и легъ, и черезъ четыре часа умеръ.

Вскрытіе 26 марта 1902. Выше средняго роста, сложенія крѣпкаго, умѣреннаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, 12,5×11 сит., на поверхности правого желудочка имѣется масса неразмутрованаго вида достигаетъ 0,9 сит., а праваго мѣстами меньше 0,1 сит. и пропитана жиромъ; оба желудочка растянуты; папиллярныя мышцы желтаго цвѣта. Вдоль сосудовъ мягкой мозговой оболочки и въ подпаутинныхъ промежуткахъ имѣются гноевидныя зеленовато-желтыя скопленія; лѣвая Негорній и до foramen jugulare зарящена всѣдствіе организаціи здѣсь имѣющагося тромба; тромбъ на мѣстѣ нагиба пазухи гнойно распался жени 20 коп. монеты здѣсь она покрыта клочковатымъ налетомъ и вязи и грануляціи. Въ полости средняго уха имѣются гнойныя массы.

489. Анна *Мимрофанова*, 1 мѣс. Отдана была на воспитаніе въ деревню, за послѣдніе дни заболѣла и умерла, 4 марта 1903.

Вскрытіе 10 марта 1903. Длина 52½ сит., вѣсъ 3020,0, слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено; стѣнка лѣваго желудочка замѣтно утолщена, мышца блѣднокрасна съ желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно плотна. Мозговая оболочки переполнены кровью. По бокамъ серповиднаго отростка твердой оболочки между нею и мягкой имѣются студневидные красноватые выпоты.

490. Александръ *Харитоновъ*, 28 л., крест., умеръ въ больницѣ 10 окт. 1903.

Вскрытіе 19 окт. 1903. Роста выше средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Сердце слегка увеличено, мышца тусклая, темноватая. Границы почечныхъ слоевъ неясны; корка мѣстами набухши, ткань съ поверхности мозга, въ подпаутинныхъ пространствахъ заключается мутная зеленоватая гнойная жидкость, вытекающая каплями при разрѣзахъ оболочки. Въ желудочкахъ найдено около двухъ столовыхъ ложекъ розовой мутной жидкости. Въ области нижняго червячка замѣчается особенно обильное скопленіе гноя.

491. Марія *Федотова*, 9 лѣтъ, крест. Внезапно заболѣла 9 дек. 1903 сильною головною болью съ рвотою и кашлемъ, черезъ 2 дня потеряла сознаніе, а 13 дек. ночью у нея появились параличи правой руки и ноги и судороги въ лѣвыхъ конечностяхъ; поступила въ клинику 18 дек. въ сопорозномъ состояніи съ клоническими по временамъ судорожными сокращеніями въ лѣвой верхней конечности, стертороднымъ дыханіемъ, слышнымъ на разстояніи, съ t° 40,3; ночью 14 дек. 1903 умерла при нарастающей слабости сердца.

Вскрытіе 16 дек. 1903. Роста 123 сит., слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Твердая мозговая оболочка нѣсколько напряжена, бѣловатаго цвѣта, мягкая мозговая оболочка также сильно напряжена, мозговыя извилины сглажены; мягкая оболочка на всемъ пространствѣ поверхности мозга представляется желтовато-зеленоватой, пропитанной гнойными массами, въ особенности по направленію сосудовъ; съ поверхности мозга она снимается съ большимъ трудомъ, легко рвется; сосудистый наметъ пропитанъ гноевидными массами; мягкая мозговая оболочка, покрывающая основаніе мозга и мозжечка, также съ большими отложеніями желто-зеленоватыхъ гноевидныхъ массъ. Мышца сердца блѣдно-красна съ слабымъ желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно плотна.

492. Иванъ *Смирновъ*, 43 л., крест., скоропостижно умеръ на пристани 11 окт. 1906.

Вскрытіе 14 окт. 1906. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце нѣсколько увеличено, значительно обложено жиромъ; мышца мутная, блѣдная, дряблая, съ слабымъ оттѣнкомъ. Въ верхушкахъ обоихъ легкихъ прощупываются плотные узлы величиною отъ вишни до грецкаго орѣха, ткань ихъ на разрѣзѣ представляется немного выдающейся съ плоскости разрѣза, темнокрасного цвѣта; мѣстами замѣтны небольшіе сфировато-желтоватые узелки. По бороздамъ на мягкой мозговой оболочкѣ во многихъ мѣстахъ замѣчаются сфроватые бугорки величиной съ просяное зерно и меньше. Желудочки мозга слабо растянуты прозрачной желтоватой жидкостью. Сосуды основанія мозга жестковаты.

493. Иванъ *Петровъ*, 19 л., крест., скоропостижно умеръ въ пріемной Клин. госпиталя 3 окт. 1909.

Вскрытіе 6 окт. 1909. Роста выше средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Твердая мозговая оболочка напряжена; извилины мозга уплощены, мягкая мозговая оболочка утолщена, по мѣстамъ пропитана и покрыта желтовато-зеленоватымъ гноемъ. Сердце немного увеличено, мышца дряблая, съ слабымъ оттѣнкомъ.

494. Марія *Казакова*, 3 мѣс. Привезенная матерью съ родины, все время плакала и черезъ часъ умерла, 19 окт. 1909.

Вскрытіе 26 окт. 1909. Длина 63 сит., вѣсъ 4720,0, умѣреннаго питанія. Мягкая мозговая оболочка мутна, утолщена, обильно пропитана зеленоватымъ гноемъ, особенно по ходу сосудовъ. Въ обѣихъ полостяхъ средняго уха находится зеленоватый гной. Сердце дряблое, мышца тусклая, какъ-бы обваренная.

495. Ефимъ *Дубенковъ*, 18 л., крест., чернорабочій. Въ 10 ч. утра явился съ работы, жаловался на головную боль, легъ на кровать и спалъ до 6 ч. вечера, въ 11 ч. опять легъ, въ 3 ч. ночи вдругъ закричалъ, произнося безсвязныя слова, по отправленіи въ больницу, вскорѣ умеръ, 29 окт. 1909.

Вскрытіе 6 нояб. 1909. Роста выше средняго, тѣлосложенія и питанія слабаго. Мышца сердца тусклая, какъ-бы обваренная. Твердая мозго-

говая оболочка напряжена, извилины мозга уплощены, мягкая мозговая оболочка по бороздамъ пропитана желтоватымъ гноемъ.

Инфекціонныя заболѣванія.

Брюшной тифъ.

496. Михей *Федуловъ*, 18 л., крест., скоропостижно умеръ 20 февр. 1900. Около двухъ недѣль жаловался на сильную головную боль и разстройство желудка.

Вскрытіе 26 февр. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, весьма слабаго питанія. Сердце увеличено въ объемѣ, съ большими отложеніями жира снаружи; стѣнки желудочковъ истончены; мышца дрябла, съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Верхняя доля праваго легкаго уплотнена, въ разрѣзѣ имѣетъ ровный печеночный видъ, блѣдно-красноватаго цвѣта, непроходима для воздуха. Селезенка немного увеличена, капсула ея напряжена, ткань дряблая. Корковый слой почекъ утолщенъ, блѣдно-желтоватаго цвѣта. Брыжжеечныя железы увеличены до грецкаго орѣха, уплотнены, темно-красныя цвѣта. Въ подвздошномъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ на протяженіи полутора метра отъ слѣпой кишки солитарныя железы увеличены до конопляного зерна.

497. Николай *Лукьяновъ*, 16 л., крест., вечеромъ сталъ жаловаться на головную боль, озноѣ; два раза была рвота и понось, продолжавшіеся всю ночь; на утро найденъ мертвымъ, 9 марта 1900.

Вскрытіе 13 марта 1900. Выше средняго роста, средняго тѣлосложенія, питанія слабаго. Солитарныя железы на пространствѣ $1^1/_2$ метра выше слѣпой кишки повсюду увеличены до конопляного зерна. Брыжжеечныя железы повсюду увеличены цѣлыми пакетами до лѣсного орѣха; ткань ихъ плотна, въ разрѣзѣ бѣлаго цвѣта. Селезенка немного увеличена, капсула ея напряжена, ткань плотна. Сердце немного увеличено, спереди большія отложенія жира. Корковый слой почекъ увеличенъ, блѣдно-желтоватаго цвѣта, пирамидки темно-красныя.

498. Федоръ *Федотовъ*, 17 л., крест., сапожникъ. Велъ жизнь трезвую. Дней шесть назадъ жаловался на боль въ груди и слабость, но всѣ дни работалъ. Ночью подошелъ къ раковинѣ и упалъ, поднятый въ бессознательномъ состояніи, отправленъ въ больницу и тамъ умеръ, 30 ноября 1900.

Вскрытіе 4 дек. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, худощавъ. Сердце 12×11 сит., съ значительнымъ отложеніемъ жира спереди; мышца съ желтоватымъ оттѣнкомъ; двустворчатый клапанъ на краяхъ утолщенъ и покрытъ красноватыми узелками; клапаны аорты утолщены и мутны. Селезенка увеличена, капсула ея напряжена; довольно плотна. Корковый слой почекъ утолщенъ, съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Въ нижнемъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ на значительномъ пространствѣ солитарныя железы увеличены до просянаго зерна и болѣе; Пейеровы бляшки увеличены и набухли, сѣровато цвѣта; въ толстыхъ кишкахъ солитарныя железы также увеличены до просянаго зерна и болѣе.

499. Германъ *Поссельтъ*, 39 л., герман. подданъ, музыкантъ. Сильно пьянствовалъ. Жаловался на сильную усталость и все кашлялъ; сильно заговаривался, всю ночь не спалъ; 29 сент. 1901 поднятъ въ бессознательномъ состояніи вечеромъ на улицѣ и по дорогѣ въ пріемный покой умеръ.

Вскрытіе 6 окт. 1901. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія; значительная худоба. Сердце 12×11 сит., значительно обложено жиромъ снаружи; толщина стѣнки лѣваго желудочка—2,0 сит., праваго—

0,3; мышца блѣдно-краснаго цвѣта съ желтымъ оттѣнкомъ, дряблая; на внутренней оболочкѣ аорты, въ особенности у вѣнечныхъ артерій, находятся мелкія плотныя бѣловатыя бляшки. Корковый слой почекъ желтоватый съ сальнымъ блескомъ, довольно плотенъ. Ткань мозга отечна, дряблая, малокровна. Слизистая тонкихъ кишекъ повсюду красновата, солитарныя железки и Пейеровы бляшки увеличены повсюду и набухли. Брыжжеечныя железы увеличены до лѣсного орѣха, плотны, блѣдно-краснаго цвѣта.

500. Федоръ *Зинченковъ*, 39 л., крест., ломовой извозчикъ. 24 окт. 1901 во время обѣда въ чайной съ нимъ сдѣлалось дурно и онъ упалъ; до дворъ отдыхалъ; послѣ обѣда нашли его лежащимъ въ роспускать мертвымъ.

Вскрытіе 29 окт. 1901. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 15×15 сит.; значительное отложеніе жира снаружи; стѣнка праваго желудочка утолщенъ въ 0,2 сит., а лѣваго—1,5 сит., мышца съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблая; на внутренней оболочкѣ аорты незначительное количество плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ. Солитарныя железы въ подвздошной увеличены до просянаго зерна и болѣе, одна—значительнаго объема (Пейерова бляшка. Брыжжеечныя железы увеличены отъ горошины до лѣсного орѣха, темно-красны, мягки.

501. Пелагея *Герасимова*, 10 л., крест. 12 января 1902 пришла изъ школы, стала жаловаться на боль въ груди, легла въ постель и вечеромъ умерла, 12 янв. 1902.

Вскрытіе 16 янв. 1902. Роста 126 сит.; средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено; стѣнки желудочковъ толщиною въ нормальную; мышца сѣровато-краснаго цвѣта, довольно дряблая; надъ клапанами аорты находится довольно объемистая бѣловатая бляшки. Ткань легкихъ блѣдно-красна, сильно малокровна, эмфизематозна. Миндаликовидныя железы значительно набухли и набухли. Селезенка значительно плотна и сильно наполнена кровью. Ткань почекъ малокровна, корковый слой утолщенъ, желтоватаго цвѣта, пирамиды укорочены, блѣдно-красны. Сосуды мягкой оболочки сильно переполнены кровью. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ набухла; солитарныя железки повсюду увеличены до просянаго зерна; кромѣ того разбросано множество Пейеровыхъ бляшекъ. Брыжжеечныя железы увеличены до лѣсного орѣха, темно-красны, плотны. Слизистая толстыхъ кишекъ сильно красна, также набухла и солитарныя железки увеличены нѣсколько болѣе просянаго зерна.

502. Василій *Зензинъ*, 30 л., крест. Пріѣхалъ изъ деревни въ городъ на продажу. Жаловался второй день на сильную боль въ груди, по дорогѣ въ больницу умеръ, 17 янв. 1902.

Вскрытіе 22 янв. 1902. Средняго роста и сложенія, умѣреннаго питанія. Содержимое желудка съ окисленъ запахомъ какъ бы бавархаго кваса и легкой примѣси спирта. Сердце нѣсколько увеличено; мышца имѣетъ желтоватый оттѣнокъ; сухожильныя нити и двустворчатый клапанъ нѣсколько утолщены; мускулатура какъ бы свареная, сѣро-красная цвѣта. Лимфатическій аппаратъ миндаликовъ и корня языка сильно набухшій, слизистая сине-красная, много набухшихъ вены; въ углубленій, слизистая сине-красная, много набухшихъ вены; въ миндаликовидныхъ выдавливается много сѣровато-гноевидныхъ массъ. Въ нижнемъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ умѣренная набухлость слизистой оболочки и умѣренное расширеніе сосудовъ, посѣдніе дѣлаются въ направленіи кишку все сильнѣе и сильнѣе, увеличивается количество слизи и гиперплазія лимфатическаго аппарата и Пейеровыхъ бляшекъ, лимфатическихъ железъ; нѣкоторыя лимфатическія железы брыжжейки также увеличены и на разрѣзѣ сѣровато-красны. Въ нижнемъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ содержимое имѣетъ нѣкоторый красновато-буроватый

отёчность; консистенція его рѣзко слизистая, тягучая. Въ тонкихъ кишкахъ имѣется широкій лентечъ.

503. Фаустинъ *Ремневичъ*, 56 л., мѣщ. Часто болѣлъ, страдалъ порокомъ сердца, раньше сильно пилъ. 25 янв. 1902 съ нимъ сдѣлалось дурно, спустя немного сталъ тяжело дышать, произвольно вздорь, вытянулся на кровати и умеръ, 25 янв. 1902.

Вскрытіе 27 янв. 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце $12^1/_2 \times 14^1/_2 \times 6$ сит.; толщина лѣваго желудочка 2,0 сит., праваго—1,0 сит., мышца блѣдно-красноватая; двустворчатый клапанъ утолщенъ, сморщенъ, мутно-бѣлаго цвѣта; клапаны аорты утолщены и сморщены; начало аорты расширено въ видѣ мѣшка, стѣнки котораго утолщены и уплотнены; внутренняя оболочка аорты бугриста, шероховата, покрыта множествомъ твердыхъ известковыхъ бляшекъ; отверстія вѣнечныхъ артерій крайне сужены, стѣнки ихъ утолщены и уплотнены, просѣты зіяютъ. Почки нѣсколько увеличены, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый и пирамидальный слой истончены; ткань сильно плотна съ свѣтлымъ блескомъ. Въ подвздошномъ отдѣлѣ солитарныя железки увеличены до просяного зерна и даже до чечевицы; разбросано множество увеличенныхъ Пейеровыхъ бляшекъ. Сосуды основанія мозга склерозированы.

504. Михаилъ *Звоновъ*, 25 л., крест., дворникъ. Послѣдніе четыре дня былъ серьезно боленъ, ничего не ѣлъ, имѣлъ лихорадку съ припадками и судорогами. Умеръ 4 окт. 1903.

Вскрытіе 8 окт. 1903. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, худощавъ. Мышца сердца блѣдно-красножелтоватая, дряблая. Почки увеличены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ нѣкоторымъ трудомъ, корковый слой слегка утолщенъ, пирамидки укорочены. Въ подвздошномъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ на слизистой нѣсколько красноватыхъ пятенъ круглаго очертанія величиною въ 2 коп. монету, солитарныя железки увеличены до просяного зерна. Брыжжечныя железы увеличены до бобовъ, въ разрѣзахъ красноватыя и мягкія.

505. Анна *Федорова*, 21 г., крест., фабричная. Больна третій день, жаловалась на боль въ животѣ, на фабрику не ходила. Наканунѣ почти ничего не ѣла и большую часть дня проспала, умерла утромъ 10 дек. 1903.

Вскрытіе 12 дек. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце увеличено вдвое, значительно обложено жиромъ; стѣнки его дряблы, мышца съ желтизной, особенно стѣнка праваго желудочка, которая истончена вслѣдствіе прорашенія ея жиромъ. Всѣ брыжжечныя железы сильно увеличены, нѣкоторыя до величины грецкаго орѣха; на разрѣзѣ сочны, красноваты, мозговидны. Весь лимфатическій аппаратъ слизистой тонкихъ кишекъ сильно набухшій, особенно Пейеровыя бляшки, которыя въ нижнемъ отдѣлѣ неспѣшно выполненными кровью дренировидными сосудами, а нѣкоторые отдѣльные лимфатическіе узелки бляшекъ представляютъ запашники въ видѣ поверхностно-толстыхъ кишкахъ сильно набухши, мѣстами почти до чечевичныхъ ватаг; на разрѣзѣ мякоть васкабливается обильно. Мозговыя оболочки значительно наполнены кровью.

506. Николай *Лукоя*, 60 л., крест., торговецъ въ разносъ. Былъ старчески слабъ, часто напивался пьянымъ. Вечеромъ сталъ жаловаться тельное состояніе, отправленный въ пріемный покой, тамъ умеръ 20 янв. 1904.

Вскрытіе 23 янв. 1904. Средняго роста и сложенія, питанія слабаго. Сердце нѣсколько увеличено и значительно обложено жиромъ; мышца

праваго желудочка желтая, мѣстами почти вовсе не сохранилось мышечной ткани; мышца лѣваго желудочка буровата, на разрѣзѣ имѣетъ пестрый желто-бурo-красный цвѣтъ; двустворчатый клапанъ по краямъ нѣсколько сморщенъ. Капсула почекъ снимается легко, ткань съ желтоватымъ оттѣнкомъ, корковый слой истончентъ, пирамидки тупы, укорочены, съ отложеніемъ извести у верхушекъ; мелкія артеріи на разрѣзахъ зіяютъ. Въ тонкихъ кишкахъ имѣется набухлость слизистой оболочки въ верхнемъ отдѣлѣ съ расширеніемъ сосудцевъ по верхнимъ складокъ; ниже—имѣется разрыхленіе слизистой оболочки, набухлость ворсинокъ, увеличеніе одиночныхъ железокъ и Пейеровыхъ бляшекъ; посѣдѣніи мѣстами розоватаго цвѣта; въ нижнемъ отдѣлѣ тонкихъ кишокъ эти измѣненія выражены болѣе рѣзко. Слизистая толстыхъ кишекъ съ аспидными отѣнкомъ; лимфатическій аппаратъ также увеличенъ. Брыжжечныя железы также увеличены, на разрѣзѣ розоваты съ дрезовидными расширеніями сосудцевъ. Сосуды мягкой мозговой оболочки значительно налиты кровью.

507. Гавріилъ *Богдановъ*, 16 л., мѣщ., столяръ. Вина не пилъ, часто жаловался на тошноту, часто бывала рвота послѣ принятія пищи, въ особенности въ послѣдніе время. Нельзя чувствовать себя очень худо, рвало три раза, лихорадило, болѣла голова, съ утра былъ въ безпамятствѣ, по отправленіи въ больницу умеръ, 17 марта 1904.

Вскрытіе 19 марта 1904. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Во всѣхъ полостяхъ сердца довольно много темной жидкой крови; мышца сердца блѣдно-красна, тусклая, слегка желтовата, нашупъ плотна. Селезенка увеличена раза въ $1^1/_2$, капсула ея напряжена, ткань темнокоричневая, съ большимъ количествомъ бѣловатыхъ мякотныхъ элементовъ, фибрилъ. Капсула почекъ снимается легко, ткань темнокрасная, корковый слой утолщенъ вдвое, пирамидки темнѣе окрашены. Въ подвздошной кишкѣ на значительномъ протяженіи выше Баугиніевой заслонки имѣется рѣзкое набухлаие одиночныхъ железокъ и Пейеровыхъ бляшекъ.

508. Василій *Чиликовъ*, 24 л., рядовой. 14 апр. поступилъ въ околодокъ съ жалобами на головную боль и дрожь, t^0 была около 38°. До утра 18-го былъ на ногахъ, когда больного нѣсколько разъ рвало, отправленный въ лазаретъ, послѣ нѣсколькихъ судорожныхъ съ хрипящимъ дыханіемъ, пѣною у рта и общими судорогами, умеръ 19 апр. 1904 въ ночь.

Вскрытіе 21 апр. 1904. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Мозговыя извилины сглажены; боковые желудочки растянуты и переполнены безцвѣтною прозрачною жидкостью; ткань мозга дрябла, влажна. Сердце немного увеличено; мышца блѣдно-красно-коричневатая, дрябла; на внутренней оболочкѣ аорты немного мелкихъ бѣловатыхъ пятенъ бляшекъ. Селезенка увеличена вдвое, капсула ея напряжена. Почки немного увеличены, капсула ихъ снимается легко, корковый слой слегка утолщенъ, красноватожелтый, пирамидки темнокрасны. Въ подвздошной кишкѣ одиночныя железки и Пейеровы бляшки сильно увеличены и рѣзко набухли. Брыжжечныя железы набухли, увеличены до лѣсного орѣха, краснаго цвѣта, въ разрѣзѣ мягки.

509. Яковъ *Проскуряковъ*, на видъ около 20 л., ученикъ 3 кл. артилл. школы. Умеръ 12 янв. 1907.

Вскрытіе 16 янв. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія. Сердце нѣсколько увеличено; мышца дряблозватая, съ желтоватымъ отѣнкомъ, кажъ-бы обварена. Наружная поверхность подвздошной кишки краснобатаго цвѣта; слизистая ея пятнистокрасного цвѣта отъ налитія сосудовъ; на ней замѣтна значительно увеличенныя красноватыя солитарныя железы и Пейеровы бляшки; содержимое ея похоже на горохъ-ковый отваръ. Брыжжечныя железы увеличены, сочны и гиперемиро-

вены. Селезенка значительно увеличена, капсула ея гладкая, напряженная, ткань ея темнокрасного цвѣта съ обильнымъ содержаніемъ мякоти.

510. Екатерина *Канель*, 27 л., жена жандармск. унт.-оф. 21 фев. 1907 якушерка опредѣлила начало выкидыша, высокая t°, неспокойное состояніе; весь день была тошнота и рвота. Ночью t° доходила до 39,7°/₁, была сильная слабость и упадокъ силъ, утромъ 22 фев. 1907 t° понизилась до 37,5°, врачъ нашелъ состояніе больной безнадежнымъ, больная вскорѣ умерла.

Вскрытіе 28 фев. 1907. Невысокаго роста, повидимому, правильнаго тѣлосложенія (подложная тканъ растянута пузырьками гнилостныхъ газовъ). Матка въ общемъ величиною съ небольшой апельсинъ. На лѣвой боковой стѣнкѣ матки нагаллица мало найдено распространенія, а складки на задней стѣнкѣ его значительно сглажены; слизистая оболочка въ глубины маточнаго зѣва выступаетъ въ видѣ бахромчатыхъ зигзаговъ; кромѣ того по всей окружности имѣется рядъ болѣе глубокихъ лучеобразныхъ надрывовъ, по безъ замѣтныхъ кровоизліяній. (Зѣвъ матки допускаетъ введеніе безъ особаго труда указательнаго пальца). Матка мѣритъ съ яичниками 210,0 гр., размѣръ ея—13,5 × 9 сит.; при разрѣзѣ она обнаруживаетъ довольно равномѣрную зернистость, мягкую на ощупь, болѣе выраженную справа и вдоль внутренняго зѣва. Эта зернистость изъ нѣсколькихъ всюду равномѣрной грязноровозатой окраски, она легко удаляется даже мягкими поскабливаніями спинной ножа; на слизистой шейки матки можно различить „пальмовидныя“ складки. Длина шейки 5,0 сит., полость матки—7,0 сит; толщина стѣнки матки на срединѣ—0,9, у дна—0,6; всюду на ощупь мускулатура матки даетъ ощущеніе нѣкоторой дряблости; въ общемъ, блѣдновата. Сердце увеличено; мышца довольно дрябла. Ткань легкихъ на разрѣзахъ всюду умѣренно суховата, довольно блѣдна. Селезенка—13×8 сит., капсула ея напряжена, поверхность по негладкости напоминаетъ кожу апельсина; ваетея мякоть въ изобилии. Пейеровы бляшки, особенно въ нижнемъ отдѣлѣ тонкой кишки, значительно набухши, и въ общемъ ихъ кишка представляется болѣе красноватой. Почки темно-красны съ коричневымъ оттѣнкомъ; рисунокъ и границы слоевъ на разрѣзѣ неразличимы. Вь общемъ кишечникъ съ селезенкою и почками представляется наиболѣе красноватымъ изъ всѣхъ прочихъ органовъ.

511. Павелъ *Тимбековъ*, 18 л., крест., столяръ. Жизнь велъ трезвую, лѣтъ, имѣлъ болѣзненный видъ. 18 дек. 1907 съ утра работалъ, но вскорѣ пришелъ на верстакъ, гдѣ вскорѣ и умеръ.

Вскрытіе 24 дек. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Мышца сердца дрябловата, тусклая, какъ бы обварѣная. Брыжеечныя железы увеличены, сочны, мягковаты, на разрѣзѣ красноваты. Серозный покровъ тонкихъ кишекъ по мѣстамъ представляется нѣсколько тусклымъ, пятнисто-красноватымъ всѣдствіе наличія мелкихъ сосудовъ. Въ тонкихъ кишкахъ находится слизистая жидкость пятнами кала горохового цвѣта; слизистая оболочка ихъ слегка набухла, кишки представляются набухшими, серозно-розоватаго цвѣта; солитарныя железки какъ въ толстыхъ, такъ и въ тонкихъ кишкахъ сильно увеличены. Селезенка увеличена раза въ два, капсула напряжена, ткань темнокрасиаго цвѣта, съ обильнымъ содержаніемъ мякоти. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей, начиная отъ входа въ гортань утолщенной, набухшей, особенно въ области надгортанника и истинныхъ голосовыхъ связокъ, розово-красного цвѣта всѣдствіе наличія мелкихъ сосудовъ, обильно покрытой гноевидной пѣнистой слизью.

512. Луиза *Шрунгъ*, 65 л., мѣщ. Часто жаловалась на болѣзнь живота. Придя съ улицы, зашаталась и даже не могла раздѣться, а лишь сказала, что съ ней что-то дурно и легла на кровать. Утромъ найдена мертвой, 18 дек. 1908.

Вскрытіе 20 фев. 1908. Роста немного выше средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено раза въ 1½, сильно обложено жиромъ; мышца сердца дрябловата, пѣнечныя артеріи жестковаты, на внутренней ихъ оболочкѣ находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки. Сосуды основанія мозга жестковаты и извиты. Кишечникъ вздутъ газами; брыжеечныя железы увеличены, мѣстами до грецкаго орѣха, на разрѣзѣ красноватаго цвѣта, сочны; въ тонкихъ и толстыхъ кишкахъ находится жидковатый калъ, похожій на гороховый супъ; слизистая тонкихъ кишекъ, особенно вблизи мѣста перехода въ толстую, слегка покрасневшая и набухшая; Пейеровы бляшки значительно увеличены и набухшія, съ довольно крутыми краями. Селезенка увеличена раза въ 1½, капсула ея напряжена, ткань дряблая, темнокрасна, съ обильнымъ содержаніемъ мякоти.

Холера (?).

513. Варвара *Хрунова*, 27 л., крест., прислуга. Вечеромъ видѣли ее здоровой и веселой, на утро найдена въ постели мертвой, 25 окт. 1908.

Вскрытіе 30 окт. 1908. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Концы пальцевъ на рукахъ синюшны. Кишечникъ наполненъ жидковатымъ сѣроватаго цвѣта содержимымъ, въ тонкихъ кишкахъ имѣющимъ консистенцію очень жидкой мышицы; серозный покровъ тонкихъ кишекъ слегка красноватаго цвѣта; слизистая въ верхнемъ отдѣлѣ набухла, слегка красновата, въ нижнемъ—блѣдная. Ее утолщенная; Пейеровы бляшки слегка набухли, брыжеечныя железы немного увеличены; въ толстыхъ кишкахъ много бѣловатой жидкости съ плавающими въ ней хлопьями, слизистая—блѣдная. Сердце дряблое; мышца дрябловата, тусклая, сѣрокрасного цвѣта. Селезенка маленькая, капсула ея морщинста. Ткань почекъ тусклоната, сѣрокрасного цвѣта.

Сибирская язва.

514. Иванъ *Егоров*, 54 л., крест., черноробочій. 10 окт. 1906 въ безсознательномъ видѣ доставленъ въ часть, гдѣ черезъ 3—4 часа умеръ, 10 окт. 1906.

Вскрытіе 14 окт. 1906. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія. Твердая мозговая оболочка напряжена, сосуды ея переполнены кровью. Мягкая мозговая оболочка почти на всемъ протяженіи представляется темнокрасною всѣдствіе множества мелкихъ сливающихся кровоизліяній, расположенныхъ преимущественно въ подпаутинныхъ пространствахъ. При разрѣзѣ мягкихъ частей въ области груди мышцы и подкожная клѣтчатка оказались отечными. Въ брюшной полости около литра водянистой красноватой жидкости. Сердце вѣсколько увеличено; объ половины содержатъ значительное количество темной совершенно жидкой крови; стѣнки лѣваго желудочка до 1,5 сит. толщины. На наружной поверхности кишекъ, особенно тонкихъ, замѣчаются пятна темно-фіолетоваго цвѣта. величиною до копѣечной монеты; такихъ пятенъ около 10; на слизистой оболочкѣ, соотвѣтственно этимъ пятнамъ имѣются также пятна темнокрасиаго, почти чернаго цвѣта величиною до 20 коп. монеты. съ поверхностными изпязвленіями въ центрѣ. Селезенка весьма дряблая, въ разрѣзѣ почти черная. Почки слегка увели-

чены, ткань ихъ блѣдная, корка толщиною до 1,0 снт. Въ толщѣ брыжжейки замѣчено кровоизліяніе величиною въ мѣдный пятакъ.

Столбнякъ.

515. Афанасій *Поляковъ*, 28 л., крест., 11 окт. 1904 ударила лошадь въ область носа, сознанія не потерялъ, боль была не особенно сильная, въ аптекѣ наложили повязку, которую затѣмъ мѣнялъ самъ. Ночью на 17-е неожиданно проснулся отъ затрудненности дыханія, свело челюсти, сгибало спину дугой; припадокъ продолжался недолго. Въ клиникѣ у больного наблюдались нѣсколько разъ припадки съ рѣзко выраженнымъ trism'омъ, opisthoton'омъ. Носовыя кости оказались переломанными. Умеръ 18 окт. 1904.

Вскрытіе 19 окт. 1904. Выше средняго роста, средняго сложенія и питанія. Лѣвый уголъ рта немного опущенъ и оттянутъ влѣво, правое верхнее вѣко опущено болѣе лѣваго и кожныя складки около лѣваго глаза выражены рѣзче. Сердце значительно увеличено; во всѣхъ полостяхъ его, но въ особенности въ правыхъ имѣется много темной жидкой съ рыхлыми темными сгустками крови; подъ серознымъ покровомъ сердца мѣстами много точечныхъ кровоизліяній; лѣвое венозное кольцо едва пропускаетъ два пальца; стѣнка праваго желудочка истончена и въ верхушкѣ проращена жиромъ; эндокардій мутный; двустворчатый клапанъ утолщенъ по краю. Селезенка увеличена, капсула ея напряжена, ткань темно-красная, чуть плотновата, съ массой бѣловатыхъ зернышекъ съ манную крупу величиной.

Инфлюэнца.

516. Петръ *Брусничкинъ*, 18 л., крест., сапожникъ. Раньше жаловался на головныя боли, образъ жизни велъ трезвый. 26 окт. 1902 работалъ съ 7 час. утра до 10 ч. вечера, затѣмъ сталъ жаловаться на сильную головную боль, послѣ чего легъ, сталъ стонать и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 1 нояб. 1902. Высокаго роста, средняго сложенія, плохого питанія. Твердая мозговая оболочка блѣдновата, довольно сильно напряжена; извилины уплощены; мягкія оболочки малокровны. Боковые желудочки нѣсколько увеличены въ объемѣ и растянуты значительнымъ количествомъ блѣдной прозрачной жидкости. Въ области Вароліева моста мягкая мозговая оболочка довольно сильно налита кровью. Сердце значительно увеличено и значительно обложено жиромъ; во всѣхъ полостяхъ его содержится довольно много темной жидкой крови; лѣвое венозное отверстіе пропускаетъ 3 пальца; правое сердце растянуто, стѣнки его утолщены, мускулатура блѣдно-желтая; мышца сердца дряблая. Легкія сильно полнокровны, темно-краснаго цвѣта; ткань ихъ мѣстами плотная, и эти участки при погруженіи въ воду оказываются менѣе пловучими; они сѣроваты, на поверхности разрѣза сѣроватыя мѣста болѣе зернисты и содержатъ меньше воздуха. Селезенка сильно набухшая; ткань рыхлая, весьма обильная кровью.

Септицемія.

517. Андрей *Никифоровъ*, 42 л., крест. 15 нояб. 1901 утромъ пришелъ въ больницу пѣшкомъ безъ провожатыхъ и заявилъ дежурному фельдшеру, что живя въ Шлиссельбургѣ и чувствуя себя больнымъ, онъ рѣшилъ отправиться въ СПБ. въ какую-нибудь больницу и пѣшкомъ шелъ до СПБ. Черезъ нѣсколько часовъ въ больницѣ умеръ.

Вскрытіе 20 нояб. 1901. Выше средняго роста, средняго сложенія, слабоватаго питанія. Изъ полости брюха вытекаетъ мутная желтоватая

съ бѣлыми хлопьями жидкость съ противнымъ запахомъ въ обильномъ количествѣ; сальникъ рыхло припаянъ къ петлямъ тонкихъ кишекъ желтоватыми отложеніями фибрина, на немъ много древовидно расширенныхъ сосудовъ и хлопьевъ фибрина; таковой же видъ имѣютъ снаружи и кишки на всемъ своемъ протяженіи. Въ правомъ плевральномъ мѣшкѣ имѣется мутная жидкость съ зеленоватыми гнойными хлопьями, облегающими также поверхность легкаго. Сердце нѣсколько увеличено, на наружномъ листкѣ сорочки есть немного нѣжныхъ фибринныхъ отложеній и небольшое расширеніе сосудовъ, жидкость самой сорочки мутна; сердце во всѣхъ полостяхъ содержитъ много темной съ двуцвѣтными сгустками крови; мускулатура сердца мутновата, мѣстами съ желтизной, дряблая—въ правомъ; правый желудочекъ нѣсколько растянутъ, верхушки папиллярныхъ мышцъ желтоваты и тупы. По большой кривизнѣ и выходной части желудка имѣются многочисленныя мягковатыя бугристыя припухлости, нерѣзко выдающіяся въ просвѣтъ, нѣкоторыя изъ нихъ поверхностно изъязвлены: на разрѣзахъ эти бугры пропитаны древовидными сосудцами, довольно сочны; при микроскопическомъ изслѣдованіи соскоба съ одного изъ бугровъ имѣется значительное количество кругловатыхъ эпителіоидныхъ клѣтокъ, имѣющихъ довольно большое ядро и не особенно рѣзкіе контуры. Слизистая оболочка желудка въ другихъ мѣстахъ нѣсколько набухшая и со значительной массой кровоизліяній; къ задней стѣнкѣ его въ области опухоли особенно тѣсно прилежитъ поджелудочная железа, на разрѣзахъ коей имѣются зеленоватыя гнойныя гнѣзда; ткань ея въ окружности нѣсколько краснѣе и плотнѣе нормы; лимфатическіе узлы вдоль большой кривизны рѣзко увеличены, на разрѣзѣ нѣкоторыхъ видна розоватая сочная ткань. Полость плевры праваго легкаго содержитъ внизу немного гнойной зеленой съ хлопьями жидкости; междудолевыя борозды запаяны зеленоватыми склейками фибрина.

518. Марія *Альбергъ*, 24 л., финл. уроженка. Разрѣшилась отъ бремени 20 янв. и послѣ этого заболѣла какимъ-то тяжелымъ послѣродовымъ заболѣваніемъ, и умерла по дорогѣ въ больницу 27 янв. 1902.

Вскрытіе 29 янв. 1902. Выше средняго роста, слабаго сложенія, средняго питанія. При вскрытіи брюшной полости изъ нея вытекаетъ около $1^1/_2$ фунтовъ съ клочьями зеленоватаго фибрина бурой мутной жидкости. Сосуды брюшины очень расширены; на всѣхъ брюшинныхъ поверхностяхъ стѣнокъ и органовъ имѣются многочисленные плотно-приставшіе зеленоватые хлопья фибрина. Въ желудкѣ около 700 к. с. жидкости. Сердце нѣсколько увеличено, во всѣхъ полостяхъ его находится темная жидкая кровь съ немногими сгустками; мускулатура въ высшей степени дрябла. Брюшинная поверхность матки гладкая; слизистая оболочка негладкая, особенно у дна на задней поверхности, гдѣ имѣются многочисленные неправильной формы куски ткани, приросшіе къ стѣнкѣ, величиною съ бобъ, со сгустками крови; мускулатура стѣнки дряблая; въ широкихъ связкахъ, особенно справа, по ходу лимфатическихъ сосудовъ имѣются жидковатыя гнойныя скопленія.

519. Александръ *Ивановъ*, около 40 л., мѣщ., скоропостижно умеръ въ ночлежномъ домѣ 1 янв. 1907.

Вскрытіе 6 янв. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. На правой голени наложена ватномарлевая повязка, по снятіи которой вся правая голень представляется припухшей, синевато-красноватаго цвѣта; надкожица нѣсколько утолщена, морщиниста, сползаетъ цѣлыми пластами, оставляя влажную блестящую грязновато-красноватую поверхность. На разрѣзѣ подкожная клѣтчатка сѣровато-красноватаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ; съ плоскости разрѣза выдавливается грязноватая гноевидная жидкость. Бедреныя железы на правой конечности значительно увеличены; на разрѣзѣ онѣ сочны, полнокровны,

мѣстами въ нихъ замѣтны небольшія подости, выполненныя густою гноевидною жидкостью. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблаго, во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь съ рыхлыми темнокрасными сгустками; мышца сердца тусклая, какъ-бы обваренная, сѣрватаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Селезенка значительно увеличена, капсула напряжена, ткань темнокрасная, почти чернаго цвѣта, съ обильнымъ содержаніемъ мякоти. Сосуды основанія мозга жестковаты, слегка извиты.

Осна.

520. Вѣра *Воронова*, 30 л., дочь д. ст. сов., умерла въ Клин. Воен. Госп. 30 марта 1908.

Вскрытіе 2 апр. 1908. Невысокаго роста, нѣжнаго сложенія, средняго питанія. На покровахъ шеи, груди, особенно спины и бедеръ, а также на живот и въ меньшей степени на лицѣ, кистяхъ и стопахъ имѣется обильная, видимо, высыпь, отчасти приподымающая поверхностный слой кожи въ видѣ слабосѣроватыхъ округлыхъ величиною около чечевицы возвышеній; въ другихъ мѣстахъ послѣдніе представляются или сплошь темнокрасными какъ бы кровоподтеками или же въ видѣ небольшого синеватаго пятнышка въ центрахъ этихъ возвышеній. На покровахъ праваго предплечія усмотрѣно, что нѣкоторыя возвышенія въ центрѣ немного вгнуты. Изъ влагалища нѣсколько выступаетъ пахучій темнокрасный сгустокъ крови. Сердце нѣсколько увеличено; въ предсердіяхъ и правомъ желудочкѣ имѣются желтокрасноватые сгустки и немного крови; лѣвый желудочекъ пустъ, сокращенъ; мускулатура сердца бѣдноватая, какъ бы сварена, нѣсколько дряблая; подъ эндокардіемъ имѣются кровоизліянія съ чечевицу величиною только въ лѣвомъ желудочкѣ. Селезенка напряжена, не морщинится, бѣдноватаго цвѣта, малокровна; мякоть выскабливается умѣренно. Почки увеличены въ объемѣ; корковый слой утолщенъ, въ немъ мѣстами видны мелкія кровоизліянія, капсула снимается съ трудомъ; на слизистой лоханокъ имѣются мелкія кровоизліянія. Въ полости влагалища помѣщается довольно объемистый сгустокъ крови; тоже—и въ полости матки и шейки ея. Наружный зѣвъ овальной формы, легко допускаетъ введеніе конца мизинца и не вызываетъ ощущенія значительной плотности. Матка 9,5 снт., утолщена, стѣнка ея мягче обычнаго на ощупь; пальмовидныя складки отчетливо выражены, внутренняя поверхность матки гладкая. Въ правой верхушкѣ легкихъ имѣется рубцовоизмѣнутое сморщиваніе и уплотненіе ткани, на разрѣзѣ тутъ попадаются плотные, отчасти омѣлѣвшіе узелки. Вдоль по пищеводу на слизистой, вездѣ бѣдной, попадаются округлополосатыя кровоизліянія въ 0,4×0,8 снт.; таковыя же и болѣе крупныя замѣчаются и на кожныхъ головныхъ лоскутахъ снутри. Мягкая мозговая оболочка содержитъ много крови. Мозгъ бѣдноватый.

Скарлатина.

521. Вильмъ *Брестенде*, 8 л., великобр. поддан. Въ продолженіе трехъ дней скончались два брата, проболѣвъ первый 3 часа, а второй около 12 час. Послѣдній 17 фев. 1908 вечеромъ найденъ былъ безъ сознанія, сильно мечущимся, съ сильно расширенными не реагирующими на свѣтъ зрачками. Была рвота, t° 40.

Вскрытіе 21 фев. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце дрябловатое, подость его растянута обильными темнокрасными кровянными сгустками, мышца дрябловатая, тусклая, сѣрокрасноватаго цвѣта. Зѣвъ нѣсколько покраснѣвшій; миндалевидныя железы

увеличены, съ плоскости ихъ разрѣза выдавливается гноевидная жидкость. Шейныя железы, брыжеечныя, Пейеровы бляшки и солитарныя железки увеличены, сочны. Изъ перерѣзанныхъ бронховъ выдавливаются гноевидныя капельки. Селезенка немного увеличена. Почки слегка увеличены, капсула ихъ напряжена, ткань тусклая, сѣро-краснаго цвѣта, корковый слой слегка утолщенъ.

Дифтерія.

522. Марея *Иванова*, 9 л., мѣщ. 4 дек. возвратившись изъ училища, стала жаловаться на головную боль, нѣсколько разъ ее рвало, появился сильный жаръ и бредъ. 6 дек. 1901 умерла.

Вскрытіе 10 дек. 1901. Роста 124 снт., слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Въ пазухахъ твердой мозговой оболочки находится большое количество крови съ рыхлыми сгустками, мягкая оболочка утолщена, трудно снимается съ поверхности мозга. Сердце 10×8 снт., правая половина переполнена кровью со сгустками, въ лѣвой—немного сгустковъ; стѣнка праваго желудочка—0,3 снт., лѣваго—0,8; мышцы ихъ блѣдно-краснаго-желтоваты. Легкія эмфизематозны. Миндалевидныя железы съ обѣихъ сторонъ увеличены до волошскаго орѣха, снаружи покрыты толстыми сѣроватыми пленками, трудно отдѣляющимися; сама ткань железъ въ центральной части снаружи представляется сѣро-красной клочковатой, легко отпадающей въ видѣ кусочковъ, весьма рыхлыхъ, ткань железъ также рыхлая, темно-красная.

523. Николай *Иванов*, 35 л., крест., рабочій на джутовой фабрикѣ. 2 дня болѣлъ въ горлѣ, правая сторона шеи была опухши. Жизнь вель трезвую, водку пилъ умѣренно; умеръ 17 янв. 1902.

Вскрытіе 19 янв. 1902. Средняго роста, умѣреннаго сложенія, худощавъ. При разрѣзѣ мягкихъ частей на передней поверхности шеи кожно выступаетъ отечное состояніе клѣтчатки, простирающееся до области ключицъ; болѣе глубокія части по обѣимъ сторонамъ гортани и въ окружности пищевода пропитаны гноемъ. Слизистая оболочка гортани покрыта сѣроватымъ плотно сидящимъ налетомъ; миндалины увеличены приблизительно въ 2—3 раза, поверхностно изъязвлены; надгортанникъ сочный, имѣетъ видъ ужаго желоба, на верхушкѣ изъязвленъ, аспидиаго цвѣта; слизистая оболочка гортани, включая голосовыя связки, покрыта сѣрымъ плотно сидящимъ налетомъ, сильно отечна. Селезенка увеличена вдвое.

524. Иванъ *Данилов*, 12 л., крест., заболѣлъ три дня назадъ. Часто кашлялъ, жаловался на головную боль, въ груди; считая теперь это за простой насморокъ, которое скоро пройдетъ, къ врачу не обращались. Умеръ 20 окт. 1907.

Вскрытіе 25 окт. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце дрябловатое; во всѣхъ его полостяхъ находится темная кровь съ обильными довольно плотными сгустками; мышца сердца дряблая, тусклая, какъ-бы обваренная. Мягкое небо, язычекъ и миндалевидныя железы покрыты обильнымъ сѣровато-грязноватымъ съ трудомъ снимающимся налетомъ. Миндалевидныя железы увеличены, на разрѣзѣ сочны, красноватаго цвѣта, мѣстами при надавливаніи на поверхности разрѣза появляются капельки гноя. Входъ въ гортань представляется значительно суженнымъ, такъ какъ слизистая оболочка утолщена, покрыта грязно-сѣроватымъ съ трудомъ снимающимся налетомъ, который доходитъ почти до истинныхъ голосовыхъ связокъ; послѣднія нѣсколько утолщены, какъ-бы набухли. Въ желудкѣ оказался круглый глистъ (аскарида). Селезенка слегка увеличена, капсула ея гладкая, ткань дряблая, съ обильнымъ содержаніемъ мякоти. Ткань по-

чекъ тусклая, какъ-бы обвареная. Въ тонкихъ кишкахъ оказались двѣ аскариды.

525. Екатерина *Принцева*, 10 л., съ 3 нояб. жаловалась на боль въ горлѣ и головную боль, причемъ съ лѣвой стороны шеи были опухшія железы; дѣвочка все время ходила, а вечеромъ 6 нояб. 1907 умерла.

Вскрытіе 10 нояб. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, во всѣхъ его полостяхъ находится много темнокрасныхъ сгустковъ и сѣроватыхъ плотноватыхъ свертковъ; мышца сердца сѣровато-краснаго цвѣта, тусклая, какъ-бы обвареная. На лѣвой миндалевидной железѣ находится сѣроватый налетъ, трудно соскабливающійся, повидимому, плотно соединенный съ тканью железы, послѣдняя сочна, на разрѣзѣ сѣровато-розоватаго цвѣта. Надгортанно-черпаловидныя связки утолщены и сочны. Лимфатическія шейныя железы увеличены, сочны, на разрѣзѣ розоватаго цвѣта. Железа, расположенная вблизи лѣваго миндалика, значительно увеличена, съ плоскости разрѣза стекаетъ много гноевидной жидкости. Изъ перерѣзанныхъ бронховъ выдавливается пѣнистая слизистая гноевидная масса. Селезенка слегка увеличена, капсула гладка, ткань ея красноватаго цвѣта съ фіолетовымъ оттѣнкомъ.

526. Николай *Константиновъ*, 24 л., мѣщ., переплетчикъ. Съ 29 сен. жаловался на боль горла. Скоропостижно умеръ 2 окт. 1908.

Вскрытіе 6 окт. 1908. Роста ниже средняго, довольно слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце дрябловато, во всѣхъ его полостяхъ находится довольно много темной крови съ рыхлыми темнокрасными сгустками; мышца тусклая, какъ-бы обвареная, сѣро-краснаго цвѣта. Обѣ миндалины и отчасти мягкое небо покрыты грязно-сѣроватымъ трудно снимающимся налетомъ; надгортанникъ представляется утолщеннымъ. Слизистая дыхательныхъ путей, начиная отъ надгортанника и кончая крупными бронхами, нѣсколько утолщена, набухшая, слегка покраснѣвшая, покрыта довольно плотными легко снимающимися грязновато-сѣроватыми пленками. Входъ въ гортань сильно суженъ. Подчелюстныя железы увеличены, сочны, красноваты. Селезенка увеличена, ткань ея темнокрасна, съ обильнымъ содержаніемъ мякоти. Почки и печень слегка увеличены, ткань ихъ дрябловата, тусклая, какъ-бы обвареная.

Болѣзни крови и обмѣна, и др.

Гнойное воспаленіе средняго уха.

527. Михаилъ, сынъ крест. Настасьи *Виноградовой*, 2 мѣс. Умеръ 3 янв. 1907.

Вскрытіе 10 янв. 1907. Длина тѣла 53 снт., вѣсъ 2660 гр., очень истощенъ, лицо имѣетъ старческій видъ. Сосуды мягкой мозговой оболочки наполнены кровью вплоть до мельчайшихъ развѣтвленій. Въ обѣихъ барабанныхъ полостяхъ находится желтоватый довольно густой гной. Сердце дрябловато; во всѣхъ его полостяхъ немного темной крови съ рыхлыми темнокрасными сгустками. Слои почекъ различимы съ трудомъ. Изъ перерѣзанныхъ бронховъ выдавливается немного гноевидной слизистой жидкости.

Рахитъ.

528. Степанъ *Вороновъ*, 10 мѣс., крест. Въ теченіе двухъ недѣль у ребенка часто повторяются приступы одышки, какъ-бы останавливается дыханіе. На костяхъ черепа явленія краніомаляціи; четкообразныя

вздутія реберъ. Принятый въ больницу, во время припадка спазма голосовой щели умеръ 14 нояб. 1901.

Вскрытіе 16 нояб. 1901. Длина тѣла 63 снт., вѣсъ 5850 гр. Сердце значительно больше кулачка покойнаго; правый желудочекъ представляется вялымъ, а лѣвый сокращеннымъ, во всѣхъ полостяхъ имѣется темная жидкая кровь; правый желудочекъ нѣсколько растянутъ, мышца его блѣдновата; по краю двустворчатаго клапана имѣются сѣровато-розоватыя полупрозрачныя величиною отъ просяного зерна до коноплянаго зернышки и утолщенія; эндокардій всѣхъ отдѣловъ, особенно предсердіи, бѣлесоватъ, но гладкій; верхушки папиллярныхъ мышцъ двустворки туповаты. Легкія полнокровны; въ крупныхъ бронхахъ много пѣнистой бѣловатой слизи. При микроскопическомъ изслѣдованіи содержимаго крупныхъ бронховъ замѣчается мѣстами много жировыхъ капель, изъ мелкихъ бронховъ этого не получилось. Слизистая желудка умѣренно-набухшая, красновата; въ содержимомъ желудка подъ микроскопомъ масса жировыхъ капель. Печень сильно полнокровна. Слизистая тонкихъ кишекъ мѣстами сильно набухшая, на ней замѣчается увеличеніе обильныхъ солитарныхъ железокъ и Пейеровыхъ бляшекъ. Лимфатическіе сосуды брыжжейки сильно увеличены, сочны, мѣстами красноваты.

529. Евгенія *Васильева*, 8 мѣс., крест. 2 окт. 1902 днемъ играла на полу, съ ней сдѣлалось дурно, повидимому, родимчикъ, приглашенный врачъ засталъ дѣвочку уже мертвой.

Вскрытіе 4 окт. 1902. Роста 63 снт., правильнаго сложенія, хорошаго питанія. Большой родничекъ нѣсколько запавшій. Кончикъ языка слегка ущемленъ между десневыми краями. На мѣстѣ перехода реберъ въ подбедерные хрящи имѣются четкообразныя вздутія. Во всѣхъ полостяхъ сердца имѣется темная жидкая кровь. Мускулатура сердца блѣдновата и мутновата, нѣсколько дрябла. Легкія довольно объемисты; на поверхности разрѣзовъ при надавливаніи выступаютъ комочки бѣловатой слизистой массы изъ мельчайшихъ отверстій дыхательныхъ трубокъ; слизистая крупныхъ бронховъ набухшая, блѣдноватая, содержитъ много слизи. На плевральной поверхности легкихъ много весьма мелкихъ точечныхъ кровоизліяній. Слизистая желудка покрыта массой бѣловатыхъ величиною съ просяное зерно бугорковъ, нѣкоторые изъ нихъ съ углубленнымъ распадомъ центромъ, межъ ними слизистая гладка, а стѣнка истончена. Такія же измѣненія въ тонкихъ и толстыхъ кишкахъ. Печень при разрѣзѣ хруститъ, блѣдновата. На разрѣзѣ селезенки много сѣроватыхъ зернышекъ. Лимфатическія железы брыжжейки рѣзко увеличены, нѣкоторыя до величины малой сливы, на разрѣзѣ блѣдно-сѣро-краснаго цвѣта. Мозговыя оболочки значительно наполнены кровью.

530. Павелъ *Николаевъ*, 1 г. 8 мѣс., крест. Переведенъ въ клинику изъ больницы очень вялымъ, со слабымъ пульсомъ; умеръ 21 янв. 1903.

Вскрытіе 24 янв. 1903. Длина—76 снт., слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Мошонка слегка отечна, нижнія части голеней и стопы отечны. Грудь бочкообразная, сильно-расширенная въ нижней части; съ обѣихъ сторонъ на границахъ костныхъ частей съ хрящевыми на ребрахъ выступаютъ четкообразныя утолщенія. Сердце величиною въ 2 кулачка покойнаго, правая его половина растянута темною жидкою кровью, въ лѣвой—крови немного; мышцы сердцы блѣдно-краснаго цвѣта, довольно плотны, стѣнки желудочковъ утолщены. Слизистая желудка блѣдна, зерниста, утолщена. Вилочковая железа увеличена въ объемѣ, уплотнена, вѣсомъ въ 25,0; въ разрѣзѣ представляется сѣровато желтоватой и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣетъ фокусы творожистыхъ массъ. Легкія сильно отечны; бронхіальныя железы рѣзко увеличены и уплотнены, въ разрѣзахъ сѣровато-желтоватаго

цвѣта. Корковый слой почекъ утолщенъ. Легкія, селезенка, печень, мозговыя оболочки умѣренно наполнены кровью. Ткань мозга сильно отечна.

Эклампсія.

531. Александръ *Кяянъ*, крест., 3 недѣль. Умеръ въ судорогахъ на рукахъ у матери.

Вскрытіе 28 нояб. 1900. Длиною 54 снт., вѣсомъ 3200 гр., слабаго тѣлосложенія, кожа собирается въ складки, долго не исчезающія. Сосуды твердой и мягкой мозговыхъ оболочекъ значительно наполнены кровью; въ пазухахъ твердой мозговой оболочки заключается кровь съ рыхлыми сгустками; всѣ полости сердца наполнены темною кровью съ рыхлыми сгустками; какъ на передней, такъ въ особенности на задней находится значительное количество свѣтло-красныхъ и темно-красныхъ поверхностныхъ пятнышекъ величиною отъ маковаго зерна до просянаго, а на задней поверхности до горошины; такія же пятна находятся на наружной поверхности начала аорты. На наружныхъ поверхностяхъ легкихъ подъ плеврой и въ бороздкахъ замѣчаются рѣзко ограниченныя темно- и свѣтлокрасныя пятна отъ маковаго до просянаго зерна.

Лейкемія.

532. Сильвестръ *Семеновъ*, 15 л., крест. Умеръ въ госпиталѣ 27 нояб. 1906.

Вскрытіе 29 нояб. 1906. Высокаго роста, слабаго сложенія, подкожный жирный слой почти отсутствуетъ. Голени и стопы отечны. Между петлями кишекъ и сальникомъ, а также въ маломъ тазу имѣется обильный красно-буроватый кровянистый выпотъ, съ блѣдными, красноватыми, легко растирающимися между пальцами пленками, въ количествѣ около 1500 ксм. Въ полости сердечной сорочки имѣется около 3 столовыхъ ложекъ блѣдной прозрачной жидкости. Сердце величиной, по крайней мѣрѣ, въ 5 кулаковъ покойнаго; всѣ полости его сильно растянуты блѣдно-красными и блѣдными сгустками крови; стѣнка праваго желудочка истончена, особенно у верхушки до 0,15—0,10 снт.; стѣнки блѣдны. Въ обѣихъ плевральныхъ полостяхъ имѣется кровянистая жидкость, нѣсколько болѣе мутная слѣва; жидкости около 30—40 к. с.; слѣва въ ней попадаются бѣловатые свертки фибрина; таковые же имѣются на плевральной поверхности лѣваго легкаго повсюду. На части внутренней поверхности сердечной оболочки, соотвѣтствующей языкообразной долѣ лѣваго легкаго, обнаруживается древовидное расширеніе налитыхъ кровью мельчайшихъ сосудовъ и группы точечныхъ кровоизліяній. Съ поверхности лѣваго легкаго, желтоватой, неровной, соскабливаются слои фибрина и тогда обнажается блестящая гладкая поверхность плевры; части нижней доли лѣваго легкаго на разрѣзѣ болѣе красноваты, менѣе проходимы для воздуха, отдѣльные куски его тонутъ; съ разрѣза здѣсь соскабливается красноватая, блѣдная, похожая на селезеночную мякоть масса. Въ тонкихъ кишкахъ мѣстами скопленія аскаридъ. Селезенка выполняетъ лѣвую половину живота; она плотна, поверхность ея гладка, мѣстами съ бѣлыми пятнами, болѣе плотными на разрѣзѣ; вѣсъ селезенки достигаетъ 3550,0 гр.; на разрѣзѣ она пестровата, плотна, не имѣетъ восковиднаго блеска; мякоть не выскабливается, видны разрѣзы утолщенныхъ трабекулъ; размѣры ея 36×20×8 снт. Печень также весьма увеличена, вѣсъ ея 4000,0 гр., а размѣры 35×28×8 снт.; на разрѣзѣ границы долекъ не совсѣмъ ясны, но мѣстами видны центры долекъ красноватые и съ расширенными венками, а периферія ихъ желтовата; въ общемъ цвѣтъ ткани желтовато-глинистый. Корко-

вый слой почекъ (12 × 13) мѣстами слегка истонченъ, блѣдноватый, нѣсколько плотнѣе нормы. Въ пазухахъ твердой оболочки и въ венахъ большого мозга имѣются бѣлые тромбы и сгустки на значительныхъ протяженіяхъ; они легко выдавливаются въ видѣ бѣловатыхъ червовидныхъ массъ. Бедреныя железы на обѣихъ конечностяхъ увеличены; на разрѣзахъ въ центрѣ ихъ видно развитіе соединительной ткани, а корковая часть, утолщенная и увеличенная, блѣдновата; нѣсколько увеличенныхъ лимфатическихъ железокъ имѣется въ подмышечныхъ впадинахъ. Правая бедреная кость была распилена по длинѣ: костный мозгъ имѣетъ гноевидный характеръ; при микроскопическомъ изслѣдованіи частицы мозга, взятаго изъ бедра, видно много кругловатыхъ элементовъ, похожихъ на бѣлыя кровяныя тѣльца. При микроскопированіи частицы кровяного сгустка изъ мозговой вены обнаруживается, что онъ состоитъ изъ бѣлыхъ кровяныхъ тѣлецъ. Въ корковомъ слоѣ почекъ мѣстами на разрѣзѣ видны бѣловатые круглые участки не болѣе булавочной головки (лимфома).

Пятнистая болѣзнь (purpura haemorrhagica).

533. Ольга *Демидова*, 12 л., крест. Часто страдала лихорадками, болѣла корью, годъ назадъ тяжелымъ тифомъ безъ осложненій. Заболѣла вдругъ 6 нояб.; головная боль, бредъ, жаръ, рвота, боли въ животѣ, частые позывы на низъ, запоръ. Кожа съ синеватымъ оттѣнкомъ; на твердомъ небѣ также небольшія синеватыя кровоизліянія. Умерла 10 нояб. 1901.

Вскрытіе 13 нояб. 1901. Средняго роста, умѣреннаго питанія. Сердце 10×10 снт., значительно обложено жиромъ спереди; правая его половина и лѣвое предсердіе переполнены кровью съ плотными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,2 снт., праваго—0,2. Въ полости лѣвой плевры находится 100 к. с. красноватой жидкости, слегка мутной. Подъ легочною плевою на лѣвомъ легкомъ повсюду разбросано множество темно-красныхъ пятнышекъ, рѣзко отграниченныхъ, отъ булавочной головки до боба; легочная плева на этомъ легкомъ во многихъ мѣстахъ шероховата; на слизистой оболочкѣ твердаго и мягкаго неба нѣсколько такихъ же пятенъ до просянаго зерна. Печень, селезенка, почки, слизистая оболочка дыхательныхъ путей, губчатое вещество костей черепа, пазухи твердой и сосуды мягкой мозговой оболочки переполнены кровью. Брыжжеечныя железы увеличены до боба. Селезенка 17,5 × 10 × 3 снт., капсула ея напряжена, ткань темно-вишневаго цвѣта.

Истощеніе.

534. Василій *Пигаревъ*, 54 л., крест., сапожникъ. Нѣсколько лѣтъ страдалъ язвой правой голени. Послѣдіе 4 мѣсяца не выходилъ изъ дому, лежалъ. Въ квартирѣ два мѣсяца былъ невыносимый холодъ, такъ какъ хозяинъ сломалъ плиту, выживая за неплатежъ. Скоропостижно умеръ 24 янв. 1904.

Вскрытіе 27 янв. 1904. Трупъ крайне истощенный. Лимфатическія железы праваго бедра выступаютъ въ видѣ увеличеннаго пакета, величиною съ куриное яйцо; правый колѣнный суставъ въ состояніи средняго сгибанія; омертвѣніе и отсутствіе большей части покрововъ голени; большеберцовая кость, имѣющая большой изъянъ желобоватой формы въ двухъ верхнихъ третяхъ, прикрыта вверху блѣдно-зелеными распадающимися грануляціями, въ нижней трети своей совершенно обнажена отъ надкостницы и покрыта бурымъ распадомъ; мышцы и фасціи голени обнажены, бурозеленаго цвѣта, въ состояніи распада. Под-

вижность праваго голеностопнаго сустава весьма ограничена; покровы на уровнѣ сустава нѣсколько опухши и красны, цвѣтъ ихъ кверху переходитъ въ зеленый; покровы стопы блѣдны, грязны. Форма лѣваго колѣна значительно измѣнена; покровы на передней сторонѣ его мозолисты, грязны; подвижность этого сустава весьма ограничена, а снутри имѣются блѣдные втянутые и приращенные къ кости рубцы. Мягкія части на пальцахъ всѣхъ конечностей синевато-грязно-багроваго цвѣта. Сердце имѣетъ молочныя пятна на наружной оболочкѣ; въ полостяхъ сердца имѣется немного блѣдноватой жидкой крови и двухцвѣтныхъ сгустковъ; мускулатура сердца дрябла, блѣдна, желтовата; лѣвое венозное кольцо пропускаетъ съ нѣкоторымъ усиліемъ два пальца; двустворчатый клапанъ по краю нѣсколько сморщенъ. Слизистая желудка блѣдна, зерниста, обложена слизью. Поверхность печени имѣетъ нѣсколько восковидный отблескъ, ткань съ желтизной; рѣжется съ хрустомъ. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой мѣстами истонченъ до 0,3 снт., ткань желтовата и съ восковиднымъ отблескомъ; пирамидки неправильно сморщены, окололоханочный жиръ разросся. Слизистая тонкихъ кишекъ истончена, малокровна. Ткань легкихъ суха, малокровна. Въ пазухахъ твердой мозговой оболочки мало крови; сосуды мягкой налиты кровью. Бедреныя железы правой стороны на разрѣзѣ блѣдно-розовы, жестковаты.

535. Александра *Миллеръ*, 60 л., дочь д. ст. сов., умерла 12 февр. 1908.

Вскрытіе 15 февр. 1908. Невысокаго роста, слабаго тѣлосложенія, съ уродливо-искривленнымъ туловищемъ, крайне истощена. На головѣ колтунъ. Кисти рукъ, голени и стопы грязны, мѣстами покрыты какъ-бы толстой чешуей изъ грязи и наросшей кожицы; на пальцахъ ногъ и стопахъ на посинѣвшихъ мѣстами участкахъ имѣются подъ струпьями язвы, величиною до 15 коп. монеты. Сердце во всѣхъ полостяхъ содержитъ кровь и сгустки, оно лишено подъ наружной оболочкой жира; вѣнечныя артеріи сильно извилисты, сѣроваты; лѣвое венозное кольцо пропускаетъ одинъ палецъ; по краю двустворчатаго клапана—толстыя бѣловатыя отложенія, верхушки сосочковыхъ мышцъ тупы, бѣлы, жестки; мышца буровата, плотновата, вдоль сосудовъ на разрѣзахъ—сѣроватыя полоски. Въ дыхательныхъ вѣтвяхъ имѣются скопленія гноевидной слизи, выступающей также на разрѣзѣ ткани и изъ болѣе мелкихъ бронховъ. Слизистая желудка темно-аспиднаго цвѣта. Печень нѣсколько уменьшена, слегка хруститъ; въ желчномъ пузырѣ 15 мелкихъ камешковъ и немного желчи. Селезенка уменьшена, почки—также; капсула ихъ снимается съ трудомъ; кора крайне истончена; ткань плотновата, рисунокъ нѣсколько смытъ.

Смерть во время хлороформированія.

536. Василій *Кедровъ*, 13 л., сынъ свящ. Умеръ въ Госп. 30 марта 1909.

Вскрытіе 31 марта 1909. Росту 138 снт., тѣлосложенія слабаго, питанія посредственнаго. На передне-внутренней поверхности въ верхней трети праваго бедра подъ повязкой, пропитанной кровью, находится рана съ совершенно ровными краями, идущая отъ середины правой пупартовой связки, внизъ и кнутри, длиною около 15 снт.; края раны соединены 7 шелковыми швами и запачканы жидкою кровью. По снятіи швовъ оказалось, что рана проникаетъ кожу и подкожную клѣтчатку до подкожныхъ венъ, изъ которыхъ на передней поверхности большой подкожной вены бедра имѣется отверстіе величиною $^1/_2$ снт., откуда вытекаетъ кровь. Всѣ полости сердца переполнены темною жидкою кровью съ небольшою примѣсью бѣловатыхъ рыхлыхъ свертковъ и пузырьковъ воздуха; длина сердца 10 снт., поперечникъ его $10^1/_2$ снт., толщина стѣнки праваго желудочка 0,2—0,15 снт., лѣваго—1,8 снт.; мышца

сердца блѣдно-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Въ полости обоихъ плевральныхъ мѣшковъ находится большое количество желто-красноватой прозрачной водянистой жидкости. Вены мягкой мозговой оболочки, покрывающей правую теменную долю, растянуты пузырьками воздуха, который на большомъ пространствѣ заполняетъ крупные ихъ стволы.

537. Сергѣй *Лебедевъ*, 43 л., крест., умеръ въ клиникѣ 3 нояб. 1903.

Вскрытіе 4 нояб. 1903. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Нижняя губа увеличена въ объемѣ, на ощупь плотна, покрыта шероховатой язвенной поверхностью съ сухими корочками, со многими трещинами. Сердце 13 × 14 снт.; снаружи значительно обложено жиромъ; правая его половина переполнена темноюжидкою кровью, въ лѣвомъ предсердіи также находится много, а въ лѣвомъ желудочкѣ—мало такой же крови; стѣнка лѣваго желудочка толщиною 1,5 снт., праваго—0,2; сердечная мышца тусклая, блѣдно-красная, дряблая, двустворчатый клапанъ нѣсколько утолщенъ на краяхъ и у основанія, лѣвое венозное отверстіе свободно пропускаетъ 2 пальца, клапаны аорты немного утолщены, мутно-бѣловаты, но хорошо выдерживаютъ влитую въ аорту воду; внутренняя оболочка аорты какъ въ началѣ, такъ въ дугѣ и въ грудной части бугриста и шероховата со множествомъ объемистыхъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ; отверстія вѣнечныхъ артерій сильно сужены и окружены мелкими плотными бляшками; стѣнки этихъ сосудовъ утолщены и на протяженіи имѣются мелкія бѣловатыя плотныя бляшки. Съ разрѣза легкихъ стекаетъ довольно много мелкопѣнистой красноватой жидкости. Слизистая желудка утолщена, зерниста. Почки довольно плотны. Ткань печени довольно плотна, по направленію сосудовъ замѣтно значительное развитіе соединительной ткани въ видѣ тонкихъ полосокъ. Твердая мозговая оболочка утолщена, бѣловатаго цвѣта; мягкая оболочка сращена съ твердою, мутно-бѣловата по направленію сосудовъ и мало прозрачна; сосуды основанія мозга безъ измѣненія. На днѣ 4-го желудочка сосуды сильно расширены кровью. Внутреннія оболочки плечевыхъ артерій безъ измѣненій.

538. Михаилъ *Кононовъ*, 16 л., крест. Naevus pigment. pil. Операція; смерть; умеръ 16 февр. 1904.

Вскрытіе 17 февр. 1904. Средняго роста и сложенія, достаточнаго питанія. На правой щекѣ и въ правой височной области имѣется обширный недостатокъ кожи неправильной формы съ ровными краями; въ заднюю часть его вдается полуотдѣленный лоскутъ покрововъ. Правая сторона носа и спинки его занята нѣсколько возвышающеюся буроватою бугристою покрытою волосами опухолью. По средней линіи шеи спереди имѣется продольная хирургическая рана въ 4 снт., углубляющаяся между мышцъ. Кровенаполненіе костей черепа значительно; твердая мозговая оболочка значительно напряжена; въ умѣренно-наполненныхъ кровью венахъ коры мозга мѣстами попадаются пузырьки газа; кровенаполненіе мелкихъ сосудовъ значительное. Вилочковая железа сохранилась, значительной величины; при разрѣзѣ въ сосудахъ ея довольно много крови, вѣсъ 25,0 гр. Сердце увеличено, значительно обложено жиромъ; во всѣхъ полостяхъ его темная жидкая кровь въ большомъ количествѣ съ немногими сгустками темнаго цвѣта; лѣвое венозное кольцо пропускаетъ 3 пальца, правый желудочекъ растянутъ, толщина его мѣстами едва доходитъ до 0,2 снт., лѣваго—0,5; мускулатура сердца блѣдная, мѣстами съ желтоватымъ оттѣнкомъ, въ особенности въ стѣнкѣ праваго желудочка; на наружной стѣнкѣ въ области праваго желудочка имѣются слегка выступающія величиною въ нѣсколько кв. снт. перламутроваго цвѣта пятна. Подъ серознымъ покровомъ легкихъ имѣются слегка выступающія точечныя кровоизліянія. Слизистая желудка набухшая, зернистая. Центральныя вены въ печени

расширены, окружены желтоватымъ ободкомъ. Ткань селезенки въ разрѣзѣ пестра вслѣдствіе развитія и увеличенія мальпигіевыхъ тѣлецъ. Корковый слой почекъ нѣсколько набухшій, рисунокъ не совсѣмъ ясный.

539. Арсеній *Васильевъ*, 27 л., мѣщ. Умеръ въ госпиталѣ въ время хлороформированія 28 сент. 1909.

Вскрытіе 30 сент. 1909. Роста выше средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Шейныя вены переполнены темной жидкой кровью. Сердце немного увеличено, сильно обложено жиромъ, во всѣхъ полостяхъ его много темной жидкой крови; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій мѣстами замѣтны бѣловатыя бляшки; мышца сѣрокраснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дрябловата, проросла жиромъ, особенно у верхушки; основанія полулунныхъ клапановъ аорты нѣсколько утолщены. Сосуды мягкой мозговой оболочки сильно наполнены темной кровью, въ которой замѣтны пузырьки газа.

IV.

Давленіе на мозгъ.

Кровоизліяніе въ мозгъ и его оболочки.

540. Титъ *Алексѣевъ*, 43 л., чернорабочій. Найденъ въ отхожемъ мѣстѣ въ безсознательномъ состояніи, по дорогѣ въ больницу умеръ 25 янв. 1900. Велъ нетрезвую жизнь.

Вскрытіе 29 янв. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, стѣнка лѣваго желудочка нѣсколько толще 1,0 снт.; вѣнечныя артеріи прощупываются въ видѣ рѣзко осязаемыхъ плотныхъ шнурковъ, а при разрѣзѣ въ стѣнкахъ ихъ оказываются многочисленныя фиброзныя утолщенія; на внутренней оболочкѣ аорты замѣтно также нѣсколько маленькихъ фиброзныхъ бляшекъ. Пирамиды почекъ окрашены нѣсколько темнѣе корковаго слоя. Правая почка опустившаяся и фиксирована въ сосѣдствѣ со слѣпой кишкой: объемъ почки уменьшенъ почти вдвое, лоханка сильно расширена и содержитъ мочевидную жидкость, пирамидки сплющены, корковый слой весьма тонокъ. Стѣнки мозговыхъ сосудовъ утолщены, особенно Сильвіевыхъ артерій. Мозговое вещество весьма блѣдно. Въ лѣвомъ желудочкѣ найдена свернувшаяся кровь, въ количествѣ около 100,0 гр., въ правомъ желудочкѣ немного крови, преимущественно въ жидкомъ видѣ: лѣвое полосатое тѣло совершенно разрушенно въ заднемъ своемъ отдѣлѣ, разрушена также передняя часть лѣваго зрительнаго бугра, такъ что кровяные сгустки лежали въ образовавшейся полости, имѣвшей величину около куринаго яйца; стѣнки полости рыхлы, неровны. Въ четвертомъ желудочкѣ найдено около чайной ложки свернувшейся крови.

541. Илья *Наумовъ*, 52 л., крест., чернорабочій. 3 февр. 1900 сдѣлалось дурно, упалъ, перенесенный въ квартиру, заявилъ, что у него парализованъ лѣвый бокъ и нога, впалъ въ безсознательное состояніе, въ тотъ же день умеръ въ Обуховской больницѣ. Жизнь велъ нетрезвую.

Вскрытіе 8 февр. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Въ полости праваго бокового желудочка мозга находится обширное кровоизліяніе изъ свернувшейся крови, главнымъ образомъ въ лобной долѣ и отчасти теменной, на границѣ полосатаго тѣла и зрительнаго бугра; въ лобной долѣ образовалась обширная полость съ разрыхленными и разорванными стѣнками мозговой ткани; оба желудочка наполнены жидкой кровью, приблизительно около 100 гр., на днѣ четвертаго желудочка находится также кровоизліяніе величиною съ бобъ. Стѣнки желудочковъ сердца нѣсколько истончены; клапаны аорты утолщены и нѣсколько мутны; внутренняя оболочка ея нѣсколько шероховата и имѣетъ мелкія бѣловатыя бляшки. Сосуды основанія мозга расширены, стѣнки ихъ мутновато-бѣловатаго цвѣта, плотны, съ присутствіемъ на нихъ мелкихъ плотныхъ бляшекъ. Почки увеличены, корковый слой утолщенъ, ткань плотна.

542. Анна *Габбихтъ*, 56 л., крест., доставленная 6 февр. 1900 въ пьяномъ видѣ для вытрезвленія въ часть, скоропостижно умерла тамъ въ пріемномъ покоѣ.

Вскрытіе 12 февр. 1900. Ниже средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Въ полости лѣваго бокового желудочка находится обширное кровоизліяніе изъ свернувшейся крови съ плотными сгустками; кровоизліяніе это продолжается въ лѣвую теменную долю и располагается между нею, зрительнымъ бугромъ и полосатымъ тѣломъ; стѣнки образованной полости разрыхлены; въ правомъ боковомъ желудочкѣ находится жидкая кровь въ значительномъ количествѣ; сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце нѣсколько увеличено, съ большими отложеніями жира; мышца съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дрябла; стѣнки желудочковъ истончены; внутренняя оболочка аорты бугриста и шероховата съ мелкими плотными бляшками. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула снимается легко, ткань истончена, корковый слой увеличенъ.

543. Иванъ *Толстоуховъ*, 39 л., крест., извозчикъ. Видѣли метавшимся на кровати, съ нимъ происходило что-то вродѣ припадка подъ рядъ раза четыре; каждый разъ на непродолжительное время успокаивался. Найденъ подъ утро мертвымъ, 7 мар. 1900.

Вскрытіе 11 мар. 1900. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. На артеріяхъ основанія мозга замѣчается небольшое и приблизительно равномѣрное утолщеніе стѣнокъ. Въ веществѣ правой половины мозга обнаружена полость нѣсколько болѣе куринаго яйца, прилегающая къ наружной поверхности праваго зрительнаго бугра и отчасти полосатаго тѣла; полость эта нѣсколько растянута рыхлыми кровяными свертками, стѣнки ея мягки, какъ бы изъѣдены; наружная часть зрительнаго бугра разрушена. Сердце довольно дрябло, мышцы его слегка желтоваты.

544. Пелагея *Ломакина*, 45 л., крест., фабричная, часто жаловалась на боль въ груди. Ложась спать говорила, что ей сжало грудь, утромъ найдена мертвой, 18 мар. 1900.

Вскрытіе 22 мар. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце значительно увеличено, стѣнки желудочковъ истончены; мышца дрябла, съ яснымъ желтоватымъ оттѣнкомъ; на внутренней оболочкѣ аорты замѣчаются мелкія бѣловатыя плотныя бляшки. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ находится объемистый плотный сгустокъ крови, заполняющій почти всю его полость; мозговая ткань на границѣ полосатаго тѣла и зрительнаго бугра съ лѣвой стороны размята и разорвана, причемъ обрывки ея покрыты сгустками крови. Сосуды основанія мозга расширены, стѣнки ихъ уплотнены, трудно спадаются, мутно-бѣлаго цвѣта. На днѣ четвертаго желудочка находится плотный кровяной сгустокъ величиною съ лѣсной орѣхъ.

545. Неизвѣстнаго званія *женщина*, 45 л., поднята въ безсознательномъ состояніи, по доставленіи въ пріемный покой умерла, 8 окт. 1900.

Вскрытіе 10 окт. 1900. Роста ниже средняго, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Въ правомъ боковомъ желудочкѣ находятся обширные плотные сгустки, вполнѣ его заполняющіе; въ области праваго зрительнаго бугра и на границѣ съ полосатымъ тѣломъ мозговая ткань разрушена и размята внѣдрившимися въ нее сгустками крови; сгустки также помѣщаются въ переднемъ рогу лѣваго желудочка. Со-

суды основанія мозга трудно спадаются, стѣнки ихъ мутно-бѣловатаго цвѣта съ присутствіемъ мелкихъ бѣловатыхъ бляшекъ. На днѣ 4-го желудочка находится кровоизліяніе величиной въ горошину. Сердце значительно увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира снаружи и съ присутствіемъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ бѣлыхъ блестящихъ пятенъ; стѣнки желудочковъ утолщены почти вдвое; мышца значительно дряблая, съ желтоватымъ оттѣнкомъ; двустворчатый клапанъ значительно утолщенъ и сморщенъ; внутренняя оболочка аорты значительно шероховата и бугриста съ твердыми плотными бляшками бѣлаго цвѣта. Лѣвое легкое въ нижней долѣ непроходимо для воздуха, буро-краснаго цвѣта, вся доля тонетъ въ водѣ. Почки уменьшены, капсула съ трудомъ снимается, ткань плотна, съ желтоватымъ оттѣнкомъ; корковый слой истонченъ, пирамидки сплющены.

546. Александръ *Чистяковъ*, 35 л., мѣщ. Скоропостижно умеръ 27 окт 1900.

Вскрытіе 28 окт. 1900. Роста выше средняго, тѣлосложенія крѣпкаго, питанія слабаго. Сердце 11 × 11 снт., съ значительнымъ отложеніемъ жира спереди; мышца съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дрябла, на полулунныхъ клапанахъ аорты находятся плотныя бѣловатыя отложенія въ видѣ узелковъ. Между мягкой оболочкой и веществомъ мозга въ лѣвомъ полушаріи на основаніи мозга находится кровоизліяніе изъ свернувшейся крови; въ боковыхъ желудочкахъ находится жидкая кровь въ большомъ количествѣ. Сосуды основанія мозга трудно спадаются, стѣнки ихъ довольно плотны, мутно-бѣловатаго цвѣта. Между Вароліевымъ мостомъ и мозжечкомъ съ лѣвой стороны находится плотная свернувшаяся кровь; на днѣ четвертаго желудочка также много свернувшейся крови. Вещество мозга полнокровно. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, ткань ихъ довольно плотна, темнокраснаго цвѣта, корковый слой утолщенъ, пирамидки стиснуты.

547. Федоръ *Корельскій*, 35 л., крест., кровельщикъ. Поднятъ въ безсознательномъ состояніи на улицѣ и доставленъ въ часть для вытрезвленія, гдѣ умеръ, 20 нояб. 1900. Жизнь вель распутную и предавался пьянству.

Вскрытіе 26 нояб. 1900. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, достаточнаго питанія. Твердая мозговая оболочка напряжена, мягкая оболочка тонкая, прозрачная, подъ нею въ области основанія и отчасти на сводѣ замѣчается излившаяся кровь, преимущественно въ бороздахъ между извилинами. Въ боковыхъ желудочкахъ, особенно въ заднихъ рогахъ имѣется скопленіе кровянистой жидкости. Въ полости четвертаго желудочка и отчасти въ третьемъ мелкіе кровяные свертки въ небольшомъ количествѣ. Въ толщѣ Вароліева моста и четверохолмія найдена излившаяся кровь въ видѣ довольно плотнаго свертка, величиною въ крупный грецкій орѣхъ. Ткань мозжечка и продолговатаго мозга отчасти разрушена по сосѣдству кровоизліянія. Артеріи основанія мозга имѣютъ замѣтно утолщенныя стѣнки. Сердце нѣсколько увеличено, стѣнка лѣваго желудочка достигаетъ величины почти 2 снт., полость желудочка замѣтно увеличена. Печень увеличена въ $1^1/_2$ раза, ткань въ разрѣзѣ имѣетъ сальный видъ и рѣзко-желтоватый цвѣтъ.

548. Кирсанъ *Дроздовъ*, 43 л., крест., сторожъ. 26 нояб. 1900 въ нетрезвомъ видѣ, спускаясь по лѣстницѣ соборной колокольни, не дойдя 20 ступеней, упалъ и ударившись о каменную ступень вискомъ, умеръ.

Вскрытіе 30 нояб. 1900. Высокаго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Въ лобной области на границѣ съ височной косая рана, проникающая до кости, длиною въ 3 снт., шириною въ 6 мм. Соотвѣтственно кожной ранѣ идетъ сквозная трещина, немного выше праваго лобнаго бугра косвенно кзади и немедленно загибающаяся внизъ, переходя на правое крыло основной кости, гдѣ теряется у турецкаго сѣдла. Подъ

мягкою оболочкою во многихъ мѣстахъ, а въ особенности на верхнихъ частяхъ мозжечка находятся большія кровоизліянія въ видѣ пятенъ. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ находится жидкая кровь въ умѣренномъ количествѣ. Сосуды основанія мозга мутно-бѣлаго цвѣта, просвѣтъ ихъ слегка зіяетъ. На днѣ четвертаго желудочка замѣчается кровоизліяніе величиною въ просяное зерно. Содержимое желудка пахнетъ спиртомъ. Сердце увеличено въ объемѣ, съ большими отложеніями жира спереди; мышца дрябла, съ желтоватымъ оттѣнкомъ; стѣнка праваго желудочка утолщена, лѣваго—истончена.

549. Степанида *Макарова*, 36 л., крест. Въ послѣднемъ мѣсяцѣ беременности, 29 нояб. 1900 почувствовала дурноту, впала въ безсознательное состояніе, доставленная въ родильный домъ, черезъ 3 часа умерла въ припадкѣ, похожемъ на экламптическій.

Вскрытіе 3 дек. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, достаточнаго питанія. Твердая мозговая оболочка сильно напряжена, мягкая тонка, прозрачна, въ сосудахъ и пазухахъ содержится довольно много крови. Стѣнки артерій основанія мозга замѣтно утолщены, на нихъ имѣются желтоватыя бляшки, особенно въ области основной артеріи и артеріи мозжечка. Вещество Вароліева моста почти во всю толщу пропитано свернувшеюся кровью и отчасти разрушено; въ полости четвертаго желудочка довольно много кровяныхъ свертковъ, дно его въ передней части ромба также отчасти разрушено; въ правой долѣ мозжечка имѣется полость съ рыхлыми неровными стѣнками, величиною въ крупный грецкій орѣхъ, она растянута свернувшейся кровью. Сердце увеличено почти вдвое, мышца тусклая и дряблая, стѣнка лѣваго желудочка толщиной до 2 снт. Щитовидная железа увеличена почти вдвое. Почки въ разрѣзѣ сплошного темнокраснаго цвѣта, корковый слой въ нѣкоторыхъ мѣстахъ тонокъ; капсула трудно отдѣляется.

550. Иванъ *Скачковъ*, 52 л., крест. 5 дек. 1900 на улицѣ сдѣлалось дурно, пошла кровь изо рта, доставленный въ больницу въ безпамятствѣ черезъ нѣсколько минутъ умеръ.

Вскрытіе 11 дек. 1900. Высокаго роста, крѣпкаго сложенія, хорошаго питанія. Сердце увеличено, на наружной его оболочкѣ замѣчаются перламутровыя блестящія пятна; мышца мѣстами желтоватая; двустворчатый клапанъ утолщенъ, укороченъ и сморщенъ, въ особенности на задней створкѣ; верхушки папиллярныхъ мышцъ укорочены, желтоватаго цвѣта, толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,2 снт.; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами имѣются сѣроватыя полупрозрачныя отложенія въ видѣ выступающихъ бляшекъ, величиною до боба и болѣе мелкія блѣдныя, но болѣе жесткія, послѣднія въ небольшомъ количествѣ; вѣнечные сосуды сердца на внутренней ихъ оболочкѣ блѣдно-желтоваты, бугристы, мѣстами ломки и при разрѣзѣ хрустятъ. Въ заднихъ черепныхъ ямкахъ имѣется много свободной жидкой крови. Мягкія мозговыя оболочки, покрывающія мозжечекъ, пропитаны кровью. Правое полушаріе мозжечка съ поверхности разрушено на небольшомъ протяженіи, черезъ это неправильное отверстіе выступаетъ кровь и сгустки. Правое полушаріе мозжечка разрушено обширнымъ, свѣжимъ кровоизліяніемъ, проникающимъ въ полость 4-го желудочка. Сосуды основанія мозга мѣстами утолщены, бѣловаты, мѣстами съ желтымъ оттѣнкомъ.

551. Александръ *Бродинкинъ*, 18 л., крест., форейторъ. Раньше все время жаловался на сильную боль въ груди и головную боль; все перемогался, но 13 февр. 1901 совсѣмъ ослабѣлъ, отправленный въ больницу, черезъ 4 часа тамъ умеръ. Отецъ предполагаетъ, что смерть послѣдовала отъ порока сердца.

Вскрытіе 17 янв. 1901. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сосуды мозговыхъ оболочекъ заключаютъ незначительное ко-

личество крови. Въ правомъ большомъ полушаріи въ лобной и отчасти въ теменной областяхъ подъ мягкой оболочкой замѣчается разлитое кровоизліяніе, величиною съ ладонь. Въ тѣхъ же областяхъ въ мозгу— обширная полость, величиною съ гусиное яйцо, стѣнки ея образованы размятой и разрыхленной мозговою тканью, смѣшанной со сгустками крови, а вся полость наполнена объемистыми плотными сгустками крови. Сосуды основанія мозга извилисты, стѣнки ихъ трудно спадаются, мутно-бѣлаго цвѣта, на развѣтвленіяхъ находятся бѣловатыя бляшки. Сердце 14 × 12 × 6,5 сит.; стѣнка лѣваго желудочка 2.2 сит., праваго—1,0 сит.; мышца бѣдно-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно плотна; дву- и трехстворчатый клапаны значительно утолщены, мутно-бѣлаго цвѣта, сморщены; внутренняя оболочка во многихъ мѣстахъ имѣетъ плотныя бѣловатыя бляшки, клапаны аорты также утолщены и сморщены; отверстія вѣнечныхъ артерій слегка сужены, стѣнки ихъ утолщены и плотны, имѣютъ бѣловатыя бляшки. Почки нѣсколько уменьшены, ткань значительно плотна, слои истончены. Солитарныя железки увеличены до просянаго зерна, въ толстыхъ кишкахъ—значительно. Брыжеечныя железы увеличены до лѣсного орѣха, плотны, темнокрасваго цвѣта.

552. Фролъ *Задоровъ*, 45 л., крест., кузнецъ. 13 дек. 1901 доставленъ въ безсознательномъ состояніи въ пріемный покой, гдѣ черезъ полчаса умеръ. Предъявлялся пьянству.

Вскрытіе 19 янв. 1901. Средняго роста, крѣпкаго сложенія, средняго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, 11 × 14 сит; на наружной поверхности имѣется молочно-мутнаго цвѣта пятно; на разрѣзѣ мышцы мѣстами сплошныя пятна и полоски желтаго цвѣта; полость лѣваго желудочка ясно увеличена, стѣнка 1,2 сит.; по крамѣ дву- и трехстворчатаго клапана имѣются фиброзныя уплотненія; мышца ихъ вяла, на внутренней поверхности аорты и вѣнечныхъ артерій—незначительныя бѣловатыя бляшки. Въ правомъ боковомъ желудочкѣ содержится жидкая кровь, стѣнки его однако цѣлы, въ третьемъ желудочкѣ и въ Сильвіевомъ водопроводѣ тоже жидкая кровь. Полость четвертаго желудочка сильно растянута темной жидкой кровью со сгустками въ количествѣ свыше половины столовой ложки. Передняя половина дна 4-го желудочка, равно и вещество Варолиева моста разрушено кровоизліяніемъ на протяженіи въ 3 коп. монету. На неправильно-разорванныхъ лоскутахъ мозгового вещества имѣются несмываемые струей воды сгустки крови. На сосудахъ основанія мозга мѣстами замѣтны бѣловатыя бляшки.

553. Василій *Марковъ*, 40 л., крест., лодочникъ. Иногда являлся домой въ нетрезвомъ видѣ. Въ трактирѣ съ нимъ сдѣлалось дурно, принесли на рукахъ въ квартиру, пришелъ въ себя, черезъ нѣсколько минутъ сталъ дремать, появлялась у него рвота, подъ утро найденъ мертвымъ. 18 янв. 1901.

Вскрытіе 22 янв. 1901. Средняго роста и тѣлосложенія, слабаго питанія. Въ боковыхъ желудочкахъ, въ особенности въ лѣвомъ, находятся объемистые сгустки крови, весьма плотные. Въ лѣвомъ полушаріи, на границѣ полосатаго тѣла и зрительнаго бугра имѣется полость нѣсколько болѣе куринаго яйца, выполненная плотными сгустками крови; стѣнки этой полости образованы размятою и клочковатою мозговой тканью, смѣшанной съ мелкими сгустками крови. Въ полости 5 и 4 желудочка находятся плотные объемистые сгустки крови. Сосуды основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта, извилисты, стѣнки ихъ трудно спадаются. Сердце значительно увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира спереди; стѣнки желудочковъ истончены, мышца дряблая, желтоватая, бѣловатыя бляшки. Почки уменьшены, слои утончены, довольно плотны.

554. Степанъ *Фроловъ*, 42 л., крест., работникъ. Жизнь велъ нетрезвую. Послѣ пьянства говорилъ, что у него является боль въ бокахъ и судорожное состояніе. 22 янв. 1901 возвратился вечеромъ въ пьяномъ видѣ и на почь выпилъ еще сотку; въ 12 ч. услышали, что онъ упалъ съ кровати и закричалъ, и нашли похолодѣвшимъ.

Вскрытіе 23 янв. 1901. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Подъ мягкой мозговой оболочкой въ переднихъ частяхъ лобныхъ долей съ лѣвой стороны височной доли, въ области Варолиева моста, продолговатаго мозга и мозжечка находится обширное и сплошное кровоизліяніе изъ свернувшейся крови. Въ боковыхъ желудочкахъ находится большое количество крови, отчасти свернувшейся. Сосуды основанія мозга склерозированы. Въ полости четвертаго желудочка находятся плотные темные сгустки крови. Сердце увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира спереди; стѣнки лѣваго желудочка утолщена въ $1^1/_2$ раза; мышца желтовата. Отъ внутренностей чувствуется ясный запахъ спирта.

555. Аѳанасій *Кудиновъ*, 30 л., крест., жена щеточника. Находится въ послѣднихъ дняхъ беременности. Въ прежнія беременности съ ней случались припадки. Съ недѣлю назадъ стала сильно пухнуть; вечеромъ 29 янв. 1901 почувствовала жаръ въ головѣ, и черезъ 2 часа умерла.

Вскрытіе 1 февр. 1901. Средняго роста и тѣлосложенія; питанія хорошаго. Голени и стопы значительно отечны. Дно матки на уровнѣ пупка, 21 × 22 сит., въ полости ея—плодъ мужского пола, длиною 47 сит., вѣсомъ безъ послѣда 1745,0 гр. Сердце увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира спереди; стѣнки желудочковъ утолщены, мышца дряблая, съ ясно желтымъ оттѣнкомъ; просвѣтъ аорты значительно сужень, поинутренняя ея оболочка и стѣнки измѣненій не представляютъ. Селезенка увеличена въ длину втрое. Почки увеличены въ объемѣ, корковый слой утолщенъ, желтоватаго цвѣта, пирамидки переполнены кровью. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ находится объемистый плотный сгустокъ крови, наполняющій весь желудочекъ, въ правомъ же желудочкѣ—значительно меньшій сгустокъ крови и жидкая кровь. Между лѣвымъ полосатымъ тѣломъ и зрительнымъ бугромъ находится полость величиною съ куриное яйцо, выполненная продолженіемъ кровянаго сгустка; стѣнки этой полости образованы размятой клочковатой мозговою тканью. Подъ мягкою мозговою оболочкою, покрывающею нижнюю поверхность мозжечка, Варолиева моста и продолговатаго мозга, находится сплошное кровоизліяніе. Полость четвертаго желудочка растянута плотнымъ объемистымъ сгусткомъ крови.

556. Прасковья *Петрова*, 34 л., крест., башмачница. Вышетъ съ мужемъ неоднократно пьянствовали. Наканунѣ пили водку; легла на чужой кровати; когда ее немного спустя стали будить, она, не просыпаясь, стала говорить безсвязныя слова и тутъ же начало ее рвать; утромъ оказалась мертвой, 18 сент. 1901.

Вскрытіе 20 сент. 1901. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце дряблое, 12 × 12 сит., двустворчатый клапанъ на свободныхъ краяхъ утолщенъ; толщина лѣваго желудочка 1,5 сит., праваго—0,3; мышца желтовата. Въ полости матки—плодъ мѣсомъ 260 гр., длиною 23 сит. Полость праваго мозгового желудочка сильно расширена и заполнена плотными объемистыми сгустками крови. На днѣ 4-го желудочка также находится плотный объемистый сгустокъ крови.

557. Анна *Павлова*, 56 л., крест. Здоровья была слабаго, всегда жаловалась на сильную боль въ груди и одышку. Дѣлъ недѣли назадъ была ушиблена съ ногъ. Умерла 6 окт. 1901.

Вскрытіе 9 окт. 1901. Выше средняго роста, средняго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце дряблое, увеличенное значительно и ожирѣн-

шее; мѣстами стѣнка сердца имѣетъ пестрый видъ вслѣдствіе рѣзко выраженнаго гнѣзднаго жирового перерожденія; вѣнечныя артеріи извилисты, но проходимы. По снятіи твердой мозговой оболочки на выпуклой поверхности лѣвой половины мозга, а отчасти и правой обнаружено кровоизліяніе, состоящее изъ темной жидкой крови и темныхъ сгустковъ, располагающихся слоемъ, достигающимъ толщины 5 снт. въ лѣвой височной области; оно продолжается также и на основаніе черепа въ предѣлахъ переднихъ и среднихъ яремныхъ ямокъ; на боковой поверхности лѣвой височной доли, которая представляется нѣсколько вдавленной, замѣчается плотноватое на ощупь буровато-блѣдно-краснаго цвѣта возвышеніе неправильной формы, величиной около половины горошины; оно имѣетъ связь съ однимъ изъ сосудовъ, проходящихъ въ средней бороздкѣ. Кровоизліяніе это проникаетъ въ толщу мозга на протяженіи около сантиметра; это гнѣздо кровоизліянія имѣетъ буровато-красный цвѣтъ. На основной поверхности височной доли имѣется обширное, величиною въ грецкій орѣхъ, гнѣздо буровато-краснаго размягченія, поверхность мозга здѣсь представляется въ видѣ неправильныхъ зубчатыхъ клочьевъ. Сосуды основанія мозга плотноваты на ощупь, но на разрѣзахъ не зіяютъ и бляшекъ въ нихъ не замѣчается. По обѣ стороны Сильвіева водопровода имѣются небольшія полосчатыя кровоизліянія.

558. Анна *Конюхова*, 34 л., крест., продавщица въ булочной. Болѣла параличемъ, болѣла голова и грудь. Поведенія была трезваго. 4 нояб. 1901 пріѣхала домой, почувствовала себя такъ дурно, что сама не могла встать съ саней и отправленная въ больницу, черезъ нѣсколько часовъ тамъ умерла.

Вскрытіе 9 нояб. 1901. Средняго роста и тѣлосложенія, хорошаго питанія. Лобныя доли около передней части серпа буровато-краснаго цвѣта; такова же и окраска мягкой мозговой оболочки, продолжается и на основаніе мозга въ предѣлахъ этихъ долей. При отдѣленіи мозгового придатка изъ воронки вытекаетъ кровянистая жидкость; мягкая мозговая оболочка въ предѣлахъ мозжечка и продолговатаго мозга обильно пропитана темной кровью. Сосуды Сильвіевыхъ бороздъ, а отчасти и основная (art. basilaris) плотноваты на ощупь,—мѣстами желтоватыя бляшки. При раздвиганіи долей, мозолистое тѣло легко надрывается и изъ боковыхъ желудочковъ обильно вытекаетъ кровянистая жидкость и выпадаютъ сгустки крови. Послѣдняя въ обильномъ количествѣ выполняетъ всѣ желудочки мозга. Въ задне-наружной части праваго зрительнаго бугра имѣется разрывъ мозговой ткани на протяженіи въ копѣечную монету; края его бахромчаты. При разрѣзахъ правыхъ узловъ основанія, въ бѣломъ веществѣ, кнаружи отъ claustrum найденъ кистовидно-разрыхленный участокъ мозга, величиной съ вишню. Эта киста наполнена желтоватой жидкостью; околососудистыя пространства въ ткани праваго зрительнаго бугра широки въ видѣ замѣтныхъ щелей и кружковъ. Сердце нѣсколько увеличено; толщина праваго желудочка 0,25 снт., лѣваго—1,3; лѣвое венозное кольцо пропускаетъ $1^1/_2$ пальца; двустворчатый клапанъ по краю замѣтно утолщенъ, равно какъ и нити, мѣстами рѣзко суженъ. Въ корковомъ слоѣ почекъ много углубленныхъ втянутыхъ мѣстъ—слѣды бывшихъ инфарктовъ.

559. Василій *Викторовъ*, 45 л., крест. 17 нояб. 1901 вынесенъ изъ конки въ сильно пьяномъ видѣ, совершенно безъ чувствъ, кашлялъ и хрипѣлъ; по доставленіи въ больницу черезъ два часа умеръ.

Вскрытіе 21 нояб. 1901. Выше средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце значительно увеличено, 14 × 12 × 7 снт., обильно обложено жиромъ, стѣнка лѣваго желудочка толщиною въ $1^1/_2$ снт., мышца желтоватая, дряблая; на внутренней оболочкѣ аорты многочисленныя фиброзныя утолщенія въ видѣ желтоватыхъ пятнышекъ

въ маковое зерно. Почки замѣтно увеличены, корковый слой блѣдно-желтоватый, нѣсколько набухшій, пирамидки грязно-краснаго цвѣта, низкія, лоханки широкія и ожирѣвшія. Пазухи твердой и сосуды мягкой переполнены кровью; въ боковыхъ желудочкахъ заключается значительное количество красноватой прозрачной жидкости. Стѣнки сосудовъ основанія мозга сильно склерозированы. Сосуды мягкой оболочки мозжечка сильно переполнены кровью; на днѣ 4-го желудочка сосуды расширены кровью. У основанія четыреххолмія и въ передней части лѣвой половины ромбовидной ямки находится въ толщѣ мозгового вещества кровоизліяніе изъ свернувшейся крови, величиною нѣсколько менѣе грецкаго орѣха; ткань мозжечка сильно переполнена кровью.

560. Татьяна *Шершнева*, 19 л., крест. Въ послѣднемъ періодѣ беременности, 23 февр. 1902 съ ночи стала жаловаться на головную боль, появилась рвота и спустя часа два впала въ безсознательное состояніе, и по дорогѣ въ больницу умерла.

Вскрытіе 26 февр. 1902. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Матка 30 × 23 снт., по вскрытіи ея отошло много водъ и въ полости ея оказался ребенокъ вѣсомъ 2300 гр., длиною въ 48 снт. Сердце 10 × 9 × 6 снт.; стѣнка лѣваго желудочка толщиною 1,7 снт., праваго—0,3; мышца съ желтоватыми полосками; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами находится нѣсколько мелкихъ бѣловатыхъ бляшекъ. Корковый слой почекъ утолщенъ, блѣдно-красный съ желтоватымъ оттѣнкомъ, пирамиды укорочены. Сосуды мозговыхъ оболочекъ значительно наполнены кровью. Въ полости 4-го желудочка находится объемистое кровоизліяніе изъ плотныхъ сгустковъ, которое располагается въ веществѣ продолговатаго мозга до самого его центра, гдѣ мозговая ткань разорвана и размята мелкими сгустками крови.

561. Анна *Вавилова*, 33 л., крест. Ожидала на дняхъ разрѣшенія отъ бремени; 24 фев. 1902 почувствовала себя дурно, жаловалась на боль головы, стало ее рвать и часа черезъ 3—4 умерла.

Вскрытіе 27 фев. 1902. Ниже средняго роста, средняго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Матка 29×24×14 снт., въ ней оказался ребенокъ 49 снт. длиною и вѣсомъ 3260 гр. Сердце 12×11×5 снт.; стѣнка праваго желудочка толщиною въ 0,2 снт., а лѣваго—1,5 снт.; мышца блѣдно-желтовата, довольно дрябла. Подъ капсулой селезенки находится множество мелкихъ рѣзко-ограниченныхъ кругловатыхъ пятенъ темно-краснаго цвѣта отъ маковаго до коноплянаго зерна; подъ брюшнымъ покровомъ печени какъ спереди, такъ и на нижней поверхности также находится множество такихъ же пятенъ отъ просяного зерна до горошины. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, пирамидальный переполненъ кровью. Пазухи твердой и сосуды мягкой мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью. Въ переднихъ рогахъ боковыхъ желудочковъ, и въ третьемъ и на днѣ 4-го находится обширное кровоизліяніе изъ свернувшейся крови; вещество мозга размято и разрыхлено въ лѣвомъ полушаріи между зрительнымъ бугромъ и четверохолміемъ, и въ толщѣ Вароліева моста и продолговатаго мозга; разрыхленныя и размятыя части мозговой ткани пропитаны мелкими сгустками крови. Сосуды основанія мозга склерозированы.

562. Евдокія *Алексѣева*, 55 л., крест. Пьянствовала. 3 окт. 1902 утромъ найдена мертвой въ постели.

Вскрытіе 6 окт. 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, достаточнаго питанія. Сердце значительно увеличено, стѣнка лѣваго желудочка достигаетъ 2,0 снт., праваго—около 0,5 и состоитъ почти цѣликомъ изъ жира; мышца блѣдная, тусклая, желтоватая, заслонки утолщены и сморщены у основанія, просвѣтъ вѣнечныхъ артерій свободенъ, но стѣнки замѣтно утолщены. Почки замѣтно уменьшены въ объемѣ, капсула снимается съ трудомъ, корковый слой тонокъ, пирамидки низки. Твердая

мозговая оболочка сильно напряжена, мозговыя извилины сильно уплощены. Въ лѣвомъ желудочкѣ найденъ кровяной свертокъ нѣсколько больше куринаго яйца и немного жидкой крови; лѣвое полосатое тѣло почти совершенно разрушено; свертокъ лежалъ въ полости съ клочковатыми стѣнками. Въ четвертомъ желудочкѣ немного свернувшейся крови. Артеріи основанія мозга склерозированы.

563. Григорій *Васильевъ*, 63 л., крест. Жизнь велъ нетрезвую, опредѣленныхъ занятій не имѣлъ. Вечеромъ начиналъ бредить, говорилъ нелѣпости, просилъ пива; въ 9 ч. легъ спать, въ 4 часу пробудившись, просилъ чаю и опять заснулъ; около 9 ч. утра дѣлалъ движенія ногами и храпѣлъ, послѣ чего тихо умеръ, 18 окт. 1902.

Вскрытіе 20 окт. 1902. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія, въ крайней степени истощенъ. Сердце $9^1/_2 \times 10$ снт., толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,8 снт., а праваго—0,5; мышца буро-красно-желтовата; дву-и трехстворчатый клапанъ утолщены и слегка сморщены; на внутренней оболочкѣ аорты разбросанныя плотныя бѣловатыя бляшки. Въ верхушкѣ праваго легкаго обширное пространство занято бѣловатой рубцовой тканью. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ. Стѣнки сосудовъ основанія мозга утолщены и уплотнены, мутно-бѣловатаго цвѣта, особенно въ артеріяхъ Сильвіевыхъ бороздъ. На днѣ 4-го желудочка въ поверхностномъ слоѣ мозгового вещества въ правомъ наружномъ углу ромбовидной ямки имѣется кровоизліяніе, величиною въ чечевицу. Всѣ внутренніе органы малокровны.

564. Валеріанъ *Мурашко*, 52 л., отставной тит. сов. Крѣпкіе напитки употреблялъ умѣренно. Найденъ мертвымъ на полу отхожаго мѣста 9 нояб. 1902.

Вскрытіе 11 нояб. 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, питанія слабаго. Подъ мягкою оболочкою почти на всемъ пространствѣ, а въ особенности на основаніяхъ мозга и мозжечка находится почти сплошное кровоизліяніе изъ свернувшейся крови. Боковые желудочки переполнены жидкою кровью; какъ въ боковыхъ, такъ и въ третьемъ и на днѣ четвертаго желудочка находятся плотные и довольно объемистые сгустки крови. Сгустки крови также окружаютъ четверохолміе. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы. Сердце значительно увеличено въ объемѣ и обложено жиромъ; стѣнки желудочковъ утолщены болѣе, чѣмъ вдвое, мышца блѣдно-красно-желтовата, дрябла; заслонки нѣсколько утолщены, внутренняя оболочка аорты слегка шероховата, просвѣтъ ея замѣтно узкій. Слои почекъ истончены, ткань довольно плотна. Отъ мозга и внутренностей чувствуется ясный запахъ спирта.

565. Неизвѣстнаго званія мужчина *Григорій*, 40 л., башмачникъ, опредѣленнаго мѣста жительства, какъ большинство башмачниковъ, не имѣлъ и жизнь велъ нетрезвую. 3 дек. 1902 пришелъ почти раздѣтый попросить работы и въ ожиданіи водки сидѣлъ на табуретѣ; внезапно упалъ и въ безсознательномъ состояніи доставленный въ пріемный покой умеръ.

Вскрытіе 7 дек. 1902. Роста средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Сердце значительно увеличено $13 \times 12 \times 8$ снт.; толщина стѣнки праваго желудочка 0,5 снт., лѣваго—2,0 снт.; лѣвое венозное кольцо съ трудомъ пропускаетъ два пальца. Почки уменьшены въ объемѣ, корковый и пирамидальный слой истончены, ткань уплотнена. Лѣвый боковой желудочекъ мозга растянутъ излившейся кровью съ образованіемъ сгустка, величиной въ гусиное яйцо; образовавшаяся расширенная полость лѣваго желудочка имѣетъ стѣнки изъ разрушенной мозговой ткани, покрытыя мелкими сгустками крови. Разрушеніе касается также наружныхъ частей лѣваго полосатаго тѣла и лѣваго зрительнаго бугра. Въ правомъ боковомъ желудочкѣ жидкая кровь въ большомъ

количествѣ. Сосуды основанія мозга слегка утолщены, извилисты. На днѣ четвертаго желудочка находится плотный свертокъ крови, величиною почти въ грецкій орѣхъ.

566. Любовь *Шмурова*, 37 л., мѣщ. Беременная въ послѣднемъ періодѣ. Наканунѣ весь день работала, но жаловалась на тяжесть въ ногахъ. 26 янв. 1903 съ утра весь день была на ногахъ, работала по хозяйству. Въ 10 ч. вечера легла, начала тяжело дышать, появился ознобъ и черезъ полчаса умерла.

Вскрытіе 31 янв. 1903. Невысокаго роста, питанія и сложенія за сильнымъ гнилостнымъ вздутіемъ опредѣлить нельзя. Голени и стопы отечны. Величина извлеченной матки $33 \times 22 \times 14,5$ снт., въ полости ея въ плодныхъ оболочкахъ, сохранившихъ воды, помѣщается младенецъ женскаго пола, длиною 49 снт., вѣсомъ 3050,0. Въ желчномъ пузырѣ 13 граненаго вида желчныхъ камней съ лѣсной орѣхъ и 5 меньшей величины. Сердце обильно обложено жиромъ; стѣнка праваго желудочка истончена; лѣвое венозное отверстіе пропускаетъ 3 пальца. Выпуклая поверхность почекъ мелко-зернистая; капсула снимается съ поверхностнымъ слоемъ корковаго вещества; послѣднее истончено. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ имѣется солидный сгустокъ крови, вѣсомъ въ 100,0 слишкомъ. Лѣвый зрительный бугоръ и полосатое тѣло разрушены кровоизліяніемъ. Мелкіе обрывки мозговой ткани помѣщаются между сгустками.

567. Настасья *Борщева*, 67 л., мѣщ., умерла 7 фев. 1903.

Вскрытіе 11 фев. 1903. Средняго роста и сложенія, слабаго питанія. Въ области теменныхъ извилинъ замѣчается атрофическое истонченіе ихъ и соотвѣтственное расширеніе бороздъ, переполненныхъ прозрачной жидкостью. Въ сосудахъ основанія мозга мѣстами замѣтны бѣловатыя толстыя бляшки, а въ артеріяхъ правой Сильвіевой борозды, кромѣ бляшекъ, имѣется двуцвѣтный сгустокъ, довольно плотный. Въ мозговомъ веществѣ правой лобной доли на выпуклой поверхности и со стороны большой мозговой расщелины имѣются участки, пронизанные мелкими точечными красновато-фіолетовыми кровоизліяніями и болѣе обширными, гдѣ на пространствѣ величиною въ грецкій орѣхъ имѣются участки разрушенія коры и подкорковаго вещества мозга буровато-краснаго цвѣта. Таковой же небольшой участокъ имѣется и въ лѣвомъ полушаріи, въ глубинѣ бѣлаго вещества Репліева островка. На поперечномъ разрѣзѣ на мѣстѣ перехода ножекъ мозга въ Вароліевъ мостъ имѣется замѣтное истонченіе участковъ бѣлаго вещества соотвѣтственно двигательнымъ волокнамъ. Сердце много больше двухъ кулаковъ покойной; мышца лѣваго желудочка на разрѣзахъ пестровата, съ бѣловатыми и желтоватыми участками, рѣжется съ хрустомъ, и толщиною около 0,8—0,9 снт.; по краю двустворчатаго клапана имѣются желтоватые узелки, около устьевъ вѣнечныхъ артерій жестковатыя бляшки; стѣнка праваго желудочка мѣстами почти совершенно истончена прорастающимъ снаружи жиромъ. Толщина корковаго слоя почекъ, а равно и высота пирамидокъ рѣзко уменьшена.

568. Эмилія *Гвоздева*, 39 л., вдова чиновника. Вела жизнь нетрезвую, болѣла бѣлой горячкой; была слаба и опухшая. Найдена мертвой въ постели 15 фев. 1903.

Вскрытіе 20 фев. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце 11×11 снт., съ большимъ отложеніемъ жира; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,0 снт., а праваго—0,3; двустворчатый клапанъ утолщенъ и на краяхъ сморщенъ; клапаны аорты также утолщены; отверстія вѣнечныхъ артерій замѣтно сужены и окружены плотными бляшками; внутренняя оболочка аорты бугриста, шероховата и сплошь покрыта объемистыми плотными бляшками; мышца сердца тусклая, дряблая, желтоватая. Содержимое желудка съ бродильнымъ запахомъ.

Подъ мягкой оболочкой на основаніи мозга въ области Вароліева моста и продолговатаго мозга—обширное кровоизліяніе изъ свернувшейся крови. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы. Въ третьемъ желудочкѣ—довольно объемистые кровяные сгустки; на днѣ четвертаго желудочка—объемистые плотные кровяные сгустки.

569. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, 60 л., 18 фев. 1903 поднятъ въ пьяномъ видѣ на площади и по доставленіи въ часть тамъ умеръ.

Вскрытіе 21 фев. 1903. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія и питанія. Сердце увеличено; на сердечной сорочкѣ имѣются перламутроваго вида пятна; толщина стѣнки праваго желудочка доходитъ мѣстами до 0,05 снт., мышца проращена жиромъ; лѣвый желудочекъ толщиною въ 1.0 снт., мышца жестковата съ сѣроватыми полосками на разрѣзѣ. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, пирамидки туповаты, низки и жестковаты. Отъ мозга и отъ содержимаго тонкихъ кишекъ исходитъ спиртный запахъ. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ, а равно и въ третьемъ и немного въ правомъ боковомъ, а также и въ 4-мъ желудочкѣ имѣются темно-красные обильные сгустки крови и жидкая кровь. Лѣвый зрительный бугоръ разрушенъ кровоизліяніемъ, полосатое тѣло подрыто имъ. Сосуды основанія мозга жестки, съ бляшками.

570. Михаилъ *Тереховъ*, 31 г., мѣщ., рабочій электрической дистанціи Ник. ж. д. Водки не пилъ съ тѣхъ поръ, какъ былъ записанъ въ общество трезвости съ 5 мар. 1902. 17 фев. 1903 внезапно заболѣлъ и черезъ 2 часа не приходя въ сознаніе умеръ.

Вскрытіе 22 фев. 1903. Выше средняго роста, средняго тѣлосложенія, слабаго питанія. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, сильно обложено жиромъ, стѣнки желудочковъ утолщены вдвое; мышца довольно плотна; двустворчатый клапанъ и клапаны аорты утолщены и слегка сморщены; на внутренней оболочкѣ аорты, довольно много мелкихъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Мозговыя оболочки сильно наполнены кровью; ткань мозга малокровна. Правый боковой желудочекъ растянутъ излившейся кровью съ плотными сгустками, на границѣ праваго зрительнаго бугра съ полосатымъ тѣломъ мозговое вещество разрушено и размягчено и пропитано мелкими кровяными сгустками; въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ довольно много жидкой крови. На днѣ четвертаго желудочка объемистые плотные кровяные сгустки. Сосуды основанія мозга безъ измѣненій.

571. Ева *Кольберсъ*, 73 л., вдова работника.

Вскрытіе 28 мар. 1903. Невысокаго роста, средняго сложенія, хорошаго питанія. Сердце значительно увеличено, на наружной поверхности его имѣется нѣсколько перламутроваго вида пятенъ; лѣвое венозное кольцо съ трудомъ пропускаетъ 2 пальца; двустворчатый клапанъ по краю утолщенъ, створки его на сосѣдственныхъ мѣстахъ сращены; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,2 снт., мышца съ сѣроватыми полосками; мышца праваго желудочка желтовата, дрябла, проращена жиромъ; полулунные клапаны аорты жестки, нѣсколько сморщены, у устьевъ вѣнечныхъ артерій имѣются бѣловатыя жесткія бляшки; восходящая часть дуги аорты замѣтно расширена и плотновата; вѣнечные сосуды на протяженіи покрыты бляшками. Корковый слой почекъ истонченъ до толщины 0.3 снт., блѣденъ, пирамидки желтоваты, блѣдны, тупы. По извлеченіи мозга въ правой средней и слѣва въ заднихъ черепныхъ ямкахъ найдены жидкая кровь и темные сгустки. Таковое же содержимое имѣется въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ, отчасти въ правомъ, въ третьемъ и четвертомъ. Лѣвое полушаріе мозжечка представляетъ обширный фокусъ свѣжаго разрушенія кровоизліяніемъ со сгустками крови и обрывками мозгового вещества. Сосуды основанія мозга жестковаты, бѣлы.

572. Василій *Ларіоновъ*, 37 л., мѣщ., переплетчикъ, жизнь велъ нетрезвую, ушелъ изъ дому пьянымъ, найденъ мертвымъ на кладбищѣ 6 мая 1903.

Вскрытіе 7 мая 1903. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія и питанія. Сердце значительно увеличено, обложено толстымъ слоемъ жира; стѣнки желудочковъ утолщены, мышцы ихъ буро-красны, довольно плотны; внутрисердечная оболочка утолщена, мутно бѣлаго цвѣта, во многихъ мѣстахъ имѣетъ рубцовыя утолщенія, выдающіяся въ мышечную ткань; двустворчатый клапанъ утолщенъ, заслонки аорты утолщены и сморщены. Содержимое желудка съ кислымъ запахомъ. Подъ легочной плевой во многихъ мѣстахъ мелкія кровоизліянія величиною въ конопляное зерно. Почки немного уменьшены, капсула ихъ снимается съ трудомъ; ткань плотная, отчасти сморщенная. На днѣ четвертаго желудочка находятся три кровоизліянія величиною нѣсколько болѣе коноплянаго зерна; кровоизліянія эти отчасти проникаютъ и въ мозговую ткань.

573. Владиміръ *Либскій*, 48 л., сынъ дьячка, легковой извозчикъ Велъ крайне нетрезвый образъ жизни. Послѣдніе три дня въ ѣзду не выѣзжалъ, а пьянствовалъ. Найденъ мертвымъ на печи 22 сент. 1903.

Вскрытіе 24 сент. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Въ боковыхъ желудочкахъ мозга большое количество кровяныхъ сгустковъ, въ особенности въ правомъ, гдѣ находится сгустокъ величиною съ дѣтскій кулакъ; сгустки весьма плотны и располагаются по преимуществу между полосатымъ тѣломъ и зрительнымъ бугромъ съ правой стороны, гдѣ образовалась полость съ разрыхленными стѣнками мозговой ткани, пропитанной мелкими сгустками крови. Сосуды основанія мозга утолщены. На днѣ 4-го желудочка находятся объемистые мелкія кровоизліянія. Сердце увеличено, мышца желтовата, дрябла; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами бѣловатыя плотныя бляшки, стѣнки вѣнечныхъ артерій утолщены, мало эластичны.

574. Николай *Балашовъ*, 44 л., служитъ въ мясной лавкѣ. Около недѣли ежедневно предавался сильному пьянству, пищи употреблялъ очень мало. Найденъ мертвымъ въ постели 22 сент. 1903.

Вскрытіе 25 сент. 1903. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Въ полости лѣваго желудочка мозга находится громадное скопленіе крови съ плотными сгустками, въ правомъ желудочкѣ также находится мало жидкой крови; сгустки въ лѣвомъ желудочкѣ помѣщаются въ полости, образованной изъ разрушенной мозговой ткани, стѣнки которой разрыхлены и пропитаны мелкими кровоизліяніями. Разрушеніе касается лѣваго полосатаго тѣла и зрительнаго бугра. Сосуды основанія мозга утолщены, мутно-бѣловатаго цвѣта. Въ полости 4-го желудочка находятся объемистые сгустки крови. На днѣ его кровоизліяніе величиною въ чечевичное зерно. Сердце значительно увеличено въ объемѣ и обложено жиромъ, стѣнки желудочковъ утолщены, мышца ихъ желто-красновата, дрябла; на внутренней оболочкѣ аорты находятся довольно объемистыя плотныя бѣловатыя бляшки. Почки немного увеличены, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, пирамидки темно-красны.

575. Модестъ *Трофимовъ*, 45 л., крест., чернорабочій. Предавался сильному пьянству. 5 дек. 1903 поднятый въ пьяномъ видѣ на улицѣ доставленъ въ пріемный покой, гдѣ и умеръ.

Вскрытіе 8 дек. 1903. Роста ниже средняго, средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце значительно увеличено и обложено жиромъ; стѣнки желудочковъ утолщены, мышца тускла, сѣровато-желтовата, трехстворчатый клапанъ утолщенъ и мутенъ, клапаны аорты также утолщены, слегка сморщены, отверстія вѣнечныхъ артерій су-

жены, едва пропускаютъ обыкновенный зондъ. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ большимъ трудомъ, корковый слой утолщенъ, пирамидки укорочены, ткань плотна. Полости боковыхъ желудочковъ сильно расширены, въ особенности лѣваго, и наполнены красноватой жидкостью. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы. На днѣ 4-го желудочка находится кровоизліяніе изъ свернувшейся крови. Дно 4 желудочка неправильно разорвано кровоизліяніемъ, которое помѣщается въ толщѣ продолговатаго мозга и имѣетъ видъ кругловатой полости величиною съ малый грецкій орѣхъ, стѣнки полости состоятъ изъ разорванной мозговой ткани.

576. Иванъ *Павловъ*, 42 л., мѣщ., чернорабочій. Сильно пьянствовалъ, съ работы домой возвращался всегда пьянымъ. Наканунѣ былъ особенно пьянъ и легъ спать, 8 фев. 1904 рано утромъ его все что-то коробило, а часовъ въ 10 умеръ.

Вскрытіе 10 фев. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Изъ брюшной и грудной полости и отъ крови сердца чувствуется ясный запахъ спирта. Сердце немного увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира; стѣнки желудочковъ утолщены, мышца блѣдно-красна, тускла; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами небольшое количество бѣловатыхъ мелкихъ плотныхъ бляшекъ; стѣнки вѣнечныхъ артерій мѣстами уплотнены, на протяженіи ихъ имѣются бѣловатыя плотныя бляшки. На слизистой оболочкѣ гортани ниже истинныхъ голосовыхъ связокъ находятся мелкія кровоизліянія. Въ верхушкахъ легкихъ находятся плотные на ощупь узлы, въ разрѣзахъ сѣроватобѣлаго цвѣта; кромѣ того находятся кругловатыя полости величиною въ горошину, наполненныя сѣровато-бѣловатыми маркими массами. Сосуды основанія мозга склерозированы. Въ полости четвертаго желудочка находятся объемистые кровяные свертки. Въ толщѣ верхней части продолговатаго мозга имѣется полость величиною съ грецкій орѣхъ, заполненная кровью съ плотными сгустками; стѣнки полости разрыхлены и пропитаны сгустками крови.

577. Петръ *Ерофѣевъ*, 31 г., крест. Постоянно болѣлъ, съ нимъ были параличные удары, одинъ въ іюлѣ, а другой въ дек. 1903. 24 фев. 1904 съ нимъ сдѣлался третій параличный ударъ, отъ котораго онъ и умеръ въ больницѣ. Послѣ второго удара около недѣли оставался нѣмъ.

Вскрытіе 29 фев. 1904. Высокаго роста, средняго тѣлосложенія, слабаго питанія. Въ сосудахъ и пазухахъ мозговыхъ оболочекъ большое количество крови. Подъ мягкой мозговой оболочкой на основаніи мозга, мозжечка и продолговатаго мозга находится обширное кровоизліяніе изъ свернувшейся крови. Сосуды основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта, стѣнки ихъ утолщены, въ особенности въ позвоночныхъ и основной артеріяхъ; при сліяніи позвоночныхъ артерій въ основную, нѣсколько выше, находится расширеніе величиною съ горошину съ истонченіемъ стѣнокъ и съ отверстіемъ съ правой стороны, пропускающимъ зондъ; на артеріяхъ Сильвіевой борозды имѣются бѣловатыя мелкія плотныя бляшки. Ткань мозга нѣсколько уплотнена, малокровна. Боковые желудочки сильно растянуты, въ особенности лѣвый, кровянистой жидкостью, въ которой плаваютъ сгустки крови. Сердце значительно увеличено и обложено жиромъ; стѣнки желудочковъ утолщены вдвое, мышца блѣдно-красно-желтовата; на внутренней поверхности аорты надъ клапанами нѣсколько мелкихъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ; отверстія вѣнечныхъ артерій замѣтно сужены. Почки немного увеличены, капсула ихъ снимается съ трудомъ, пирамидки укорочены; ткань довольно плотная.

578. Иванъ *Павловъ*, 39 л., крест., приказчикъ мясной лавки. Ранѣе много выпивалъ, но послѣдній годъ былъ замѣтно боленъ, жалуясь на боль въ груди. 1 март. 1904 сдѣлалось дурно, покачнулся, сталъ хрипѣть, въ безпамятствѣ отправили въ больницу, доставленъ уже мертвымъ.

Вскрытіе 5 март. 1904. Выше средняго роста, средняго сложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено; мышца блѣдно-желтовата, толщина стѣнки праваго желудочка—0,3 снт., лѣваго—1,4; по краю двустворчатаго клапана имѣются полупросвѣчивающія розоватыя утолщенія и болѣе плотныя бѣловатыя. Капсула почекъ снимается легко, корковый слой мѣстами немного истонченъ, на разрѣзѣ сальнаго блеска, окололоханочный жиръ разросся; на слизистой ихъ немного точечныхъ мелкихъ кровоподтековъ. Въ правомъ чечевицеобразномъ тѣлѣ имѣется мелкая, не больше просяного зерна, кругловатая опухоль, легко вынутая концомъ ножа изъ мозговой ткани (миліарная аневризма). Въ задней части 3-го желудочка видны темные кровяные сгустки, пронизывающіе также правую ножку мозга, толщу Вароліева моста и переднюю часть продолговатаго мозга. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы.

579. Карлъ *Энгстремъ*, 63 л., финлянд. уроженецъ. 7 март. 1907 въ 6 ч. вечера легъ спать, черезъ нѣкоторое время сталъ храпѣть и не смотря на попытки разбудить, не просыпался, въ 12 ч.—рвота и смерть.

Вскрытіе 10 март. 1904. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. На основаніи мозга съ правой стороны Вароліева моста имѣется разрывъ ткани, величиною нѣсколько болѣе боба, изъ разрыва торчитъ объемистый сгустокъ крови. На наружной поверхности лѣвой лобной доли имѣются также надрывы мозговой ткани, покрытые сгустками крови. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы. Въ лѣвой затылочной долѣ имѣется разрывъ ткани въ видѣ полости величиною въ грецкій орѣхъ, заполненной плотными кровяными сгустками; въ толщѣ Вароліева моста и продолговатаго мозга имѣется также полость въ грецкій орѣхъ, также заполненная плотными кровяными сгустками; стѣнки обѣихъ полостей состоятъ изъ разорванной мозговой ткани, покрытой мелкими кровяными сгустками. Въ правой лобной долѣ имѣется полость въ лѣсной орѣхъ, содержащая желтоватую жидкость; стѣнки полости довольно гладки, плотны. На днѣ 4-го желудочка имѣются мелкія кровоизліянія. Сердце увеличено вдвое, стѣнки желудочковъ значительно утолщены, мышца ихъ блѣдно-красна съ рѣзкой желтизной, дрябла; на внутренней оболочкѣ аорты большое количество бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ; отверстія вѣнечныхъ артерій сильно сужены, стѣнки ихъ утолщены, съ большимъ количествомъ плотныхъ бляшекъ. Почки уменьшены, капсула ихъ снимается съ нѣкоторымъ трудомъ, корковый и пирамидальный слои истончены, плотны.

580. Матрена *Евлампіева*, 63 л., крест. Недѣлю назадъ у нея умеръ скоропостижно взрослый сынъ, послѣ чего все время очень скучала и замѣтно стала слабѣть, очень мало принимала пищи, а послѣдніе два дня почти совсѣмъ не ѣла, жалуясь на сильную головную боль. Днемъ 8 мая 1904 найдена въ безсознательномъ состояніи и вскорѣ умерла.

Вскрытіе 11 мая 1904. Ниже средняго роста, средняго тѣлосложенія, слабаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено; стѣнки желудочковъ утолщены, мышца блѣдно-красно-желтовата, дрябла; двустворчатый клапанъ и клапаны аорты мутноваты, утолщены; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами немного мелкихъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Подъ мягкой мозговой оболочкой на всемъ основаніи мозга и на поверхности мозжечка большое количество излившейся и свернувшейся крови; сосуды основанія мозга рѣзко расширены, значительно склерозированы. Въ полости 3-го желудочка—довольно объемистый сгустокъ темно-красной крови.

581. Анатолій *Нечаевъ*, на видъ около 45 лѣтъ, подполк., страдающій

прогрессивнымъ параличемъ, поступилъ въ клинику 26 сент. 1904 въ сопорозномъ состояніи, установившемся послѣ апоплектоиднаго припадка, и черезъ 12 часовъ умеръ.

Вскрытіе 29 сент. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Зрачки неравномѣрны: правый умѣренно расширенъ, лѣвый сильно суженъ. На половомъ членѣ съ лѣвой стороны въ бороздкѣ имѣется овальный рубецъ съ неровными краями, бѣлаго цвѣта, подвижной, около 0.5 снт. въ діаметрѣ. Вѣсъ головного мозга 1550,0 гр., размѣры 20×17×8 снт. Въ правой затылочной долѣ, въ самой задней части ея, подъ мягкой мозговой оболочкой и въ извилинахъ находится полость, величиною съ бобъ, заполненная излившеюся и свернувшеюся въ видѣ довольно плотныхъ сгустковъ кровью. Въ правомъ зрительномъ бугрѣ, въ задненаружной его части находится два точечныхъ кровоизліянія. Сосуды основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта, довольно эластичны. Сердце 13×12×3,5 снт., обложено толстымъ слоемъ жира; толщина стѣнокъ 1,5 и 0,2 снт., мышца блѣдно-красно-желтовата, довольно плотна, на внутренней оболочкѣ аорты довольно большое количество мелкихъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, ткань плотная, лоханки расширены и заполнены жировою тканью.

582. Неизвѣстнаго званія *женщина*, 65 л., 25 окт. 1904 полусидѣла на ступенькѣ парадной лѣстницы въ безсознательномъ состояніи, отправленная въ больницу, въ тотъ же день умерла тамъ.

Вскрытіе 29 окт. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, достаточнаго питанія. При сниманіи черепной крышки въ изобиліи выдѣлились темные сгустки и кровь; часть основанія правой височной доли съ поверхности—въ мозговыхъ оболочкахъ также пропитана кровью. Сосуды основанія мозга имѣютъ много бѣлыхъ бляшекъ и мѣстами даже закупорены. Сосуды оболочекъ переполнены кровью. Въ обоихъ боковыхъ желудочкахъ и въ 3-мъ имѣются кровь и сгустки. Основаніе праваго бокового желудочка разрушено, здѣсь мозговая ткань клочьями перемѣшана со сгустками крови. Кровь проникаетъ и въ 4-ый желудочекъ. Второе гнѣздо кровоизліянія имѣется въ правой половинѣ Вароліева моста. Мышца сердца жестковата; вдоль лѣваго венознаго кольца и на клапанахъ аорты имѣются известковыя жесткія отложенія. Въ почкахъ явленія развитія соединительной ткани.

583. Яковъ *Рубашевскій*, 68 л., мастеръ СПБ. арсенала. 30 дек. 1904 доставленъ въ госпиталь въ безсознательномъ состояніи, съ прерывистымъ дыханіемъ, синюхой; рвота пищевыми массами; зрачки сужены; артеріосклерозъ; не приходя въ сознаніе, умеръ.

Вскрытіе 3 янв. 1905. Роста выше средняго, питанія удовлетворительнаго. При извлеченіи мозга вытекаетъ много водянистой жидкости. Стѣнки артерій основанія мозга довольно рѣзко и неравномѣрно утолщены; на основной—бляшки съ чечевичное зерно, этотъ сосудъ и позвоночная артерія широки и извилисты, на артеріяхъ Сильвіевой борозды многочисленныя бѣлыя бляшки. Въ области четверохолмія и передней части ромбовидной ямки найдена излившаяся кровь, смѣшанная съ обрывками мозговой ткани, все вмѣстѣ образуетъ очагъ величиною съ грецкій орѣхъ, проникающій въ толщу Вароліева моста. Сердце нѣсколько увеличено, 13×13 снт.; на внутренней оболочкѣ аорты немного фиброзныхъ утолщеній; стѣнка лѣваго желудочка достигаетъ 1,5 снт. толщины. Почки немного увеличены, корковый слой мѣстами тонокъ, на поверхности встрѣчаются наполненныя вены, мѣстами границы съ пирамидами неясны; ткань блѣдная, бѣловатая, пирамиды окрашены блѣднѣе корки.

584. Зинаида *Степанова*, 64 л., крест., скоропостижно умерла 21 окт. 1906.

Вскрытіе 26 окт. 1906. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и

питанія. Сердце нѣсколько увеличено, значительно обложено жиромъ, дрябловато; на внутренней оболочкѣ аорты и двустворчатомъ клапанѣ нѣсколько сѣровато-бѣловатыхъ бляшекъ различной величины; такія же бляшки на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій, мышца тускловата съ буроватымъ оттѣнкомъ. Въ подпаутинныхъ пространствахъ большое количество красноватой жидкости. Желудочки мозга растянуты большимъ количествомъ свернувшейся темной крови; ткань прилежащей части зрительныхъ бугровъ представляется разрушенной, размягченной. Сосуды основанія значительно склерозированы.

585. Павелъ *Прокофьевъ*, 43 л., крест., легковой извозчикъ, въ настоящее время не имѣющій опредѣленнаго мѣстожительства и занятій. Образъ жизни велъ трезвый, жаловался на боль въ ногахъ. 9 нояб. 1906 вечеромъ пришелъ въ баню и спустя минутъ 20 нахожденія въ парильной упалъ на полъ и черезъ ½ часа умеръ.

Вскрытіе 13 нояб. 1906. Высокаго роста, средняго сложенія, умѣреннаго питанія. Лѣвое яичко увеличено въ объемѣ. Замѣчается припухлость околосуставныхъ тканей въ области лѣваго колѣннаго, голеностопнаго и отчасти лучезапястнаго суставовъ. Въ пазухахъ много жидкой крови; въ сосудахъ мягкой—крови мало. Боковые желудочки заполнены кровянистою жидкостью, а правое полосатое тѣло и прилежащія части разрушены кровоизліяніемъ: здѣсь имѣется сгустокъ крови, величиною почти въ полкулака; по удаленіи его мозговое вещество представляется въ видѣ обрывковъ, перемѣшанныхъ съ плотно приставшими сгустками крови, несмываемыми струей воды; на разрѣзахъ, части, прилежащія къ внутренней капсулѣ, пропитаны мелкими кровоизліяніми и представляются въ видѣ фіолетовыхъ участковъ. Въ ткани моста и дна 4-го желудочка имѣется второе гнѣздо кровоизліянія въ видѣ темно-красныхъ полосъ и сгустковъ вдоль слоевъ мозговой ткани. Сосуды основанія мозга бѣлесоваты, на разрѣзахъ слегка зіяютъ. Сердце больше 2 кулаковъ покойнаго, по краю двустворчатаго клапана наблюдается утолщеніе, особенно на сосѣдственныхъ мѣстахъ обоихъ клапановъ; мускулатура жестковата и на разрѣзѣ нѣсколько пестра, стѣнка праваго желудочка сильно проращена жиромъ; дуга аорты расширена, на стѣнкахъ много бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Въ обоихъ легкихъ верхнія доли рѣзко уплотнены, рѣжутся съ хрустомъ; на разрѣзахъ видно много сѣроватыхъ бугорковъ, видны расширенные бронхи, а вверху мѣстами и полости величиною въ горошину, выполненныя распадомъ. Въ тонкихъ кишкахъ мѣстами попадаются поперечно-расположенныя съ подрытыми краями и сѣроватымъ дномъ язвочки. Почки слегка увеличены, капсула снимается съ трудомъ, корковый слой неравномѣрно утолщенъ, окололоханочный жиръ разросся. Придатокъ лѣваго яичка весьма плотный и утолщенный, содержитъ гнѣздо сыровиднаго размягченія бѣлаго цвѣта. Синовіальная оболочка лѣваго колѣннаго сустава утолщенная, влажная, сочная, замѣчается расширеніе ея сосудцевъ кровью.

586. Настасья *Сергѣева*, около 50 л., вдова колл. асс., скоропостижно умерла въ Клин. В. Госп. 7 дек. 1906.

Вскрытіе 9 дек. 1906. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце значительно увеличено, сильно обложено жиромъ, очень дряблое; на двустворчатомъ клапанѣ находятся сѣровато-желтоватыя бляшки, величиною съ чечевичное зерно; вѣнечныя артеріи нѣсколько зіяютъ, жестковаты; мышца очень дрябла, свѣтлоглинистаго цвѣта. Въ продольной пазухѣ твердой мозговой оболочки темно-красный свертокъ крови; мягкая мозговая оболочка очень сочная, сильно полнокровная. Желудочки мозга сильно растянуты находящейся въ нихъ темно-красной свернувшейся кровью; стѣнки желудочковъ, особенно третьяго, разрушены излившейся кровью. Сосуды

основанія мозга склерозированы. Въ желчномъ пузырѣ находится 58 камешковъ зеленовато бураватаго цвѣта.

587. Ненаблюдавшаго звали *женщина*. около 50 л., 6 янв. 1907 г. поднятый въ безчувственно-пьяномъ видѣ, умеръ.

Вскрытіе 11 янв. 1907. Роста выше средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, довольно дрябловато. Клапаны двустворки нѣсколько утолщены, значительно обложено жиромъ, утолщены; на внутренней обшивкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находится нѣсколько плотноватыхъ склерозныхъ бляшекъ, величиной до чечевичнаго зерна; мышца сердца бѣловатыхъ бляшекъ, величиной до чечевичнаго зерна; мышца сердца бѣловатыхъ бляшекъ, величиной до чечевичнаго зерна; мышца сердца бѣловатыхъ бляшекъ, величиной до чечевичнаго зерна; мышца сердца бѣловатыхъ бляшекъ, величиной до чечевицы; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 сант. Аневризмъ нѣтъ. Клапаны аорты и легочной артеріи нормальны. Въ области лѣвой Сильвіевой ямки въ задней части мозга, въ области лѣвой Сильвіевой ямки темной кровью. Поверхность верхняго червячка мозжечка пропитано темной кровью. Полости боковыхъ и третьяго желудочка наполнены большими рыхлыми темно-красными свертками; стѣнки желудочковъ представляются отчасти разрушенными, покрыты кашицеобразной массой мозгового вещества, смѣшанною съ кровью. Въ полости 4-го желудочка немного жидкой смѣшанной

внутренняя поверхность твердой мозговой оболочки въ этомъ мѣстѣ покрыта красноватыми отложеніями съ развитыми сосудами на пространствѣ величиной съ серебряный рубль. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы. На правой сторонѣ грудной клѣтки ребра 6—9 оказались надломанными по передней подмышковой линіи; въ прилежащихъ къ надломамъ мягкихъ тканяхъ замѣчается небольшое пропитываніе темной кровью; ребра вообще тонки и хрупки, ломаются даже при небольшомъ насиліи.

594. Иванъ *Балашовъ*, л. 31, крест., скоропостижно умеръ въ арестномъ помѣщеніи дер. Волковой 21 снт. 1908.

Вскрытіе 25 снт. 1908. Роста выше средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія и умѣреннаго питанія. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ, дрябло. Желудокъ довольно большой; отъ содержимаго его и отъ мозга—рѣзкій спиртный запахъ. Между твердою и мягкою мозговыми оболочками соотвѣтственно затылочной и отчасти теменной долѣ лѣваго полушарія находится слой темной крови съ рыхлыми сгустками. Сосуды мягкой оболочки сильно наполнены кровью. Сосуды основанія мозга извиты.

595. Катерина *Анисимова*, 52 л., финлянд. урож. Не имѣла постояннаго мѣстожительства, просила милостыню и ежедневно была пьяная. Найдена на заднемъ дворѣ мертвою 20 снт. 1908.

Вскрытіе 26 снт. 1908. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. Сосуды мягкой наполнены кровью вплоть до мельчайшихъ развѣтвленій. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ находится довольно много темной крови, въ остальныхъ желудочкахъ много красноватой жидкости. На границѣ зрительнаго бугра и полосатаго тѣла находится полость съ неровными стѣнками величиной съ голубиное яйцо, выполненная темною кровью съ обильными кровяными свертками и обрывками разрушеннаго мозгового вещества. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы. Сердце увеличено раза въ 2, очень дряблое, сильно обложено жиромъ, мышца почти сплошь проросла жиромъ; на внутренней оболочкѣ аорты имѣются бѣловатыя плотноватыя бляшки.

596. Василій *Александровъ*, 19 л., крест., скоропостижно умеръ 7 окт. 1908.

Вскрытіе 8 окт. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Въ правомъ полушаріи находится полость сейчасъ же кнаружи отъ полосатаго тѣла, достигающая почти наружной поверхности лобной доли у Сильвіевой борозды, величиной съ куриное яйцо, выполненная кровяными сгустками и свертками, смѣшанными съ частицами мозгового вещества. Въ желудочкахъ мозга находится около чайной ложки прозрачной жидкости. Въ правой артеріи Сильвіевой борозды находится фибринозный свертокъ длиною около 1,0 снт. Сердце немного увеличено, на двустворчатомъ клапанѣ и на клапанахъ аорты имѣются довольно плотныя бородавчатыя разращенія, величиной до большой горошины, на одномъ клапанѣ аорты находится отверстіе величиной съ серебряный пятачекъ, прикрытое бородавчатымъ разращеніемъ; другой клапанъ представляется нарушеннымъ въ своей цѣлости, начиная отъ свободнаго края на 0,2 снт. внизъ; мышца сердца дрябловата, тусклая, толщина стѣнки праваго желудочка около 0,3 снт., лѣваго—1,2.

597. Тимофей *Заварзаевъ*, 56 л., крест., легковой извозчикъ. Жаловался на удушье; иногда пилъ водку. 11 окт. 1908 пришелъ домой вечеромъ выпивши и легъ спать, черезъ нѣсколько часовъ обнаружили его мертвымъ.

Вскрытіе 14 окт. 1908. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Въ лѣвомъ полушаріи мозга соотвѣтственно полосатому тѣлу оказалась полость величиной съ яблоко, выполненная темнокрасными

кровяными сгустками, въ которыхъ можно различить обрывки мозговой ткани. Желудочки мозга сильно растянуты кровяными темнокрасными сгустками; въ 4-мъ желудочкѣ кровяной сгустокъ величиной съ голубиное яйцо. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, довольно сильно обложено жиромъ; клапаны аорты нѣсколько сморщены, утолщены, при гидростатической пробѣ пропускали воду; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,7 снт., лѣваго—около 2,5; мышца имѣетъ пестрый видъ, на темнобуромъ фонѣ бѣловатыя прослойки.

598. Михей *Синица*, 58 л., крест., чернорабочій. 21 окт. 1908 пришелъ утромъ въ гости, былъ слабъ и на ногахъ держаться не могъ, говоря что ему дурно, легъ на полъ, гдѣ его рвало и били судороги, черезъ часъ умеръ.

Вскрытіе 25 окт. 1908. Выше средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце раза въ $1^1/_2$ больше кулака покойнаго, сильно обложено жиромъ, дряблое; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются многочисленныя бляшки, по мѣстамъ объизвествленныя, мѣстами изъязвившіяся; мышца сердца очень дряблая, глинистаго цвѣта. Сосуды мягкой мозговой оболочки довольно сильно наполнены кровью. Соотвѣтственно правому полосатому тѣлу въ мозгу находится полость, величиною съ голубиное яйцо, съ неровными, какъ бы рваными стѣнками, выполненная темнокраснымъ кровянымъ сгусткомъ, смѣшаннымъ съ обрывками мозговой ткани. Во всѣхъ желудочкахъ могла находится частью жидкая, частью свернувшаяся кровь. Сосуды основанія мозга склерозированы.

599. Антонъ *Петровъ*, 73 л., мѣщ., чернорабочій, послѣдніе годы по старости и слабости здоровья ничѣмъ не занимался, существовалъ благотворительною помощью, ночевалъ всегда по ночлежнымъ домамъ; пьянствовалъ. 28 окт. 1908 приглашенный для укладки дровъ во время работы неоднократно уходилъ со двора, а затѣмъ въ послѣдній разъ около 12 час. дня явился во дворъ въ совершенно пьяномъ видѣ и не только не могъ работать, но даже не могъ стоять на ногахъ, отчего былъ отправленъ въ часть для вытрезвленія, гдѣ и умеръ.

Вскрытіе 3 нояб. 1908. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Въ правомъ полушаріи мозга, соотвѣтственно большимъ мозговымъ узламъ, находится полость величиною въ яблоко, съ неровными, какъ-бы рваными стѣнками; въ этой полости находятся рыхлые кровяные сгустки, смѣшанные съ обрывками мозгового вещества. Въ желудочкахъ мозга—частью жидкая, частью свернувшаяся кровь. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце нѣсколько увеличено, на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются обильныя бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца сердца буровата.

600. Кузьма *Клементьевъ*, 52 л., столяръ. 12 февр. 1909 утромъ сонный застоналъ и свалился съ постели; положенный на кровать и немного оправившись, выпилъ чаю и сказалъ, что онъ «весь разстроенъ», около 7 ч. вечера, лежа на кровати сильно захрапѣлъ и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 19 февр. 1909. Роста выше средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Въ лѣвомъ полушаріи, соотвѣтственно полосатому тѣлу, находится полость, величиною съ яблоко, съ неровными, какъ-бы рваными стѣнками, она наполнена свернувшейся кровью, смѣшанной съ обрывками мозгового вещества. Въ мозговыхъ желудочкахъ находится около чайной ложки темной крови. Въ окружности Сильвіева водопровода мозговое вещество пропитано темной кровью снт. на 0,2. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы. Сердце нѣсколько увеличено, дрябловато; на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій имѣются плотноватыя бляшки.

601. Афиногенъ *Богдановъ*, 50 л., крест. Каждый день приходилъ домой въ пьяномъ видѣ. Скоропостижно умеръ вечеромъ 16 окт. 1909.

Вскрытіе 20 окт. 1909. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Въ продолговатомъ мозгу тотчасъ подъ дномъ 4-го желудочка находится полость величиною съ воробьиное яйцо, выполненная сгусткомъ крови, смѣшанной съ обрывками мозгового вещества. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, сильно обложено жиромъ; вѣнечныя артеріи прощупываются, какъ плотные шнурки, просвѣтъ ихъ по мѣстамъ суженъ почти до полнаго уничтоженія; мышца дрябла, глинистаго цвѣта. Желудокъ нѣсколько вздутъ, почти доходитъ до пупка, въ немъ около 300 к.с. пищевой кашицы съ запахомъ бродящаго тѣста.

602. Ѳеофила *Костерская*, 65 л. 29 окт. 1909 ѣла собранные на пустопорожнемъ мѣстѣ грибы, съ ней сдѣлалось дурно, начало рвать и вскорѣ умерла.

Вскрытіе 3 нояб. 1909. Роста средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Правый уголъ рта опущенъ. Зрачекъ лѣваго глаза шире праваго. Мягкая мозговая оболочка на основаніи мозга, отчасти и на боковыхъ поверхностяхъ, пропитана темной кровью до 0,5 снт. Желудочки мозга, особенно 4-й сильно растянуты темною, частью свернувшейся кровью. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце немного увеличено, сильно обложено жиромъ; вѣнечныя артеріи прощупываются какъ толстые плотные шнурки; на внутренней оболочкѣ аорты, вѣнечныхъ артерій и на двустворкѣ имѣются бѣловатыя плотныя бляшки; мышца бурокрасная; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—около 0,5. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, оставляя неравномѣрно-бугристую поверхность, ткань довольно плотна, корка истончена.

Давленіе на сердце.

Разрывъ сердца или аорты.

603. Венедиктъ *Мержвинскій*, 50 л., двор. Найденъ 19 янв. 1900 мертвымъ во дворѣ, изъ носа и ушей текла кровь. Послѣдній мѣсяцъ жаловался на боль въ ногахъ, груди и головѣ; часто заговаривался.

Вскрытіе 22 янв. 1900. Выше средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Черепъ разбитъ на многочисленные мелкіе осколки. Переломъ всѣхъ реберъ, переломъ позвоночнаго столба въ двухъ мѣстахъ. Всѣ кости черепа порозны и хрупки. Въ полости околосердечной сумки находится 450 к. см. жидкой крови. Сердце увеличено въ объемѣ, съ большими отложеніями жира снаружи, полости пусты; стѣнки желудочковъ утолщены, плотны, бурокраснаго цвѣта. Двустворчатый клапанъ утолщенъ и мутенъ; у начала аорты надъ клапанами на наружной стѣнкѣ находится поперечный разрывъ длиною въ 6 снт., проникающій черезъ всю толщу стѣнки. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой утолщенъ и блѣденъ; пирамидки переполнены кровью.

604. Иванъ *Федоровъ*, 60 л., крест., каменотесъ. Скоропостижно умеръ 2 февр. 1900. Изрѣдка выпивалъ, въ общемъ жизнь велъ трезвую. Послѣдніе дни жаловался на боль въ груди.

Вскрытіе 4 февр. 1900. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, питанія слабаго. Въ полости околосердечной сумки находится 400 к. см. крови, отчасти жидкой, отчасти съ плотными темными сгустками. Сердце увеличено въ объемѣ, на наружной поверхности покрыто большими отложеніями жира; полости его пусты; на задней поверхности, на границѣ желудочковъ находится продольный разрывъ стѣнки лѣваго желудочка длиною въ 4 снт.; края разрыва неправильной формы, покрыты плотными кровянистыми сгустками, стѣнки желудочковъ

истончены, мышцы ихъ дряблы, буро-желтаго цвѣта. Печень значительно уменьшена въ объемѣ; капсула ея мутна и утолщена. Корковый слой почекъ утолщенъ, пирамидки укорочены, ткань плотна. Сосуды основанія мозга съ мутно-бѣлыми бляшками, плохо спадаются.

605. Дарья *Кузнецова*, 35 л., крест., фабричная. 8 мар. 1900 скоропостижно умерла на фабрикѣ, въ катушечномъ отдѣленіи. Жаловалась часто на боль подъ ложечкой и въ груди, вела жизнь нетрезвую.

Вскрытіе 11 мар. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Въ полости сердечной сумки находится около 500 к. с. крови, состоящей изъ плотныхъ кровяныхъ сгустковъ. Сердце немного увеличено въ объемѣ, съ большими отложеніями жира; полости его пусты; стѣнки желудочковъ истончены, мышцы желтоваты, дряблы. Внутренняя оболочка аорты представляется шероховатой и изрытой возвышеніями и углубленіями желто-бѣловатаго цвѣта; углубленія съ подрытыми краями; на дугѣ аорты имѣется щелевидный разрывъ; всѣ стѣнки его длиною около $1^1/_2$ снт. покрыты свертками крови.

606. Иванъ *Садовой*, 47 л., крест., кучеръ. 2 окт. 1900 найденъ мертвымъ въ конюшнѣ. Сильно кашлялъ.

Вскрытіе 4 окт. 1900. Выше средняго роста, средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Въ полости околосердочной сумки находится около 600 к. см. кровяной жидкости съ плотными сгустками, которые облегаютъ все сердце и совершенно его сдавили. Сердце увеличено; стѣнки желудочковъ утолщены, дряблы, съ ясно-желтоватымъ оттѣнкомъ. Дуга аорты значительно расширена, стѣнки ея истончены, на ощупь тверда во многихъ мѣстахъ; на внутренней поверхности ея замѣчаются большія отложенія известковыхъ твердыхъ бляшекъ; вся она какъ бы изрыта и покрыта сгустками, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ стѣнкѣ находятся выпячиванія, величиной въ бобъ, гдѣ стѣнки истончены до просвѣчиванія; въ одномъ изъ такихъ выпячиваній на наружной правой периферіи находится разрывъ стѣнки въ видѣ поперечной щели длиною въ 3 мм.; разрывъ этотъ покрытъ сгустками. Въ подкожной клѣтчаткѣ нижнихъ конечностей на разрѣзѣ замѣчается водяночная жидкость въ значительномъ количествѣ. Корковый и пирамидальный слои почекъ истончены, ткань плотна.

607. Петръ *Смолинъ*, 19 л., крест., булочникъ. Жизнь велъ трезвую. 13 янв. 1901 разговаривая, моментально схватился за грудь, сказалъ, что сердце болитъ, и тутъ же упалъ на полъ и вскорѣ умеръ. Ранѣе жаловался, что у него болитъ сердце.

Вскрытіе 20 янв. 1901. Высокаго роста, весьма крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сосуды мягкой мозговой оболочки переполнены кровью. Сердце нѣсколько увеличено, имѣетъ форму приблизительно шаровидную; околосердечная сумка наполнена свернувшеюся кровью, около 600 к. см. Стѣнка лѣваго желудочка достигаетъ почти 2 снт.; заслонки аорты утолщены и слегка сморщены; внутренняя оболочка аорты гладкая, на ней на 1 снт. выше заслонокъ снаружи и спереди имѣется щелевидное отверстіе, расположенное вертикально, длиною около 0,5 снт., проникающее черезъ внутреннюю мышечную оболочку; эта послѣдняя отслоена отъ наружной оболочки сосуда, причемъ образовалась полость величиною въ половину куринаго яйца, наполненная свернувшейся кровью. Снаружи на поверхности сосуда, латерально почти у прикрѣпленія околосердія находится неправильное щелевидное отверстіе, величиною въ чечевичное зерно, соединяющее полость описаннаго мѣшка съ околосердечною сумкою. Печень увеличена, капсула ея повсюду представляетъ бѣловатыя утолщенія. Корковый слой почекъ утолщенъ, пирамидки укорочены. Солитарныя железы въ подвздошномъ отдѣлѣ увеличены до просяного зерна. Брыжжеечныя железы увеличены почти до лѣсного орѣха, ткань ихъ темно-краснаго цвѣта.

608. Арсеній *Алексѣевъ*, 70 л., крест. Трезвый, часто жаловался на боль въ груди. 11 мар. 1901 пріѣхалъ въ 2 ч. дня изъ провинціи погостить къ племяннику; немного погодя отправился навѣстить знакомыхъ и возвратился около 8 час. вечера, легъ на кровать, жалуясь на боль въ груди; немного спустя сталъ храпѣть и впалъ въ безсознательное состояніе, и въ 11 часу умеръ.

Вскрытіе 13 мар. 1901. Въ сердечной сорочкѣ найдено 250 к. см. крови и сгустокъ объемомъ въ 220 к. см.; полости почти пусты. На передней поверхности лѣваго желудочка имѣется выпячиваніе съ $^1/_2$ куринаго яйца, а на выпуклости послѣдняго эксцентрично, вблизи перегородки желудочковъ, неправильнаго вида линейная щель длиною около 1,5 снт., продольная, края ея пропитаны кровью; мускулатура желудочковъ съ желтоватымъ оттѣнкомъ; вовсе желтый цвѣтъ и чрезвычайно дряблую консистенцію она имѣетъ въ стѣнкѣ лѣваго желудочка въ области выпячиванія. Свнутри это выпячиваніе (aneurisma cordis) прикрыто плотнымъ сгусткомъ, сѣровато-краснымъ, неправильно-слоистаго строенія, плотно укрѣпленнымъ среди перекладинъ; двустворчатый клапанъ по краю утолщенъ и сморщенъ; вѣнечныя артеріи мѣстами сужены вслѣдствіе развитія омѣлѣвшихъ бляшекъ; аорта рѣзкихъ измѣненій не представляетъ.

609. Василій *Андреевъ*, 48 л., ремесл. Опредѣленныхъ занятій и мѣста жительства не имѣлъ, велъ нетрезвый образъ жизни, постоянно жаловался на боль въ груди, кашлялъ. 10 нояб. 1901 найденъ въ клозетѣ на полу хрипѣвшимъ, немного спустя умеръ.

Вскрытіе 14 нобя. 1901. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Половой членъ, мошонка и нижнія конечности сильно отечны. Въ полости брюшины большое количество водяночной красноватой жидкости. Въ желудкѣ 500 к. см. пищевой смѣси, полость желудка расширена, стѣнка истончена. Въ полости околосердечной сумки 500 к. см. излившейся крови, состоящей большею частью изъ плотныхъ кровяныхъ сгустковъ. Сердце значительно увеличено, полости его пусты, стѣнки желудочковъ истончены, мышцы ихъ крайне дряблы, желтоваты. Внутренняя оболочка аорты бугриста, сильно истончена и покрыта множествомъ тонкихъ известковыхъ бляшекъ, весьма объемистыхъ, надъ клапанами она на большомъ пространствѣ подрыта въ видѣ кармана, въ области котораго наружная оболочка просвѣчиваетъ и покрыта сгустками. Въ верхушкахъ легкихъ плотные сѣроватые узлы величиною съ лѣсной орѣхъ. Почки увеличены, корковый слой истонченъ, переполненъ кровью.

610. Егоръ *Тимофеевъ*, 17 л., крест., тряпичникъ, былъ замѣченъ дворниками лежащимъ въ безсознательномъ состояніи на дворѣ и такъ какъ онъ ничего не говорилъ, а они полагали, что онъ пьянъ, то внесли его въ кучерскую, гдѣ онъ пролежалъ съ 1—5 ч. дня, и затѣмъ отвезли въ пріемный покой части. Здѣсь онъ, не приходя въ себя, умеръ на глазахъ фельдшера въ 9 ч. утра другого дня, 29 янв. 1902.

Вскрытіе 1 февр. 1902. Довольно высокаго роста, средняго по своимъ лѣтамъ сложенія, плохого питанія. Въ полости сердечной сорочки имѣется около 500 ксм. жидкой крови и темныхъ сгустковъ. Сердце нѣсколько увеличено; полость его почти совершенно пуста; мышцы сердца блѣдны; толщина стѣнки праваго желудочка 0,35 снт., толщина стѣнки лѣваго—около 2,0 снт.; по краямъ двустворчатаго клапана—бѣловатыя плотныя старыя утолщенія. Надъ лѣвымъ полулуннымъ клапаномъ аорты въ разстояніи одного сантиметра черезъ внутренніе слои оболочки аорты идетъ неправильнаго вида горизонтальный разрывъ, длиною около 3,2 снт. Это отверстіе сообщается со щелевидною полостью, величиною болѣе серебрянаго рубля, помѣщающейся въ толщѣ аортальной стѣнки: эта полость сообщается съ полостью сердечной сорочки черезъ наружный листокъ аортальной стѣнки при помощи небольшого отверстія на задней стѣнкѣ аорты, расположеннаго надъ вышеописаннымъ на 1,5 снт.; это отверстіе неправильной щелевидной формы въ вертикальномъ направленіи, величиной оно около 0,7 снт.; зондъ, вводимый въ него, охотно направляется вверхъ въ предѣлахъ разслоенія аортальной стѣнки. Внутренняя стѣнка аорты гладка; только около одной вѣнечной артеріи, около устья имѣется небольшая бляшка. Окружность аорты надъ клапанами 7,5 снт.; окружность легочной артеріи 8,0 снт.; клѣтчатка около аортальной дуги и безыменной артеріи пропитана кровью; разслойка стѣнки аорты не доходитъ 1 снт. до верхушки дуги аорты. Сосуды основанія мозга и мозжечка гнѣздно, въ видѣ бѣловатыхъ бляшекъ, утолщены и зіяютъ. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ имѣется много (около 50,0) темныхъ сгустковъ, въ окружности мозговая ткань разрушена въ предѣлахъ лобной доли, подрытъ зрительный бугоръ и разрушено полосатое тѣло. Два небольшихъ сгустка помѣщается въ 3-мъ и 4-мъ желудочкахъ.

611. Михаилъ *Соколовъ*, 32 л., крест., сапожникъ. Жизнь велъ нетрезвую, напивался всегда допьяна, по вытрезвленіи жаловался на боли въ груди, желудкѣ и головы. Скоропостижно умеръ 23 марта 1902.

Вскрытіе 28 март. 1902. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Въ полости околосердечной сумки находится 300 ксм. крови и кровяныхъ сгустковъ, весьма плотныхъ и плотно приставшихъ къ поверхности сердца; 200 ксм. занимаютъ одни сгустки изъ всего количества крови. Сердце 11×10 снт., спереди обложено толстымъ слоемъ жира; полости сердца почти пусты; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,7; мышцы ихъ блѣдно-красны съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблы; двустворчатый клапанъ утолщенъ, клапаны аорты тоже утолщены и сморщены. Внутренняя оболочка аорты бугриста, шероховата, покрыта множествомъ объемистыхъ, плотныхъ, отчасти известковыхъ бляшекъ; стѣнка аорты вообще утолщена и уплотнена, но съ правой стороны надъ клапанами истончена до просвѣчиванія въ видѣ кармана емкостью немного болѣе грецкаго орѣха; на выдающейся части этого кармана имѣется сквозное отверстіе величиною съ булавочную головку, съ ровными краями. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой утолщенъ, пирамидки уплотнены, имѣютъ сальный видъ и блескъ, лоханки расширены и заполнены жировой тканью, изъ сосочковъ выдавливается мутно-гноевидная жидкость.

612. Анна *Терентьева*, 61 г., крест. Жизнь вела трезвую; служила кухаркой прежде, послѣднее время жила на свои средства. 30 сент. 1902 скоропостижно умерла, не жалуясь передъ смертью ни на какія боли.

Вскрытіе 3 окт. 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Полость околосердечной сумки переполнена кровью съ плотными темно-красными сгустками. Сердце покрыто приставшими плотными сгустками крови; оно 14×14 снт., въ полостяхъ заключаетъ плотные сгустки крови; спереди большія отложенія жира; у верхушки сердца съ передней стороны находится до 7 щелеобразныхъ разрывовъ, имѣющихъ продольное направленіе длиною около 0,2 снт. каждый, всѣ они покрыты сгустками крови; въ окружности ихъ, въ особенности кверху, подъ перикардіемъ находятся валикообразныя кровоизліянія; означенныя щели ведутъ въ полость лѣваго желудочка. Толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,0 снт., праваго—0,3; мышцы ихъ блѣдно-красны, желтоваты, дряблы; на внутренней поверхности лѣваго желудочка соотвѣтственно передней стѣнкѣ верхушки находится язвенная поверхность, на которой выдаются измѣненныя мышечныя волокна въ видѣ бурокрасныхъ разращеній, легко рвущихся и распадающихся; стѣнка желудочка на этомъ мѣстѣ истончена и крайне блѣдна;

на днѣ этой измѣненной поверхности находятся щелеобразные ходы, имѣющіе сообщеніе съ вышеописанными наружными щелями. Внутри-сердечная оболочка на остальныхъ мѣстахъ слегка мутно-бѣловатая, а въ правомъ желудочкѣ прозрачна; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ, клапаны аорты также; отверстія вѣнечныхъ артерій слегка сужены; аорта надъ клапанами расширена, стѣнки ея утолщены, не сглажены, внутренняя оболочка морщинится и шероховата, съ большими известковыми бляшками. Щитовидная железа значительно увеличена и уплотнена, на разрѣзѣ желтовато-красная. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой истончент, ткань плотна и малокровна. Сосуды основанія мозга мутно-бѣловатаго цвѣта, съ плотными бляшками на ихъ протяженіи.

613. Матрена *Чирина*, 64 л., крест. Водки не пила. Жаловалась послѣдніе два дня на боли въ груди. 17 фев. 1903 утромъ найдена въ постели мертвой.

Вскрытіе 21 февр. 1903. Ниже средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Околосердечная сумка растянута кровью съ плотными сгустками, которые облегаютъ сердце со всѣхъ сторонъ. Сердце 11×12 снт., въ полостяхъ заключаетъ довольно много крови со сгустками, толщина стѣнки лѣваго желудочка посрединѣ около 2,0 снт., а у верхушки—0,2, праваго—0,2; мышцы ихъ желто-гшнистаго цвѣта, весьма дряблы; на передней поверхности сердца въ области праваго желудочка почти соотвѣтственно перегородкѣ находится разрывъ стѣнки праваго желудочка, имѣющій сообщеніе съ лѣвымъ, продольнаго направленія, длиною въ 2,0 снт., края разрыва неровны, покрыты сгустками крови; подъ перикардіемъ въ окружности разрыва (тамъ же) находятся желтыя кровоизліянія. Двустворчатый клапанъ утолщенъ и слегка сморщенъ, клапаны аорты сильно сморщены и утолщены, отверстія вѣнечныхъ артерій сильно сужены, внутренняя оболочка аорты шероховата отъ мелкихъ бляшекъ. Почки немного увеличены, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый и пирамидальный слой истончены, ткань плотна. Сосуды основанія мозга склерозированы.

614. Василій *Бочаровъ*, 34 л., крест., поваръ. Спиртныхъ напитковъ не употреблялъ. Вечеромъ 18 окт. 1903, отпустивъ обѣдъ, почувствовалъ у пупы и упалъ; приглашенный врачъ нашелъ его мертвымъ.

Вскрытіе 23 окт. 1903. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Околосердечная сумка сморщена, полость ея растянута излившейся большой массой свернувшейся крови, которой находится въ ней 350 кем. Сердце 12×11×4,5 снт., лѣвая его половина пуста, а въ правой немного жидкой крови; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,8 снт., праваго—0,4; мышцы ихъ бѣдно-красно-желтоваты, дрябды; двустворчатый клапанъ и клапаны аорты утолщены и сморщены. Просвѣтъ дуги аорты расширенъ, внутренняя ея оболочка бугриста, шероховата, со множествомъ бѣловатыхъ объемистыхъ плотныхъ бляшекъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣетъ утолщенія и прободенныя стѣнки. Надъ одинмъ изъ клапановъ въ задней перифоріи аорты находится сквозной продольный разрывъ стѣнки въ видѣ щели, на внутренней оболочкѣ длиною около 2,0 снт., а на наружной—около 1,5 снт.; вокругъ разрыва со наружной стороны подъ оболочкою находится распространенное кровоизліяніе.

615. Лаврентій *Иванов*, 32 л., крест., работникъ по извозному промыслу. Жизнь велъ нетрезвую. 20 сент. 1906 около 8 ч. утра вышелъ на дворъ и говорилъ, что ему что-то дурно. направился въ клозетъ, и когда вышелъ оттуда, прибился къ стѣнкѣ, а затѣмъ свалился на землю и немного спустя умеръ.

Вскрытіе 22 сент. 1906. Роста выше средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія и умѣреннаго питанія. Въ рукоятяхъ грудины съ правой

стороны снутри находится углубленіе, величиною съ небольшое яблоко, выполненное расширенной частью аорты. Въ полости околосердечной сорочки около 700 кем. темной крови съ обильнымъ количествомъ сгустковъ. Сердце нѣсколько увеличено, значительно ожирено, довольно плотное, сокращеніе; всѣ его полости содержатъ небольшое количество жидкой темной крови. Восходящая часть и дуга аорты представляютъ значительное расширеніе величиною по кулака взрослаго человѣка; на передней поверхности этого расширенія въ верхней его части находится косопродольный разрывъ, длиною около 2,5 снт., изъ него при надавливаніи сердца вытекаетъ темная кровь, это отверстіе ведетъ нѣсколько вѣбо въ расширенную часть аорты. Мышца сердца бурвато-красноватаго цвѣта; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 2,5 снт. Внутренняя оболочка расширенной части аорты представляется значительно измѣненной: мѣстами въ ней замѣчается отложеніе извести, а мѣстами—различной величины и формы сѣровато-желтоватыя бляшки. Сосуды основанія мозга не измѣнены.

616. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, 45 л., 29 дек. 1907 былъ поднятъ на панели въ безсознательномъ состояніи и по доставленіи въ больницу оказался мертвымъ.

Вскрытіе 3 янв. 1908. Роста средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Въ полости околосердечной сорочки около 600 кем. темной крови съ обильными рыхлыми сгустками. Сердце нѣсколько увеличено, довольно хорошо сократилось, полости его почти пусты; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 2,0 снт. Восходящая часть аорты представляетъ мѣшкообразное расширеніе, величиною съ кулакъ; на его передне-верхней поверхности находится темнокрасное пятнышко, въ центрѣ котораго разрывъ стѣнки аорты, проницающій тонкій зондъ. Съ внутренней поверхности аневризма аорты представляется какъ бы изрытою, обильно покрытой плотноватыми бляшками различной величины. Содержимое желудка съ запахомъ спирта. Сосуды основанія мозга жестковаты, извиты.

617. Іоганнъ *Вельманъ*, 47 л., сапожникъ. Будучи слабъ здоровьемъ, сильно пилъ водку. Въ послѣднее время пилъ около 2 недѣль сряду, жаловался на боль въ груди и въ лѣвомъ боку, при чемъ нѣсколько времамъ у него всчухало лицо. 27 янв. 1908 жалуясь, что ему худо, выпилъ чашку кофе и свалился на кровать, и не приходя въ себя умеръ.

Вскрытіе 2 февр. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Въ околосердечной сорочкѣ около 600 кем. темной крови съ рыхлыми темнокрасными сгустками. Въ восходящей части аорты представляетъ мѣшкообразное расширеніе, величиною съ кулакъ взрослаго человѣка; на передней стѣнкѣ этого расширенія находится щелевидное косопродольное отверстіе съ неровными краями краями, длиною 5 снт.; въ полости его находится довольно много темной крови съ обильными рыхлыми сгустками; внутренняя его оболочка представляется почти сплошь покрытой бѣловатыми по мѣстамъ сильно обызвествленными бляшками. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$ дряблое, полости его почти пусты, внутренняя оболочка сердца сплошного темно-краснаго цвѣта; мышцы сѣровато-красноватаго цвѣта; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,4 снт., а лѣваго—около 1,5. Сосуды основанія мозга склерозированы.

618. Пименъ *Гречухо*, 79 л., мѣщ. Послѣдніе пять лѣтъ страдалъ головокруженіемъ. 13 окт. 1908 найденъ лежавшимъ на полу въ коридорѣ съ разбитымъ затылкомъ возлѣ принесеннихъ имъ дровъ, внесенный въ квартиру черезъ $^1/_2$ часа умеръ.

Вскрытіе 16 окт. 1908. Роста средняго, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. У лодыжекъ отекъ. Въ полости околосердеч-

ной сорочки около 600 ксм. темной крови съ обильными рыхлыми темнокрасными сгустками; сердце немного увеличено, дрябловатое, сильно обложено жиромъ, полости его почти пусты. Восходящая часть аорты немного расширена; внутренняя поверхность ея покрыта плотными бляшками, на ней, нѣсколько ниже отхожденія безыменной артеріи, находится полулунной формы, длиною около 3,0 снт., расположенный поперечно разрывъ внутренней и средней оболочекъ; наружная оболочка отслоилась отъ средней на пространствѣ величиной съ серебряный рубль; въ ней замѣтны два маленькихъ разрыва, такъ что полость аорты сообщается съ полостью околосердечной сумки. Мышца сердца дряблая, глинистаго цвѣта, проросла жиромъ, легко рвется. Сосуды основанія мозга жестковаты, извиты.

619. Николай *Михайловъ*, 46 л., крест., чернорабочій. Нѣсколько лѣтъ предавался пьянству, послѣднюю недѣлю пересталъ пить, за неимѣніемъ средствъ. 25 окт. 1909 въ 2 ч. дня стало дурно и, сидя на стулѣ, минутъ черезъ десять, не приходя въ сознаніе, умеръ.

Вскрытіе 30 окт. 1909. Средняго роста, довольно правильнаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Въ полости околосердечной сорочки оказалось около полулитра темной крови съ обильными рыхлыми кровяными сгустками. На задней поверхности восходящей аорты почти на 1,0 выше ея устья замѣчается неправильно-округлой формы отверстіе, съ діаметромъ около 0,5, ведущее въ аорту; внутренняя оболочка аорты утолщена, покрыта бляшками, по мѣстамъ сильно объизвествлена, а по мѣстамъ и изъязвлена. Сердце немного увеличено, дряблое, сильно обложено жиромъ, полости его почти пусты; на полулунныхъ клапанахъ аорты и двустворки небольшія утолщенія; мышца свѣтло-глинистаго цвѣта, дряблая; вѣнечныя артеріи жестковаты, устья ихъ плохо проходимы.

620. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, на видъ около 45 л. 5 нояб. 1909 упалъ лицомъ на мостовую, потерялъ сознаніе и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 12 нояб. 1909. Роста выше средняго, крѣпкаго тѣлосложенія, питанія хорошаго. Въ околосердечной сорочкѣ около 600 ксм. темной свернувшейся крови. На правой боковой сторонѣ аорты снт. на 2 отъ ея устья въ ея стѣнкѣ находится неправильно-продолговатой формы съ неровными, какъ бы изъѣденными, краями отверстіе, ведущее въ полость аорты; послѣдняя въ восходящей своей части немного мѣшкообразно расширена; вся ея внутренняя поверхность какъ бы изрыта, мѣстами прощупываются объизвествленные участки. Сердце немного увеличено, дряблое; въ его полостяхъ немного свернувшейся крови; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,4, лѣваго—0,8 снт. Въ желудкѣ около литра буроватой пищевой кашицы. Въ кишкахъ оказался одинъ круглый глистъ.

VI.

Задушеніе вслѣдствіе попаданія въ дыхательные пути или въ полость плевры крови изъ легкихъ или изъ разрыва аорты.

621. Петръ *Земляникинъ*, 37 л., мѣщ., безъ опредѣленнаго мѣстожительства. Пришелъ на квартиру сожительницы, всю ночь кашлялъ, а утромъ 3 окт. 1909 произошло сильное кровотеченіе и смерть. Сильно пилъ водку, постоянно жаловался на боль въ груди и сильно кашлялъ.

Вскрытіе 5 окт. 1900. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Полости сердца почти пусты; стѣнки желудочковъ немного тоньше нормальныхъ; мышцы дряблы, блѣдно-краснаго цвѣта съ ясно

желтымъ оттѣнкомъ. Внутренняя оболочка аорты также въ грудной части шероховата и бугриста, покрыта большими твердыми бѣловатыми бляшками, а также язвами съ подрытыми краями и покрытыми сгустками крови какъ свѣтло-краснаго цвѣта, такъ и буровато-сѣраго; стѣнка дуги аорты и грудной части истончена и расширена въ видѣ мѣшка величиною съ гусиное яйцо; на этомъ мѣшкѣ замѣчается много выпячиваній съ истонченіемъ стѣнокъ до просвѣчиванія; на передней части этого мѣшка въ области нисходящей части дуги аорты находится разрывъ въ видѣ неправильной щели, соединяющейся съ отверстіемъ въ стѣнкѣ лѣваго бронха, величиною съ горошину; оба разрыва покрыты и окружены сѣровато-грязнымъ распадомъ и сгустками крови. Лѣвое легкое въ разрѣзѣ довольно плотное; въ верхушкѣ лѣваго легкаго и въ нижней долѣ во многихъ мѣстахъ замѣчаются болѣе плотные узлы, темнѣе окрашенные; оба легкія повсюду проходимы для воздуха. Капсула почекъ снимается съ трудомъ; корковый слой истонченъ; ткань сильно малокровна.

622. Михаилъ *Павловъ*, 30 л., мѣщ., 19 нояб. 1900 найденъ въ ночлежкѣ у раковины, изо рта у него шла кровь, черезъ нѣсколько минутъ умеръ. Бродяга, занимался нищенствомъ и скитался по ночлежнымъ и постоялымъ дворамъ; часто былъ пьянъ. Давно страдаетъ чахоткою, въ послѣднее время совсѣмъ сталъ слабъ.

Вскрытіе 25 нояб. 1900. Въ полости рта, въ глоткѣ и у входа въ дыхательные пути находится кровь въ смѣси съ воздухомъ, образующая крупные пузыри; слизистая—блѣдна. Сердце сокращенное, полости его почти пусты, подъ наружнымъ покровомъ довольно обильныя отложенія жира, мышца блѣдная, дряблая; на внутренней оболочкѣ аорты мелкія фиброзныя утолщенія въ небольшомъ количествѣ. Въ легкихъ при ощупываніи опредѣляется присутствіе повсюду мелкихъ весьма плотныхъ и довольно рѣзко отграниченныхъ узелковъ, а въ легочныхъ верхушкахъ ощущаются болѣе крупныя и разлитыя уплотненія ткани. Въ просвѣтѣ развѣтвленій дыхательнаго горла до мельчайшихъ вѣтвей находится кровь, смѣшанная съ воздухомъ; въ правой верхушкѣ найдено 2—3 маленькихъ язвенныхъ полости, содержащихъ гноевидную жидкость, а въ лѣвой, кромѣ мелкихъ, одна—величиной почти въ куриное яйцо, а другая—нѣсколько меньше; эти послѣднія болѣе крупныя полости имѣютъ отчасти гладкія и рубцовыя стѣнки. Въ желудкѣ найдено 400 ксм. бурокрасной густой жидкости съ обильной примѣсью фибринозныхъ свертковъ.

263. Варвара *Волкова*, 37 л., крест., папиросница. 11 дек. 1900 шла по панели, изъ горла у нея сильно тронулась кровь, и черезъ нѣсколько минутъ умерла, 11 дек. 1900. Второй годъ больна, видимо была чахоточная и припадочная. Лечилась постоянно.

Вскрытіе 19 дек. 1900. Ниже средняго роста, слабаго тѣлосложенія, въ значительной степени истощена. Въ полости желудка 450 ксм. пищевой смѣси, имѣющей видъ и цвѣтъ кофейной гущи. Сердце на всемъ пространствѣ сращено со своею сумкою старыми перепонками; оно увеличено въ объемѣ, блѣдножелтоватаго цвѣта, почти всѣ его полости пусты; въ правомъ предсердіи незначительное количество жидкой крови; стѣнка праваго желудочка утолщена, лѣваго—истончена; мышца бурокраснаго цвѣта съ желтымъ оттѣнкомъ. Правое легкое вздуто; ткань лѣваго легкаго плотна, заключаетъ множество полостей, величиною отъ лѣсного орѣха до куринаго яйца; изъ нихъ послѣдняя наполнена кровью, свернувшимися сгустками; вокругъ полости разбросаны въ большомъ количествѣ плотные сѣроватые узелки; правое легкое въ верхушкѣ и въ средней долѣ имѣетъ плотные сѣроватые узелки; отечно. Въ полости гортани, дыхательнаго горла и бронховъ находится большое количество крови со сгустками и пѣной; слизистая ихъ обо-

лочка повсюду блѣдна. Печень, селезенка, мозгъ—малокровны. Пирамидальный слой почекъ имѣетъ блескъ, корковый слой истонченъ.

624. Василій *Раковъ*, 40 л., мѣщ., кровельщикъ. Жизнь велъ трезвую, спиртныхъ напитковъ употреблялъ очень мало. Семь лѣтъ боленъ, жаловался на боль въ лѣвомъ боку и груди и послѣдніе два года постоянно лечился отъ признаковъ чахотки. 22 янв. 1901 закашлялся, открылось кровохарканье и тутъ же умеръ.

Вскрытіе 25 янв. 1901. Выше средняго роста, средняго тѣлосложенія, значительно истощенъ. Въ полости желудка находится 600 ксм. крови съ плотными сгустками, смѣшанной съ кусочками пищи. Сердце увеличено въ объемѣ съ большимъ отложеніемъ жира спереди, всѣ его полости пусты; мышца бурокраснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, весьма дрябла; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ, клапаны аорты на свободныхъ краяхъ утолщены; на внутренней поверхности аорты находятся плотныя бѣловатыя известковыя бляшки, поверхность ея бугриста, изрыта, нисходящая часть дуги аорты расширена въ видѣ полости величиною въ кулакъ взрослаго человѣка; стѣнки этой полости съ внутренней стороны покрыты объемистыми и обширными известковыми бляшками, бугристы и покрыты приставшими кровяными сгустками; стѣнки полости истончены во многихъ мѣстахъ до просвѣчиванія и прилегаютъ къ лѣвому бронху. Въ полости лѣваго легочнаго мѣшка находится 1100 ксм. жидкой крови, а въ правомъ—около 100 ксм. Всѣ бронхи переполнены кровью. Въ верхушкѣ праваго легкаго находится уплотненіе величиною въ куриное яйцо, состоящее изъ плотныхъ сѣровато-бѣловатыхъ узелковъ, непроходимыхъ для воздуха. Почки уменьшены, корковый слой утолщенъ, желтоватаго цвѣта.

625. Настасья *Андреева*, 65 л., крест. 24 янв. 1901 послѣ кровохарканья умерла. Ночью постоянно кашляла.

Вскрытіе 27 янв. 1901. Небольшого роста, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Сердце сокращенное, вѣнечныя артеріи на ощупь слегка шероховаты, въ полостяхъ немного жидкой крови, стѣнка праваго желудочка достигаетъ 0,5 снт., лѣваго—1,0; мышца дрябла, слегка желтовата, у основанія двустворчатаго клапана и полулунныхъ заслонокъ аорты—небольшія отложенія извести. Въ полости рта довольно много свернувшейся крови, она замѣчается также въ пищеводѣ и въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей, въ послѣднихъ она смѣшана съ воздухомъ въ крупно-пузырчатую пѣну. Легкія вздуты, совершенно прикрываютъ сердце; верхушка праваго легкаго на ощупь бугристо-плотная, въ разрѣзѣ пронизана слоями соединительной ткани рубцоваго характера, причемъ просвѣты бронховъ мѣстами неравномѣрно расширены, стѣнки ихъ рѣзко утолщены. Изъ перерѣзанныхъ мелкихъ вѣтвей дыхательнаго горла выдавливается слизь, а изъ болѣе крупныхъ — пѣнистая свернувшаяся кровь. Въ желудкѣ около 100 ксм. свернувшейся отчасти пѣнистой крови. Почки небольшія, плотноватыя, капсула отдѣляется съ трудомъ, корковый слой мѣстами тонокъ, пирамидки низки, лоханки жирныя. При изслѣдованіи сосудистой системы въ области грудной аорты найдены многочисленныя утолщенія и отчасти изъязвленія внутренней оболочки; въ сонныхъ артеріяхъ она также утолщена, покрыта бляшками. Сосуды основанія мозга склерозированы.

626. Федотъ *Орловъ*, 38 л., личн. поч. гражд. 22 нояб. 1901 во второмъ часу ночи возвращался на извозчикѣ домой, съ нимъ сдѣлалось дурно, изо рта показалась кровь, и черезъ нѣсколько минутъ умеръ. Страдалъ и лечился отъ порока сердца два года, постоянно носилъ компрессы изъ глины на груди и былъ настолько слабъ, что съ трудомъ одѣвался.

Вскрытіе 24 нояб. 1901. Роста выше средняго, тѣлосложенія слабаго, питанія плохого. На передней поверхности груди, подъ правой

ключицей замѣчается округлое возвышеніе полушаровидной формы, до 9 снт. въ діаметрѣ и высотою 3 снт., расположенное у самой грудины въ области 1—4 реберъ. Сердце немного увеличено; стѣнка праваго желудочка толщиною почти до 0,1 снт., лѣваго—1,0 снт. Окружность устья аорты 11,0 снт., полулунныя заслонки ея утолщены и сморщены; вся внутренняя оболочка аорты, представляющей расширеніе у самого начала, сплошь покрыто фиброзными утолщеніями и отложеніями извести, мѣстами же какъ бы изъязвлена. Въ желудкѣ содержалось 600 ксм. густой пищевой смѣси. Въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей содержится пѣнистая кровь съ примѣсью кровяныхъ свертковъ. Лѣвое легкое имѣетъ въ верхушкѣ нѣсколько узловатыхъ затвердѣній. Верхняя часть правой плевры занята расширеніемъ аорты, образующей здѣсь круглую мѣшкообразную полость величиною въ 2 кулака взрослаго человѣка; полость эта у самой стѣнки выполнена плотными свертками волокнины, образующей слой толщиною до 3,0 снт., остальное пространство занимаетъ рыхло-свернувшаяся кровь. Между грудобрюшною преградою и правымъ легкимъ найдено около литра рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ. 1, 2 и 3 ребра на правой сторонѣ, соотвѣтственно расширенію аорты, отсутствуютъ на нѣкоторомъ протяженіи; слой грудныхъ мышцъ здѣсь имѣетъ только около 0,5 снт. толщины. На мѣстѣ наибольшаго растяженія аорты внутренняя поверхность сосуда оказалась отчасти утолщенною, отчасти какъ бы изъязвленною и покрытою многочисленными отложеніями извести, стѣнка сосуда въ общемъ весьма тонкая.

627. Егоръ *Вакулинъ*, 73 л., крест., велъ всегда трезвый образъ жизни. 19 февр. 1902 легъ спать и уснулъ, а черезъ $^1/_2$ часа ему сдѣлалось дурно, впалъ въ безсознательное состояніе и умеръ.

Вскрытіе 22 февр. 1902. Высокаго роста, средняго тѣлосложенія, слабаго питанія. Мягкая оболочка значительно отечна. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы. Сердце значительно увеличено и обложено толстымъ слоемъ жира; всѣ его полости заключаютъ большое количество темной жидкой крови; мышца блѣдно-красно-желтоватая, дряблая; стѣнки желудочковъ истончены; двустворчатый клапанъ и клапаны аорты покрыты множествомъ объемистыхъ бѣлыхъ бляшекъ. Просвѣтъ аорты значительно увеличенъ, стѣнки ея утолщены, неподатливы, внутренняя оболочка бугриста, покрыта множествомъ объемистыхъ плотныхъ и даже известковыхъ бляшекъ; при переходѣ дуги аорты въ нисходящую часть находится щелевидный разрывъ длиной около 1 снт., неправильной формы, покрытый мелкими сгустками крови. Клѣтчатка передняго средостѣнія пропитана разлитымъ кровоизліяніемъ, стекающимъ на переднюю часть околосердечной сумки. Въ полости лѣвой плевры находится громадное кровоизліяніе изъ огромныхъ сгустковъ, имѣющее сообщеніе, повидимому, съ вышеописанной щелью въ аортѣ. Въ верхушкахъ легкихъ находятся плотные узлы, въ разрѣзахъ имѣющіе видъ сѣроватыхъ узелковъ, непроходимыхъ для воздуха. Печень и почки уменьшены въ объемѣ.

628. Федоръ *Николаевъ*, 37 л., крест., заводскій рабочій. Жизнь велъ трезвую, спокойную. Три года назадъ имѣлъ ударъ правой стороны тѣла, отчего правымъ глазомъ не владѣлъ, жаловался на боль головы. Лѣтъ 5 назадъ получилъ на заводѣ ушибъ обоихъ глазъ. Скоропостижно умеръ 23 сент. 1903.

Вскрытіе 26 сент. 1903. Выше средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, питанія удовлетворительнаго. На артеріяхъ основанія мозга замѣчается небольшое и неравномѣрное утолщеніе стѣнокъ. Нижняя доля лѣваго легкаго имѣетъ небольшой объемъ и какъ бы прижата къ позвоночнику. Въ лѣвой плевральной полости найдено нѣсколько болѣе литра крови, жидкой и въ видѣ свертковъ. Въ переднемъ и заднемъ

средостѣніи замѣчается пропитываніе рыхлой клѣточатки сверкающейся кровью, въ заднемъ средостѣніи оно простирается вдоль пищевода. Сердце дряблое, мышца его драбла, полости пусты; внутренняя оболочка аорты сплошь покрыта отчасти фиброзными утолщеніями, отчасти какъ бы язвами, мѣстами замѣчается отложеніе извести, просвѣтъ сосуда въ его началѣ замѣтно расширенъ. Измѣненіе внутренней оболочки весьма рѣзко выражено также въ области дуги и въ началѣ нисходящаго отдѣла; стѣнка сосуда мѣстами тонка и пропитана кровью. Почки имѣютъ на поверхности рубцовыя углубленія, ткань плотноватая.

629. Эмиль *Климстедтъ*, 49 л., дворъ., служитъ въ парадномъ бюро. Сильно пилъ водку и кашлялъ. 4 окт. 1903 найденъ мертвымъ въ постелѣ, съ опущенной головой на стулъ; ротъ и носъ былъ въ крови, на полу сухая кровь.

Вскрытіе 7 окт. 1903. Высокаго роста, средняго сложенія, плохого питанія. При вскрытіи живота исходитъ замѣтный спиртный запахъ. Сердце нѣсколько увеличено, значительно обложено жиромъ; въ полостяхъ праваго сердца немного темной со сгустками крови, въ полостяхъ лѣваго—пусто; дуга аорты сильно расширена, при вырѣзаніи хруститъ, при наливаніи воды клапаны ее держатъ; устье венознное кольцо пропускаетъ 3 пальца, оба желудочка представляются сильно растянутыми, по краю двустворчатаго клапана надѣются утолщенія; мускулатура сердца дряблая, съ желтоватымъ оттѣнкомъ; на внутренней оболочкѣ аорты многочисленныя бѣловатыя бляшки. Въ желудкѣ имѣется 600 кем. пищевой смѣси съ крупными сгустками крови, которые имѣются на спинѣ языка, на стѣнкахъ глотки и во входѣ въ гортань, и выдѣляются также изъ гортани при надавливаніи на легкія. На передней стѣнкѣ трахеи надъ раздѣленіемъ ея имѣется красноватая мясистая видь, вслѣдствіе чего просвѣтъ ея почти совершенно закрытъ. Въ отверстіяхъ носа и ротовой полости кровь изъ горла, и тутъ же умеръ.

Вскрытіе 5 февр. 1907. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, плохого питанія. Сердце дряблое, во всѣхъ его полостяхъ находится немного темноватой крови; мышца сердца бѣдновато-желтоватаго оттѣнка. Въ желудкѣ около 50 кем. темной, почти черной сверкающейся крови. Изъ входа въ гортань при подниманіи легкихъ гортанью книзу вытекаетъ слизистая гноевидная жидкость, смѣшанная съ кровью. Ткань легкихъ повсюду пронизана плотными узлами величиной до голубинаго яйца, въ разрѣзѣ изрыта массою полостей различной величины, выполненныхъ слизисто-гноевидною жидкостью, а нѣкоторыя изъ нихъ —кровью, вокругъ полостей замѣтно много сѣровато-желтоватыхъ узелковъ величиною до просяного зерна и болѣе. Бронхи, особенно въ лѣвомъ легкомъ, выполнены сверкающейся кровью. Почки слегка увеличены, капсула снимается легко, слои различимы съ трудомъ.

631. Бронисланъ *Зерзиковскій*, 38 л., дворъ., ветер. фельдш. Очень страдалъ кашлемъ съ мокротою. Скоропостижно умеръ 20 окт. 1908.

Вскрытіе 1 нояб. 1908. Роста выше средняго, умѣренно тѣлосложенъ и питанія. У входа въ гортань отекъ. Сердце немного увеличено, во всѣхъ его полостяхъ много темной жидкой крови, мышца дряблована. Въ содержимомъ желудка содержатся небольшіе кровяные сверстки.

Въ полости рта и глоткѣ нѣсколько довольно объемистыхъ темно-красныхъ кровяныхъ сгусткоръ. У входа въ гортань и въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей вплоть до ихъ мельчайшихъ развѣтвленій много рыхлыхъ кровяныхъ сгусткоръ и темной крови. Верхнія доли легкихъ почти сплошь пронизаны различной величины плотноватыми участками, на разрѣзѣ сѣрокрасного цвѣта, пронизаны многочисленными сѣроватыми, а мѣстами уже желтоватыми бугорками; мѣстами на разрѣзѣ замѣтна различной величины плотноватые желтоватые участки, окруженные какъ бы нѣкоимъ желтоватыхъ бугорковъ; нерхушки легкихъ нарыт различной величины полостями съ неровными какъ бы изъѣденными стѣнками, полости эти выполнены частью гноевидной массой, а частью темной кровью; кровь особенно много въ правомъ легкомъ.

VII.

Острое малокровіе вслѣдствіе кровотеченія отъ различныхъ причинъ.

632. Николай *Терпѣевъ*, 48 л., капитанъ. Болѣлъ 5 мѣсяцевъ, жалуется на непроходимость пищи въ пищеводѣ. Безпрестанная рвота кровью, сначала сверкающеюся, далѣе чистою алою кровью, продолжавшаяся съ небольшими перерывами въ продолженіе 10 часовъ, смерть 21 апр. 1901.

Вскрытіе 24 апр. 1901. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, значительно исхудавшій. Сердце $11^1/_2 \times 12$ снт., съ значительнымъ отложеніемъ жира спереди, лѣвая половина совершенно пуста, а въ правой находится значительное количество крови съ плотными бѣловатыми сгустками; мышца сердца съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблая; на внутренней оболочкѣ аорты находится незначительное количество мелкихъ плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ. Въ желудкѣ находится 2 кем. крови въ видѣ 3-хъ объемистыхъ плотныхъ темно-красныхъ сгусткоръ величиною въ 2 кулака и значительное количество жидкой крови; слизистая оболочка желудка темно красная цвѣта, зернота, истончена; по малой кривизнѣ, ближе къ выходу, находится язвенная поверхность полулунной формы, длиною въ $3^1/_2$ снт., шириною въ $1^1/_2$ снт., дно которой покрывается до брюшного слоя, поверхность язвы сѣроватаго цвѣта, края валикообразны, довольно плотны. Въ пищеводѣ на разстояніи 15 снт. отъ начала его находится на протяженіи 7 снт. суженіе, съ просвѣтомъ толщины гусинаго пера, обусловленное новообразованіемъ, довольно плотнымъ, облегающимъ весь окружность пищевода на значительномъ пространствѣ; внутренняя часть новообразованія состоитъ изъ распада коричневаго цвѣта, смѣшаннаго со сгустками крови; распадъ этотъ прикрываетъ язвенную поверхность грязно-бураго цвѣта; наружная часть периферіи новообразованія хрящевой плотности бѣлаго цвѣта; въ задней части этой опухоли находится отверстіе, соединяющееся со слѣпо-заканчивающейся аорты, которая пропускаетъ зондъ. Въ желчномъ пузырѣ большое количество мелкихъ камней. Кишки полочекъ снимается съ трудомъ, корковый слой утолщенъ, пирамидки укорочены, ткань довольно плотна. Печень, селезенка, почки малокровны; мозгъ малокровенъ и отеченъ. Сосуды основанія мозга имѣютъ мутно-бѣловатыя стѣнки. Тонкія кишки переполнены темною жидкою кровью; толстая кишки также растянуты детсебраною кровью.

633. Василій *Балаевъ*, 35 л., крест., плотникъ. Жалуясь всегда трезвую, не болѣлъ. 20 сент. 1902 съ утра чувствовалъ слабость, отказался идти на работу; дойдя до двери, внезапно упалъ и спустя немного умеръ.

Вскрытіе 6 окт. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 12×12 снт., спереди значительное отложеніе жира; въ

полостях его, особенно въ предсердіяхъ и въ началѣ аорты и легочной артеріи, находится большое количество темно-красныхъ и бѣлыхъ сгустковъ крови, толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 сит., праваго—0,3, мышцы ихъ довольно дряблы. Въ полости желудка находится немного болѣе столовой ложки темно-красныхъ сгустковъ крови; сливистая сѣро-асцидіаго цвѣта, а при входѣ на большомъ пространствѣ пропитана темно-краснымъ цвѣтомъ отъ краснящаго вещества крови. Въ полости гортани и дыхательнаго горла находится небольшое количество кровянистой жидкости; подъ корнемъ брыжейки находится опухоль величиной въ дѣтскую голову; опухоль эта инкв желудка и спереди 12-перстной кишки, прикрытая сверху поперечной оболочной кишкой, имѣетъ сообщеніе и сращена со стѣнкой 12-перстной кишки, въ которой въ верхнемъ и нижнемъ отдѣлѣ, а также въ началѣ тощей кишки находятся круглыя прободенія величиной 2—5 сит. въ діаметрѣ, края ихъ гладки, валикообразно утолщены и покрыты гнойно-краснымъ распадомъ; въ полости 12-перстной кишки и тощей жидкая кровь въ умѣренномъ количествѣ. Опухоль непосредственно переходитъ и сращена съ головкой поджелудочной железы, которая въ этой части утолщена и уплотнена; ткань опухоли въ центрѣ имѣетъ полость, заполненную гнойно-краснобатымъ кашицеобразнымъ распадомъ, въ которомъ свободно помѣщаются куски железистой ткани; полость имѣетъ сообщеніе съ описаннымъ выше прободеніемъ кишечника.

634. Иванъ *Васильевъ*, сынъ Елизаветы Табаковой, крест., 2 нед. отъ роду. Послѣ ранняго отпаденія пуповины, изъ нея все время прасачивалась кровь, 3 февр. 1901 рана открылась и ребенокъ истекъ кровью.

Вскрытіе 6 февр. 1901. Длиной 64 сит., вѣсомъ 3300 гр., сложенія правильнаго, питанія средняго. На передней стѣнкѣ, въ окружности пупка, въ предѣлахъ передней подбрюшинной рыхлой ткани, а также вдоль нижней начальной поддерживающей печень связки, имѣется небольшое кровоизліяніе. Полости желудочекъ пусты; въ предсердіяхъ содержится въ небольшомъ количествѣ темная жидкая кровь; сба желудочка сокращены; мышца сердца очень блѣдна. Печень на всемъ своемъ протяженіи закрыта плотнымъ красно-бурымъ тромбомъ. Ткани около пупочнаго кольца разрыхлены и пропитаны въ небольшую полость, величиной съ лѣсной орѣхъ, выполненную сгустками крови, отчасти побурѣвшей, но безъ гнойнаго распада. Просвѣтъ пупочной артеріи очень великъ и всюду на разрѣзахъ зіяетъ. Всѣ внутренніе органы содержатъ очень мало крови, слизистая оболочка блѣдна.

635. Соломонида *Абрамова*, 37 л., крест. Доставлена въ госпиталь съ рѣзкой анеміей, въ полубессознательномъ состояніи; изъ влагалища выпала рука и перевязанная пуповина. Рожаетъ 14 разъ; всѣ роды сопровождались сильнымъ кровотеченіемъ, такъ было и теперь. 13 нояб. въ 5 часовъ вечера началось кровотеченіе; часовъ въ 11 вышелъ послѣдъ; присутствовавшая при родахъ простая бабка перевязала пуповину и отрѣзала послѣдъ; всѣдъ за тѣмъ выпала рука, такомъ видѣ роженица находилась всю ночь, причемъ бабка старательно тянуза за ручку. Доставлена утромъ въ клинику, сдѣлана была эмбріотомія, ручка держалась только на кожѣ, была оторвана и вывернута изъ плечеваго сустава; умерла отъ острой малокровіи 14 нояб. 1901, черезъ часъ по доставленіи въ клинику.

Вскрытіе 17 нояб. 1901. Ниже средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Ногтяки и малыя губы сильно отечны, кнзнки конечности—также. Подъ брюшиною, покрывающей нижній отдѣлъ сѣпой кишки и правую широкую маточную связку, и въ клѣтчаткѣ, окружающей влагалище, находится обширное кровоизліяніе. На слизистой оболочкѣ влагалища какъ при входѣ, такъ и на всей поверхности правильнаго

сводства мелкихъ кровоизліяній, отъ горошины до боба, при входѣ во влагалище замѣтны щелевидныя нарушенія цѣлости оболочки до подслизистой ткани, около 1/2 сит. длиною, окруженныя кровоподтеками. Матка 24 × 20 × 4 1/2 сит.; полость ея пуста; стѣнки дряблы, сидзаются, толщиною у дна около 1 сит., а во влагалищной части—0,6; зѣвъ раскрытъ, свободно пропускаетъ руку, разрыхленъ, на губахъ его множество мелкихъ продольныхъ разрывовъ, окруженныхъ кровоизліяніями; въ правомъ сегментѣ матки, начиная отъ наружнаго отверстія зѣва, въ вертикальномъ направленіи вверху находится нарушеніе цѣлости стѣнки матки въ видѣ продольнаго разрыва, длиною въ 13 сит., проникающаго всю толщу стѣнки и открывающагося въ окружающую клѣтчатку, гдѣ и между листками правой широкой маточной связки находится кровоизліяніе, образующее полость величиною въ дѣтскую голову; кровь излившаяся почти жидка съ весьма рыхлыми сгустками; края разрыва дряблы, слегка бахромчаты и покрыты мелкими сгустками крови; внутренняя поверхность матки шероховата, дряблы, повсюду покрыта мелкими жесткими кровяными сгустками, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ кусками оставшейся оболочки. Почки немного увеличены, корковый слой истончѣнъ, бѣдно-желтоватъ, пирамидки укорочены.

636. Настасья *Данилова*, 50 л., крест., черноработчая. 23 нояб. 1903 заливалась на застоевой пылюю была доставлена въ пріемный покой, съ обильнымъ кровотеченіемъ изъ лопнувшей варикозной вены на правой голени и глубокимъ обморокомъ, черезъ нѣсколько минутъ умерла.

Вскрытіе 27 нояб. 1903. Ниже средняго роста, средняго тѣлосложенія, худощава. Правая голень увеличена въ объемѣ сравнительно съ лѣвой, въ средней трети она въ окружности на 4,0 сит. больше лѣвой, а въ нижней трети—на 1,5 сит.; на правой голени, по средней линіи внутренней стороны находятся до 11 язвъ, частью округлыхъ, частью неправильныхъ, съ синевато-краснымъ дномъ, съ краевъ рубцующихся; язвы неправильной формы отъ 1,5 до 3,0 сит. въ діаметрѣ, окружность ихъ синевата; на 5,0 сит. ниже внутренняго мыщелка праваго бедра находится кругловатая язва около 1,5 сит. въ діаметрѣ, въ центрѣ ея находится небольшой засохшій сгустокъ крови, по отдѣленіи котораго появился обильное кровотеченіе изъ подкожной вены. По отпрепарованіи кожи и подкожной клѣтчатки на мѣстѣ этой язвы оказался расширенный венозный просвѣтъ, сращенный съ дномъ язвы и имѣющій отверстіе, черезъ которое свободно проходитъ зондъ; ширина венознаго сгвола въ этомъ мѣстѣ около 1,0 сит. На внутренней поверхности праваго бедра въ нижней трети замѣтно довольно объемистое расширеніе вены въ видѣ кругловатаго величиною въ лѣсной орѣхъ и болѣе. Въ нижней половинѣ брюшной полости помѣщается опухоль, величиною въ 2 головы взрослаго человѣка, занимающая всю нижнюю половину полости, кругловатая, выбухающая, имѣетъ сообщеніе съ маткой и яичниками; нѣкоторыя тонкихъ нитей отложеніемъ жира; всѣ его полости пусты, только въ правомъ предсердіи весьма мало жидкой крови; мышцы сердца бѣловато-красныя, сероватая, довольно дряблыя. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой истончѣнъ; ткань плотная. Внутренніе органы малокровны. Опухоль исходитъ изъ перерожденнаго яичника, состоитъ изъ многихъ полостей, заключающихъ желтоватую прозрачную жидкость.

637. Анна *Дуденева*, 35 л., крест. 26 нояб. 1903 черезъ часъ послѣ родовъ скоропостижно умерла, жалуясь на боль въ животѣ.

Вскрытіе 29 нояб. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, слабаго питанія. Изъ половой щели свободно истекаетъ пуповина, длиною въ 50,0 сит., а вокругъ нея торчитъ объемистый сгустокъ крови. Голени и стопы отечны. Матка занимаетъ почти половину полости живота, 29 × 18 × 9 сит. Сердце немного увеличено, дряблое, ожирѣвшее; всѣ его полости пусты;

только въ правомъ желудочкѣ и въ аортѣ находятся небольшіе сгустки крови, мышца сердца бѣдно-красно-желтоватая, дряблая. Почки увеличены, капсула ихъ снимается съ трудомъ, ткань бѣдно-желтоватая. При изслѣченіи матки изъ брюшной полости черезъ наружные половые органы выпало два объемистыхъ плотныхъ величиной въ кулакъ взрослаго человѣка каждый темно-красныхъ сгустка крови; зѣвъ матки широко открытъ, свободно пропускаетъ руку; полость матки сильно расширена, стѣнки ея истончены до 0,7 сит., бѣдны, въ полости матки на задней стѣнкѣ прикрѣпляется послѣдъ, весьма крѣпко сращенный съ стѣнкою; нижняя треть его оказалась отдѣленною и покрытою плотно приставшимъ толстымъ сгусткомъ крови. Внутренніе органы малокровны.

638. Федосья *Солодчна*, 50 л., крест., скоропостижно умерла въ госпиталѣ 17 сент. 1905.

Вскрытіе 19 сент. 1905. Средняго роста и сложенія, достаточнаго питанія. При трупѣ отдѣльно доставленъ трупикъ новорожденнаго младенца женскаго пола, вѣсомъ 4900,0, длиною — 56,0 сит. Матка сильно увеличена, дряблая, бѣдна, выступаетъ надъ лобкомъ почти на двѣ ладони; 28×18,5 сит.; стѣнка толщиной 1,0 сит.; въ сосудахъ ея очень мало крови. Въ области тѣла со стороны влагалища имѣется разрывъ вправо и влѣво. Остатки дѣтскаго мѣста и оболочки прилежатъ къ стѣнкамъ матки и легко отъ нихъ отдѣляются. Сердце значительно увеличено и обложено жиромъ, въ полостяхъ его содержится преимущественно газъ и очень мало крови; стѣнка праваго желудочка вѣсомою истончена и мѣстами прорашена жиромъ; въ толщѣ лѣваго желудочка замѣчаются желтоватые участки. Внутренніе органы малокровны. Клин. Воен. Госп.

639. Марья *Еремина*, 41 г., 5 дек. 1906 скоропостижно умерла въ Покрытіи 8 дек. 1900. Средняго роста, тѣлосложенія и питанія. Нижняя часть полости живота немного выше пупка занимаетъ увеличная матка. На передней поверхности сердца имѣются перикардіальныя бляшки; во всѣхъ полостяхъ сердца, за исключеніемъ лѣваго предсердія, почти вовсе не имѣется крови; мускулатура дряблая, тонка, толщина праваго желудочка около 0,1 сит. лѣваго—около 1,0, мягче нормы. 26 × 16 сит., стѣнка ея утолщена почти до 2,0 сит., весьма дряблая, бѣдноватая; на разрѣзѣ видно много пустыхъ зіяющихъ широкихъ сосудистыхъ отверстій. Мѣсто прикрѣпленія послѣда—у дна матки въ видѣ красноватой негладкой поверхности не тронешь не болѣе лещины величиной; тутъ же имѣются болѣе бѣдные клочки оболочекъ, которыя довольно легко отдѣляются отъ внутренней поверхности матки. Въ полости матки и въ верхней части расширеннаго влагалища найдено два крупныхъ кровяныхъ сгустка, темныхъ, плотныхъ, вѣсомъ въ 900,0 гр. На слизистой влагалища имѣются кровоподтеки. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ и мозга почти совершенно пусты.

640. Дмитрій *Орловъ*, 54 л., мѣщ., чернорабочій. 4 дек. 1905 пришелъ въ баню на видъ здоровымъ и трезвымъ; въ парильномъ отдѣленіи на полкѣ упалъ и вымоченный

нены кровью. Въ полостяхъ гортани, дыхательнаго горла и бронховъ находится большое количество красноватой жидкости; слизистая ихъ оболочка повсюду сильно красна. Сосуды твердой и мягкой оболочекъ переполнены кровью. Отъ мозга, грудныхъ и брюшныхъ внутренностей чувствуется сильный запахъ спирта.

644. Василій *Хотѣевъ*, 26 л., мѣщ., чернорабочій. Легъ спать сильно пьяный, утромъ 8 марта 1901 найденъ мертвымъ. Сильно былъ преданъ пьянству; ни на какія болѣзни не жаловался.

Вскрытіе 11 марта 1901. Средняго роста и тѣлосложенія, худощавъ. Въ черепной полости ощущается рѣзкій спиртный запахъ. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены жидкою кровью; мягкая оболочка толста, сочна, молочно-мутная на сводѣ и покрыта зернистыми утолщеніями. Сосуды основанія мозга имѣютъ замѣтно утолщенныя стѣнки. Внутренній покровъ сердца сплошного темнокраснаго цвѣта; мышца сердца дряблая. Содержимое желудка имѣетъ проницательный, напоминающій бродящее тѣсто, запахъ.

645. Терентій *Ковальковъ*, 35 л., крест., рабочій въ садовомъ заведеніи. Послѣдніе дни, да и вообще сильно пьянствовалъ. Наканунѣ пришелъ домой пьянехонькимъ. Во время обѣда выпилъ одинъ $^1/_2$ бутылки водки, послѣ чего, отказавшись работать—рыть землю, легъ отдыхать и заснулъ. Часовъ въ 5 стали его будить, онъ еще дышалъ; вскорѣ умеръ, 24 сент. 1901.

Вскрытіе 28 сент. 1901. Средняго роста, умѣренно-крѣпкаго сложенія, средняго питанія. Въ желудкѣ найдено 1500 к. с. пищевой смѣси. Сердце значительно увеличено; во всѣхъ полостяхъ сердца въ изобиліи содержится жидкая пѣнистая кровь и масса сгустковъ; мускулатура сердца нѣсколько дряблая, дряблѣе въ правомъ желудочкѣ; она блѣдно-сѣровато-краснаго цвѣта, мѣстами съ желтоватымъ оттѣнкомъ; полость праваго желудочка растянута. Легкія значительно полнокровны и отечны; въ бронхахъ содержится красноватая пѣнистая слизь въ значительномъ количествѣ. Почки и мозгъ переполнены кровью. При вскрытіи брюшной полости и желудка ощущается слабый спиртный запахъ.

646. Степанъ *Петровъ*, 28 л., крест., чернорабочій. Выпивалъ мало. Возвращаясь изъ гостей совершенно опьянѣвшимъ, оставленъ былъ товарищами на улицѣ, гдѣ и найденъ былъ мертвымъ 23 окт. 1901.

Вскрытіе 25 окт. 1901. Средняго роста и тѣлосложенія, хорошаго питанія. Въ желудкѣ 750 к. с. жидкости съ сильнымъ запахомъ спирта; слизистая оболочка покрыта толстымъ слоемъ слизи, набухла, слегка красновата. Сердце немного увеличено, обложено значительнымъ количествомъ жира; всѣ его полости, особенно правыя, переполнены кровью съ рыхлыми сгустками, стѣнки желудочковъ утолщены; мышцы ихъ темно-краснаго цвѣта, довольно плотныя; на внутренней оболочкѣ аорты надъ клапанами незначительное количество мелкихъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Въ полости гортани и дыхательнаго горла находится большое количество слизистой жидкости, слизистая оболочка темно-красна; въ мелкихъ бронхахъ находится бѣловатая слизистая пѣнистая жидкость. Печень, почки, селезенка переполнены кровью. Пазухи и сосуды мягкой оболочки переполнены кровью. Отъ мозга, легкихъ и крови въ сердцѣ чувствуется сильный запахъ спирта. Твердая мозговая оболочка во многихъ мѣстахъ сращена со сводомъ черепа и съ мягкою, послѣдняя по направленію сосудовъ мутно-бѣловатаго цвѣта.

647. Алексѣй *Телѣжкинъ*, 34 л., крест., чернорабочій при водопроводной мастерской. Раньше пилъ водку немного, но послѣдніе три дня сильно выпивалъ. Пришелъ 24 февр. 1902 сильно пьянъ, сѣлъ на стулъ, наклонилъ голову и началъ храпѣть, а потомъ легъ на полъ, сильно храпя, и немного спустя умеръ.

Вскрытіе 1 марта 1902. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце $10 \times 11^1/_2 \times 5^1/_2$ снт., спереди значительно обложено жиромъ; всѣ его полости переполнены темной жидкой кровью съ рыхлыми сгустками; толщина лѣваго желудочка—1,6 снт., праваго—0,3; на внутренней оболочкѣ аорты небольшое количество мелкихъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Верхушка лѣваго легкаго содержитъ плотные узлы темно-краснаго цвѣта, непроходимые для воздуха. Въ полости гортани и дыхательнаго горла большое количество красноватой мелкопѣнистой жидкости; слизистая ихъ оболочка значительно красна. Легкія, печень, почки, мозговыя оболочки сильно переполнены кровью. Отъ мозга и другихъ внутренностей трупа чувствуется сильный запахъ спирта.

648. Федотъ *Горенковъ*, 23 л., чернорабочій. Доставленный въ безчувственно-пьяномъ видѣ въ участокъ, тамъ умеръ 17 нояб. 1902.

Вскрытіе 25 нояб. 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Отъ мозга чувствуется ясный запахъ спирта. Сердце $10 \times 11 \times 5^1/_2$ снт.; всѣ его полости наполнены темно-жидкою кровью, пахнущей спиртомъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,4; мышцы ихъ темно-красны, довольно плотны. Въ желудкѣ около 600 к. с. сѣроватой пищевой смѣси съ запахомъ бродящаго тѣста. Легкія, селезенка, почки, мозговыя оболочки сильно переполнены кровью. Отъ всѣхъ внутренностей тѣла чувствуется ясный запахъ спирта.

649. Наталья *Михайлова*, 36 л., сильно употребляла спиртные напитки. 19 нояб. 1902 утромъ была уже сильно пьяна и въ скорости найдена была мертвой.

Вскрытіе 26 нояб. 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, съ обильнымъ отложеніемъ жира; правая половина совершенно переполнена темною жидкою кровью. Въ полости рта немного жидкой крови, слизистая входа въ гортань набухшая и сильно покраснѣвшая, на протяженіи дыхательнаго горла она также ярко-красная и покрыта бѣлою мелко-пузырчатою пѣною. Легкія, селезенка, почки, печень, мозговыя оболочки полнокровны. На лѣвой долѣ мозжечка, на задней его поверхности имѣется изліяніе крови подъ мягкой оболочкой, величиною въ бобъ; ткань этого органа и продолговатаго мозга, кромѣ обильнаго содержанія крови, другихъ особенностей не представляетъ. При вскрытіи желудка ощущается слабый спиртный запахъ.

650. Федоръ *Зюковъ*, 41 г., крест., каменщикъ. За послѣдніе 9 лѣтъ сильно пьянствовалъ, въ этомъ году записался на 6 мѣсяцевъ въ общество трезвости, по окончаніи срока сталъ ежедневно сильно пьянствовать. Въ сильно нетрезвомъ видѣ легъ спать и подъ утро 3 дек. 1902 усмотрѣнъ былъ мертвымъ.

Вскрытіе 5 дек. 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, слабаго питанія. Сердце $10 \times 11^1/_2$ снт., всѣ его полости значительно наполнены темной жидкой кровью; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,4 снт., праваго—0,5; мышцы ихъ буро-краснаго цвѣта, дряблыя, внутренняя оболочка аорты слегка шероховата отъ присутствія на ней бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Слизистая желудка утолщена, зерниста. Легкія, селезенка, печень, почки, мозговыя оболочки значительно наполнены кровью. Сосуды основанія мозга слегка утолщены, мутно-бѣловатаго цвѣта. Отъ мозга и крови сердца чувствуется запахъ спирта.

651. Леонидъ *Рева*, 35 л., помощ. столон. Гл. В.-М. Упр. 16 янв. сказалъ, что заболѣлъ и съ этого дня на службу не ходилъ, изъ квартиры не выходилъ. Раньше водки не пилъ, 16-го пришелъ домой выпивши, 17-го выпилъ сороковку, 18-го полторы бутылки водки, 19-го еще одну бутылку водки. 20 янв. 1903 утромъ найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе 22 янв. 1903. Выше средняго роста, средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 11×13×6 снт., обложено большимъ количествомъ жира; всѣ его полости переполнены темною кровью съ плотными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,8 снт., праваго—0,5; мышцы ихъ блѣдно-красны съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблы; на внутренней оболочкѣ аорты небольшое количество плотныхъ бѣловатыхъ мелкихъ бляшекъ. Слизистая желудка сѣровато-блѣдная, утолщенная, зернистая. Легкія сильно отечны. Печень, селезенка, почки, мозговыя оболочки сильно переполнены кровью. Сосуды основанія мозга извилисты, мутно-бѣлаго цвѣта.

652. Александръ *Муравьевъ*, 17 л., крест., столяръ. Пришелъ вечеромъ домой совершенно пьяный, на утро 22 янв. 1903 найденъ былъ мертвымъ.

Вскрытіе 26 янв. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 11×11 снт., обложено толстымъ слоемъ жира; всѣ его полости наполнены довольно темной жидкой кровью; на задней поверхности по продольной бороздѣ находится довольно много рѣзко-ограниченныхъ темнокрасныхъ кругловатыхъ пятнышекъ, величиной отъ маковаго до просяного зерна. Содержимое желудка имѣетъ запахъ бродящаго хлѣба. Ткань легкихъ сильно переполнена кровью, слегка отечна; въ верхушкахъ—объемистые и плотные узлы, въ разрѣзѣ желтовато-сѣраго цвѣта, заключающіе творожистыя массы. Въ полости гортани и дыхательнаго горла много красноватой слизи, слизистая ихъ оболочка сильно покраснѣвшая. Печень, селезенка, почки, мозговыя оболочки сильно переполнены кровью. Въ наружныхъ покровахъ головы и подъ сухожильнымъ растяженіемъ черепа множество мелкихъ и крупныхъ темнокрасныхъ пятнышекъ отъ просяного зерна до чечевицы. Ткань мозга отечна.

653. Павелъ *Филатовъ*, 31 г., крест., сапожникъ. Жизнь велъ нетрезвую, по временамъ довольно продолжительно пилъ, жаловался на боль въ груди; отъ пьянства приписался 23 окт 1902 въ общество трезвости и послѣ этого вовсе не пилъ. Послѣдніе три дня сильно пилъ. 29 янв. не пилъ, 30 янв. 1903 былъ въ банѣ и, вернувшись, сталъ жаловаться на боль въ груди и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 5 фев. 1903. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце 12×13 снт., обложено толстымъ слоемъ жира; всѣ его полости переполнены темною жидкою кровью, подъ перикардіемъ довольно много рѣзко-ограниченныхъ темнокрасныхъ пятнышекъ отъ просяного зерна до чечевицы; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,0 снт., а праваго—0,8; мышцы ихъ блѣдно-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблы; на внутренней оболочкѣ аорты немного мелкихъ бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Слизистая желудка утолщена и зерниста. Легкія сильно переполнены кровью, слегка отечны. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой утолщенъ, пирамидки укорочены. Отъ мозга чувствуется ясный запахъ спирта. Селезенка и печень сильно наполнены кровью.

654. Неизвѣстнаго званія *женщина*, 30 л., найдена мертвою на улицѣ 16 фев. 1903.

Вскрытіе 20 фев. 1903. Роста 146 снт., средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено, всѣ его полости переполнены темной жидкой кровью съ небольшимъ количествомъ бѣловатыхъ сгустковъ; на внутренней оболочкѣ аорты нѣсколько бѣловатыхъ бляшекъ. Слизистая желудка утолщена, зерниста, покрыта густымъ слоемъ слизи. Почки нѣсколько увеличены, корковый слой утолщенъ, желтаго цвѣта, пирамидки темно-красны. Легкія, селезенка, печень значительно наполнены кровью. Отъ крови, заключавшейся въ сердцѣ, и отъ легкихъ чувствуется ясный запахъ спирта.

655. Александръ *Петеръ*, 36 л., поч. тел. Два мѣсяца подрядъ не ходилъ на службу, пилъ запоемъ, пока не былъ отправленъ въ больницу, по выходѣ откуда сталъ снова пьянствовать. 21 фев. 1903 пришелъ домой пьяный съ бутылкой водки, часть которой выпилъ за обѣдомъ, и легъ спать; вечеромъ найденъ окоченѣвшимъ.

Вскрытіе 25 фев. 1903. Небольшого роста, умѣреннаго сложенія и питанія. Въ желудкѣ 700 к. с. жидкой смѣси; слизистая набухшая, мѣстами сѣроаспиднаго цвѣта, зернистая. Сердце нѣсколько увеличено, съ обильнымъ отложеніемъ жира; полости сердца пусты; внутренняя оболочка аорты сплошного грязно-краснаго цвѣта, съ небольшимъ количествомъ мелкихъ темноватыхъ рубцовыхъ утолщеній; мышца желтовата, дряблая. Корковый слой почекъ немного утолщенъ. Ткань легкихъ въ разрѣзѣ сплошного темнокраснаго, почти чернаго цвѣта; на поверхности разрѣза выдавливается довольно много темной слегка пѣнистой крови.

656. Андрей *Ершовъ*, 25 л., крест., столяръ, сильно употреблялъ спиртные напитки; каждый день приходилъ съ работы въ сильно нетрезвомъ видѣ. Наканунѣ ложился спать пьянымъ, утромъ 5 мар. 1903 два раза выходилъ изъ квартиры, явился въ совершенно нетрезвомъ видѣ и легъ на кровать спать, захрапѣлъ; проспавъ около получаса, храпѣть пересталъ; когда къ нему подошли, то онъ уже былъ мертвъ.

Вскрытіе 8 мар. 1902. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце содержитъ въ обѣихъ половинахъ темную жидкую кровь, мышца тусклая и дряблая. Содержимое желудка имѣетъ спиртный запахъ; слизистая складчатая, набухшая, зернистая. При осмотрѣ поверхности легкихъ между долями и снизу замѣчено нѣсколько рѣзко-ограниченныхъ темныхъ пятнышекъ отъ маковаго до чечевичнаго зерна; развѣтвленія дыхательныхъ путей содержатъ густую бѣлую пѣну. Легкія, селезенка, мозговыя оболочки переполнены кровью.

657. Григорій *Филимоновъ*, 27 л., крест., тряпичникъ. Предавался пьянству; послѣднее время записался на 3 мѣсяца въ общество трезвости и водки въ теченіе этого времени не пилъ. Часто жаловался на нездоровье и сильно кашлялъ. Въ сильно нетрезвомъ видѣ возвратившись на квартиру, легъ спать, а на утро 9 мар. 1903 найденъ былъ мертвымъ

Вскрытіе 11 мар. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено; всѣ его полости заключаютъ темную жидкую кровь въ значительномъ количествѣ; стѣнки желудочковъ слегка утолщены, мышцы ихъ красноватаго цвѣта, тусклы, умѣренной плотности. Легкія полнокровны. Слизистая зѣва и входа въ гортань сильно покраснѣвшая, на надгортанникѣ имѣются легкія кровоизліянія, слизистая гортани и дыхательнаго горла также темнокрасна. Корковый слой почекъ истонченъ, границы слоевъ неясны; сильно наполнены кровью.

658. Ефимъ *Харитоновъ*, 31 г., крест., ломовой извозчикъ. Ранѣе много пилъ водки; за послѣдніе 4 мѣсяца прогуловъ за нимъ не было, никогда не болѣлъ. 11 мар. 1903 по случаю окончательнаго разсчета, вмѣстѣ 18 человѣкъ выпили двѣ четверти водки; въ 7 ч. вечера Х. легъ спать, а черезъ два часа его обнаружили мертвымъ.

Вскрытіе 15 мар. 1903. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, худощавъ. По вскрытіи грудной полости легкія представляются чрезвычайно объемистыми, не спадаются, прикрываютъ сердце. Сердце нѣсколько увеличено, въ правой половинѣ довольно много жидкой темной крови, въ лѣвой - такая же кровь въ небольшомъ количествѣ. Въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей довольно много вязкой мелкопузырчатой розовой пѣны. Содержимое желудка съ бродильнымъ запахомъ; слизистая набухшая, зернистая, покраснѣвшая. Капсула почекъ трудно

отдѣляется, корковый слой набухшій и блѣднѣе пирамидокъ. Легкія, селезенка, почки, мозговыя оболочки полнокровны. Отъ мозга чувствуется ясный запахъ спирта.

659. Емельянъ *Назимовъ*, 28 л., крест., чернорабочій. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками. 24 мар. 1903 на работу не пошелъ, приносилось нѣсколько сороковокъ водки, въ пьяномъ видѣ легъ спать, а ночью оказался мертвымъ.

Вскрытіе 27 мар. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Съ передней стороны шеи ниже гортани въ отверстіе вставлена серебряная трахеотомическая трубочка, укрѣпленная тонкою веревочкой вокругъ шеи. Сердце значительно увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира снаружи; всѣ его полости заключаютъ большое количество темной жидкой крови; стѣнки желудочковъ нѣсколько утолщены. Въ верхушкахъ легкихъ имѣются плотные узелки, величиною въ лѣсной орѣхъ, темнокраснаго цвѣта, непроходимые для воздуха. Просвѣтъ гортани въ области нижняго края щитовиднаго хряща сильно суженъ, такъ что едва пропускаетъ карандашъ. Легкія, селезенка, почки сильно наполнены кровью. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста; слизистая утолщенная, зернистая. Въ сосудахъ мозговыхъ оболочекъ весьма много крови. Отъ мозга чувствуется запахъ спирта.

670. Андрей *Владиміровъ*, 34 л., крест., лакей. Около 15 снт. предался сильному пьянству, водки пилъ много, а пищи не принималъ. Наканунѣ выпилъ $^1/_2$ бутылки водки, свалился со стула, послѣ чего легъ спать, а утромъ 4 окт. 1903 найденъ мертвымъ.

Вскрытіе 7 окт. 1903. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце 13×13 снт., дряблое, ожирѣвшее, въ полостяхъ его умѣренное количество темно-жидкой крови; внутренняя оболочка сердца окрашена въ темнокрасный цвѣтъ, особенно въ лѣвой половинѣ; мышцы блѣдно-красно-желтоваты, дряблы; на двустворчатомъ клапанѣ и на внутренней оболочкѣ аорты немного бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Слизистая желудка сѣро-аспиднаго цвѣта. Печень уменьшена, плотная. Почки уменьшены, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ; ткань плотная. Легкія, печень, мозговыя оболочки заключаютъ большое количество крови.

661. Яковъ *Шипуновъ*, 36 л., крест., чернорабочій. Велъ нетрезвый образъ жизни, но пьянымъ напивался только по праздникамъ. 7 дек. 1903 выпилъ $^1/_{20}$ ведра казеннаго вина, закусывая хлѣбомъ, затѣмъ почувствовалъ себя дурно, сталъ храпѣть и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 10 дек. 1903. Средняго роста, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено, всѣ его полости сильно наполнены темною жидкою кровью, пахнущею спиртомъ, толщина стѣнокъ желудочковъ сильно увеличена, внутренняя оболочка сердца, аорты и легочной артеріи окрашены въ равномѣрно темно-красный цвѣтъ. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста, слизистая равномѣрно-красновата, зерниста, полость желудка сильно расширена. Почки уменьшены въ объемѣ, дольчаты, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, пирамидки темно-красны. Легкія, печень сильно переполнены кровью. На днѣ 4-го желудочка сосуды сильно расширены кровью.

662. Трофимъ *Михайловъ*, 44 л., крест., экипажный корпусникъ. Сильно предавался пьянству, а послѣдніе дни пилъ до безпамятства. 10 дек. 1903 пьянымъ легъ на полъ спать, гдѣ и обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 14 дек. 1903. Средняго роста и тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце 14×14$^1/_2$ снт., всѣ его полости заключаютъ большое количество темной жидкой крови съ рыхлыми сгустками; снаружи сердце обложено сплошнымъ довольно толстымъ слоемъ жира; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,5; мышцы ихъ сѣровато-желтоваты, дряблыя; на внутренней оболочкѣ аорты небольшое количество плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ. Печень уменьшена, блѣдно-красная съ желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно плотная. Почки увеличены, капсула ихъ снимается съ трудомъ, звѣздчатыя вены сильно расширены кровью, корковый слой истонченъ, желтовато-красноватаго цвѣта, въ немъ имѣется нѣсколько круглыхъ полостей, величиной отъ горошины до боба, заполненныхъ красноватой жидкостью; пирамиды укорочены, темнокрасны. Легкія и печень сильно переполнены кровью.

663. Аксинья *Минина*, 38 л., крест. Около 10 лѣтъ постоянно пила водку, почти всегда была пьяная. 14 февр. 1904 съ утра стала пить водку, улеглась въ 12 ч. спать на полу, а въ 3 часа ее нашли мертвой.

Вскрытіе 18 февр. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Во всѣхъ полостяхъ сердца умѣренное количество темной жидкой крови; мышцы темнокрасныя, тусклыя, довольно плотныя; на внутренней оболочкѣ аорты небольшое количество бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста; слизистая красновата, набухла, зерниста. Въ верхушкахъ легкихъ прощупываются плотные узлы, величиною съ куриное яйцо, въ разрѣзѣ представляющіе нѣсколько полостей, каждая величиною въ бобъ, заполненныхъ сѣроватыми сыровидными массами, вокругъ полостей мелкіе сѣроватые узелки, величиною въ просяное зерно. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается легко, поверхность почекъ зернистая и бугристая, корковый слой истонченъ, пирамидки укорочены, въ корковомъ слоѣ множество круглыхъ кистовидныхъ расширеній, величиною въ мелкую горошину; ткань плотная. Печень желтоглинистаго-цвѣта. Легкія, селезенка, почки, мягкая мозговая оболочка сильно наполнены кровью.

664. Иванъ *Рыбкинъ*, 33 л., крест., столяръ. Жизнь велъ крайне нетрезвую. Два дня подрядъ пьянствовалъ. 22 февр. 1904 улегся на полу, гдѣ спустя 3 часа найденъ мертвымъ.

Вскрытіе 25 февр. 1904. Ниже средняго роста, средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 12×12 снт.; во всѣхъ полостяхъ много темной жидкой крови съ небольшимъ количествомъ рыхлыхъ сгустковъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0.5; мышцы ихъ тусклыя, темнокрасныя, довольно плотныя; отъ крови сердца чувствуется ясный запахъ спирта. Слизистая желудка утолщена, покрыта толстымъ слоемъ слизи, красновата, зерниста. Легкія, селезенка, почки, печень сильно переполнены кровью. Отъ мозга чувствуется ясный запахъ спирта.

665. Владиміръ *Ивановъ*, 24 л., палатный надзиратель. Время отъ времени злоупотреблялъ спиртными напитками. Выпилъ 2—4 рюмки водки и легъ спать, утромъ 11 марта 1904 найденъ въ своей кровати мертвымъ.

Вскрытіе 14 марта 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира по бороздкамъ, дряблое, не сокращенное; всѣ его полости пусты, за исключеніемъ праваго предсердія, въ которомъ имѣется немного темной жидкой крови со слабымъ спиртнымъ запахомъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,3; мышцы ихъ дряблыя, тусклыя, буроватыя; на внутренней оболочкѣ аорты небольшія бѣловатыя бляшки. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста, слизистая утолщена, темно-красна. Легкія, почки, печень, мозговыя оболочки сильно наполнены кровью.

666. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, на видъ около 20 лѣтъ. 27 сент. 1904 поднятъ во дворѣ ночлежнаго дома въ безсознательномъ состояніи, по дорогѣ въ пріемный покой умеръ.

Вскрытіе 30 сент. 1904. Роста 165,0 снт., тѣлосложенія средняго,

умѣреннаго питанія. Сердце 12 × 11 × 6,5 снт., всѣ его полости переполнены темною жидкою кровью съ рыхлыми сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,6 снт., праваго—0,6; мышцы ихъ темно-краснаго цвѣта, довольно плотны. Содержимое желудка съ яснымъ запахомъ спирта. Легкія, селезенка, почки, печень, мозговыя оболочки, мозгъ сильно наполнены кровью.

667. Марья *Гурьева*, 22 л., крест., башмачница. Вела нетрезвый образъ жизни. 29 сент. 1904 была сильно пьяна, поднятая на шоссе въ болѣзненномъ состояніи, по дорогѣ умерла.

Вскрытіе 3 окт. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце 10 × 11,5 снт.; всѣ его полости переполнены темной жидкой кровью, пахнущей спиртомъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,4, мышца блѣдно-красная, умѣренной плотности. Содержимое желудка пахнетъ спиртомъ; слизистая красновата, набухла, зерниста, покрыта толстымъ слоемъ густой слизи. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, въ немъ находится нѣсколько вдавленій, величиною отъ просяного зерна до горошины, въ разрѣзахъ бѣловатаго цвѣта, довольно плотны. Печень уменьшена въ объемѣ, ткань блѣдно-красноватая, сильно наполнена кровью; по направленію сосудовъ имѣется множество бѣловатыхъ плотныхъ полосокъ. Ткань мозга полнокровна. Изъ черепной полости и отъ вещества мозга чувствуется ясный запахъ спирта.

668. Егоръ *Петровъ*, крест., 29 л., занимался извозомъ. 14 окт. 1904 тонувшаго въ канавѣ вытащили на дорогу, онъ былъ теплъ и барахтался руками. Оставивъ его, бросились за помощью, вернувшись нашли его вновь въ канавѣ, головою внизъ, вытащили уже мертвымъ. Въ послѣднее время часто предавался пьянству.

Вскрытіе 17 окт. 1904. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. При вскрытіи брюшной и грудной полости чувствуется ясный запахъ спирта. Слизистая желудка, содержимое котораго пахнетъ спиртомъ, покрыта толстымъ слоемъ бѣловатой слизи, красна, зерниста. Во всѣхъ полостяхъ сердца много темной жидкой крови; на внутренней оболочкѣ аорты небольшое количество мелкихъ бѣловатыхъ бляшекъ. Оба легкія значительно спались. Капсула почекъ снимается съ трудомъ. Корковый слой утолщенъ, границы слоевъ неясны. Ткань печени довольно плотная, по направленію сосудовъ много бѣловатыхъ плотныхъ полосокъ.

669. Андрей *Ашастинъ*, 41 г., крест., судорабочій. За послѣднее время выпивалъ. 17 окт. 1904 въ безчувственно-пьяномъ видѣ поднятъ на улицѣ и по доставленіи въ пріемный покой умеръ.

Вскрытіе 20 окт. 1904. Высокаго роста, средняго сложенія и питанія. Сердце значительно увеличено; во всѣхъ полостяхъ его, но особенно справа имѣются въ изобиліи темные сгустки и жидкая кровь, нѣкоторые сгустки двухцвѣтные; мускулатура сердца жестковата, съ желтоватымъ оттѣнкомъ; стѣнка праваго желудочка проращена жиромъ, мѣстами почти сплошь. Слизистая желудка зерниста, обложена слизью, сѣровата. Отъ крови легкихъ пахнетъ спиртомъ. Ткань печени съ ясной желтизной и сальнымъ блескомъ разрѣза. Капсула почекъ снимается легко, корковый слой мѣстами узковатъ, жиръ около лоханокъ разросся. Твердая мозговая оболочка значительно напряжена и въ сосудахъ ея довольно много крови; вены мягкой оболочки сильно наполнены кровью.

670. Иванъ *Майоровъ*, 44 л., крест., каменщикъ. Изрѣдка пилъ водку, но умѣренно, часто жаловался на боль праваго бедра и вслѣдствіе этого иногда не работалъ. 23 окт. 1904 умеръ внезапно, разговаривая, лежа на кровати.

Вскрытіе 26 окт. 1904. Высокаго роста, средняго питанія. Въ лѣвую

сторону отклоненъ немного пониженный уголъ рта, лѣвая носо-губная складка выражена много рѣзче правой. На внутренней поверхности праваго бедра въ верхней трети имѣется поперечный блѣдный втянутый рубецъ, повидимому, сращенный съ подлежащей фасціей. Слышенъ отъ области желудка исходящій спиртный запахъ. Въ желудкѣ около 600 к. с. пищевой смѣси со спиртнымъ запахомъ, слизистая истончена, сѣро-аспиднаго цвѣта. Сердце значительно увеличено и обложено жиромъ; во всѣхъ полостяхъ его много темной жидкой крови; на сердцѣ есть молочно-мутныя пятна. Въ верхушкѣ лѣваго легкаго имѣются темно-сѣрые плотные узлы, почти безвоздушные. Ткань легкихъ сильно полнокровна. Твердая оболочка значительно напряжена; сосуды мягкой сильно налиты кровью; на разрѣзахъ мозговой ткани значительно выступаютъ много кровяныхъ точекъ и полосъ и бѣлое вещество быстро пріобрѣтаетъ розовый оттѣнокъ.

671. Наталья *Бушуева*, около 29 л., мѣщ. Найдена мертвою на улицѣ. Подъ верхнимъ платьемъ нѣтъ бѣлья.

Вскрытіе 6 окт. 1906. Умѣреннаго роста и питанія. Соединительныя оболочки темно-краснаго цвѣта. Сердце сокращено, въ лѣвой половинѣ сердца темная жидкая кровь съ довольно объемистыми рыхлыми темно-красными сгустками; правая половина—почти пустая. По снятіи черепной крышки слышенъ ясный спиртный запахъ. Содержимое желудка съ запахомъ спирта, слизистая нѣсколько утолщена. Легкія довольно объемистыя, темно-краснаго цвѣта; на разрѣзѣ выступаетъ много пѣнистой жидкости, смѣшанной съ темно-красной кровью. Слои почекъ различимы съ трудомъ. Ткань печени при разрѣзѣ хруститъ, съ глинистымъ оттѣнкомъ, на ножѣ остается сальный налетъ, рисунокъ слабо выраженъ.

672. Егоръ *Егоровъ*, 36 л., крест. Умеръ 6 янв. 1907.

Вскрытіе 12 янв. 1907. Средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Пальцы на рукахъ и ногахъ представляются нѣсколько опухшими, синевато-красноватаго цвѣта. Сердце значительно увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблое; во всѣхъ его полостяхъ находится темная, какъ бы лаковая кровь; мышца сердца дрябловата, буроватая съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Содержимое желудка съ запахомъ спирта, слизистая—складчатая. Шейныя вены какъ подкожныя, такъ и глубокія переполнены темною лаковою кровью. При выниманіи мозга слышится ясный спиртный запахъ. Сосуды основанія мозга жестковаты, зіяютъ. Слои почекъ различимы съ трудомъ, лоханки сильно обложены жиромъ.

673. Михаилъ *Богдановъ*, 23 л., крест. Съ 16 лѣтъ сильно употреблялъ спиртные напитки, жилъ при отцѣ, ничѣмъ не занимался, каждый день былъ пьянъ, ни на какую боль никогда не жаловался. 21 янв. 1907 вернулся домой въ сильно пьяномъ видѣ, съ $^1/_4$ часа пѣлъ пѣсни, а затѣмъ повалился на кровать и уснулъ, и черезъ нѣсколько часовъ найденъ мертвымъ.

Вскрытіе 22 янв. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. При вскрытіи полостей ощущается спиртный запахъ. Сердце содержитъ въ полостяхъ довольно много жидкой крови. Ткань легкихъ въ разрѣзѣ темно-краснаго, почти чернаго цвѣта, весьма сочна. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ весьма большое количество крови.

674. Андрей *Мустонекъ*, 51 г., крест. По выходѣ изъ больницы 5 янв. каждый день пилъ водку до опьяненія. 17 янв. 1908 возвратился домой въ сильно пьяномъ видѣ и не раздѣваясь легъ спать; ночью было обнаружено, что онъ мертвъ.

Вскрытіе 23 янв. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, значительно обложено жиромъ,

очень дряблое; полости его пусты; мышца сердца очень дряблая, буровато-глинистаго цвѣта. Слизистая желудка сѣро-аспиднаго цвѣта, слегка истончена. Печень, легкія полнокровны. Сосуды основанія мозга жестковаты.

675. Василій *Бѣляковъ*, 37 л., крест., поднятъ мертвымъ на льду Обводнаго канала 5 марта 1907.

Вскрытіе 11 марта 1907. Роста выше средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. При вскрытіи грудной и брюшной полостей ощущается довольно сильный спиртный запахъ. Во всѣхъ полостяхъ сердце содержитъ много темной жидкой крови; сердечная мышца тусклая. Слизистая желудка набухшая, зернистая, покрыта бѣловатой слизью. Капсула почекъ не вполнѣ свободно отдѣляется, корка немного утолщена, блѣдна, испещрена темно-красными полосками, основанія пирамидокъ также темно-красны. Легкія, печень, мозговыя оболочки полнокровны.

676. Яковъ *Анисимовъ*, 27 л., крест. 17 окт. 1907 въ безчувственно-пьяномъ видѣ поднятъ на улицѣ и отправленъ въ часть для вытрезвленія, гдѣ и умеръ.

Вскрытіе 19 окт. 1907. Роста выше средняго, крѣпкаго тѣлосложенія и умѣреннаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, дряблое, полости его выполнены темной кровью. Въ желудкѣ около $1^1/_2$ литра пищевой кашицы съ рѣзкимъ запахомъ спирта; слизистая красноватаго цвѣта, покрыта слизью. При выниманіи мозга слышится спиртный запахъ.

677. Павелъ *Некрасовъ*, 32 л., крест. Нѣсколько лѣтъ пьянствовалъ, а послѣднее время особенно сильно, по нѣсколько дней сряду. 10 нояб. 1907 вечеромъ ушелъ въ баню, а черезъ нѣсколько часовъ былъ привезенъ въ безчувственно-пьяномъ видѣ; ничего не говорилъ, а только храпѣлъ въ носъ, въ 12 ч. ночи замолчалъ, при осмотрѣ оказалось, что онъ мертвъ.

Вскрытіе 15 нояб. 1907. Роста ниже средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, дрябло, сильно обложено жиромъ; во всѣхъ полостяхъ его находится темная кровь въ обильномъ количествѣ; мышца сердца дрябловата, съ глинистымъ оттѣнкомъ, проросла полосками жира. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста; слизистая блѣдна, истончена, легко облѣзаетъ. Сосуды основанія мозга жестковаты, слегка извиты, зіяютъ. При выниманіи мозга слышится спиртный запахъ.

678. Николай *Яковлевъ*, 25 л., крест. 26 дек. 1907 въ совершенно пьяномъ видѣ былъ поднятъ съ улицы и доставленъ на квартиру, черезъ часъ обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 29 дек. 1907. Выше средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія и умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено, дряблое, во всѣхъ его полостяхъ находится много темной густой крови. Содержимое желудка съ запахомъ спирта; слизистая нѣсколько утолщена. Слизистая дыхательныхъ путей красноватаго цвѣта вслѣдствіе налитія мелкихъ сосудовъ. При выниманіи мозга былъ слышенъ спиртный запахъ. Печень, легкія, мозговыя оболочки полнокровны.

679. Федоръ *Яковлевъ*, 35 л., крест., маляръ. Все лѣто предавался пьянству и до послѣдняго дня. Ночью доставили его совершенно пьянаго, въ 2 ч. дня 27 окт. 1908 проснулся и опять напился пьяный, затѣмъ легъ спать и спустя нѣсколько времени былъ обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 31 окт. 1908. Роста выше средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце немного увеличено, во всѣхъ полостяхъ находится много темной крови съ обильными рыхлыми темнокрасными сгустками; мышца сердца буроватаго цвѣта, по мѣстамъ на ней замѣтны

сѣроватыя прослойки. Содержимое желудка съ запахомъ спирта, слизистая блѣдно-красновата, слегка зерниста. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей слегка набухла, красноватаго цвѣта вслѣдствіе налитія мелкихъ сосудовъ. Изъ бронховъ выдавливается гноевидная слизь, стѣнки ихъ слегка утолщены. Въ кишкахъ—ленточная глиста. Ткань почекъ плотновата, лоханки довольно сильно обложены жиромъ. При выниманіи мозга слышенъ спиртный запахъ. Сосуды основанія мозга немного извиты.

680. Иванъ *Богдановъ*, 38 л., крест., чернорабочій. Находился безъ всякихъ занятій, сильно пьянствовалъ, постоянно жаловался на боль въ груди и говорилъ, что ему все въ тѣлѣ холодитъ и все что-то болитъ. 8 нояб. 1908 пьяный былъ задержанъ за кражу и въ части скоропостижно умеръ.

Вскрытіе 12 нояб. 1908. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, во всѣхъ его полостяхъ темная кровь. Содержимое желудка съ рѣзкимъ запахомъ спирта, слизистая слегка набухшая, легко облѣзаетъ. При выниманіи мозга слышенъ спиртный запахъ. Ткань почекъ плотновата, пирамидки болѣе темнаго цвѣта, лоханки довольно сильно обложены жиромъ.

681. Георгій *Холодовскій*, 22 л., мѣщ. Спиртные напитки употреблялъ въ большомъ количествѣ. 7 нояб. 1908 пришелъ домой пьянымъ, выпилъ стаканъ водки и легъ на кровать, гдѣ незамѣтно для присутствующихъ скоропостижно умеръ.

Вскрытіе 15 нояб. 1908. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце немного увеличено, дрябловато, во всѣхъ полостяхъ много темной густой крови. Содержимое желудка съ рѣзкимъ запахомъ спирта, слизистая слегка набухшая, складчатая. Легкія полнокровны, изъ перерѣзанныхъ бронховъ выдавливаются капельки зеленоватой гноевидной слизи. При выниманіи мозга слышенъ спиртный запахъ.

682. Павелъ *Александровъ*, 28 л., крест., легковой извозчикъ. 13 февр. 1909 обнаруженъ сидящимъ на козлахъ въ безчувственномъ состояніи, при доставленіи въ пріемный покой оказался мертвымъ.

Вскрытіе 18 февр. 1909. Роста выше средняго, крѣпкаго тѣлосложенія, довольно хорошаго питанія. Голени въ нижней части отечны. Сердце немного увеличено, на ощупь дрябловато; во всѣхъ его полостяхъ много темной густой крови; внутренняя оболочка сердца и аорты окрашена въ сплошной темнокрасный цвѣтъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 1,0 снт., а праваго—0,4, мышца съ глинистымъ оттѣнкомъ. Содержимое желудка съ запахомъ спирта, слизистая нѣсколько утолщена, зерниста, складчата, легко облѣзаетъ. Сосуды основанія мозга нѣсколько извиты; при выниманіи мозга слышенъ спиртный запахъ.

683. Андрей *Васильевъ*, 30 л., крест., чернорабочій. Сильно пьянствовалъ. 2 нояб., какъ пьянаго препроводили въ часть для вытрезвленія, а оттуда въ больницу, гдѣ онъ и умеръ 3 нояб. 1909.

Вскрытіе 11 нояб. 1909. Роста средняго, тѣлосложенія и питанія умѣреннаго. Сердце немного увеличено, во всѣхъ его полостяхъ темная кровь; внутренняя оболочка сердца окрашена въ сплошной красноватый цвѣтъ; мышца дрябловата. Слизистая желудка слегка набухла, зерниста. Въ мочевомъ пузырѣ около 4 стакановъ мочи.

Задушеніе рвотными массами.

684. Марія *Ефимова*, 3 мѣс., 30 янв. 1900 умерла скоропостижно ночью; спала на одной кровати вмѣстѣ съ матерью.

Вскрытіе 3 февр. 1900. Длина 56 снт. Развита и сложена сообразно

возрасту, питанія удовлетворительнаго. На наружной поверхности сердца множество темнокрасныхъ рѣзко-ограниченныхъ кровоизліяній въ видѣ пятенъ величиною отъ просяного зерна до горошины, а на задней поверхности на границѣ предсердія съ желудочками эти пятна сливаются въ одно обширное пятно; полости сердца переполнены темною кровью съ весьма рыхлыми сгустками. Подъ плеврою на легкихъ во многихъ мѣстахъ замѣтны также рѣзко-ограниченныя темнокрасныя кровоизліянія въ видѣ пятенъ отъ просяного зерна до горошины; ткань легкихъ переполнена кровью, но повсюду проходима для воздуха. Въ зѣвѣ и при входѣ въ гортань большое скопленіе слизи и бѣловатыхъ пищевыхъ кусочковъ, которые находятся и въ дыхательномъ горлѣ. Пазухи твердой мозговой оболочки и сосуды мягкой переполнены кровью.

685. Ольга *Краузева (Яковлева)*, $3^1/_2$ мѣс. Все время дѣвочка была здорова и весела. 6 окт. 1900 въ 5 часу ночи мать проснувшись накормила дѣвочку и, когда та уснула на рукахъ, положила ее въ люльку; въ 6 часу нашли ее мертвой.

Вскрытіе 9 окт. 1900. Длиною 53 сант., вѣсомъ 3950 гр. Хорошаго тѣлосложенія и питанія. На соединительной оболочкѣ нижняго вѣка праваго глаза и на глазномъ яблокѣ съ наружной стороны находятся мелкія точечныя кровоизліянія; тоже—и на нижнемъ вѣкѣ праваго глаза. На наружной поверхности сердца сзади, а также и у верхушки находятся мелкіе съ конопляное зерно экхимозы; полости заключаютъ большое количество темной жидкой крови, въ особенности правыя. Легкія какъ-бы обрызганы множествомъ мелкихъ кровоизліяній до просяного зерна величиною, свѣтло-краснаго цвѣта. Въ дыхательномъ горлѣ и бронхахъ находится небольшое количество бѣловатой слизистой жидкости съ примѣсью мелкихъ комочковъ свернувшагося молока. Въ желудкѣ находится около 2 чайныхъ ложекъ молочно-бѣлой жидкости съ плотными бѣлыми свертками.

686. Константинъ *Холодовъ*, 17 л., крест. Страдалъ около 4 лѣтъ падучей, припадки случались разъ въ недѣлю, иногда и рѣже. Чувствуя приближеніе припадка, ложился. 6 нояб. 1900 послѣ послѣдняго припадка найденъ лежащимъ ничкомъ на кровати, уткнувшись въ подушку, мертвымъ.

Вскрытіе 8 нояб. 1900. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія и питанія. Губчатое вещество костей черепа переполнено кровью; твердая мозговая оболочка на всемъ пространствѣ сращена со сводомъ черепа; сосуды мягкой переполнены кровью. Боковые желудочки переполнены прозрачной водянистой жидкостью. Ткань мозга отечна. На днѣ 4-го желудочка сосуды сильно расширены. На задней поверхности сердца въ области праваго желудочка находится пятно въ просяное зерно, свѣтло-краснаго цвѣта, рѣзко-ограниченное; въ правой половинѣ сердца много темножидкой крови, лѣвый желудочекъ пустой, а лѣвое предсердіе заключаетъ умѣренное количество темножидкой крови; на внутренней поверхности аорты мелкія съ просяное зерно бѣлыя плотныя бляшки. Легкія переполнены кровью. Подъ легочною плеврою въ нѣсколькихъ мѣстахъ легкихъ, въ особенности на нижнихъ поверхностяхъ замѣчается нѣсколько рѣзко-ограниченныхъ темнокрасныхъ круглыхъ пятенъ величиною до просяного зерна. Въ полости рта, пищевода, гортани и дыхательнаго горла находится бѣловатая пищевая смѣсь, которая совершенно заполняетъ и средніе, и мелкіе бронхи; слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла темнокрасна. Печень, селезенка, почки переполнены кровью.

687. Михаилъ *Потяевъ*, 30 л., крест., торговецъ. Найденъ 10 нояб. 1900 мертвымъ на полу, гдѣ онъ легъ чувствуя, что ему жарко; былъ въ нетрезвомъ видѣ. Жизнь велъ трезвую, часто жаловался на боль въ груди и одышку.

Вскрытіе 12 нояб. 1900. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, достаточнаго питанія. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ сильно наполнены темною жидкою кровью. На эпендимѣ желудочковъ, въ томъ числѣ и 4-го, рѣзко замѣтны переполненные кровеносные сосуды. Артеріи основанія мозга имѣютъ достаточно тонкія стѣнки. Сердце нѣсколько увеличено, содержитъ въ обѣихъ половинахъ довольно много рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ. Содержимое желудка имѣетъ проницательный спиртный запахъ. Капсула почекъ легко снимается, ткань почти сплошного темно-краснаго цвѣта; корковый слой набухшій. Въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей содержалось около 2-хъ столовыхъ ложекъ жидкости, напоминающей содержимое желудка, въ смѣси съ сукровицей. Слизистая оболочка у входа въ гортань и по всему протяженію дыхательныхъ путей сильно покраснѣвшая. Легкія по вскрытіи грудной клѣтки не спадаются. Съ поверхности разрѣзовъ легкихъ соскабливается много жидкой крови и водянистой пѣнистой жидкости; кромѣ того изъ мелкихъ развѣтвленій дыхательныхъ путей выдавливается сѣроватая жидкость, имѣющая сходство съ содержимымъ желудка.

688. Петръ *Кузнецовъ*, 38 л., мѣщ., извозчикъ. Найденъ въ постели мертвымъ 15 нояб. 1900, легъ спать пьянымъ. Велъ жизнь нетрезвую.

Вскрытіе 19 нояб. 1900. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира снаружи; всѣ его полости переполнены темною жидкою кровью; мышца сердца темно-краснаго цвѣта съ яснымъ желтоватымъ оттѣнкомъ. Въ полости гортани и дыхательнаго горла находится много кровянистой жидкости, смѣшанной съ кусочками, подобными находящейся въ пищевой смѣси желудка; слизистая оболочка гортани, дыхательнаго горла и бронховъ темно-краснаго цвѣта. Сосуды мягкой мозговой оболочки заключаютъ большое количество крови.

689. Александръ *Горшковъ*, 44 л., мѣщ., рабочій. Часто предавался сильному пьянству и пилъ до той поры, пока у него ничего не оставалось. Пилъ послѣдніе четыре дня подрядъ. 13 дек. 1900 утромъ найденъ мертвымъ на полу возлѣ кровати въ дворницкой.

Вскрытіе 15 дек. 1900. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Въ полости желудка находится 600 куб. снт. кашицеобразной пищевой смѣси. Сердце 12×12 снт., съ большимъ отложеніемъ жира спереди и фиброзными плотными бѣлыми бляшками; правая его половина переполнена темной жидкой кровью, а въ лѣвомъ предсердіи—умѣренное количество; стѣнки желудочковъ утолщены вдвое, мышцы ихъ буро-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, довольно плотны, двустворчатый клапанъ утолщенъ и мутенъ, слегка сморщенъ; на внутренней оболочкѣ аорты мелкія бѣловатыя бляшки, отверстія вѣнечныхъ артерій нѣсколько сужены. Легкія сильно переполнены кровью. Въ полости гортани и дыхательнаго горла находится большое количество кровянистой жидкости, смѣшанной съ пищевыми веществами; тоже—въ среднихъ и мелкихъ бронхахъ; слизистая оболочка дыхательныхъ путей сильно красна. Въ зѣвѣ и при входѣ въ гортань много пищевой смѣси. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, корковый слой утолщенъ, пирамидки укорочены. Печень, почки, мозгъ переполнены кровью.

690. Матвѣй *Арсентьевъ*, 5 мѣс., крест. Два послѣдніе мѣсяца болѣлъ животомъ и ночью на 17-е дек. 1900 умеръ на рукахъ у матери на желѣзной дорогѣ.

Вскрытіе 20 дек. 1900. Росту 65 сант., хорошаго сложенія и питанія. Слизистая желудка утолщена, покрыта густымъ слоемъ слизи. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, правая половина его переполнена темной кровью,

съ довольно плотными сгустками, лѣвое предсердіе также переполнено кровью, въ лѣвомъ желудочкѣ находится немного жидкой крови; стѣнки желудочковъ значительно утолщены, мышцы ихъ блѣдновато-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Подъ плеврою на легкихъ, особенно на правомъ, почти повсюду разбросаны рѣзко-выраженныя кругловатыя ярко- и темнокрасныя пятна отъ просяного зерна до мелкой горошины (экхимозы). Бронхіальныя железы увеличены до лѣсного орѣха, довольно плотны, въ разрѣзахъ сѣровато-желтоватаго цвѣта, въ центрахъ имѣютъ бѣло-сѣроватый распадъ; верхушка праваго легкаго уплотнена, въ разрѣзахъ блѣдно-краснаго цвѣта, мало проходима для воздуха, заключаетъ множество сѣроватыхъ мелкихъ узелковъ. Въ полости гортани, дыхательнаго горла и всѣхъ бронховъ находится большое количество мутной бѣловатой жидкости, совершенно сходной съ жидкостью въ желудкѣ; слизистая оболочка дыхательныхъ путей блѣдна. Почки увеличены, корковый слой утолщенъ, бѣловатаго цвѣта съ сальнымъ блескомъ, плотны. Слизистая тонкихъ кишекъ набухла, утолщена, солитарныя железки повсюду увеличены до просяного зерна, въ толстыхъ кишкахъ значительно болѣе, чѣмъ въ тонкихъ.

691. Александръ-Альфредъ *Кутвокенъ*, 50 л., торговецъ въ разносъ. Велъ жизнь нетрезвую, послѣднюю недѣлю сильно пилъ водку и ничего не ѣлъ. Наканунѣ пришелъ сильно пьяный, всю ночь пилъ водку и утромъ легъ спать на полъ и скоро сталъ храпѣть и умеръ, 22 янв. 1901. Послѣ каждаго его пьянства бывала рвота зеленью по нѣсколько дней.

Вскрытіе 26 янв. 1901. Выше средняго роста, сложенія правильнаго, средняго питанія. Сердце $10^1/_2 \times 10^1/_2$ снт., значительныя отложенія жира на задней поверхности подъ перикардомъ, желудочки сокращены, полости ихъ пусты, лѣвое венозное кольцо съ трудомъ пропускаетъ 2 пальца, мышцы сердца съ желтоватымъ оттѣнкомъ; по краямъ двустворчатаго клапана кромѣ старыхъ мутноватыхъ утолщеній имѣется цѣлый рядъ свободныхъ болѣе мягкихъ розоватаго цвѣта, похожихъ на грануляціи, разращеній; и тѣ и другія сильно суживаютъ ширину двустворки, а равно и отверстіе ея. Кромѣ пѣнистой жидкости въ просвѣтѣ крупныхъ бронховъ содержатся многочисленные куски; при микроскопированіи ихъ, а равно содержимаго мельчайшихъ бронховъ найдены жировыя капли, мышечныя и соединительно-тканныя волокна, крахмальныя зерна. Корковый слой почекъ истонченъ.

692. Федотъ *Котовъ*, 54 л., крест., прислуга. Найденъ мертвымъ на полу 29 янв. 1901. Довольно часто выпивалъ, наканунѣ смерти былъ пьянъ порядочно.

Вскрытіе 30 янв. 1901. Высокаго роста, крѣпкаго сложенія, хорошаго питанія. Сердце увеличено; спереди у верхушки на небольшомъ протяженіи сращено съ сердечной сорочкой довольно длинными рыхлыми старыми ложными перепонками; правый желудочекъ и оба предсердія переполнены темною жидкою кровью; сердце 11×13 снт.; по бороздамъ обложено обильно жиромъ; полость праваго желудочка растянута, стѣнка его, особенно у верхушки, истончена; мускулатура сердца дряблая, съ желтоватымъ оттѣнкомъ; на внутренней поверхности сердечныхъ артерій мѣстами замѣчаются незначительныя склеротическія бляшки. Кровь имѣетъ рѣзкій спиртный запахъ. Изъ гортани вытекаетъ въ большомъ количествѣ красноватая слизистая съ примѣсью мелкихъ комочковъ пищи жидкость. На стѣнкахъ слизистой оболочки гортани, дыхательнаго горла, крупныхъ и среднихъ бронховъ всюду видны въ большомъ количествѣ приставшіе бѣловатые комочки. При надавливаніи на ткань выступаютъ такіе-же комочки, при микроскопическомъ изслѣдованіи оказавшіеся жировыми каплями и растительными клѣтками. Почки сращены своимъ нижнимъ концомъ, подковообразны, 29 сант., капсула

снимается съ трудомъ. Стѣнки сосудовъ основанія мозга нѣсколько уплотнены.

693. Михаилъ *Шагинъ*, $1^1/_2$ мѣс., крест. Ѣхалъ на рукахъ у матери около 200 верстъ по неудобной дорогѣ, и по желѣзной дорогѣ; 2 февр. 1901 утромъ ослабѣлъ и не сталъ принимать груди, а часовъ черезъ шесть умеръ.

Вскрытіе 9 февр. 1901. Длиною 56 снт., вѣсомъ 3180 гр., тѣлосложенія средняго; значительное исхуданіе. Правая половина сердца, а также лѣвая половина его переполнена темной кровью, мышца сердца блѣднокраснаго цвѣта. Подъ легочной плевою повсюду на легкихъ разбросано множество рѣзко-ограниченныхъ ярко- и темнокрасныхъ пятенъ кругловатаго очертанія отъ просяного зерна до боба; тоже—и на наружной поверхности сердца, но въ значительно меньшемъ количествѣ, величиною до просяного зерна. Просвѣты бронховъ до мельчайшихъ развѣтвленій заполнены вязкой мутно-бѣловатой слизью. Въ полости зѣва, гортани и дыхательнаго горла находится вязкая мутно-бѣловатая слизь, которая ихъ совершенно заполняетъ. Печень, почки, мозгъ значительно переполнены кровью, селезенка—умѣренно. Въ тонкихъ кишкахъ много желтоватой слизи, смѣшанной съ крупинками свернувшагося молока; слизистая слегка набухла. Толстыя кишки заключаютъ бѣловатую слизь, довольно густую; слизистая—въ такомъ же состояніи. Ткань мозга полнокровна.

694. Егоръ *Ершовъ*, 33 л., крест., извозчикъ. Въ послѣдніе пять лѣтъ предавался сильно пьянству, по временамъ жаловался на боль въ груди и въ особенности въ области сердца. 7 февр. 1901 вечеромъ вернулся съ извоза въ пьяномъ видѣ, съ нимъ сразу сдѣлалось дурно, а черезъ пять минутъ оказался мертвымъ, старались оживить растираніемъ и качаніемъ.

Вскрытіе 12 февр. 1901. Выше средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія, соединительныя оболочки глазъ переполнены кровью, зрачки равномѣрно расширены. Слизистая оболочка желудка повсюду равномѣрно и сильно красна, набухла, зерниста, покрыта толстымъ слоемъ слизи. Сердце довольно значительно увеличено въ объемѣ, съ значительными отложеніями жира снаружи; всѣ его полости значительно наполнены темною жидкою кровью; стѣнки желудочковъ утолщены вдвое; мышцы ихъ бурокраснаго цвѣта съ желтоватыми и бѣловатыми прослойками, довольно плотны. Всѣ бронхи какъ средніе, такъ и мелкіе переполнены красноватой жидкостью съ кусочками пищевыхъ веществъ, похожими на содержащіеся въ желудкѣ. Полость зѣва, гортани и дыхательнаго горла до его развѣтвленія переполнена красноватою мутною жидкостью съ большимъ количествомъ мелкихъ бѣловатыхъ пищевыхъ кусочковъ. Печень, селезенка, почки, мозговыя оболочки переполнены кровью.

695. Павелъ *Мясоѣдовъ*, 41 г., мѣщ., фельдшеръ. 12 февр. 1901 возвратился послѣ 9 часовъ домой выпивши, дома продолжалъ пить водку и пиво. Домашніе легши спать услышали сильный храпъ и, подбѣжавъ къ нему, увидѣли, что изо рта идетъ пѣна; по дорогѣ въ пріемный покой умеръ.

Вскрытіе 19 февр. 1901. Средняго роста, слабаго тѣлосложенія и питанія. Сердце замѣтно увеличено, съ большимъ отложеніемъ жира спереди; правая половина переполнена темно-вишневой жидкой кровью, въ лѣвой—немного крови; чувствуется ясный запахъ алкоголя; стѣнки желудочковъ немного утолщены, мышцы съ желтоватыми прослойками, дряблы; клапаны аорты утолщены, мутно-бѣловатаго цвѣта и сморщены; на внутренней оболочкѣ аорты находится множество довольно объемистыхъ плотныхъ бляшекъ съ известковыми отложеніями. Ткань легкихъ сильно переполнена кровью, отечна. Полость гортани и дыха-

тельнаго горла заполнена кашицеобразными массами, а также—вторичные бронхи и мельчайшія развѣтвленія ихъ въ легкихъ; слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла сильно красна. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы.

696. Егоръ *Филипповъ*, 8 л., мѣщ. Вечеромъ сильно болѣла голова, опухли железы, на другой день днемъ 16 фев. 1901 умеръ. Годъ назадъ боленъ былъ скарлатиной.

Вскрытіе 20 февр. 1901. Росту 112 снт., средняго тѣлосложенія, слабаго питанія. Шея вверху спереди немного утолщена насчетъ увеличенія легко прощупываемыхъ лимфатическихъ железъ въ подчелюстныхъ областяхъ, въ области дѣленія сонныхъ артерій и угловъ нижней челюсти. Железы эти оказались красноваты, въ разрѣзахъ сочны; мѣстами на разрѣзахъ видны небольшія гнѣзда гноевиднаго размягченія. Подъ эпикардомъ многочисленныя точечныя кровоизліянія; сердце нѣсколько увеличено; полости обоихъ предсердій и праваго желудочка растянуты большимъ количествомъ кровянистыхъ сгустковъ, отчасти обезцвѣченныхъ; мышца дрябла, съ желтоватымъ оттѣнкомъ; по краямъ двустворчатаго клапана имѣются розоватыя довольно мягкія утолщенія. Клѣтчатка на шеѣ вверху около сосудовъ и лимфатическихъ железъ пропитана прозрачной серозной жидкостью. Ткани зѣва—мягкое небо, язычекъ, въ особенности миндалевидныя железы сильно утолщены, сочны, красноваты, мѣстами на разрѣзѣ железы имѣютъ гноевидныя гнѣзда размягченія. Лимфатичаскій аппаратъ на корнѣ языка въ состояніи остраго набуханія. На слизистой гортани, дыхательнаго горла, крупныхъ, среднихъ и мелкихъ бронховъ—довольно толстый слой пищевой смѣси. На діафрагмальной поверхности лѣваго легкаго имѣется два точечныхъ кровоподтека. Границы почечныхъ слоевъ мѣстами совершенно неясны; ткань—съ замѣтно желтоватымъ оттѣнкомъ; въ корковомъ слоѣ мѣстами точечныя кровоизліянія. Мозговыя оболочки значительно переполнены кровью.

697. Александръ *Смирновъ*, 19 л., крест., столяръ. Жизнь велъ крайне нетрезвую, Пришелъ въ мастерскую сильно пьянымъ и тутъ же выпилъ еще $^1/_{40}$ водки и свалился на полъ; на утро 23 апр. 1901 найденъ мертвымъ.

Вскрытіе 25 апр. 1901. Средняго роста, хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено; всѣ его полости переполнены темною жидкою кровью; подъ серозною оболочкою какъ на передней поверхности, такъ особенно сзади находится множество рѣзко-ограниченныхъ кругловатыхъ пятнышекъ отъ маковаго до просяного зерна; стѣнки желудочковъ утолщены. Содержимое желудка спиртнаго запаха. Подъ легочной плевой во многихъ мѣстахъ, особенно въ складкахъ между долями находится множество рѣзко-ограниченныхъ темно-красныхъ пятенъ неправильной формы отъ просяного зерна до горошины. Въ полости гортани и дыхательнаго горла множество кусочковъ пищевой смѣси желудка, проникающихъ до мелкихъ развѣтвленій бронховъ. Слизистая оболочка сильно и равномѣрно красна. Печень, почки, мозговыя оболочки переполнены кровью.

698. Пелагея *Лаврова*, 40 л., крест., работала на канатной фабрикѣ, 2 сент. 1901 найденъ ея трупъ подъ аркой городской подземной трубы, выходящей въ Неву. Выпивала, но пьяницей не была; ушла изъ дому на работу 17 сент. и больше никто ея не видѣлъ.

Вскрытіе 4 окт. 1901. Ниже средняго роста, средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Желудокъ растянутъ, въ немъ около 850 ксм. содержимаго съ замѣтнымъ запахомъ спирта. Сердце немного увеличено, значительно обложено жиромъ, мышца съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дрябла. Въ зѣвѣ, полости гортани, дыхательнаго горла и мелкихъ бронховъ находится значительное количество жидкости, подобной найденной въ желудкѣ. Почки уменьшены въ объемѣ, корковый слой истонченъ, желтоватаго цвѣта съ сальнымъ блескомъ; плотны. Печень, почки значительно наполнены кровью.

699. Михаилъ *Федоровъ*, 28 л., крест., чернорабочій. 1 окт. 1901 найденъ мертвымъ на откосѣ набережной, гдѣ незадолго передъ тѣмъ усѣлся, въ этотъ день былъ изрядно выпивши. Года два уже какъ постоянно жаловался на боль въ груди.

Вскрытіе 6 окт. 1901. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, питанія умѣреннаго. Сердце нѣсколько увеличено, подъ наружнымъ покровомъ обильныя отложенія жира, правая половина переполнена темною жидкою кровью съ небольшою примѣсью рыхлыхъ свертковъ; въ лѣвой половинѣ ея немного; сердечная мышца блѣдна и слегка желтовата. Въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей заключалось около столовой ложки мутной красноватой жидкости съ примѣсью хлопьевъ и небольшихъ кусковъ пищевыхъ веществъ; такая-же жидкость выдавливается изъ мелкихъ бронховъ; слизистая оболочка дыхательныхъ путей ярко-красная. Легкія весьма объемисты и совершенно выполняли грудную полость; полнокровны. Селезенка, почки, печень полнокровны. Въ желудкѣ содержалось около одного литра кашицеобразной смѣси, имѣющей проницательный запахъ бродящаго тѣста; слизистая ясно зернистая, сѣроватая.

700. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, около 45 л., 8 окт. 1901 поднятъ съ панели сильно пьянымъ, по дорогѣ въ часть умеръ.

Вскрытіе 11 окт. 1901. Роста и тѣлосложенія средняго, умѣреннаго питанія. Сосуды основанія мозга довольно эластичны, стѣнки ихъ мутно бѣловатаго цвѣта. Слизистая оболочка желудка утолщена, зерниста; запахъ спирта. Сердце $11 \times 9^1/_2$ снт., съ большимъ отложеніемъ жира снаружи; въ правой половинѣ темная жидкая кровь въ значительномъ количествѣ, а въ лѣвой—меньше; у клапановъ аорты замѣчаются мелкія плотныя бѣловатыя бляшки. Легкія сильно вздуты, прикрываютъ сердце, сильно переполнены кровью; въ верхушкахъ—узловатыя уплотненія въ бобъ, темно-краснаго цвѣта. Въ зѣвѣ и полости гортани находятся кусочки пищи, подобные найденнымъ въ желудкѣ, и слизь; въ дыхательномъ горлѣ при развѣтвленіи бронховъ находится кусокъ мяса продолговатой формы $4 \times 2 \times 1^1/_2$ снт., кусокъ этотъ плотно вколоченъ въ дыхательное горло и сидитъ сѣдлообразно на развѣтвленіи бронховъ. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей темнокраснаго цвѣта. Печень, почки переполнены кровью.

701. Федоръ *Балдинъ*, 47 л., крест., огородникъ. Сильно пьянствовалъ. Явился пьянымъ и легъ спать, а на утро 9 окт. 1901 былъ найденъ мертвымъ.

Вскрытіе 13 окт. 1901. Высокаго роста, средняго сложенія, плохого питанія. Сердце нѣсколько увеличено; правый желудочекъ производитъ впечатлѣніе растянутаго, мускулатура его дрябла, нѣсколько желтовата, толщина стѣнки около 0,2 снт.; въ предсердіяхъ и въ правомъ желудочкѣ содержалась кровь въ умѣренномъ количествѣ и газы; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,1 снт.; по краю двустворчатаго клапана есть хрящеватой плотности утолщеніе, верхушки папиллярныхъ мышцъ желто-сѣраго цвѣта, увеличенной плотности, сухожильныя нити утолщены. Легкія не спадаются. Изъ гортани вытекаетъ густоватая сукровица съ бѣловатыми крошками пищевой смѣси. На слизистой трахеи замѣчаются точечныя кровоизліянія. На слизистой оболочкѣ бронховъ имѣется масса бѣлыхъ крошковатыхъ комочковъ. Ткань легкихъ сильно полнокровна, мѣстами отечна; при микроскопическомъ изслѣдованіи содержимаго легкихъ опредѣляется много жировыхъ капель и крахмальныхъ зеренъ. Мозговыя оболочки значительно полнокровны. Сосуды основанія мозга плотноваты на ощупь. Жидкость въ сердечной сорочкѣ имѣетъ замѣтный спиртный запахъ.

702. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, 50 л., нищенствовалъ Предавался сильному пьянству, видъ имѣлъ болѣзненный, страдалъ сильною одышкою. 31 янв. 1902 зашелъ въ ночлежную, сѣлъ на нарахъ около стѣны. сталъ сильно кашлять, а потомъ затихъ; черезъ четверть часа въ томъ же положеніи былъ найденъ мертвымъ.

Вскрытіе 3 февр. 1902. Роста 156 снт., тѣлосложенія умѣреннаго, питанія недостаточнаго. Въ желудкѣ болѣе 600 к. с. водянистой жидкости; слизистая набухшая, рѣзко зернистая. Сердце немного увеличено, содержитъ въ обѣихъ половинахъ довольно много свернувшейся крови, мышца—бурокрасная, аорта у ея начала немного расширенная. Въ полости рта и въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей содержится много зеленоватой слизи. Легкія по вскрытіи груди не спадаются и совершенно прикрываютъ сердце; ткань ихъ мало упруга, въ разрѣзѣ темно-красна, весьма отечна; въ правой верхушкѣ нѣсколько рубцовыхъ узловъ, величиною до горошины. Почки въ разрѣзѣ сѣро-краснаго цвѣта, корковый слой толщиною почти до 1 снт., блѣденъ, пирамидки окрашены немного темнѣе корки. Печень и мозговыя оболочки переполнены кровью.

703. Татьяна *Иванова*, 6 нед., мѣщ. Ночью стала плакать, ее спеленали и положили въ люльку, а на утро 17 февр. 1902 она найдена была мертвой.

Вскрытіе 20 февр. 1902. Длиною 53 снт., вѣсомъ 3590 гр. Средняго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено; всѣ его полости переполнены темною жидкою кровью съ весьма рыхлыми сгустками; на наружной поверхности подъ перикардіемъ повсюду находится множество темно-красныхъ рѣзко-ограниченныхъ пятенъ отъ маковаго зерна до чечевицы, пятна эти расположены преимущественно въ задней поперечной бороздкѣ. На вилочковой железѣ подъ оболочкою находится множество такихъ же пятенъ въ маковое зерно. Подъ легочной плевой, покрывающей какъ сами легкія, такъ и ребра находится множество такихъ же пятенъ отъ маковаго зерна до чечевицы. Въ мелкихъ бронхахъ находится пѣнистая слизистая бѣловатая жидкость съ примѣсью крупинокъ, похожихъ на находящіяся въ желудкѣ. Въ полости гортани и дыхательнаго горла находится пѣнистая слизь въ значительномъ количествѣ, слизистая оболочка ихъ умѣренно красна. Правое легкое значительно вздуто, ткань ихъ темно-краснаго цвѣта, заключаетъ много крови, отечна. Пазухи твердой и сосуды мягкой мозговой оболочки переполнены кровью. Одиночныя железки и Пейеровы бляшки въ подвздошномъ отдѣлѣ увеличены. Брыжжеечныя железы увеличены до боба, темно-красны, мягки.

704. Марья *Ѳомина*, 36 л., крест., чернорабочая. Очень рѣдко была трезвой. Въ сильно нетрезвомъ видѣ легла спать, по утру 14 окт. 1902 найдена мертвой, стоящей на колѣняхъ на полу, облокотившись на табуретку.

Вскрытіе 16 окт. 1902. Средняго роста и сложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 12×12 снт., обложено снаружи толстымъ слоемъ жира, всѣ его полости переполнены темно-красною жидкою кровью; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,2. мышцы ихъ блѣдно-красно-желтоваты, дряблы; двустворчатый клапанъ утолщенъ, клапаны аорты сморщены, утолщены, съ плотными известковыми бляшками на нихъ; одинъ изъ клапановъ сращенъ съ стѣнками аорты и не открывается; внутренняя оболочка аорты бугриста, шероховата съ объемистыми известковыми бляшками, отверстія вѣнечныхъ артерій заращены. Слизистая желудка сѣровата, зерниста. Въ зѣвѣ, а также при входѣ въ гортань находится два объемистыхъ куска картофеля и большое количество тягучей слизи; массы эти занимаютъ совершенно входъ въ гортань; въ полости гортани и дыхательнаго горла также много тягучей слизи, слизистая ихъ—красновата. Ткань легкихъ темно-краснаго

цвѣта, сильно переполнена кровью. Печень, селезенка, почки, мозговыя оболочки сильно переполнены кровью.

705. Маркъ *Шабранскій*, 36 л., канц. служ., найденъ въ постели мертвымъ 14 окт. 1902.

Вскрытіе 18 окт. 1902. Средняго роста, слабаго сложенія, умѣреннаго питанія. Въ желудкѣ найдено около 600 к. с. пищевой смѣси. Сердце нѣсколько увеличено, мышца слегка дряблая; во всѣхъ полостяхъ сердца темнокрасные сгустки крови, особенно обильные въ предсердіяхъ. Бронхи свободны, на слизистой дыхательнаго горла немного пищевой смѣси, равно какъ и въ нижней части гортани. Входъ въ гортань, равно какъ и дыхательная щель забиты совершенно плотно большимъ кускомъ мяса въ 4,0×2,5 снт. Слизистая оболочка дыхательнаго горла блѣдно-розовая. Легкія, печень, мозговыя оболочки переполнены кровью. Зубы весьма плохи, особенно коренные.

706. Кузьма *Антроповъ*, 32 л., мѣщ., портной. Образа жизни былъ крайне нетрезваго, нѣсколько разъ бывалъ на излеченіи въ больницахъ то по пьянству, то по болѣзни груди съ сильной одышкой; въ послѣднее время особенно пьянствовалъ. Явился домой совершенно въ пьяномъ видѣ и легъ спать, на утро 20 окт. 1902 былъ обнаруженъ мертвымъ.

Вскрытіе 24 окт. 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце 11×11×6½ снт., всѣ его полости переполнены темною жидкою кровью; толщина стѣнокъ лѣваго желудочка 1,8 снт., праваго—0,5; дву-и трехстворчатый клапаны нѣсколько утолщены. Слизистая желудка равномѣрнаго темно-краснаго цвѣта. Въ зѣвѣ, полости гортани и въ дыхательномъ горлѣ находится большое количество объемистыхъ кусковъ картофеля, печеночной ткани и кусочковъ лука; слизистая оболочка темно-краснаго цвѣта, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣются мелкія кровоизліянія. Легкія, печень, селезенка, почки, мозговыя оболочки сильно переполнены кровью.

707. Сергѣй *Бурдуковъ*, 25 л., крест. Велъ весьма нетрезвый образъ жизни. Придя домой 29 окт. 1902 скоропостижно умеръ. Въ день смерти и наканунѣ былъ пьянъ.

Вскрытіе 2 нояб. 1902. Средняго роста и тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Легкія по вскрытіи грудной клѣтки плохо спадаются, внутреннія края ихъ соприкасаются другъ съ другомъ. Въ обѣихъ половинахъ сердца, преимущественно въ предсердіяхъ небольшое количество совершенно жидкой темно-вишневой крови; сердечная мышца темно-красная, тусклая, нѣсколько дряблая. Слизистая оболочка желудка набухшая, сѣроватая, зернистая. Полость дыхательнаго горла и развѣтвленій бронховъ запружены большимъ количествомъ мутно-розовой жидкости, похожей на содержимое въ желудкѣ; жидкость эта смѣшана съ мелкими газовыми пузырьками. Ткань легкихъ темно-краснаго цвѣта, сильно переполнена кровью, отечна; мелкіе бронхи запружены такой же жидкостью, какъ и крупные. Печень, почки, селезенка и мозговыя оболочки сильно переполнены кровью.

708. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, 40 л., 6 окт. 1903 явился въ чайное заведеніе, потребовалъ чаю и печенки, черезъ нѣсколько минутъ сталъ сильно икать и свалился на полъ безъ всякаго сознанія, по дорогѣ въ больницу умеръ.

Вскрытіе 10 окт. 1903. Средняго роста, крѣпкаго сложенія, средняго питанія. При вскрытіи живота изъ него исходитъ рѣзкій спиртный запахъ. Сердце увеличено; всѣ полости его переполнены темной жидкой кровью; лѣвое венозное кольцо пропускаетъ почти три пальца, мускулатура жестковата, сѣро-красная съ буроватымъ оттѣнкомъ; по краю двустворчатаго клапана имѣются плотныя отложенія; на аортѣ—тоже. Во входѣ въ гортань замѣченъ крупный непрожеванный кусокъ мяса

въ 5×3,5×2 снт. На плевральной поверхности праваго легкаго мѣстами замѣчаются съ просяное зерно выступающія кровоизліянія. При надавливаніи на легкія изъ гортани вытекаетъ густоватая кровянистая жидкость съ мелкими кусочками мяса; таковое же содержимое имѣется въ крупныхъ и среднихъ бронхахъ. Отъ мозга исходитъ замѣтный спиртный запахъ. Легкія, печень, почки, мозговыя оболочки переполнены кровью.

709. Степанида *Рыбакова*, 42 л., крест. Вела жизнь нетрезвую, была болѣзненная, недавно страдала воспаленіемъ легкихъ. Скоропостижно умерла 21 нояб. 1903.

Вскрытіе 23 нояб. 1903. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія, достаточнаго питанія. Печень и желудокъ опущены. Легкія весьма объемисты, вздуты. Сердце ожирѣвшее, содержитъ въ полостяхъ много свернувшейся крови, особенно въ правой половинѣ; мышца блѣдная и дряблая. Въ желудкѣ 600 к. с. жидкости; объемъ желудка значительно увеличенъ, стѣнки тонкія, слизистая блѣдная, зернистая. Въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей много мутной съ кашицеобразнымъ осадкомъ жидкости, смѣшанной со слизью; эта жидкость выдавливается изъ мелкихъ развѣтвленій дыхательныхъ путей, слизистая которыхъ рѣзко красная. Легкія темно-красны въ разрѣзѣ, на поверхности разрѣза вытекаетъ большое количество мелко-пузырчатой пѣнистой жидкости. Селезенка сильно сокращенная, содержитъ много крови. Почки замѣтно уменьшены, капсула трудно снимается, корковый слой тонокъ, основаніе пирамидъ темно-красное.

710. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, 35 л., ночевавшій въ ночлежномъ домѣ, утромъ 12 дек. 1903 найденъ на полу въ корридорѣ этого дома въ безсознательномъ состояніи, храпѣлъ и черезъ четверть часа умеръ.

Вскрытіе 15 дек. 1903. Роста ниже средняго, слабаго тѣлосложенія и питанія. Сердце 10×11×6 снт., всѣ его полости переполнены темною жидкою кровью съ кисловатымъ запахомъ; спереди большое отложеніе жира; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,3, на внутренней поверхности аорты небольшое количество бѣловатыхъ бляшекъ. Желудокъ растянутъ, полость его расширена, въ немъ находится около 500 ксм. пищевой смѣси съ запахомъ бродящаго тѣста, слизистая блѣдно-сѣроватаго цвѣта. На спинкѣ языка, въ глоткѣ и въ полости гортани находятся довольно объемистые кусочки яичнаго желтка, а въ дыхательномъ горлѣ и въ мелкихъ развѣтвленіяхъ бронховъ сѣроватыя массы, похожія на содержимое въ желудкѣ; слизистая дыхательныхъ путей темно-краснаго цвѣта. Ткань легкихъ темно-краснаго цвѣта, сильно наполнена кровью, съ разрѣзовъ стекаетъ большое количество кровянистой мелкопѣнистой жидкости. Селезенка уменьшена, капсула ея сморщена, ткань темнокрасная, плотна. Почки уменьшены, капсула ихъ снимается съ трудомъ. Печень и мозговыя оболочки сильно наполнены кровью. Изъ черепной и грудной полости чувствуется ясный запахъ спирта.

711. Павелъ *Бахваловъ*, 13 л., крест. Еженедѣльно съ нимъ происходили припадки, по ночамъ начинало трясти, потомъ стоналъ, припадокъ продолжался $^1/_4$ часа. Послѣдній припадокъ случился въ ночь на 28 янв. Скоропостижно умеръ 29 янв. 1904.

Вскрытіе 1 фев. 1904. Худощавъ. Правая половина сердца сильно переполнена рыхло-свернувшеюся кровью, въ лѣвомъ предсердіи такое же количество крови. Во рту немного жидкости, напоминающей содержимое желудка, такая же жидкость, отчасти пѣнистая, изливается изъ дыхательныхъ путей въ количествѣ около столовой ложки; слизистая дыхательныхъ путей покраснѣвшая, особенно въ области трахеи. Легкія весьма объемисты, на ощупь мягкія, на нижней и задней поверхности

ихъ найдено нѣсколько темно-красныхъ пятнышекъ въ просяное зерно; изъ мелкихъ дыхательныхъ путей выдавливается мутная вязкая мелкопузырчатая жидкость. Твердая мозговая оболочка сильно напряжена, мозговыя извилины сплющены; ткань большого мозга плотновата, въ области лѣвой затылочной доли на верхней поверхности прощупывается затвердѣніе ткани безъ рѣзкихъ границъ, величиной въ лѣсной орѣхъ, въ разрѣзѣ не имѣющее особой окраски. Въ области полосатыхъ тѣлъ, особенно слѣва и на границѣ съ зрительными буграми, замѣчается нѣсколько возвышеній (опухолей) величиною до горошины, форма ихъ приблизительно круглая, плотность различная, однѣ изъ нихъ значительно плотнѣе мозга, другія—студневидны.

712. Василій *Хрусталевъ*, 2 мѣс., мѣщ. Съ утра былъ веселъ и здоровъ, скоропостижно умеръ у матери на рукахъ 15 мар. 1904.

Вскрытіе 19 мар. 1904. Средняго сложенія, плохого питанія. На мѣстѣ перехода реберъ въ хрящи ощупываются кругловатыя утолщенія. Сердце нѣсколько увеличено; въ предсердіяхъ и правомъ желудочкѣ содержится съ темными сгустками кровь, особенно много ея въ полости праваго предсердія; мускулатура блѣдновата. Капсула почекъ снимается легко, ткань блѣдная, пирамидки желтоваты. Подъ плеврой имѣются многочисленныя весьма мелкія кровоизліянія; при надавливаніи на легкія изъ гортани выступаетъ кровянистая слизистая густоватая жидкость кислотной реакціи, таковое же содержимое имѣется въ крупныхъ бронхахъ; при микроскопическомъ изслѣдованіи видны мѣстами въ небольшомъ количествѣ мелкія жировыя капельки. Вилочковая железа весьма объемиста, 22,0 гр., ткань блѣдная, съ разрѣза ея соскабливается сливкоподобное содержимое. Слизистая кишечника блѣдная, содержимое его—густое слизистое, слегка окрашенное желчью; въ толстыхъ кишкахъ имѣются увеличенія одиночныхъ железокъ.

713. Иванъ *Тимофеевъ*, 5 нед., крест. Мальчикъ умеръ на рукахъ метери, переѣзжавшей на пароходѣ черезъ Неву, 19 окт. 1904.

Вскрытіе 24 окт. 1904. Длиною 56,0 снт., вѣсомъ 4350,0 гр. Соединительныя оболочки глазъ красноваты. Сердце значительно увеличено, въ полостяхъ праваго сердца и отчасти лѣваго предсердія имѣется довольно много темной съ немногими сгустками крови; мускулатура блѣдновата. Слизистая желудка обложена слизью. На слизистой пищевода и во входѣ въ гортань имѣются пищевыя массы. При надавливаніи на легкія изъ крупныхъ вскрытыхъ уже бронховъ выдавливаются бѣлесоватыя слизистыя крупнопузырчатыя массы кислотной реакціи. На разрѣзѣ легкихъ изъ бронховъ болѣе мелкаго калибра выдавливаются густыя слизистыя блѣднорозоватыя массы, при микроскопическомъ изслѣдованіи содержащія жировыя капельки. Печень нѣсколько хруститъ при разрѣзѣ, довольно полнокровна. Почки—съ переполненными кровью звѣздчатыми венками. Въ тонкихъ и толстыхъ кишкахъ много слизи. Мягкая мозговая оболочка переполнена кровью.

714. Николай *Горячевъ*, 44 л., мѣщ., маляръ. Страшно пьянствовалъ. Занималъ уголъ за 2 р. 50 к. въ мѣсяцъ, имѣлъ приличный заработокъ и всѣ деньги пропивалъ, послѣднее время ежедневно являлся поздно вечеромъ и всегда въ пьяномъ видѣ. Спать легъ пьяный, найденъ мертвымъ въ постели 4 окт. 1905.

Вскрытіе 8 окт. 1905. Роста средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце значительно увеличено, сильно обложено жиромъ, очень дряблое, на его задней поверхности имѣется нѣсколько темно-красныхъ несмывающихся пятенъ величиной отъ маковаго зерна до чечевичнаго. Всѣ полости сердца переполнены жидкою темною кровью, имѣющей лаковый видъ, мышца сердца проросла полосками жира, очень дряблая, желтовато-буроватаго цвѣта; на внутренней оболочкѣ аорты имѣются нѣсколько возвышенныхъ сѣроватыхъ плотноватыхъ на ощупь

бляшекъ неправильной формы величиной до небольшой горошины; вѣнечныя артеріи сердца жестковаты, на ихъ внутренней оболочкѣ такія же бляшки, но только меньшей величины. Слизистая желудка нѣсколько утолщена. Въ полости рта, въ дыхательныхъ путяхъ вплоть до мельчайшихъ развѣтвленій бронховъ и пищеводѣ находятся массы, подобныя имѣющимся въ желудкѣ. Мягкая мозговая оболочка отечна, сосуды ея переполнены кровью; мозговое вещество отечно.

715. Ефимъ *Вязанка*, 56 л., крест., чернорабочій. 2 окт. 1906 пришелъ со своими двумя сыновьями въ гости къ своему свату, который ихъ угощалъ водкой, пивомъ, селедками, мясомъ и колбасой, затѣмъ спустя 3—4 ч. скоропостижно умеръ.

Вскрытіе 4 окт. 1906. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Соединительныя оболочки сплошного темнокраснаго цвѣта. Сердце нѣсколько увеличено, дряблое, значительно обложено жиромъ, полости его пусты; внутренняя оболочка правой половины сердца окрашена въ темно-красный цвѣтъ, на внутренней оболочкѣ аорты и вѣнечныхъ артерій находится нѣсколько плоскихъ немного возвышающихся сѣровато-желтоватыхъ бляшекъ, величиною отъ маковаго до коноплянаго зерна, мышца сердца дряблая, буроватаго цвѣта, съ глинистымъ оттѣнкомъ, тусклая. Въ полости рта, пищевода и дыхательныхъ путей вплоть до мельчайшихъ ихъ развѣтвленій находится смѣшанная со слизью масса, подобная имѣющейся въ желудкѣ. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, слои почти неразличимы; въ лѣвой почкѣ находится полость, величиною съ грецкій орѣхъ, выполненная свѣтлой желтоватой жидкостью. Сосуды основанія мозга извиты, жестковаты.

716. Иванъ *Андреевъ*, 19 л., крест. Любилъ выпивать и очень много, нигдѣ не служилъ, велъ жизнь неаккуратную. За пьянство четыре мѣсяца назадъ уволенъ былъ изъ чайной, гдѣ служилъ. Вечеромъ видѣли его въ пьяномъ видѣ, утромъ 24 марта 1907 обнаруженъ на площадкѣ лѣстницы мертвымъ.

Вскрытіе 30 марта 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, дряблое; по его наружной поверхности находится нѣсколько темнокрасныхъ пятнышекъ отъ булавочной головки до чечевичнаго зерна; во всѣхъ полостяхъ сердца, но преимущественно въ правой его половинѣ находится темная жидкая кровь съ обильными рыхлыми темно-красными сгустками; на внутренней оболочкѣ вѣнечныхъ артерій находится нѣсколько мутноватыхъ бѣловатыхъ бляшекъ величиной отъ маковаго зерна. Во входѣ въ гортань и въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей вплоть до мельчайшихъ развѣтвленій бронховъ находится масса, подобная содержащейся въ желудкѣ. Слизистая дыхательныхъ путей и входа ва гортань слегка утолщена, ярко - краснаго цвѣта вслѣдствіе расширенныхъ мельчайшихъ сосудовъ.

717. Николай *Сентябревъ*, 33 л., крест., столяръ. 31 окт. 1907 поднятъ на панели, сильно скрипѣлъ зубами, въ безсознательномъ состояніи отправленъ въ часть, при пріемѣ оказался мертвымъ.

Вскрытіе 4 нояб. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено, дрябловато; во всѣхъ его полостяхъ, преимущественно въ правой находится темная кровь съ обильными темнокрасными сгустками; на внутренней оболочкѣ аорты находятся нѣсколько бѣловатыхъ плотноватыхъ бляшекъ; мышца сердца дрябловата, съ глинистымъ оттѣнкомъ. Содержимое желудка съ рѣзкимъ запахомъ денатурированнаго спирта; слизистая грязновато-красноватаго цвѣта, немного утолщена, зерниста, покрыта слизью, легко облѣзаетъ. У входа въ гортань, а также по всей поверхности слизистой оболочки вплоть до мельчайшихъ развѣтвленій бронховъ находятся массы, похожія на содержащіяся въ желудкѣ, съ примѣсью слизи; слизистая дыхательныхъ путей грязновато-красноватаго цвѣта. Изъ мелкихъ бронховъ выдавливается слизь, смѣшанная съ пищевыми крошками. На діафрагмальной поверхности находится нѣсколько темно-красныхъ пятенъ величиною до коноплянаго зерна. Сосуды мягкой мозговой оболочки переполнены кровью вплоть до мельчайшихъ развѣтвленій.

718. Пелагея *Алексѣева*, 26 л., крест., прислуга. Была на своемъ столѣ. 20 нояб. 1907 найдена въ постели мертвой, на шеѣ и платьѣ имѣлись слѣды рвоты.

Вскрытіе 23 нояб. 1907. Средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сердце нѣсколько увеличено, довольно сильно обложено жиромъ; лѣвый желудочекъ сокращенъ, почти пустой, правый желудочекъ зыблется, переполненъ темной жидкой кровью. Въ желудкѣ около 500 к. с. пищевой кашицы; слизистая сѣровато-розоватаго цвѣта, зерниста. У входа въ гортань, а также на истинныхъ голосовыхъ связкахъ находятся массы, подобныя находящимся въ желудкѣ. У мѣста развѣтвленія бронховъ находится пищевой комокъ длиною около 8,0 снт., шириною по мѣстамъ достигая 1,5 снт., комокъ этотъ сѣровато - розоватаго цвѣта, довольно плотный, закупориваетъ вполнѣ трахею и нижнимъ концомъ заходитъ въ правый бронхъ. Слизистая дыхательныхъ путей красноватаго цвѣта, нѣсколько утолщена, довольно обильно покрыта слизью. На діафрагмальной поверхности легкихъ находится много темнокрасныхъ несмываемыхъ пятенъ, величиной до чечевичнаго зерна. Шейные сосуды переполнены темною жидкою кровью.

719. Николай *Баталинъ*, 20 л., крест., дворникъ. Водку пилъ умѣренно. 12 дек. 1907 поднятъ въ безчувственно—пьяномъ видѣ на улицѣ и привезенъ домой; вскорѣ началась рвота и минутъ черезъ пять умеръ.

Вскрытіе 14 дек. 1907. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. Лѣвый желудочекъ сердца довольно плотный, правый зыблется. Во всѣхъ полостяхъ сердца находится темная жидкая кровь, но больше ея въ правой половинѣ; толщина стѣнки праваго желудочка около 0,4 снт., лѣваго — около 1,5. Въ желудкѣ около 200,0 к. с. пищевой смѣси съ запахомъ спирта. Въ полости рта, у входа въ гортань, у голосовыхъ связокъ, а также въ дыхательныхъ путяхъ вплоть до ихъ довольно мелкихъ развѣтвленій находятся массы, подобныя имѣющимся въ желудкѣ. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей нѣсколько набухла, грязновато-красноватаго цвѣта вслѣдствіе инъекціи сосудовъ. При выниманіи мозга слышится спиртный запахъ.

720. Марья *Спиридонова*, 27 л., мѣщ. Страдала припадками, повидимому, эпилепсіи. Скоропостижно умерла 21 дек. 1907.

Вскрытіе 26 дек. 1907. Роста ниже средняго, умѣреннаго тѣлосложенія, довольно хорошаго питанія. Лѣвый желудочекъ сердца сокращенъ, содержитъ немного темной жидкой крови, правый желудочекъ зыблется, въ немъ находится много темной жидкой крови, на наружной поверхности сердца имѣется нѣсколько темно-красныхъ несмываемыхъ пятенъ. Въ желудкѣ около 100 к. с. пищевой смѣси. Въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей вплоть до мельчайшихъ развѣтвленій находятся массы, подобныя имѣющимся въ желудкѣ; слизистая дыхательныхъ путей розоватаго цвѣта вслѣдствіе налитія мелкихъ сосудовъ. Легкія мало спались; на ихъ діафрагмальныхъ поверхностяхъ находится нѣсколько темнокрасныхъ пятнышекъ; изъ перерѣзанныхъ бронховъ выдавливается пищевая масса.

721. Лукьянъ *Гариновъ*, 72 л., крест. 27 дек. 1907 приведенъ былъ въ сильно нетрезвомъ видѣ, какъ только внесли его въ квартиру, онъ совершенно потерялъ силы и упалъ на полъ; и спустя около часу умеръ.

Вскрытіе 2 янв. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія и

питанія. Сердце нѣсколько увеличено, сильно обложено жиромъ, дрябловато; во всѣхъ его полостяхъ, но преимущественно въ правой его половинѣ находится темная кровь; на наружной поверхности сердца находится темно-красное несмываемое пятнышко величиною съ чечевицу; клапаны аорты немного утощены и сморщены; вѣнечныя артеріи жестковаты; на внутренней оболочкѣ ихъ и аорты находятся бѣловатыя плотноватыя бляшки; мышца сердца буроватаго цвѣта, по мѣстамъ проросла полосками жира. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей красноватаго цвѣта вслѣдствіе налитія мелкихъ сосудовъ, покрыта слизистыми гноевидными массами, въ послѣднихъ замѣтны кусочки бѣлаго хлѣба, достигающіе величиною до 3,0 снт. Въ желудкѣ около $^1/_2$ литра пищевой смѣси съ запахомъ бродящаго тѣста; слизистая розоватаго цвѣта, немного утолщена, облѣзаетъ. При выниманіи мозга слышенъ спиртный запахъ. Сосуды мягкой мозговой оболочки наполнены кровью вплоть до мельчайшихъ развѣтвленій. Сосуды основанія мозга жестковаты, извиты, зіяютъ. Почки маленькія, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой нѣсколько истонченъ, плохо отличимъ отъ мозгового; лоханки сильно обложены жиромъ.

722. Василій *Талызинъ*, 46 л., крест. Былъ въ гостяхъ, гдѣ втроемъ выпили дюжину пива; уходя держался на ногахъ твердо, хотя и былъ выпивши. Найденъ на лѣстницѣ мертвымъ 1 янв. 1908.

Вскрытіе 5 янв. 1908. Средняго роста, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія; 3—5 ребра по лѣвой сторонѣ въ мѣстѣ соединенія съ хрящами оказались надломанными; мягкія части въ окружности ихъ пропитаны частью жидкой, частью свернувшейся кровью. Сердце немного увеличено, сильно обложено жиромъ, дрябловато; во всѣхъ его областяхъ, но преимущественно въ правой половинѣ находится темная кровь; мышца проросла полосками жира. Содержимое желудка съ запахомъ бродящаго тѣста; слизистая пятниста, краснаго цвѣта, слегка утолщена. Слизистая дыхательныхъ путей темно-краснаго цвѣта вслѣдствіе налитія мелкихъ сосудовъ, покрыта пищевыми массами; тотчасъ-же ниже развѣтвленія трахеи на бронхи въ правомъ бронхѣ находится кусокъ мяса длиной около 3,0 снт., почти совершенно закупорившій просвѣтъ бронха; просвѣтъ лѣваго бронха выполненъ пищевыми массами. 2—8 ребра на лѣвой сторонѣ оказались надломанными пальца на два кнаружи отъ позвоночника; въ окружности ихъ мягкія ткани пропитаны темной кровью; ребра вообще довольно тонкія и хрупкія. Сосуды основанія мозга жестковаты.

723. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, около 18 л., 27 нояб. 1909 найденъ мертвымъ, погруженнымъ по колѣни въ воду канавы.

Вскрытіе 30 нояб. 1909. Роста ниже средняго, умѣреннаго тѣлосложенія и питанія. На задней поверхности сердца имѣется нѣсколько темно-красныхъ пятнышекъ величиною до просяного зерна; лѣвый желудочекъ сокращенъ, содержитъ немного темной жидкой крови, правый желудочекъ зыблется, растянутъ кровью. Въ желудкѣ около 400 к. с. пищевой кашицы, слизистая покрыта слизью. Въ полости рта, глотки и въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей находятся массы, подобныя имѣющимся въ желудкѣ. Изъ перерѣзанныхъ бронховъ выдавливается пищевая масса. На діафрагмальной поверхности легкихъ, а также по бороздамъ замѣтны разсѣянныя темно-красныя пятнышки величиною до просяного зерна.

724. Степанъ *Кулинъ*, 56 л., крест. Злоупотреблялъ спиртными напитками. Былъ выпивши, пѣлъ пѣсни и шутилъ, умеръ онъ, упавъ со стуломъ внизъ лицомъ 25 окт. 1908.

Вскрытіе 29 окт. 1908. Средняго роста, довольно плотнаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Кишечныя петли неравномѣрно вздуты, желудокъ опущенъ почти до пупка. Легкія мало спадаются, внутреннія

края ихъ соприкасаются. Во всѣхъ полостяхъ сердца немного слегка сгустившейся крови, внутренній покровъ сплошь окрашенъ въ грязно-красный цвѣтъ и въ правой половинѣ гуще, чѣмъ въ лѣвой, равнымъ образомъ и внутренняя оболочка легочной артеріи и аорты; сердце значительно обложено жиромъ, мышца нѣсколько дряблая; въ желудкѣ около 400 к. с. пищевой смѣси съ запахомъ бродящаго тѣста, объемъ желудка увеличенъ вдвое, слизистая слегка набухшая и мѣстами зернистая. Въ дыхательныхъ путяхъ со столовую ложку пищевой смѣси. Въ правой верхушкѣ легкихъ 3—4 твердыхъ рѣзко ограниченныхъ узла величиною съ горошину, на разрѣзѣ объизвествленныхъ; при надавливаніи изъ мелкихъ бронховъ выступаютъ мѣстами бѣловатыя и сѣроватыя, состоящія изъ крупинокъ, массы. Корковый слой почекъ мѣстами тонокъ. Сосуды основанія мозга имѣютъ замѣтно утолщенныя стѣнки.

725. Яковъ, 3 нед., сынъ Афанасіи *Юкимовой*, крест. Въ воспитательномъ домѣ считался больнымъ. 24 окт. 1909 уходя изъ воспитательнаго дома, мать хорошенько закутала ребенка и прикрыла голову одѣяломъ, дорогою замѣтила, что сынъ мертвъ.

Вскрытіе 28 окт. 1909. Длина 51 снт., вѣсъ 2840,0. Питанія слабаго. Во всѣхъ полостяхъ много темной крови съ довольно обильными сѣроватыми фибринозными свертками; мышца сердца тускловата, какъ бы вареная, блѣдно-сѣроватаго цвѣта. Бронхи вплоть до мельчайшихъ развѣтвленій наполнены массами, имѣющимися въ желудкѣ. Слизистая въ толстыхъ кишкахъ усѣяна бѣловатыми зернышками (увеличенныя солитарныя железки).

726. Иванъ *Степановъ I-й*, 31 г., крест. 16 нояб. 1909 сидя въ компаніи за столомъ въ трактирѣ, почувствовалъ себя дурно и упалъ со стула на полъ, въ безсознательномъ состояніи отправленъ былъ въ больницу и черезъ часъ умеръ тамъ.

Вскрытіе 19 нояб. 1909. Роста средняго, тѣлосложенія крѣпкаго, питанія хорошаго. Сердце увеличено раза въ $1^1/_2$, во всѣхъ его полостяхъ много темной крови; внутренняя оболочка аорты какъ-бы изрыта, сплошь покрыта бѣловатыми плотноватыми бляшками; устья вѣнечныхъ артерій сильно сужены, почти совершенно непроходимы для зонда, внутренняя оболочка артерій также покрыта бѣловатыми плотноватыми бляшками; мышца плотная на ощупь, на разрѣзахъ имѣетъ пестрый видъ, на буровато-красноватомъ фонѣ бѣловатыя блестящія прослойки соединительной ткани; толщина стѣнки лѣваго желудочка около 1,5 снт., праваго—0,4. Въ желудкѣ около 500 к. с. пищевой кашицы съ запахомъ бродящаго тѣста. Слизистая пищевода и дыхательныхъ путей обильно покрыта пищевыми массами. Изъ мелкихъ перерѣзанныхъ бронховъ выдавливаются пищевыя массы.

Задушеніе отъ попаданія въ дыхательные пути инородныхъ тѣлъ.

727. Осипъ *Капучинскій*, 59 л., отст. колл. сов., сильно предавался спиртнымъ напиткамъ изо дня въ день; послѣднія двѣ недѣли даже не выходилъ изъ своей комнаты, предаваясь пьянству. 24 сент. 1901 усмотрѣнъ сидящимъ за столомъ на стулѣ мертвымъ.

Вскрытіе 29 сент. 1901. Средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы. Слизистая желудка сѣроватаго цвѣта. Сердце 13×13 снт., съ значительнымъ отложеніемъ жира, всѣ его полости переполнены темной жидкой кровью; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,1 снт., а праваго—0,8; мышцы ихъ дряблы, съ желтымъ оттѣнкомъ; на внутренней оболочкѣ аорты множество мелкихъ плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ. Зѣвъ, входъ въ пищеводъ и въ гортань плотно забиты кускомъ пищи продолговатой формы въ 10×4×3 снт.; часть этого куска уже находится въ пищеводѣ, а дру-

гая часть плотно закрываетъ входъ въ гортань; весь этотъ пищевой кусокъ состоитъ изъ одного куска, повидимому, части желудка жвачнаго животнаго (т. наз. рубецъ); другой подобный кусокъ, но нѣсколько меньше, находится въ нижнемъ отдѣлѣ пищевода при входѣ въ желудокъ. Въ полости гортани и дыхательнаго горла большое количество красноватой жидкости, слизистая ихъ красновата. Почки увеличены въ объемѣ, капсула ихъ снимается легко; корковый слой истонченъ; въ лѣвой почкѣ въ корковомъ слоѣ находится кистовидное расширеніе величиною съ грецкій орѣхъ, наполненное желтовато-прозрачною жидкостью. Легкія, печень, селезенка, почки переполнены кровью.

728. Александръ *Павловъ*, 23 л., рядовой. 15 дек. 1901 найденъ мертвымъ, лежащимъ на полу въ камерѣ караульнаго помѣщенія. Жаловался при поступленіи въ полкъ на припадки падучей, былъ прикушенъ языкъ. Былъ на испытаніи $1^1/_2$ мѣсяца въ госпиталѣ, припадковъ не наблюдалось.

Вскрытіе 17 дек. 1901. Роста высокаго, средняго тѣлосложенія, хорошаго питанія. Съ правой стороны языка изъ полости рта кнаружи торчитъ объемистый кусокъ бѣлаго хлѣба, размякшій и легко рвущійся. Въ полости желудка 300 к. с. пищевой кашицы, состоящей исключительно изъ прожеванныхъ кусочковъ бѣлаго хлѣба. Сердце 13×13 снт., значительно обложено жиромъ; подъ перикардіемъ во многихъ мѣстахъ мелкія точечныя кровоизліянія; всѣ полости сердца переполнены темной жидкой кровью. Легкія сильно вздуты, темно-краснаго цвѣта, сильно переполнены кровью; подъ легочной плевой на правомъ легкомъ множество кровоизліяній въ видѣ рѣзко-ограниченныхъ темно-красныхъ пятенъ отъ просяного зерна до горошины; мельчайшія развѣтвленія бронховъ заполнены мелко-пѣнистой бѣловатой жидкостью. Въ полости рта и при входѣ въ гортань находится два объемистыхъ малопережеванныхъ куска бѣлаго хлѣба съ коркою коричневаго цвѣта. Полость гортани и дыхательнаго горла заполнена мелко-пѣнистой бѣловатой жидкостью, слизистая ихъ красновата. Печень, селезенка, почки, мозговыя оболочки сильно переполнены кровью. Сосуды на днѣ 4-го желудочка сильно расширены кровью.

729. Катерина *Васильева*, 54 л., мѣщ. Послѣднее время жаловалась на боль въ груди и сердцебіеніе. 16 окт. 1902 во время ужина съ ней сдѣлалось дурно, упала на полъ въ безчувственномъ состояніи и вскорѣ умерла.

Вскрытіе 20 окт. 1902. Небольшого роста, средняго тѣлосложенія, достаточнаго питанія. Въ обѣихъ половинахъ сердца немного свернувшейся крови, сердечная мышца блѣдная и нѣсколько дряблая, у отверстій вѣнечныхъ артерій на внутренней оболочкѣ аорты немного фиброзныхъ утолщеній, слегка суживающихъ просвѣтъ сосуда. Въ желудкѣ найдено довольно много кашицеобразной пищевой смѣси, въ которой попадаются довольно большіе непережеванные куски мяса. Въ просвѣтѣ пищеварительныхъ путей у начала пищевода найденъ какъ-бы ущемленнымъ кусокъ мяса въ 6,0×2,5 снт., форма куска приблизительно цилиндрическая, кусокъ этотъ плотно закрываетъ входъ въ дыхательные пути, слизистая оболочка послѣднихъ грязновато-розоватаго цвѣта. Капсула почекъ съ трудомъ отдѣляется, ткань плотновата, блѣдна; пирамидки низки. Печень съ рубцевыми утолщеніями подъ капсулой, глинистаго цвѣта, жирная. Мозгъ малокровенъ.

730. Павелъ *Россъ-Козловъ*, 1 г. 3 мѣс. 22 сент. 1906 играя на полу, имѣлъ въ рукахъ яблоко, которое грызъ зубами, и, откусивши большой кусокъ, подавился имъ и вскорѣ умеръ.

Вскрытіе 24 сент. 1906. Роста 77 снт., хорошаго питанія. Соединительныя оболочки глазъ блѣдны, на нихъ замѣтны темнокрасныя несмывающіяся точечныя пятна. Шейныя вены переполнены жидкой темной кровью. Легкія довольно объемисты, мало спадаются. Правая половина сердца зыблется, содержитъ много темной жидкой крови; лѣвый желудочекъ сокращенъ, крови содержитъ немного. Въ дыхательной трубкѣ и бронхахъ находится желтовато-буроватая пищевая кашица, смѣшанная съ мелко-пѣнистой слизью; у развѣтвленія трахеи на бронхи находится небольшой кусочекъ яблока, величиной съ лѣсной орѣхъ, окруженный красноватой темно-пѣнистой слизью. Слизистая дыхательныхъ путей красноватаго цвѣта вслѣдствіе расширенія сосудовъ, особенно въ мѣстѣ нахожденія яблока. Края легкихъ эмфизематозно растянуты. Вены мягкой мозговой оболочки переполнены кровью.

731. Константинъ *Степановъ*, 54 л., мѣщ., чернорабочій. Ежедневно пьянствовалъ, часто жаловался на боль въ груди и недомоганіе во всемъ тѣлѣ, а также страдалъ одышкой. 12 февр. 1908 пришелъ въ трактиръ выпивши, потребовалъ полбутылки водки и, не успѣвъ выпить нѣсколько рюмокъ, захрапѣлъ, упалъ со стула и умеръ.

Вскрытіе 16 февр. 1908. Средняго роста, умѣреннаго тѣлосложенія, достаточнаго питанія. Легкія малоспавшіяся, передніе края ихъ нѣсколько заходятъ другъ за друга. Въ лѣвой половинѣ сердца находилось немного совершенно жидкой темной крови, въ правой—такая же кровь въ большомъ количествѣ; по извлеченіи сердца въ околосердіи оказалось 300 к.с. крови; сердце немного увеличено, обильно обложено жиромъ; по направленію лѣвой вѣнечной артеріи прощупываются узловатыя затвердѣнія вслѣдствіе присутствія въ стѣнкахъ сосуда твердыхъ желтоватыхъ бляшекъ; сердечная мышца темно-красная, умѣренной плотности, толщина стѣнки праваго желудочка 0,5 снт., лѣваго—нѣсколько болѣе 1,0 снт. Въ полости рта найденъ кусокъ мяса приблизительно цилиндрической формы, 10 × 3 снт.; кусокъ этотъ однимъ концомъ своимъ находился въ гортанномъ входѣ и плотно закрывалъ его. Слизистая желудка замѣтно набухшая. Слизистая глотки фіолетоваго цвѣта, слизистая гортани и дыхательнаго горла ярко-красная, набухшая, не исключая и поверхности голосовыхъ связокъ; изъ вѣтвей дыхательнаго горла вытекло около столовой ложки мутной жидкости съ примѣсью слизи и хлѣбныхъ крошекъ; пищеводъ пустъ. Поверхность почекъ неровная, съ замѣтными углубленіями; корковый слой нѣсколько толще 0,5 снт., граница его съ пирамидами не вездѣ ясна; ткань плотновата, пирамидки окрашены темнѣе. Сосуды основанія мозга имѣютъ слегка утолщенныя стѣнки.

Задушеніе мягкими предметами.

732. Новорожденный *младенецъ* Надежды *Клевцовой*, крест. 13 окт 1900 разрѣшилась отъ бремени на извозчикѣ, якобы неживымъ младенцемъ.

Вскрытіе 16 окт. 1900. Длиною 54 снт., вѣсомъ 3900 гр., хорошаго тѣлосложенія и питанія. Половой членъ и мошонка замѣтно отечны. На наружной поверхности сердца сзади и на дугѣ аорты находятся 3 ярко-красныхъ въ просяное зерно пятна; въ полостяхъ сердца, въ особенности въ предсердіяхъ находится много темной жидкой крови; мышца сердца блѣдно-краснаго цвѣта, плотна. Легкія плаваютъ, заключаютъ умѣренное количество крови; подъ легочною плевою въ бороздкахъ замѣтны мелкія свѣтло-красныя пятна въ просяное зерно. Слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла красновата. Селезенка переполнена кровью. Пазухи твердой мозговой оболочки и сосуды мягкой переполнены кровью.

733. Младенецъ *женскаго* пола, найденъ мертвымъ на скамейкѣ у воротъ 13 нбр. 1900.

Вскрытіе 18 нбр. 1900. Длина 49,5 снт., вѣсъ 3410,0. Всѣ полости

сердца переполнены темной жидкой кровью, на наружной поверхности задней стѣнки лѣваго желудочка находится свѣтло-красное круглое пятно, величиною въ просяное зерно. Легкія плаваютъ; подъ легочною плевою на нихъ поэкзду разбросано множество свѣтло-красныхъ кругловатыхъ пятенъ отъ маковаго до просянаго зерна. Желудокъ плаваетъ, кишечники тонетъ. Въ наружныхъ покровахъ головы и на черепныхъ костяхъ находится много кровоизліяній въ видѣ кругловатыхъ пятенъ отъ просянаго зерна до бобы. Мозгъ, печень, селезенка, почки сильно переполнены кровью.

734. Борисъ *Яковлевъ-Трофимовъ*, $2^1/_2$ л., мѣщ., 5 дек. 1901 найденъ на кровати около матери, съ грудью во рту, мертвымъ. Мать была сильно выпивши и найдена спавшею, тѣло ея придавлявшею ребенка.

Вскрытіе 7 дек. 1901. Роста $51^1/_2$ снт., вѣсомъ 3000,0 гр., слабаго тѣлосложенія и плохого питанія. Сердце увеличено раза въ полтора; всѣ его полости переполнены темною жидкою кровью; на задней поверхности посрединѣ надъ перикардіемъ имѣется рѣзко-ограниченное темно-красное пятно съ просянае зерно; сѣнки желудочковъ утолщены, мышцы ихъ дряблы, бѣдно-красно-желтоваты. Легкіи слегка вздуты; на нижней поверхности праваго легкаго подъ плеврою находятся немногихъ мелкихъ точечныхъ рѣзко-ограниченныхъ темно-красныхъ пятенъ. Солитарныя железки увеличены до маковаго зерна. Брыжечныя железы увеличены до бобы, довольно плотны, въ разрѣзѣ малокровны.

735. Александръ *Власовъ*, $2^1/_2$ мѣс., сынъ солдатской дочери. Мочь мать покормила грудью и положила возлѣ себя спать. Часу въ 4-мъ проснулись, увидѣла, что ребенокъ мертвъ, 2 окт. 1902.

Вскрытіе 7 окт. 1902. Длиною $56^1/_2$ снт., вѣсомъ 4070,0; умѣреннаго питанія. Во всѣхъ полостяхъ сердца находится большое количество темной крови съ рыхлыми сгустками. На легочной плевѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ замѣчены точечныя рѣзко-ограниченныя темнокрасныя пятна. Въ полости гортани и дыхательнаго горла находится большое количество краснаватой слизи, которая заполняетъ развѣтвленія мелкихъ бронховъ; слизистая краснаватая. Ткань легкихъ темно-краснаго цвѣта, значительно напоена кровью. На нижней поверхности печени у передняго края подъ капсулой множество рѣзко-ограниченныхъ темнокрасныхъ пятенъ отъ маковаго зерна до горошины. Звѣздчатыя вены почекъ расширены и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣются мелкія точечныя кровоизліянія. Мозговыя полости значительно наполнены кровью.

736. Младенецъ *мужескаго* пола неизв. званія, найденъ мертвымъ на огородѣ 11 марта 1904.

Вскрытіе 13 марта 1904. Длиною 51 снт., вѣсомъ 3425,0 гр., хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Легкія плаваютъ. Въ полости глотки, гортани и дыхательныхъ путей весьма большое количество слизи, густой, бѣловатой, пѣнистой; слизистая сильно красна. Подъ легочною плевою, покрывающею легкія, въ складкахъ, а также на наружныхъ пятнышекъ, кругловатыхъ, величиною отъ просянаго зерна до большихъ развѣтвленій заполнены густой бѣловатой слизью. Сердце нелишнаго увеличено, всѣ его полости переполнены темною красною кровью. Только незначительная часть желудка плаваетъ, желудокъ переполненъ густою бѣлѣдноватою слизью. Печень, селезенка и почки сильно наполнены кровью. Въ наружныхъ покровахъ головы и на костяхъ черепа находится множество, величиною до горошины, кровоизліяній.

737. *Новорожденный* ребенокъ крестъ. Настасьи *Норимовой*, *мужескаго* пола, найденный мертвымъ на льду, остался неизвѣстнымъ мать.

Вскрытіе 21 марта 1904. Длиною 52,0 снт., вѣсомъ 3250,0 гр., хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Подъ легочной плевой на

обоихъ легкихъ находится нѣсколько мелкихъ рѣзко-ограниченныхъ темно-красныхъ пятнышекъ отъ маковаго до просянаго зерна. Въ бронхахъ довольно много пѣнистой густой бѣловатой слизи, а также—въ ною жидкой, полупѣнистой горяч. Всѣ полости сердца переполнены темною жидкой пѣнистой кровью, мышца сердца довольно дряблая.

738. Настасьи *Гиврилова*, 25 дн., крест. 16 окт. 1904 мать повезла дѣпринесла уже мертвой.

Вскрытіе 19 окт. 1904. Длиною 53 снт., вѣсомъ 4070,0 гр., питанія хорошаго. Купно съ діаграфомъ съ обѣихъ сторонъ помѣщается на уровнѣ 5-хъ реберъ. Легкія слегка вздуты. На наружной поверхности сердца имѣется какъ спереди, такъ и сзади три темнокрасныхъ кругловатыхъ полости сердца, въ особенности правыя, переполнены темною жидкою кровью съ рыхлыми сгустками. Въ полости гортани и дыхательнаго горяч мелкопѣнистая красноватая слизь въ значительномъ количествѣ.

Mors thymica.

739. Софьи *Бобренева*, 2 мѣс. крест. Ночью часа три кричала, подъ утро успокоилась, мать заспеленала ее и положила съ собой на кровать, утромъ 5 февр. 1901 найдена мертвой.

Вскрытіе 10 февр. 1901. Роста 55 снт., вѣсъ 4250 гр., хорошаго тѣлосложенія, умѣреннаго питанія. Сердце немного увеличено; всѣ его полости переполнены темной жидкой кровью; сѣнки желудочковъ утолщены, мышцы ихъ бѣдно-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Легкія вздуты, края ихъ прикрываютъ сердце. Въ развѣтвленіяхъ мелкихъ бронховъ находится бѣловатая слизистая жидкость, которая при микроскопическомъ наслѣдованіи оказалась состоящею изъ эпителія и слизистыхъ и бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ. Солитарныя железки и дыхательнаго горла находятся такая же жидкость въ умѣренномъ количествѣ съ примѣсью мелкихъ кусочковъ свернувшагося молока. Вилочковая железка вѣсомъ въ 32,0 гр.; она довольно мягка, заключаетъ умѣренное количество крови. На нижней поверхности печени подъ капсулой замѣчается множество ярко- и темно-красныхъ рѣзко-ограниченныхъ пятенъ кругловатаго очертанія отъ просянаго зерна до горошины; ткань плотна, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, съ значительными развѣтвленіями соединительной ткани въ видѣ бѣловатыхъ полосокъ по направленію сосудовъ. Въ почкахъ надъ капсулой, снимающейся съ трудомъ, замѣчается множество рѣзко-ограниченныхъ ярко-красныхъ круглыхъ пятенъ отъ просянаго зерна до мелкой горошины; ткань довольно плотна. Печень и почки переполнены кровью, селезенка—умѣренно. Яичники увеличены, и представляются состоящими изъ нѣсколькихъ кистообразныхъ полостей, наполненныхъ безцвѣтною жидкостью. Въ тонкихъ кишкахъ бѣловатая слизь. Солитарныя железки въ подвздошной и толстыхъ кишкахъ увеличены. Брыжечныя железы увеличены до боба, довольно плотны. Мозговыя оболочки переполнены кровью.

740. Иванъ *Ефимовъ*, 4 мѣс., 10 февр. 1902 умеръ въ больницѣ, куда мать отнесла его за недѣлю до смерти; ребенокъ тамъ всегда стоналъ.

Вскрытіе 15 февр. 1902. Длина 69 снт., вѣсъ 8200,0. Сложенія крѣпкаго, питанія очень хорошаго. Сизистая желудка бѣдна и блѣдна. Сердце значительно увеличено, по наружной оболочкѣ его многочисленныя мелкія темновишневаго цвѣта кровоизліянія по ходу сосудовъ; во всѣхъ полостяхъ содержится темновишневая кровь съ обильными сгустками; мускулатура сердца бѣлдновата, нѣсколько дряблая, съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Вѣсъ вилочковой железы 40,0 гр. Подъ легочной

плеврой видно очень немного кровоизліяній. Селезенка 6 × 8 снт., ткань ея—темнокрасного цвѣта съ обильной болѣе свѣтлой зернистостью; мякоть высасывается обильно. Въ тонкихъ кишкахъ умѣренное количество бѣдноватой съ большой примѣсью слизи пищевой кашицы. Въ кишкахъ значительное увеличеніе солитарныхъ фоликуловъ. Мозговыя оболочки переполнены кровью.

741. Михаилъ *Смирновъ*, 4 мѣс., крест. 11 дек. 1903 при переѣздѣ на новую квартиру былъ завернутъ въ одѣяло, по пріѣздѣ оказался мертвымъ, изъ носу показалась кровь.

Вскрытіе 16 дек. 1903. Длина 63 снт., вѣсъ 5930,0 гр., хорошаго тѣлосложенія и питанія. Сердце нѣсколько увеличено; въ полостяхъ его находится темная жидкая кровь, которая переполняетъ правую половину его; стѣнки желудочковъ утолщены, въ особенности лѣваго. Легкія вздуты; подъ плеврою въ бороздкахъ находится множество мелкихъ величиною въ просяное зерно и нѣсколько болѣе рѣзко-ограниченныхъ темно-красныхъ пятнышекъ; ткань легкихъ въ разрѣзахъ темно-красная, съ нихъ соскабливается въ умѣренномъ количествѣ мелкопѣнистая кровянистая жидкость. Вилочковая железа значительно увеличена въ объемѣ, вѣсомъ 31,0 гр., въ разрѣзахъ дольки ея темно-красны, весьма рыхлы, повсюду пропитаны густою бѣловатою гноевидною жидкостью, которая въ нижнихъ частяхъ долей образовала объемистыя полости. Селезенка увеличена вдвое, дряблая. Печень объемиста, плотна. Почки увеличены, капсула ихъ снимается легко, корковый слой утолщенъ, ткань темно-красная. Солитарныя железки и Пейеровы бляшки въ подвздошной кишкѣ рѣзко увеличены, набухшія. Печень и мозговыя оболочки сильно наполнены кровью.

742. Александръ *Архиповъ*, 2 мѣс., крест. 2 нояб. 1904 въ 4 часа утра мать покормила его грудью и положила его спать рядомъ съ собою; въ 6 ч. проснувшись увидѣла, что ребенокъ лежитъ лицомъ внизъ на подушкѣ съ слабыми признаками жизни: она стала качать его на рукахъ, у ребенка пошла пѣна изо рта и онъ тутъ же умеръ.

Вскрытіе 6 нояб. 1904. Длина тѣла 62 снт., вѣсъ 5500,0; хорошаго питанія. Въ грудную полость довольно рѣзко выступаетъ вилочковая железа, по удаленіи которой размѣры ея оказались 9,5 × 1,5 снт., доли имѣютъ неравномѣрную мясную плотность, въ разрѣзѣ—розовая, при надавливаніи выступаютъ многочисленныя капли сливкоподобной жидкости. Подъ серезной оболочкой легкихъ замѣтно нѣсколько рѣзко-ограниченныхъ пятенъ темно-краснаго цвѣта величиною съ просяное зерно; при надавливаніи на вѣточки дыхательныхъ путей, изъ нихъ выступаетъ мутно-розовая жидкость, подобная содержимому желудка. Печень неравномѣрной плотности, подъ капсулой ея видны многочисленныя темно-красныя пятна величиною съ чечевичное зерно. На слизистой оболочкѣ подвздошнаго отдѣла замѣтны набухшія Пейеровы бляшки, а въ толстыхъ кишкахъ—рѣзко-увеличены солитарныя железы.

Содержаніе.

I.

Опредѣленіе понятія о скоропостижной смерти 1
Значеніе изученія причинъ скоропостижной смерти 2
Исторія развитія взглядовъ на причины скоропостижной смерти. 3
Новѣйшія статистики о наибольшей частотѣ скоропостижной смерти отъ забол'ѣваній сосудистой системы (Hertich и Popp, Lacassagne и Coutagne, Hofmann, Lesser, Key-Åberg, Wynn Westcott, Kleinberg, Веляшъ, Vibert, В. Александровъ, Loche) . 5
Наша статистика съ классификаціей причинъ скоропостижной смерти 6
Классификація детальныхъ исходовъ Endarteritis chron. deform. 10
Локализація разрывовъ аневризмъ и позднѣйшія статистики ихъ. 13
Величина разорвавшихся аневризмъ 13
Локализація самопроизвольныхъ разрывовъ аорты 14
Большая частота хроническаго эндартеріта у мужчинъ 14
Различіе между полами въ частотѣ разрывовъ сердца, разрывовъ аорты и aneurism. dissec. (механизмъ разрывовъ ея—Вертоградовъ), внутричерепныхъ кровоизліяній 14
Распредѣленіе количества смертныхъ случаевъ отъ паралича сердца при хроническомъ эндартеріитѣ по возрасту и полу, за послѣдніе 25 лѣтъ (академическая статистика) 16
Сравненіе академической статистики съ Вѣнской Key-Åberg'a . 16
Статистика аневризмъ по возрасту и полу 17
Статистика мозговыхъ кровоизліяній по возрасту и полу . . . 18
Статистика (академическая) разрывовъ сердца и аорты по возрасту. 19
Распредѣленіе случаевъ смерти отъ хроническаго эндартеріита по классамъ и занятіямъ 19
Вліяніе занятій на сердце и сосуды 21
Причины хроническаго эндартеріита,—алкоголизмъ и сифилисъ (Коровинъ, Новосельскій) 22
О вліяніи наслѣдственности на развитіе артеріосклероза (Кабановъ). 23
О значеніи «фиброматознаго» сложенія при артеріосклерозѣ (Крыловъ) 23
Вліяніе времени года на появленіе случаевъ скоропостижной смерти 25
Движеніе скоропостижныхъ смертей во Франціи и Россіи (по даннымъ Центральнаго Статистическаго Комитета) 26
Распредѣленіе по возрасту и полу всѣхъ случаевъ скоропостижной смерти за послѣдніе 25 лѣтъ (академическая статистика) . 29
Суженіе или облитерація вѣнечныхъ сосудовъ сердца 30

О недостаточности клапановъ аорты . . . 30
О недостаточности митральныхъ клапановъ . . . 31
О вліяніи плевральныхъ сращеній и переполненія желудка, какъ причины, предрасполагающей къ смерти . . . 32
О вліяніи тепла и холода, измѣненій сосудистаго давленія при скоропостижной смерти (смерть въ банѣ, при дефекаціи, при беременности, въ припадкѣ подучей, суженіе двустворки у беременныхъ (Парахухинъ) . . . 33
Измѣненія мышцы сердца (ожирѣніе сердца, жировое перерожденіе сердца и фиброзное) . . . 34
Закрытіе просвѣта дыхательныхъ путей (инородными тѣлами, рвотными массами,—мнѣніе Thiemich'a,—мягкими предметами) . . . 35
Morz thymica (Соколовъ) „Status lymphaticus (Соколовъ и Thiemich). 37
Бугорчатка легкихъ . . . 38
Крупозная пневмонія (Kleinberg) . . . 40
Катарральная пневмонія . . . 42
Капиллярный бронхитъ у дѣтей . . . 42
Плевритъ . . . 43
Воспаленіе верхнихъ воздухоносимыхъ путей . . . 43
Ракъ гортани . . . 44
Обоюдосторонее гнойное воспаленіе средняго уха . . . 44
Воспаленіе брюшины . . . 44
Острое и хроническое воспаленіе желудочно-кишечнаго канала . . . 45
Заворотъ кишекъ . . . 45
Воспаленіе почекъ . . . 45
Цирозъ печени, ракъ матки, пищевода . . . 47
Инфекціонныя болѣзни.
Брюшной тифъ . . . 47
Холера, сибирская язва, оспа, скарлатина, инфлюэнца . . . 48
Септикемія . . . 48
Дифтерія . . . 48
Менингитъ . . . 48
Опухоли мозга, размягченіе мозга, водянка мозга . . . 49
Параличъ сердца вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ.
Параличъ сердца вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ, endoarteritidis deform. chr. аорты и вѣнечныхъ сосудовъ сердца . . . 50
Параличъ сердца вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ и ожирѣнія сердца . . . 51
Параличъ сердца вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ, endoarteritidis deform. chron. и расширенія аорты . . . 52
Параличъ сердца вслѣдствіе endoarteritidis deform. chron. аорты или вѣнечныхъ артерій сердца . . . 53
Параличъ сердца вслѣдствіе endoarteritidis deform. chron. et art. coron. cordis и endocarditidis chronicae . . . 54
Параличъ сердца вслѣдствіе endoarteritidis deform. chronicae и расширенія аорты . . . 55
Параличъ сердца вслѣдствіе endoarteritidis deform. chronicae, endocarditidis chron. и расширенія аорты . . . 56
Параличъ сердца вслѣдствіе ожирѣнія его . . . 56
Параличъ сердца вслѣдствіе хроническаго эндокардита . . . 57
Параличъ сердца вслѣдствіе перерожденія сердечной мышцы . . . 58
Кровоизліяніе въ мозгъ и его оболочки . . . 59
Смерть отъ давленія на сердце . . . 60
Механизмъ смерти при разрывѣ сердца и большихъ сосудовъ . . . 61
Задушеніе излившейся кровью въ дыхательные пути или въ полость плевры . . . 61

Острое малокровіе . . . 61
Смерть отъ чрезмѣрнаго опьяненія . . . 62
Смерть во время хлороформированія . . . 63
Смерть при purpura haemorrhagica, лейкемія, рахитъ . . . 64
Смерть отъ истощенія . . . 64
Эпилепсія . . . 65

II.

Приложеніе.

Судебно-медицинскіе протоколы съ предварительными свѣдѣніями.

I. Смерть отъ эпилепсіи . . . 1
II. Положенія сердца:
Параличъ сердца вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ . . . 1
Параличъ сердца вслѣдствіе недост. серд. клап., endoarteritid. deform. chron. аорты и вѣнечн. сосуд. сердца . . . 7
Параличъ сердца вслѣдствіе недост. серд. клап. и ожирѣнія сердца . . . 25
Параличъ сердца вслѣдствіе недост. серд. клап., endoarteritid. def. chr. и расширенія аорты . . . 28
Параличъ сердца вслѣдствіе endoarteriit. def. chr. аорты и вѣн. сосуд. сердца . . . 30
Параличъ сердца вслѣдствіе endoarter. def. chr. аорты и endocardit. chron . . . 55
Параличъ сердца вслѣдствіе endoarter. def. chr. и расширенія аорты . . . 70
Параличъ сердца вслѣдствіе endoarter. def. chron., endocard. chr. и расширенія аорты . . . 72
Параличъ сердца вслѣдствіе ожирѣнія его . . . 76
Параличъ сердца вслѣдствіе хроническ. эндокардита . . . 83
Параличъ сердца вслѣдствіе перерожденія сердечной мышцы . . . 85
Параличъ мозга:
Опухоли головного мозга и его оболочекъ . . . 92
Мозговой нарывъ . . . 94
Размягченіе головного мозга . . . 94
Водянка головного мозга . . . 94
III. Болѣзни органовъ дыханія:
Крупозное воспаленіе легкихъ . . . 95
Гриппозное воспаленіе легкихъ . . . 104
Катарральное воспаленіе легкихъ . . . 104
Бугорчатка легкихъ . . . 108
Капиллярный бронхитъ . . . 116
Острое воспаленіе дыхательныхъ путей . . . 118
Воспаленіе плевры . . . 118
Ракъ пищевода и воспаленіе легкаго . . . 119
Отекъ гортани . . . 120
Ракъ гортани . . . 120
Болѣзни органовъ брюшной полости.
Воспаленіе брюшины . . . 121

Воспаленіе желудочно-кишечнаго канала 127
Заворотъ кишекъ 128
Циррозъ печени 132
Воспаленіе почекъ. 133
Ракъ матки 135
Воспаленіе мозговыхъ оболочекъ 136
Инфекціонныя заболѣванія.
Брюшной тифъ. 138
Холера (?) 143
Сибирская язва 143
Столбнякъ. 144
Инфлюэнца 144
Септицемія 144
Оспа. 146
Скарлатина 146
Дифтерія 147
Болѣзни крови и обмѣна, и др.
Гнойн. восп. среди. уха 148
Рахитъ 148
Сифилисъ 150
Лейкемія 150
Пятнистая болѣзнь 151
Истощеніе. 151
Смерть во время хлороформированія. 152
IV. Давленіе на мозгъ.
Кровоизліяніе въ мозгъ и его оболочки 154
V. Давленіе на сердце.
Разрывъ сердца и аорты 174
VI. Задушеніе вслѣдствіе попаданія въ дыхательные пути или въ полость плевры крови изъ легкихъ или изъ разрыва аорты. 180
VII. Острое малокровіе вслѣдствіе кровотеченія отъ различныхъ причинъ 185
VIII. Смерть отъ чрезмѣрнаго опьяненія 189
Задушеніе рвотными массами 199
Задушеніе отъ попаданія въ дыхательные пути инородныхъ тѣлъ. 213
Задушеніе мягкими предметами 215
Mors thymica 217

БИБЛІОТЕКА
Кафедры Общей Гигіены
1-го Харьковского Медицинского Института

ОПЕЧАТКИ:

Стр.		Напеч.	Слѣд.
40	№ 136	52 л.	58 л.
—	№ 139	49 л.	42 л.
181	—	№ 263	№ 623

НБ ХНМУ