

**Кривченко Ю.В., Ладна І.В., Пажин С. О.**

**Анатомічні особливості червоподібного відростку**

**Харківський національний медичний університет,  
кафедра анатомії людини**

**Науковий керівник к.м.н., доцент Кривченко Ю.В.**

ЧВ (апендикс) — це порожнистий орган травного тракту, який відходить від задне-медіальної частини вільного купола сліпої кишки.

Форма, розміри, і положення ЧВ в порожнині живота дуже різноманітні. Як правило, він має циліндричну форму. Підстава ЧВ розташована біля кінця вільної стрічки сліпої кишки, на 2- 3 см нижче впадання клубової кишки в сліпу кишку. Було досліджено 16 трупів дорослої людини і встановлено, що довжина ЧВ становить ~ 2 - 24 см (в середньому ~ 9 см), зовнішній діаметр ~ 0,5 - 1 см. У чоловіків апендикс зазвичай довший, ніж у жінок на 6 - 7 мм. З боку порожнини сліпої кишки біля гирла відростка можуть бути видні 1 - 2 складочки слизової оболонки – клапан Герлаха.

ЧВ не має постійного положення в черевній порожнині. Замкнутий кінець апендикса довгою віссю може бути направлений: каудально (у 7 чоловік), латерально (у 5 чоловік) або краніально (у 4 чоловік). Найчастіше ЧВ розташовується в правій здухвинній ямці. При цьому його замкнутий кінець звернений вниз і медіально, у напрямку до малого тазу. При цьому апендикс може проходити поверх поперекового м'яза і клубових судин. У жінок ЧВ може розташовуватися в безпосередній близькості до правих придатків матки, рідше – у порожнині малого тазу. При висхідному напрямку апендикс може знаходитися позаду сліпої кишки (ретроцекальне положення) і навіть зачервенно. Дуже рідко зустрічаються аномалії форми (подвоєння відростка), положення (зворотне розташування органів черевної порожнини), розмірів.