


Науково-дослідний алгоритм лікування пацієнтів з метаболічно-асоційованою стеатотичною хворобою печінки в поєднанні з гіпертонічною хворобою I-II стадій

Железнякова Н. М., Александрова Т. М., Молодан В. І., Просоленко К. А., Панченко Г. Ю., Гопцій О. В., Візір М. О.



Примітки: УЗД – ультразвукове дослідження, МАСХП – метаболічно-асоційована стеатотична хвороба печінки, САТ – систолічний артеріальний тиск, ДАТ – діастолічний артеріальний тиск, ГХ – гіпертонічна хвороба;

* Наявність надмірної ваги/ожиріння, дисглікемії, підвищення тригліцеридів, ліпопротеїдів високої щільності, артеріальної гіпертензії.

Даний алгоритм розроблений для лікувальних закладів терапевтичного профілю як спосіб лікування пацієнтів з метаболічно-асоційованою стеатотичною хворобою печінки в поєднанні з гіпертонічною хворобою I-II стадій, який включає додаткове призначення до базисної терапії МАСХП периндоприлу у дозі 8 мг на добу та адеметіоніну за схемою 800 мг внутрішньовенно перші 15 днів з подальшим пероральним прийомом в дозі 500 мг 2 рази на день тривалістю до двох місяців.