

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**



ЗБІРНИК ТЕЗ

**міжвузівської конференції молодих вчених та
студентів**

МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

(Харків – 16-17 січня 2017 р.)

Харків - 2017

УДК 61.061.3 (043.2)

ББК 61 (063)

*Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків – 16-17 січня 2017 р.)
Харків, 2017. – 600 с.*

За редакцією професора В.М. ЛІСОВОГО

Відповідальний за випуск проф. В.В. М'ясоєдов

Затверджено Вченою радою ХНМУ
Протокол № 12 від 22 грудня 2016 р.

Ли Нельсона из Вашингтонского университета было выявлена взаимосвязь с наличием плодных клеток в организме женщины, т.е. так называемого фетального МХ. А также ее исследования определили, что данные клетки долгоживущие и могут делиться и давать начало множеству специализированных видов клеток, т.е. данные клетки являются стволовыми. В пользу данной теории свидетельствуют результаты, полученные кардиологом Хиной Чондри, которая в своих исследованиях на мышах выявила, что фетальные МХ поступая в сердце, дифференцируются и становятся кардиомиоцитами. Однако, при исследованиях доктора Эми Бодди из Университета Аризоны было выявлено, что материнская иммунная система может реагировать на увеличение фетальных клеток плода в виде выработки иммунных Т-клеток, которые направлены на их уничтожение. Но если эти клетки обладают способностью изменять свой фенотип и становятся более агрессивными в ответ на иммунную реакцию матери, то это может привести к обострению конфликта с потенциально негативными последствиями. Эмбриональные клетки могут реагировать на материнский иммунный ответ путем повышения скорости пролиферации, производя факторы, которые могут быть нацелены на разрушение материнских иммунных клеток. Одно исследование показало, что вторжение в клетки трофобласта могут индуцировать апоптоз материнских Т-клеток, что может негативно сказываться на состоянии иммунитета матери. При исследовании больных системной склеродермией было выявлено значительное повышение уровня фетальных МХ, что в контрольной группе не наблюдалось. Данные исследования свидетельствуют, что эти клетки могут запустить аутоиммунные процессы.

Исходя из выше сказанного, данный вопрос является недостаточно изученным и нуждается в дальнейших исследованиях.

Аралова В.О.

ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО СОСУДИСТОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЛЁГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

**Харьковский национальный медицинский университет
кафедра акушерства и гинекологии № 1, г. Харьков, Украина
Научный руководитель: д.мед.н., проф. Потапова Л.В.**

Материалы и методы. Нами были обследованы 20 беременных с признаками преэклампсии (отёки, повышение артериального давления, протеинурия) различной степени тяжести в сроке 39-40 недель. I-ю группу составили 10 (50%) пациенток с преэклампсией лёгкой степени. Вторая группа сформирована из 10 (50%) беременных с признаками преэклампсии средней степени тяжести. Средний возраст пациенток 1-й группы составил $26,4 \pm 0,3$, а второй $27,3 \pm 0,4$.

Основным методом исследования было определение индексов резистентности в маточных артериях. Цветное доплеровское картирование проводилось в положении женщины лежа на спине по методике,

разработанной [А.Н. Стрижаковым и др., 1990 г.] с применением ультразвукового сканера фирмы Philips. Полученные абсолютные результаты изменения значений систолической и диастолической скоростей кровотока преобразовывались в относительные показатели: систолодиастолическое отношение (СДО), пульсационный индекс (ПИ), индекс резистентности (ИР).

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе изучения полученных результатов была выявлена тенденция повышения показателей периферического сосудистого сопротивления в маточных артериях у беременных с преэклампсией средней степени тяжести. СДО увеличилось на 9% в сравнении с показателями у пациенток с преэклампсией лёгкой степени, что составило $2,32 \pm 0,08$ и $2,13 \pm 0,06$ соответственно ($p < 0,05$). ПИ во 2-й клинической группе ($0,87 \pm 0,03$) на 11,5% выше, чем в 1-й ($0,78 \pm 0,02$) ($p < 0,05$). ИР у пациенток с преэклампсией средней степени тяжести на 17% выше, чем у беременных с преэклампсией лёгкой степени, $0,55 \pm 0,02$ и $0,47 \pm 0,01$ ($p < 0,05$).

Можно сделать вывод, что одним из патогенетических звеньев развития позднего гестоза у беременных являются изменения периферического сосудистого сопротивления.

Арсентьева А.В., Филатова С.С., Лысенко Т.П.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ
МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА

Харьковский национальный медицинский университет
Кафедра акушерства, гинекологии и детской гинекологии,
г. Харьков. Украина

Научный руководитель: д.мед.н., проф. Тучкина И.А.

Актуальность. Аномальные маточные кровотечения (АМК) занимают одно из лидирующих мест среди патологических состояний в гинекологии. По данным литературы, частота АМК в последние годы увеличилась [Andrist L.C., Arias R.D. et al., 2004]. (Andrist L.C., Arias R.D. et al., 2004). До 65% пациенток репродуктивного возраста обращаются к специалистам по поводу чрезмерных менструальных кровотечений (Herve Fernandez, 2007). Причиной АМК часто являются: поражение гипоталамо-гипофизо-яичниково-маточной системы, гипоталамо-гипофизарно-яичниково-маточных взаимоотношений, воспалительные и инфекционные заболевания, переутомление, острый и хронический стресс, нарушение гормонального гомеостаза после абортов, при наличии миомы матки, полипоза эндометрия, нарушение гемостаза. Длительные кровотечения могут приводить к железодефицитной анемии, бесплодию, снижению работоспособности и развитию соматических заболеваний.

Цель работы: провести ультразвуковую характеристику АМК у женщин репродуктивного возраста

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе кафедры акушерства, и гинекологии и детской гинекологии в КУОЗ «Харьковский городской родильный дом №1». Для проведения исследования

КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ГЕМАНГІОМ У ДІТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ХІРУРГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.....	185
Куликова К.С., Пидкова А.И.....	186
ЭХОЦИСТОГАСТРОСТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПСЕВДОКИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	186
Ламааши Э.М.....	188
ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНЮ.....	188
Лепеха И.В.....	189
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СКРЫТОЙ ТИРЕОИДНОЙ МИКРОКАРЦИНОМЫ ПОД КЛИНИЧЕСКОЙ МАСКОЙ РАКА ЛЕГКИХ ..	189
Маркевич Н.А., Калюжка В.Ю.	190
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ИСХОДА ПЛАНОВЫХ ПУЛЬМОНЭКТОМИЙ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО	190
Оноприйко Ю.Ю., Антонова М.С.	191
ГЕРНИОАЛЛОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ.....	191
Переяслова А.С., Иванова А.Н., Гончарь Е.Н., Хоценко И.А., Арустамова Г.С.	193
ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ТОЛЩИНЫ ХОРИОИДАЛЬНОГО СЛОЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕРОЗНОЙ ХОРИОРЕТИНОПАТИЕЙ.....	193
Поликов Г.О., Антонова М.С.....	193
ЕТАПНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПАНКРЕАТОГЕННИЙ СЕПСИС	193
Приходько Д.О., Гончарь О.М., Арустамова Г.С., Переяслова Г.С., Хаценко І.О.	195
ДИНАМІКА ДОЛІ БАЗАЛЬНО-КЛІТИННОГО РАКУ СЕРЕД ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ПОВІК В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.....	195
Проненко И. Ю.....	196
ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ОРГАНосоХРАНЯЮЩЕЙ ХИРУРГИИ ПОЧЕЧНО - КЛЕТОЧНОГО РАКА	196
Робак В.І., Курбатов В.О., Драна Л.О.	197
КРИТЕРІЙ ПРОГНОЗУ ПЕРЕБІГУ ПАРАПАНКРЕАТИТУ	197
Ситникова Н.Ю.	198
ПРИМЕНЕНИЕ ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНЗ (ЛИНЗЫ PARAGON) В КОРРЕКЦИИ БЛИЗОРУКОСТИ	198
Цись Ю. В., Давиденко Н.В.	199
МОЖЛИВОСТІ ПІДСИЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ДЕСТРУКТИВНИХ ПНЕВМОНІЙ У ДІТЕЙ ШЛЯХОМ СПРЯМОВАНОГО ДИНАМІЧНОГО ВПЛИВУ НА ПАТОГЕННУ МІКРОФЛОРУ	199
Шубина М. В	200
ПЕРВЫЙ ПРОТЕЗ СЕТЧАТКИ - ARGUS II.....	200
АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ.....	202
Jacobs Yvonne, Romanenko A.A.....	202
PREVALENCE OF METABOLIC SYNDROME IN WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARIAN DISEASE.....	202
Алайя Ламиа	203
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ	203
Абдуллаева С.И., Гасанова А.Р.....	204
ВЛИЯНИЕ ФЕТАЛЬНОГО МИКРОХИМЕРИЗМА НА ИММУНИТЕТ МАТЕРИ.....	204
Аралова В.О.....	205
ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО СОСУДИСТОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЛЁГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ	205
Арсентьева А.В., Филатова С.С., Лысенко Т.П.	206
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА	206
Артамонов Р.О., Дубовик В.В.....	207
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ ПСИХОЗОВ	207