

Изъ докторскихъ диссертаций, допущенныхъ къ защитѣ въ Императорской Военно-Медицинской Академіи въ 1911—1912 учебномъ году.

Ш

№ 27.

О непосредственныхъ и отдаленныхъ результатахъ оперативнаго леченія разрывовъ промежности, выпаденій влагалища и матки восстановленіемъ тазового дна.

Изъ Императорскихъ Клиническихъ Повивально-Гинекологическаго и Великой Княгини Елены Павловны Институтовъ.

(Директоръ перваго и завѣдывающій гинекологическимъ отдѣленіемъ втораго: Гейбъ-акушеръ Двора Его Величества, профессоръ Дмитрій Оскаровичъ Оттъ).

54018

ДИССЕРТАЦІЯ

на степень доктора медицины
Карла Федоровича Шабакъ.

X 5264

Цензорами диссертации, по порученію Конференціи, были профессора: Д. Д. Поповъ и А. А. Редлихъ и приватдоцентъ Д. О. Оттъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Государственная Типографія
1912

Изъ докторскихъ диссертаций, допущенныхъ къ защитѣ въ Императорской Военно-Медицинской Академіи въ 1911—1912 учебномъ году.

7-го Мая 1912

№ 27.

С. ПЕТЕРБУРГЪ
Академіи Военно-Медицинской
№ 27
1912

О непосредственныхъ и отдаленныхъ результатахъ оперативнаго леченія разрывовъ промежности, выпаденій влагалища и матки возстановленіемъ тазового дна.

Изъ Императорскихъ Клиническихъ Повивально-Гинекологическаго и Великой Княгини Елены Павловны Институтовъ.

(Директоръ перваго и завѣдывающій гинекологическимъ отдѣленіемъ втораго: Лейбъ-акушеръ Двора Его Величества, профессоръ Дмитрій Оскаровичъ Оттъ).

2755
1911

ДИССЕРТАЦІЯ

на степень доктора медицинскы
Карла Федоровича Шабакъ.

Цензорами диссертации, по порученію Конференціи, были профессора: Д. Д. Половъ и А. А. Редлихъ и приват-доцентъ Д. О. Оттъ.

№	НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
	1-го Харьк. Мед. Института

Библиотека Чита	1540
Харьк. Гос. Мед. Ун-та	1540
Мат. кн.	12
Шифр. деп.	12
М. кеттер	

С. ПЕТЕРБУРГЪ.
Государственная Типографія.
1912.

Перечень
1912 г.

1950

7 - НОЯ 2012

Переучет-60

№ 25

508 РМ - Г

Докторскую диссертацию лекаря Карла Федоровича Шабакъ под заглавиемъ: «О непосредственныхъ и отдаленныхъ результатахъ оперативнаго лечения разрывовъ промежности, выпадений влагалища и матки» печатать разрешается съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи было представлено въ Императорскую Военно-Медицинскую Академію 500 экземпляровъ ея [150 экземпляровъ диссертаци и 300 отдѣльныхъ оттисковъ краткаго резюме ея (выводы) представляются въ Канцелярію Конференціи Академіи, а 350 экземпляровъ диссертаци въ академическую бібліотеку].

С.-Петербургъ, 3 марта 1912 года.

Ученый Секретарь, профессор А. Моисеевъ.

Иск. М. Иститут
 П. П. КОВ. СБ/НОТЛКА

1912

81029

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
Введение	5
I. Историческій очеркъ	7
II. Краткія патолого-анатомическія свѣдѣнія	10
III. Этіологія	16
IV. Диагнозъ и прогнозъ	42
V. Симптомы	45
VI. Профилактика и леченіе съ сравнительной оцѣнкой различныхъ оперативныхъ методовъ	52
VII. Первичные результаты отъ возстановленія тазового дна	69
VIII. Отдаленные результаты	72
IX. Выводы	89
X. Таблицы	92
Указатель литературы	299
Положенія	309
Curriculum vitae	311

1912

...отличия не только в размерах, но и в форме, а также в расположении относительно друг друга. Иногда встречаются случаи, когда один из стоек находится выше другого, или они расположены не параллельно, а под углом друг к другу. Это может быть связано с различными причинами, такими как врожденные пороки развития или приобретенные изменения в результате заболеваний или травм.

ВВЕДЕНИЕ.

Почти на всех акушерско-гинекологических съездах, как иностранных, международных, отечественных, а также в ученых обществах, предметом неоднократного обсуждения служит вопрос о выпадении матки.

При этом высказываются всевозможные мнения относительно причины выпадения, которую одни видят в ослабленном связочном аппарате, другие в несостоятельном тазовом дне, в стénках влагалища, в Retroversi'i ut. и проч.

Предлагаются разные новые оперативные методы лечения, старые модифицируются, и все это единственно с целью получить более идеальные результаты, так как старые не удовлетворяют или оказались не безопасными quo ad valitudinem et vitam больной.

Далее, одни называют полным выпадением, когда дно матки находится ниже выхода малого таза (Küstner, Славянский и др.), другие—когда матка лежит ниже Hiatus'a genitalis (Halban, Tandler, Nebesky и другие), или когда матка вся extra rimam (большинство гинекологов). Наконец, некоторые принимают полный выворот влагалища с шейкой матки между вывороченными влагалищными стénками за полное выпадение и проч.

Итак, до настоящего времени еще не достигнуто полного согласия ни относительно этиологии, ни лечения, ни диагностики выпадения матки. А между тем только тогда, когда будет достигнуто согласие по всем пунктам, мы станем на правильный путь и нам возможно

будет правильно судить о неудачах того или иного оперативного метода.

Для достижения этого согласия и правильного разрешения столь сложного вопроса, как выпадение влагалища и матки, нужны не только теоретическая, но, главным образом, цифровая данные, полученные от применения того или другого оперативного метода на большом числе больных, одержимых пролапсом различных степеней до полного включительно.

Мы задались целью детально обработать в этом смысле весь имеющийся у нас в руках материал из клиник профессора Д. О. Отта.

За 11 лет, с 1897 по 1907 год включительно, оперировано профессором Д. О. Оттом и его ассистентами 516 больных восстановлением тазового дна и промежности, причем 366 раз при разных степенях выпадения влагалища и матки и 150 раз при старом разрыве промежности без ясно выраженного опущения влагалищных стенок. Часть этих больных проверена относительно отдаленных результатов через большой промежуток времени после операции. Полученные при этом различные отдаленные результаты оправдали принятый у нас метод лечения выпадений влагалища и матки, как соответствующий причинному показанию.

Пользуясь случаем принести моему учителю, глубоко уважаемому профессору Дмитрию Оскаровичу Отту, при клинике которого я состою вот уже 12 лет, мою сердечную благодарность за предложенную мне тему и за его всегашнее любезное ко мне отношение.

Приятным долгом своим считаю также принести благодарность товарищам, давшим мне сведения об отдаленных результатах относительно некоторых больных, и всем тем, кто так или иначе принимал участие при составлении мною этой работы.

Краткий исторический очерк.

Выпадение влагалища и матки старо, как и само человечество, так как, по видимому, роды производили всегда те же травмы в родовом канале, как и теперь, и с теми же последствиями для роженицы.

Печатное описание разрывов промежности и выпадений матки впервые встречается у Гипократа (см. Schroeder ¹⁾). О неправильном положении матки и ее выпадениях мы узнаем больше подробно из книги греческого врача Soranus'a ²⁾, древнейшего гинеколога, жившего в Эфесе во II стол. по Р. Х. и учившегося в Риме. В книге этой: «О женских болезнях» — он упрекает между прочим своих коллег в невѣжестве за то, что они весьма дико и своеобразно лечили выпадения, напр. привязыванием к лѣстницѣ, ногами вверх, на 24 часа, или обкуриванием выпавших органов вонючими веществами и проч. Soranus сам вправлял выпавшую матку, придавая при этом больной соответствующее удобное положение, и вставлял для удержания матки пессарий из шерсти. Он считал также необходимым срывать омертвевшие части выпавшей матки или при надобности даже удалять матку (см. Schröder. Handbuch der Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane. 11 Auflage. Seite 229 — мелкий шрифт).

В средние века дѣло лечения выпадений матки не только не подвинулось вперед, но позабылось даже и все добытое во времена блестящаго периода греческой медицины. Все лечение сводилось ко вложенію пессарія во влагалище. Маточныя кольца вошли въ употребленіе со времени А. Paré ³⁾ (живш. сь 1517—1590 г.). — Kilian ⁴⁾

въ своей монографіи упоминаетъ уже о 50 разныхъ видовъ пессарій.

Попытки лечить выпаденія матки искусственнымъ сужениемъ влагалища, напр. прижиганіемъ ляписомъ, азотной кислотой и каленымъ желѣзомъ, существовали давно.

Въ концѣ XVII и въ началѣ XVIII стол. François Mauriceau ³⁾, творецъ современной научной гинекологіи, и Smellie ⁴⁾, знаменитый англійскій акушеръ, высказывали мнѣніе, что оперативное лечение разрывовъ промежности и влагалища можетъ быть удачнымъ. Въ серединѣ прошлаго столѣтія Huguier ⁵⁾ сдѣлалъ впоху въ ученіи о выпаденіи своимъ трудомъ: «о гипертрофій шейки».

Къ этому же времени зашиваніе промежности стало получать болѣе общее распространеніе, благодаря прижизненію его I. Diefenbach'омъ ⁶⁾ и преемникомъ его V. Langenbeck'омъ ⁷⁾ и др.

Нѣсколько позже, Simon'омъ ⁸⁾ и въ особенности ученикомъ его Hegar'омъ ⁹⁾ впервые предложена при старыхъ разрывахъ промежности и выпаденіяхъ половыхъ органовъ пластическая операція съ треугольной фигурой освѣженія на влагалищѣ и промежности по принципамъ анатома-топографическимъ, а еще позднѣе предложенные способы: Martin'a ¹⁰⁾, Fritsch'a ¹¹⁾, Küstner'a ¹²⁾ и пр. являются только незначительной модификаціею Hegar'овскаго метода.

Кромѣ того, былъ еще предложенъ цѣлый рядъ другихъ операцій на промежности для удержанія движенія внизъ матки, какъ напр. такъ называемая доскутная операція Simpson'a ¹³⁾—Lawson-Tait'a ¹⁴⁾—Saenger'a ¹⁵⁾, Lefort-Neugebauer'a ¹⁶⁾ (Colporrhaphia med.), Губарева ¹⁷⁾ (возстановленіе columnae rugarum ant. et post.) и др. Всѣ онѣ въ настоящее время примѣняются рѣдко и, по справедливости, вытѣснены методомъ Hegar'a.

Возстановленіе тазоваго дна при помощи Glut. max.—по Halban'у и Tandler'у ¹⁸⁾, недавно предложенное, имѣетъ цѣлью позаметывать мышечныя ткани для возсозданія утраченныхъ, т. е. разорванныхъ и атрофиро-

ванныхъ мышцъ тазоваго дна. Насколько предлагаемый способъ привьется на практикѣ, покажетъ будущее, но появленіе его доказываетъ, какое большое значеніе авторы его придаютъ мышечнымъ элементамъ тазоваго дна.

Способъ Hegar'a ⁹⁾, давшій въ рукахъ его самого и нѣкоторыхъ другихъ отличные результаты, многими не удовлетворилъ въ этомъ отношеніи и предметомъ ихъ особеннаго вниманія при выпаденіяхъ сдѣлалась сама матка, связки ея и также влагалище (Colporrhexis).

Такимъ образомъ, оперативная гинекологія обогатилась цѣлымъ рядомъ новыхъ методовъ для устраненія выпаденій. Нужно сказать, что эти методы, болѣею частью, идентичны съ операціями, примѣняемыми для исправленія неправильныхъ положеній матки, какъ Ventrofixatio ut. no Ohlshausen'y ¹⁹⁾, Fritsch'y ²⁰⁾, Küstner'y ²¹⁾ и др.;—Vaginofixatio—no Schücking'y ²²⁾, Dührsen'y ²³⁾, A. П. Лебедеву ²⁴⁾ и др.; Vesicofixatio—no Mackenrodt'y ²⁵⁾;—Abbreviatio lig. rot.—no Aran-Aliquiè—Alexander'y-Adams'y ²⁶⁾. Далѣе: Interpositio ut. no Freund'y ²⁷⁾ Schauta ²⁸⁾, Wertheim'y ²⁹⁾, Fritsch'y ³⁰⁾, Resectio vag.—no Müller'y ³¹⁾; Extirpatio ut. + Resectio vag.—no Martin'y ³²⁾; Colporrhexis ant. et post.—no Снегиреву ³³⁾ и проч.

Но никто теперь не сомнѣвается, что только что перечисленные оперативные методы дѣйствительны только тогда, когда къ нимъ будетъ присоединена добавочная Colporrhaphia, а длительные результаты отъ нихъ тѣмъ лучше, чѣмъ основательнѣе было сдѣлано возстановленіе тазоваго дна.

Такимъ образомъ, весь вопросъ оперативнаго леченія выпаденій матки въ настоящее время сводится къ тому, что почти всѣ гинекологи примѣняютъ операціи на маткѣ, связкахъ и проч. и прибавляютъ къ нимъ пластику и только меньшинство примѣняютъ одну только пластику, не обращая вниманія на положеніе матки и отвергая фиксацію ея, произведенную тѣмъ или другимъ хирургическимъ способомъ, какъ и всякія операціи на маточныхъ связкахъ.

Краткія патолого-анатомическія свѣдѣнія.

Матка нормально занимаетъ въ полости малаго таза, благодаря своему связочному аппарату, весьма подвижное положеніе въ физиологическихъ границахъ. Всякая перемѣна положенія тѣла, дыхательныя движенія, кашель, крикъ, пѣніе, переполненіе мочевого пузыря и прямой кишки отзываются на положеніи матки. Благодаря такой весьма большой подвижности матки можетъ легко произойти, съ одной стороны, при извѣстныхъ условіяхъ, ненормальное положеніе ея, но съ другой стороны такая подвижность необходима для безпрепятственнаго выхода части ея изъ полости малаго таза при увеличеніи ея во время беременности.

Нормальное положеніе матки при пустомъ или мало наполненномъ пузырьѣ—*Anteversio*, какъ это впервые установилъ *Schultze* ³⁷⁾ и заглавъ было подтверждено *Bardleben* 'омъ ³⁸⁾, *Ziegenspeck* 'омъ ³⁹⁾, *Winkel* 'емъ ⁴⁰⁾, *Waldeyer* 'омъ ⁴¹⁾, *Spiegelberg* 'омъ ⁴²⁾ и др.

По старымъ авторамъ матка удерживается въ нормальномъ положеніи и на нормальной высотѣ благодаря своему связочному аппарату, состоящему, какъ извѣстно, изъ трехъ паръ мышечно-соединительно-тканевыхъ образований. Въ настоящее время имъ уже не придаютъ того исключительнаго значенія, какъ раньше, и приписываютъ имъ лишь роль удерживать матку въ устойчивости въ полости малаго таза дномъ, обращеннымъ къ лону, и шейкой, обращенной въ крестцовую впадину.

Нормальное положеніе половыхъ органовъ въ анатомо-топографическомъ отношеніи въ маломъ тазу зави-

сать преимущественно отъ 2-хъ причинъ: отъ внутрибрюшного давления и отъ силы, противодействующей ему, заключающейся въ замыкающемъ аппаратѣ брюшной полости снизу, т. е. тазового дна и промежности, въ качествѣ антагониста брюшного пресса.

По *Ed. Martinu* ⁴³⁾ самымъ главнымъ удерживающимъ аппаратомъ для органовъ полости таза является тазовая соединительная ткань. Въ своихъ анатомическихъ изслѣдованіяхъ надъ тазомъ съ продансомъ онъ констатировалъ атрофію соединительной ткани, а не *Levati* и *Diaphragmae pelvis*.

По нашему мнѣнію, констатированная *Ed. Martinu* атрофія соединительной ткани не есть причина выпаденія, а только слѣдствіе его и объясняется постѣдовательнымъ нарушеніемъ питанія тканей, вслѣдствіе затрудненнаго кровообращенія при смѣщенныхъ половыхъ органахъ.

При нормальныхъ условіяхъ брюшной прессъ дѣйствуетъ на верхнюю (заднюю) стѣнку матки и смѣщаетъ ее внизъ, но встрѣчаясь препятствіемъ въ тазовомъ днѣ, при условіи его состоятельности; слѣдовательно, органы малаго таза какъ бы покоятся на тазовомъ днѣ и промежности.

Въ противномъ же случаѣ, т. е. при несостоятельности его, матка будетъ смѣщаться большею частью внизъ по оси таза, причемъ мѣстомъ приложения дѣйствія брюшного пресса или равнодействующей является передняя (нижняя) стѣнка матки (*Pansch* ⁴⁴⁾, *Leshaft* ⁴⁵⁾, *Rauber* ⁴⁶⁾, *Halban-Tandler* ⁴⁷⁾, *Nebesky* ⁴⁸⁾, *Губаревъ* ⁴⁹⁾, *Гаунесъ* ⁵⁰⁾ и др.).

При выпаденіи взаимное топографическое отношеніе влагалища, матки, пузыря, прямой кишки и брюшины всегда оказывается измѣненнымъ, ихъ нормальная функція — нарушенной и мышечныя и соединительно-тканевыя элементы атрофированными до извѣстной степени.

Венозный застой и гипертрофія—обычныя явленія смѣщенныхъ и выпавшихъ органовъ. Излившіеся опоры

снизу въ *сogroge perin.*, передняя стѣнка влагалища опускается подъ давлениемъ брюшного пресса.

Обыкновенно къ тому же времени опускается и задняя стѣнка, и тогда обѣ влагалищныя стѣнки, соприкасаясь между собой, образуютъ во входѣ влагалища складку, на подобіе буквы Н.

При значительномъ выпаденіи передней стѣнки выпадаетъ также пузырь, образуя вмѣстѣ съ ней *Cystocele*. Если же въ дивертикуль, образовавшійся отъ выпавшей задней стѣнки влагалища, вовлекается стѣнка прямой кишки, то образуется *Rectocele*.

Изолированное выпаденіе задней стѣнки влагалища происходитъ или вслѣдствіе чрезмерно длинныхъ дугласовыхъ складокъ, или вслѣдствіе особыхъ условій внутрибрюшного давленія, причемъ послѣднее направляется главнымъ образомъ на *Excavatio recto-uterina*, какъ напр. при фиксированной вперёдъ маткѣ.

Удлиненіе шейки матки происходитъ въ тѣхъ случаяхъ выпаденія, гдѣ матка (тѣло ея) не поддается давленію сверху и не опускается вслѣдствіе парапериметритическихъ тяжей и сращеній или сохранившагося тонуса связочнаго аппарата.

Въ такомъ случаѣ внутрибрюшное давленіе встрѣчаетъ на своемъ пути *locus minoris resistentiae* въ области передняго и задняго сводовъ и въ верхнемъ отдѣлѣ влагалища, которые, будучи слабо укрѣплены, весьма уступчивы, принимаютъ болѣе активное участіе въ выпаденіи, чѣмъ сама матка, и увлекаютъ за собой шейку, растягивая ее въ длину (вторичное выпаденіе матки), даже до 15 и болѣе сантиметровъ (20 см.), причемъ дно матки нерѣдко лежитъ на нормальной высотѣ (*Prolapsus incompletus sine descensus*).

Въ случаяхъ же, гдѣ матка поддается внутрибрюшному давленію и опускается легко, вслѣдствіе отсутствія тяжей, или вслѣдствіе расслабленнаго тонуса связочнаго аппарата, тамъ не наблюдается такого рѣзкаго удлиненія шейки, а если оно и бываетъ, то не болѣе 1—2 см. противъ нормы (первичное выпаденіе матки).

При первичномъ неполномъ выпаденіи матки участіе влагалищныхъ стѣнокъ въ выпаденіи не бываетъ столь значительнымъ, какъ при вторичномъ, причемъ онѣ стѣдуютъ за маткой (вторично), представляя инверсію, начиная со сводовъ.

При зондированіи полости длинныхъ матокъ нерѣдко наблюдалось рѣзкое суженіе внутренняго зѣва, проходимаго только для самаго тонкаго маточнаго зонда.

Часто можно констатировать, что послѣ нѣкоторыхъ терапевтическихъ мѣропріятій, направленныхъ противъ рубцоваго пери-параметрита при выпаденіи матки съ *Elongati'e collis*, послѣдняя можетъ исчезнуть или уменьшиться. Это сокращеніе шейки зависитъ отъ того, что фиксирующіе и удерживающіе матку тяжи болѣе не противодействуютъ внутрибрюшному давленію—матка свободно опускается, между тѣмъ какъ при существованіи тяжей и рубцовъ внутрибрюшное давленіе дѣйствуетъ на своды, вытягивая благодаря этому шейку въ длину, другими словами, вторичное выпаденіе матки (съ *Elongati'e collis*) переходитъ въ первичное (почти съ нормальной длины маткой).

Такимъ образомъ, первичныя и вторичныя выпаденія не могутъ быть строго разграничены другъ отъ друга и такое дѣленіе, слѣдовательно, можетъ быть только приблизительно и не имѣетъ существеннаго значенія.

Но въ нѣкоторыхъ клиникахъ выпаденія строго разграничиваются на первичныя и вторичныя и выводятся точное процентное отношеніе для тѣхъ и другихъ.

Такъ же, какъ при извѣстныхъ условіяхъ, совершается переходъ вторичнаго неполнаго выпаденія матки въ первичное полное, бываетъ и переходъ неполнаго выпаденія матки съ гипертрофіей шейки въ полное, какъ на это уже указалъ Славянскій³¹⁾, вслѣдствіе наступающаго обратнаго развитія гипертрофическихъ частей при *Involuti'o senilis* и при примѣненіи нѣкоторыхъ способовъ леченія.

Въ вашей III-й группѣ (неполн. выпаден.) длина матки равнялась отъ 12—15 см. въ 42%, отъ 8½ см. до

12 см.—въ 45% и до 8½ см.—въ 13%. Какъ видно изъ этихъ цифровыхъ данныхъ, большинство матокъ были значительно удлинены, и, следовательно, большинство выпадений должно быть отнесено къ категории вторичныхъ и лишь меньшинство можно причислить къ первичнымъ.

То обстоятельство, что на основаніи нашего матеріала чаще и больше всего удлиняется междуточная часть шейки (*pars intermed. по Schroederу*) въ связи съ небольшимъ удлинениемъ надвлагалищной (*supravag.*), зависитъ, главнымъ образомъ, по нашему мнѣнію, не исключая при этомъ и другихъ причинъ, отъ того, что *Excavatio vesico-uterina* и передняя влагалищная стѣнка поддаются скорѣе давленію, чѣмъ *Excavatio recto-uterina*, вслѣдствіе направленія равнодѣйствующей спереди отъ наклоненной назадъ матки, стѣдственно, и влеченіе шейки внизъ переднимъ сводомъ должно быть болѣе сильнымъ, нежели влеченіе заднимъ сводомъ.

По Halban'у и Tandler'у⁸²⁾ при выпаденіи матки удлиняется не только шейка, но и тѣло, на что уже раньше указалъ Вирюковичъ⁸³⁾ въ своей диссертации.

Далѣе по Halban'у и Tandler'у образуется углубленіе брюшины (*Recessus retrosymphisicus*) между пузырьремъ и симфизисомъ, что, по нашему мнѣнію, происходитъ отъ дѣйствія внутрибрюшного давленія.

Особую группу выпадений съ неясной этиологіей составляютъ болѣе рѣдкіе случаи гипертрофіи влагалищной части шейки, причемъ тѣло матки имѣетъ нормальную величину и оба свода, какъ передній, такъ и задній, остаются на нормальной высотѣ. На нашемъ матеріалѣ встрѣчались 3 случая *Hypertrophii portionis vaginalis colli* съ *Elongati'ей part. intermediae colli*. Въ диссертации Вирюковича⁸⁴⁾ изъ клиники проф. А. П. Лебедева и у другихъ описаны подобные случаи.

Если смотреть сверху, со стороны открытой брюшной полости (при *Laparatomii*), то оказывается, что при полномъ выпаденіи (*по Küstner'у*⁸⁵⁾) брюшина втянута воронкообразно и въ это узкое отверстіе втягиваются

Lig. rot., lat. et ovaric. и трубы. Яичники обыкновенно не опускаются въ эту воронку. Это отверстіе часто закрывается воспалительными спайками, такъ что, по Küstner'у, вправить матку въ такихъ случаяхъ чрезвычайно затруднительно, причемъ онъ считаетъ здѣсь операцию *Neegar'a* безрезультатной. О такихъ двухъ несправимыхъ случаяхъ сообщаетъ Вирюковичъ⁸⁷⁾ изъ клиники проф. А. П. Лебедева, гдѣ была примѣнена *Extirpatio ut. vag.* Также въ случаѣ Кирѣева⁸⁸⁾, гдѣ вправление выпаденія матки не удавалось, была сдѣлана *Extirpatio per vaginam*.

На нашемъ матеріалѣ, при полныхъ выпаденіяхъ, такихъ несправимыхъ случаевъ не оказалось. При неполныхъ же выпаденіяхъ, на нашемъ же матеріалѣ, два раза вправление первоначально не удалось изъ за периметрита, но послѣ соответствующаго леченія и покоя въ продолженіе нѣсколькихъ дней, матка была вправлена и *Colporrhinaeorrhaphia* дала прекрасные результаты.

При полныхъ выпаденіяхъ матка никогда не бываетъ увеличена, выпадаетъ чаще всего своимъ дномъ къзади и лежитъ въ вывороченномъ влагаліщѣ.

Что касается гистологическаго изслѣдованія гипертрофированныхъ и удлинненныхъ шеекъ, то оно указываетъ, что мы имѣемъ дѣло съ чистыми гиперплазіями всѣхъ тканей, входящихъ въ составъ шейки, причемъ ни одна изъ нихъ не оказывается преобладающей надъ другой (*Sinye*⁸⁹⁾).

БИБЛИОТЕКА

Алексѣйскій Медицинскій Институтъ

№ 5264

Шифр

ПЕР. В. Р. ПО

1936

Этіологія.

Прежде чѣмъ перейти къ разбору причинъ выпаденія матки въ нашемъ матеріалѣ, я приведу мнѣнія нѣкоторыхъ авторовъ.

По Schroeder'у—Hofmeier'у⁶⁰⁾ въ большинствѣ случаевъ въ послѣдующемъ періодѣ изъ зияющей половой щели выпадаетъ передняя или передняя и задняя влагалищныя стѣнки. Влагалище тянется внизъ шейку, которая удлиняется и гипертрофируется въ томъ случаѣ, когда матка не поддается. Если же соединенія матки со смежными органами дряблы, то она слѣдуетъ влеченію влагалища и происходитъ исподволь полное выпаденіе. Благоприятствуетъ происхожденію выпаденія усиленное (форсированное) дѣйствіе брюшного пресса, болѣе вертикальное положеніе влагалища, вслѣдствіе отклоненія матки назадъ и главнымъ образомъ разрывъ промежности.

По Fritsch'у⁶¹⁾ при родахъ передняя стѣнка влагалища и, въ особенности при ригидной шейкѣ, оттягивается книзу проходящей головкой, причемъ влагалище сдвигается отъ подлежащихъ тканей и укорачивается.

Послѣ родовъ остается всегда незначительное опущеніе передней стѣнки влагалища. Вслѣдствіе растяженія и разрыва Levator'ani и Fasc. pelv. и разрыва промежности, она (передняя стѣнка) лишается своей опоры на задней, имѣющей теперь почти вертикальное направленіе, и свѣшивается свободно во входъ влагалища, нѣрдко комбинируясь съ выпаденіемъ задней стѣнки (изолированное опущеніе стѣнокъ влагалища). За влагалищемъ слѣдуетъ часто наклоненная къзади матка и пузырь.

Затѣмъ развиваются застойныя явленія и гипертрофія влагалища и шейки. Матка опускается, какъ вслѣдствіе своей собственной тяжести, тяжести кишечныхъ петель и силы дѣйствія брюшного пресса, такъ и потому, что она лишена опоры и виситъ лишь на связкахъ. Своды влагалища постепенно сглаживаются и наконецъ все влагалище и шейка оказываются спереди входа влагалища (первичное выпаденіе стѣнокъ влагалища съ опущеніемъ матки). Первичнымъ выпаденіемъ матки Fritsch называетъ тѣ случаи, когда ретровертированная матка быстро поддается давленію сверху и, опускаясь, выворачиваетъ влагалище, которое выпадаетъ вмѣстѣ съ ней.

По Д. О. Отту⁶²⁾ опущеніе матки происходитъ главнымъ образомъ отъ моментовъ, содѣйствующихъ поступательному движенію матки внизъ, т. е. брюшного пресса и проч. и отъ ослабленія сопротивленія, оказываемаго тазовымъ дномъ и промежностью. Кромѣ того, Д. О. Отту приводитъ цѣлый рядъ менѣе важныхъ факторовъ, какъ напр. тяжесть и конфигурацію матки, состояніе брюшныхъ стѣнокъ, состояніе связочнаго аппарата и влагалища.

Winter⁶³⁾ считаетъ главной причиною выпаденія послѣродовой періодъ послѣ первыхъ родовъ, не исключая при этомъ и другихъ причинъ. Беременность вызываетъ растяженіе связокъ, разрыхленіе тазоваго дна и влагалища. Роды прибавляютъ къ этому разрывы видимые и подкожные. Въ послѣродовомъ періодѣ—переполненные пузырь и прямая кишка, воспалительные процессы, а также раннее вставаніе вызываютъ Subinvolutio, что все вмѣстѣ способствуетъ развитію выпаденія. Предрасполагающимъ къ выпаденію моментомъ Winter считаетъ Нугеринвolutію uteri senilis. Травма играетъ только передаточную роль.

Küstner⁶⁴⁾ считаетъ причиною выпаденія влагалища: 1) Retroversi'o-Flexi'o ut. При Retroversi'и влагалище укорачивается на 4—6 см., которое и выпадаетъ часто въ видѣ складки.

2) При разрывѣ промежности свисаетъ часть передней стѣнки во входѣ влагалища, что одновременно съ Retroversi'eй въ значительной степени увеличиваетъ выпаденіе влагалища.

3) При Subinvoluti'и, хотя и рѣдко, но бываетъ выпаденіе влагалища.

4) Выпаденіе матки—это высшая степень послѣдствія Retroversi'i-flexi'и.

Еще ранѣе Küstner'a такой взглядъ на выпаденіе высказалъ Schultze⁶⁵⁾, его учитель.

По мнѣнію Arx'a⁶⁶⁾, Theilhaber'a⁶⁷⁾ и др. выпаденіе передней влагалищной стѣнки является главнымъ образомъ причиною выпаденія матки.

Своими обстоятельными экспериментальными изслѣдованіями этиологию выпаденій половыхъ органовъ Halban и Tandler⁶⁸⁾ весьма много сдѣлали для объединенія взглядовъ по этому вопросу. Они утверждаютъ, что выпаденіе—это грыжа Hiatus'a genitalis (отвергіе въ Levat. ani). И, дѣйствительно, за самое послѣднее время много гинекологовъ (Krönig,⁶⁹⁾ Phannenstiел, Rankow⁷⁰⁾, Sellheim и др.) высказались солидарно съ ихъ мнѣніемъ. Но съ другой стороны нужно признать, что Halban и Tandler ничего новаго не сказали, а только подтвердили экспериментально и подробно освѣтили то, что было давно извѣстно. Сдѣлавши однородныя изслѣдованія, пришелъ къ такому же заключенію, какъ и Halban и Tandler.

По ихъ мнѣнію, хотя матка удерживается, благодаря связочному аппарату, въ висячемъ положеніи, но долго сопротивляясь давленію брюшного пресса, въ особенности форсированнаго, не въ состояніи. Только состоятельное дно (не поврежденное) можетъ парализовать дѣйствіе брюшного пресса. Въслѣдствіе родовъ и также отъ паралича промежности, какъ это наблюдается при Spina bifida, образуется недостаточное закрытіе Hiatus'a genitalis, черезъ которое и происходитъ выпаденіе какъ влагалищныхъ стѣнокъ, пузыря, такъ и матки.

Изъ вышесказаннаго мы видимъ, что большинство авторовъ приписываютъ выпаденіе матки оттягиванію ея внизъ, главнымъ образомъ, первично выпавшей передней стѣнкой влагалища, какъ то: Schroeder, Hofmeier, Fritsch, Winter, Theilhaber, Arx, къ которымъ присоединяется еще Hegar⁷¹⁾, Veit⁷²⁾, Славинскій⁷³⁾, Снегиревъ⁷⁴⁾, Новиковъ и др. Снегиревъ⁷⁵⁾ придаетъ пузырю выдающееся значеніе въ числѣ причинъ, обусловливающихъ выпаденіе. По Отту, Halban'у и Tandler'у, Nebesky, Kroenig'у, Phannenstiелю, Sellheim'у и др. главная причина выпаденія—несостоятельность тазового дна и наконецъ по Schultz'у, Küstner'у, Fehling'у⁷⁷⁾, Христіани⁷⁸⁾ и др. причина выпаденія, за немногими исключеніемъ, первичная Retroversio ut.

Что дѣйствительно разслабленное тазовое дно, именно поврежденный Levator ani, является главной причиною выпаденія, подтверждаетъ характерный случай Sitzenfrey'a⁷⁹⁾, гдѣ послѣ резекціи Levator'a изъ за рака Бартолиновой желѣзы, вслѣдъ за этимъ развился пролапсъ соответствующей стороны влагалища и передней стѣнки. Другой доказательный случай въ пользу теоріи Insufficienciae fundi pelvis описанъ Sutter'омъ⁸⁰⁾, гдѣ у нерожавшей 18-ти-лѣтней больной, страдавшей выпаденіемъ влагалища и матки, операція Alex.-Adams'a + Amput. port. + Colporrhaph. ant. не дали положительнаго результата и черезъ 4 недѣли получился рецидивъ, тогда какъ Colporrhaphia у нея же дала полный длительный успѣхъ, и онъ считаетъ, что причиною этого успѣха послужило хорошо и солидно возстановленное Sept. recto-vaginalis. 2 написхъ случаяхъ Prolaps. recti, осложненныхъ выпаденіемъ влагалищныхъ стѣнокъ, радикально излеченныхъ возстановленіемъ тазового дна, служатъ также доказательствомъ того, что причиною выпаденія тазовыхъ органовъ, какъ-то: матки, влагалища и прямой кишки, является несостоятельное тазовое дно.

Здѣсь упомянемъ, что такой методъ леченія выпаденія прямой кишки въ связи съ несостоятельностью тазового дна былъ впервые предложенъ проф. Оттъ⁸¹⁾

въ 1899 г., какъ методъ, соотвѣтствующій причинному показанію, и съ тѣхъ поръ примѣняется имъ и многими другими всегда съ полнымъ успѣхомъ (докладъ Якобсона ⁸²) на V международномъ акушерскомъ съѣздѣ въ С.-Петербургѣ).

Наконѣцъ разрывъ передняго отръбка Levatoris ani при Heboosteotomii вызываетъ выпаденіе, какъ это наблюдалъ Kroenig ⁸³), получивъ 3 раза полное выпаденіе матки.

Кромѣ постепенно развивающагося выпаденія матки, все авторы различаютъ еще острое выпаденіе, которое происходитъ чаще всего въ послѣродовомъ періодѣ, вслѣдствіе чрезмѣрнаго повышенія внутрибрюшнаго давленія при одновременно существующемъ расслабленіи тазового дна.

На нашемъ матеріалѣ отмѣчено у 8-ми больныхъ внезапное выпаденіе матки: вслѣдствіе поднятія тяжести у двухъ, вслѣдствіе паденія у двухъ, вслѣдствіе прыжка у двухъ, вслѣдствіе тяжелой работы у одной и одинъ разъ у прачки. Это обыкновенно сопровождалось явленіями шока (падали безъ чувствъ и, когда приходили въ себя, матка оказывалась выпавшей).

Перейдемъ теперь къ разбору нашего матеріала.

Всѣхъ нашихъ 516 больныхъ мы распредѣлили на 4 группы, смотря по величинѣ выпаденія, которое онѣ имѣли въ день принятія въ клинику.

Въ I группу вошли 150 больныхъ съ разрывомъ промежности, безъ выпаденія влагалища или матки, или иногда съ неясно выраженнымъ, или только къ начинающемуся опущеніемъ матки и влагалищныхъ стѣнокъ.

Во II группу вошли 219 больныхъ, имѣвшихъ опущеніе матки, выпаденіе влагалища въ разныхъ степеняхъ и разрывъ промежности (кромѣ двухъ нерожавшихъ).

Въ III группу вошли 143 больныхъ съ неполнымъ выпаденіемъ матки ¹) и разрывомъ промежности.

¹) Къ неполнымъ выпаденіямъ мы относимъ все удлинненныя и гипертрофированныя шейки, если онѣ показываются въ половой щели.

Въ IV группу вошли 4 больныя съ полнымъ выпаденіемъ матки (когда вся она лежитъ extra rimam).

Изъ всѣхъ 516 больныхъ только 3 не рожали. Изъ нихъ одна получила разрывъ при паденіи на вилы (I группа), а 2 другія (II группа) имѣли вялое и слабо развитое отъ природы тазовое дно; одна изъ послѣднихъ страдала, кромѣ того, съ 12-ти-лѣтняго возраста выпаденіемъ прямой кишки. Что причиной выпаденія у нерожавшихъ бываетъ первичная слабость и недоразвитіе тазового дна, или отсутствіе perinaei указываютъ: Starr ⁸⁴), Schömacker ⁸⁵), Ertzbischoff ⁸⁶), Chaduc ⁸⁷) и др.

По мнѣнію всѣхъ авторовъ выпаденіе у нерожавшихъ встрѣчается рѣдко. У Христиани ⁸⁸) было всего 6 нерожавшихъ изъ всѣхъ 143 случаевъ выпаденія. По Weinbergу ⁸⁹)—6 нерожавшихъ приходилось на 174 рожавшихъ. По Scanloni ⁹⁰) 15 : 114. Въ собранной нами статистикѣ изъ 800 выпаденій влагалища и матки было всего 29 у нерожавшихъ, что=3,6% нерожавшихъ.

Изъ нашихъ 516 больныхъ 2 жаловались на выпаденіе еще до замужества. Отношеніе первородящихъ къ повторнородящимъ у насъ было слѣдующее:

I группа	70 %
II группа	93,2%
III группа	86,1%
IV группа	100 %

Для сравненія приведенныхъ мною цифръ съ данными другихъ авторовъ относительно частоты выпаденій у повторнородящихъ укажу на слѣдующіе два автора:

Христиани ⁸⁸)—86% повторнородящихъ.

Бирюковичъ ⁹²)—88%

Цифры приведенныхъ авторовъ мало отличаются отъ нашихъ. Въ среднемъ до 10% выпаденій матки и влагалища падаютъ на первородящихъ. Полное же выпаденіе, судя по нашимъ даннымъ, бываетъ исключительно у многорожавшихъ и притомъ

довольно рѣдко. У насъ оно встрѣчалось за 11 лѣтъ всего 4 раза.

Всѣ 516 больныхъ, кромѣ 3-хъ нерожавшихъ, имѣли разрывъ при родахъ (одна нерожавшая получила разрывъ при паденіи). Разрывъ при родахъ былъ только въ 9% зашитъ, но всегда безрезультатно. Изъ разрывовъ 15% оказались подкожными. Эти подкожные разрывы происходятъ въ тѣхъ случаяхъ, когда кожа промежности и слизистая влагалища поддаются растяженію подъ напоромъ головки во время родовъ и разрываются только мышцы и фасціи. Такая промежность съ подкожнымъ разрывомъ остается совершенно цѣлой на видъ, но между тѣмъ имѣется явное несостоятельность тазового дна со всѣми дальнѣйшими его послѣдствіями. Славянской ⁸³⁾ указалъ, что эти случаи описываются старыми авторами какъ параличи промежности и представляють изъ себя начальную степень центрального разрыва промежности. Центральный разрывъ наблюдается весьма рѣдко и описанъ между прочимъ Славянской-Гренштрандъ ⁸⁴⁾, Сицинскимъ ⁸⁵⁾ и др. Очевидно, что на такіе невидимые снаружи подкожные разрывы промежности нужно обращать особое вниманіе.

Saenger ⁸⁶⁾ находитъ совершенно правильно, что самыя большія выпаденія встрѣчаются при сильно ослабленной промежности, т. е. при подкожныхъ разрывахъ.

Чтобы предотвратить при родахъ подкожные разрывы, или разрывы вообще тамъ, гдѣ ихъ нельзя избѣгнуть, профессоромъ Д. О. Оттомъ ⁸⁷⁾ предложено было впервые въ 1895 г. срединное профилактическое разсѣченіе промежности (Perinaeotomia по Parhe). По этому поводу вышла изъ Императорскаго Повивально-Гинекологическаго Института диссертация Мандельберга ⁸⁸⁾.

Кромѣ того, по этому же вопросу вышли сообщенія Прокофьевой ⁸⁹⁾, Ахшарумова ¹⁰⁰⁾, докладъ Ильина ¹⁰¹⁾ на III-мъ акушерскомъ съѣздѣ въ Кіевѣ и др. съ подтвержденіемъ цѣлесообразности предложеннаго Оттомъ способа для профилактической цѣли сохраненія мышцъ промежности и тазового дна.

Что касается количества родовъ, то на нашемъ материалѣ отмѣчено:

Во I группѣ:

одни роды имѣли	43	больныхъ.
2—3 родовъ имѣли	53	»
4—5 »	34	»
6—8 »	13	»
9—10 »	4	»
11 » имѣла	1	большая.
? »	1	»
О пара	1	»
Всего		150 больныхъ.

Во II группѣ:

одни роды имѣли	15	больныхъ.
2—3 родовъ имѣли	78	»
4—5 »	59	»
6—8 »	40	»
9—10 »	13	»
11—14 »	9	»
15 » имѣла	1	большая.
? » имѣли	2	больныхъ.
О парае	2	»
Всего		219 больныхъ.

Во III группѣ:

одни роды имѣли	19	больныхъ.
2—3 родовъ имѣли	38	»
4—5 »	34	»
6—8 »	28	»
9—10 »	10	»
11—14 »	10	»
15—16 »	4	»
Всего		143 больныхъ.

Въ IV группѣ:

3 родовъ имѣла	1 (больная)
6 » »	1 »
7 » »	1 »
10 » »	1 »
<hr/>	
Всего	4 больныя.

Такимъ образомъ, въ

I группѣ болѣе 5 родовъ имѣли	12%	больныя.
II » » — » »	29%	»
III » » — » »	37%	»
IV » » — » »	75%	»
<hr/>		
Въ I группѣ 11 родовъ имѣли	0,6%	»
» II » 11—16 родовъ имѣли	4,6%	»
» III—IV » 11—16 »	10%	»

Изъ приведеннаго процентнаго отношенія ясно видно, что число родовъ прямо пропорціонально величинѣ выпаденія.

Что касается выкидышей, то

въ I группѣ:

былъ 1 выкидышъ у	32 больныя.
отъ 2—4 выкидышей у	14 »
5 выкидышей у	1 больной.

во II группѣ:

1 выкидышъ имѣли	44 больныя.
2—4 выкидыша »	28 »
6—8 выкидышей »	4 »

въ III группѣ:

1 выкидышъ имѣли	27 больныя.
2—4 выкидыша »	15 »
6—8 выкидышей »	3 »

Всего 168 больныя.
=32%.

Наши больныя начинали первоначально ощущать опущеніе половыхъ органовъ (продолжавшееся иногда въ теченіи 40 лѣтъ), которое затѣмъ переходило постепенно въ выпаденіе влагалища и матки (продолжавшееся отъ 2 мѣс. до 30 и выше лѣтъ). Въ большинствѣ случаевъ чувство опущенія и выпаденія появлялось вслѣдъ за первыми родами (45%), если роды сопровождались разрывомъ промежности. 30% больныя стали замѣчать опущеніе только послѣ послѣднихъ родовъ; 19%—въ климактерическомъ періодѣ и у 6% это явленіе наблюдалось послѣ промежуточныхъ родовъ, т. е. бывшихъ между первыми и послѣдними.

Характерно то, что многія больныя увѣряли, что у нихъ вся матка выпала, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ у нихъ было только выпаденіе влагалища. Конечно, такое заявленіе больныя слѣдуетъ объяснить незнаніемъ, въ чемъ заключается заболѣваніе.

Изъ сказаннаго видно, что выпаденіе матки не есть болѣзнь преимущественно климактерическаго возраста, какъ это полагаетъ Новиковъ¹⁰³⁾ и др., а развивается исподволь, болѣею частью, послѣ родовъ, сопровождавшихся разрывами, протекаетъ крайне медленно и только въ небольшомъ сравнительно процентѣ происходитъ исключительно въ климактерическомъ періодѣ (19%).

По Христіани¹⁰³⁾ 17% больныя относятъ свое заболѣваніе ко времени I родовъ; у Heftler'a¹⁰⁴⁾ было такихъ больныя 35%; у насъ 45%.

Опущеніе стали замѣчать въ нашей II группѣ:

отъ 1 г. до 5 лѣтъ тому назадъ	54%	больныя
« 6 л. до 10 лѣтъ тому назадъ	24%	»
« 10 лѣтъ до 40 лѣтъ тому назадъ	22%	»

Выпаденіе же стали замѣчать въ той же II группѣ:

отъ 2 мѣс. до 5 л. тому назадъ	59%	больныя,
« 6 л. до 10 л. тому назадъ	30%	»
« 11 л. до 26 л. тому назадъ	11%	»

Въ III группѣ выпаденіе замѣчали:
отъ 2 л. до 5 л. тому назадъ 40% больныхъ,
» 6 до 10 л. тому назадъ 20% »
» 11 л. до 33 л. тому назадъ 40% »

Въ IV группѣ:
отъ 15 л. до 30 л. 100% больныхъ.

Такимъ образомъ, чѣмъ продолжительнѣе существованіе выпаденія, тѣмъ и большіе размѣры его, тѣмъ и большее % отношеніе числа больныхъ по отдѣльнымъ группамъ.

Затѣмъ еще нѣкоторые больныя указывали на быстрое увеличеніе выпаденія, обыкновенно, или послѣ поднятія тяжести, или послѣ лѣтнихъ полевыхъ работъ, или вообще послѣ рѣзкаго напряженія мышечной системы.

Неправильный послѣродовой періодъ былъ въ 45% (лихорадка, кровотеченіе, Subinvolutio и пр.).

Неправильныя менструалыя были въ 60%.

Въ климактерическомъ возрастѣ находились:

Въ I группѣ 0,6% больныхъ.
» II » 22% »
» III » 42% »
» IV » 75% »

Относительно возраста имѣлись слѣдующія данныя:

Въ I группѣ:
18 л. 1 больная.
20 » 1 »
21—30 л. 71 больныхъ.
31—40 » 65 »
41—50 » 11 »
? 1 больная.

Всего 150 больныхъ.

Во II группѣ:
21—25 л. 17 больныхъ.
26—30 » 37 »
31—40 » 85 »
41—50 » 54 »
51—60 » 23 »
61—70 » 3 »

Всего 219 больныхъ.

Въ III группѣ:
21—25 л. 3 больныхъ.
26—30 » 6 »
31—40 » 36 »
41—50 » 54 »
51—60 » 33 »
61—70 » 11 »

Всего 143 больныхъ.

Въ IV группѣ:
40—50 л. 2 больныхъ.
50—60 » 1 больная.
63 л. 1 »

Всего 4 больныхъ.

Такимъ образомъ, старше 40 лѣтъ было:

Въ I группѣ 7% больныхъ.
» II » 36,5% »
» III » 68% »
» IV » 100% »

Что касается сословія, то въ I группѣ было:

крестьянокъ 40 больныхъ.
мѣщанокъ 16 »

купеч. званія	4	больныхъ.
дворянокъ и гражданокъ	70	»
?	20	»

Всего 150 больныхъ.

Во II группѣ:

крестьянокъ	77	больныхъ.
мѣщанокъ	31	»
купеч. званія	7	»
дворянокъ и гражданокъ	86	»
?	18	»

Всего 219 больныхъ.

Во III группѣ:

крестьянокъ	84	больныхъ.
мѣщанокъ	32	»
купеч. званія	2	»
дворянокъ и гражданокъ	21	»
?	4	»

Всего 143 больныхъ.

Во IV группѣ:

крестьянокъ	2	больныхъ.
мѣщанка	1	больная.
дворянка	»	»

Всего 4 больныхъ.

Слѣдовательно, къ трудовому классу (къ крестьянкамъ и мѣщанкамъ) принадлежали:

Во I группѣ	43%	больныхъ.
» II »	54%	»
» III »	83%	»
» IV »	75%	»

Относительно занятій имѣлись слѣдующія свѣдѣнія:

Во I группѣ:

домашнимъ хозяйствомъ занимались	108	больныхъ.
прислугъ	12	»
фабричныхъ	2	»
землепашествомъ занимались	8	больныхъ.
портниха	1	больная.
женщ. врач. и акуш.	5	больныхъ.
служащихъ и учительницъ	3	»
?	11	»

Всего 150 больныхъ.

Во II группѣ:

домашнимъ хозяйствомъ занимались	150	больныхъ.
прислугъ	24	»
фабричныхъ	9	»
землепашествомъ занимались	4	»
портниха	1	больная.
женщ. врач. и акуш.	6	больныхъ.
прачекъ	6	»
торговокъ	6	»
?	13	»

Всего 219 больныхъ.

Во III группѣ:

домашнимъ хозяйствомъ занимались	70	больныхъ.
прислугъ	28	»
фабричныхъ	5	»
землепашествомъ занимались	8	»
портниха	1	больная.

прачекъ	16	больныхъ.
торговокъ	2	»
гладильщица	1	больная.
?	12	больныхъ.
<hr/>		
Всего	143	больныхъ.

Въ IV группѣ:

домашн. хоз. занимались	2	больныхъ,
землепашествомъ занимались	2	»
<hr/>		
Всего	4	больныхъ.

Такимъ образомъ, домашнимъ хозяйствомъ занимались

Въ I группѣ	83,5%	больныхъ.
» II »	76%	»
» III »	54%	»
» IV »	50%	»

Семейное положеніе нашихъ больныхъ было слѣдующее:

I группа:

замужнихъ	125	больныхъ.
незамужнихъ	12	»
вдовъ	9=6%	»
?	4	»
<hr/>		
Всего	150	больныхъ.

II группа:

замужнихъ	175	больныхъ.
незамужнихъ	9	»
вдовъ	32=15%	»
?	3	»
<hr/>		
Всего	219	больныхъ.

III группа:

замужнихъ	78	больныхъ.
незамужнихъ	23	»
вдовъ	38=27%	»
?	4	»
<hr/>		
Всего	143	больныхъ.

IV группа:

замужнихъ	3	больныхъ.
вдова	1=25%	больная.
<hr/>		
Всего	4	больныхъ.

На основаніи семейнаго положенія больныхъ, одержимыхъ выпаденіемъ матки, нельзя сдѣлать какого-либо вывода; слѣдуетъ только отмѣтить, что съ увеличеніемъ объема выпаденія процентное отношеніе вдовъ къ остальнымъ прогрессируетъ.

Итакъ, изъ приведенныхъ цифровыхъ данныхъ мы видимъ, что величина выпаденія влагалища и матки прямо пропорціональна климактерическому періоду, возрасту больныхъ и принадлежности ихъ къ трудовому классу.

Мѣсячныя у нашихъ больныхъ начались въ возрастѣ:

отъ 12—14 л.	въ 49%
» 15—18 »	» 45%
до 12 л. и послѣ 18 л.	» 6%

Начало половой жизни:

отъ 16—20 л.	въ 52,4%	(241 человекъ).
» 20—30 »	» 45,2%	(208 человекъ).
» 31—38 »	» 2%	(9 человекъ).
» 12—15 »	» 0,4%	(2 человекъ).
неизвестно		(56 человекъ).

Всего 516 человекъ.

Первые роды были въ возрастѣ:

въ I группѣ:

отъ 16—18 л. у	10	больныхъ.	} 80%
» 19—25 » »	90	»	
» 26—30 » »	22	»	
» 31—36 » »	2	»	
» 39 » »	2	»	
О пара	1	больная.	
?	23	больныхъ.	
<hr/>			
Всего	150	больныхъ.	

Во II группѣ:

отъ 16—18 л. у	20	больныхъ	} 80%
» 19—25 » »	125	»	
» 26—30 » »	25	»	
» 31—36 » »	5	»	
» 38 » »	2	»	
» 42 » »	1	больной.	
О парае	2	больныхъ.	
?	37	»	
<hr/>			
Всего	219	больныхъ.	

Въ III группѣ:

отъ 16—18 л. у	11	больныхъ.	} 86%
» 19—25 » »	90	»	
» 26—30 » »	11	»	
» 31—36 » »	5	»	
?	26	»	
<hr/>			
Всего	143	больныхъ.	

Въ IV группѣ:

отъ 22—24 л. у	2	больныхъ. = 50%
» 31—32 » »	2	»
<hr/>		
Всего	4	больныхъ.

Такимъ образомъ, первые роды для всѣхъ группъ приходились въ возрастѣ:

отъ 16—18 л. въ	10,0%	} 82,2%
» 19—25 » »	72,2%	
» 26—30 » »	13,6%	
» 31—36 » »	3,0%	
» 38—42 » »	1,1%	

Fetzner¹⁰⁵⁾, изъ клиники Sellheim'a, находитъ, что у старыхъ первородящихъ часто развивается выпаденіе, вслѣдствіе потери эластичности тканей и вслѣдствіе частоты оперативнаго вмешательства.

На нашемъ матеріалѣ выпаденія встрѣчались только въ 17,7% у больныхъ, имѣвшихъ первые роды въ возрастѣ, свыше 26 лѣтъ и до 42-лѣтняго включительно и 82,2% выпаденій встрѣчались у больныхъ, имѣвшихъ первые роды въ возрастѣ отъ 16—25 лѣтъ, и поэтому нельзя придавать мнѣнію Fetzner'a особенно доказательнаго значенія. Правда, Fetzner'омъ приняты границы между старыми и молодыми первородящими 20-лѣтній возрастъ, но съ этимъ едва ли можно согласиться, такъ какъ эластичность тканей въ 25-лѣтнемъ возрастѣ, какъ намъ кажется, нисколько еще не утеряна.

Что касается послѣднихъ родовъ, то въ нашей I группѣ послѣдніе роды имѣли тому назадъ:

отъ 1 1/2 мѣс. до 6 мѣс.	24	больныхъ.
» 7 г.—2 л.	46	»
» 3—5 л.	29	»
» 6—10	14	»
» 11—20	14	»
» 20—30	0	»
нерожавш.	1	больная.
?	22	больныхъ.
<hr/>		
Всего	150	больныхъ.

Во II группѣ послѣдніе роды имѣли тому назадъ:

отъ 1½ мѣс. до 6 мѣс.	10	больныхъ.
» ½ г.—2 л.	48	»
» 3—5 л.	45	»
» 6—10 »	43	»
» 11—20 »	35	»
» 21—35 »	9	»
» 36—40 »	1	больная.
нерокавш.	2	больныхъ
	26	»

Всего 219 больныхъ.

Во III группѣ послѣдніе роды имѣли тому назадъ:

отъ 1½ мѣс.—6 мѣс.	5	больныхъ.
» ½ г.—2 л.	13	»
» 3—5 л.	19	»
» 6—10 »	21	»
» 11—20 »	41	»
» 21—35 »	26	»
» 36—40 »	2	»
нерокавш.	16	»

Всего 143 больныхъ.

Во IV группѣ послѣдніе роды имѣли тому назадъ:

отъ 6—10 л.	1	больная.
» 11—20 »	2	больныхъ.
» 21—35 »	1	больная.

Всего 4 больныхъ.

Слѣдовательно:

Во I группѣ:

послѣдн. роды 5 л. тому назадъ. . .	въ 66 %
» » 20 » и болѣе т. н. »	0 %

Во II группѣ:

послѣдн. роды 5 л. назадъ	въ 33 %
» » 20 » и болѣе т. н.	5,29%

Во III группѣ:

послѣдн. роды 5 л. тому назадъ . . .	въ 40%
» » 20 » и болѣе т. н.	23%

Во IV группѣ:

послѣдн. роды 5 л. тому назадъ . . .	въ 0%
» » 20 » и болѣе т. н.	25%

Итакъ, чѣмъ больше времени прошло отъ послѣднихъ родовъ, тѣмъ и больше величина выпаденія и наоборотъ.

Относительно *ранняго вставанія* послѣ родовъ возникли разногласія за послѣднее время. У насъ въ нѣкоторыхъ исторіяхъ болѣзни имѣются ясныя указанія, что слишкомъ раннее вставаніе послѣ родовъ на 1—2—3 день, съ немедленнымъ физическимъ трудомъ, при существующемъ разрывѣ промежности было причиной выпаденія. Къ сожалѣнію, въ нашихъ исторіяхъ болѣзни на этотъ весьма важный въ этиологическомъ отношеніи вопросъ не обращено должнаго вниманія.

Еще на гинекологическомъ конгрессѣ въ Берлинѣ въ 1899 г. заявленіе Küstner'a, что раннее вставаніе послѣ родовъ допустимо, получило рѣшительный отпоръ въ лицѣ Ohlshausen'a и другихъ.

На 80 собраніи нѣмецкихъ естествоиспытателей и врачей въ 1908 г. за раннее вставаніе послѣ родовъ высказались: Küstner, Kroenig и Opitz. Противъ ранняго вставанія былъ Hofmeier, такъ какъ по его мнѣнію оно затрудняетъ наблюденіе и пріеммотръ за больными. Fehling тоже былъ противъ ранняго вставанія, находя, что вставать и работать—это одно и то же.

Heimann, изъ клиники Küstner'a, приходитъ къ заключенію, на основаніи своихъ наблюденій, что раннее вставаніе при нормальномъ послѣродовомъ періодѣ позво-

лительно, но это привилегия тѣхъ больныхъ, которыя могутъ быть подъ контролемъ врача или акушерки. По его же наблюдѣніямъ, вслѣдъ за раннимъ вставаніемъ (на 2—3 день) съ тяжелымъ физическимъ трудомъ развивались болѣзни женской половой сферы.

Приписать щипцамъ или другимъ оперативнымъ вмѣшательствамъ выпаденіе мы не можемъ, такъ какъ они примѣнялись на нашемъ матеріалѣ (516 больныхъ) довольно рѣдко, всего въ 8%.

Нѣкоторые авторы указываютъ на щипцы, какъ на профилактической моментъ противъ выпаденій и разрыва: именно, благодаря имъ, головкѣ не даютъ долго давить на мышцы тазоваго дна—Phaunentstiel, Selheim, Феноменовъ¹⁰⁷⁾ и др. Gans¹⁰⁸⁾ приходитъ къ заключенію, что отдаленные результаты относительно щипцовъ не даютъ выпаденія матки и влагалища. Мандельбергъ⁷⁸⁾ же находитъ на большой собранной имъ въ литературѣ статистикѣ, что процентъ разрывовъ отъ наложенія щипцовъ рѣзко увеличивается.

При дальнѣйшемъ разборѣ причинъ выпаденія матки мы видимъ, что у 7-ми изъ нашихъ больныхъ развилось послѣдовательное выпаденіе частей послѣ Extirpatio¹⁾ и ut. (произведенной въ другихъ клиникахъ). У одной изъ нихъ Extirpatio была сдѣлана по поводу выпаденія матки, послѣ чего вскорѣ развилось рецидивъ (Enterocoele).

Также слѣдуетъ отмѣтить, что крупныя дѣти, частые, трудные, продолжительные и многочисленные роды бывали причиной развившагося выпаденія, такъ какъ причиняютъ тазовому дну болѣшія травмы, чѣмъ обыкновенно.

Изъ другихъ причинъ, вызывающихъ выпаденіе, слѣдуетъ отмѣтить: Spina bifida, которая въ свою очередь вызываетъ параличъ мышцъ тазоваго дна (встрѣчается у дѣтей). Bürger¹⁰⁹⁾ и др. описали такіе случаи выпаденія половыхъ частей у новорожденнаго ребенка. По мнѣнію Bürger¹⁰⁹⁾ повышенное внутрибрюшное давленіе, вслѣдствіе крика и потугъ, благоприятствовало происхожденію выпаденія.

Штромбергъ¹¹⁰⁾ описалъ случай полного выпаденія матки у 18-лѣтней, neroжавшей дѣвцы, одержимой кифозомъ. Въ такихъ случаяхъ выпаденіе можно объяснить врожденной слабостью тазоваго дна съ одной стороны и повышеннымъ внутрибрюшнымъ давленіемъ, вслѣдствіе уменьшенія пространства брюшной полости,—съ другой стороны.

У насъ отмѣчено неполное выпаденіе матки (№ 115, группа III) у 37-лѣтней больной съ кифозомъ черезъ 3 мѣсяца послѣ единственныхъ родовъ. Разрывъ у нея при родахъ не былъ зашитъ, вслѣдствіе обморочнаго будто бы ея состоянія.

По Schauta¹¹¹⁾ причиной выпаденія можетъ быть частый coitus у puellae publicae, также и мастурбація.

По Lehr'у¹¹²⁾ выпаденіе можетъ быть при исхуданіи, если жировая ткань, служащая тазовому дну опорой, исчезнетъ, напр. послѣ брюшнаго тифа.

Выпаденіе половыхъ органовъ можетъ также происходить отъ давленія опухолями сверху, или отъ влеченія опухолями матки изъ половой щели (механическая причина).

Наконецъ благоприятствующими моментами, при существованіи несостоятельнаго тазоваго дна, могутъ быть: слишкомъ малое наклоненіе таза, благодаря чему тазовые органы будутъ находиться подъ повышеннымъ давленіемъ органовъ брюшной полости, какъ на это указалъ впервые Rueter¹⁾ и также, какъ намъ кажется, болѣе большой уголъ между нисходящими вѣтвями лонной кости, нежели нормально, вслѣдствіе чего уменьшается сопротивляемость мышцъ тазоваго дна.

То обстоятельство, что при полныхъ разрывахъ почти нѣтъ выпаденій, зависитъ, какъ это мною изложено въ отдѣльномъ трудѣ: «о непосредственныхъ и отдаленныхъ результатахъ оперативнаго леченія полныхъ разрывовъ»¹¹³⁾, именно отъ того, что такія больныя не могутъ

¹⁾ Цит. по Schroeder'у; conf. ²⁾ литерат. указатели.

³⁾ Сборникъ трудовъ въ память 25-лѣтней ученой дѣятельности Д. О. Оттъ и Monatsschrift für Geburtshülfe & Gynäkolog. 1910.

напрягать своего брюшного пресса до обычного физиологического предѣла изъ за большого дефекта въ антагонистѣ его—тазовомъ днѣ и изъ за того, что у нихъ внутрибрюшное давление вообще всегда понижено. Недержаніе газовъ и жидкаго стула заставляетъ ихъ избѣгать сильнаго напряженія брюшного пресса. Наконецъ имъ нѣтъ надобности тужиться при дефекаціи изъ за отсутствія сфинктера.

Такимъ образомъ, при полныхъ разрывахъ понижена давящая сверху сила, именно та сила, которая при несостоятельномъ тазовомъ днѣ вызываетъ выпаденіе. Поэтому остатокъ тазового дна при полныхъ разрывахъ въ состояніи выдержать пониженное внутрибрюшное давление и удерживать органы малаго таза на нормальномъ мѣстѣ.

Изъ всѣхъ 55 полныхъ разрывовъ, которые наблюдались за нашъ отчетный періодъ, только 9 имѣли незначительное опущеніе передней стѣнки.

Разобравъ на нашемъ матеріалѣ подробно причины, вызывающія выпаденіе, постараемся дать картину постепеннаго его развитія. Еще во время беременности, въ особенности къ концу ея, измѣняются временно топографическія отношенія половыхъ органовъ. Во время родового акта роженица съ большимъ трудомъ и огромной физической силой проталкиваетъ плодъ черезъ родовые пути, причемъ нѣрѣдко получаютъ настолько большіе разрывы въ особенности тазовой диафрагмы и диафрагмы urogenitalis, которые въ томъ случаѣ, если не будутъ зашиты или если швы не срастутся, вслѣдствіе сильнаго разможенія тканей и проч., оставляютъ такіе дефекты, что можно сказать, что совершился патологическій, а не физиологическій актъ родовъ.

Въ послѣродовомъ періодѣ, послѣ такихъ большихъ травмъ, полученныхъ въ періодѣ изгнанія, присоединяется Subinvolutio (45%), лихорадка, плохое питаніе тканей и проч., такъ что обратное развитіе ad integrum половыхъ органовъ и тазового дна уже почти немисливо. Если при этомъ больная еще рано встанетъ, начнетъ

сейчасъ же тяжело работать, плохо питаться и при послѣдующихъ, черезъ малый промежутокъ, родахъ прибавятся опять неблагоприятныя осложненія (Subinvolutio, лихорадка и пр.), то въ результатѣ получится несостоятельное тазовое дно, со слабымъ и дряблымъ связочнымъ аппаратомъ матки и, слѣдовательно, всѣ благоприятныя условія для развитія выпаденія половыхъ органовъ, отъ чего и начинается.

При несостоятельномъ тазовомъ днѣ и плохомъ связочномъ аппаратѣ матки и влагалище лишаются своего нормальнаго положенія, смѣщаясь внизъ, за физиологическія границы, благодаря дѣйствію брюшного пресса, который теперь, при нарушеніи равновѣсія въ сторону тазового дна, беретъ верхъ надъ послѣднимъ, т. е. своимъ антагонистомъ.

Что тазовому дну дѣйствительно приходится выдержать все давление сверху, т. е. брюшного пресса, доказано изслѣдованіями Schatz'a ¹¹⁴⁾, Лаврентьева ¹¹⁵⁾ и др.

По экспериментальнымъ изслѣдованіямъ Лаврентьева равнодѣйствующая сила, дѣйствующая сверху внизъ на входъ таза, пересѣкаетъ послѣдній подъ угломъ 89° и направляется почти параллельно оси таза. Лавриновичъ ¹¹⁶⁾ съ другой стороны доказалъ экспериментально, что при извѣстныхъ положеніяхъ большой (à la vache) получается отрицательное внутрибрюшное давление и этимъ дополнилъ изслѣдованія Schatz'a и др.

Уклонившись въ сторону, вернемся снова къ первоначальному вопросу. Матка, лишенная опоры въ тазовомъ днѣ, почти всегда отклоняется назадъ, принимаетъ, благодаря внутрибрюшному давленію, чаще всего положеніе по оси таза, смѣщается внизъ, вслѣдствіе чего создаются въ полости малаго таза застоиныя явленія (благодаря переключиванію маточныхъ сосудовъ), увеличиваются вялость и дряблость маточныхъ связокъ, тканей, а также всѣхъ самой матки. Почти одновременно вялая передняя влагалищная стѣнка, не имѣя опоры въ промежности, поддается внутрибрюшному давленію и опускается. Такое состояніе опущенія передней стѣнки влагалища и матки можетъ тянуться иногда годами, пока не

приваляются еще новые травмы в тазовомъ днѣ отъ родовъ или дѣйствующая сверху сила почему либо не увеличится (тяжелая работа и проч.), послѣ чего опущение будетъ уже снова прогрессировать. Если смѣщеніе матки внизъ задерживается парапериметритическими тяжками, вслѣдствіе старыхъ воспалительныхъ процессовъ въ связкахъ, то тогда въ выпаденіи принимаетъ болѣе активное участіе влагалище, которое, благодаря внутрибрюшному давленію, влечетъ за собою шейку матки и вытягиваетъ ее въ длину. Такимъ образомъ получаются вторичныя выпаденія матки. Въ противномъ случаѣ, т. е. когда матка легко поддается внутрибрюшному давленію, вслѣдствіе отсутствія сращеній, мы имѣемъ дѣло съ первичнымъ выпаденіемъ матки.

Итакъ, на основаніи разобраннаго нами матеріала, приходимъ къ заключенію, что для развитія выпаденія матки требуется много причинъ, дѣйствующихъ сообща въ продолженіе долгихъ лѣтъ и что оно зависитъ главнымъ образомъ отъ нарушенія равновѣсія и удерживающихъ матку въ нормальномъ положеніи, т. е. отъ внутрибрюшного давленія и отъ тазоваго дна. Последнее можетъ сдѣлаться несостоятельнымъ и потерять свой тонусъ, или, главнымъ образомъ, отъ родовъ, или отъ другихъ причинъ, какъ то: отъ Spinae bifidae, мастурбации, врожденнаго инфантилизма половыхъ органовъ и пр.

Кромѣ того, благоприятствуютъ выпаденію: большое число родовъ, частые роды, иногда продолжительные и трудные, съ крупными дѣтьми, послеродовыя заботы, всѣмъ плохимъ обратнымъ развитіемъ и увеличеніемъ веса матки, съ расслабленіемъ связокъ и тканей, раннее вставаніе, физическій трудъ, возрастъ за 40 лѣтъ, климактерическій періодъ, повышенное внутрибрюшное давленіе, вслѣдствіе уменьшенія объема брюшной полости (Kurphosis), истощеніе послѣ тяжелыхъ болѣзней (тифъ), опухоли, давящія на матку сверху, или опухоли, влекущія матку внизъ, вслѣдствіе ихъ тяжести и также врожденная слабость тазоваго дна.

Наконецъ благоприятствующими моментами являются еще слишкомъ малое наклоненіе таза и слишкомъ широкой уголъ между несходящими вѣтвями лонныхъ костей.

Заканчивая разборъ причинъ выпаденія матки, мы подчеркиваемъ, что изъ всѣхъ выше перечисленныхъ причинъ считаемъ самой существенной—несостоятельность тазоваго дна.

Въ продолженіи нашего изслѣдованія мы имѣемъ случай описать еще одну форму выпаденія матки, а именно: выпаденіе матки съ опущеніемъ шейки и стѣнокъ влагалища, т. е. выпаденіе матки съ опущеніемъ влагалища. Это выпаденіе матки съ опущеніемъ влагалища встречается въ жизни очень рѣдко и почти исключительно у женщинъ, страдающихъ врожденнымъ инфантилизмомъ половыхъ органовъ. Оно характеризуется тѣмъ, что матка и влагалище выпадаютъ одновременно и въ томъ же направленіи, т. е. внизъ. При этомъ матка и влагалище выпадаютъ въ тазовое дно, т. е. въ тазовую полость, а не въ влагалище, какъ это бываетъ при выпаденіи матки безъ опущенія влагалища. Это выпаденіе матки съ опущеніемъ влагалища встречается въ жизни очень рѣдко и почти исключительно у женщинъ, страдающихъ врожденнымъ инфантилизмомъ половыхъ органовъ. Оно характеризуется тѣмъ, что матка и влагалище выпадаютъ одновременно и въ томъ же направленіи, т. е. внизъ. При этомъ матка и влагалище выпадаютъ въ тазовое дно, т. е. въ тазовую полость, а не въ влагалище, какъ это бываетъ при выпаденіи матки безъ опущенія влагалища.

Диагнозъ и прогнозъ.

Диагнозъ выпаденія матки не представляетъ трудности, но для точнаго опредѣленія фазиса его требуется подробное изслѣдованіе, какъ, напр., опредѣленіе глубины сводовъ и отношеніе ихъ къ шейкѣ, измѣреніе длины матки зондомъ, опредѣленіе отношеній пузыря къ маткѣ мужскимъ катетеромъ и отношеніе прямой кишки къ выпаденію задней стѣнки влагалища.

Необходимо также установить размѣры и границы выпавшихъ частей по отношенію ко входу влагалища и дать имъ соответствующую номенклатуру. Наконецъ слѣдуетъ выяснитъ, что смѣшалось первично: влагалище или матка и съ какимъ выпаденіемъ матки мы имѣемъ дѣло: съ первичнымъ или вторичнымъ?

Принятая въ нашей клиникѣ номенклатура выпаденій отвѣчаетъ анатомическимъ даннымъ:

опущеніе (descensus uteri), когда шейка лежитъ ниже нормальной границы, т. е. ниже *Plani interspinozi* по *Waldeyer'у*;

неполное выпаденіе (prolapsus incompletus s. partial. ut.), когда шейка показывается въ половой щели, или выходитъ изъ нея и

полное выпаденіе (prolapsus ut. completus s. totalis), когда вся матка дѣликомъ лежитъ внѣ половой щели.

Такой же терминологіи, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ придерживаться и въ отношеніи выпаденія влагалища:

опущеніе влагалища (descensus vaginae), когда влагалищныя стѣнки видны во входѣ влагалища между наруж-

ными половыми частями въ видѣ буквы *H*, но не заходить далѣе входа; *неполное выпаденіе влагалища* (prol. vag. incompl.) часто + *Cystocele*, рѣдко + *Rectocele*, когда выпавшія стѣнки лежатъ только частью внѣ влагалищнаго входа, причѣмъ сохранились еще влагалищныя своды и *опущеніе* *полное выпаденіе влагалища* (prol. vag. complet. + *Cystocele* всегда, иногда + *Rectocele*), когда все влагалище выворочено и лежитъ extra rimam.

Конечно, при этомъ бываетъ, что обѣ влагалищныя стѣнки не выпадаютъ въ одинаковой степени, такъ, напр., передняя стѣнка можетъ быть полностью выворочена, между тѣмъ какъ задняя выпала только частью или же только слегка опустилась. Въ послѣднемъ случаѣ мы констатируемъ, что, задній влагалищный сводъ можетъ находиться на нормальномъ мѣстѣ, а передняго свода совершенно нѣтъ, онъ весь сплывъ.

Rectocele необходимо діагностировать изслѣдованіемъ пальцемъ черезъ прямую кишку, или вдуваніемъ воздуха въ прямую кишку. При большихъ выпаденіяхъ въ грыжевой мѣшокъ опускаются иногда кишечныя петли (*Enterocele*), какъ напр., въ нашихъ 2 случаяхъ (№ 17—III гр. и № 20—III гр.) и въ случаѣ, описанномъ *О. Прокофьевой*¹¹⁷⁾ и др.

При рецидивахъ послѣ операціи необходимо придерживаться только что приведенной терминологіи и строго разграничить рецидивы влагалищныя (опущеніе, неполное и полное выпаденія) отъ маточныхъ (опущеній, неполныхъ и полныхъ выпаденій).

Что касается прогноза при выпаденіи матки *quo ad vitam*, то онъ сравнительно хорошъ, развѣ только разившійся гнойный катарръ пузыря, въ видѣ осложненія, можетъ вызвать восходящій нефритъ и послѣдующую урэмію со смертнымъ исходомъ. Описаны также случаи, когда острое ущемленіе выпавшей матки вызывало смерть.

Относительно же *quo ad valetudinem*, нужно отмѣтить, что часто выпавшая, отекая, или принимающая кожистый характеръ и ороговѣвшія части мѣшаютъ

ходьбѣ, язвы на нихъ, осложненія съ пузырьемъ и прочи отравляютъ жизнь такимъ больнымъ. Другія же связываются со своимъ состояніемъ и чувствуютъ себя сравнительно сносно.

Яркимъ примѣромъ того, какъ велико желаніе у нѣкоторыхъ больныхъ избавиться отъ своего недуга, служить наша больная (№ 70—III гр.) съ неполнымъ выпаденіемъ матки, пришедшая нѣшкомъ изъ Саратова, несмотря на свои 70 лѣтъ въ намъ въ клинику на операцию.

Необходимо еще указать на крайне рѣдкое осложненіе рака на выпавшей маткѣ. Подобные рѣдкіе случаи описаны Кѣтлинскимъ⁽¹¹⁸⁾ и др.

Симптомы. Въ нашей I группѣ (разрывъ промежности) субъективные симптомы заключались, главнымъ образомъ, въ болевыхъ ощущеніяхъ: внизу живота, въ поясницѣ, въ пахахъ, иногда боли въ промежности и sub coito по причинѣ воспалительныхъ процессовъ въ половой сферѣ и неправильнаго положенія матки (Retroversio 76%). Затѣмъ наблюдались бѣли (43%), чувство напирания внизъ и опущенія (31%), меноррагія (25%) и болѣзненное мочеиспусканіе (16%).

Симптомы.

Въ нашей II группѣ (выпаденіе влагалища) болевые ощущенія и тяжесть внизу живота также преобладаютъ. Кроме того, нѣкоторые жаловались на боли при дефекаціи и на боли въ копчикѣ. Бѣли замѣчались въ 42%, меноррагія—20%, разстройство мочеиспусканія—26%, запоръ—7%. Кольца носили въ 7%. Ощущается еще гемморой, зудъ наружныхъ половыхъ частей и онѣмѣніе въ ногахъ.

Въ нашей III группѣ (неполное выпаденіе матки) изъ субъективныхъ симптомовъ на первый планъ выступаютъ затрудненное мочеиспусканіе, причѣмъ нѣрѣдко для совершения этого акта больныя должны себя вправлять выпавшей части, также запоры, бѣли и недержаніе мочи. Кольца носили въ 13%. Одно кольцо было удалено кусками. Болевые ощущенія отступаютъ на второй планъ. Въ этой же группѣ больныя частью были слабо упитанными, малокровными и нервными, хотя и упитанныя не составляли исключения.

При полном выпадении матки (IV группа) всё те же симптомы выступают еще рѣзче (затрудненное мочеиспускание и проч.), чѣмъ въ предыдущей группѣ.

Всѣ больныя замѣчали, что къ концу дня выпадение увеличивалось, вслѣдствіе ходьбы, стоянія, работы и уменьшалось за ночь, даже исчезало совершенно: прохвально, или при помощи вправленія. Но съ утра, при ходьбѣ и работѣ, оно принимало вскорѣ опять прежніе размѣры.

Всѣ эти страданія переносились больными терпѣливо десятки лѣтъ, такъ какъ болѣзнь развивалась исподволь и больныя успѣвали свыкнуться и примириться съ нею.

При остромъ же выпаденіи появлялись рѣзкія боли и наступала даже потеря сознания.

Временное улучшение выпаденія замѣчалось при наступленіи беременности, начиная со 2-й половины ея.

Что касается того, какія изъ влагалищныхъ стѣнокъ чаще выпадали, то, по объективнымъ даннымъ, въ нашей II группѣ чаще всего встрѣчалось совмѣстное выпадение передней и задней стѣнокъ влагалища (63%), причѣмъ 10 разъ была Cystocele (4,5%), 7 разъ Rectocele (3%) и 2 раза Cystocele+Rectocele (0,9%).

Отдѣльно во II группѣ передняя стѣнка выпала въ 29%, причѣмъ 12 разъ была Cystocele (5%).

Задняя стѣнка выпала въ нашей II группѣ отдѣльно въ 8% (17 разъ), причѣмъ 4 раза была Rectocele.

Такимъ образомъ во II группѣ, въ общемъ, передняя стѣнка участвовала въ выпаденіи въ 92%, задняя — въ 71%.

Наша III группа (неполное выпаденіе матки) дала въ 70% выпаденіе передней и задней стѣнокъ, причѣмъ въ 1/2 случаевъ была Cystocele и въ 1/2 случаевъ—Cystocele+Rectocele.

Отдѣльно передняя стѣнка выпадала въ 30%, причѣмъ, болѣею частью, имѣлась Cystocele.

Такимъ образомъ въ III группѣ, передняя стѣнка приняла участие въ выпаденіи въ 100%, а задняя въ 70%.

Въ нашей же IV группѣ (полное выпаденіе матки) во всѣхъ 4-хъ случаяхъ былъ полный выворотъ влагалища, какъ передней, такъ и задней стѣнокъ ея.

Что касается длины матки, то въ I и IV группахъ она была нормальна, во II группѣ—въ 12% и въ III группѣ въ 75% увеличена. Это удлинненіе матки происходитъ всегда, главнымъ образомъ, насчетъ шейки ея.

Въ нашей клиникѣ всегда старались точно опредѣлить, какая именно часть шейки принимала участие въ удлинненіи. При этомъ руководствовались извѣстнымъ дѣленіемъ шейки на 3 части по Schroeder'у.

Относительно удлинненія отдѣльныхъ частей шейки найдено слѣдующее (III группа):

Elongatio colli supravaginalis и partis intermediae встрѣчалось въ 68%, Elongatio colli part. intermed. въ 30%; Elongatio part. vaginalis+part. intermed. наблюдалось всего 3 раза=2%.

Такимъ образомъ межтучная часть шейки участвовала въ удлинненіи въ 100%.

Изъ 73-хъ измѣренныхъ и занесенныхъ въ исторію болѣзни матокъ въ III группѣ оказались: въ 13% нормальной величины (8 см.); въ 45% отъ 8 1/2 см. до 12 см.; въ 42% отъ 12 см. до 15 см.

Во II группѣ оказалось: 18 матокъ длиннѣе нормы; изъ нихъ 15—до 10 1/2 см., а 3—отъ 11—13 см. длины.

По нашему мнѣнію, часть этихъ 18 случаевъ должна быть отнесена къ слѣдующей III-й группѣ, т. е. къ неполнымъ выпаденіямъ матки. Но въ нашихъ исторіяхъ болѣзни они были занесены подъ диагнозомъ Prolapsus vagin., можетъ быть потому, что, какъ это часто бываетъ, матка сократилась и ушла вверхъ, т. е. скрылась изъ входа влагалища подъ влияніемъ 1—2-хъ-дневнаго покоя

БИБЛИОТЕКА
1901. 24. 10. Мемор. 10000

больных, которым онъ пользовались въ клиникѣ до составления исторіи болѣзни.

Сопоставляя выпаденіе влагалитичныхъ стѣнокъ и удлиненіе отдѣльныхъ частей маточной шейки въ нашей III группѣ, мы видимъ, что въ первомъ случаѣ въ большихъ размѣрахъ и чаще выпадаетъ передняя стѣнка (100%), чѣмъ задняя (70%), а во второмъ — чаще встрѣчается Elongatio p. intermed. (100%), чѣмъ p. Supravag. (68%). Принимая во вниманіе, что Elongatio part. intermed. colli происходитъ вслѣдствіе давленія сверху на передній Дугласъ и влеченія шейки внизъ передней влагалитичной стѣнкой, а Elongatio supravaginal. colli происходитъ отъ совмѣстнаго давленія сверху на передній и задній Дугласъ и влеченія шейки внизъ передней и задней стѣнками, мы приходимъ къ заключенію, что частота удлиненія упомянутыхъ частей шейки зависитъ отъ частоты выпаденія влагалитичныхъ стѣнокъ (передней или задней), что и на самомъ дѣлѣ подтверждается нашими клиническими наблюденіями.

На нашемъ матеріалѣ III-й группы мы видѣли, что чаще всего выпадала передняя стѣнка, а потому и слѣдовало ожидать, что часть шейки, лежащая выше прикрѣпленія передней стѣнки влагалити, т. е. pars intermed., будетъ больше удлиняться и, наоборотъ, часть шейки, лежащая выше прикрѣпленія задней стѣнки (pars supravag.) — меньше, какъ въ дѣйствительности и показали наши наблюденія: именно, въ 100% Elongat. c. part. intermd. и въ 68% — Elongatio c. part. supravagin.

Изолированное выпаденіе задней стѣнки наблюдалось только во II группѣ въ 8% (17 разъ на 219). Это явленіе нужно приписать особенно вялому и податливому состоянию задняго Дугласа. Кроме того, оно сопряжено иногда съ совмѣстнымъ выпаденіемъ прямой кишки. Такія изолированныя выпаденія задней стѣнки не встрѣчаются въ болѣе тяжелыхъ формахъ выпаденія матки (напр. въ III и IV групп.), а потому нужно ихъ считать переходящей стадіей выпаденія.

Изъ дальнѣйшихъ объективныхъ данныхъ отмѣчаемъ слѣдующія:

<i>Во I группѣ:</i>	
Endometrit. catharal.	43%
Endometrit. haemorrhag.	10%
Metrit. chron. corp. et colli	13%
Ectropion	10%
Erosiones	4%
Retroversio-flexio	75%
Anteversio-flexio	25%
Residua pp. metrit.	34%
Oophoritis et salpyngit.	10%
Fibromyoma	1 разъ
Пластика до операціи (у нѣкоторыхъ по нѣсколько разъ)	3%
Hernia umbilical.	2%
Cystis gland. Bartolin.	1 разъ
Diastasis lin. albae	2%
<i>Во II группѣ:</i>	
Endometrit. chron.	44%
Metrit. chron. corp. et colli	20%
Residua p. perimetrit.	40%
Retroversio-flexio	70%
Anteversio-flexio	30%
Salpyngo-oophoritis	4%
Ectropion	12%
Erosiones	4%
Ulcerai colli	1%
Colpitis	2%
Hernia umbil. et inguinal.	3%
Diastasis lin. albae et Enteroptosis	4%
Fibromyoma	2 раза
Polypus muc. uteri	2 раза
Bartolinitis	3 раза

Atrophia uteri	2 раза.
Decubitus ex Pessario	1 разъ.
Haemorrhoides	1%
Obstipatio	7%
Пластика до операціи	7%
(у нѣкоторыхъ по нѣсколько разъ и у нѣкоторыхъ еще—Amput. colli).	
Extirpatio ut. до операціи	7 разъ.
(изъ нихъ 1×—въслѣдствіе рака, 5×—въслѣдствіе фибромомы, 1×—въслѣдствіе выпаденія. Эти операціи были сдѣланы до нашей отъ 1/2 года до 10 лѣтъ тому назадъ).	
Laparotomia до операціи	2 раза.
Colpomotia до операціи	1 разъ.

Въ III группѣ:

Endometrit. chron.	27%
Metrit. chron.	3%
Ulcera colli et vaginae	26%
Разстройство при мочеиспуск.	28%
Ectropion	6%
Retroversio-flexio	90%
Anteversio-flexio	10%
Hernia	6%
(H. Umbilical.—2 раза; H. femoralis—1 разъ; H. inguinalis—2 раза; H. lin. albae—2 раза; Enterocoele—2 раза).	
Cystis ovarii	1 разъ.
Cystis parietis vaginal.	1 »
Haemorrhoides	1 »
Bartolinit.	2 раза.
Atrophia ut.	2 »
Obstipatio	23%
Пластика до операціи была сдѣлана въ	8%
(у нѣкоторыхъ по нѣсколько разъ,	

причемъ съ пластикой была сдѣлана и ампутація шейки).

Удаленіе кисты до операціи 1 разъ.

Въ IV группѣ:

У всѣхъ была Ulcera colli et vaginae. Длина матки у 3-хъ нормальная, у одной—8/2 см.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что больныя, одержимыя выпаденіемъ влагалища и матки, страдали еще цѣлымъ рядомъ воспалительныхъ и проч. заболѣваний въ половой сферѣ. Громадный % наклоненій матки назадъ, отъ 70 до 90%, встрѣчающейся у нашихъ больныхъ, легко объясняется раньше сказаннымъ относительно положенія матки при несостоятельномъ тазовомъ днѣ и при разслабленномъ тонусѣ связочнаго аппарата. Retroversio—flexio ut. оказалась въ большинствѣ случаевъ подвижными. Что же касается значительнаго числа отгибныхъ Resid. p. p. metr., то онѣ относятся, главн. обр., къ старымъ воспалительнымъ процессамъ въ широкихъ и крестцово-маточныхъ связкахъ. На всѣ эти многочисленные заболѣванія при выпаденіи матки и влагалища мы смотримъ какъ на второстепенныя явленія и наша первая задача направлена къ устраненію причины выпаденія—несостоятельнаго тазового дна.

Профилактика и лечение съ сравнительной оцѣнкой различныхъ оперативныхъ методовъ.

Раньше, чѣмъ говорить о лечении выпаденія, нужно упомянуть о мѣрахъ профилактики этого заболѣванія. Профилактика выпаденія заключается въ устраненіи тѣхъ вредныхъ вліяній, о которыхъ мы подробно уже говорили при разборѣ этиологии: разрывъ промежности, послѣродовыя заболѣванія, раннее вставаніе и тяжелая работа и пр. Одной изъ самыхъ дѣйствительныхъ профилактическихъ мѣръ при угрожающемъ разрывѣ промежности при родахъ слѣдуетъ считать перинеотомию, которую рекомендуютъ: Оттъ ¹¹⁹⁾, Winkel, Küstner ¹²⁰⁾ и др. и также разрывъ по Schuardy.

Кромѣ того, необходимо организовать надлежащую акушерскую помощь повсемѣстно, не только въ городахъ, но и въ деревняхъ и селахъ, причемъ вмѣнять въ обязанность зашивать случающіеся при родахъ разрывы промежности. Если зашивание невыполнимо сейчасъ, въ дѣствіе отсутствія врача, то это должно быть сдѣлано въ ближайшіе дни послѣ родовъ. Изъ диссертациі Чернова ¹²¹⁾ (изъ клиники Лебедева), изъ работъ Холмогорова ¹²²⁾, Массена ¹²³⁾, Бошпгедта ¹²⁴⁾, Вастана ¹²⁵⁾ и др. мы видимъ, что позднее зашивание свѣжыхъ разрывовъ промежности послѣ 2-го дня и позже даетъ прекрасные результаты.

Для той же цѣли профилактики желательное воспитать здоровое поколѣніе съ хорошимъ тѣлосложеніемъ и хорошо развитой мускулатурой, улучшить гигиеническія условия, преподавать въ школахъ гимнастику и пр.

Наконецъ, ради профилактическихъ же цѣлей необходимо при первыхъ признакахъ опущенія влагалищныхъ

стѣнокъ приступить къ восстановленію тазового дна и не ждать, пока выпаденіе со всѣми его послѣдствіями (атрофія тканей, язвы на выпавшихъ частяхъ и проч.) увеличится.

Всѣ другія мѣры, употребляемыя въ начальныхъ степеняхъ выпаденія, какъ то: кольца, гинекологической массажъ, укрѣпленіе тонуса тканей вяжущими спринцованіями и проч.,—почти никогда не приносятъ пользы больнымъ и требуютъ отъ нихъ траты много времени, средствъ, а также большого терпѣнія.

Переходя теперь собственно къ леченію, мы припомнимъ, что главной поддержкой для правильного положенія органовъ малого таза (матки, влагалища и пр.) служить тазовое дно и что несостоятельность его является причиной выпаденія, почему, слѣдовательно, въ дѣлѣ леченія выпаденія все вниманіе должно быть обращено на восстановленіе его тонуса оперативнымъ путемъ. Относительно связочнаго аппарата мы также пришли къ заключенію, что онъ не въ состояніи удержать на долго матку отъ смѣщенія ея внизъ за физиологическую границу и что ему принадлежитъ, главнымъ образомъ, роль придать маткѣ извѣстную устойчивость и положеніе по отношенію къ оси таза. При нарушеніи гармоніи дѣйствія брюшного пресса и тазового дна матки, въ большинствѣ случаевъ, векорѣ теряетъ свою устойчивость, т. е. ея связочный аппаратъ дѣлается несостоятельнымъ, и она принимаетъ неправильное положеніе (Retroversio-flexio). Если по Winckel'ю ¹²⁶⁾, Retroversio наблюдается въ 90% у рожавшихъ и только 10% падаютъ на стерильныхъ замужнихъ и Virgines и по Ziegenspeck'у ¹²⁷⁾ отъ 65%—78,5% у многорожавшихъ и отъ 21%—35% у Virgines и Nulliparae, изъ которыхъ многія страдали врожденной Retroversio'ей,—то мы вправѣ приписать это запрокидываніе матки назадъ, въ большинствѣ случаевъ, нарушенію равновѣсія упомянутыхъ двухъ силъ, а именно слѣдствію поврежденія тазового дна и связочнаго аппарата при родахъ.

Еще поэтому, что, восстановивъ нарушенное равновѣсіе, т. е. тазовое дно, мы создаемъ снова физиологию

ческие условия для нормального положения тазовых органов, причем связочному аппарату дается возможность окрепнуть и снова приобрести эластичность и прежний тонус. И, действительно, бывшая до восстановления тазового дна Retroversio mobilis, после восстановления, как мы имгли возможность неоднократно в этом убедиться на нашем материале, нередко снова произвольно принимает положение Anteversio.

В тех случаях, где Retroversio и после восстановления тазового дна остается, но не дает болезненных симптомов, там нет надобности исправлять ее.

При болезненных же симптомах от Retroversio mobilis консервативное лечение, как-то: гинекологический массаж, колбно-локтевое положение и пр. оказывает подчас хорошия услуги, так как укрепляют тонус связочного аппарата. Также временно вложенное кольцо нередко оказывает пользу в смысле удержания матки в положении Anteversio.

Поэтому нет надобности при выпадениях исправлять неправильное положение матки особыми еще операциями, создающими новое, еще более неестественное и неправильное положение ее. Так напр. при Ventrofixatiоn матка искусственно поднимается в брюшную полость; при Vaginofixatiоn хотя матка остается в нормальном положении, но она вмѣстѣ съ тѣмъ теряет присущую ей подвижность, вследствие рубцового сращения на мѣстѣ прикрепления. Если же фиксирующую матку рубецъ растянется, то теряется весь эффектъ операции.

То же самое нужно сказать относительно позже предложенной операции (Schauta¹⁾)—Wertheim'a.

Въ клиникахъ Отта никогда не исправлялись оперативнымъ путемъ при выпаденіи матки неправильныя ея

¹⁾ Schauta самъ за самое послѣднее время (Monatsschrift für Geburt. u. Gynaek. 1912) въ своей статьѣ: Die Behandlung der Geburt nach operativer Antefixation, не особенно восторгается фиксирующими методами и совѣтуетъ не фиксацию матки, а фиксацию круглой связки по Doleris.

положения. Восстановление тазового дна всегда давало удовлетворительные въ этомъ отношеніи результаты.

Приверженцевъ консервативнаго леченія Retroversio много. Еще недавно Mayer¹²³⁾, Hermann¹²⁴⁾, Sellheim¹²⁵⁾ и др., на основаніи клиническаго матеріала, совѣтовали при Retroversio и лечить симптомы, присоединяя, въ случаѣ надобности, при выпаденіи влагалища и разрывѣ промежности Colporrhinaeorrhaphiоn. Нерокавшихъ Mayer лечилъ симпоматически, безъ Colporrhinaeorrhaphiоn и безъ колець. Результаты получались при такомъ консервативномъ леченіи хорошия.

Также противъ чрезмѣрнаго оперативнаго вмѣшательства при исправленіи Retroversio'и высказались: Pozzi, Рейвъ¹²⁶⁾, Bossi и др.

Въ клиникахъ Отта уже въ продолженіе почти 25 лѣтъ прилбняется при всѣхъ степеняхъ выпаденія влагалища и матки, какъ основная операція, восстановление тазового дна (Colporrhinaeorrhaphia normalis).

Восстановление тазового дна производится въ клиникѣ проф. Отта слѣдующимъ образомъ:

Во влагалищѣ фигура освѣженія имѣетъ форму треугольника, обращеннаго вершиной къверху. При переходѣ на кожу разръзъ ведется на $\frac{1}{2}$ см.— $1\frac{1}{2}$ см. ниже отверстія выводнаго протока Бартолиновыхъ железъ, затѣмъ, закругляясь къверху, соединяется съ разръзомъ на промежности, идущимъ на границѣ входа во влагалище.

Въ случаяхъ, гдѣ кожа промежности и слизистая оболочка влагалища сохранились (подкожный разрывъ), разсѣкаютъ ихъ, чтобы дойти до сохранившихся еще мышечныхъ волоконъ. Такимъ образомъ, мы получаемъ двустороннюю, симметричную, достаточно глубоко окровавленную фигуру освѣженія, при шиваніи которой происходитъ значительное суженіе влагалища, съ образованіемъ новаго солиднаго и мощнаго тѣла промежности

¹⁾ На V международномъ акушерско-гинекологическомъ конгрессѣ.

²⁾ Протоколы засѣданій акуш.-гинекологич. Общества. Журн. акуш. и женск. бол. 1910 г.

(corpus perinaei) et septum recto-vaginales. При накладывании швов обычно попадают фасции, соединительная ткань и мышцы, в томъ числѣ и волокна Levator'a ani, притяженіемъ ихъ съ боковъ погружными швами по направлению къ серединѣ. Чѣмъ больше мышечныхъ волоконъ мы будемъ въ состояніи соединить по средней линіи и чѣмъ больше мышечныхъ элементовъ вообще окажется въ возстановленномъ тазовомъ днѣ и промежности, — тѣмъ выгоднѣе это будетъ для успѣха въ смыслѣ отдаленныхъ результатовъ.

Въ виду той роли, какую играютъ въ тазовомъ днѣ мышцы и фасции, былъ предложенъ специальный шовъ на Levator ani (Myorrhaphia m. Levat. ani) при несостоятельности тазового дна Ziegenspeck'омъ¹²⁹⁾, Heidenhain'омъ¹³⁰⁾, Halban'омъ и Tandler'омъ¹³¹⁾ и др. Мною¹³²⁾ было предложено зашивание Levator'a. part. anter. въ области Insertionis pubicae (Докладъ XI-ому Пироговскому Съезду). Губаревъ¹³³⁾ предложилъ зашивание фасции надъ Levat. ani.

Способъ отыскивания Levat. ani во время операціи, по способу Halban'a и Tandler'a и др., напоминаетъ лоскутный способъ, предложенный Simpson'омъ, Lawson Tait'омъ и Saenger'омъ. Какъ въ этомъ послѣднемъ способѣ, такъ и при Myorrhaphi'i Levat. ani, прокладываютъ путь между передней стѣнкой прямой кишки и задней стѣнкой влагалища. Хотя способъ Lawson Tait'a¹⁾ въ настоящее время рѣдко применяется и по справедливости оставленъ многими гинекологами, въ виду его анти-томографическихъ свойствъ, но намъ кажется, что удачныя возстановленія тазового дна по способу Lawson Tait'a нужно именно приписать тому обстоятельству, что при немъ въ шовъ попадаютъ волокна Levat. ani.

Для воссозданія мышечнаго тазового дна, когда Levat. ani сильно атрофированъ, предложена Latzko¹³⁴⁾

1) Не останавливаясь на описаніи способа, я указываю на специальныхъ учебникахъ по гинекологіи, гдѣ онъ наглядно изображенъ на рисункахъ.

и Halban'омъ и Tandler'омъ¹³⁵⁾ (новая операція Myoplastica Levat. ani et Glutei max. пока применялась только въ единичныхъ случаяхъ).

Что касается специального шва Levat. ani, то онъ, какъ намъ кажется, не имѣетъ особыхъ преимуществъ, въ виду слѣдующихъ соображеній: вслѣдствіе разрывовъ и растяженія Levator ani, при несостоятельности тазового дна, въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ атрофированъ и отыскать его отдѣльно представляется дѣломъ не легкимъ и нерѣдко даже бесполезнымъ, такъ какъ наложенныя на него лигатуры, вслѣдствіе его слабости, должны прорываться, почему и теряется весь эффектъ самой идеи операціи.

Поэтому надежнее и проще, применяя широкую Colporrhaphi'e, захватывать Levat. ani въ шовъ черезъ влагалище, вмѣстѣ съ фасціей и соединительной тканью, притягивая его съ боковъ къ серединѣ и служивая такимъ образомъ Hiatus genitalis.

Colporrhaphi'e, применяемая въ нашей клиникѣ, была впервые предложена у насъ еще здравствующимъ Hegar'омъ (Способъ Martin'a¹⁾, Fritsch'a²⁾, Küstner'a³⁾, Отта¹²⁶⁾ и др. представляетъ незначительную модификацію, въ смыслѣ величины и гаурины фигуры освѣженія (Оттъ, Hegar'овской пластики).

Если эти способы имѣютъ право гражданства въ соответствующихъ случаяхъ, то другіе, какъ Lefort-Neugebauer'a⁴⁾ (Colporrhaphia mediana), Fricke's⁵⁾ (Epiorrhaphia) и др., создающіе анатомическія препятствія для выпаденія, — отжили свой вѣкъ.

Большое значение имѣетъ для успѣха операціи матеріалъ для швовъ и способъ ихъ наложенія. Шелкъ въ разныхъ нумерахъ отвѣчаетъ всѣмъ требованіямъ пластичности и современной антисептики. Швы мы всегда накладываемъ узловатые, въ особенности при погружныхъ, при

1) На по робомъ описаніи этихъ методовъ я не останавливаюсь, такъ какъ они прекрасно изложены въ учебникахъ по гинекологіи.

посредствъ которыхъ хорошо прилаживаются соответствующіе отдѣлы, устраняются мертвые пространства и ткани остаются продолжительное время въ соприкосновеніи, вслѣдствіе трудной рассасываемости шелковой нитки, что именно весьма желательнo (Оттъ)¹⁷⁾. Погруженные швы накладываются по мѣрѣ надобности въ 2 или 3 яруса.

Операция производилась у насъ всегда подъ хлороформнымъ наркозомъ и только при противопоказаніи къ нему примѣнялся или эфиръ (всего 28 разъ), причемъ въ половинѣ случаевъ начаты хлороформный наркозъ былъ законченъ эфирнымъ, въ виду слабости сердца у больныхъ, — или подъ кокаиномъ (методъ Schleich'a) — 13 разъ, или наконецъ операция производилась безъ мѣстной анестезіи и безъ общаго наркоза (4 раза), при крайней слабости больныхъ и 1 разъ вслѣдствіе выраженаго самой больной желанія оперироваться такимъ путемъ.

Послѣоперационный уходъ за швами долженъ быть по возможности бережнымъ. Больныя должны лежать на спинѣ со связанными полотенцемъ выше колъѣвъ погами. На швы кладется стерильный перевязочный матеріалъ, который по мѣрѣ надобности мѣняется. Швы съ промежности снимаются рано, на 4—5 день и, большую часть, въ 2 приема.

Обыкновенно въ первые 4 дня у больныхъ нѣтъ произвольнаго стула. Наканунѣ, передъ снятіемъ швовъ, дается слабительное, а на слѣдующее утро ставятъ маленькую глицериновую клизму (30,0 глиц. + 70,0 воды). Влажные швы снимаются на 7—8 день.

Къ основной операциі (Colpoproterinaeorrhaphia) присоединяются слѣдующія вспомогательныя: 1) Colporrhaphia anterior¹⁾ въ тѣхъ случаяхъ, когда оказывается нужнымъ удалить излишекъ чрезмѣрно измѣнившейся, гипертро-

¹⁾ Не останавливаясь на описаніи Colporrhaphi'a anterior' и Amputati' colli alta, такъ какъ они производятся обычнымъ способомъ и описаніе ихъ можно найти въ любомъ специальномъ учебникѣ.

фированной и мало способной на обратное развитіе слизистой оболочки передней влагалищной стѣнки;

2) Amputatio e. supravaginalis alta, съ пересадкой сводовъ, когда необходимо укоротить чрезмѣрно удлиненную шейку. При этой операциі путемъ образования, при помощи радиусообразныхъ швовъ новаго наружнаго маточнаго зѣва, достигается уменьшеніе объема растянутыхъ сводовъ.

При метритной маткѣ дѣлаютъ клиновидную экзещію шейки по Schroeder'у, которая благоприятно вліяетъ на излеченіе метрита. Швы на шейку накладываются также шелковые, радиусообразно подъ все ложе раны, по 3—4 на каждой губѣ, затѣмъ поверхностные и наконецъ на углы раны.

Снятіе швовъ съ шейки происходитъ на 9—12 день. Наши 516 больныхъ подверглись слѣдующимъ операциямъ:

Въ I группѣ:

Colpoproterinaeorrhaphi'a	83	больныхъ.
Colpoproterin. - recto - rrahaphi'a	46	»
Colpoproterin. - rrahaph. + Exci-		
si'a e.	21	»
<hr/>		
Всего	150	больныхъ.

Кромѣ того, были произведены еще слѣдующія операци:

Abrasio cav. ut.	86	больнымъ.
Herniotomia	2	»
Fistulo-rrhaphia	2	»
Cystectomy gl. Bartolin.	1	больной.
<hr/>		
Всего	91	больной.

Осложненія при операцияхъ: I × Perforatio ut. и I × вскрыты случайно задній сводъ.

Во II группу подверглись:

Colperinaeorrhaphii	123	больныхъ.
Colperin.-rrh. + Colporrh. ant.	36	»
Colperinaeo-recto-rrhaphii. Colperin.-rrh. + Excisi'i colli.	9	»
Colperin.-rrh. + Amput. altae	33	»
Colperin.-rrh. + Colporrh. ant. + Amp. altae	17	»
	1	больная.
<hr/>		
Всего	219	больныхъ.

Кромѣ того, были сдѣланы еще слѣдующія операции:

Abrasio cav. ut.	109	больнымъ.
Discisio cicatric. parametr.	4	»
Abbreviatio lig. rotund. (по Wertheim,y).	1	больной.
<hr/>		
Всего	114	больнымъ.

Осложненіе при операци:

Perforatio parietis uteri	1	разъ.
-------------------------------------	---	-------

Во III группу производились:

Colperinaeorrhaphia	10	больнымъ.
Colperin.-rrh. + Colporrh. ant.	13	»
Colperin.-rrh. + Excisio colli.	12	»
Colperin.-rrh. + Amput. colli.	72	»
Colperin.-rrh. + Colporrh. ant. + Amput.	36	»
<hr/>		
Всего	143	больнымъ.

Всего 143 больнымъ.

Другія добавочныя операции:

Abrasio	41	больной.
Colpotomia (Cystectomia)	3	больнымъ.
Colpo-coeliotomia	1	больной.
Haemorrhoidectomia	1	»
<hr/>		
Всего 46 больнымъ.		

Осложненія при операци:

Perforatio uteri	1	разъ.
Дугласъ (задній) вскрытъ	5	разъ.

Во IV группу:

Colperinaeorrh. + Colporrh. ant.	4	больнымъ
---	---	----------

Итакъ, нами 516 больнымъ сдѣлано всего 1049 отдельныхъ операций. При этомъ были осложненія: 3×матка случайно проткнута и 6×случайно вскрытъ задній Дугласъ, кончившіяся благополучно для больныхъ.

Передняя пластика влагалища была сдѣлана:

Во II группѣ	въ 17%
» III »	34%
» IV »	100%
» I »	ни разу.

Относительно высокой ампутации нужно сказать, что въ I и IV груп. она ни разу не была произведена, во II-й же группѣ она выразилась въ 8% и въ III-й—въ 75%.

Послѣоперационное теченіе было слѣдующее:

Во I группу:

Нормальную т° имѣли	136	больн. (91,3%)
Лихорадки	14	» (8,7%)
<hr/>		
Всего 150 больн.		

Всего 150 больн.

Изъ лихорадившихъ: 1 имѣла септическую лихорадку (№ 13); была доставлена въ клинику съ сепсисомъ и умерла на 10-й день послѣ операціи.

У 1-й больной былъ abortивный тифъ;
4 больн. лихорадили отъ невыясненныхъ причинъ;
8 больн. дали 1—2 кратн. повышение темпер.

Во II группѣ:

Нормальную т° имѣли . . . 206 больн. = 94%

Изъ нихъ одна отравилась и умерла (№ 35), а другая умерла сейчасъ послѣ операціи отъ наркоза (№ 111).

Лихорадили 13 » = 6%

Всего 219 больн.

Изъ лихорадящихъ у 2—Cystit.

- 1—Thrombosis venae femor.
- 1—Influenza.
- 9—Резорбционная лихорадка.

Всего 13 больн.

Въ III группѣ:

Нормальную т° имѣли 117 больн. = 82%

Лихорадили 26 » = 18%

Всего 143 больн.

Изъ лихорадящихъ умерла одна (№ 124—отъ Emboli'i art. pulmon.)

Въ IV группѣ нормальную т° имѣли всѣ 4 больныхъ = 100%.

Итакъ, изъ всѣхъ 516 больныхъ лихорадило 10%; умерло—4, изъ которыхъ только одну смерть можно было бы поставить въ вину операціи. У нея было расхождение швовъ; умерла на 25-й день послѣ операціи отъ Emboli'i art. pulmon.

Относительно заживленія раны получены слѣдующія данныя:

Въ I группѣ сращеніе пер-
вымъ натяженіемъ у . . . 132 больн. = 88%

Расхождение нѣсколькихъ
кожныхъ швовъ у 18 » = 12%

Всего 150 больн.

Расхождение отмѣчено при Colporinaeo-
rrhaphi'i 5×

При Colporerin.-reeto-rrhaphi'i 10×

При Colporerin. rh. + Excisi'i с. 3×

Всего 18×

Во II группѣ: per primam inten-
tionem 175 больн. = 80%.

Расхождение нѣсколькихъ кожныхъ
швовъ у 42 больн. = 20%

большое расхождение у 1 »
умерла отъ наркоза 1 »

Всего 219 больн.

Въ III группѣ: per primam
intentionem 95 больн. = 62%

Мѣстами поверхностное рас-
хождение 1—2 швовъ у . . . 45 »

Большое расхождение 2 »

Полное расхождение на про-
межности и на шейкѣ,
умерла 1 »

Всего 143 больн.

Расхождение нѣсколькихъ кожныхъ швовъ было при
слѣдующихъ операціяхъ:

30× при Colporerinrph. + Amput. с.
12× » » + Colporrhaph ant.

2×при Colporerirph. + Excisio colli.
4× » » + Colporrhaph aut.

Въ IV группѣ: per primam intent. . . 1 разъ.

Расхождение нѣсколькихъ кожныхъ швовъ 3 раза.

Поверхностное расхождение раны (мѣстами), не имѣвшее, однако, никакого вліянія на хорошее заживленіе, встрѣчалось чаще всего на промежности, гдѣ была сдѣлана добавочная операція укороченія шейки (высокая ампутація). Последнее обстоятельство объясняется иногда механической травмой от зеркала, нанесенной свѣжей ранѣ при снятіи швовъ съ шейки.

Также довольно часто поверхностно расходятся швы на передней стѣнкѣ (Colporrhaphia anterior). Только 4 раза получилось болѣе пространное расхождение промежностной раны, зажившей per granulationem=0,7%.

Принимая во вниманіе то большое значеніе, какое имѣеть для успѣха операціи безупречное заживленіе раны, и ту травму, которая нерѣдко наносится промежности при снятіи швовъ съ шейки, слѣдуетъ выяснитъ пользу высокой ампутаціи шейки, какъ вспомогательной операціи при выпаденіи матки. Больныя съ ампутаціей шейки должны оставаться въ клиникѣ большее число дней, чѣмъ при одной только Colporerinaeorrhaphi'i. Наши первичные и отдаленные результаты оказались хорошими при восстановленіи тазового дна и высокой ампутаціи, какъ вспомогательной операціи при удлиненіи шейки и потому, судя по результатамъ, нельзя опровергать благотворнаго ея вліянія (см. первичн. результаты). Но при высокой ампутаціи шейки мы поступаемъ только симптоматически, такъ какъ удаляемъ то, что растянулось подъ давленіемъ сверху и вслѣдствіе влеченія внизъ влагалищемъ. Всѣмъ хорошо извѣстно, что эти удлиненія шейки, даже при одномъ покойномъ положеніи въ постели, рѣзко и быстро уменьшаются и поэтому оперативное удаленіе удлинненной шейки весьма можетъ быть не такъ ужъ необходимо и результаты безъ него были бы, пожалуй, не хуже.

Для того, чтобы выяснитъ этотъ вопросъ, слѣдуетъ собрать большой матеріалъ, проведенный безъ высокой ампутаціи шейки и пробрѣнный относительно отдаленныхъ результатовъ.

Лично мною оперировано 11 случаевъ неполнаго выпаденія матки: 1—въ 1904 году въ Земской больницѣ князя Вяземскаго въ Тамбовской губ.; 1 случай въ Чернышевской лечебницѣ Общества Врачей специалистовъ въ Петербургѣ и 9 случаевъ въ Старорусской Земской больницѣ—однимъ только восстановленіемъ тазового дна. У 5-ти изъ нихъ была рѣзкая Ellongatio colli; длина матки была отъ 13—14 см. Во всѣхъ 11-ти случаяхъ была сдѣлана только обширная, достаточно глубокая и высоко во влагалище заходящая Colporerinaeorrhaphia.

При выпискѣ на 18—21 день матка у всѣхъ была по зонду около 8 см. Полное заживленіе. Одна больная была особенно тщательно прослѣжена (въ 1909 г.). При приемѣ больной (въ Старорусской Земской больницѣ) зондъ показывалъ 14—15 см. длины матки. Черезъ нѣсколько дней покоя въ кровати зондъ—12 см. На 8-й день послѣ операціи зондъ—10 см., на 14-й день—9 см. и при выпискѣ на 21-й день—8 см.

Итакъ, въ моихъ 11 случаяхъ неполнаго выпаденія, первичные результаты были превосходны. Что касается отдаленныхъ результатовъ этихъ больныхъ, то они оказались въ тѣхъ случаяхъ, которые мнѣ удалось впоследствии изслѣдовать, также превосходными.

Относительно времени пребыванія больныхъ въ клиникѣ укажемъ на слѣдующія данныя:

Въ I группѣ:

съ Colporerinaeo-recto-rrhaphi'eii	
отъ 10—15 дней	31 болн.
» 16—22 »	14 »
» 26 »	1 »

съ Colporerinaeorrhaphi'ей + Excisi'ей colli
отъ 12—15 дней 15 больн.
» 16—25 » 6 »

съ Colporerinaeorrhaphi'ей
отъ 9—15 дней 61 больн.
» 16—25 » 18 »
» 26—45 » 4 »

Всего 150 больн.

Итакъ, до 15 дней оставались въ клиникѣ 77% боль-
ныхъ I группы.

Во II группу:

съ Colporerinaeo-recto-rhaphi'ей
отъ 10—14 дней 6 больн.
» 19—26 » 3 »

съ Colporerinaeorrhaphi'ей и съ Colporerinaeorrha-
phi'ей + Colporrhaph. ant.

отъ 10—15 дней 95 больн.
» 16—26 » 56 »
» 26—35 » 8 »

съ Colporerinaeorrhaphi'ей + Excisi'ей colli
отъ 13—15 дней 10 больн.
» 16—26 » 22 »
32 дня 1 »

съ Colporerinaeorrhaphi'ей + Amput. alta

отъ 12—15 дней 3 больн.
» 16—20 » 11 »
» 20—30 » 3 »

съ Colporerinaeorrh. Colporrhaph. ant. + Amput. alta
27 дней 1 больн.
Всего 219 больн.

Итакъ, до 15 дней оставались въ клиникѣ 52% боль-
ныхъ II группы

Въ III группу:

съ Colporerinaeorrhaphi'ей
отъ 9—20 дней 7 больн.
» 21—26 » 3 »

съ Colporerinaeorrhaph. + Colporrhaph. ant.
отъ 12—18 дней 11 больн.
» 25—26 » 2 »

съ Colporerinaeorrhaph. + Excisi'ей colli
отъ 13—20 дней 10 больн.
» 21—32 » 2 »

съ Colporerinaeorrhaph. + Colporrhaph. ant. + Amput.
alta

отъ 12—20 дней 62 больн.
» 21—30 » 34 »
» 32—70 » 12¹⁾ »

Всего 143 больн.

Итакъ, до 20 дня выписалось 62% всѣхъ больныхъ
III группы.

¹⁾ Изъ нихъ у 4-хъ операція въ 2 приема, вследствие слабости
больныхъ.

Въ IV группѣ.

съ Colporrhinaeorrhaphi'eй + Colporrhaph. ant.	
отъ 16—19 дней	3 больн.
34 дня	1 »
Всего	4 больн.

Итакъ, до 19-го дня выписалось 75% больныхъ IV группъ.

Изъ вышеприведеннаго мы видимъ, что больше половины всѣхъ больныхъ оставались въ клиникѣ до 15 дней.

Операции на шейкѣ были причиной болѣе продолжительнаго пребыванія въ клиникѣ, чѣмъ операции одной только пластики.

Также часть больныхъ оставалась въ клиникѣ для леченія ваннами и пр., чѣмъ и объясняется ихъ болѣе продолжительное пребываніе въ стѣнахъ института.

Первичные результаты.

Состояніе больныхъ при выпискѣ было слѣдующее:

Въ I группѣ изъ 150 больныхъ выписались здоровыми 149; одна умерла отъ сепсиса, будучи доставлена въ клинику уже съ зараженіемъ крови.

Во II группѣ изъ 219 больныхъ выписались здоровыми 216 больныхъ; съ гранулирующей промежуточной раной, но безъ выпаденія—1 и умерло—2 (одна отъ наркоза, а другая сама отравилась).

Въ III группѣ изъ 143 больныхъ выписались здоровыми 139 человекъ; съ незначительнымъ опущеніемъ передней стѣнки—2; съ Cystocele—1; умерла на 25-й день послѣ операции, при нормальной t°, отъ Embolia art. pulm.—1.

Умершая имѣла расхожденіе швовъ и страдала, кромѣ того, сахарной болѣзью. Причина плохого заживленія въ этомъ случаѣ находилась, повидимому, въ зависимости отъ диабета. Мы знаемъ, что у диабетиковъ раны заживаютъ плохо, что, между прочимъ, было извѣстно уже въ старину ¹⁾. Въ виду этого слѣдуетъ въ случаяхъ выпаденія матки, осложненныхъ сахарной болѣзью, лучше отказываться отъ операции. Наша погибшая отъ эмболии больная прожила бы, можетъ быть, безъ операции не одинъ еще годъ.

На ниппѣ 516 Colporrhinaeorrhaphi'и приходится 1 смерть отъ эмболии легочной артеріи, между тѣмъ

¹⁾ Franz König ¹⁸⁸⁹) указалъ на то обстоятельство, что раны заживаютъ лучше при безсахарной діетѣ.

как по Iolly ¹³⁹⁾, въ клиникѣ Ohlshausen'a, она дала до 1893 г. на 634 случая 2 смерти (по даннымъ Sanders'a ¹⁴⁰⁾ и до 1910 г. на 500 случаевъ—6 смертей. Iolly видитъ разницу въ числѣ эмболий этихъ двухъ группъ въ томъ, что раньше довольствовались менѣе глубокими швами, чѣмъ теперь. Последній выводъ Iolly не подтверждается нашими данными, такъ какъ мы получили 1 разъ эмболию, несмотря на глубокое и обширное освѣженіе и причина ея, по нашему мнѣнію, кроется скорѣе всего въ томъ, что рана не заживаетъ вполне хорошо.

Въ IV группѣ выписались здоровыми всѣ 4 больныхъ. Итакъ, изъ всѣхъ 516 больныхъ выписались здоровыми 509; 4 умерли, изъ которыхъ только смерть одной (Embolia art. pulm.) могла бы быть поставлена въ виду оперативному вмѣшательству, вслѣдствіе расхождения швовъ на промежности и на шейкѣ.

Причиною смерти 3-хъ другихъ было: 1) наркозъ, 2) отравленіе (самоубійство), 3) сепсисъ (была доставлена въ клинику уже съ зараженіемъ крови).

Только 3 больныхъ оставили клинику съ легкимъ рецидивомъ передней стѣнки влагалища, вслѣдствіе неполнаго сращения раны.

Итакъ, первичные результаты дали намъ 99,3% выздоровленія.

Смертность въ зависимости отъ пластики, при современной антисептикѣ и асептикѣ, почти совсѣмъ исключается и равняется на основаніи сборной нашей статистики—0,2% на 1532 случая.

У Hegar'a ¹⁴¹⁾ на 400 случаевъ Colporrhinaeorrhaphii были 2 смерти; у Winter'a ¹⁴²⁾ на 113 случаевъ пластики—1 смерть, у Klein'a ¹⁴³⁾ на 463 случая—0% смерти; у насъ на 516 случаевъ—1 смерть, если исключить 3 смерти не по вину операціи; у Бирюковича ¹⁴⁴⁾ изъ клиники Лебедева на 42 случая пластики — 0% смерти.

Для сравненія приведемъ другія статистики непосредственныхъ результатовъ отъ восстановленія тазового дна:

Въ Повивальномъ Институтѣ съ 1893—1897 г., по отчету д-ра Каннегиссера ¹⁴⁵⁾, первичные результаты отъ пластики=100% выздоровленія.

Cohn ¹⁴⁶⁾ , изъ Берлинской клиники	получилъ	Выздоров.
Kieme ¹⁴⁷⁾ , изъ Галле'ской клиники	получилъ	75%
Asch ¹⁴⁸⁾ , изъ Бонн'ской клиники	получилъ	95%
Humpf ¹⁴⁹⁾ , изъ Геттингенской клиники	получилъ	95%
Schmidt ¹⁵⁰⁾ , получилъ		90%
Klein ¹⁵¹⁾ , получилъ		97%
Бирюковичъ ¹⁵²⁾ , изъ клин. проф. Лебедева ¹⁾		93%

Изъ вышеприведенныхъ цифръ мы видимъ, что первичные результаты отъ восстановленія тазового дна при выпаденіи матки оказались почти безъ исключенія хорошими. Въ нашей клиникѣ они дали 99,3% излеченія; въ другихъ клиникахъ, какъ въ отечественныхъ, такъ и заграничныхъ, процентъ первичнаго излеченія нѣсколько меньше, чѣмъ нашъ.

¹⁾ Изъ 42 случаевъ пластики три зажили per granulationem, остальные per primam intentionem.

13. Были-ли зашиты этот разрыв и сросся-ли он?

14. Не можете-ли Вы указать на причину нового выпадения матки?

15. Не подвергались-ли Вы вторичной операции по поводу нового выпадения?

Полученные ответы распределяются следующим образом по всем 4-м группам:

I группа (см. страницу 80) дала 34 письменных или субъективных ответа. Из них 32 признали себя безусловно здоровыми. Только 2 жаловались на чувство опущения. У одной это чувство опущения появилось вследствие за родами, при которых был разрыв промежности. Эта больная не может идти в счет рецидивов и поэтому в I группу окончательно излеченных, на основании их письменного заявления, оказалось 96,9%.

Из этих 34 больных роды имела 8 человек (1 роды у 5-х; 2 родов у 1-й и 3 родов у 2-х).

Разрыв при родах имела 5 человек; выкидыши—2; беременна теперь одна.

От операции до ответа прошло времени:

от $\frac{3}{4}$ г.—2 л.	17 больн.
от 3—5 л.	7 »
» 6—10 »	10 »

Отвѣтившія больныя подверглись:

Colporrhinaorrhaphi'a	19 раз
» +Excisi'o colli	4 раза
Colporrhinaeo-recto-rhaphi'a	11 раз

Объективно исследовано из I группы 16 больных. Все они оказались вполне здоровыми, что=100% окончательного излечения.

Из них 2 родили. У одной из рожавших была сделана перинеотомия по Отту. 2 беременны теперь. 3 находятся в климатическом периодѣ. Одна больная являлась в клинику 2 раза; первый раз было вставлено кольцо для исправления положения Retroversi'i

Отдаленные результаты.

Переходя къ отдаленным результатам нашего материала, отмѣчаем, что из 470 посланных писемъ отвѣтъ получился от 156 больных, причемъ 59 человекъ явились лично и 97 прислали заполненный вопросный листъ, что равняется $\frac{1}{3}$ отвѣтовъ больных, которымъ были посланы письма.

Наибольшій срокъ, протекшій отъ операции до опроса, равнялся 11 годамъ; самый короткій—9 мѣсяцамъ; въ среднемъ=6 лѣтъ.

Большимъ было предложено дать отвѣты на следующие вопросы:

1. Какъ Вы себя чувствуете послѣ операции?
2. Если Вы себя чувствуете хорошо, то все-ли время, истекшее послѣ операции?
3. Въ чемъ состоятъ Ваши занятія и какой образъ жизни Вы ведете?
4. Какія болѣзни перенесли Вы послѣ операции?
5. Не выпадаетъ-ли снова матка?
6. Если выпадаетъ, то черезъ сколько времени послѣ операции стала она снова выпадать?
7. Не жалуетесь-ли Вы на страданія мочевого пузыря?
8. Были-ли выкидыши послѣ операции?
9. Были-ли преждевременные роды послѣ операции?
10. Были-ли роды послѣ операции и когда?
11. Сколько часовъ продолжались эти роды?
12. Были-ли разрывъ промежности послѣ этихъ родовъ?

ut. mov. 8 мѣсяцевъ спустя, при вторичномъ осмотрѣ, матка въ кольцѣ въ положеніи Anteversionis. Кольцо удалено. У всѣхъ 16 больныхъ матка была найдена 9× въ Anteversi'i и 7× въ Retroversi'i mov.

Послѣ операциі до изслѣдованія прошло времени:

отъ $\frac{3}{4}$ г.—2 л.	6 больн.
» 2—5 л.	6 »
» 6—10 »	4 »

Подверглись:

Colporerinaeorrhaphi'i	6 больн.
Colporerinaeorrhaphi'i + Excisi'i c.	4 »
Colporerinaeo - recto - rraphi'i	6 »

II группа (см. стр. 80) дала 48 субъективныхъ отвѣтовъ.

Изъ нихъ вполнѣ здоровыми заявили себя 44 человека. 3 чувствовали опущеніе послѣ родовъ, сопровождавшихся разрывами.

Одна жаловалась на опущеніе (не рожала со времени операциі).

Исключивъ 3-хъ рожавшихъ, получимъ 97,8% окончательнаго выздоровленія.

Отъ операциі до отвѣта прошло:

отъ $\frac{3}{4}$ г.—2 л.	12 больн.
» 2—5 л.	16 »
» 6—10 »	18 »
11 »	2 »

Эти больныя подверглись операциямъ:

Colporerinaeorrhaphi'i	23 больн. ¹⁾
Colporerin. - rrh. + Excisi'i colli	7 »
Colporerin. - rrh. + Excisi'i c. +	2 »
Colporerin. - rrh. + Colporrh. ant.	9 »

¹⁾ Среди нихъ у 11-й теперь чувство опущенія. Ей 59 лѣтъ.

Colporerin. - rrh. + Amput. altae 6 больн.

Colporerin. - rrh. + Colporrh. ant. +

Amp. altae 1 »

6 рожали изъ всѣхъ 48. Одни роды были у 5-хъ; 5 родовъ у 1-й. Всѣ имѣли при родахъ разрывы, 1 разъ была сдѣлана перинеотомія. Разрывы были зашиты и срослись у 3-хъ.

Возрастъ 44-хъ больныхъ, чувствовавшихъ себя хорошо ко времени отвѣта, былъ слѣдующій:

отъ 25—30 л.	3 больн.
» 31—40 »	11 »
» 41—50 »	16 »
» 51—60 »	10 »
» 61—73 »	4 »

Возрастъ 4-хъ больныхъ, жалующихся на опущеніе:

отъ 32—37 л.	3 больн.
59 »	1 »

Изслѣдовано изъ II группы 22 человека. У 18-ти нѣтъ никакого выпаденія, и онѣ совершенно здоровы. У одной изъ остальныхъ 4-хъ оказалось ничтожное опущеніе передней стѣнки послѣ родовъ. У 3-хъ выпаденіе влагалища въ средней степени (неполное выпаденіе влагалища); у одной изъ нихъ выпаденіе развилось послѣ разрыва при родахъ; у другой, по ея словамъ, послѣ паденія въ ледникъ.

Положенія матки у изслѣдованныхъ больныхъ таковы: 9× Anteversio и 13× Retroversio. Длина матки во всѣхъ случаяхъ нормальная.

Исключивъ 2 рецидива по причинѣ родовъ, получимъ 90% полнаго выздоровленія для изслѣдованныхъ больныхъ II группы.

Возрасть 18 больных, оказавшихся вполне здоровыми ко времени исследования, были следующие:

отъ 25—30 л.	2 больн.
» 31—40 »	9 »
» 41—50 »	7 »

и возрастъ 4-хъ, имѣвшихъ рецидивъ:

отъ 36—43 л.	4 больн.
----------------------	----------

Подверглись операциі: см. стран. 79:

Colporerinaerrharph	11 больн. (1 рецидивъ).
» +Excisio c.	1 »
» +Ampt. a.	4 » (1 ») .
» +Colporrhaph.	3 » (2 ») .
» +rectorrhaph	2 »
» +Colporrhaph+Ampt.	1 »

Изъ 22-хъ изслѣдованныхъ больныхъ 3 рожали по 2 раза. У 2-хъ былъ разрывъ. Беременна теперь одна.

III и IV группы (см. стр. 80) дали письменныхъ отвѣтовъ 15. Изъ нихъ чувствовали себя вполне хорошо 14 человекъ (въ томъ числѣ и одна изъ больныхъ, имѣвшихъ полное выпаденіе матки), что составляетъ 93,3% окончательнаго выздоровленія.

Только 1 больная, изъ приславшихъ отвѣтъ (III группа), имѣла чувство выпаденія. У нея была сдѣлана Colporerinaerrharph. + Amput. c. alta. При выпискѣ отмѣчено заживленіе per primam intentionem; со времени операциі прошло 6 л.; ей теперь 63 года.

Возрасть 14 больныхъ, чувствующихъ себя совсемъ хорошо:

отъ 46—47 л.	2 больн.
» 50—60 »	11 »
» 66 »	1 »

Отъ операциі до отвѣта прошло:

отъ 3/4 г.—2 л.	5 больн.
» 2 — 5 »	1 »
» 6 — 10 »	9 »

Подверглись операциі:

Colporerinaerrharph'i	3 больн.
Colporerinaerrharph'i + Colporrh. ant.	2 »
Colporerinaeorrhaph'i + Amput. c. altae.	6 »
Colporerinaeorrhaph'i + Colporrh. ant. + Amp. altae.	4 »

Отъ III и IV группъ изслѣдовано 21 человекъ (2 изъ нихъ Г. П. Сережниковымъ и 3 профессоромъ Оттъ).

Изъ нихъ 17 вполне здоровы, работоспособны и никакого выпаденія половыхъ частей не имѣютъ (одна изъ нихъ имѣла до операциі полное выпаденіе матки).

Возрасть изслѣдованныхъ больныхъ:

отъ 42—48 л.	7 больн.
» 51—60 »	7 »
» 61—70 »	6 »
» 72 »	1 »

Тѣло матки оказалось въ большинствѣ случаевъ малымъ и атрофированнымъ (Atrophia senilis). Положеніе матки найдено 10 × въ Anteversi; 6 × въ Retroversi; 5 × не отмѣчено.

У больныхъ Христиани¹³³⁾, оперированныхъ по способу Ventrofixati'i, напротивъ, много матокъ оказались, при осмотрѣ относительно отдаленныхъ результатовъ, сильно удлинненными—до 13 см. и, несмотря на это, нѣкоторыя изъ нихъ не отмѣчены въ число рецидивовъ, хотя такое состояніе матки врядъ-ли можно считать нормальнымъ.

У 4-хъ остальныхъ изслѣдованныхъ нашихъ больныхъ III и IV группъ было найдено слѣдующее: у 1-й больной (№ 133—III гр.) опущеніе передней стѣнки влагалища. У нея была сдѣлана годъ назадъ задняя пластика + Excisio colli. Заживленіе получилось per granulationem.

II, III и IV группы выхлещ.	Всего больных 510.		III и IV группы 47 больных		II группа 219 больных		I группа 150 больных		Г р у п п ы	Субъективные отзывы.	Безусловно хорошо.	Рецидивы от родов.	Рецидивы.	% отношение.	Объективные данные.	Безусловно хорошо.	Рецидивы от родов.	Рецидивы.	% отношение.	Субъективные и объективные.	Рецидивы.	% отношение.	
	97	90	13	14	48	31	32	31															
63	38	4	3	1	3	1	1	1															
3	3	4	3	1	1	1	1	1															
96,6%	96,7%	90,4%	96,9%	93,9%	97,8%	96,9%	96,9%	96,9%															
43	39	31	31	21	22	16	16	16															
35	31	3	3	17	18	0	0	0															
3	3	3	3	1	2	0	0	0															
5	5	5	3	3	2	2	2	2															
87,6%	91,1%	85,0%	87,6%	83,0%	90,6%	100%	100%	100%															
100	149	100	100	35	63	49	49	49															
7	8	8	4	4	3	3	3	3															
93,9%	94,6%	93,9%	93,9%	88,6%	95,4%	97,9%	97,9%	97,9%															

Итак, все письменные (субъективн.) отзывы (97) от всех групп дали только 3 раза чувство опущения и выпадения, что = 96,7% полного выздоровления.

Все 59 исследованных больных дали 5 раз рецидив (2 × опущение передней стѣнки и 3 × неполное выпадение влагалищных стѣнок), что = 91,1% полного выздоровления.

Все субъективные и объективные данные, вместе взятые (156 больных), дали 94,6% полного выздоровления.

Эти же данные для II, III и IV групп составляют 93% полного выздоровления.

Итак, наши отделенные результаты колеблются по отношению отдельных групп между 88,6% и 97,9%, или в среднем = 94,6% (см. страницу 80).

Наконец следует указать, что из всех 8 рецидивов, принятых в расчет при выводѣ процентного отношения, только 3 рецидива можно считать действительными рецидивами (Prolaps vagin. anter. incompl.), так как при остальных 5-ти было только ничтожное опущение передней стѣнки влагалища и со времени операции прошел большой срок (по 9 летъ напр. у двух исследованных). Принимая, таким образом, в расчет только эти 3 рецидива, получаем 98% окончательного выздоровления.

Рецидивов же выпадения матки ни разу не пришлось наблюдать.

Роды послѣ восстановления тазового дна часто дают разрывы, и вследствие этого, в зависимости от степени разрыва, и рецидивы. Из 9-ти рожавших II группы 4 имѣли опущение влагалища и одна Prol. vag. incompl. (Cystocele), что составляет 55% рецидивов вследствие родов. В III и IV группах рожавших не оказалось, в виду преклонного возраста больных.

Baatz¹⁸⁴⁾, из клиники Winter'a, констатирует рецидив у рожавших послѣ пластики в 68,1%.

Asch¹⁸⁵⁾ даже заявляет, что разрыв при родах послѣ восстановления тазового дна — есть показатель, что прочность была зашита самым лучшим образом.

Чтобы предотвратить рецидивы от родов, некоторые гинекологи предлагают больных с выпадением стерилизовать, дблая резекцию труб. Против такой мбры высказывается Asch ¹⁾, Hegar и другие.

Для сравнения приведем процентное отношение отдаленных результатов других статистических данных, полученных от пластических операций при выпадении влагалища и матки:

Sonntag ¹⁵⁶⁾ , изъ Фрейбургской клиники	
Hegar ¹⁵⁷⁾ a	92 %
Asch ¹⁵⁷⁾ , изъ Боннской клиники	
Fritsch ¹⁵⁸⁾ a	59 %
Cohn ¹⁵⁸⁾ , изъ Берлинской клиники	
Schroeder ¹⁵⁹⁾ a	56,6%
Dorf ¹⁵⁹⁾	84 %
Münchmayer ¹⁶⁰⁾ , изъ Дреденской клиники	
Leopold ¹⁶¹⁾ a	82,5%
Kieme ¹⁶¹⁾ ,	66 %
Ida Schmidt ¹⁶²⁾ , изъ клиники Wyder ¹⁶²⁾ a	42 %
Meinert ¹⁶³⁾ , изъ Грейфсвальдекой клиники	
.	52 %
Fehling ¹⁶⁴⁾ ,	61,8%
Travalgino ¹⁶⁵⁾ , изъ Амстердамской клиники	
.	87 %
Martin ¹⁶⁶⁾ :	93 %
Theilhaber ¹⁶⁷⁾ :	92 %
Baum ¹⁶⁸⁾ :	69,8%
.	59,6%
Baatz ¹⁶⁹⁾ , изъ клиники Winter ¹⁷⁰⁾ a	93,9%
.	(проф. Dorn)
.	93,9%
.	(проф. Winter)
Снегирев ¹⁷⁰⁾ на 472 случая	51,1%

¹⁾ Asch: Zur Tubensterilisation: Centralblatt für Gynaekologie № 44 1910.

Наконец самъ Hegar ¹⁷¹⁾ утверждаетъ въ своемъ учебникъ: Operative Gynäkologie (IV издание), что онъ при своемъ методѣ лечения выпадений матки рецидивовъ почти уже не получаетъ.

Итакъ, процентъ окончательнаго выздоровления у вышеприведенныхъ авторовъ, оперирующихъ выпадения матки и влагалища по методу обвяжения (Colporrhinæo-graphia) колеблется между 42,8% и 93,9%.

Полученное нами процентное отношение: 88,6%—97,9%, или въ среднемъ 94,6% (93%) является такимъ образомъ одною изъ лучшихъ статистикъ въ настоящее время и несколько не уступаетъ уже опубликованнымъ даннымъ Martin'a (93%), Winter'a (93,9%), Theilhaber'a (92%), Sonntag'a (92%) и самого Hegar'a.

Почему, однако, методъ восстановления тазового дна при выпадении матки не пользуется заслуженнымъ вниманиемъ со стороны большинства заграничныхъ гинекологовъ?

Объясняется это, во-первыхъ, тѣмъ, что этотъ методъ дать въ рукахъ многихъ операторовъ большой процентъ рецидивовъ, иногда даже больше половины было неудачъ и, во-вторыхъ, переменную взглядовъ части авторовъ на патологию и этиологию выпадений влагалища и матки. Schultze ¹⁷²⁾, Kistner ¹⁷³⁾, Herf ¹⁷³⁾, Christiani и др. придаютъ самое важное значение нормальному положению влагалища, вследствие брюшино-связочнаго прикрепления матки, и считаютъ Retroversio ut. первой стадией выпадения и рецидива, почему для устранения ея стали производить дблый рядъ фиксирующихъ матку операций.

Что не слѣдуетъ придавать такого значенія исправленію отклоненія матки, объ этомъ мы уже говорили выше и приводили соответствующую литературу (см. стр. 54).

Здѣсь же я хочу указать на заключение Baatz'a ¹⁷⁴⁾, изъ клиники Winter'a, который говоритъ, что если до операции восстановления тазового дна при выпадении имбется на лицо Retroversio, то будто бы весьма ошибочно примѣнять одну только пластичку, а необходимо

КНИЖКА
Третьяковскаго Медицинскаго Института
№

еще фиксировать матку в положении Anteversi'i. Он сравнивает 2 группы чистой пластики тазового дна, одна из которых оперирована съ 1887 по 1897 гг. профессором Dorn'омъ, давшая ему 43% хорошихъ отдаленныхъ результатовъ, или 59,6% по исключеніи рецидивовъ отъ родовъ и отъ плохого первичнаго заживленія.

Другая группа, оперированная проф. Winter'омъ съ 1897 по 1903 гг., дала 83,8% хорошихъ отдаленныхъ результатовъ, или, по исключеніи рецидивовъ отъ родовъ, 93,9%.

Причину такой рѣзкой разницы въ результатахъ этихъ 2-хъ группъ Ваatz видитъ въ томъ, что въ группѣ Winter'a было до операциіи только 8 разъ Retroversio изъ 33 случаевъ, а въ группѣ Dorn'a 31 разъ изъ 47 случаевъ.

Но съ этимъ никакъ нельзя согласиться, такъ какъ ясно, что дѣло тутъ не въ Retroversi'i, а въ томъ, что Dorn оперировалъ еще въ то время (съ 1887 г.), когда при операцияхъ применялись сильно дезинфицирующіе растворы, вслѣдствіе чего и получались у него худшіе первичные результаты, а потому и худшіе отдаленные, нежели у Winter'a.

Итакъ, чтобы гарантировать себя отъ рецидива, нужно все стараніе приложить къ тому, чтобы освѣженіе было сдѣлано достаточно обширное и получило бы безупречное первичное сращеніе раны. Слѣдствіемъ этого получается хорошо возстановленное тазовое дно, а оно является въ свою очередь, какъ мы раньше это видѣли, самой лучшей поддержкой для правильнаго положенія половыхъ органовъ малаго таза.

Но получили-ли лучшіе результаты тѣ операторы, которые отказались отъ одной только пластики, присоединяя къ ней, съ цѣлью улучшить результаты, еще цѣлый рядъ другихъ операциіи на маткѣ и связкахъ?

Изъ нижеприведенныхъ авторовъ мы видимъ, что отдаленные результаты получались далеко не всегда въ пользу фиксирующихъ и другихъ методовъ. Лучшіе результаты Martin'a, Theilhabe'a, наши и другихъ авторовъ, полу-

ченные только отъ одного возстановленія тазового дна, оказались выше лучшихъ результатовъ, полученныхъ отъ фиксирующихъ матку и проч. операциіи.

Кромѣ того выяснилось, что фиксирующая матку операциіи при выпаденіи, безъ прибавленія къ нимъ пластики почти всегда не дѣйствительны.

Но пусть говорить языкъ цифръ:

Herf ¹⁷³⁾ получилъ отъ одной Ventrofixatio, излеченія	25 %
Schmit ¹⁷⁶⁾ получилъ при пластикѣ + Vaginofixat. излеченія	33 %
Schmit получилъ при пластикѣ + Abbre-vati'i и lig. rotund. излеченія	41,7%
Schmit получилъ при пластикѣ + укороченіи кругл. и крестцовоматочныхъ связокъ излеченія	50 %
Христиани ¹⁷⁷⁾ получилъ при пластикѣ + ventrofixatio излеченія	75 %
Христиани получилъ при пластикѣ (задней и передней) + Ventrofix. излеченія	84,9%
Martin ¹⁷⁸⁾ получилъ при пластикѣ + Vaginofixat. излеченія	82 %
Hohl ¹⁷⁹⁾ получилъ при пластикѣ + Vaginofixat. излеченія	77 %
Andersch ¹⁸⁰⁾ получилъ при пластикѣ + Vaginofixat. излеченія	85 %
Baatz ¹⁸¹⁾ получилъ при пластикѣ + Abbre-vat. lig. rot излеченія	47,8%
Küstner ¹⁸⁴⁾ получилъ при пластикѣ + Ventrofixat. излеченія	80 %
Westermarck ¹⁸²⁾ получилъ при пластикѣ + Ventrofixat. излеченія	70 %
Doederlein и Kroenig ¹⁸⁵⁾ : Fixatio ut. по Wertheim'у излеченія	71 %
Fuchs ¹⁸⁵⁾ , Fixat. ut. по Wertheim'у излеченія	95 %
Kirchgossner ¹⁸⁶⁾ , пластика + Extirp. ut. излеченія	81 1/2%

Winter ¹⁸⁷): пластика + Vaginofixat излечения	73%
Winter: пластика + Alexander Adams излечения	48%
Bumm ¹⁸⁸): пластика + Extirpatio излечения	90%
Schauta ¹⁸⁹): Interpositio ut. + шовъ Levat. ani излечения	77%

Изъ русскихъ гинекологовъ, примѣняющихъ фиксирующія матку операци при выпаденіи ея, приведемъ слѣдующихъ:

А. И. Лебедевъ ¹⁹⁰), какъ видно изъ клиническаго отчета о 200 чревосчеченіяхъ, произведенныхъ проф. Лебедевымъ съ 1884—1892 г. Диссертация Орлова ¹⁹¹), Снегиревъ ¹⁹²), Холмогоровъ ¹⁹³), Д. Д. Поповъ ¹⁹⁴), Добbertъ ¹⁹⁵), Теръ-Микаэлянцъ ¹⁹⁶) изъ клиники Феноменова ¹⁹⁷), Муратовъ ¹⁹⁸), Оленинъ ¹⁹⁹), Александровъ ²⁰⁰) Соловьевъ ²⁰¹), Груздевъ ²⁰²), Бурдзинскій ²⁰³), Холодковскій ²⁰⁴) и др.

Такимъ образомъ, отдаленные результаты отъ фиксации, пластическихъ операций и экстирпации матки въ связи съ пластикой промежности при выпаденіяхъ были до 90% ¹) благополучны, но уступаютъ отдаленнымъ результатамъ Martin'a=93%, Theilhaber'a=92%, нашимъ=93% и др., полученнымъ отъ одного только восстановления тазового дна.

Однако, слѣдуетъ указать на то, что среди гинекологовъ еще въ настоящее время имѣются скептики, не признающіе ни одного изъ современныхъ методовъ леченія выпаденій матки радикальнымъ. Последнее подчеркнул въ своемъ докладѣ на I съѣздѣ россійскихъ акушеровъ и гинекологовъ въ Москвѣ проф. Снегиревъ ²⁰⁵). По его мнѣнію, это происходитъ отъ того, что не отыскана еще

¹) Исключены результаты Fuchs'a (95% операт. Wertheim'a) ввиду того, что они выведены на слишкомъ маломъ числѣ больныхъ (21 человекъ) и ввиду того, что эти свѣдѣнія получены во многихъ случаяхъ всего только черезъ 2 мѣсяца послѣ операций.

точная причина выпаденій. Въ собранной имъ статистикѣ 2386 разныхъ операций при выпаденіяхъ матки было до 21,3% неудачъ.

Мы же, напротивъ, на основаніи нашихъ результатовъ, можемъ остаться весьма удовлетворенными и полагаемъ, что стоимъ на единственно правильномъ пути, какъ относительно взгляда на этиологию, такъ и относительно нашего метода леченія.

Если отдаленные результаты оказались, на основаніи сравнительной статистики, въ пользу метода восстановления тазового дна и промежности, то и другое требованіе отъ наилучшаго оперативнаго метода, т. е. меньшій рискъ для жизни больной и отсутствіе нежелательныхъ послѣдствій отъ операций—всецѣло на сторонѣ того же восстановления тазового дна.

Смертный исходъ, непосредственно отъ Colporrhaphi'и, встрѣчается на основаніи собранной мною статистики въ 0,2% или 1 разъ на 500 операций.

Отъ фиксирующихъ же матку и прочихъ операций смертный исходъ бываетъ гораздо чаще и превосходитъ первый въ значительной степени.

Христиани ²⁰⁶) имѣлъ 3 случая смерти отъ 143 Ventrifixati'и непосредственно послѣ операци, что=2,1%.

Kirchgesner ²⁰⁷) имѣлъ 3 случая смерти изъ 40 случаевъ Extirpati'и ut. + Colporrhaphia. Онъ считаетъ только одну смерть въ зависимости отъ операци, хотя сюда нужно включить и вторую, умершую отъ коллапса сердца на 20-й день и поэтому смертность отъ операци у него = 5%.

Rauhut (Halle ²⁰⁸) получилъ на 131 случай вагинальной экстирпации матки, собранныхъ имъ въ литературѣ, 11 разъ смертный исходъ, что = 8%.

Bumm ²⁰⁹) получилъ при тотальной экстирпации 10% смертнаго исхода.

Что касается осложненій и нежелательныхъ послѣдствій отъ этихъ двухъ категорій операций, то восстановление тазового дна исключаетъ таковыя совершенно.

Отъ фиксирующихъ же матку и проч. операций, принимаемыхъ при выпаденіяхъ матки, эти осложненія верѣдки, какъ напр. растройство во время беременности и родовъ, растройство при мочеиспусканіи, мучительныя иногда болевья ощущенія на мѣстѣ образующихся отъ фиксации рубцовъ, также грыжа по бѣлой линіи и паховыя грыжи и проч.

Всѣ эти перечисленныя осложненія вѣтъ болѣе тягостны для больныхъ, чѣмъ лишаютъ ихъ въ значительной степени работоспособности.

Описаніе этихъ осложненій можно встрѣтить весьма часто какъ въ отечественной, такъ и въ иностранной литературѣ, перечислять которую, ввиду ея обширности, нѣтъ возможности. Такъ, въ заграничныхъ клиникахъ введено даже особое названіе для родовъ съ искусственно фиксированной маткой: Antefixationsgeburt. Въ виду этихъ осложненій отъ фиксирующихъ матку операций, Schauta высказывается въ февральской книжкѣ Monatsschrift für Geburtsh. u. Gynaekologie, 1912, въ статьѣ: Die Behandlung der Geburt nach operativer Antefixation такимъ образомъ: «Iede operative Fixation, soll sie überhaupt Erfolg haben, übertreibt die physiologische Befestigung des Uterus — sie ist eine zu feste Fixation» (стр. 136).

На основаніи всего вышеизложеннаго мы позволяемъ себѣ сдѣлать слѣдующіе выводы:

1. Выпаденіе влагалища и матки—страданіе, развивающееся преимущественно послѣ родовъ, какъ слѣдствіе, главнымъ образомъ, травмы тазового дна и промежности. Изъ всѣхъ больныхъ, имѣвшихъ выпаденіе, 97% приходится на долю рожавшихъ и главнымъ образомъ повторнородящихъ (90%) и только 3% на долю нерожавшихъ.

2. Выпаденіе влагалища и матки протекаетъ хронически, причемъ первые субъективные признаки его отмѣчаются больными, какъ чувствено ощущенія и выпаденія: въ 45% это бываетъ влѣдъ за первыми родами, въ 6%—послѣ

однихъ изъ послѣдующихъ, въ 30%—влѣдъ за послѣдними родами и въ 19,9%—въ климактерическомъ періодѣ.

3. Острое выпаденіе матки происходитъ влѣдствіе большой травмы, возможно только при существованіи предрасполагающихъ условій въ тазовомъ днѣ, сопровождается обыкновенно явленіями шока и наблюдается рѣдко (2%).

4. Крѣпкое и хорошо развитое тазовое дно играетъ главную роль для удержанія влагалища и матки въ физиологическихъ границахъ въ полости малаго таза. Такъ какъ при слабомъ несостоятельномъ тазовомъ днѣ, будь это влѣдствіе разрывовъ при родахъ, или влѣдствіе природнаго слабого развитія его у нерожавшихъ, внутрибрюшное давленіе смѣщаетъ исподволь половые органы малаго таза внизъ, нѣрѣдко до полнаго выпаденія включительно, причемъ матка почти всегда принимаетъ положеніе ретроверсії,—такъ какъ, кромѣ того, изъ всѣхъ случаевъ ретроверсії по Winkel'ю приходится 90% на рожавшихъ и только 10% на нерожавшихъ, то слѣдовательно имѣется связь между родами, несостоятельностью тазового дна, ретроверсией и выпаденіемъ. Восстановленіе тазового дна при выпаденіи и ретроверсії является такимъ образомъ причиннымъ показаніемъ.

5. Полные же разрывы промежности, наоборотъ, почти не влекутъ за собой выпаденія влагалища и матки въ виду того, что больныя, одержимыя этимъ страданіемъ, не могутъ напрягать своего брюшнаго пресса до обычнаго физиологическаго предѣла, такъ какъ у нихъ внутрибрюшное давленіе вообще понижено и имъ нѣтъ надобности тужиться при дефекаціи, отчего сохранившаяся часть тазового дна, въ виду только что сказаннаго, въ состояніи противостоятъ пониженому внутрибрюшному давленію.

6. Восстановленіе тазового дна въ видѣ обширной Colporrhaphie и даетъ при всѣхъ степеняхъ выпаденія влагалища и матки, а также при рецидивахъ отъ другихъ оперативныхъ методовъ наилучшіе отдаленные результаты (93%) сравнительно съ другими операциями для той же цѣли.

7. Восстановление тазового дна является самым бережным оперативным вмешательством для больных, страдающих выпадением влагалища и матки, так как оно дает только 0,2% смертности. Таким образом, этот процент является много меньшим, чем получаемый от применения других оперативных методов.

8. Восстановление тазового дна, кроме других преимуществ, не дает вносibilities никаких осложнений от самой операции, как это нередко бывает с другими оперативными методами лечения выпадений матки.

9. Высокая ампутация при удлинении и гипертрофии шейки, передняя пластика при Cystocele, клиновидная экцизия при хроническом метритe и выскабливание полости матки при эндометритe, как вспомогательные операции при восстановлении тазового дна, способствуют хорошим, как первичным, так и отдаленным, результатам.

10. При родах, после восстановления тазового дна, часто бывает разрыв промежности (55%), который в свою очередь может быть причиной рецидива. Таким больным следует делать при последующих родах, в случае угрожающего разрыва промежности, перинеотомию, в виду того, что рваная рана, после зашивания, дает лучшее заживление, чем рваная.

ТАБЛИЦЫ.

Группа I:

150 больных с разрывом промежности без ясно выраженного опущения влагалища и матки.

№ п/п	Возраст	Состояние до операции	Состояние после операции	Сроки наблюдения	Результат
1	35	Выпадение матки II ст.	Восстановлено тазовое дно	1 год	Хорошо
2	42	Выпадение матки III ст.	Восстановлено тазовое дно	2 года	Хорошо
3	38	Выпадение матки II ст.	Восстановлено тазовое дно	1 год	Хорошо
4	45	Выпадение матки III ст.	Восстановлено тазовое дно	3 года	Хорошо
5	30	Выпадение матки II ст.	Восстановлено тазовое дно	1 год	Хорошо
6	40	Выпадение матки III ст.	Восстановлено тазовое дно	2 года	Хорошо
7	35	Выпадение матки II ст.	Восстановлено тазовое дно	1 год	Хорошо
8	48	Выпадение матки III ст.	Восстановлено тазовое дно	3 года	Хорошо
9	32	Выпадение матки II ст.	Восстановлено тазовое дно	1 год	Хорошо
10	43	Выпадение матки III ст.	Восстановлено тазовое дно	2 года	Хорошо
11	37	Выпадение матки II ст.	Восстановлено тазовое дно	1 год	Хорошо
12	46	Выпадение матки III ст.	Восстановлено тазовое дно	3 года	Хорошо
13	34	Выпадение матки II ст.	Восстановлено тазовое дно	1 год	Хорошо
14	41	Выпадение матки III ст.	Восстановлено тазовое дно	2 года	Хорошо
15	36	Выпадение матки II ст.	Восстановлено тазовое дно	1 год	Хорошо
16	44	Выпадение матки III ст.	Восстановлено тазовое дно	3 года	Хорошо
17	31	Выпадение матки II ст.	Восстановлено тазовое дно	1 год	Хорошо
18	47	Выпадение матки III ст.	Восстановлено тазовое дно	3 года	Хорошо
19	33	Выпадение матки II ст.	Восстановлено тазовое дно	1 год	Хорошо
20	49	Выпадение матки III ст.	Восстановлено тазовое дно	3 года	Хорошо

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, г-тва, словное, семейное положение, занятие.	Результ.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
1	1897 № 1556.	П. 35 л. ж. врача, учнт.	с 12 л. чр. 3 н. 4—5 дн. иногда ступи. боль в г-ва, подреб.	23	1	25	10	Разр. пром.	2 раза зашла, пром.	Боль во время соитус'а. До родов соитус была нормальна.	Ruptura perinaei. Матка большая. Зонд. 10½ см.	24/х—опер. под хлорое. Abrasio и Colporerin-grhaphia.	Безлх. Prima intentio.	9/х—выпис. Здорова.	—
2	1898 № 1652.	Е. 23 л. ж. инженер-технол.	с 14 л. чр. 3—4 н. 4—5 дн.	21	2	22	1	Разр. пром. после 1 и II род.	Оба раза зашла, но безуспешно.	Жалуется иногда на частое мочеиспускание.	Rupt. perin. Introitus vag. зияетъ.	23/и—опер. под хлорое. Colporerin-grhaphia.	Безлх. Prima intentio.	9/и—выпис. Промежи. плотная.	—
3	1898 № 1700.	Л. 26 л. жрест. зам. дом. хоз.	с 14 л. чр. 4 н. 3 дн.	24	1	26	7 м.	Разр. пром.	Септикопизмия.	Жалуется на б-ли.	Ruptura perinaei.	16/х—опер. под хлорое. Colporerin-grhaphia.	Безлх. Prima intentio.	27/х—выпис. Промежи. плотная.	—
4	1898 № 1734.	З. 28 л. ж. ремесла. дом. хоз.	с 16 л. 3—4 н. 2—4 дн.	19	6	20	2	Разр пром. при I род. щипцы.	Разрыв зашит. не сросся.	Недержание газов и жидкого стула.	Rupt. perin. completa et recti. Retroflexio m.	10/х—опер. под хлорое. Colporerin-recto-grhaphia.	Безлхор. Поверхности, расхожд. швов на маленк. пространства.	17/х—выпис. Промежи. плотная.	—
5	1899 № 1829.	З. 28 л. графиня зам.	с 16 л. 3—4 н. 2½ дн.	25	3	26	5	Разр. пром. щипцы при I род.	Норм.	Частое мочеиспускание.	Старый разрыв промежи. Рубцева я щип. Гипертрофия малых губъ.	21/и—опер. под хлорое. Ампутация малых губъ и Colporerin-grhaphia.	Безлх. Prima intentio.	7/и—выпис. Промежи. хороша.	Пшетъ въ маѣ 1908 г., что чувствуетъ себя хорошо. Больше не рожала.
6	1899 № 1897.	А. 32 л. жрест. зам. фабричн.	с 16 л. чр. 4 н. 4 дн.	20	5 р. 2 вых.	23	1½	Разр. пром. при 10 л. тому назад.	Лихор. кровотождк. 2—3 н. Разр. былъ зашит., но не ср.	Недержание газов и жидкого стула.	Rupt. perin. compl. (10 л. тому назад). Шейка матки разорвана. Въ крестц-маточныхъ связкахъ рубцы.	8/х—опер. под хлорое. Colporerin-recto-grhaphia.	Безлхор. Поверхности, расхожд. м-стами.	27/х—выпис. Состояние удовлетвор.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лѣтъ, со- стояние, се- мейное по- ложение, занятіе.	Регулы.	Начало поло- вой жизни.	Число родовъ и выздѣлшіе.	На которомъ году были первые роды. Сколько лѣтъ на- задъ были послѣд- ніе роды.	Искость родовъ для большой.	Послеродовой періодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послѣоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные	
7	1899 № 1897	К. 23 л. крест. зам. губовла- пествомъ.	съ 17 л. 3—4 н. 3—4 дн.	20	2	21	8 н.	Разр. пром. полн. не зашита.	Норм.	Недержание га- зовъ и жидкого стула послѣ 1 ро- довъ, продолжав- шихся часъ.	Rupt. perin. compl. et gesti. Влагалище и матка нормальны.	¹¹ / _х —опер. подъ хлором. Colporerin- recto-rhaphia.	Безлнх. Prima intentio.	²⁵ / _х —выпис. Здорова.	Питетъ въ маѣ 1908 г., что совер- шенно здоровъ. Имѣла трое родовъ, безъ разрывовъ. Принимать боль- шую благодарность за выздоровленіе.
8	1899 № 1898	А. 41 г. ж. дворян. дом. хоз.	съ 14 лѣтъ 3—4 н. 4 дн.	26	1	27	14	Разр. пром.	Норм.	Кровотеченіе большо въсѣдъ. Болей не имѣетъ, 2 г. бѣли.	Rupt. perin. Endometrit.	⁹ / _х —опер. подъ хлором. Abrasio et Colporerin-rhaphia	Безлнх. Prima intentio.	¹⁹ / _х —выпис. Здорова.	Питетъ въ маѣ 1908 г., что чу- ствуетъ себя хоро- шо. Родовъ не имѣла.
9	1899 № 1915	Ш. 23 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 14 лѣтъ 3 н. 5 дн. иногда сгустк.	19	2	20	1 1/2	Разр. пром. полн. при I род.	Норм.	Недержание га- зовъ, жидкихъ и плотныхъ испраж- неній. Частые попытки на доже- лцію. Чувство на- пирания внизъ. Бѣли.	Rupt. perin. completa et gesti (1 1/2 см.). Graviditas M. IV.	¹¹ / _х —опер. подъ хлором. Colporerin. recto-rhaphia.	Безлнх. Per prim.	²¹ / _х —выпис. Здорова.	Питетъ въ маѣ 1908 г., что все время чувствуетъ себя хорошо. Ро- ждала 3 раза, быстро (3 часа).
10	1900 № 1982	В. 36 л. зам. крест. кухарка.	съ 12 лѣтъ чр. 3 н. 5 дн. Послѣ по- сѣдъ, род. по 3 дн. были сгустк. боли пе- редъ и по-вр.	22	7	24	4	Разр. пром.	Лихор. Subin- voluit.	Боли въ сплнхъ и внизу живота. Menorrhagia. За- трудненное моче- испусканіе.	Диагнозъ: прамыхъ мышць, небольшой разрывъ про- мжности. На шейкѣ Ocula Nabothi et Ectropion. Met- ritis chron. Endometrit. Resid. parametrit.	²⁹ / _х —опер. подъ хлором. Abrasio, Excisio colli (по Прехтеру) Colporer- tin-rhaphia.	Безлнх. Prima intentio.	²¹ / _н —выпис. На промежи. и во влагали. примолочней. рубцевъ. На шейкѣ руб- цевъ. Промеж. полнѣе доста- точна.	—
11	1900 № 1991	П. 31 г. ж. врач. дом. хоз.	съ 13 лѣтъ н. 3 дн.	19	4	23	4	Разр. пром. при II род.	Лихор. крово- течъ, вы- дѣл. съ запах.	Боли въ послѣд- нѣ. Dysmenorrhoea. Бѣли съ кровяни- стой окраской.	Небольшой разрывъ про- мжности. Шейка увели- чена. Ectropion. Retroflex. mob.	¹⁴ / _н —опер. подъ хлором. Abrasio, Colporerin-rhaphia.	Безлнх. Prima intentio.	⁵ / _н —выпис. Промежи. хорошая.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регула.	Начало половой жизни.	Число родов и выхажив.	На котором году были первые роды.	Сколько лет не закр. боли послеродов.	Исход родов для больной.	Послеродовый период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписк.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
12	1900 № 2003	К. 25 л. ж. чинов. дом. хоз.	Съ 15 летъ 3 и 7 дн.	24	1	23	6 нед.	Разр. полн. прир. щипцы на 4-й день род. зашит. не срос.	Лихор. не долго.	Недержание газов и жидкого стула.	Rupt. perin. completa.	²⁵ / ₁ —опер. подъ хлороф. Colporerin-rtbarphia.	Безлх. Поверхности, расхожд. около самого заднего прохода.	¹⁷ / ₁₁ —выпис. Открытие задн. прохода хорошо сформировано. Газы деря. Самостоятельное хорошее.	—
13	1900 № 2013	М. 40 л. крест. зам. крестьян-ствовак.	Съ 14 летъ черезъ мѣсяцъ 4 дн. мало.	20	4	24	11	Благополучно.	Норм.	Разрывъ промежности полученъ при падении на рукуяту навозной ямы 3 нед. тому назадъ. Разрывъ былъ зашитъ, но неудачно въ земской больницѣ. Жалуется на ознобъ.	Rupt. perin. compl. et recti artibe (3 см.). На левой голени воспаление ямы. Паховыя железы увеличены. Пульсъ при приемѣ былъ 120 въ минуту. Моча содержитъ гной и сгустки была.	¹³ / ₁₁ —опер. подъ кокаи. Colporerin-rtbarphia.	Лихорад. Причина—Phlebitis acuta v. sapharnea. Periphlebitis phlegmonosa T-га до 40°—41°. Бредъ.	† смерть ²⁵ / ₁₁ Societio. Septicæmia. Операционное лечение. Thrombosis v. sapharnea sinistra suppurativa. Pneumonia septica metastatica	—
14	1900 № 2049	С. 29 л. двор. двора дом. хоз.	съ 13 л.	22	4	23	2½	Разр. пром. при I род.	Послѣ I род. лежала 6 н.	Боли внизу живота слева. Чувство выпадения во время бытия. Бѣли.	Rupt. perin. Salpingo-oorphoritis sin.	¹⁹ / ₁₁ —опер. подъ хлороф. Colporerin-rtbarphia.	Безлх. Per prim.	²⁶ / ₁₁ —выпис. Здорова.	—
15	1901 № 2152	Ф. 22 л. почта. гражд. прислуга.	съ 17 л. 3 н. 4 дн.	18	1	22	2 м.	Разр. пром. зашит. не срос.	Лихорад. 3 н.	Боли въ промежности и въ поясницѣ.	Rupt. perin. inveterata.	¹⁷ / ₁₁ —опер. подъ хлороф. Colporerin-rtbarphia.	Безлх. Per prim.	¹ / ₁₁ —выпис. Здорова.	—
16	1901 № 2200	З. 24 л. ж. псаломщ. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 2 дн.	18	1	19	5	Разр. пром. щипцы. зашит. не срос.	Эклампися. Лихорад 3 мѣс.	Боли въ поясницѣ со времени родовъ.	Rupt. perin. Ectropion. Res. pp. post sin. Anteflexio uteri.	²⁵ / ₁₁ —опер. подъ хлороф. Excisio colli et Colporerin-rtbarphia.	Безлх. Per prim.	¹² / ₁₁ —выпис. Удовлетвор. состояни.	Письмо, что родо-ль не шила и стращаетъ бѣлыми. Лучно показались ²⁵ / ₁₁ —09. Metrix. chron. Anteflex. Промежи. плоти.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, состояние, занятие.	Роды.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На которых году были первые роды.	Сколько лет на закл. были последние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовый период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперативное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
17	1901 № 2260.	Л. 41 г. ж. торговца дом. хоз.	с 16 л.	18	1 р.	3 и 6 дн. обл.	19	18	Разр. пром. полн.	Недержание газов и кровотечение со времени последних родов.	Rupt. perin. compl. Retroversio mob. Fibromioma ut. dна матки (вмешательство в левую орхиту).	24—опер. под хлороф. Abrasio. Colporrin-recto-rhaphia.	Безлж. Per prim.	24/х—выпис. Газы удерж.	При последовании в мае 1908 г. промежн. высокая. Introitus при введении 2-х пальц. болзж. Anus нормалн. Retroversio. Coitus болзжен. вследствие узости. Clim. 4 года.
18	1901 № 2267.	Т. 27 л. крест. зам. дом. хоз.	с 15 л.	22	1 р.	3 и 3 дн.	24	3	Разр. пром. полн. щипцы на 4 сутн. зашит., не срое.	Недержание газов и стула, а также мочи со времени родов.	Rupt. perin. compl. et recti (6—7 см.).	14—опер. под хлороф. Colporrin-recto-rhaphia.	Безлжор. Поверхности. расхожд.	25—выпис. Удерживает газы, стул и мочу.	—
19	1902 № 2331.	Р. 21 г. крест. незам. прислуга.	с 14 л.	—	1	4 и 3 дн. малю, с бол.	21	2 м.	Разр. пром. зашит., не срое.	Чувство напряжения внизу, боль в животе со времени родов.	Rupt. perin. Retroflexio ut. Residua postica.	20/у—опер. под хлороф. Colporrin-rhaphia.	Безлж. Prima intentio.	26/у—выпис. Здорова.	—
20	1902 № 2389.	С. 29 л. крест. зам. дом. хоз.	с 17 л.	22	3 р.	чр. мисадт, 3—4 дн.	23	7 м.	Разр. пром. полн. при I род.	Лихорад. Недержание газов и жидкого стула.	Rupt. perin. compl. et recti (4 см.).	20/х—опер. под хлороф. Colporrin-rhaphia.	Безлж. Prima intentio.	15/х—выпис. Здорова.	—
21	1903 № 2446.	Г. 21 г. ж. крест. зам. дом. хоз.	с 16 л.	17	2	3 1/2 и 3 дн.	19	7 м.	Разр. пром. полн. при I род. при II род. увеличился Роды 2 ч.	Налож. швы. Разошл. С I родов не держ. газов. Чувство напора внизу. Головокружение.	Rupt. perin. compl. Retroversio ut. fix.	24/л—опер. под хлороф. Colporrin-recto-rh.	Безлж. Prima intentio.	15/у—выпис. Вольн. хорошее состоян.	—
22	1903 № 2475.	К. 26 л. ж. крест. зам. дом. хоз.	с 13 л.	18	3	4—3 л. 4 дн. згтовт. не имать со-искамь или оч. рбдо.	21	1	Разр. пром. полн. при I род.	Недержание газов, иногда и испражнений. Напряжение внизу при ходьбе и работ.	Rupt. perin. compl. et recti (2 см.) Retroflexio fix.	15/х—опер. под хлороф. Colporrin-recto-rh.	Безлжор. Per prim; за искл. неболн. расхожд. по среднй пром.	21/х—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год. № листа.	Фамилия, дата, со- словное со- единение по- ложения, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На каком году был первый род.	Сколько лет в по- сле- и последе- ние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный ме- тод и какого часа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
23	1904 № 2966.	Р. 22 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 17 л. 4 и 6 дн.	20	1	21	3 м.	Разр. пром. полн. (роды 19 ч.)	Крово- течение до 5 н.	Недержание мочи и жидк. стул.	Rupt. perin. completa et recti. Двояк широкая связка рубцовой укорочена.	¹⁶ /и—опер. подь хлорое. Colporperin- recto-tri.	Безлих. Per prim.	⁸ /и—выпис. Промежи. вполне удо- влет. Гам в жидк. стуж. удерживает.	—
24	1904 № 2617.	С. 32 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 11 л. 3 1/2 и 6 дн	18	2 р. 1 вык.	19	11 л.	Разр. пром. полн.	Хворала Subinvo- lut.	Беля. Запоры. Бо- ли внизу живот 14 летъ больна.	Rupt. perin. Matka nor- мальна; небольн. resid. ссыва.	²⁹ /ix—опер. подь хлорое. Abrasio Colporperin-triaphia.	Безлих. Per prim.	⁵ /x—выпис. Retroflex. ut. Промежи. состоятельна.	—
25	1905 № 2779.	К. 22 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 17 л. 4 н. 3—4 дня.	17	2 р. 1 вык.	18	2 г. вык. 3 м.	Разр. пром. полн.	Хворала после выкд., кровоотеч. значит.	Чувство выпад. матки. Вып. Запоры Болезнен. мочеиспу- скание. Боли с хвлятками во время регулов.	Rupt. perin. Retroflexio ut. Endometrit.Oophoritis.	²⁵ /x—опер. подь хлорое. Abrasio Colporperin-triaphia.	Безлих. Per prim.	¹⁴ /xii—выпис. Промежи. хорошая.	—
26	1906 № 2872.	Ф. 40 л. крест. зам. сельск. раб.	съ 14 л. через 3 дня	20	9	21	4	Разр. пром. полн. после последн. родовъ (быстр. роды, боль- шая голова у ребенка.	Норм.	Недержание мочи и кала.	Rupt. perin. compl. et. recti (5 см.).	¹⁵ /v—опер. подь хлорое. Colporperin- recto-tri.	Безлих. Per prim.	²⁰ /v—выпис. Симптомъ. recti исправ.	Принимет въ май 1908 г., что чув- ствует себя все время хорошо. Ро- довъ не имья. Принимает боль- шую благодушность
27	1906 № 2901.	А. 35 л. крест. зам. хлб. маш.	съ 18 л. 3—4 и. 5, дн. непрар.	22	5	23	5	Разр. пром. 3-о роды— двойня.	Лихорез.	Чувствоушущия боли въ спинь. Не- правильная кровь.	Rupt. perin. Metritis. Endometrit. Retroflex m. Res. pp. post. Ovula Nabot.	⁷ /x—опер. подь хлорое. Abrasio. Excisio cinoidea. Colporperin-triaphia.	Безъ лихор. Per. prim., кровь центра промежности.	²⁸ /x—выпис. Здорова.	—
28	1906 № 2947.	Д. 30 л. ж. инжен. дом. хоз.	съ 16 л. 3 1/4 и 3 дн.	20	4 р. 4 вык.	21	4	Разр. пром. полн.	Норм.	Боли внизу жи- вота, тяжесть около 2-х л. Запоры. Re- troflex ut. fx. Леж- ась массажемъ.	Rupt. perin. Reclinatio ut. mob. Resid. post.	¹⁰ /xii—опер. подь хлорое. Abrasio. Colporperin-triaphia.	Безлих. Per prim.	²⁰ /xii—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год. № листа.	Фамилия, звание, семейное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На сколько лет были первые роды.	Сколько лет прошло после родов.	Послед роды для больной.	Постродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
29	1906 № 2948.	А. 30 л. крест. незам. сидячка.	с 13 л. 4 и 4 д. иного.	—	1	30	5 м.	Разр. пром. полн.	Лихорад.	Недержание газов и жидкая стула.	Rupt. perin. compl. Retroflexio, Endometrit. haemorrhagica.	¹² /хл—опер. под хлороз. Abrasio Colproperin-rectorrhaph.	Безлх. Рег prim.	²⁷ /хл—выпис. Санитарь функционирует правильно.	Исследована в мае 1908 г., чувствует себя хорошо. Беремена 2 м 5 с. Промени, плоти, эластичная. Orific. recti в норм. сост. Retroversio ut.
30	1907 № 2971.	К. 26 л. крест. зам. крестьянство.	с 16 л. 4 и 4 д. обил. стуга.	21	3	22	4 м.	Разр. пром. полн.	Лихорад. 5 нед. выдл. грязн.	Недержание газов и жидкая стула. Боли внизу живота.	Rupt. compl. Ectropion. Antelexio ut. В 7-ой тирской крест.—маточ. слава. рубцы. Endometrit.	⁵ /п—опер. под хлороз. Colproperin-recto-rhaphia.	Безлх. Рег prim.	¹⁴ /п—выпис. Здорова.	Пашеть в мае 1908 г., что чувствует все время хорошо. Были роды (3 час.) с небольшим разрыв, кот. не был зашит.
31	1907 № 2986.	А. 35 л. крест. незам. прислуга.	с 14 л. 4 и 7 д. обил. боли в 1-й день.	—	4	24	6 л.	Разр. пром. полн.	—	3 г. боли в поясниц. Недержание газов и жидкая стула.	Rupt. perin. compl. Metrit. Рубцы сзади. Endometrit. hemorrhagica.	²⁷ /п—опер. под хлороз. Abrasio Colproperin-rectorrhaphia.	Безлх. Рег prim.	⁷ /п—выпис. Здорова.	—
32	1907	О. 36 л. мшн. зам. дом. хоз.	с 14 л. 4 и 2 д.	12	5 р. 1 вых.	25	4	Разр. пром. при III род. и грязная лушка; зашит. При VI родах разрыв не зашит.	Норм.	6 л. боли внизу живота.	Rupt. perin. Metrit. chron. Hernia umbilical.	²⁴ /п—опер. под хлороз. Herniotomia umbilicalis et Colproperin-rhaphia.	Безлх. Рег prim.	⁷ /п—выпис. Состоятел. промечи.	—
33	1907 № 3042.	К. 26 л. крест. незам. зем.делатством.	с 14 л. 4 и 3 д.	—	—	—	—	—	—	2 мис. т. н. упала со стога сына на вылы на деревянный конец и получила полный разрыв промежи. В земской больниц. зашили, но безрезультатно.	Rupt. perin. compl. et recti (6 см.). Место разрыва покрыто рубцами. Retroflexio fix.	²⁷ /х—опер. под хлороз. Colproperin-recto-rhaphia.	Безлх. Рег prim.	⁸ /хл—выпис. Санитарь хорошо функционирует. Промечи, состоят.	Исследована в сентябре 1908 г., чувствует себя прекрасно, работает на полях. Промечи и задн. проход в норм. состоянии.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Возраст.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Несколько родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статусь и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
34	1907 № 3063.	К. 26 л. крест. зам. дом. хоз.	с/в 17 л. 3 1/2 м. 7 дн.	18	1	26	6	Разр. пром.	Лихорад. 4 нед. Нервное отпад. долго.	Тяжесть и тупые боли внизу живота. Нервизация мочи. Больна с последних родов.	Rupt. perin. Retroflex. ut. Res. sin. et. post. sin. Perimetrit. sin. Endometrit.	²³ /x—опер. подь хлороэ. Abrasio Colpoperin-rhaphia.	Безлих. Per. prim.	⁹ /x—выпис. Промежн. состоят.	Исследована вь сентябрь 1908 г. Чувствуеть себя хорошо. Промежн. Levator ani суици. хорошо. Antever-sio ut. Являхь придатковъ нять; удалены вь этомъ году per laparotomiam.
35	1907 № 3076.	Е. 32 л. св. священ. дом. хоз.	с/в 14 л. 3 м. 5 дн. обил. куск.	26	1	30	1 г. 3 м.	Разр. пром. полн. не заш.	Лихорад.	Чувство опущения. Газы и жидкй стуль держатся. Спина болят. Бьтл.	Rupt. perin. compl. Синктеръ надриан. Retroversio mob. Рубцы с/ва. Endometrit.	⁹ /x—опер. подь хлороэ. Abrasio Colpoperin.-recto-trh.	Безлих. Per. prim.	¹⁰ /x—выпис. Промежность хорошая. Синктеръ-функционировать.	Пишетъ вь сентябрь 1908 г., что чувствуеть себя хорошо больше всьца послъ операцин. Ощущаеть по временамъ опущение матки, приписываеть это поднятию тяжести и нервному раздражению.
36	1897 № 100.	Д. 30 л. учител. муз. зам. дом. хоз.	с/в 13 л. 4 н. 4 дн. слаб. с/в болью.	20	1	30	1 м.	Разр. пром. полн. роды 2 1/2 сут. щипцы зашпц. несрос.	Хворала катарр. мочев. пуз.	Съ трудомъ умер. живаеъ газы и жидк. испражи.	Rupt. perin. compl. et. recti (2 см.). Antever-sio ut.	⁹ /x—опер. подь хлороэ. Colpoperin-recto-rhaphia.	Безлих. Prima intentio.	²⁰ /x—выпис. Здорова.	—
37	1897 № 109.	Т. 24 л. крест. незам. прислуга.	с/в 16 л. 3—6 дн. сильн. боли ступс.	20	2	21	7 м.	Разр. пром. полн. при I род. (6 сут.) не заш.	Хворала 6 нед.	Недержание газозъ. Чувство напирания внизъ. Боли внизу живота и вь поясницъ.	Rupt. perin. compl. Metrit.	²⁹ /x—опер. подь хлороэ. Colpoperin-recto-rhaphia.	Безлих. Per. prim.	¹⁰ /x—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лето, со- словие, се- мейное по- ложение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На которомъ году были первые роды.	Сколько летъ на- задъ были после- ние роды.	Исходъ родовъ для больной.	Послеродовой периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статусъ и діагнозъ.	Операционный ме- тодъ и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана, Состояние при выпискѣ.	Отдавленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
38	1897 № 117.	А. 21 г. прест. зам. землепаше- ствомъ.	съ 13 л. 3½—4 н. 5 дн. сил.	19	—	20	9 м.	Разр. пром. Экламсия, лоды перо- родорвант и при из- влеч. разр. пром. не зажит	Хворала 6 нед.	Со времени родовъ боли въ поясницѣ и лѣвой ногѣ. Обиль- ныя мѣсячныя. Бѣ- лн. Чувство напир- анія внизъ.	Rupt. perin. Fluor albus. Endometrit. chron. Res. va- rita. спохъ.	15/х—опер. подъ хлороф. Abrasio. Col- porperin.-gtharphia.	Безлнх. Per prim.	14/х—выпис. Здорова.	—
39	1897 № 125.	С. 25 л. прач.	съ 11 л. 3½ н. 3—4 дн.	23	1	24	7 м.	Разр. пром. полн. щипцы зажит, не срос.	Норм.	Недержаниегазовъ и жидкаго стула. Бѣлн. Небольшое чувство напирания внизъ.	Rupt. peri. compl. et. recti, Ectropion. Retrover- sio ut. Resid. sin.	11/х—опер. подъ хлороф. Colporperin.- recto-gtharphia.	Безлнх. Per. prim. за исclud. поверх. расхожд. въ средн. части пром.	20/х—выпис. Здорова.	—
40	1897 № 129.	Э. 26 л. мѣщ. незам. прислуга.	съ 13 л. 3—4 н. 3 дн. слаб. съ болью.	20	2	22	9 м.	Разр. пром. полн. при I род. Щипцы, Экламсия.	Хворала 6 нед.	Недержание га- зовъ. Чувство напир- анія внизъ.	Rupt. perin. compl. Ante- versio ut. Res. parametrit.	15/х—опер. подъ хлороф. Colporperin.- recto-gtharphia.	Безлнх. Per prim.	14/х—выпис. Здорова.	—
41	1897 № 147.	П. 23 л. зам. дом. хоз.	—	—	1	23	1½ м.	Разр. пром.	Норм.	Разрывъ промеж- ности.	Rupt. per. Res. para- metrit.	15/х—опер. подъ хлороф. Colporperin.- gtharphia.	Безлнх. Per prim.	14/х—выпис. Здорова.	—
42	1898 № 29.	П. 24 л. ж. мироз. посреди двор. дом. хоз.	съ 13 л. 4 н. 7 дн.	20	2	20	3	Разр. пром. при II род. ягодич. полоз.	Хворала послѣ II род.	Боли въ поясницѣ. Бѣлн.	Rupt. perin. Residua. En- dometrit.	17/н—опер. подъ хлороф. Abrasio. Col- porperin. gtharphia.	Безлнх. Per prim.	1/н—выпис. Здорова.	—
43	1898 № 56.	А. 25 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 6 дн. сил. съ болью.	17	3	18	4	Разр. пром. при III род.	Хворала.	Боль въ животѣ и при coitus' ѣ. Частое моченсуксаніе. Бѣ- лн.	Rupt. perin. Endometrit. Resid. paraperimetrit.	10/н—опер. подъ хлороф. Colporperin. gtharphia.	Безлнх. Per prim.	20/н—выпис. Здорова.	—
44	1898 № 60.	С. 30 л. мѣщ. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 4 дн. слаб.	21	3	—	—	Разр. пром. щипцы.	Хворала послѣ II род.	Бѣлн. Разрывъ промежности.	Rupt. perin.	20/н—опер. подъ хлороф. Colporperin. gtharphia.	Безлнх. Per prim.	20/н—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лѣта, сос- ловіе, се- ншное по- ложене, занятіе.	Результ.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На какомъ году были первые роды.	Сколько лѣтъ на- задъ были послед- ніе роды.	Исходъ родовъ для больной.	Постродовой периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Операционный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послѣоперационное теченіе.	Какого числа выписана, Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
45	1898 № 61.	А. 22 л. крест. позам. прислуга.	съ 17 л. 4 н. 6—7 дн.	22	1	22	2 1/2 год.	Разр. пром. запнт., не срос.	Норм.	Боли въ промеж- ности. Провинистыя выделения.	Rupt. perin. Subinvolut. uteri.	21/4—опер. подл. хлороф. Colporperin- traphia.	Безлнх. Per prim.	13/4—выпис. Промеж. полнѣ воз- становл.	—
46	1898 № 112.	И. 41 г. крест. зам.	черезъ 4 н. 5 дн.	—	7 р. 1 вык.	—	—	Разр. пром.	Норм.	Боли внизу живо- та со время выли- дыша (3 г. н.). Пло- хо держитъ газы. Бѣлы. Обильныя крови.	Rupt. perin. Синистеръ вазій. Metrit. chron. Endo- metrit. chron.	22/4х—опер. подл. хлороф. Abrasio. Col- porperin.-traphia.	Безлнх. Per prim.	5/8—выпис. Здорова.	—
47	1899 № 13.	У. 33 л. зам. дом. хоз.	съ 12 л. 4 н. 5 дн.	—	9 р. 1 вык.	—	2 мѣс.	Разр. пром. прѣ 1 род. щипцы.	Норм.	Разрывъ промеж- ности.	Rupt. perin.	16/4—опер. подл. хлороф. Colporperin- traphia.	Безлнх. Per prim.	20/4—выпис. Здорова.	—
48	1899 № 14.	Н. 24 л. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 5 дн.	23	1	23	1	Разр. пром. полн. (быстр- роды).	Норм.	Недержание га- зовъ; была 3 раза оперирована, но бе- результатно.	Rupt. per. compl.	15/4—опер. подл. хлороф. Colporperin- recto-traphia.	Безлнх. Per prim.	20/4—выпис. Здорова.	—
49	1899 № 15.	Е. 18 л. ж. артиста. дом. хоз.	съ 13 л. 4 н. 3— 4 дн.	16	1	—	1	Разр. пром.	Хворала 2 мѣс.	Боли внизу живо- та Бѣлы. Чувство напряженія внизъ. Обильныя крови. Малокровіе.	Rupt. perin. Retroversio- flexio mob. Endometrit. Res. post. et lateralia dextra.	15/4—опер. подл. хлороф. Abrasio Col- porperin.-traphia.	Безлнх. Per prim.	24/4—выпис. Здорова.	Исслѣдована въ 1908 г., чувствовала себя хорошо годъ послѣ операціи. Теперь боли въ явн, бѣлы, плохо держитъ мочу. Годъ назадъ пѣ- ла мертвого ребен- ка. Разрыла не бы- ло. Промежн. со- стоятъ Retroversio и. фл. Erosion. Бѣ- лы. Выпад. ваг. нѣтъ.

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лета, состо- яние, семе- льное поло- жение, заня- тие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выздоровле- ний.	На которомъ году были первые роды.	Сколько летъ на- задъ были послед- ние роды.	Исходъ родовъ или болезней.	Послеродовой периодъ.	Анамнезъ, Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный мо- доть и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
50	1899 № 22.	Р. 36 л. вѣщ. зам. дом. хоз.	съ 13 л. 6 н. 4— 6 дн.	19	3	20	4	Разр. пром. полн. слаб. схватки при всѣхъ родахъ. Щипцы.	Норм.	Недержание га- зовъ и жидкого сту- ла. 4 раза запыла промежность, но по- следній разъ сред- нения не получи- лось.	Rupt. perin. compl. Resid. lateral, sin.	²³ / _{iv} —опер. подъ хлором. Colporerin- recto-rhaphia.	Безлнх. Per prim.	²⁷ / _{ii} —выпис. Здорова.	—
51	1899 № 55.	К.	—	—	—	—	—	Разр. пром.	—	—	Rupt. perin. Endometrit. chronica.	²⁷ / _{ii} —опер. подъ хлором. Abrasio Col- porerin-rhaphia.	Безлнх. Per prim.	²⁸ / _{ii} —выпис. Здорова.	—
52	1899 № 93.	Л. 28 л. ж. нижн. учитель- ница.	съ 13 л. 4 н. 4 дн.	26	1	27	1	Разр. пром. полн. Щипцы.	Хворала.	Недержание га- зовъ и жидкого стула.	Rupt. perin. compl.	²² / _{iv} —опер. подъ хлором. Colporerin- recto-rhaphia.	Безлнх. Per prim.	²⁷ / _{iv} —выпис. Здорова.	—
53	1899 № 114.	Г. 40 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 13 л. 5—6 н. 3 дн.	23	9 р. 1 вых.	23	8 м.	Разр. пром. щипцы при по- следъ. 2-хъ род.	Хворала послѣ последн. родовъ.	Больна съ 1 ро- додъ. Чувство нап- рянія внизу.	Rupt. perin.	²² / _{ix} —опер. подъ хлором. Colporerin- rhaphia.	Безлнх. Per prim.	²³ / _{ix} —выпис. Здорова.	—
54	1899 № 119.	А. 28 л. крест. песам. прислуга.	съ 14 л. 3—4 н. 6—7 дн. съ болью.	21	3	21	6 м.	Разр. пром.	Норм.	Со времени 1 ро- додъ (8 л. дав.) чувство напирати внизъ. Был. Бол внизу живота.	Rupt. perin. Endometrit. Erosio.	²¹ / _{ix} —опер. подъ хлором. Abrasio Col- porerin-rhaphia.	Безлнх. Per prim.	²² / _{ix} —выпис. Здорова.	—
55	1899 № 128.	С. 37 л. ж. врач. дом. хоз.	съ 12 л. 4 н. 5 дн. съ болью.	25	4	—	3	Разр. пром. при 1 род. не защит.	Хворала послѣ 1 родовъ. Родилья горячка.	Со времени 1 ро- додъ чувство нап- рянія внизъ. Болъ въ поясницѣ и внизу живота. Был. Dys- uria.	Rupt. perin. Metritis. Retroversio. Resid. post. Endometrit.	²⁵ / _{ix} —опер. подъ хлором. Abrasio Col- porerin-rhaphia.	Безлнх. Per prim.	¹⁹ / _{ix} —выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ. № листа.	Фамилия, гдѣ, сословіе, семейное положеніе, занятіе.	Регуляръ.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На которомъ году былъ первый родъ.	Сколько лѣтъ на задѣ была послѣдняя рожа.	Исходъ родовъ для больной.	Послеродовой періодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный методъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
56	1899 № 130.	Х. 37 л. арест. зам. хлѣбоба- пештовъ.	съ 15 л. 4 и 3 дн.	19	3	—	1½	Разр. пром. роды 3 сут.	Норм.	Со времени послѣднихъ родовъ боли въ животѣ. Неправильныя кров. Бѣли.	Rupt. perin. Endometrit. et metrit. chron. Metro-rhaphia. Res. parametrit.	½х—опер. подъ хлороф. Abrasio. Amput. col. uteri. Colporerin.-rrhaphia.	Безлнх. Рег. prim.	1½х—выпис. Здорова.	Послѣдовавъ въ 1908 г. Чувствуетъ себя до сихъ поръ хорошо. Бѣли роды съ разрыв. не защит. сімах. Промежи крѣпкая. Anteversio. Зондъ — 7 см.
57	1899 № 167.	І. 29 л. ж. врач. дом. хоз.	съ 14 л. 4 и 6 дн. съ болью.	18	4 р. 3 вык.	—	—	Разр. пром. при I род.	Норм.	Боли въ животѣ. Обычныя мѣсячныя.	Rupt. perin. Metritis. Endometrit. chronica Perisporhitis sin. Res. sin. et dextra.	¾х—опер. подъ хлороф. Abrasio. Colporerin.-rrhaphia.	Безлнх. одно по- вышеніе 30° Рег prim. кровъ поверх. расхожд. на 2-хъ швахъ на промежи.	2½х—выпис. Здорова.	Питетъ въ маѣ 1908 г., что чувствовала себя все время хорошо до новыхъ родовъ (1906 г.). Былъ разрывъ, защитъ, неполный сросся, чувствуетъ теперь выпаденіе.
58	1899 № 182.	А. 26 л. ж. сельска- го, служ- жить въ канцеляріи.	съ 14 л. 4 и, 3—4 дн.	18	4 р. 3 вык.	—	—	Разр. пром. II роды со щипцами.	Хворала послѣ II род.	Боли внизу живота. Около 3-хъ л. неправильныя регулы.	Rupt. perin. Erosiones col. Endometrit. catarrhalis. Res. pp.	¾х—опер. подъ хлороф. Abrasio. Colporerin.-rrhaphia.	Безлнх. Рег prim.	2½х—выпис. Здорова.	—
59	1899 № 188.	П. 34 л. ж. дворян. 3½ и 5 дн. съ болью сгуста.	съ 15 л. 3½ и 5 дн. съ болью сгуста.	17	1 р. 1 вык.	18	16	Разр. пром. ручное отдѣленіе послѣда.	Лихорад.	Около 10 лѣтъ чувство инвазіи внизъ. Боли внизу живота. Бѣли. Обычныя болѣзни. Кровя. Первыея явленія 6 л. страдала морвинизмомъ.	Rupt. perin. subcutanea. Retroversio ut. fix. Endometrit. et metrit. chron. Metritis collicularis. Resid. bilateral et postica periparametritides.	¾х—опер. подъ хлороф. Abrasio. Amput. col. Colporerin.-rrhaphia.	Безлнх. Рег prim.	1½х—выпис. Здорова.	—
60	1899 № 193.	М. 23 л. ж. фельд- шера.	съ 14 л. 4 и, 5—6 дн.	23	3	23	1½	Разр. пром при I род. запитъ, не срос.	Послѣ I род. родильн. горячка.	Со времени I родовъ чувство инвазіи внизъ (5 л. т. н.). Боли въ поясницѣ. Бѣли.	Rupt. perin. Endometrit. catarrhalis, Anteversio.	1½х—опер. подъ хлороф. Abrasio Colporerin.-rrhaphia.	Безлнх. Рег prim., кровъ спайки; на ¼ см. расхожд.	2½х—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, лета, сословие, семейное положение, занятие.	Родила.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году был первый род.	Сколько детей за последние 5 лет.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
61	1900 № 13	Ю. 24 л. ж. дворян. дом. хоз.	съ 10 л. по 6—7 дн. съ болюю.	20	3	21	5 м.	Разр. пром. подложный.	Лихорад.	Боли внизу живота съ посидящих родов. Б.м. Обильная, продолжительная кровь.	Rupt. perin. subcutan. Subinvolutio. Endometritis. Menorrhagia.	²³ /I—опер. под хлорое. Abrasio Colporerin-gtharpha.	Безлжх. Per prim.	⁵ /II—выпис. Промежи. состоят.	—
62	1900 № 22	К. 31 г. крест. пезам. прислуга.	съ 15 л. 4 п. 3—7 дн.	26	1	25	9 м.	Разр. пром.	Хворала 3 н.	3 мѣс. боли в животѣ и кровотечение.	Rupt. perin. Endometrit. decidual.	⁴ /II—опер. под хлорое. Abrasio Colporerin-gtharpha.	Безлжх. Per prim.	²⁰ /II—выпис. Здорова.	—
63	1900 № 42	В. 35 л. ж. надв. сов. дом. хоз.	съ 13 л. 3 н. 3—4 дн.	23	3 р.	—	—	Разр. пром. полн. послѣдн. роды—двойни.	Норм.	Чувство оупущения вниз и выпадения матки около 9 л., усиливающееся съ каждой беременностью.	Rupt. perin. compl. subcut. Anteversio.	²⁵ /II—опер. под хлорое. Colporerin-gestio-gtharpha (кожа надъ свитктеромъ разсѣчена по средней линии).	2 раза по вечерам. 38°. Per prim.	⁷ /II—выпис. Здорова.	—
64	1900 № 31	Д. 25 л. мѣщ. зам. дом. хоз.	Свѣдѣній нѣтъ.	—	—	—	—	Разр. пром.	—	Боли въ лѣвой паховой области.	Rupt. perin.	⁵ /III—опер. под хлорое. Colporerin-gtharpha.	Безлжх. Per prim.	¹⁰ /III—выпис. Здорова.	—
65	1900 № 119	Т. 34 л. вдова инж. дом. хоз.	съ 12 л. 4 н. 7 дн.	17	4 р. 1 вык. 1 вык. маточ. берем. 5 л. назд. лечен. консервативно.	—	11	Разр. пром. при послѣдн. родахъ.	Хворала. Грудница.	Больна 11 л. послѣ разрыва промежности.	Rupt. perin. Resid. ex graviditate extrauterinae sin. Киста Бартолиновыхъ железъ.	¹⁶ /IX—опер. под хлорое. Abrasio Colporerin-gtharpha. Extirpatio gl. Bartolini.	Безлжх. Per prim.	¹ /X—выпис. Здорова.	—
66	1900 № 163	Б. 31 г. вдова дпор. дом. хоз.	съ 12 л. 4 н. 7 дн. сна.	19	4 р. 1 вык. 1 вык. маточ. берем. 3 г. 7 м. назд.	—	10	Разр. пром. щипцы.	Норм.	Больна со времени аборта 9 л. т. наз. Обильная менструация.	Rupt. perin. Retroflex. ut. Iix. Hypertrophia cili ut. (небольшое удлиненіе).	⁷ /XI—опер. под хлорое. Abrasio-Amput. c. ut. Colporerin-gtharpha.	Безлжх. Per prim.	²⁵ /XI—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годы, № листа.	Фамилия, лета, социальное положение, занятие.	Регуляр.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На каком году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Постродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Постоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
67	1900 № 172	Е. 26 л. ж. овицера.	с 13 л. 4 н. 2 дн. слаб. с болью и с запахом.	17	2 р.	2 вык.	18	6	Разр. пром. I род. гортань; тромбоз вен; обильн. вог; лежала 3 мьс.	Около 6 лет чувство напряжения внизу живота и в пояснич. Блия. Dysuria	Rupt. perin. Retroversio mob. Endometrit. Motritis chron. Parametrit. sin.	²¹ /х—опер. под хлорс. Abrasio. Amput. clinoid. Перерезан рубец в левом параметрии, при чем было случайно вскрыто Дугласово пр. Colporerin.—trrhaphia.	3 раза по вечер. 38,5°. Per prim.	¹¹ /хп—выпис. Послеопер. состоят.	
68	1900 № 188	Ч. 31 г. ж. права дом. хоз.	с 13 л. 4 н. 4 дн.	22	3 р.	1 вык.	23	5	Разр. пром. при всех родах зажит., по плоху срос.	Недержание мочи при напряжении брюшного пресса при кашл. Небольши боли внизу живота.	Rupt. perin. Resid. post. dextra.	¹⁵ /хп—опер. под хлорс. Colporerin.—trrhaphia.	3 дня по вечер. 38°—38,4°. Per. prim.	²² /хп—выпис. Здорова.	Пометь в Mat 1908 г., что чувствует себя хорошо. Страдает сильной нервной раздражимости. Не рожала. Частые позывы на мочеиспускание.
69	1901 № 11	Б. 34 л. ж. инспект. гимназии дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 2—3 дн. с болью.	23	5 р.	2 вык.	24	4	Разр. пром. при I род. щипцы	Больна с последних родов. Боли в спине и живот. Пупочная грыжа.	Rupt. perin. Retroflex. ut m. Parametrit. chron. Hemia umbil.	¹⁴ /х—опер. под хлорс. Colporerin.—trrhaphia. Lapaotomia. Укорочение обильн. круглых связок наложением швов на 7—8 см.	Безлнх. Per. prim.	¹⁶ /хп—выпис. Промежн. восстановл. Матка долж. нормально.	
70	1901 № 12	Б. 43 л. ж. права дом. хоз.	с 13 л. 3 1/2 н. 4—3 дн с болью.	—	4 р.	1 вык.	—	—	Разр. пром. Хворала посл. I род.	Неправн. кровл. Два раза подвергалась Abrasiis.	Rupt. perin. Ectropion. Motrit. ut. et colli chron. Endometrit. Res. parametrit.	²² /хп—опер. под хлорс. Abrasio. Amput. c. Colporerin.—trrhaphia.	Безлнх. Per. prim. Abscessus labii majoris.	¹⁷ /хп—выпис. Здорова.	Послеопер. пров. С. в 1908 г. неподвиж. променжн. в прекращенном состоянии.
71	1901 № 46	В. 30 л. ж. инженер. технолога дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 3 дн.	16	7	—	7 м.	Разр. пром. при I и VII род.	Хворала посл. VII род.	Жалуется на разрыв променжн. со времени последних родов. Раньше подвергалась 3 раза восстановленю променжн.	Rupt. perin. Endometrit.	²¹ /хп—опер. под хлорс. Abrasio. Colporerin.—trrhaphia.	Безлнх. Per. prim.	²¹ /хп—выпис. Здорова.	

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, лѣта, сословіе, семейное положеніе, занятіе.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На сколько году были первые роды.	Сколько лѣтъ назадъ были послѣдніе роды.	Исходъ родовъ для больной.	Послеродовой периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность симптомовъ болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный методъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
72	1901 № 112	П. 26 л. ж. чиновн. дом. хоз.	съ 13 л. 4 н. 3 дн.	20	3 р. 1 вык.	21	2	Разр. пром. полн. при I родѣ. Не зашит.	Норм.	Недержание мочи и жидкаго стула со времени I родовъ. 3 г. наз. в Германіи было сделано зашиваніе, безрезультатно.	Rupt. perin. compl. et. recti (2 см.). Матка и придатки норм.	¹⁴ / _x —опер. подъ хлоро. Colporerin-rhaphia.	Безлх. Per prim.	²⁴ / _x —выпис. Здорова.	Плещетъ въ Маѣ 1908 г. что чувствуетъ себя хорошо. Имѣла 3 роды, съ разрывами, которые были зашиты и срослись. Только за послѣдній годъ замѣчается опущеніе во время.
73	1901 № 118	Я. 30 л. потомств. дворника зам. дом. хоз.	съ 15 л. 4 н. 3—4 н. съ больно.	21	3	22	2	Разр. пром. при I родѣ. Не зашит.	Норм.	Чувство жара и выдел. со I родовъ. Бѣ...	Rupt. perin. Endometrit. chron.	²⁵ / _x —опер. подъ хлоро. Abrasio Colporerin-rhaphia.	Безлх. Per prim.	¹⁹ / _x —выпис. Здорова.	Плещетъ въ Маѣ 1908 г. что чувствуетъ себя все время хорошо. Были роды, съ разрывами, который зашиты. Роды продолж. 16 часовъ.
74	1901 № 119	К. 32 л. ж. мѣщ. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 4 дн. съ больно.	21	2 р. 4 вык.	—	3	Разр. пром. подожж. (двойн.).	Норм.	Кровотеченіе. I-й дн. Больна мѣсяцъ.	Rupt. perin. subcutanea. Insufficiencia fundi pelvis. Abortus incompletus.	²² / _x —опер. подъ хлоро. Abrasio Colporerin-rhaphia.	Безл. Per prim.	⁵ / _x —выпис. Здорова.	Плещетъ, что чувствуетъ себя все время хорошо. Родовъ не имѣла. При ходьбѣ частые позывы къ мочеиспусканію.
75	1901 № 154	П. 32 л. ж. сапожн. дом. хоз.	съ 13 л. 4 н. 3 дн. съ больно.	30	1	31	1	Разр пром. полный щипцы зашит. не срос.	Хворала 2 мѣс.	Послѣ родовъ держаніе газовъ и жидкаго стула.	Rupt. perin. compl. Res. para-perimetrit.	²⁴ / _x —опер. подъ хлоро. Colporerin-rhaphia.	3 дня по вечерамъ 38°. Причина—внѣшечникъ. Per prim.	¹⁵ / _x —выпис. Состояніе удовлетвор.	
76	1902 № 86	К. 50 л. мѣщ. зам. дом. хоз.	съ 13 л. 4 н. 7—8 дн. 3 г. clim.	16	9 р. 2 вык. 2 преждевремен.	—	—	Разр. пром.	Норм.	Больна со времени 1 и 2 родовъ: жалуется на опущеніе тяжести при ходьбѣ.	Rupt. perin. Resid. para-perimetrit.	²⁰ / _x —опер. подъ эфир. (adposita cordis) Colporerin-rhaphia.	Безлх. Per prim.	¹⁷ / _y —выпис. Здорова.	

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, последнее положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На каком году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
77	1902 № 98.	Ц. 34 л. дом. хоз.	съ 16 л. 3—4 н. 6—7 дн. съ болью.	20	2	—	1	Разр. пром.	Лихорад.	Разрыв промежности при последних родах. Задер. Были. Капель.	Rupt. perin. Endometrit. Estription.	¹⁵ / _{ix} —опер. под хлороф. Abrasio. Colporerin.-trrhaphia.	2 раза температура выше 38°. Per. prim.	²⁷ / _{xii} —выпис. Промеж. состоит.	—
78	1902 № 163.	Ц. 33 л. крест. зам.	съ 14 л. 4 н. 3—4 дн. слаб.	20	11	—	—	Разр. пром.	—	Опушение около 5 лет.	Ruptura perin.	¹⁰ / _{xii} —опер. под хлороф. Colporerin.-trrhaphia.	Безлхор. Per prim., кроме небольшого расхождения на промежн.	²⁵ / _{xii} —выпис. Здорова.	—
79	1903 № 80.	Л. 33 л. двор. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 4—5 дн.	27	2	—	—	Разр. пром. съ I род.	Хворала.	Со времени I доз. боли в жив. и чувство напряжения. Были.	Rupt. perin. Endometrit.	¹⁰ / _{iv} —опер. без наркоза Abrasio. Colporerin.-trrhaphia.	Безлхор. Per prim., кроме поверхности, расхожд. на промежн. На промежн. образовалась свищ, из кот. выдв. гной и удален глубокой шов.	¹¹ / _v —выпис. Здорова.	—
80	1903 № 93.	С. 36 л. врач. зам.	съ 14 л. 3 1/2 н. 4—5 дн.	25	2	—	2	Разр. пром при II род. зашит. акушеркой.	Норм.	Со времени I родов боли в жив. и чувство тяжести напряжения во мал. лщц.	Rupt. perin.	²⁵ / _{iv} —опер. под наркозом. Colporerin.-trrhaphia.	Безлх. Per prim. Здорова.	³⁰ / _{iv} —выпис. Здорова.	—
81	1903 № 161.	Б. 30 л. ж. прис. повар. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 3—4 н. 3—4 дн.	20	5	21	1	Разр. пром. при II род. тшница.	Хворала посл. II род.	Боли внизу живота. Были.	Rupt. perin. Endometrit.	⁴ / _{xii} —опер. под хлороф. Abrasio. Colporerin.-trrhaphia.	Безлх. Per prim. Здорова.	²⁰ / _{xi} —выпис. Здорова.	—
82	1903 № 202.	К. 35 л. ж. горн. нижн. дом. хоз.	съ 11 л. 4 н. 4—5 дн.	23	6 раз. 1 вык.	24	3	Разр. пром. при I род. зашит.	Норм.	Чувство напряжения в промежн. и тшца постепенно. За последние 3 год. сильно исхудала. Были.	Rupt. perin. Retroversio mob. Hernia umbilicalis et lineae albae. Metritis chronica. Endometritis. Ren. mob.	¹⁰ / _{xii} —опер. под хлороф. Abrasio. Excisio c. et. Colporerin.-trrhaphia.	Безлхор. Per prim. кроме свищев. канала съ выдв. гноя.	²⁵ / _{xii} —выпис. Подл. наблюд. врача.	—

№ по порядку.	Год, № листа	Фамилия, имя, отчество, последнее положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На каком году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
83	1904 № 53	Ф. 35 л. ж. чинов. дом. хоз.	съ 17 л. 4 н. 3 дн.	20	4 р. 2 вык.	21	—	Разр. пром. полн. при II род.	Норм.	Недержание газов и кала со времени 2 родов (10 л. наз.). Б.лн.	Rupt. perin. completa. Metrit. coli. Endometrit.	⁹ / ₁₀ in—опер. подь хлороф. Colporerin-recto-rhaphia et Abrasio.	Безлхор. Per prim. кровяч. расхлжд.	²⁴ / ₁₀ in—выпис. Здорова.	—
84	1904 № 74	О. 35 л. ж. крест. зам.	съ 17 л. 4 н. 6 дн. съ болью.	21	2	22	3	Разр. пром. полн. при II род.	Норм.	Со времени 2 родов (3 г. наз.), недержание газов и каловых масс. Б.лн. Боли во время регулы.	Rupt. perin. compl. Anteflexio. Oophoritis sin. Endometrit.	¹⁵ / ₁₀ in—опер. подь хлороф. Abrasio. Colporerin-recto-rhaphia.	Одно повышение 38,4°. Поверхн. расхлжд. на больш. пространствах per granul.	¹¹ / ₁₀ in—выпус. Здорова.	—
85	1904 № 75	К. 34 л. ж. няжен. дом. хоз.	съ 15 л. 4 н. 3—6 дн. слаб.	24	3 р. 1 вык.	25	2	Разр. пром.	Норм.	Больна около 4 л. после выкидышей и боли в менструац.	Rupt. perin. Endometrit.	¹⁵ / ₁₀ in—опер. подь хлороф. Abrasio. Colporerin-rhaphia.	Безлх. Per prim.	²⁴ / ₁₀ in—выпус. Здорова.	—
86	1904 № 124	С. 40 л. ж. ваова чернораб. няня.	съ 12 л. 4 н. 3—7 дн. сил. исправ.	20	2	21	11 л.	Разр. пром.	Норм.	Болезненные менструац. Б.лн.	Rupt. perin. Endometrit. hyperplastica.	²⁵ / ₁₀ in—опер. подь хлороф. Abrasio. Colporerin-rhaphia.	Безлх. Per prim.	¹¹ / ₁₀ in—выпус. Здорова.	—
87	1904 № 139	П. 37 л. ж. крест. зам. дом. хоз.	съ 20 л. 3—4 н. 6 дн. сил. съ болью.	28	6	28	6 нед.	Разр. пром. полн. при V род.	Норм.	Недержание газов и кала (3 года).	Rupt. perin. compl.	⁴ / ₁₀ in—опер. подь хлороф. Colporerin-recto-rhaphia.	Безлх. Per prim.	¹⁷ / ₁₀ in—выпус. Здорова.	—
88	1904 № 185	Я. 20 л. ж. крест. незам. сестра милосердия.	съ 11 л. 4 н. 7—10 дн. сил.	17	1	18	1 1/2 г.	Разр. пром.	Дихор. выд. блан.	Со времени родов обильная кровяная запоры.	Rupt. perin. Ectropion. Metrit. calli. Endometrit. Perimetrit.	²⁵ / ₁₀ in—опер. подь хлороф. Abrasio. Amput. с Colporerin-rhaphia.	Безлх. Per prim.	¹⁵ / ₁₀ in—выпус. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, лета, социальное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На каком году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Источ. родов. для болей.	Постродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болей.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Постоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
89	1904 № 196	У. 29 л. ж. миров. судья, дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 1—2 н. слаб. с 16 л. болью.	22	2	23	4	Разр. пром. при II род.	Subinvolut.	Боли внизу живота и в пояснице. Бьдл.	Rupt. per. Endometrit. Res. pr. metrit. dextra et post.	⁴ /х—опер. под хлором. Abrasio. Colporerin-triaphia.	Безлх. Per prim.	¹⁷ /х—выпис. Здорова.	Пипетъ въ Маѣ 1908 г., что чувствует себя все время хорошо. Был выкидышь и роды с небольшим разрывом, который был зашит и сросся.
90	1904 № 222	К. 23 к. двор. вдова, дом. хоз.	с 13 л. 4 н. 4 дн. слаб.	17	2	18	—	Разр. пром.	Норм.	Боли въ животѣ. Бьдл.	Rupt. ptrin. Endometrit. chron. Resid. sin. sin et dextra.	²⁹ /х—опер. под хлором. и энтр. Abrasio Colporerin-triaphia.	2 повыш. 39, 2° и 38° Per prim.	¹² /х—выпус. Здорова.	—
91	1904 № 239	К. 40 л. зам. дом. хоз.	с 14 л. 5—6 дн. 4 н. сил.	22	8 р. 1 вык.	22	6	Разр. пром.	Хворала.	Боли въ животѣ. Бьдл. Больна 3 года.	Rupt. perin. Diastasis lin. alb. Residua. Anteflexio. Endometrit.	¹² /х—опер. под хлором. Abrasio. Colporerin-triaphia.	Безлх. Per prim.	⁹ /х—выпис. Здорова.	Пипетъ въ Маѣ 1908 г., что отрицает сделанную ей операцию и признает какую-то другую. Потому и не дает о себѣ свѣдѣній.
92	1904 № 267	Д. 33 л. акуш. зам.	с 15 л. 4 н. 6—7 дн. сил.	24	4 р. 1 вык.	25	—	Разр. пром.	Subinvolut.	Около 9 л. сильныя менструал.	Rupt. perin. subcutan. Endometrit hemorrhag.	⁷ /х—опер. под хлором. Abrasio. Colporerin-triaphia.	2 повыш. 38,8° и 38° Per prim.	²⁹ /х—выпис. Здорова.	—
93	1904 № 270	П. 35 л. вдова служивъ въ винномъ складѣ.	с 16 л. 4 н. 7 дн. слаб.	23	5	24	10 м.	Разр. пром. зашит. не срос.	Норм.	2 мѣсяца бои въ поясницѣ и недержаніе газовъ. Бьдл.	Rupt. perin. Старую рубцу отъ неудачно зашитой промежи. Residua. Endomet.	²⁹ /х—опер. под хлором. Abrasio. Colporerin-triaphia.	Безлх. Per prim. кровь одного шва.	¹⁷ /х—выпис. Здорова.	—
94	1905 № 6	М. 35 л. зам. заплм. шитьемъ.	с 18 л. 3—4 н. 3 л.	23	2	25	8	Разр. пром.	Хворала послѣ I род.	Боли въ паху. Недержаніе мочи при кашлѣ.	Rupt. perin. subcutanea. Periophoritis duplex et salpingitis duplex.	²⁴ /х—опер. под хлором. Colporerin-triaphia.	Безлх. Per prim.	⁹ /н—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, дата, словное, семейное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На каком году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
95	1905 № 38	Б. 25 л. ж. п.самоц. дом. хоз.	с/в 16 л. неправи. сроки 7—8 дн. сил. сь болью.	19	3 р. 1 вык.	20	10 м.	Разр. пром.	Норм.	Выпадение влагалища, ощущение маятн. Б/лн. Сильное кровотечение.	Rupt. perin. subcutan. Retroflexio ut mob. Endometri. hemorrag.	¹ / ₁₁ —опер. под/хлороф. Abrasio. Colporerin-trharphia.	Безлнх. Per prim.	²⁹ / ₁₁ —выпис. Здорова.	Пиннетъ въ Маѣ 1908 г., что изслѣдована врачомъ. Послѣдній констатируетъ Retroflexio ut. и беременность 2 мѣс.
96	1905 № 68	В. 35 л. ж. свянц. дом. хоз.	с/в 15 л. 4 н. 7—8 дн.	21	7	21	—	Разр. пром. при I род. щины.	Норм.	Больна 14 л. с I родовъ.	Rupt. perin.	² / ₁₁ —опер. под/хлороф. Colporerin-trharphia.	Безлнх. Per prim.	¹¹ / ₁₁ —выпис. Здорова.	Пиннетъ въ Маѣ 1908 г., что чувствуетъ себя все время хорошо. Не рожала.
97	1905 № 73	Л. 35 л. ж. учнт. дом. хоз.	с/в 15 л. 3 ¹ / ₂ —4 н. 8 дн. слаб.	18	3	19	—	Разр. пром.	Хворала послѣ родовъ.	Около года чувство напирания внизу живота и неправильная кровь.	Rupt. perin. subcutan. Ectropion. Endometrit. hyperplast. Erosiones.	⁴ / ₁₁ —опер. под/хлороф. Abrasio Amput. с. Colporerin-trharphia.	Безлнх. Per prim.	¹⁹ / ₁₁ —выпис. Здорова.	Пиннетъ въ Маѣ 1908 г., что все время чувствуетъ себя хорошо. Родовъ не имѣла.
98	1905 № 75	Ш. 33 г. ж. учнт. дом. хоз.	с/в 12 л. 4 н. 3 дн.	16	1 р. 5 вык.	17	16	Разр. пром.	Норм.	Около 10 л. не правильная кровь и чувство напирания внизъ.	Rupt. perin. Endometrit.	⁹ / ₁₁ —опер. под/хлороф. Abrasio. Colporerin-trharphia.	Безлнх. Per prim.	¹⁷ / ₁₁ —выпус. Здорова.	—
99	1905 № 106	С. 20 л. немал. дом. хоз.	с/в 16 л. 4 н. 5—6 д. сил. сь болью.	19	1	20	2 м.	Разр. пром. полн. щинцы зашит. не срос.	Норм.	Подержание газова и жидкаго стула.	Rupt. perin. compl.	²⁵ / ₁₁ —опер. под/хлороф. Colporerin-gesto-trharphia.	Безлнх. Per prim.	¹⁵ / ₁₁ —выпис. Здорова.	—
100	1905 № 110	З. 37 л. мѣщ. зам. дом. хоз.	с/в 16 л. 3—4 н. 5—4—3 дн. иногда сь болью.	21	3	22	14	Разр. пром. послѣ I род.	Норм.	Боли въ крестцѣ. Напирание внизъ.	Rupt. perin. Insufficiencia fundi pelvis. Ectropion. Endometrit. Retroversio fix. Periophoritis duplex.	²⁵ / ₁₁ —опер. под/хлороф. Abrasio Amput. с. (судачайно вскрытъ задній сводъ). Colporerin-trharphia.	Безлнх. Per prim.	¹⁵ / ₁₁ —выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, летъ, со- словие, се- ловенное по- ложение, занятие.	Результ.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На которомъ году были первые роды.	Сколько летъ на- задъ были послед- ние роды.	Носить родовъ для боляной.	Послеродовой периодъ.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статусъ и диагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана Состояние при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
101	1905 № 113	Б. 27 л. ж. купца дом. хоз.	съ 12 л. 3½ н. 6—7 дн. сил.	17	2 р. 1 вык.	18	5	Разр. пром.	Норм.	Боли внизу живота. Бѣлы. Частое мочеиспускание. Обильная менструальная.	Rupt. perin. Insufficiencia fundi pelvis. Endometrit. Retroflexio mob. Res. pp.	1/iv—опер. подъ хлороф. Abrasio Colporerin-rrhaphia.	Per prim. съ 15-го дня по 20-ое Typhus abortiv. Лечение массажемъ.	19/iv—выпис. Здорова.	—
102	1905 № 121	Р. 39 л. ж. чиновн. дом. хоз.	съ 12 л. 3½ н. 5 дн. слаб. съ болью.	38	1	39	2 м.	Разр. пром. боли, шпиды зашит. не срос.	Лихорад.	Недержание газов и жидкого стула с времени родовъ.	Rupt. perin. completa. Fistula recto vaginalis.	1/iv—опер. подъ хлороф. Colporerin-recto-rrh. et Fistulo-rrhaphia.	Безлнх. Per prim.	19/iv—выпис. Здорова.	—
103	1905 № 125	Б. 34 л. ж. провиз. дом. хоз.	съ 15 л. неправил. 3 л.	24	3	26	1	Разр. пром. 2 раза шпиды.	Лихорад.	Разрывъ промежности. Бѣлы.	Rupt. perin. Endometrit. Retroversio.	11/iv—опер. подъ хлороф. Abrasio. Colporerin-rrhaphia.	Безлнх. Per prim.	19/iv—выпис. Здорова.	—
104	1905 № 137	Ф. 32 л. ж. незам. дом. хоз.	съ 16 л. 4 н. 5 дн. съ болью.	18	1	—	—	Разр. пром. шпиды.	Норм.	Боли въ паху. Недержание мочи. Бѣлы.	Rupt. perin. subcutan. Endometrit. Res. paraperimetrit.	17/iv—опер. подъ хлороф. Abrasio. Colporerin-rrhaphia.	Безлнх. Per prim.	15/iv—выпис. Здорова.	—
105	1905 № 197	Ш. 45 л. ж. надв. сов. дом. хоз.	съ 12 л. 4 н. 5— 7 дн. сил. съ болью.	18	3 р. 1 вык. 1 пре- ждовр.	—	—	Разр. пром.	Хворала послѣ преждеврем. родовъ.	Боли въ поясницѣ. Бѣлы. Обильная менструальная.	Rupt. perin. subcutanea. Endometrit. polyosa Metritis colli.	19/x—опер. подъ хлороф. Abrasio. Amput. с. Colporerin-rrhaphia.	Безлнх. Per prim.	18/x—выпис. Здорова.	Излѣчена докторомъ С.—хорошее состояние беременности.
106	1905 № 221	Ч. 34 л. двор. зам. дом. хоз.	съ 15 л. 5 н. 6—7 дн.	—	5 р. 1 вык.	—	3	Разр. пром.	Послѣ послѣд. родовъ 6 нед.	Бѣлы. Боли крестца.	Rupt. perin. subcutanea. Endometrit. chron. Ectropion. Erosiones. Residua post. sin.	19/xi—опер. подъ хлороф. Colporerin-rrhaphia.	Безлнх. Per prim.	18/x—выпис. Здорова.	Пашеть въ Маѣ 1908 г., что страдаетъ нервными болями въ позвоночникѣ. Родовъ не было.
107	1905 № 223	Т. 44 л. зам. дом. хоз.	съ 17 л. 4—5 дн.	19	6	20	8	Разр. пром.	Послѣ послѣд. родовъ Subinvolut.	Выпадение матки.	Rupt. perin. subcut. Metrit. colli.	18/x—опер. подъ хлороф. Abrasio. Amput. с. Colporerin-rrhaphia.	Безлнх. Per prim.	19/x—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, социальное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На каком сроке были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Интервалы родов для болей.	Постродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность, симптомы болей.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и в каком числе была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
108	1905 № 240	О. 24 л. двор. зам. дом. хоз.	с 15 л. 4 н. 3—4 дн.	19	2	20	2	Разр. пром.	Норм.	Боли внизу живота.	Rupt. perin. subcutanea.	² / ₁ х—опер. под хлороф. Colporperin.-triphaphia.	Безлжх. Per prim.	² / ₁ х—выпис. Здорова.	—
109	1905 № 262	Н. 30 л. ж. капитана дом. хоз.	с 13 л. 4 н. 6—7 дн. сил.	18	5	18	1 г.	Разр. пром. при I род. зашит. не сред.	Норм.	Боли в пояснице и чувство наполнения в области крови.	Rupt. perin. Retroversio ut. Endometrit.	² / ₁ х—опер. под хлороф. Abrasio. Colporperin.-triphaphia.	Безлжх. Per prim.	²² / ₁ х—выпис. Здорова.	—
110	1905 № 290	Р. 32 л. двор. зам. дом. хоз.	с 15 л. 4 н. 5 дн.	26	2	27	11 м.	Разр. пром.	Норм.	Ощущение выпячивания прямой кишки. Бьлж.	Rupt. perin. subcutanea. Endometrit.	² / ₁ х—опер. под хлороф. Abrasio. Colporperin.-triphaphia.	Безлжх. Per prim.	¹⁷ / ₁ х—выпис. Здорова.	Наследована доктором С.—Чувствует себя хорошо. Промежи. состоятельна.
111	1905 № 308.	Н. 27 л. мещ. зам. дом. хоз.	с 13 л. 4 н. 2—3 дн.	16	1	16	11	Разр. пром.	Лихорад. кровянист. выдлж. 2 мьс.	Боли внизу живота. Болзненн. coitus.	Rupt. perin. Residua paraperimetrit.	²² / ₁ х—опер. под хлороф. Colporperin.-triphaphia.	Безлжх. Per prim.	¹⁶ / ₁ х—выпис. Здорова.	—
112	1906 № 19	Д. 26 л. крест. зам. дом. хоз.	с 16 л. 4 н. 5—6 дн. сил. сь болью.	—	3	—	4 м.	Разр. пром. при II род.	Норм.	Чувство опущения. Бьлж.	Rupt. perin. Endometrit. Metrit. coll. Ectropion. Residua pp. metrit. sin.	¹⁶ / ₁ х—опер. под хлороф. Abrasio. Amput. c. Colporperin.-triphaphia	Безлжх. Per prim.	²⁹ / ₁ х—выпис. Здорова.	Наследована вь Маѣ 1908 г. Чувствует себя хорошо. Retroversio ut. тов. Промежность—3 опережность вальда. Родидва нл. ¹⁶ / ₁ х—1909 г. истамлено кольцо. Матка Anteverso. Кольцо удалено.
113	1906 № 104	С. 25 л. ж. чиновн. дом. хоз.	с 12 л. 3 н. 5 дн.	18	2	19	5	Разр. пром. полн. при I род. не зашит.	Норм.	Недержаниегазо и жидкаго стула.	Rupt. perin. completa.	⁵ / ₁ х—опер. под хлороф. Colporperin.-recto-rrh.	Безлжх. Per prim.	²⁰ / ₁ х—выпис. Здорова.	Пиметь вь Маѣ 1908 г., что чувствует себя все время хорошо. Родовь не было.

№ по порядку.	Годы. № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Постродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность симптомов болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Постоперационное течение.	Какого числа выписана, Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
114	1906 № 115	С. 50 л. ремеслен. вдова	с 13 л. 4 н. 3 дн. сил.	22	8 р. 1 вык.	24	—	Разр. пром. полн. при I род.	Норм.	Полный разрыв 30 л. т. наз. Роды тот же раз на 30 л. т. наз. С 30 л. т. наз. времени недержания газов и жидкого стула. Обильная кровь.	Rupt. perin. completa. Endometrit. hyperplast.	¹² /II—опер. под хлороф. Abrasio. Colporerin-recto-rrh.	Безлх. Per prim.	¹ /V—выпис. Здорова.	Исследована в 1908 г. Чувствует себя хорошо. Месечные продолжают. Промежность и anus норм.
115	1906 № 123	К. 26 л. ж. нижн. дом. хоз.	с 12 л. 4 н. 5 дн. сил.	24	2 24	1	Разр. пром. полн. при I род. цинцы зашит. не срос.	Хворала.	Недержание и жидкого стула. Били.	Rupt. perin. completa Endometrit.	²⁵ /II—опер. под хлороф. Abrasio. Colporerin-recto-rrh.	Безлх. Per prim.	⁴⁰ /II—выпис. Здорова.	—	
116	1906 № 148	Р. 37 л. ж. купца дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 3—4 дн. сь болью.	22	4 23	8	Разр. пром.	Хворала.	Боли внизу живота. Чувство напирания вниз.	Rupt. perin. Endometrit. Res. pp. metrit.	¹⁶ /IV—опер. под хлороф. Colporerin-rrhaphia	3 дня повышен. темп. 38° Per prim.	⁶ /V—выпис. Здорова.	—	
117	1906 № 154	Г. 25 л. мѣщ. зам.	с 13 л. 4 н. 4—6 л.	21	2 22	—	Разр. пром. полн. при I род. цинцы зашит. не срос.	—	С 1 родов недержание газов и жидкого стула.	Rupt. perin. completa.	¹⁵ /IV—опер. под хлороф. Colporerin-recto-rrh.	Безлх. Per prim. кроме спайки.	²⁵ /V—выпис. Здорова.	—	
118	1906 № 200	К. 50 л. мѣщ. зам.	с 14 л. 4 н. 4—5 л.	20	7 21	12	Разр. пром. при I род.	Норм.	После 1 род (30 л. наз.) чувств. напирания вниз.держание мочи напряжении брюшного пресса, холодности и т. п. Били.	Rupt. perin. Endometrit.	¹⁵ /V—опер. под хлороф. Abrasio. Colporerin-rrhaphia.	Безлх. Per prim.	²⁶ /V—выпис. Здорова.	—	
119	1906 № 218	П. 39 л. крест. зам. хлѣбопашествомъ.	с 13 л. 3 н. 7 дн. сил.	20	1 39	4 м.	Разр. пром. роды ² / ₂ сут. цинцы.	Норм.	Недержание мочи. Рвз. внизу живота. Били. Обильная сечыва.	Rupt. perin. Incontinentia urinae. Res pp. metrit. sin. Endometrit.	¹⁵ /IX—опер. под хлороф. Abrasio. Colporerin-rrhaphia.	Безлхор. Per prim. Лечилась массажемъ.	²³ /X—выпис. Моча удерживается лучше.	—	

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилія, лѣта, со- словіе, се- мейное по- ложене, занятіе.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На которомъ году были первые роды. Сколько лѣтъ на- задъ были послѣд- ніе роды.	Исходъ родовъ, больной.	Послѣдовой періодъ.	Анамнезъ. Жалобъ, давность и симптомы болезни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послѣоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
120	1906 № 220.	П. 32 л. двор. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 3 дн.	27	1	29	3	Разр. пром. полн. роды 42 час. щипцы высок.	Лихорад. Недержание газова- го и жидкаго стула. Бѣл. Боли въ поясницѣ и въ крестцѣ и въ промеж- ности. Общія слабость и неспособность къ фи- зическому труду.	Rupt. perin compl. Fis- tula recto-vaginal. Endo- metrit.	¹⁴ /x—опер. подъ хлороз. Abrasio. Colporerin—recto-rh. et Fistulo-rhaphia.	Безлнх. Per prim.	²⁵ /x—выпис. Здорова.	Исследована въ Матъ 1908 г. Чув- ствуетъ себя хо- рошо. Промеж- ность крѣпкая.
121	1906 № 222.	К. 36 л. двор. зам. дом. хоз.	съ 13 л. 4 н. 5 дн. снл. съ болью.	18	5 р. 2 вык.	19	8	Разр. пром. полн. при I род.	— Боли внизу живота и въ поясницѣ. Бѣл. Недержание мочи. Запоры.	Rupt. perin. Resid. para- metrit post. et dextra. Endometrit.	¹⁴ /x—опер. подъ хлороз. Abrasio. Colporerin—rhaphia.	Безлнх. Per prim.	²⁵ /x—выпис. Здорова.	Исследована въ Матъ 1908 г. Чув- ствовала себя пер- вое время хорошо, а потомъ снова частыя позывы на мочу. Промежность состоит. Climax.
122	1906 № 229.	П. 29 л. зубн. врач. зам.	съ 16 л. 4 н. 2 дн. слаб.	22	1	23	6	Разр. пром. полн. щипцы не срос.	Хворала. Недержание газова- го и жидкаго стула. Бѣл. Безплодіе послѣ родовъ.	Rupt. perin. compl. Res. pp. metrit. Endometrit.	¹⁴ /x—опер. подъ хлороз. Abrasio. Recto-perin. rhaphia (въ виду уцѣлѣвшей спайки влагалища).	Безлнх. Per prim. кромѣ небольш. по- верх. расколд.	²⁵ /x—выпис. Здорова.	—
123	1906 № 231.	Т. 32 л. зам. дом. хоз.	съ 16 л. 36 н. по 5—6 дн.	25	2 р. 1 вык. (3 м. наз.).	26	3	Разр. пром. при I род. щипцы.	Subin- volut. послѣ I род.	Rupt. perin. Endometrit. decidualis.	²² /x—опер. подъ хлороз. Abrasio. Colporerin—rhaphia.	Безлнх. Per prim.	¹⁴ /x—выпис. Здорова.	Плнеть въ Матъ 1908 г., что чув- ствуетъ себя все время хорошо. Не рожала.
124	1906 № 278.	Л. 33 г. вдова дом. хоз.	съ 13 л. 3 1/2 н. 5—6 дн. снл.	21	3	22	7	Разр. пром.	Норм.	Rupt. perin. Ectropion. Retroversio mob.	¹⁴ /x—опер. подъ хлороз. + ⊙. Abra- sio. Amput. c. Col- porerin—rhaphia.	Безлнх. Per prim.	¹⁴ /x—выпис. Здорова.	Плнеть, что со- вершенно здорова.
125	1906 № 301.	П. 34 л. ж. капитана дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 7 дн.	—	4 р. 1 вык.	—	1 г. 3 м.	Разр. пром. при по- слѣд. род. щипцы.	—	Rupt. perin. Ednometrit.	²⁷ /x—опер. подъ хлороз. Abrasio. Colporerin—rhaphia.	Безлнх. Per prim.	¹⁴ /x—выпис. Здорова.	Плнеть въ Матъ 1908 г., что чув- ствуетъ себя удо- влетворительно. Не рожала.

№ по порядку.	Годы. № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регулярно.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На каком году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Носодат родов для боляной.	Последней период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.
126	1906 № 356	Т. 23 л. зам. дом. хоз.	с 15 л. 4 н. 4 дн. слаб.	18	4	20	4	Разр. пром.	Норм.	2 г. боли внизу живота. Был.
127	1906 № 360	П. 30 л. крест. зам. дом. хоз.	с 19 л. 4 н. 5 дн. сил.	19	5 р. 1 вык.	20	8 м.	Разр. пром. при I род., а при III род. боли.	Норм.	5 л. недержание газов, кала и мочи.
128	1906 № 364	К. 28 л. ж. капитана двор. дом. хоз.	с 12 л. 4 н. 3—4 дн.	25	1 р. 1 вык.	28	2 м.	Разр. пром. боли. двинцы роды трудн. 68 час. зшит., но не срое.	Норм.	Недержание газов и жидкого стула. Был задний выд. первого положения; ребенок 4,710 гр. Сделана перинеотомия. Разрыв перешей на кинку при извлечении.
129	1906 № 372	К. 30 л. крест. зам. чернораб.	с 17 л. 3 н. 7 дн. сил.	20	6	21	8 нед.	Разр. пром. I род. двинцы V—двойни.	Норм.	С последних родов (8 нед.) недержание мочи.
130	1906 № 381	К. 34 л. ж. инжен. женщ. врач.	с 15 л. 4 н. 4—5 дн.	21	3	22	2 ч.	Разр. пром.	Норм.	Неправильный и аров.
131	1906 № 382	Ш. 30 л. ж. врача зубн. врач.	с 13 л. 4 н. 5 дн. сил.	21	2 р. 2 вык.	22	5 м.	Разр. пром. при II род.	Лихорад. пост. II род.	Боляна с последних родов. Чувство напряжения в киш. Частое мочеиспускание. Был запор. Был внизу живота.

Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
Rupt. perin. subcutan. Parametrit. sin.	¹ / ₂ хл—опер. под хлором. Abrasio. Colpoperin—rthaphia.	Безлих. Per prim.	¹ / ₂ хл—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. compl.	¹ / ₂ хл—опер. под хлором. Colpoperin—recto—rth.	Безлих. Per prim. кровь маляна, сыща на промежя.	¹ / ₂ хл—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. compl. Retroversio mob. Fistula recti.	¹ / ₂ хл—опер. под хлором, и под звуки органа. Colpoperin—recto—rth.	Безлих. Per prim.	¹ / ₂ хл—выпис. Здорова.	Пометь в Маѣ 1908 г., что чувствует себя все время очень хорошо. Не рожала.
Rupt. perin. subcutan.	¹ / ₂ л—опер. под хлором. Colpoperin—rthaphia.	Безлих. Per prim.	¹ / ₂ л—выпис. Лучше удерживает мочу.	Пометь что чувствует себя хорошо. Был выкид. и роды. Жалуется на легкое расстройство мочеиспускания.
Rupt. perin. Endometrit. chronica.	¹ / ₂ хл—опер. под эвир. Abrasio. Colpoperin—rthaphia.	Безлих. Per prim.	¹ / ₂ хл—выпис. Здорова.	Испытана колдой: чувствует себя хорошо. Промежность состоит.
Rupt. perin. Retroflexio. Resid. post. Endometrit. Parametrit.	¹ / ₂ хл—опер. под хлором, и эвир. Abrasio (случайно перорид. захлг) Colpoperin—rthaphia.	Безлих. Per prim.	¹ / ₂ л—выпис. Здорова.	Пометь в Маѣ 1908 г., что чувствует себя удовлетворительно. Не рожала.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На, котором году был первый род.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов, для большой.	Последовательность.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
132	1906 № 384.	У. 28 л. двор. зам. учителя.	с 14 л. 4 н. 3—4 дн.	23	1	28	3 м.	Разр. пром. щипцы не срос.	Лихорад.	Недержание газов и боли в Аппенд. около 3 мес.	Rupt. perin.	²⁰ / _{хл} —опер. подь хлороэ. Coloproperin-rhaphia.	Безлих. Per prim.	¹ / ₄ —выпис. Здорова.	Пометъ въ Маѣ 1908 г., что чувствуетъ себя хорошо. Не рожаа.
133	1907 № 2	А. 42 л. ж. директ. гимназiи дом. хоз.	с 14 л. 3 н. 6—7 дн. сил.	21	4 р. 1 преждевр. 1 вык.	22	4	Разр. пром.	Норм.	Около 4 л. обильная кровь. Зудъ в половых частях.	Rupt. perin. Широкое разие половой щели. Endometrit. hemorrhag.	⁹ / ₄ —опер. подь хлороэ. Abrasio. Coloproperin-rhaphia.	Безлих. Per prim.	²⁰ / ₄ —выпис. Здорова.	—
134	1907 № 31	Р. 28 л. дух. завн. дом. хоз. зам.	с 12 л. 3 н. 5 дн. сил.	22	2	25	1 1/2 г.	I роды щипцы поли. разр. пром. зашит. не срос.	Закупорка вѣтъ послѣ зашит. I род.	Со времени I родовъ размиръ промежности (3 г. нал.) Недержание газовъ жидкаго стула.	Rupt. perin. compl. Retroversio fix.	²⁰ / ₄ —опер. подь хлороэ. Recto-Coloproperin-rhaphia.	Безлих. Per prim.	¹⁵ / ₄ —выпис. Здорова.	Пометъ въ Маѣ 1908 г., что чувствуетъ себя все время хорошо. Родовъ не имѣла.
135	1907 № 40	Д. 39 л. двор. зам. дом. хоз.	с 13 л. 4 н. 5 дн.	28	2 р. 1 вык.	28	9	Разр. пром.	Послѣ II род. 2 мес. кровоотдѣ.	Около 6 л. обильная кровь, частое мочеиспускание, боли и запоръ.	Rupt. perin. Endometrit. Residia post. et. dextra. Dysuria.	²¹ / ₄ —опер. подь хлороэ. Abrasio. Coloproperin-rhaphia.	Безлих. Per prim.	¹⁵ / ₄ —выпис. Здорова.	—
136	1907 № 102	Т. 30 л. ж. двор. дом. хоз.	с 14 л. 4 1/2 н. 3—5 дн. сил. небольши. боли передъ регулами.	22	4 р. 1 преждевр. 2 вык.	23	1 г. 2 м.	Разр. пром.	Лихорад. кровоотдѣ.	Около 5 л. чувств. напирания внизъ. Обильная регулы. Запоры. Общая слабость.	Rupt. perin. subcutan. Endometrit.	⁹ / ₄ —опер. подь хлороэ. + О. Abrasio. Coloproperin-rhaphia.	Безлих. Per prim.	²⁷ / ₄ —выпис. Здорова.	Пометъ въ Маѣ 1908 г., что чувствуетъ себя все время хорошо. Не беременела.
137	1907 № 117	А. 38 л. ж. купца. дом. хоз.	с 12 л. 4 н. 6—7 дн.	23	4	23	11	Разр. пром.	Норм.	4 г. боли въ поясницѣ и внизу живота. Чувство напирания внизъ. Бѣли.	Rupt. perin. subcutan. Metritis colli. Retroversio. Res. pp. metrit. sin. et post.	²¹ / ₄ —опер. подь хлороэ. Coloproperin-rhaphia.	Безлих. Per prim. кроме небольш. расхожда.	¹⁰ / ₄ —выпис. Здорова.	—
138	1907 № 133	Б. 45 л. зам.	с 14 л. 4 н. 6 дн. сил.	25	4 р. 1 преждевр. 1 вык.	26	8	I роды щипцы разр. пром.	Кровоточение.	2 г. обильная кровь и недержание мочи.	Rupt. perin. Endometrit. chron. Res. pp. metrit. sinistra.	²⁰ / ₄ —опер. подь хлороэ. Abrasio. Coloproperin-rhaphia	Безлих. Per prim.	⁷ / ₄ —выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа	Фамилия, дата, со- словие, се- мейное по- ложение, завятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и вынашив.	На которых году были первые роды. Сколько лет на- зад бы последние роды.	Исход родов или боляной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни	Статус и диагноз.	Оперативный ме- тод и какого часа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.	
139	1907 № 139	Ш. 34 л. зам. город. архит. дом. хоз.	с 11 л. 4 н. 6 дн. сил. бол. во время.	16	5	19	9	Разр. пром.	Посл ^е V род. крово- течение.	9 л. с 2 посл ^е дних родов обиль- ными кровя. бол. в пахах.	Rupt. perin. Endometrit. hyperplastica Metritis colli follicularis.	$\frac{1}{2}$ ч—опер. под ^ь хлороз. Abrasio. Amput. с. Colopro- perin.-rtharphia.	Безлх. Рег prim.	$\frac{25}{4}$ ч—выпис. Здорова.	Пиннетъ въ Маб 1908 г., что чув- ствует большое облегчение от опе- рации. Родовъ не было.
140	1907 № 177	Г. 33 л. зам. дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 6—7 дн. сил.	—	3 р. 1 вык.	—	—	Разр. пром.	Хворала.	Кровотечи. Бол. низу живота.	Rupt. perin. Endometrit. catarrhalis Residua para- metrit.	$\frac{27}{4}$ ч—опер. под ^ь хлороз. Abrasio. Coloproperin.-rtharphia.	Безлх. Рег prim.	$\frac{1}{4}$ ч—выпис. Здорова.	—
141	1907 № 187	П. 20 л. крест. зам. дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 3—4 дн.	19	1	20	3 м.	Разр. пром.	Хворала.	Разрывъ промеж- ности со времени родовъ. Бѣли.	Rupt. perin. Endometrit.	$\frac{1}{4}$ ч—опер. под ^ь хлороз. Abrasio. Coloproperin.-rtharphia.	Безлх. Рег prim.	$\frac{14}{4}$ ч—выпис. Здорова.	—
142	1907 № 199	П. 30 л. мѣд. акуш. зам.	с 16 л. 3 н. 3 дн.	26	1	27	2 г. 4 м.	Разр. пром. полн. былъ защитъ, не ерос.	Нагное- ние въ швахъ.	Со времени ро- довъ полный раз- рывъ промежности. Недержание газовъ и жидкого стула.	Rupt. perin. compl.	$\frac{14}{4}$ ч—опер. под ^ь хлороз. Coloproperin- recto-rtharphia (руб- цы около anus'a разсѣчены).	Безлх. Рег prim.	$\frac{24}{4}$ ч—выпис. Здорова.	—
143	1907 № 202	В. 28 л. ж. чиновн. дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 4 дн. сил.	18	1	23	5	Разр. пром. защит.	Норм.	3 л. со времени родовъ боли въ поясницъ и заворы. Бѣли.	Rupt. perin. Endometrit. Res. pp. metrit. sin. et post.	$\frac{27}{4}$ ч—опер. под ^ь хлороз. Abrasio. Coloproperin.-rtharphia.	Безлх. Рег prim.	$\frac{27}{4}$ ч—выпис. Здорова.	Мужъ пишетъ въ Маб 1908 г., что умерла отъ рожа на лицъ. Со сто- роны женск. пол. смерь жалоба не имѣла.
144	1907 № 251	С. 34 л. вдова ветерин. врача.	с 15 л. 4 н. 2 дн.	19	2 р. 1 вык.	20	12	Разр. пром.	Хворала посл ^е выкид.	Посл ^е выкидыша (11 л. т. наз.) бѣли и боли въ животъ и поясницъ.	Rupt. perin. Metritis colli. Endometritis.	$\frac{25}{4}$ ч—опер. под ^ь хлороз. Abrasio. Amput. с. Colopro- perin.-rtharphia.	Безлх. Рег prim.	$\frac{19}{4}$ ч—выпис. Здорова.	—

№ по порядку	Год, № листа	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие	Регулы	Начало половой жизни	Число родов и выкидышей	На каком году были первые роды	Сколько лет назад были последние роды	Сколько родов длительно болевой	Послеродовой период	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни	Статус и диагноз	Оперативный метод и какого числа была операция	Послеоперационное течение	Какого числа выписана. Состояние при выписке	Отдаленные результаты: субъективные и объективные
143	1997 № 300	К. 36 л. ж. чинов. дом. хоз.	сх 14 л. 4 и 5 дн. сил. сь болью передь и первые 2 дня.	23	4 р. 3 вык.	24	6	Разр. пром.	Послг. послгд. родоь было задержане оболочекъ.	Около 2 л. бол-из повсичи и привомъ шау. Чувств напирания внизь.	Rupt. perin. Endometrit. Retroflexio uteri.	²⁴ /х—опер. подь хлорое. Abrasio. Colporerin.-traphia.	Безлнх. Per prim.	⁵ /х—выпис. Здорова.	Пинеть въ Сент-бурь 1908 г., что чувствуеть себя хорошо. Родоь не имгьла.
146	1907 № 317	С. 39 л. ж. колд. совтн. дом. хоз.	сх 14 л. 4 и 5 дн.	23	4	25	6 м.	Разр. пром.	Норм.	Со времени 1 родоь идержане моч; блн.	Rupt. perin. subcutan. Ectropion. Endometrit.	⁷ /х—опер. хлорое. Abrasio. Amput. c. Colporerin.-traphia.	Безлнх. Per prim.	¹⁹ /х—выпис. Здорова.	—
147	1907 № 329	П. 28 л. зам.	сх 17 л. 4 и 3 дн. сь болью; послг родоь боли пропшл.	18	1	27	11 м.	Продолжит. роды 3 сут. щипци полн. разр. пром. зашит. не срос.	Лнхорад. и воспла-ден. мочев. пуз.	Со времени родоь проходжен газоь и каловых массъ во время испражнения на галище. Бъли.	Rupt. perin. completa Fistula recto-vaginal. Erosiones. Endometrit.	¹² /х—опер. подь хлорое. Abrasio. Recto-colporerin.-traphia (старый рубецъ разсчечъ вмѣстѣ съ частью кнпки).	Безлнх. Per prim.	²⁰ /х—выпис. Здорова.	—
148	1907 № 362	А. 32 л. двор. дом. хоз.	сх 15 л. 3 и 2—3 дн. боли во время.	25	4 р 1 вык.	26	2	1 роды 2 сут. щипци полн. разр. пром. зашит. не срос.	Норм.	Чувство напирания внизь. Частое мочеиспускане. Не держане газоь и жидкого стула.	Rupt. perin. compl.	¹⁰ /х—опер. подь хлорое. Colporerin.-recto-traphia.	Лнхор. (2 раза по-выш. t-ra) Per prim.	²⁵ /х—выпис. Здорова.	Пинеть въ Маѣ 1908 г., что чувствуеть себя плохо, хотя со стороны промежности, кнпки и пузыря жалобъ не имѣеть.
149	1907 № 375	П. 29 л. дом. хоз. зам.	сх 15 л. 4 и 3 дн.	27	1	29	4 1/2 м.	Тяжелые роды 3 сут. годичн. предлжк. трудное извлеч. полн. разр. пром. 2 раза зашит. безрезул.	—	Идержане кал и чувство напирания внизь.	Rupt. perin. completa. Fistula recto-vaginalis.	⁵ /х—опер. хлорое. Recto-colporerin.-traphia.	Безлнх. Per prim.	²⁴ /х—выпис. Здорова.	Пинеть въ Сент-бурь 1908 г., что чувствуеть себя все время хорошо. Родоь не имгьла.
150	1907 № 391	Г. 26 л.	сх 16 л. 4 и 3 дн.	18	1	19	3	Разр. пром. при 1 род	Норм.	Со времени 1 родоь, чувство напирания внизь. Бъли.	Rupt. perin. Endometrit.	¹⁰ /х—оп. хлорое. Abrasio. Colporerin.-traphia.	Безлнх. Per. Prim.	²¹ /х—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, летъ, со- словие, се- мейное по- ложение, за- нятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выпаденияй.	На которомъ году были первые роды. Сколько летъ на- задъ были послед- ние роды.	Исходъ родовъ для больной.	Постродовой перiodъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и диагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послѣоперационное течение.	Какого числа выписана, зу- льматы. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.	
1	1897 № 1550.	Ф. 38 л. крест. вдо- ва, прислу- га.	съ 16 л. 3 н. 3 дн. стугъ съ бол.	18	2	19	16	Разр. пром.	Хвор. послѣ II род.	Боли внизу живота и въ поясницѣ. Чув- ство выпадения чус- тей съ годъ, уси- лившаяся за послѣд- ніе 2 мѣс.	Rupt. perin. Metritis. Retroflexio mob. Res. para perimetrit. dextra. Endo- metrit. Prolaps. vag. ant.	¹³ /x—оп. хлороф. Abrasio Colporerin- rrh. (Martin).	Безлх. Per prim.	²⁰ /x—выпис. Здорова.	—
2	1897 № 1582.	К. 49 л. ж. стет. показои, дом. хоз.	чрезъ 3 н. 3 дн. 2 г. сбш.	37	3 р. 1 вык.	38	7	Разр. пром при всѣхъ родахъ защит.	Норм.	Послѣ II родовъ стала замѣчать вы- паденіе передней стѣ- нки, постепенно про- грессировавшее.	Rupt. perin. Prol vag. ant. Cystocele. При на- ту-жании—descensus uteri. Res. post.	²⁰ /x—оп. хлороф. Colporrhaph. antio- rior et Colporerin- rrhaphia.	Безлх. Per prim. На передн. стѣнкѣ небольшое расхожд. по сере- динѣ.	⁹ /xi—выпис. Здорова.	Пометь въ Маѣ 1908 г., что чув- ствуютъ себя удо- влетворительно опу- щенія матки не чувствуютъ.
3	1897 № 1605.	К. 36 л. ж. ветер. врача.	съ 18 л. 3 н. 5 дн.	19	3	21	—	Разр. пром.	Норм.	Больна 3 года. Бо- ли въ поясницѣ и въ ногахъ во время проевъ. Кровь черезъ 2 нед. обильна и про- должительнае пре- жнего. Бѣн. Непро- извольное мочеиспу- сканіе при ходьбѣ.	Rupt. perin. Descens. vag. ant. Ectropion. Metrit. Endometrit.	¹⁷ /xi—оп. хлороф. Abrasio. Colporrh. ant. Colporerin-rrh. Cystocotomia parie- tis vag. anter.	Безлх. Per prim.	⁵ /xii—выпис. Здорова.	—
4	1897 № 1610.	Г. 45 л. зам. герм. подава.	съ 13 л. 3 н. 2—3 дн. винода боли.	26	7 р. 4 вык.	27	8	Разр. пром. при I род. защит. 5 л. назадъ.	—	Не держать га- зовъ и жидкій стулъ. Чувство напирания на низъ.	Rupt. perin. compl. Отъ бывшей Colporeri- aeorrhaphi и имется тон- кій кожный мостикъ. Prol. v. ant. et post. Res. pp. mot.	²² /xi—оп. хлороф. Colporerin-recto- rrh.	Безлх. Per prim.	¹¹ /xii—выпис. Здорова.	—
5	1898 № 1669.	М. 30 л. крест. зам. прислуга.	съ 15 л. 4 н. 3—4 дн.	—	1 р. 2 вык.	24	5	Разр. пром. щипцы.	—	Около 5 л. чув- ствуетъ опущение внизъ и изъ подо- выхъ частей выхо- дитъ опухоль. По- стоянное заворы. Бѣн. Частекъ и силь- ные регулы (иногда черезъ 2 нед.). Боли въ поясницѣ.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Endometrit.	²² /ii—оп. хлороф. Colporrh. aut. et Col- porerin-rrh.	Безлх. Per prim.	⁵ /iv—выпис. Здорова.	Чувствуетъ себя хорошо (Маѣ 1908 г.). См. 1904 г. № 2618.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регуляр.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На которых году был первый род.	Сколько лет вышло после родов.	Исход родов для больной.	Психической период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
6	1898 № 1670.	Т. 32 л. двор. зам. дом. хоз.	с 15 л. 4 н. 3—4 дн.	22	3 р. 2 вык.	23	3	Разр. пром.	Норм.	Боля внизу живота. Б.лн.	Rupt. perin. Metrit. c. et corporis. Endometrit. Prol. vag. ant. Res. parimetric. post. et dextra.	²⁵ / ₁₀₀ —оп. хлороф. Abrasio. Colporerin-rrhaphia.	Безлх. Per prim. исключая кожи у спаив, зашившей per granal.	⁵ / ₁₀₀ выпис. Здорова.	—
7	1898 № 1690.	Х. 25 л. ж. чинов. дом. хоз.	с 15 л. 3—4 н. 7 дн.	—	1 быстр.	24	1 г. 9 м.	Разр. пром. зашит. не сросся.	Лихор.	Боля со времени родов.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Res. pp. metrit.	¹ / ₁₀₀ —оп. хлороф. Colporerin-rrh. (Fritsch).	Безлх. Per prim.	¹⁵ / ₁₀₀ —выпис. Здорова.	Пишет в Мае 1908 г. что чувствовала себя хорошо до родов. После операции 3 раз родила, всегда с разрывами, которые зашивали. Только последние 2 раза не зашили. Жалуются на ощущение. Хочет сделать операцию.
8	1898 № 1705.	Ю. 31 г. ж. солдата. прислуга.	с 15 л.	—	1 сроч. 1 прежде-врем.	22	2	Разр. пром.	Лихор.	Боля со последних родов (5 мес. выкидыш). Сильные менструации, ку-скажи. Боля внизу живота. Б.лн. Запоры.	Rupt. perin. Res. pp. metrit. Prol. vag. ant. et post. Endometrit.	¹⁵ / ₁₀₀ —оп. хлороф. Abrasio. Colporerin-rrhaphia.	Безлх. Per prim.	²⁵ / ₁₀₀ —выпис. Здорова.	—
9	1898 № 1710.	Ф. 39 л. крест. незам. прислуга.	с 15 л. 3—4 н. 5 дн.	—	2	26	9	Разр. пром.	—	Опухание внизу около 14 л. Б.лн.	Rupt. perin. Retroflex. ut. Prol. vag. ant. et post.	¹ / ₁₀₀ —оп. хлороф. Colporrin. ant. et Colporerin. rrhaphia.	Безлх. Per prim.	²⁵ / ₁₀₀ —выпис. Здорова.	—
10	1898 № 1711.	М. 46 л. мвщ. зам. прислуга.	с 15 л. 3—4 н. 3 дн.	—	5	22	20	Разр. пром.	—	Около 13 л. опухание внизу, увеличивающееся после тяжелой работы. Б.лн. Запоры.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Cystocele. Portio supravag. удлинена и истончена. Retroflexio.	¹ / ₁₀₀ —оп. хлороф. Colporrin. ant. et Colporerin-rrhaphia.	Безлх. Per prim.	²⁵ / ₁₀₀ —выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годы, № акта.	Фамилия, лет, со- стояние, се- мейное по- ложение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выпадения.	На которых году были первые роды.	Сколько лет, на- зад были послед- ние роды.	Исход родов для больной.	Постродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный ме- тод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
16	1898 № 1779.	Б. 32 л. содатка зам. дом. хоз.	съ 14 л. 4 и 5 дн.	19	9 р. 1 вых.	1	Разр. пром. полн.	Норм.	Поддержание жид- ких испражнений Чувство напора вниз и выпадения частей.	Rupt. perin. completa et recti (на 1/4 см). Prol. vag. ant. et post. Resid. pp. metrit.	5/11—оп. хлороф. Colporerin.-recto- rrh.	Безлж. Per prim.	17/11—выпис. Здорова.	—	
17	1899 № 1796.	К. 38 л. ж. солдата, прислуга.	съ 14 л. 3 и 7 дн.	—	4 19	8	Разр. пром.	—	2 года неравно- мерная; через 2 1/2 нед по 7—8 дней обильно. Боли в пояснице и внизу живота. Чувство на- пора вниз.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Fibromatosis.	16/11—оп. хлороф. Colporerin.-rrhaphia. Abrasio.	Безлж. Per prim., хромй небольш. расхожд. на промеж.	21/11—выпис. Здорова.	—	
18	1899 № 1825.	Д. 49 л. ж. купца дом. хоз.	съ 14 л. 3—4 и. 2—3 дн. 5 mris. stim.	—	2 35	8	Разр. пром.	—	2—3 года чу- ствует опущение вниз. Частое моче- испускание. Иногда бьли.	Rupt. per. Prol. v. ant. Cystocele. Задний свод не сактивен.	15/11—оп. хлороф. Colporrh. ant. Colpo- perin.-rrhaphia. Abrasio.	Безлж. Per prim.	7/11—выпис. Здорова.	—	
19	1899 № 1836.	Я. 57 л. крест. ку- харка.	съ 15 л. 3—4 и. 6 дн. 8 л. stim.	—	7 24	21	Разр. пром.	—	Последние годы опущение выхожде- ние опухоли наружу 2 нед. тому назад после подъема та- жестя почувствовал резкое выхождение	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Elongat port. supravaginal. Ulcera colli. Retroflexio. Зонд—9 см.	9/11—оп. хлороф. Amput. с. (по Шре- деру). Colporerin.- rrhaphia.	Безлж. Per prim. При ватужив. неть вылучива- ния частей.	25/11—выпис. Здорова.	—	
20	1899 № 1839.	Л. 57 л. ж. купца дом. хоз.	2 г. stim.	—	9 ероч. 1 пре- ждевр. 3 вых.	22	Разр. пром.	—	Чувство опущения съ первых родов, усилилось за послед- ние 3 года.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Rectocele.	8/11—оп. энпр. (вслед. расшир. сер- ца). Colporrh. ant et Colporerin.-rrh.	Безлж. У спайки поперхн. расхожд.	27/11—выпис. Здорова.	Пиннетъ въ Маѣ 1908 г., что все время чувствует себя хорошо. Вы- падения не замѣ- чаетъ.	
21	1899 № 1845.	З. 36 л. ж. оенц. дом. хоз.	съ 14 л. 4 и 5 дн.	—	2 р. 1 вых.	26	4 1/2	Разр. пром.	—	Чувство опущения вниз.	Rupt. perin. Prol. ant. et post. Retroflexio mob.	15/11—оп. хлороф. Colporerin.-rrhaphia.	Безлж. У спайки поверхн. расхожд.	16/11—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лѣтъ, со- словие, со- менной по- ложеніе, защитѣ.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выпаденій.	На которыхъ году были первые роды.	Сколько лѣтъ на- задъ были послед- ние роды.	Исходъ родовъ для болѣной.	Послѣдственной периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послѣоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
22	1899 № 1855.	Ш. 54 л. двор. вдова дом. хоз.	съ 13 л. 4 м. 4 дн. 7 л. сім.	24	5 р. 1 вык.	25	14	Разр. пром.	Хвор. послѣ 1 род.	Выпаденіе частой въ теченіе 5 лѣтъ. Запоры. Камель. Кольца выпадаютъ при натуживаніи.	Rupt. perin. ProL v. ant. et post. Anteflexio. Metrit. chron. Resid. pp. metrit. sin. et dextra. Bronchiitis. Emphysema.	² / ₄ —оп. ковачъ. Colporerin.-rrhaphia.	Лихорад. по прич. инфекц. и бромит. Neuritis na. Peron. Per prim.	²³ / ₄ —выпис. Здорова.	—
23	1899 № 1886.	С. 28 л. мѣш. зам. дом. хоз.	съ 18 л. 4 м. 5 дн.	24	3	25	1 г. 7 м.	Разр. пром. при 1 род. щипцы защит.	Лихор.	Выпаденіе ягта- лица при натужива- ніи.	Rupt. perin. subcutanea. ProL v. ant. Ectropion. Anteversio. Res. post.	² / ₄ —оп. хлороэ. Colporrh. ant. et Col- porerin.-rrhaphia.	Безлнх. Per prim.	²⁴ / ₄ —выпис. Здорова.	Наслѣдована въ Мая 1908 г., чув- ствовала себя хо- рошо около года послѣ операціи, до розов; нѣтъ 2 ро- довъ, съ разрѣ- вомъ не запи- тымъ.—При нату- живаніи выпадаютъ передняя стѣнка всѣмъ ясно. Тазовое дно впа- ло и расшатано. Про- ба Levator'a слабо выражена. Retrov. mob.
24	1899 № 1908.	Т. 56 л. вдова сол- дата, ниня.	съ 14 л. 3—4 н. 7 дн. 4 г. сім.	17	4	18	18	Разр. пром.	—	Опушеніе внизъ 10 лѣтъ. Послѣдніе 2 года стала выхо- дить опухоль сна- ружи. Бѣлы и по- стоянные запоры.	Rupt. perin. ProL v. ant. Cystocele.	¹⁵ / ₄ —оп. хлороэ. Colporrh. ant. et Col- porerin.-rrhaphia.	Безлнх. Per prim.	²⁵ / ₄ —выпис. Здорова.	—
25	1900 № 1967.	Г. 38 л. ремесл. зам. дом. хоз.	съ 13 л. 4 н. 4—9 дн.	16	1 сроч. 1ירו- ждовр.	18	19	Разр. пром.	Послѣ II род. (8 мѣс. мертв. ребен.). лихор.	Чувство выпаденія матки. Неудержаніе мочи при кашлѣ. Боли въ животѣ и въ спинѣ.	Rupt. perin. ProL v. post. Rectocele. Endometrit. haemorrhagica. Res. para- metrit. post. Retroposit. ut.	¹⁵ / ₄ —оп. хлороэ. Abrasio Colporerin.- rrhaphia.	Безлнх. Per prim. кромѣ небольш. мѣста на промежн. Per granulation.	²⁶ / ₄ —выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год. № листа.	Фамилия, лет, со- словие, се- мейное по- ложение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году были первые роды. Сколько лет вна- задь были послед- ние роды.	Исход родов для больной.	Постродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный ме- тод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
26	1900 № 2000.	Н. 48 л. крест. зам. прачка.	съ 14 л. 3—4 и. 2—3 дн. мало.	32	3	33	9	Разр. пром.	Лихор. посл. II род. Боли съ жизнью и въ по- рядкемъ проходь 3 мѣс.	—	—	—	—	—
									Больна съ посл. нхъ родовъ. Выпа- дение частей Часты позывы и задержка моченспускания.	Rupt. perin. ProL v. ant. et post. Cystocele. Hyper- trophia colli. Erosiones. Resid. post. sin.	²⁹ /и—оп. хлороф. Amp. с. alta Colopro- perin.-rrhaphia.	3 раза во вечерамъ выше 38°. Cystitis. Містами поверхи. расхвдл.	¹⁴ /и—выпис. Состояніе удовлетвор.	Пипеть въ Маѣ 1908 г., что чув- ствует себя во время хорошо, за исключеніемъ час- таго сердцебиенія. Не рожала.
27	1900 № 2002	Ю. 30 л. сестра ми- лосердц.	съ 12 л. 3 и. 3—4 дн.	16	4 р. 1 вык.	21	4	Разр. пром. Роды всегда про- должител. до 3-хъ сут.	Общая слабость.	—	—	—	—	—
									Больна съ посл. родовъ. Выпа- дение частей. Боль въ пояснице и въ паху. Частые по- зывы къ моченспу- сканию.	Rupt. perin. ProL v. ant. et post. Retroversio mob. Res. post. et dextra.	²⁹ /и—оп. хлороф. Abrasio. Coloproperin- rrhaphia.	Безлх. Per prim.	¹⁴ /и—выпис. Промежи. удовлетвор.	—
28	1900 № 2013.	К. 56 л. мѣщ. вдова дом. хоз.	съ 12 л. 3 и. 3 дн. 10 л. сѣм.	16	2 р. 2 вык.	17	38	Разр. пром.	—	—	—	—	—	—
									Выпадение частей Частое моченспусканіе. Больна 10 л. (посл. удлинени мат- ки, вслѣдствіе рака, влагалищнымъ пу- темъ).—Больная но- сила кольцо. Послед- нее время, несмотря на это, передняя сѣвка влагалища выпадаетъ.	Rupt. perin. Inversio vag. ant. totalis. Cystocele.	¹⁴ /и—оп. хлороф. Colporrh. ant. et Col- oproperin.-rrhaphia.	Безлх. Per prim.	²⁵ /и—выпис. Здорова.	—
29	1900 № 2041.	Б. 22 л. зам. дом. хоз.	съ 16 л. 3 и. 3 дн.	17	2	18	1	Разр. пром.	Норж.	—	—	—	—	—
									Выпадение матки посл. I родовъ и затрудненное моче- нспусканіе.	Rupt. perin. ProL v. ant.	²⁹ /v—оп. хлороф. Coloproperin.-rrhaphia.	Безлх. Per prim.	¹⁵ /v—выпис. Здорова.	—
30	1900 № 2044.	Б. 41 г. мѣщ. вдова дом. хоз.	съ 13 л. 3—4 и. 4—5 дн.	20	3 р. 1 вык.	21	10	Разр. пром. при I род.	Норж.	—	—	—	—	—
									Опушение частей. Частое моченспус- каніе. Запоры.	Rupt. perin. ProL vag. ant. et post. Rectocele.	¹⁴ /v—оп. хлороф. Coloproperin.-rrhaphia.	Безлх. Per prim. исключая 2 пловъ за спайкой.	¹⁶ /v—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лѣтъ, со- слоице, се- мейное по- ложение, занятіе.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выпаденій.	На которомъ году были первые роды, Сколько лѣтъ на- задъ были послѣд- ніе роды.	Исходъ родовъ для больной.	Послеродовой периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана, Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.	
31	1900 № 2054.	В. 25 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 18 л. 3 и. 3 ин. теперь черезъ 4 н. 4 дн.	19	3	21	1	Разр. пром. при I род.	—	Болезнь съ послѣд- нихъ родовъ. Чув- ство выпаденія. Рас- стройство мочеиспу- сканія.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Cystocele. Ante- versio. Resid. sin.	¹⁶ /x—оп. хлорое. Colporerin-гггарфия.	Безлѣх. Per prim.	²⁵ /x—выпис. Здорова.	—
32	1900 № 2058.	А. 60 л. мѣщ. вдова дом. хоз.	съ 16 л. 3—4 н. 3—5 дн. много снѣг. 10 л.	17	8	18	23	Разр. пром.	Норм.	Выпаденіе частей. Расстройство моче- испусканія. Запоры. Болезнь 4 года (по- слѣдъ подъема тяже- сти).	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Cystocele et Rectocele. Retroflexio mob.	¹⁸ /x—оп. эфир. (Ar- teriosclerosis). Col- porrh. ant. et Colpo- perin-rrh.	Безлѣх. Per prim.	²⁹ /x—выпис. Здорова.	—
33	1900 № 2069.	Д. 44 л. вдова чин. дом. хоз.	съ 14 л. 3 и. 7 дн. иногда съ бол. скусть.	24	5	26	9	Разр. пром. Ручное отдѣленіе послѣда при IV род.	Хвор. послѣ IV род.	Болезнь живота при подниманіи тя- жестей. Чувство да- вленія на низъ. Бѣли.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Endometrit.	²⁰ /x—оп. хлорое. Abrasio. Colporerin- гггарфия.	Безлѣх. Per prim.	¹⁵ /x—выпис. Здорова.	—
34	1900 № 2072.	Г. 56 л. ж. войск. старш.	съ 14 л. 3 и. 7 дн. 5 л. снѣг.	16	12 р. 2 вык.	19	10	Разр. пром.	Норм.	Ощущеніе выпаденія частей послѣ напряженія. Боли въ крестцѣ. Расстрой- ство мочеиспусканія. Бѣжкі бѣли.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Rectocele. Descens. ut. Res. pp. metrit. sin. dextra et post.	⁷ /x—оп. хлорое. Colporrh. ant. et Col- porerin-гггарфия.	Безлѣх. Per prim. Гинекологич. массажъ.	¹⁴ /x—выпис. Боли въ крестцѣ пре- кратились. Матка значи- тельно под- вижна.	—
35	1900 № 2092.	Н. 36 л. вдова учи- теля, дом. хоз.	съ 14 л. 3 и. 3 дн.	16	3	18	14	Разр. пром.	Хвор.	Болезнь съ послѣд- нихъ родовъ, болѣзнь внизу живота.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Retroflexio fix. Descensus ovariorum. Res. post. et lateral.	⁶ /x—оп. хлорое. Colporerin-гггарфия.	Безлѣх. Per prim. ¹⁷ /x встѣла. ²⁰ /x отравилась напатырн спиртомъ + mors ²⁰ /x.	Section: Ожоги вплоть до толстыхъ кшечекъ. genitalia: Reclinatio Perioophor- itis duplex.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На которых году был первый род.	Сколько лет выназали более поздние роды.	Исход родов для больной.	Постродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	История болезни.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана, состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
36	1901 № 2186.	К. 25 л. крест. зам. чернораб.	с 17 л. 4 п. 6 дн.	21	2	23	2 м.	Разр. пром. затит. не сросся.	—	При тяжелой работе выпадение. Растройство мочеиспускания. Запоры.	Rupt. perin. ProL v. ant. Anteverso.	¹⁴ /v—оп. хлорое. Colporrh. ant. et Colpoperin.-rhrph.	Безлжх. Per prim.	²² /v—выпис. Промежк. достаточн.	Пшетье в. Маѣ 1908 г. что чувствовала себя 2года послѣ операци до родов хорошо. При родах разрыв не затит. Теперь беременна и чувствует ощущение жакт и раштенье.
37	1901 № 2190.	Р. 48 л. ж. кузница. дом. хоз.	с 16 л. 3 н. 3 дн. мало 2 г. clim.	24	10	26	8	Разр. пром.	Норм.	Выпадение частей.	Rupt. perin. ProL v. ant. et post. Desc. ant. Res. post. et dextra.	¹⁶ /v—оп. хлорое. Colporrh. ant. et Colpoperin.-rhrph.	Безлжх. Per prim.	²² /v—выпис. Здорова.	По наведеннымъ лично мною справкамъ въ Старой Русѣ, мужъ сообщаетъ, что больная умерла осенью 1901 г. отъ душевной болѣзни. Относительно выпадения не было жалобъ.
38	1901 № 2243.	Б. 38 л. крест. зам. дом. хоз.	с 19 л. 3 н. 5 дн.	30	1	30	8	Разр. пром.	Хвор.	Растройство мочеиспускания. Запоры. Бѣли.	Rupt. perin. ProL v. ant. et post. Endometrit. hyperplastica. Res. post. sin.	¹⁷ /x—оп. хлорое. Abrasio. Colporperin.-rhrpharia.	Безлжх. Поверхн. расхожд. на промежности. Влажные пер prim.	⁹ /xii—выпис. Здорова.	Исследована въ Маѣ 1908 г., чувствуетъ себя хорошо, кромѣ растройства мочеиспускания, жакт и до операци. Родовъ не имѣла. Промежность состоятел. Выпадения стѣнокъ нѣтъ. При натуживаннн выходитъ моча. Поставлено кольцо № 7½. Retroversio.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, запись.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году один первород.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и в каком числе была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
39	1901 № 2248.	Ч. 50 л. ж. сваш. дом. хоз.	—	16 8 л. клим.	6	18	30	Разр. пром.	Норм.	Боли внизу живота. Расстройство мочеиспускания. Били.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Cystocele. Retropositio ut. Colpitis senilis. Res. parametrit. post. et sin. Polypus submucosus cervicis. зондъ— 7 см. Endometrit.	²⁵ / ₁₁ —оп. хлороф. Abrasio. Colporrh. ant. et Colporperin.-rrhaphia.	Безлжх. Per prim.	⁹ / ₁₁ —выпис. Здорова.	—
40	1901 № 2269.	Ш. 27 л. ж. дорян. артистка.	—	16 сь 11 л. 4 н. 7 дн. общ. стуг.	2	17	9	Разр. пром.	Норм.	Ощущение напора вниз. Боли в паху и в крестц. Били, окрашенная кровью. Запоры. Геморроидальное кровоотечение, и совпадает большей частью с менструальными.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Retroversio. Oophoritis. duplex. Resid. post. Endometrit. catarrhalis. Hysteria. Dysuria.	⁵ / ₁₁ —оп. хлороф. Abrasio. Colporperin.-rrhaphia.	Безлжх. Per prim. Электризация. Массаж. Ванны.	¹¹ / ₁₁ —выпис. Промежи. срослась.	—
41	1902 № 2270.	Д. 35 л. ж. ярост. фабрич.	—	18 сь 16 л. 3 1/2 н. 7 дн.	6 р. 1 вк.	19	1	Разр. пром.	Хвор.	Чувство выпадения после последних родов, усиливающееся с течением времени. Dysuria. Menorrhagia.	Rupt. perin Prol. v. ant. et post. Cystocele. Res. post. et sin.	¹⁴ / ₁₁ —оп. хлороф. Abrasio. Colporperin.-rrhaphia.	Безлжх. Per prim.	²⁵ / ₁₁ —выпис. Здорова.	Последована вь Мат 1908 г. чувствует себя хорошо, весь день работает, стоя на ногах, и поднимает тяжести. Родов не имела, жалоб нет никаких. Промежи кривая. Retroversio. Ectropion. Выпадения нет.
42	1902 № 2292.	В. 35 л. прес. зам. дом. хоз.	—	22 сь 17 л. 4 н. 7 дн. сь бол. теперь чр. 4 н. по 4 дн.	4	25	1 1/2 г.	Разр. пром.	Хвор.	Выпадение частей, усиливающееся за последнее время и мжающее ходить. Запоры, мтяжающиеся поносами.	Rupt. perin. subcutanea. Prol. v. ant. et. post. Enteroptosis. Ectropion. Retroversio m.	⁹ / ₁₁ —оп. хлороф. Colporperin.-rrhaphia.	Безлжх. Per prim. Кровь одного мьста на промежи. per granulation.	²⁷ / ₁₁ —выпис. Промежи. вполне сост.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, г-та, со- словие, со- мнение, по- ложение, запятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выпадения.	На которыхъ году были первыя роды.	Сколько лѣтъ, на- задъ были послѣд- ние роды.	Искость родовъ для большой.	Послеродовой периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
43	1902 № 2307.	П. 43 л. ж. вдовца, до- рож. аг. до- м. хоз.	съ 16 л. 4 н. 5 дн.	22	5	23	41	Разр. пром.	—	2 года назадъ уда- лена влагалищнымъ путемъ фиброматоз- ная матка. Вскоре послѣ того чувство выпячивания и выпаде- ния наружу вла- глица.	Rupt. perin. ProL v. ant. et post. Rectocele. Матка отсутствуетъ.	⁵ / ₁₁ —оп. экзар. (расши- рение сердца). Colporperin.-rrharphia.	Безлнх. Per prim.	¹⁴ / ₁₁ —выпис. Здорова.	Питетъ въ Маѣ 1908 г., что чув- ствуетъ послѣ уда- ления матки тяже- лые приливы къ головѣ и верхней части туловища почти черезъ каж- дые 2 часа. Выпа- дения нѣтъ. Разст- рство мочепус- канія.
44	1902 № 2374.	Р. 61 г. вдова рем. дом. хоз.	съ 14 л. 3 н. 15 л. clim.	18	8	19	20	Разр. пром.	—	Выпадение частей, Боли въ животѣ и поясницѣ. Сердце- биеніе.	Rupt. perin. ProL v. post. Rectocele. Retropositio ut. ix.	¹¹ / ₁₁ —оп. кованн. (расшир. сердца). Colporperin.-rrharphia.	Безлнх. Per prim.	²¹ / ₁₁ —выпис. Здорова.	Мужъ сообщаетъ, что была здорова послѣ операціи, а въ 1906 г. умерла отъ разрыва сердца.
45	1902 № 2377.	П. 43 л. ж. крест. фабричн.	съ 15 л. 4 н. 7 дн. болн 1°.	19	2	21	10	Разр. пром.	—	Послѣ послѣднихъ родовъ 5 лѣтъ суесть стала замѣчать вы- паденіе частей, осо- бенно послѣ подня- тія тяжестей. Обиль- ныя бѣлы. Мѣсяч- ныя со времени вы- паденія стали обиль- нѣе.	Rupt. perin. ProL v. ant. et post.	¹⁹ / ₁₁ —оп. хлороэ. Colporrh. ant. et Col- porperin.-rrharphia.	Безлнх. ¹⁷ / ₁₁ —Нас- матомъ на промеж- ности, кот. была выскрѣта. Per prim. кромѣ незначит. части на промежн.	⁷ / ₁₁ —выпис. Здорова.	—
46	1902 № 2387.	Р. 35 л. фин. гражд. зам.	съ 14 л. 3—4 дн. съ бол.	27	2	28	5	Разр. пром.	Лихор.	Боли въ поясницѣ и внизу живота. За- поры 2—3 дня.	Rupt. perin. Descensus vag. post. Uterus in dextro- positione. Ret. pp. post. et. dextra.	⁵ / ₁₁ —оп. хлороэ. Colporperin.-rrharphia.	Безлнх. Per prim.	¹² / ₁₁ —выпис. Здорова.	—
47	1902 № 2396.	П. 43 л. крест. вдова прислугѣ.	съ 19 л. 4 н. 5 дн.	22	7 р. 1 вык.	23	6	Разр. пром.	Хвор.	Опуханіе маткн. Бѣлы.	Rupt. perin. ProL v. ant. et post. Зондъ—9 см.	²⁴ / ₁₁ —оп. хлороэ. Colporrh. ant. et Col- porperin.-rrharphia.	Безлнх. Per prim. Кровь 2 сплювъ на спайкѣ.	²⁹ / ₁₁ —выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регулярность.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году был первый род.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Последней период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.
48.	1903 № 2412.	Г. 38 л. крест. зам.	с 16 л. 3—4 н. 1—3 дн.	18	6	19	2½	Разр. пром.	Хлор. посл. посл. родов.	Выпадение частей. Б.в.н. Разстройство мочеиспускания.
49.	1903 № 2464.	М. 45 л. ж. нотариуса.	с 14 л. 4 н. 6 дн.	20	3	21	20	Разр. пром. при посл. родах.	Норм.	Опушение частей сь последних родов. Боли в крестце при ходьбе и сидении.
50.	1903 № 2465.	Г. 68 л. м.в.н. бывшая прислуга.	с 17 л. 4 н. 4 дн. с бол. clim. 20 л.	—	3	23	33	Разр. пром. при 1 род.	Лихор. посл. посл. родов шарыв.	Опушение частей со времени 1 родов. Ухудшение 1/3 года. Разстройство мочеиспускания. Запоры.
51.	1903 № 2526.	Г. 54 л. м.в.н. вдова прислуга.	с 14 л. 3 н. 3 дн. 5 л. clim.	24	4	23	23	Разр. пром.	—	12 л. жалуется на выпадение частей. Боли в пояснице. Разстройство мочеиспускания.
52.	1904 № 2554.	Г. 42 л. крест. зам. дом. хоз.	с 17 л. 3 н. 6 дн.	18	13 р. (вз. ных один двойня) 1 вык.	19	5	Разр. пром.	—	10 л. выпадение матки и 15 л. двухсторонняя грыжа. Запоры. Б.в.н.

Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
Rupt. perin. subcut. Prol. vag. ant. post. Retrof. mob. Endometrit. Дистаз. прямых мышц. Слабое питание.	19/1—оп. хлороф. Abrasio. Colporperin. rthaph.	Безлх. Per prim.	19/1—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Descensus. vag. post. Res. pp. post. Metrit. chron.	14/iv—оп. хлороф. Colporperin. rthaph.	Безлх. Per prim.	14/iv—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Prol. v. ant. Cystocele. Res. pp. post.	14/iv—оп. хлороф. Colporrh. ant. Colporperin. rthaph.	Безлх. Per prim.	14/iv—выпис. Здорова.	Пометь в Мае 1908 г. что во время посл. операции чувствуешь себя хорошо. Матка не выпадает. Пузырь не страдеть.
Rupt. perin. Descensus. vag. ant. et post. Uterus atrophicus sen.	19/xi—оп. хлороф. Colporperin. rthaph.	Безлх. Per prim.	19/xi—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Prol. v. ant. Hypertrophia part. mediae coeli. Зонд.—10½ см. Reclinatio. Hernia scutalis duplex (сь кранио лино). Дистаз прямых мышц. Endometrit.	21/1—оп. хлороф. Abrasio. Amput. c. alta. Colporperin. rthaphia.	Безлх. Per prim.	19/1—выпис. Здорова. Проможи. Солидная Anteflexio. Переводится в хирургич. отделен. для опер. грыжи.	Пометь в Мае 1908 г. что чувствуешь себя все время хорошо. Матка не выпадает. Мочится нормально. Родов не было. Благодарит и молит Бога о здоровье доктора.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, зачатие.	Регуляр.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На которых году были первые роды.	Сколько лет назад была последняя родов.	Исход родов для больной.	Последней менструации.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
53	1904 № 2574.	Е. 21 г. крест. вдова дом. хоз.	с 14 л. 3 и 3 дн.	—	1	18	2 1/2 г.	Разр. пром. помн.	Лихор.	Недержание газов и жидкого стула.	Rupt. perin. completa. Prol. v. ant. Anteversio.	21/II—оп. хлороэ. Colporrh. restorri.	Безлж. Per prim.	2/II—выпис. Здорова.	После родов в Мае 1908 г. Чувствует себя во время хорошо, промежность составная. Anus нормальный. Anteflexio mob. Сокращение Levator'a хорошо выражено. Coitus был сначала болезн. из-за утонсти. Родов не шло.
54	1904 № 2575.	Р. 33 л. крест. зам. дом. хоз.	с 17 л. 3 и 5—6 дн. сь бол.	17	5 р. 1 вык.	19	2 г. 7 м.	Разр. пром.	Лихор. послѣ родов.	Боли внизу живота и в пояснице.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Cystocele. Ectropion. Anteflexio. Endometrit. Perisymphionitis. Is. pp. sin. post. Дистазь правыхъ мыщц живота.	1/II—оп. хлороэ. Colporrh. ant. et Colporrh. rri. (Fritsch).	Безлж. Per prim.	12/III—выпис. Здорова.	
55	1904 № 2618.	М. 36 л. крест. вдова прелюба.	с 15 л. 3 и 3—4 дн.	20	2 р. 2 вык.	24	4	Разр. пром. при обоихъ родах; щипцы оба раза.	Хвор.	Чувствует выпадение частей.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Retroversio mob. Resid. parametrit.	20/X—оп. хлороэ. Colporrh. ant. et Colporrh. rri.	Безлж. Per prim.	1/X—выпис. Здорова.	После родов в Мае 1908 г. Чувствовала себя хорошо 2 года послѣ операции, а потом снова опухнула и носила кольцо, которое выпадает. Причина опухения — падение в ледник. При надувании — prol. vag. ant. et post. Retroversio mob. Промежность довольно вялая. Проба на сокращение Levator'a слабо выражена.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регуляр.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На которых году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и в каком числе была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана, Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
61	1905 № 2716.	Б. 53 л. крест. зам. прислуга.	с/ь 17 л. 3 1/2 н. 4—5 дн. 2 г. с/им.	24	4	25	20	Разр. пром.	Норм.	Выпадение около года. Запоры.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Retroversio uteri.	¹⁵ /м—оп. хлорое. Colporrhaph. ant. et Colporerin-trh.	Безлнх. Per prim.	²⁵ /м—выпис. Здорова.	Пшеть вь Мат 1908 г., что все время после операции чувствует себя хорошо. Матка не выпадает.
62	1905 № 2728.	К. 50 л. зам.	с/ь 18 л. 3—4 н. 3—4 дн.	20	5	23	20	Разр. пром.	Норм.	Выпадение. Запоры.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Atrophia uteri. Colpitis senilis.	¹ /х—оп. хлорое. и эмпт. Colporrh. ant. et Colporerin-trhaph.	Безлнх. Per prim.	¹⁵ /м—выпис. Здорова.	—
63	1905 № 2770.	Р. 52 л. ж. тов. город. гол. дом. хоз.	с/ь 14 л. 3—4 н. 5—6 дн. 3 г. с/им.	21	5 р.	22	8	Разр. пром.	Норм.	Опушение и выпадение около 8 л. усилившееся за последние 3 года.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Cystocele. Desc. ut. Retroversio.	¹ /х—оп. хлорое. + эмпт. Colporrh. ant. et Colporerin-trhapha.	Безлнх. Per prim.	²¹ /х—выпис. Здорова.	Пшеть вь Мат 1908 г., что чувствует себя все время хорошо. Выпадение не замечает. Приность признательность за удачную операцию.
64	1905 № 2781.	Б. 28 л. ж. штабс-ротмистр. дом. хоз.	с/ь 12 л. 3 1/2 н. 5 дн. обл. с/угсти.	24	2	25	7 нд.	Разр. пром.	Норм.	Выпадение частей. Боль вь сплнх. Запоры.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Reclinatio ut. Endometrit. Res. post. Cystis gid. Bartolini.	² /х—оп. хлорое. Abrasio. Colporerin-trhaph. Cystoectomia gland. Bart.	Безлнх. Per prim. кроме одного мьста расхожд.	²⁵ /х—выпис. Здорова.	Пшеть вь Мат 1908 г., что чувствует себя прекрасно. Выпадения неть. Родовь не имьла.
65	1906 № 2811.	М. 37 л. ж. ведико-брит. полд.	с/ь 11 л. 4 н. 3—7 дн.	22	2 р.	26	11 л. посл. вык. 6 нд. наз.	Разр. пром.	Норм.	Выпадение частей. Бил. Кровоотдачнн.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. Metrit. Endometrit. Oophoritis duplex.	²⁰ /—оп. хлорое. Abrasio. Colporerin-trhaph.	Безлнх. Per prim.	¹ /—выпис. Здорова.	Пшеть вь Мат 1908 г., что чувствует себя неуваваемой и призность благодарность оператору. Родовь не имьла.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, лѣта, сословіе, семейное положение, занятіе.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На которых году был первый род.	Сколько лѣтъ вназад была послѣдняя родов.	Исходъ родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность симптомов болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный методъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
66	1906 № 2823.	З. 48 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 15 л. 3 н. 7 дн. мало съ запах.	23	1	42	6	Разр. пром.	Subinvolut.	Опухненіе влагалища.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Bartholinitis. Reclinatio ut.	²⁵ /л—оп. хлорое. Colporperin.-rhrph.	Безлнх. Per prim.	¹⁰ /л—выпис. Здорова.	Послѣдована въ Маѣ 1908 г., чувствуетъ себя хорошо. Опухненія не замѣчаетъ; clim. съ Марта 1908 г., променность лактичная, при натуживаніи нѣтъ выпячиванія влагалищныхъ стѣнокъ. Сократительная способность Levator'a отчетливо выражена. Retroversio fixa.
67	1906 № 2833.	Ш. 39 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 19 л. 4 н. 5 дн. обил. вногда густок.	24	4 р. 1 вык.	25	3	Разр. пром.	Хвор.	Выпаденіе матки съ послѣднихъ родовъ. Боли внизу живота и въ половнцѣ. Dysuria.	Rupt. perin. Pro' v. ant. et post. Retroflexio ut. mob. Oophoritis sin.	²⁵ /л—оп. хлорое. Colporperin.-rhrph.	Безлнх. Per prim.	¹⁰ /л—выпис. Здорова.	—
68	1906 № 2868.	Ю. 40 л. ж. врача дом. хоз.	съ 13 л. 4 н. 5 дн. обил.	24	3	25	8	Разр. пром.	—	Неправильная кров. Боли во время кровей. 10 л. тому назад Leparatoma по поводу кисты яичника, послѣ чего еще 2 раза рожала.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Ectropion. Metrit. coli et corp. Reclin. ut. Ovuia Nabothi. Endometrit. haemorrhagica polyposa.	²⁵ /л—оп. хлорое. Abrasio. Colporperin.-rhrph.	Безлнх. Per prim.	⁹ /л—выпис. Здорова.	Пшеть въ Маѣ 1908 г., что чувствуетъ себя отлично. Не рожала.
69	1906 № 2873.	П. 43 л. ж. врачка.	съ 16 л. 3—4 н. 6—7 дн.	—	3	22	14	Разр. пром.	—	Замѣчаетъ въ этомъ году опухненіе. Боли въ половнцѣ и внизу живота. Неправильная кровя.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Metrit. chron. Cystis ovarii dextra. Endometrit.	²⁵ /л—оп. хлорое. Abrasio. Colporperin.-rhrph.	Безлнх. Per prim.	⁹ /л—выпис. Здорова.	Пшеть въ Маѣ 1908 г., что чувствуетъ себя все время хорошо. Работаетъ много, жал. врача. Выпаденія нѣтъ.

№ по порядку.	Годы. № листа.	Фамилия, имя, отчество, пол, возраст, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На каком году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана, Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
70	1906 № 2873.	Ф. 31 г. в. крест. ж. контор. дом. хоз.	с 16 л. 4 и 7 дн. обл.	22	6	23	7 м.	Разр. пром.	Хвор.	Боли внизу живота. Опухоль в паху 2-й год. Девочки болели женою. Был.	Rupt. perin. subcutanea. Prol. v. ant. et post. Retroflexio ut. Hemia inguinalis sin. Endometrit.	1/4—оп. хлороф. Abrasio Colporerin.-rharph.	Безлх. Per prim. кроме одного живота на спайке.	15/4—выпис. Здорова.	—
71	1906 № 2914.	Т. 35 л. в. крест. зам. торговка.	с 15 л. 4 и н., сей- часть чер- резь 2—2 1/2 и. по 5 дн. стукт.	17	8 р. 2	18	2 г.	Разр. пром.	Subin- volut. послѣ послѣд.	Опушение матки. Неправильный менструальный.	Rupt. perin. ProL. v. ant. et post. Metrit. chron. Res. pr. post.	2/4—оп. хлороф. Colporerin.-rharph.	Безлх. Per prim. Психозы.	25/4—выпис. Промежи. состоятел.	—
72	1906 № 2918.	Л. 25 л. в. мщц. неам. прислуга.	с 16 л. 4 и. 3—4 дн. боли до.	19	2	21	3 г.	Разр. пром.	Хвор.	С 7 год выпадѣн частей. Запоры. Боли в животе и поясницѣ.	Rupt. perin. ProL. vag. ant. Antellexio. Res. post. Perisalpyngitis.	1/4—оп. хлороф. Colporerin.-rharph.	Безлх. Per prim.	16/4—выпис. Здорова.	—
73	1906 № 2924.	Я. 36 л. в. дожд. шт.- канитана надзира- тельница бога- дельни.	с 15 л. 3 и. 3—7 дн.	22	6 р. 1	23	4 г. вых. 3 г.	Разр. пром.	Выкид. неблагог.	Боли внизу живота и в поясницѣ.	Rupt. perin. ProL. v. ant. et post. Metrit. colli. Retropositio. Enteroptosis.	15/4—оп. хлороф. Amput. с. Colporerin.-rharph.	Безлх. Per prim.	25/4—выпис. Здорова.	—
74	1906 № 2932.	М. 36 л. в. крест. зам. дом. хоз.	с 18 л. 3 1/2 и. 5 дн. обл. те- перь че- резь 6—8 и. мало.	18	6	22	2 г.	Разр. пром.	Хвор.	Выпадѣние влагалища. Запоры. Dysuria. Начало заблѣвания относится к времени 3-х родов (7 л. назад).	Rupt. perin. ProL. v. ant. et post. Metrit. Res. post.	24/4—оп. хлороф. Colporerin.-rharph.	Безлх. Per prim.	6/4—выпис. Здорова.	Пишетъ въ Мѣб 1908 г., что чувствуетъ себя все время отлично. Были один разъ, съ разрывомъ, который сросся.
75	1906 № 2933.	Т. 55 л. в. ж. двор. дом. хоз.	с 14 л. 4 и. 7 дн. обл. 4 г. сѣм.	30	3 р.	31	15	Разр. пром.	Хвор.	Выпадѣние частей. Боли въ поясницѣ Dysuria. Запоры. Больна 4 года.	Rupt. perin. ProL. v. ant. Retroflexio ut.	24/4—оп. хлороф. Colporerin.-rharph.	Безлх. Per prim.	16/4—выпис. Здорова.	Пишетъ въ Мѣб 1908 г., что все время чувствуетъ себя хорошо.

№ по порядку	Годъ, № листа.	Фамилия, лето, со- словие, се- машное по- ложение, занятие.	Результ.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выпаденей.	На сколько году были первые роды.	Сколько летъ на- задъ были послед- ние роды.	Несколько родовъ для больной.	Постродовой периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статусъ и диагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операция.	Послѣоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
76	1906 № 2937.	К. 38 л. крест. зам. землепаш.	съ 15 л. 4 н. 7 дн. много, съ бол. куск.	26	6	29	3 г.	Разр. пром.	Хвор. послѣ послѣд. родовъ.	Выпаденіе матки особенно резко при хобдѣ. Боль въ пе- ринеи. Был. Не- сила козко.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Diastasis mm. rectorum. Metrit. c. Retro- flexio mob. Res. post. Endometrit. Hypertrophi- coli.	¹¹ / ₂₁ —оп. хлорое. Abrasio Amput. c. supravagin. Colporrh. ant. et Colporperin.-rrhaphia.	Безлнх. Per prim.	²³ / ₂₁ —выпис. Здорова.	Пиметь въ Маѣ 1908 г., что чув- ствуетъ себя все время хорошо. Матка не выпа- даетъ.
77	1907 № 2960.	К. 27 л. двор. зам. служит. на Нивкол. ж. дорогѣ.	съ 13 л. 4 н. 3—5 дн. теперь ² / ₂ н. 9—10 дн. обил.	20 4 вык.		21	6	Разр. пром.	Хвор. послѣ выкид.	Чувство тяжести внизу живота. Не правильныя кровя- послѣдн. ¹ / ₂ годъ был.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. Anteflexio ut. in retropositione, Res. post. Endometrit.	¹² / ₂₁ —оп. хлороф. Abrasio. Colporperin.- rrhaph.	Безлнх. Per prim., кромѣ 2-хъ швовъ.	²⁰ / ₂₁ —выпис. Здорова.	—
78	1907 № 2972.	С. 33 л. мѣд. жена. порти.	съ 14 л. 4 н. 3—4 дн. съ бол.	22	5	23	3 г.	Разр. пром.	Хвор. послѣ послѣд. родовъ.	Тяжесть внизу жи- вота. Затрудненіе при дефекаціи с I родовъ. Опер. Fistulae ani. Dysuria был.	Rust. perin. Prol. v. ant. et post. Anteflexio. Res. pp. post. Endometr.	⁵ / ₂₁ —оп. хлорое. Abrasio. Colporperin.- rrhaph.	Безлнх. Per prim.	²¹ / ₂₁ —выпис. Здорова.	Пиметь въ Маѣ 1908 г., что чув- ствуетъ себя хо- рошо. Матка не выпадаетъ. Бере- менна на 4-омъ мѣ- сяцѣ.
79	1907 № 2981.	С. 47 л. потомств. гражд. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 6—7 дн. 3 мѣс. еім.	17	2	32	13	Разр. пром.	Хвор. послѣ II родъ.	Опушеніе 7 л. и задъ, усиливающее при ходьбѣ и ра- ботѣ.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Diastasis mm. rectorum. Res. post. Morbus Base- dovii. Dilatatio cordis.	¹⁰ / ₂₁ —оп. кокаинъ (расшир. сердца) Colporrh. ant. et Colporperin.-rrhaph.	Одно повышен. 39° Per prim.	²³ / ₂₁ —выпис. Здорова.	—
80	1907 № 2984.	Г. 55 л. мѣд. зам. дом. хоз.	съ 16 л. 3 н. 4—5 дн. ² / ₂ г. еім.	18	11	20	13	Разр. пром. послѣ II родъ.	—	2 г. тому назад опушеніе.	Rupt. perin. Descensus vag. ant. et post. Cystocele.	¹⁰ / ₂₁ —оп. хлорое. Colporrh. ant. et Colporperin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	¹ / ₂₁ —выпис. Здорова.	Пиметь въ Маѣ 1908 г., что чув- ствуетъ себя все время очень хо- рошо. Опушенія нѣтъ.
81	1907 № 3038.	И. 40 л. мѣд. зам. прислугѣ.	съ 12 л. 4 н. 3 дн.	20	4 р. 7 вык.	21	4 г.	Разр. пром.	Хвор. послѣ послѣд. родовъ.	Чувство напирани- на нязъ и выпаденіе Dysuria. Запоры. Вис- симптомы появили- со времени послѣд- ныхъ родовъ. Был.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Metrit. coli follicularis. Res. post. et Haemorrhoides. Endometrit.	⁵ / ₂₁ —оп. хлорое. Abrasio. Excisio. coli. Colporperin.- rrhaphia.	Безлнх. Per prim., кромѣ одного поверхи, расхожд.	¹⁰ / ₂₁ —выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ. № листа.	Фамилия, имя, со- словие, се- мейное по- ложение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На которыхъ году были первые роды. Сколько летъ, на- задъ были послед- ние роды.	Возрастъ родовъ для большой.	Последней периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статусъ и диагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операция.	Постоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
82	1907 № 3040.	З. 24 л. крест. зам. дом. хв.	съ 15 л. 3—4 п. 4 дн. мало, съ бол. до.	23	1	24	2 м.	Разр. пром. при людиш. предлж. запшт. не срос.	Хвор. Боли внизу жи- вота. Бѣл. Запоры. Газы и жидкй стулъ удерживаетъ.	Rupt. perin. complet. Семикгъ надорван. Retro- flexio mob. Resid. post.	¹⁵ /x—оп. хлорос. Colporerin-recto- vagin. ant. et post. Pro- flexio mob. Resid. post.	Безлнх. Per prim. кроме поперхи. расходъ на промеж.	²⁵ /x—выпис. Возстановл. промежи.	
83	1907 № 3062.	Ш. 50 л. крест. зам. адова прачка.	съ 14 л. 4 п. 5 дн. 3 г. clim.	18	3	19	25	Разр. пром.	Хвор. Выпадение матки послѣдня 9 л. Dys- suria.	Rupt. perin. Prol. vag. post. Colpitis senilis. Res. post. Descensus ut.	¹⁵ /x—оп. хлорос. Colporerin-rhaph.	Безлнх. Per prim.	²⁵ /x—вып. Здорова.	Пипеть, что чув- ствуетъ себя хо- рошо. Принадле- жить. Принюеть благодарность за возвращение здо- ровья. Работаетъ по стиркамъ.
84	1907 № 3069.	Щ. 28 л. зам. сестра мылосердия.	съ 13 л. 4 п. 4—5 дн.	21	1	26	3 г.	Разр. пром.	Норм. Боли внизу жи- вота и въ поясницѣ. Dysuria.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Metritis. Salpingoophori- tis. Res. dextra.	²⁵ /x—оп. хлорос. Colporerin-rhaph.	Безлнх. Per prim.	⁴ /x—выпис. Здорова.	Пипеть въ Октя- брь 1908 г., что чувствуетъ себя все время хорошо. Не рожала и не беременѣла.
85	1907 № 3077.	Р. 35 л. мѣщ. зам. дом. хоз.	съ 16 л. 3—4 п. 3 дн.	24	5 р. 2 вык.	23	1 г. 8 м.	Разр. пром.	Хвор. Чувство опущенія и выпирания (9 л.). Носила кольца, ко- торья плохо уде- рживали выпадение Боли въ поясницѣ.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Rectocele. Ectropion. Anteflexio.	⁷ /x—оп. хлорос. Colporerin-rhaph.	Безлнх. Per prim.	¹² /x—выпис. Здорова.	Пипеть въ Сен- тябрь 1908 г., что чувствуетъ себя хорошо. Не ро- жала.
86	1907 № 3079.	С. 28 л. ж. мастера, дом. хоз.	съ 14 л. 3—4 п. по 5—7 дн.	18	7	19	2 г.	Разр. пром.	Хвор. Боли въ поясницѣ и въ пахахъ. Крово- течение 2-й месяцы.	Rupt. perin. Prol. v. post. Retro-dextro-positio. Endometrit. Res. pp. dextra et post.	²⁵ /x—оп. хлорос. Abrasio. Colporerin- rhaph.	Безлнх. Per prim.	⁵ /x—выпис. Здорова.	—
87	1897 № 84.	Л. 52 л. ж. ген- майора дом. хоз.	съ 15 л. 3½ п. 4 дн. сва. 1 г. clim.	17	7	—	20	Разр. пром.	Норм. Около года чув- ство напирания внизъ и выпадение влага- лища.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Colpitis adhaesiva. Degeneratio cordis.	¹⁴ /x—оп. безъ нар- коза и подъ кокаи. Colporrh. ant. et Colporerin-rhaph.	Безлнх. Per prim.	⁴ /x—выпис. Промежи. Возстановл. Выпад. стѣ- нокъ влагали- щъ.	Пипеть въ Мѣй 1908 г., что чув- ствуетъ себя все время совсѣм хо- рошо.

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лѣта, семейное положеііе, занятіе.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На которомъ году были первые роды.	Сколько лѣтъ назадъ были послѣдніе роды.	Исходъ родовъ, для больной.	Послеродовой періодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный методъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
88	1897 № 99.	Г. 38 л. зам. дом. хоз.	съ 16—17 л. 4 н. 7 дн. сил.	20	8 р. 1 вык.	21	2	Разр. пром. при I род. щипцы.	Всегда слабость.	Боляя 4 р. Болъ въ послѣдн. Обшая слабость. Сердцебиеніе.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Endometrit. Resid. Anteversio.	$\frac{1}{2}$ х—оп. хлороф. Abrasio. Colporperin-rhaph.	Безлѣх. Per prim.	$\frac{21}{4}$ х—выпис. Здорова.	—
89	1897 № 102.	Г. 38 л. ж. в.	съ 17 л. 4 н. 4—5 дн.	20	3	21	12	Разр. пром. при I род.	Хвор. послѣ II род.	Чувство напранія внизъ. Болъ въ поясницѣ. Бѣлы.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Endometrit. chron. Anteversio.	$\frac{2}{2}$ х—оп. хлороф. Colporrh. ant. et Colporperin-rhaph.	Безлѣх. Per prim.	$\frac{25}{2}$ х выпис. Здорова.	—
90	1897 № 144.	В. 27 л. мѣш. незам. портниха.	съ 14 л. 4 н. 3—4 дн. съ бол.	23	2 р. 2 вык.	—	—	Разр. пром. при I род.	Хвор.	Ощущеніе амагална и болъ внизу живота съ I родовъ. Бѣлы.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Retroversio. Res. pp. Endometrit.	$\frac{2}{2}$ хп—оп. хлороф. Abrasio Colporperin-rhaph.	Безлѣх. Per prim. Гинекол. массаж.	$\frac{17}{4}$ х—выпис. Здорова.	—
91	1898 № 5.	Б. 40 л. крест. зам. чернораб.	съ 17 л. 4 н. 4 дн. 3 г. clim.	17	8	18	4	Разр. пром. при VI род.	Норм.	Около 4 л. чувство напранія внизъ, особенно при ходьбѣ и при всякомъ напраніи брюши. пресса. Поверглась записанію промежности 10 л. назадъ.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Residua.	$\frac{12}{4}$ х—оп. хлороф. Colporperin-rhaph.	Безлѣх. Per prim.	$\frac{25}{4}$ х—выпис. Здорова.	—
92	1898 № 11.	Л. 44 г. вдова кол. ас. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 7—8 дн. сил.	19	13	20	7	Разр. при I род., щипцы, зашитъ, не сросся.	Хвор. послѣ I—III родовъ тромбозъ венъ нижн. конечн.	Послѣ послѣднихъ родовъ чувствуетъ себя большею; болъ внизу живота, обильныи менструальныи и чувство напранія внизъ при ходьбѣ и стояніи.	Rupt. perin. Prol. v. post. Hernia lineae albae. Res. pp. post.	$\frac{20}{1}$ х—оп. кокаи. (слабость сердца). Colporperin-rhaph.	Безлѣх. Per prim.	$\frac{5}{2}$ х—выпис. Здорова.	—
93	1898 № 43.	Б. 36 л. ж. землемѣра дом. хоз.	съ 11 л. 6 н. 3—4 дн.	30	2	—	1½	Разр. пром. при I род., щипцы, зашитъ, сросся при II разр., зашитъ, не сросся.	Норм.	Со времени II родовъ болъ въ поясницѣ. Бѣлы.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Retroversio ut. Res. sin. Endometrit.	$\frac{27}{2}$ х—оп. хлороф. Abrasio. Надрубываніе рубца и Colporperin-rhaphia.	Безлѣх. Per prim.	$\frac{15}{2}$ х—выпис. Здорова.	Пинетъ въ Маб 1908 г., что чувствуетъ себя все время хорошо. Не рожала.

№ по порядку.	Годъ. № листа.	Фамилия, звѣта, со- словие, се- мейное по- ложение, занятіе.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выжиданій.	На которомъ году были первые роды, сколько лѣтъ на- задъ были послѣд- ніе роды.	Источъ родовъ для большой.	Послеродовой періодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	
94	1898 № 53.	Л. 33 л. мѣщ. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 3—4 дн. сил. сгусты.	24	2	—	4	Разр. пром. при I род. не зашит.	Норм.	Чувство напирани- я и опущенія внизъ съ I родовъ. Гемор- роидальныя шишки и геморроидальное кровотеченіе. Бѣлн.
95	1898 № 71.	К. 50 л. ж. двор. повѣщ.	съ 12 л. 4 н. 5 дн. съ бол. сѣм. 3 г.	23	2	—	13	Разр. пром. при I род. не зашит.	Нарм.	Чувство напирани- я на задній проходъ. 2½ г. не могла вы- сидѣть, ни ходить. Послѣ гинекологи- ческаго массажа по- правилась.
96	1898 № 109.	Б. 23 л. крест. незам. забръщн.	съ 15 л. 4 н. 6—7 дн. съ бол.	18	2	20	5 м.	Разр. пром. при I род. не зашит. не сросся.	—	Чувство напирани- я и боли внизу живота.
97	1898 № 110.	Н. 26 л. крест. незам. прислуга.	съ 14 л. 4 н. 3—4 дн. саб.	21	2	21	2	Разр. пром. при I род. не зашит.	—	Напирание внизъ и выпаденіе матки около 5 л. Боли въ поясницѣ и внизу живота. Бѣлн, Ду- сугія.
98	1898 № 133.	В. 39 л. мѣщ. зам. кухарка.	съ 14 л. 4 н. 4—5 дн. сил.	23	5 р. 4 выг.	—	—	Разр. пром. при I род. не зашит.	Норм.	Опухненіе и боли внизу живота. Обиль- ныя крови. Бѣлн.

Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана, Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зултаты: Субъективные и объективные.
Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана, Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зултаты: Субъективные и объективные.
Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Ectropion. Endometrit. Res. pr. sin.	¼—оп. хлороф. Abrasio. Colporperin- trihar.	Безилх. Per prim.	21/и—выпис. Здорова.	Наслѣдована въ Май 1908 г., чув- ствуетъ себя все время хорошо. Ро- жала 2 раза. Про- мѣжность довольно состоятельная. Разры- вы не спаивѣт. При возуживаніи малѣйшія стѣн- ки немного выпи- чиваются. Levat. ani функционируетъ хорошо. Anteflexio.
Rupt. perin. Большіе рубцы. Prol. v. ant. et post. Retroversio fix. Res. post.	¼—оп. хлороф. Colporperin-trihar.	Безилх. Per prim.	15/iv—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Prol. v. ant. Anteversio.	⅞—оп. хлороф. Colporperin-trihar.	Безилх. Per prim.	29/ix—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Descensus ut. et vag. ant et post. Retroversio mob. Endomet- rit.	22/ix—оп. хлороф. Abrasio. Colporperin- trihar.	Безилх. Per prim.	7/x—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Anteflexio. Met- rit. Endometrit. chron. Res. post. Perioophorit. dextra.	26/x—оп. хлороф. Abrasio. Colporperin- trihar.	Безилх. Per prim.	12/xi—выпис. Здорова.	Пишетъ въ Май 1908 г., что все время чувствуетъ себя хорошо. Не рожала.

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лѣта, со- стояние, се- мейное по- ложение, занятіе.	Речуны.	Начало молочной железы.	Число родовъ и выпадения.	На которомъ году было первое ро- ждение. Сколько лѣтъ на- задъ были после- дніе роды.	Исходъ родовъ для больной.	Послеродовой періодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	
99	1898 № 137.	Р. 60 л. ж. купца, дом. хоз.	съ 17 л. 4 н. 2—3 дн. 16 л. сlim.	32	6 р. 1 вык.	33	17	Разр. пром. при I род. щипцы.	Хвор. послѣ I род. розины, горячки.	Исподволь, въ те- чение 10 л. опуше- ние влагалища. Но- сила кольцо.
100	1898 № 175.	В. 30 л. ж. учит. дом. хоз.	съ 14 л. 3—4 н. 5 дн. болн.	25	2	25	4	Разр. пром. при I род. запнт., не спросит; оба раз- щипцы.	Хвор. послѣ I род.	Опушение стѣнокъ влагалища со вре- мени I родовъ. Белн.
101	1899 № 12.	П. 33 л. ж. вап- тана.	съ 13 л. 4 н. 3—4 дн.	18	4	—	6	Разр. пром.	Норм.	Около 3 л. чув- ство напирания внизъ. Dysuria. За- поры.
102	1899 № 47.	П. 50 л. ж. вице- адмир.	съ 17 л. 3—4 н. 7 дн. 4 г. slim.	24	4 р. 1 вык.	—	20 л. наз. вык.	Разр. пром.	Хвор. послѣ II род.	Около 6 л. выпад- еніе прямой кишки.
103	1899 № 58.	К. 33 л. двор. зам. дом. хоз.	съ 15 л. 3 н. 6 дн.	24	6	—	—	Разр. пром.	Норм.	Выпаденіе стѣнокъ влагалища около 3 л. при натуживаніи Menorrhagia. Белн. Запоры.

Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post.	²⁰ x—оп. хлороф. Colporrh. ant. et Colporperin.-rrharh.	Безлнх. Per prim., кровоѣ одного шва.	²² xI—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Prol. v. post. Anteflexio, Endomet- rit. Cyst. Bartolin.	²⁰ xII—оп. хлороф. Abrasio. Colporperin- rrharh. Ectomia gld. Bartolin. hyper- troph.	Безлнх. Per prim.	¹⁶ l—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Descensus. vag. ant. et post. Ante- versio.	¹⁵ l—оп. хлороф. Colporperin.-rrharh.	Безлнх. Per prim.	²⁰ l—выпис. Здорова.	Последована въ Маѣ 1908 г., 4-рою С. — Чувствуетъ себя все время хо- рошо. Не рокала. Промежность со- стоятельная. Выпа- чиванія нѣтъ.
Rupt. per. Prol. v. ant. et post. Prol. recti. Insufi- cientia fundi pelvis.	⁵ III—оп. хлороф. Разрывъ превра- щеніемъ разсѣченіемъ сфинктера въ по- лнх. Colporperin- recto-rrh.	Безлнх. Per prim.	²⁷ III—выпис. Здорова.	—
Rupt. per. Descensus. vag. ant. et post. Ante- versio. Endometrit.	¹⁴ III—оп. аэвр. (не- значительн. измене- нія въ сердцѣ). Abra- sio. Colporperin- rrharh.	Безлнх. Per prim. за исключ. небольн. поверхн. расхожд.	¹ IV—выпис. Здорова.	Пшеть въ Маѣ 1908 г., что чув- ствуетъ себя все время хорошо. Роды были черезъ 2 года, послѣ опера- ціи; былъ маде- ній разрывъ, за- шитъ и сросся.

№ по порядку.	Годъ, № акта.	Фамилия, лѣта, со- словіе, се- мейное по- ложение, занятіе.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выздоровлѣній.	На какомъ году были первые роды, Сколько лѣтъ на- задъ были послѣд- ніе роды.	Источъ родовъ для большой.	Послеродовой періодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послѣоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдѣльные ре- зультаты: субъективные и объективные.	
104	1899 № 101.	Ф. 30 л. ж. врача дом. хоз.	съ 17 л. 4 н. 7 дн.	20	5	21	1 г. 2 м.	Разр. пром. Норм.	Опушение вла- дниц около 8 л. Бѣ- ли. Запоры.	Rupt. perin Descensus, vag. ant. et post. Endo- metrit. catarrhalis. Ante- flexio. Res. p. sin.	²⁰ / _{iv} —оп. хлороф. Abrasio. Colporperin- rrrhaph.	Безлх. Per prim.	¹⁵ / _v —выпис. Здорова.	—	
105	1899 № 105.	Д. 27 л. ж. солд.	съ 16 л. 4 н. 3—4 дн.	22	3 р. 1 вык.	23	3 м.	Разр пром. волн. послѣ II род.	Недержание газомъ и жидкаго стула съ времени II родовъ (2 г. назадъ).	Rupt. perin completa. Prof. vag. ant Anteversio. Res. pp. metrit.	²⁰ / _{iv} —оп. хлороф. Colporperin-recto- rrh.	Безлх. Per prim.	¹⁴ / _v —выпис. Здорова.	—	
106	1899 № 205.	П. 25 л. двор. зам. дом. хоз.	съ 16 л. 4 н. 4 дн. съ бол.	20	2	21	8 м.	Разр. пром. Норм.	Чувство тяжести внизу. Выпаденіе матки.	Rupt. perin. Prof. v. ant. et post.	²¹ / _{xii} —оп. хлороф. Colporperin-rrrhaph.	Безлх. Per prim.	⁵ / _i —выпис. Здорова.	—	
107	1900 № 6.	Б. 34 л. крест. прачка зам.	съ 16 л. 3 н. 5 дн.	21	4	21	2 г. 4 м.	Разр. пром. при I род.	Выпаденіе съ I ро- довъ; 4 г. назадъ за- пнили промежность, и чего чувств. себя хорошо, но съ по- слѣднихъ родовъ сно- ва стала замѣчать выпаденіе, размеры когого доходить до кулака. Выпаденіе легко вправляется рукой.	Rupt. perin. Prof. v. ant. et post. Cystocele. Rectocele. Retroversio mob.	²⁵ / _i —оп. хлороф. Colporperin-rrrhaph.	Безлх. Per prim.	¹⁰ / _{ii} —выпис. Здорова.	—	
108	1900 № 8.	Д. 27 л. ж. шт. капит.	съ 13 л. 4 н. 3 дн. сва.	21	2 р. 1 вык.	21	1½ г.	I роды тяжелы. II роды тоже тяж. высок. шиши; при вихъ полн. разр. пром.	Хвор. послѣ родовъ.	½ г. опущеніе и выпаденіе матки Кровянистая бѣли Жидкихъ испражнен- ій и газомъ не дер- жать со времени II родовъ.	Rupt. perin. et recti sub- cutanea. Prof. v. ant. et post. Antelexio. Elongatio colli. Cystis ovarii. dextri incipiens. Descensus uteri.	¹⁴ / _i —оп. хлороф. Colporperin-recto- rrh. Сдѣлано раз- сѣченіе остатка ко- жи до слизистой оболочки recti.	Безлх. Per prim.	²⁵ / _i —выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лѣта, со- словие, се- вейшее по- ложение, занятіе.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На которыхъ году были первые роды. Сколько лѣтъ на- задъ были послед- ние роды.	Исходъ родовъ для болевой.	Послеродовой периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.
109	1900 № 24.	Р. 29 л. двор. зам. дом. хоз.	съ 15 л. 4 н. 5—6 дн.	20	6 р. 2 вык.	—	—	Разр. пром. при послѣд. родахъ.	Норм. Болезна 8 мѣс. съ выкидыша. Боль внизу живота. Ме- норрагія. Запоры.
110	1900 № 29.	П. 26 л. крест. зам. портниха.	съ 16 л. 3½ н. 7 дн. съ бол.	17	4 р. 1 вык.	—	—	Разр. пром.	Норм. Около 2 л. Ме- норрагія. Боли въ спинѣ и животѣ Бѣл.
111	1900 № 58.	М. 28 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 15 л. 3 н. 6—7 дн. съ бол. сил.	25	2 р. 1 вык.	—	6 нл.	Разр. пром. полн. при II род.	Хвор. послѣ II род.
112	1900 № 67.	Ф. 50 л. зам. дом. хоз.	съ 16 л. 4 н. 3 дн.	20	4	—	—	Разр. пром.	Норм. Опухленіе стѣнок влагалища. Въ 1897 была удалена матка вълѣдствіе фибромъ опы

Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
—	—	—	—	—
Rupt. perin. Prol. v. vag. ant. et post. Endometrit. hyperplastica. Res. pp. metrit.	½/и—оп. хлороф. Alarasio. Ampul. с. Colporerin.-rrharb.	Безвхл. Per prim.	15/и—выпис. Здорова.	Помнить въ Марѣ 1908 г., что чув- ствовала себя хоро- шо до родовъ (1½ гола назадъ). Роды быстрые— ½ часа. Разрывъ защиты, сороса. Изшла еще 2 вы- кидыша и 3 вы- скабливанія. Стра- даетъ теперь опу- щеніемъ матки.
Rupt. perin. Metrit. Endometrit. Ectropion. Prol. vag. ant. et post.	¾/и—оп. хлороф. Colporerin.-rrharb.	Безвхл. Per prim.	18/и—выпис. Здорова.	Послѣдована въ Марѣ 1908 г., чув- ствуетъ себя все время хорошо. Промѣнность со- стоятельна. Вы- пичиванія нѣтъ. Anteversio.
Rupt. perin. completa. Prol. vag. ant. et post. Anteversio mob.	10/и—оп. хлороф. Colporerin.-recto- rrh. + Смерть сейчасъ же по оконч. операціи (отъ наркоза).	—	—	—
Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post.	17/и—оп. хлороф. Colporerin.-rrharb.	Безвхл. Per prim.	23/и—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лето, со- словие, се- мейное по- ложение, за- нятие.	Регуль- ный.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На которыхъ го- ды были первые ро- ды. Сколько летъ на- задъ были послѣд- ние роды.	Исходъ родовъ для больной.	Послеродовой периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, данность и симптомы болезни.	Статусъ и диагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: Субъективные и объективные.
113	1900 № 87.	К. 37 л. вдвст. вдова преступа.	съ 16 л. 3 и. 6 дн. сн.	18	4 р. 1 вык.	—	Разр. пром.	—	2-й г. чувство опу- щения матки.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Retroflexio. mob. Endometrit.	²⁵ / _у —оп. хлороф. Abrasio. Colpoperin- rrhaph.	Безлнх. Рег. prim.	¹⁵ / _у —выпис. Здорова.	—
114	1900 № 92.	Х. 31 г. ж. вниж. пут. сооб.	съ 12 л. 4 и. 5 дн.	21	3	22	3	Разр. пром. при I род. щипцы.	Норм. Чувство напир- анія внизъ. Опуше- ніе стенокъ влагалища. Боли внизу животъ и въ поясницѣ. Боль- на со II родовъ (6 л назадъ) отъ нерос- теиса променности. Послѣ III родовъ яв- ленія опущенія уси- лились. Разрывъ при этихъ родахъ уве- личился.	Rupt. perin. Descensus. vag. ant. Retroflex. mob. Endometrit. Desc. ut.	²⁵ / _у —оп. хлороф. Abrasio. Colpoperin- rrhaph.	Безлнх. Рег. prim.	⁵ / _у —выпис. Здорова.	Пишетъ въ Мат 1908 г., что чув- ствуетъ себя все время хорошо. Роды изъшла 5 летъ назадъ. Была сла- бана — во время портыванія го- ловки Perinaeoto- mia. Защита и срослась.
115	1900 № 98.	Б. 40 л. ж. капи- тана.	съ 14 л. 4 и. 5 дн.	21	3 р. 2 вык.	—	7	При послѣд. родахъ экламп. щипцы Разр. пром. не зашит.	—	Болезнь съ послѣд- нихъ родовъ. Чув- ство напирания внизъ. Dysuria.	Rupt. perin. Prol. v. ant. ⁵ / _у —оп. хлороф. Colpoperin-rrhaph.	Безлнх. Рег. prim. мѣстами поверхн. раскожд. вълѣдств. мортивкац. ткани.	¹⁵ / _у —выпис. Здорова.	—
116	1900 № 118.	Ш. 32 л. ж. капит. дом. хоз.	съ 16 л. 4 и. 7 дн. слаб.	16	2 р. 1 вык.	—	—	Разр. пром.	Норм. 13 л. жалуется на увеличеніе шейки матки, которая пе- казывается наружу. Бли.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Metrit. coll. et corp. uteri. Retroflexio fix. Endometrit.	¹⁵ / _х —оп. хлороф. Abrasio. Amput. coll. Colpoperin-rrhaph.	Безлнх. Рег. prim.	²⁵ / _х —выпис. Здорова.	—
117	1900 № 125.	Г. 37 л. вдвст. вдова прачка.	съ 15 л. 4 и. 7 дн. сн.	20	7	—	1 годъ 8 м.	Разр. пром.	Хвор. Выпаденіе матки около 3 л. Носила кольцо. Бли.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. Descensus. uteri. An- teversio. Erosiones coll ut. Metrit. coll. Endometrit. Decubitus fornic. sin. vagin. отъ кольца.	⁵ / _х —оп. хлороф. Abrasio. Amput. c. Colpoperin-rrhaph.	Безлнх. Рег. prim.	²⁵ / _х —выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лето, со- словие, со- едине по- ложение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выпадения.	На которыхъ году были первые роды. Сколько летъ на- задъ были послед- ние роды.	Источъ родовъ для болезни.	Постродовой перодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Состоять и диагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана, Состояние при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.	
118	1901 № 1.	К. 60 л. ж. почтен. гражд.	съ 15 л. 4 н. 6—7 дн. сл. съ бол. 17 л. clim.	24	3	—	26	Разр. пром. съ 1 род.	Норм.	Съ 1 родовъ разви- лись выпаденіе матки. После родовъ матка. Паховая грыжа изъ за которой была 2 раза операция, но безрезультатно.	Rupt. per. Descens. vag. ant. et post. et uteri. Retroversio. Hernia ingui- nalis dextra.	² / ₁ —оп. комбин. (ar- teriosclerosis). Colpo- perin.-rrhaph.	Безмх. Per prim. мѣстами поверхи. раскожд.	²⁵ / ₁ —выпис. Здорова.	—
119	1901 № 59.	А. 37 л. ж.внц. зам. дом. хоз.	съ 12 л. 3 1/2 н. 3 дн. съ болъю. clim.	17	4 р. 4 вык.	—	12	Разр. пром. послѣ II род.	Норм.	Опушение стѣнокъ влагалища около 17 г. Подвергалась 4 разъ запиранию промеж- ности и 3 г. назадъ была удалена матка.	Rupt. perin. Prof. vag. ant. et post. Матки нѣтъ.	¹⁴ / ₁ —оп. хлороз. Colporrh. ant. et Col- porperin.-rrhaph.	Безмх. Per prim. мѣстами поверхи. раскожд.	² / ₁ —выпис. Здорова.	—
120	1901 № 122.	Т. 43 г. врач. зам.	Слѣ	дѣ	нѣ	нѣ	тѣ.	Разр. пром.	—	Чувство напирания внизъ. Пахово дер- жится злова при на- пряженіи. Матка уда- лена 1/2 г. назадъ по поводу эфроматоза. Послѣ этого явленія опущения усильнись.	Rupt. perin. Prof. v. ant. Матки нѣтъ.	²⁵ / ₁ —оп. хлороз. Colporperin.-rrhaph.	Безмх. Per prim.	¹⁴ / ₁ —выпис. Здорова.	Пшеть въ Матъ 1908 г. и отказы- вается почему-то дать о себѣ свидѣ- нія, говоря, что у нея удалена матка, а другой операциі, будто бы, не было.
121	1901 № 126.	Х. 49 л. ж. город. голова дом. хоз.	Слѣ	дѣ	нѣ	нѣ	тѣ.	Разр. пром.	—	Около года чув- ство напирания внизъ при напряженіи брюшного пресса и выпаденіе стѣнокъ влагалища. 2 г. на- задъ была удалена эфиброматозная матка черезъ влагалище и черезъ годъ ста- замѣчать выпаденіе влагалища.	Rupt. perin. subcutan. Prof. v. post. Rectocoele.	⁵ / ₁ —оп. хлороз. Colporperin.-rrhaph.	Безмх. Per prim.	²⁷ / ₁ —выпис. Здорова.	—

БИБЛИОТЕКА
Харьковского Медицинскаго Института

№ по порядку.	Годы. № листа.	Фамилия, дата, со- словие по- ложение, занятия.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выпадения.	На котором году были первые роды. Сколько лет на- зад были после- дние роды.	Исход: родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный ме- тод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.	
122	1901 № 136.	К. 40 л. зам. акуш. и дантист.	с 15 л. 4 и 3 дп. слаб.	32	3	—	4½ г.	При I род. эклампсия. III роды двойни, при измечении 2-го плода получила разр. пром.	Хвор. после III род.	Болезнь с после- дних родов. Напри- мер, вывих. Близ Запоры.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Endometrit.	19/x—оп. хлорое. Abrasio. Colporerin- gthaph.	Безвях. Per prim.	29/x—выпис. Здорова.	—
123	1901 № 138.	Г. 37 л. зам. дом. хоз.	с 13 л. 4 и 4—5 дп. слаб.	21	7	—	1½ г.	Разр. пром. при III род.	Хвор. после родов.	После VI родов (7 л. назад) чу- ство напирания вниз и опущения. В 1900 ямгла гнойный паре- метриг, который был вскрыт через брюшные покровы.	Rupt. perin. Prol. v. ant.	26/x—оп. хлорое. Амрит. с. Colporith. ant. Colporerin- gthaph.	Лихорад. 5 дн. выше 38°. Поверхн. расход. швов на промежи. Замале- ние per granul.	15/x1—выпис. Здорова.	—
124	1901 № 140.	Д. 35 л. крест. зам. дом. хоз.	с 16 л. 3 и 7 дп. сна.	18	7	—	1 г. 3 м.	Разр. пром. при III род.	Отвек погь.	7 л. выпадение че- стей. Болн внизу жи- вота и в поясниц. (со времени III ро- дов). Вылн.	Rupt. perin. Prol. vag. aut. et post. Endometrit.	21/x—оп. хлорое. + разр. Abrasio. Col- porith. ant.-Colpor- erin-rrh.	На 5-й день веч. 39,7°. Cystitis. швы per primam, кровя часть передней стныи.	25/x1—выпис. Здорова.	Последована в Мае 1908 г., чу- ствует себя все время хорошо. Ро- дов не было. После операции около года coitus был болезненный, вследствие уоста вагалища. Про- можность шир- ном в 3 пальца. Решива веть. Retroversio mob.
125	1901 № 157.	Б. 58 л. ж. управ- ляющего дом. хоз.	с 14 л. 4 в. 3—4 дп. 8 л. clim.	21	10 р. 1 вык.	—	—	Разр. пром. I роды двойни.	Норм.	6 л. чувство опу- щения.	Rupt. perin. Descensus. vag. ant. et post. Erosiones.	15/x1—оп. хлорое. Colporerin-rrhaph.	Безвях. Per prim.	26/x1—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа	Фамилия, имя, отчество, пол, возраст, состояние, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На протяжении года были ли первые роды.	Сколько лет, назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.
126	1901 № 186.	Г. 40 л. ж. купца.	с 15 л. 4 н. 3—6 дн.	17	7 р. 2 вык.	—	8	Разр. пром. подожки.	Норм.	Чувство напирания вниз при физическом напряжении. Dysuria. Б.Ы.
127	1902 № 74.	К. 40 л. крест. зам. дом. хоз.	с 16 л. 4 н. 7 дн. свд.	19	6	—	3	Разр. пром. при посвд. родах. Ручное отделение послвда.	—	Со времени последних родов (3 г.) боли в спине и в пояснице.
128	1902 № 119.	П. 25 л. ж. помщн.	с 14 л. 4 н. 7—9 дн. свд. стугст.	16	4 р. 1 вык.	—	11 м.	Разр. пром. при I род. Незамт.	Норм.	С I родов чувствование опущения, увеличивается за последнее время. Menorrhagia. Кротохарание. Б.Ы.
129	1902 № 133.	Х. 38 л. ж. зам.	с 13 л. 4 н. 6 дн. свд. с 13 л. 4 н.	17	7	—	3	Разр. пром. при посвд. родах.	Норм.	Больна 3 г. с последних родов. Опущение влагалища. Боли внизу живота и в пояснице. Б.Ы.
130	1902 № 170.	А. 40 л. ж. есудд. бойск. доб.	4—5 лн. с 4 бол.	23	8 р. 1 вык.	—	1 1/2 г.	Разр. пром.	Норм.	Напряжение вниз. Боли в крестце и внизу живота. Запоры и раздражение нервыя ядения.
131	1903 № 2.	И. 27 л. ж. крест. зам. прислуга.	с 16 л. 3 н. 6 дн. свд. с 4 бол.	23	2	24	—	Разр. пром.	Хвор.	Посл I родов встала на 5-й день и принялась за тяжелую работу, — тогда же почувствовала, что матка и все тазовые органы опустились. Б.Ы.

Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана, состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
Rupt. perin. subcutan. Prol. vag. ant. et post. Anteversio mob. Ectropion. Endometrit.	¹⁴ /x—оп. хлороз. Abrasio. Colporperin. rhrph.	Безлнх. per prim. у спайки поверхн. расхожд.	²⁰ /x—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Prol. v. ant. Retroflexio mob. Descensus uteri. Metrit. coli chron.	⁵ /iv—оп. хлороз. потомъ экер. Amput. c. Colporperin. rhrph.	2 дня лихорад. Поверхн. расхожд. мстами.	²⁰ /iv—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Descens. vag. ant. Endometrit.	⁷ /x—оп. хлороз. Abrasio. Colporperin. rhrph.	Безлнх. Per prim.	²⁰ /x—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Hypertroph. port. vaginae. Retroversio. Laceratio colli. Endometrit.	²¹ /x—оп. хлороз. Abrasio. Amput. c. Colporperin. rhrph.	Безлнх. Per prim.	¹⁴ /x—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Descens. vag. ant. Retroversio m. Endometrit.	²⁰ /xii—оп. хлороз. Abrasio. Colporperin. rhrph.	Безлнх. Per prim. кромъ небольш. расхожд.	¹² /x—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Cystocele. Retroflexio mob. Perimetrit. sin. Oophoritis sin. Endometrit.	¹⁰ /i—оп. хлороз. Abrasio. Colporperin. rhrph.	Безлнх. Per prim. кромъ небольш. расхожд.	²⁴ /i—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Роды.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.
132	1903 № 3.	Ф. 29 л. лекарск. помощ. зам.	с 11 л. 9—4 н. 7 дн. сил.	25	2	26	1	Разр. пром. при I род. и задержка оболочек.	—	Около года опущение влагалища. Меноррагия. Висцер. Малокровие. Нервность.
133	1903 № 23.	Б. 25 л. крест. зам. торговка.	с 14 л. 4 н. 4—5 дн. сил. сь бол.	16	3 р. 1 вык.	17	1 1/2 г.	Разр. пром.	—	Около 6 мѣс. боль внизу живота и в крестцѣ. Небольши блан.
134	1903 № 158.	Б. 35 л. немал. крест. хлѣбопаш.	с 13 л. 3—4 н. 5 дн. сь бол.	22	3	22	3	Разр. пром. при I род. зашит. не срос.	Хвор.	С 1 родов (13 л. назад) выпадение, особенно при натугах.
135	1903 № 163.	А. 34 л. ж. служ. Варш. ж. дор. дом. хоз.	с 12 л. 4 н. 4 дн.	30	2	—	—	Разр. пром.	Норм.	3 мѣс. опущение влагалища и блан.
136	1903 № 164.	К. 22 г. ж. дор. дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 5 дн. сил. сь бол.	20	1	21	7 м.	Разр. пром. зашит. не срос.	Септический эндометритъ.	Со времени родов чувство напряжения внизу, блан и боли въ крестцѣ.
137	1903 № 167.	А. 35 л. ж. ремесл. кредельщица.	с 14 л. 3 1/2 н. 7—8 дн. сил. сь бол.	20	10	—	4	Разр. пром. при послѣд. родахъ.	Норм.	4 г. чувствуетъ тяжесть внизу живота. Опущение стннокъ влагалища и Menorrhagia.

Статусъ и диагноз.	Оперативный методъ и какого числа была операция.	Послѣоперационное течение.	Какого числа Состояние при выпискѣ.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
Статусъ и диагноз.	Рupt. perin. subcutan. Prol. v. ant. et post. Retroflexio mob. Menorrhagia.	2 1/2—оп. хлорое. 1. Abrasio. 2. Укорочение кругл. связокъ (по Wertheim'у). 3. Colporrin.-rrh. (Fritsch).	2 1/2—выпис. Здорова.	—
Статусъ и диагноз.	Рupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Salpingoophoritis. Antelexio. Ectropion. Res. perimetrit.	2 1/2—оп. хлорое. Colporrin.-rrharp.	2 1/2—выпис. Здорова.	—
Статусъ и диагноз.	Рupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Retroflex. fix. Hypertroph port. intermed. Ectropion.	2 1/2—оп. хлорое. Amput. c. Colporrin.-rrharp.	Безлнх. На промежи. поверхк. швы прорывались. Во влагалищѣ швы пер prim.	2 1/2—выпис. Здорова. Пишетъ въ Маѣ 1908 г. что чувствуетъ себя все время хорошо. Не рожала. Принимать благодарности.
Статусъ и диагноз.	Рupt. perin. subcutan. Descens. vag. ant. et post. Retroversio fix. Endometrit.	2 1/2—оп. хлорое. Colporrin.-rrharp.	Безлнх. Per prim.	2 1/2—выпис. Здорова. —
Статусъ и диагноз.	Рupt. perin. Prol. v. ant. Retroversio mob. Endometrit.	2 1/2—оп. хлорое. Abrasio. Colporrin.-rrharp.	Безлнх. Per prim.	10 1/2—выпис. Здорова. Пишетъ, что выпадениемъ влагалища из-до, ни послѣ операции не страдала и потому возвращаетъ вопросъ невыполненными обратно.
Статусъ и диагноз.	Рupt. perin. subcutan. Prol. v. ant. et post. Retropositio ut. Res. pp. metrit. Hernia umbilicalis.	7 1/2—оп. хлорое. Abrasio. Colporrin.-rrharp.	Безлнх. Per prim.	2 1/2—выпис. Здорова. —

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, имя, сокращенное семейное положение, занятие.	Результ.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году был первый род.	Сколько лет прошло между родами.	Исходъ родов, для болей.	Последней период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.
138	1903 № 172.	Ж. 29 л. ж. губ. секрет. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 4—5 дн. слаб.	20	4 р. 2 вык.	—	13 м.	Разр. пром. при II род. зашит.	Норм.	Чувство опухания матки месяца 2 после последних родов.
139	1903 № 177.	Т. 67 л. мещ. адова в.-морск. фельш. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 3 дн. слаб. 15 л. clim.	19	13 р. 2 вык.	—	20	Разр. пром.	Лихор. II род.	Выпадение влагалища при натуживании (около 2 жгъв.). После кольцо, но безрезультатно.
140	1904 № 51.	Ш. 34 л. крест. зам. фабрич.	съ 19 л. 3 1/4 н. 4 дн. сдв. съ бол. 1 г. clim.	23	4	23	6	Разр. пром. при I род. последние роды двойни.	Хвор.	Болея около 12 л. съ I родов: боли внизу живота и выпадение влагалища, мешающее работать.
141	1904 № 61.	К. 43 л. ж. врач. дом. хоз.	съ 14 л. 1 мбс. 3 дн.	23	3	23	15	Разр. пром. при I род. незашит.	Норм.	Болея съ I родов; 4 г. как состояние ухудшилось; боли въ поясницѣ и въ правомъ паху. Запоры. Частые позывы къ мочеиспусканию. Блн.

Статусъ и диагноз.	Оперативный методъ и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выпискѣ.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
Rupt. perin. subcutan. Prol. vag. ant. Anteversio mob.	⁴¹ /x—оп. хлороч. Colporerin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	⁴⁵ /x—выпис. Здорова.	После родов а д-ромъ С. Чувствуетъ себя все время хорошо.
Rupt. perin. Prol. v. ant. Cystocele. Hypertrophia colli intermed.	¹¹ /x—оп. хлороч. Amput. c. Colporerin.-rrhaph.	Безлнх. на промежн. и некоторые швы прорвались, во влагалищѣ—per prim.	¹ /x—выпис. Промежн. швы опять возстановл.	После родов а вт. Маѣ 1908 г., после операций ¹ / ₂ года чувствовала себя хорошо. Потому снова почувствовала опухение, но слабѣе, чѣмъ до операции. Выпадение влагалищныя стѣнки не имѣется. Повидному чувство опухения вызвано Retroversioей. Принести благодарности за лечение.
Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Res. parametrit.	² /n—оп. хлороч. Amput. c. Colporerin.-rrhaph.	3 вышн. (38°—38,6°) Per prim.	² /n—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Prol. v. ant. Res. pp. metri. post. et lateral. Bartolinitis. Endometri.	²⁰ /n—оп. хлороч. Abrasio. Colporerin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim. кроме небольш. расхожд. посреднѣ влагалища.	⁴ /n—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № акта	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году были первые роды. Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
142	1904 № 80.	К. 48 л. женщ.-врач, зам.	с 13 л. 4 в. 3—4 дн.	20	3	21	Разр. пром.	Норм.	Больна 7 л. Выпадение стьюкоз влагалища, 6 л. назвала стьюна пластика, но безрезультатно.	Rupt. perin. Desc. v. ant. Retroflexio fixata. Res. per. metrit. bilateralia.	²⁴ / _{iv} —оп. хлорое. Abrasio et Colporperin.-rrhaph.	Одно повыш. 38° Per prim.	²⁵ / _{iv} —выпис. Здорова.	—
143	1904 № 90.	Г. 33 л. крест. вдова, при-слуга.	с 16—17 л. по 6—8 дн. через 4 н. сиа.	17	3	—	Разр. пром. при I род.	—	13 л. выпадение матки. Боли внизу живота и в пояснич. Обильная менструация. Бъли.	Rupt. perin. Prof. v. ant. et post. Hypertroph. colli. intermed. et supravagin. Ulcera colli.	⁵ / _{iv} —оп. хлорое. Amput. c. alta et Colporperin.-rrhaph.	Безлх. Per prim.	²⁶ / _{iv} —выпис. Здорова.	—
144	1904 № 109.	Б. 48 л. ж. зам. дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 7 дн. сиа.	18	9 р. 2 вык.	19	Разр. пром.	Норм.	3 г. выпадение матки.	Rupt. perin. Prof. v. ant. Elongatio colli med. Ante-flexio ut.	¹⁵ / _{iv} —оп. хлорое. Amput. c. alta Colporperin.-rrhaph.	Одно повыш. 38,4° Per prim. на шейке и во влагалище. Промежи. разошлась.	¹⁵ / _{iv} —выпис. с бесплодием и гранулирующей промжностью.	—
145	1904 № 117.	К. 37 л. ж. вунда дом. хоз.	с 15 л. 3½ н. 6—7 дн.	19	5 р. 1 вык.	20	Разр. пром. при I род.	Норм.	Боли внизу живота и в пояснич. опущение влагалища со времени I родов. После кольцо, была стьюна пластика и ампутация шейки.	Rupt. per. subcut. Prof. vag. ant. et post. Endometrit hyperplast.	¹⁶ / _{iv} —оп. хлорое. Abrasio, Colporperin.-rrhaph.	Безлх. Per prim. кромж небольшим. поверхн. рыхлостя.	¹⁶ / _{iv} —выпис. Здорова.	—
146	1904 № 119.	Д. 31 г. зам. чернораб.	с 16 л. через 40—42 дн. по 4—5 дн.	20	1	30	Разр. пром.	Норм.	Выпадение матки со времени родов. Бъли. Запоры. Рвз при мочеиспускании.	Rupt. perin. subcutan. Prof. vag. ant. et post. Endometrit.	¹⁷ / _{iv} —оп. хлорое. Abrasio, Colporperin.-rrhaph. (при Abrasi и проткнута матка).	Безлх. Per prim.	¹⁷ / _{iv} —выпис. Здорова.	—
147	1904 № 130.	К. 55 л. зам. дом. хоз.	с 15 л. 4 н. 9 дн. 4 г. clim.	17	11 р. 1 вык.	19	Разр. пром. XI роды щипцы.	Хвор.	Чувство давления вниз с 1 родов. Частые позывы в мочу. Год назад перенесла Соротитию по случаю висты яичника.	Rupt. perin. Prof. v. ant. et post.	²⁰ / _{iv} —оп. хлорое. Colporperin.-rrhaph.	Безлх. Per prim.	¹⁹ / _{iv} —выпис. Здорова.	Письмъ въ Маб 1908 г., что чувствовал себя хорошо послѣ операцїи 3 года, потомъ стала забывать предья влени.

№ по порядку.	Годы № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятые.	Роды.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Носила роды или болей большой.	Постродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Постоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
148	1904 № 135.	С. 41 г. крест. вдова еврейч.	с 13 л. 4—6 и. 4—5 дв. сил.	17	—	—	—	—	—	Выпадение прямой кишки с детства при ходьбе и при натуживании. После кольцо вылагалища, которое сначала помогло.	Proct. recti (с 25 лет увелич. величиной) et vag. post. Retroversio mob. Зонд 9 см. Venter-propendens.	²⁰ /v—оп. хлорор. Colporrhin. recto-trh. (промежи, была расчтена до полного разрыва).	Безлх. Per prim.	²¹ /v—выпис. Здорова.	Исследована в Мае 1908 г., чувствует себя хорошо и стала свободно ходить. Промежность высокая. Выпадения никакого нет. Страдает только сильными запорами и частым мочеиспусканием. Anteversio ut.
149	1904 № 165.	Л. 53 л. зам.	с 18 л. 1 мкс. 6—7 дн. сь болью.	22	9 р. 1 вык.	—	—	Разр. пром. при I род.	Норм.	25 л. болями; выпадение передней ствжки влагалища. Кровотечение 4 года.	Rupt. perin. ProL. vag. ant. Cystocele. ProL. vag. post. Hypertrophia part. intermed. с. Зонд—9 см. Metrit. chron. Endometrit. hyperplast.	⁶ /x—оп. хлорор. Abrasio. Amput. с. alta. Colporrh. ant. et Colporperin.-trhaph.	Безлх. Per prim.	⁷ /x—выпис. Здорова.	Пить в Мае 1908 г., что время чувствует себя хорошо. Выпадения нет.
150	1904 № 192.	К. 52 л. зам. прислуга.	с 14 л. 3 1/4—4 в. 4 дн. 6 мкс. slim.	18	3 р. 1 вык.	—	—	Разр. пром. выкид. 12 л. назад.	Хвор. посл- выкид.	Недержание мочи. Боли в левом боку. Близ.	Rupt. perin. subcutan. ProL. vag. ant. et post. Incontinentia urinae.	²² /x—оп. хлорор. Colporperin. trhaph.	Безлх. Per prim.	¹⁰ /x—выпис. Здорова.	—
151	1904 № 214.	К. 34 л. ж. врач. дом. хоз.	с 13 л. 4 и. 7 дн.	27	1	28	6	Разр. пром. (ягодич. предлеж.) зашит. не срос.	Норм.	6 л. со времени родов выпадение матки, боли, зуд в половых частях. Подверглась чрезочечению по поводу фибромиомы матки. Зашита промежность не срослась.	Rupt. perin. ProL. vag. post. Rectocele. Res. Endometrit.	²² /x—оп. хлорор. Abrasio. Colporperin.-trhaph.	Одно повыш. 38,5° Per prim.	⁹ /x—выпис. Здорова.	Пить в Мае 1908 г., что чувствует себя все время хорошо. Родов не няла, а только выкидыш.
152	1904 № 235.	Т. 35 л. двор. зам. дом. хоз.	с 15 л. 4 и. 3—4 дн.	17	6 р. 1 вр. 2 вык.	—	—	Разр. пром. каждый раз. Всегда зашив.	Норм. Хвор. посл- выкид.	Боли во влагалищ. Запоры.	Rupt. perin. ProL. v. ant. et post. Endometrit. catarrhalis.	⁵ /x—оп. хлорор. Abrasio. Colporperin.-trhaph.	Безлх. Per prim.	²² /x—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году была первая родовая.	Сколько лет, назад был последний род.	Исход родов для больной.	Периоды половой жизни.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
153	1904 № 238.	В. 39 л. ж. врач дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 5—6 дн.	25	4	26	—	Разр. пром. при I род. пищцы.	Хвор.	С 1 родов дущение матки. Бьли.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et. post. Descensus. uteri. Зондъ 9½ см. Endometrit.	¾л—оп. хлороф. Abrasio Amput. c. Colporerin-rhaph.	Безлх. Per prim.	27/11—выпис. Здорова.	—
154	1905 № 10.	Г. 45 л. зам. прислуга.	с 18 л. 1—2 мѣс. по 6 дн.	23	4	25	—	Разр. пром.	Норм.	4-й год недержание мочи. Бьли. Боли въ пояснице.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Incontinentia urinae. Endometrit.	2/4—оп. хлороф. Abrasio. Colporerin-rhaph.	Безлх. Per prim.	16/II—выпис. Здорова.	—
155	1905 № 16.	Е. 46 л. пот. гражд. дом. хоз.	с 17 л. 4 н. 4—3 дн. сил. сь бол.	21	4	22	—	Разр. пром. при послѣд. родахъ.	Норм.	Боли внизу живота и опущение влагалища 11 летъ.	Rupt. perin. subcutan. Prol. vag. ant. et post. Retroflexio mob. Erosiones. Fibromyoma subserosa. Endometrit.	2/4—оп. хлороф. Abrasio. Colporerin-rhaph.	Безлх. Per prim.	12/II—выпис. Здорова.	Пишетъ въ Мѣс 1908 г., что чувствуетъ себя все время хорошо.
156	1905 № 40.	И. 32 л. двор. помѣщ. зам.	с 13 л. 3½—4 н. 3—6 дн. сил. сь бол.	19	5	20	5½ л.	Разр. пром. при каж. родахъ. Замѣв. всегда.	Норм. Mastitis.	Чувство напирания внизъ. 8 л. бьли, обильная кровь, нервная явленія.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Retroversio mob. Parametrit. bilat. Endometrit.	1/II—оп. хлороф. Abrasio. Colporerin-rhaph.	Безлх. Per prim.	21/II—выпис. Здорова.	—
157	1905 № 78.	К. 36 л. клас. надзирательница, вдова.	с 14 л. 3—4 н. 5 дн.	19	5	19	10	Разр. пром.	Хвор. послѣ I род. родильн. горячек.	Около 12 л. неправильныя мѣсячныя. Боли въ спинѣ и ногахъ.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Retroflex. Ectropion. Metrit. chron.	7/II—оп. хлороф. Abrasio. Amput. c. Colporerin-rhaph.	Безлх. Per prim.	25/II—выпис. Здорова.	—
158	1905 № 91.	И. 29 л. ж. общ. дом. хоз.	с 12 л. 4 н. 4—5 дн. сил.	21	1	22	7	Разр. пром. пищцы.	Норм.	Боли внизу живота 1½ г. Выпадение влагалища. Бьли.	Rupt. perin. subcutan. Prol. vag. ant. Descens. uteri. Retroflexio m. Metrit. coli. Endometr.	16/II—оп. эвир. (vitem cordis). Abrasio. Amp. c. alta. Colporerin-rhaph.	Безлх. Per prim.	6/IV—выпис. Здорова.	Пишетъ въ Мѣс 1908 г., что чувствуетъ себя все время хорошо. Родовъ не было.
159	1905 № 154.	Г. 40 л. ж. есаула дом. хоз.	с 13 л. 3—4 н. 3 дн. сь болью.	22	4	23	9	Разр. пром.	Хвор. послѣ послѣд. родовъ.	Недержание мочи. Бьли и боли въ пояснице 3 летъ.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Endometrit.	2/4—оп. хлороф. Abrasio. Colporerin-rhaph.	Безлх. Per prim.	18/4—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год. № листа.	Фамилия, г-ть, со- словное по- ложение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и вынашив.	На котором году были первые роды. Сколько лет на- зад были послед- ние роды.	Искость родов. для болей.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный ме- тод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана, Состояние при выписк.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.	
160	1905 № 160.	П. 30 л. зам.	с 15 л. через 23—35 дн. по 3 дн.	25	2	26	1½ г.	Разр. пром. оба раза отдыхали посля рукой.	Норм.	Частые позывы на мочу. Запоры. Б-ны.	Rupt. perin. subcutan. Prol. vag. ant. et post. Retroflexio mob. Endomet- rit.	¾—оп. хлорое. Abrasio. Colporerin- rharph.	Безлх. Per prim.	21/в—выпис. Здорова.	Исследована в в. 1908 г. прое. Отг. и найдена здоровой.
161	1905 № 180.	П. 54 л. вдова про- тоиерея.	с 14 л. 4 н. 6 дн. clim. 5 л.	21	8 р. 1 вык.	22	—	Разр. пром.	Хвор. посля выки.	Опушение матки около 10 лет.	Rupt. perin. ProL. vag. ant. Cystocele. Descensus uteri.	¾х—оп. хлорое. Amput. c. alta. Col- porerin-rharph.	Безлх. Per prim.	21/х—выпис. Здорова.	Пшеть в Маѣ 1908 г., что чув- ствовала себя все время хорошо.
162	1905 № 203.	Н. 29 л. зам. дом. хоз.	с 14 л. 3¼ н. 5—6 дн.	24	3	25	1 г. 4 м.	Разр. пром. при I род. незапит.	Слабость посля I род.	Больна сь I ро- дов; слабость и чувство напряжения вниз.	Rupt. perin. ProL. v. ant. et post. Res. p. metrit. dextra.	2/2—оп. хлорое. Colporerin-rharph.	Безлх. Per prim.	11/х—выпис. Здорова.	—
163	1905 № 228.	В. 43 л. крест. зам. деревенск. домашн. работы.	с 15 л. 3¼ н. 3 н. 10 мѣс. clim.	20	8	21	10	Разр. пром. VII роды трудн. 3 сут.	Норм.	13 л. подержание мочи.	Rupt. perin. ProL. vag. ant. Cystocele. Incontinentia urinae.	¾х—оп. хлорое. Colporerin-rharph.	Безлх. Per prim.	5/1—выпис. Здорова.	Пшеть в Маѣ 1908 г., что можа порезному плоху ударивается. Вы- падения никакого нѣтъ.
164	1905 № 206.	В. 43 л. ж. наде. сов. дом. хоз.	с 13 л. 4 н. 6—7 дн.	22	8 р. 1 вык.	23	7	Разр. пром. при II род. незапит.	Норм.	Боли внизу жи- вота и из поясниц. Б-ны. Обильная кро- ви. Слабость, сердце- биение.	Rupt. perin. ProL. v. ant. et post. Metrit. Endometrit. chron. Anaemia. Res. post. sin.	14/х—оп. хлорое. Abrasio. Colporerin- rharph.	Безлх. Per prim. осложн. thrombo- sis v. Saph. magnaе sinistra.	16/х—выпис. Здорова.	—
165	1905 № 277.	А. 44 л. мѣщ. торговн. зам.	с 18 л. 4 н. 10—11 дн. сиа.	23	6 р. 6 вык.	24	9	Разр. пром.	Хвор. посля I род.	9 л. обильная крови и слабость.	Rupt. perin. ProL. v. ant. et post. Descensus uteri. Retroversio. Metrit. c. et corp. Res. p. metrit. sin. Erosiones.	23/х—оп. хлорое. Abrasio. Amput. c. Colporerin-rharph.	Безлх. Per prim.	¾х—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ № листа.	Фамилия, г-ль, сокращенное по-ложение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На какомъ году были первые роды.	Сколько летъ прошло между первыми родами.	Последы родовъ для болевой.	Послеродовой периодъ.	Анамнезъ.	Статусъ и диагнозъ.	Оперативный методъ и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выпискѣ.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
166	1905 № 284.	Д. 26 л. ж. подполк. дом. хоз.	съ 14 л. 1 мѣс. 5 дн. сил.	21	2	22	2 г.	Разр. пром. 9 м.	Норм.	Около 2 л. кровотечение, были боли въ спинахъ, головные боли.	Rupt. perin. Profl. v. ant. Anteflexio. Metrit. coli. Endometrit. Ectropion. Erosiones.	²⁰ /хл—оп. хлороф. Abrasio. Amput. c. Colpoperin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	¹¹ /хл—выпис. Здорова.	—
167	1905 № 287.	Ф. 31 г. двор. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 1 мѣс. 3—4 дн. съ бол.	22	3 р. 1 вык.	23	3 г.	Разр. пром. при I род.	Хвор. послѣ родовъ.	Съ послѣднихъ родовъ чувство напряжения лишь Болъ въ крестцѣ. Была Онемѣние и боли въ ногахъ.	Rupt. perin. Profl. v. ant. et post. Descensus ut. Retroflexio.mob. Endometrit.	²⁰ /хл—оп. хлороф. Abrasio. Colpoperin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	¹⁶ /хл—выпис. Здорова.	—
168	1905 № 289.	Н. 39 л. двор. пдова дом. хоз.	съ 13 л. 1 мѣс. 5—6 дн. сил. съ бол.	19	7	20	7	Разр. пром.	Норм.	Боли въ поясницѣ и внизу живота. Был. Недержание мочи.	Rupt. perin. Profl. v. ant. et post. Endometrits. Metrit. coli.	⁹ /хл—оп. хлороф. Abrasio. Amput. c. Colpoperin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	²⁵ /хл—выпис. съ жалобой на недержание мочи.	—
169	1903 № 299.	Г. 32 л. зам. акуш.	съ 13 л. 4 н. 4 дн. сил.	23	4	24	2 г.	Разр. пром. при I род. незаппг.	Норм.	Больна 8 л.; выпадение влагалища Были. Подверглась до настоящей операции пластичъ прочности и ампутации шейки.	Rupt. perin. Profl. v. ant. et post. Retroversio m. Endometrit. Res. p. metrit.	¹⁶ /хл—оп. хлороф. Abrasio. Colpoperin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	¹² /л—выпис. Здорова.	—
170	1906 № 23.	Л. 53 л. ж. чинов. дом. хоз.	съ 14 л. 1 мѣс. 6 дн. сил. 2 г.	22	12 р. 2 вык.	23	9	Разр. пром. при I род.	Норм.	Съ I родовъ болѣзнь живота, въ поясницѣ и запоры Были.	Rupt. perin. Profl. v. ant. et post. Retroversio ut. Erosiones. Endometrit. polypos.	¹⁵ /л—оп. хлороф. Abrasio. Colpoperin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	¹ /л—выпис. Здорова.	—
171	1906 № 33.	Д. 37 л. зам. дом. хоз.	съ 15 л. 1 мѣс. 3—5 дн. съ бол. го.	20	3 р. 1 предъвер.	21	15	Разр. пром. I роды двойн.	Норм.	Боли въ поясницѣ. Чувство напряжения въ мочу. Были Обильная кровь. Запоры.	Rupt. per. subcutan. Profl. v. post. Retroversio mob. Endometrit.	²⁵ /л—оп. хлороф. Abrasio. Colpoperin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	¹¹ /л—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лѣта, со- словие, се- мейное по- ложение, занятіе.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На которомъ году были первые роды.	Сколько лѣтъ на- задъ были послѣд- ніе роды.	Исходъ родовъ для больной.	Послеродовой периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана, Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
172	1906 № 39.	Г. 44 л. ж. жит. сов. дом. хоз.	съ 15 л. 3 н. 6—7 дн. снд. — 9 мѣс. clim.	20	13 р. 3 вык.	21	3	Разр. пром. при пострб. родахъ.	Норм.	Чувство тяжести въ животѣ. Бѣдн. Обильная кровь. Слабость.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Metrit. colli. Ectropion. Зондъ—9 см. Endometrit.	¹ / ₂ л—оп. хлороф. +Эмпр. Abrasio. Amput. с. Colporerin-rhaph.	Безлѣх. Per prim. кромѣ небольш. поверхн. расхожд.	²² / ₄ л—выпис. Здорова.	Пашеть въ Маѣ 1908 г., что чувствует себя все время хорошо. Не рожала. Принести благодарности.
173	1906 № 43.	Г. 31 г. мѣщ. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 3—4 дн.	21	4	22	1 1/2 г.	Разр. пром. при I род. (быстр. роды).	Норм.	Около 9-ти л. чув- ствовала опущеніе боли въ поясницѣ запоры. Оперирова- лась по поводу опу- щенія въ 1898 г. но безрезультатно.	Rupt. peria. subcut. Prol. v. ant. et. post.	¹ / ₂ л—оп. хлороф. Colporerin-rhaph.	2 повыш. (38,4°—38,9°) Per prim.	²² / ₄ л—выпис. Здорова.	Послѣдована въ Маѣ 1908 г., чув- ствует себя хоро- шо. Промѣжность сонливая. Сокраще- ніе диафрагмы rel- vis ясно выраже- но. Anteflexio mob. Зондъ 8 см. Пра- вый яичникъ уве- личенъ, болѣзнен- ный. Нѣтъ 1 вы- кидышъ.
174	1906 № 82.	В. 33 л. двор. зам. дом. хоз.	съ 19 л. 1 мѣс. 3—6 дн. снд. съ бол.	26	4	26	1 г. 1 м.	Разр. пром. при I род.	Хвор.	Около 7 л. боли въ крестцѣ. Обиль- ная кровь. Бѣдн. Запоры.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Endometrit.	²² / ₄ л—оп. хлороф. Abrasio. Colporerin-rhaph.	Безлѣх. Per prim.	²⁴ / ₄ л—выпис. Здорова.	—
175	1906 № 85.	К. 40 л. двор. зам.	съ 14 л. н. 3 дн. снд.	—	4 р. 1 предв.	—	5	Разр. пром. Роды трудн. При II род. извлечение за ножки.	Норм. Послѣ II род. бѣдн.	Боли въ крестцѣ. Чувство напирания вниз. Обильная кровь. Нервное раз- стройство.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et. post. Endometrit.	²² / ₄ л—оп. хлороф. Abrasio. Colporerin-rhapha.	Безлѣх. Per prim.	⁹ / ₄ л—выпис. Здорова.	Послѣдована въ Маѣ 1908 г., чув- ствует себя хоро- шо. Послѣ опера- ція прервалась мѣсячная, отчего сильно страдает симптомами выпаденія. Anteversio. Зондъ = 6 1/2 см. Промѣжность со- нливая. Диафрагма relvis сокращается хорошо. При на- туживанія—легкое опусканіе передней стѣнки, которое, однако, нельзя при- вѣсть за рецидивъ.

№ по порядку.	Годъ. № листа.	Фамилия, дѣтя, со- словие се- мейное по- ложение, занятіе.	Роды.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выписки.	На которомъ году были первые роды.	Сколько лѣтъ на- задъ были послѣд- ніе роды.	Исходъ родовъ для больной.	Послеродовой періодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Операционный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
176	1906 № 91.	К. 49 л. вдова кол. сов. дом. хоз.	съ 16 л. 4 и. 7 дн. съ бол.	24	4 р. 1 вык.	24	17½ л.	При I род. ципры и разн. пром. не зашит.	Хвор.	Съ I родовъ (25 л. назадъ) ощущение напора на низъ. Боли въ поясницѣ и утомляемость при ходьбѣ и стояніи. Бѣли.	Rupt. perin. Desc. vag. ant. et post. Retropositio. Res. p. metrit. sin. et post. Endometrit.	½/и—оп. хлороф. Abrasio. Colpoperin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	16/и—выпис. Здорова.	—
177	1906 № 99.	Ф. 30 л. казнач. зам. дом. хоз.	съ 17 л. 4 и. 3—4 дн.	18	3	18	10	Разр. пром.	Норм.	5 л. боли внизу живота и сильную бѣли.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Antellexio. Metrit. colli. Endocervicitis.	¾/и—оп. хлороф. Abrasio. Amput. c. Colpoperin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	16/и—выпис. Здорова.	—
178	1906 № 153.	К. 43 л. крест. зам. поденц.	съ 14 л. 4 и. 3—4 дн. сил. съ бол.	17	13 р. 1 вык.	18	3	Разр. пром. при послѣд. родахъ (ягодич. предл.) не зашит.	Хвор.	2½ г. иодержаніе газовъ и жидкнхъ испражнений. Слабость пузыря. Временами запоры. Бѣли.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Endometrit. Res. p. metrit. dextra.	¼/и—оп. хлороф. Abrasio. Colpoperin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	27/и—выпис. Здорова.	—
179	1906 № 195.	Е. 39 л. вдова впец. адм. дом. хоз.	съ 14 л. 4 и. 4 дн. сил.	17	4 р. 1 предл. 1 вык.	18	12	Разр. пром. при III род. ципры.	Норм.	Около 2 л. обильная кровь. Частое мочеиспусканіе.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Metrit. colli. Endometrit.	¾/и—оп. хлороф. Abrasio. Colpoperin.-rrhaph. Sclerificatio colli.	Безлнх. Per prim.	2½/и—выпис. Здорова.	—
180	1906 № 236.	В. 28 л. ж. врач. дом. хоз.	съ 12 л. черезъ 33—42 дн. по 2—6 дн. сил. съ бол. го.	21	2 р. 1 вык.	22	5	Разр. пром. II роды трудн. 1½ сут. пореорачія.	—	Ощущеніе матки. Бѣли. Запоры.	Rupt. perin. Descensus vag. ant. et post. Elongatio colli. Laceratio colli. Retroversio. Parametrit. bilat. Endometrit.	16/и—оп. хлороф. Abrasio. Amput. c. Colpoperin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	20/и—выпис. Здорова.	Пшеть въ Маѣ 1908 г., что чувствуютъ себя все время хорошо. Не беременѣла.

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, зѣта, со- словие, се- мейное по- ложение, званіе.	Роды.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выпаденій.	На которомъ году были первые роды, Сколько лѣтъ на- задъ были послѣд- ніе роды.	Исходъ родовъ для больной.	Послеродовой периодъ.	Анамнезъ, Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана, Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.	
181	1906 № 257.	Б. 26 л. зам. дом. хоз.	съ 12 л. 4—6 н. 7—8 ан. съ бол.	18	4	18	1	Разр. пром.	Хвор. послѣ I род.	Боли въ поясницѣ и ягодицъ бою. Ча- стые позывы на мочу. Бѣлы. Обильная мѣ- сячныя.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Endometrit. Res. parametrit. sin.	²⁵ /x—оп. хлорое. Abrasio. Discisio ciatricis in fornice sin. Colpoperin- rrhaph.	Лихор. на 2-й—3-й день. Per prim., кроме небольш. расходъ на промез.	¹⁴ /x—выпис. Здорова.	—
182	1906 № 268.	Т. 30 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 15 л. 1 мѣс. 6 дн.	21	3	22	1 г. 10 м.	Разр. пром. Послѣдніе роды двойни.	Норм.	Чувство напир- анія внизу и выпад- еніе матки съ по- слѣднихъ родовъ.	Rupt. perin. Descensus. vag. post. Retroflexio mob.	Безлх. Per prim.	¹⁵ /x—выпис. Здорова.	—	
183	1906 № 333.	М. 46 л. мѣщ. зам. дом. хоз.	съ 17 л. 4 н. 3—4 дня сид.	—	6 р. 1 вык.	—	8	Разр. пром.	Норм.	8 л. выпаденіе изъ половыхъ частей. Бѣлы.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et. post. Anteversio. Зондъ—9 см. Ectropion. Диагностъ прямыхъ мышцъ.	²⁴ /x1—оп. хлорое. Abrasio. Amput. c. alta. Colpoperin- rrhaph.	Безлх. Per prim.	¹² /x1—выпис. Здорова.	—
184	1906 № 395.	К. 27 л. ж. нач. станци дом. хоз.	съ 15 л. 4 н. 4 дн. съ бол.	16	4 р. 5 вык.	17	4 г. 7 м.	Разр. пром. при I род.	Норм.	6 л. боли въ крест- цѣ и бѣлы.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Ectropion. Parametrit. sin. Endometrit.	²⁴ /x—оп. хлорое. Abrasio. Colpoperin- rrhaph.	Безлх. Per prim.	²³ /1—выпис. Здорова.	—
185	1907 № 8.	Ж. 46 л. крест. зам.	съ 15 л. 4 н. 4 дн. сид.	19	2 р. 2 предпр.	20	2 1/2 г.	Разр. пром. Послѣдніе роды 2 сут. трудн. ягодич. предлож.	Норм.	Больше года боли внизу живота. Не- держаніе мочи.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Anteflexio. Retropositio.	²² /1—оп. хлорое. Colpoperin-rrhaph.	Безлх. Per prim.	¹⁵ /1—выпис. Здорова.	—
186	1907 № 14.	А. 36 л. крест. зам.	съ 14 л. 1 мѣс. 6 дн.	19	5	20	1 г. 4 м.	Разр. пром. Послѣ II род. хвор.	Норм.	Боли внизу жи- вота. Обильная кро- ви.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. Metrit. chronica colli et corp. Endometrit. Res. pp. metrit. dextra et post.	¹⁹ /1—оп. хлорое. Abrasio. Amput. c. Colpoperin-rrhaph.	Безлх. Per prim. на 16-й день по- лучил. изъ шей- ки сильное крово- теченіе, остановлен- ное тампонадией.	²⁰ /1—выпис. Здорова.	Пишетъ въ Матъ 1908 г., что чув- ствуетъ себя хо- рошо.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Последней период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Постоперационное течение.	Какого числа выписана, Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
187	1907 № 23.	И. 41 г. ж. канд. прав. дом. хоз.	с 18 л. 4 н. 7 дн.	24	3	25	12	Разр. пром. при I род. Зашит. II род. разрыв тоже зашит.	Норм.	Чувство опухения матки. Обильная кровь. Были частые позывы на мочу. Запоры. Носила кольцо, которое потом не помогало уже.	Rupt. perin. subcutan. Prol. vag. ant. Metrit. coli. Res. p. metrit. post.	¹⁴ / ₁ —оп. хлорос. Abrasio. Amput. c. Colporerin.-rthaph.	Безлж. Per prim.	⁷ / ₁ —выпис. Здорова.	Пишет из Мад 1908 г., что чувствует себя хорошо.
188	1907 № 63.	Г. 44 л. ж. врач. дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 7 дн. сил.	24	4 р. 2 вык.	25	7	Разр. пром. Зашит. II род.	Хвор. посл. II род.	Боли в спинке. Чувство напирания вниз. Носила кольцо, но без пользы.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Metrit. ut. et coli.	¹² / ₁ —оп. хлорос. Amput. c. Colporerin.-rthaph.	Безлж. Per prim.	²⁷ / ₁ —выпис. Здорова.	—
189	1907 № 89.	К. 28 л. врач. зам. хоз.	с 13 л. 3 н. 3 дн. слаб.	27	1	28	4 1/2 м.	Трудные роды 2 1/2 сут. вродич. предлж. Разр. пром. зашит, но не сросся.	Заживление родовых разрывов из теде. предлж. 3-х нед.	Со времени родов были запоры.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Anteflexio.	²³ / ₁ —оп. хлорос. Colporerin.-rthaph.	Безлж. Per prim.	¹⁹ / ₁ —выпис. Здорова.	—
190	1907 № 107.	К. 30 л. жвщ. зам. акуш.	с 15 л. 4 н. 3—4 дн.	27	3	27	3	Разр. пром. при I род. не зашит.	Норм.	2 г. боли в крестце, чувство напирания вниз, запоры, частое мочеиспускание.	Rupt. petin. Prol. vag. ant. et post. Retroversio flx.	¹² / ₁ —оп. хлорос. Colporerin.-rthaph.	Безлж. Per prim.	²⁹ / ₁ —выпис. Здорова.	—
191	1907 № 114.	Л. 35 л. зам. дом. хоз.	с 12 л. 4 н. 3 дн. сил.	18	3	19	10	Разр. пром. посл. родов.	Хвор. посл. родов.	Боли в пояснице и внизу живота посл. последних родов. Были.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Erosion. Ectropion. Endometrit.	¹⁴ / ₁ —оп. хлорос. Abrasio. Amput. c. Colporerin.-rthaph.	Одно повыш. 38,4° Безлж. Per prim.	⁷ / ₁ —выпис. Здорова.	—
192	1907 № 121.	П. 28 л. зам. акуш.	с 13 л. 4 н. 3 дн. сил.	26	1	27	1 г. 3 м.	Разр. пром. не зашит.	Норм.	Современия родовъ чувство тяжести внизу живота. Были.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. Endometrit.	²¹ / ₁ —оп. хлорос. Abrasio. Colporerin.-rthaph.	Безлж. Per prim.	¹ / ₄ —выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, лета, социальное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На каком году были первые роды.	Сколько лет в зачатии были последние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Операционный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
193	1907 № 122.	С. 35 л. вниц. зам. дом. хоз.	с 13 л. 31 1/2 дн. сил. сугук.	25	4	26	3	Разр. пром.	Норм.	Боли внизу живота. Обильная кровь. Били.	Rupt. perin. Profl. vag. post. Endometrit. Res. p. metrit.	²¹ Ип—оп. хлороф. Abrasio. Colporerin-rrhaph.	Безлх. Per prim.	³ /v—выпис. Здорова.	—
194	1907 № 138.	К. 47 л. зам. дом. хоз.	с 13 л. 26—30 дн. по 3—6 дн.	28	2 р. 1 вык.	29	17	При I род. шницы Разр. пром. зашит.	Хвор. посл-е выкид.	Выпадение влагалища. Запоры. Сердцебиение.	Rupt. per. Profl. v. ant. Retroversio mob. Endometrit. Elongat. colli. Hypertrophia supravaginal.	³⁰ Ип—оп. хлороф. Abrasio. Amput. c. alta et Colporerin-rrhaph.	Безлх. Per prim.	¹⁴ /v—выпис. Здорова.	Писать в Маг 1908 г., что чувствует себя все время хорошо.
195	1907 № 147.	Л. 50 л. двор. вдова дом. хоз.	с 13 л. 4 н. 6 дн. — 9 мес. clim.	20	4 р. 2 вык.	21	19	Разр. пром. при I род.	Норм.	Около 8 л. ощущение матки. Боли в поясниц. Запоры. Расстройство мочеиспускания.	Rupt. perin. Profl. vag. ant.	⁹ /v—оп. хлороф. Colporerin-rrhaph.	Безлх. Per. prim. Pleuritis на 15 день.	⁹ /v—выпис. Здорова.	—
196	1907 № 154.	Т. 48 л. ж. артуса дом. хоз.	с 19 л. 4 н. 5 дн.	24	3 р. 1 прор-двер. 4 вык.	25	6	Разр. пром. при посл-д. родах зашит.	Норм.	С посл-дних родов частые позывы на мочу. Нервное расстройство.	Rupt. perin. Profl. vag. ant.	¹⁴ /v—оп. хлороф. Colporerin-rrhaph.	Безлх. Per prim.	¹⁴ /v—выпис. Здорова.	—
197	1907 № 200.	М. 30 л. зам. дом. хоз.	с 16 л. 4 н. 7 дн. сил. с бол.	20	4	21	2	Разр. пром.	Норм.	2 г. выпадение матки, били, обильная кровь.	Rupt. perin. Profl. v. ant. Hypertrophia colli. Endometrit.	¹⁴ /v—оп. хлороф. Abrasio. Amput. c. alta. Colporerin-rrhaph.	Безлх. Per prim. кровь поверхн. расхожд.	¹⁴ /v—выпис. Здорова.	—
198	1907 № 223.	В. 48 л. зам. дом. хоз.	с 13 л. 4 н. 6 дн. сил. с бол. — clim. 4 г.	21	10 р. 1 вык.	22	7	Разр. пром. Вск роды продолжат.	Норм.; но медленно поправл.	Выпадение половых частей 10 л. Учащенное мочеиспускание. 12 л. назад была сдвинута пластика промежности, посл-е чего 2 раза рожала и оба раза сь разрывами.	Rupt. perin. Profl. vag. ant. et post. Зонд—9 см. Hypertrophia colli.	¹⁰ Их—оп. хлороф. +эвпр. Amput. c. alta et Colporerin-rrhaph.	Безлх. Per prim.	²⁰ Их—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годы, № листа.	Фамилия, звта, со- словие, се- мейное по- ложение, занятие.	Роды.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году были первые роды.	Сколько лет на- зад были послед- ние роды.	Исход родов, или больной.	Постродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный ме- тод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа Состояние при выписки.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
199	1907 № 236.	М. 42 л. зам. дом. хоз.	с 12 л. 1 мес. 4 дн.	20	9 р. 6 вык.	21	6	Разр. пром. при всех родах.	Норм.	5 л. выпадение впа- гина. Тянутия бо- ли внизу живота, более обильные мѣ- сячные. Бѣлн. Не- произвольное моче- испускание (при кашлѣ и т. п.). Был раньше пластика про- межности.	Rupt. perin. subcutan. Prol. v. ant. Metrit. col. Hypertrophia colli. part. med. et vaginal. Colpitis. Res. p. metrit. post. Endo- metrit. Зонд—12 см.	¹⁵ /x—оп. хлороф. Abrasio. Amput. c. Colproperin- rrhaph.	Безлнх. Per prim.	²⁵ /x—выпис. Здорова.	Писать в Се- птемь 1908 г., что выпадение не замѣ- чать, но очень слабо.
200	1907 № 275.	В. 50 л. зам.	с 13 л. 4 н. 7 дн. — 1 г. 3 мес. clim.	19	9 р.	20	10	Разр. пром.	Норм.	25 л. выпадение матки.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Desensus uteri. Hypertrophia colli.	¹⁵ /x—оп. хлороф. Abrasio. Amput. c. Colproperin-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	²⁵ /x—выпис. Здорова.	—
201	1907 № 287.	П. 42 л. крест. зам. дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 3—4 дн. сиа.	36	1 р. 2 вык.	38	5	Разр. пром. защит. не сросся.	Норм.	6 л. выпадение ма- тки. Боли въ спине. Бѣлн. Частое моче- испускание. Непра- вильная крови. По- сила кольцо, но без- результатно.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Retroversio. Ectropion. Endometrit. ca- tarrhialis.	²⁵ /x—оп. хлороф. Abrasio. Amput. c. Colproperin-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	¹⁵ /x—выпис. Здорова.	—
202	1907 № 290.	Ч. 45 л. зам. дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 3 дн. — не мен- струир. 3 г.	25	3	26	16	Разр. пром.	Норм.	Чувство опущения, усилившееся постл. Extirpat. ut. (въ 1904 г.) по поводу фибромы.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Rectocele.	²⁵ /x—оп. хлороф. +O. Colproperin- rrhaph.	Безлнх. Per prim.	¹⁵ /x—выпис. Здорова.	—
203	1907 № 297.	С. 56 л. ж. генерала дом. хоз.	с 13 л. 4 н. 4 дн. — 3 г. clim.	26	9	27	11	Разр. пром. при 1 род. не зашит.	Норм.	8 л. выпадение впа- гина и учащенное мочеиспускание.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Resid. post. Polyp. muc. cervicis.	²⁵ /x—оп. хлороф. Ablatio polyri mu- cosi. Colproperin- rrhaph.	Безлнх. Per prim.	¹⁷ /x—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, пол, возраст.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На каком году были первые роды.	Сколько лет между родами.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.	
204	1907 № 318.	И. 32 л. зам. зубоврач. курсы.	с 17 л. 4½ н. 7 дн. сил.	20	4 р.	1 предв.	21	1½ г.	Разр. пром. при 1 род.	Хвор. послеродов.	11 л. боли внизу живота и б.яли.	Rupt. perin. Prol. veg. ant. et post. Retroversio. Res. pp. motrit. sin. et post. Endometrit.	½хл—оп. хлороэ. Abrasio. Colporperin.-rraph.	Безлх. Per prim.	½хл—выпис. Здорова.	Последована в Сентябрь 1908 г. Выпала створка влагалища и т.д. Промежность хороша. Retroversio mob.
205	1907 № 323.	Н. 40 л. вдова фабричная.	с 14 л. 1 мес. 3 дн. сил.	19	9	20	3	Разр. пром.	Норм.	4 г. выпадение половых частей, 10 г. назад была пластика по поводу выпадения, после чер. родила еще 2 раз. Б.яли.	Rupt. perin. Prol. var. ant. Cystocele. Retroflexio. Bond.—13 см. Hypertrophia colli. Descensus uteri. Endometrit.	¼хл—оп. хлороэ. +эвпр. Abrasio. Amp. c. alta. Colporperin.-rraph.	Одно повыш. 38,5° Per prim., кровь спайки.	½хл—выпис. Здорова.	Последована в Сентябрь 1908 г. При наугуживании выпадение передней створки влагалищной с гусиное яйцо. Около спайки рубцов. ткань. Anteversio.	
206	1907 № 324.	В. 35 л. вдова поч. прачка.	с 14 л. 4 н. 5 дн. сил.	20	5 р. 2 вык.	21	2	Разр. пром. Роды всегда трудн. по 3 сут.	Хвор. и обшая слабость.	Выпадение матки и частое мочеисп. спайки. 2 г. резко ухудшение. Б.яли.	Rupt. perin. Prol. v. post. complet. et vagin. ant. partial. Rectocele. Hypertrophia colli. Endometrit. Hernia inguinalis. bilateral.	¾хл—оп. хлороэ. Abrasio. Amp. c. alta. Colporperin.-rraph.	Безлх. Per prim.	¾хл—выпис. Здорова.	Последована в Сентябрь 1908 г. Промежность сохранила. При наугуживании незначительное выпадение передней створки, которое нельзя принять за рецидив. Retroversio mob. Зонд.—7 см. Чувствует себя хорошо. Принести благодарность.	
207	1907 № 330.	Ф. 45 л. вдова поч. гражд. прислуга.	с 19 л. 4 н. 7 дн. сил.	28	3	29	15	Разр. пром.	Норм.	1 г. опущение матки. Б.яли.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Descensus. ut. Hypertrophia colli. Endometrit.	¼хл—оп. хлороэ. Abrasio. Amp. c. alta. Colporperin.-rraph.	Безлх. Per prim.	¾хл—выпис. Здорова.	Последована в Сентябрь 1908 г. Чувствует себя хорошо. Выпадения нет. Anteversio. Зонд.—7 см.	

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов, дни болевой.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
208	1907 № 337.	Л. 47 л. же, директ. училища дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 2—3 дн., иногда 5 дн. с 5 бол. — не менстр. 4 мкс.	25	3	26	14	Разр. пром.	Норм.	Тяжесть внизу живота, особенно при ходьбе. Частые позывы на мочу. Боле-на около 2 лет.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. Parametrit. bilateralis.	¹⁹ /хл—оп. хлорос. Colpoperin.-rrhaph. Discisio cicatricis in fornice.	Безлх. Пер прим.	²⁰ /хл—выпис. Здорова.	—
209	1907 № 339.	О. 26 л. дочь купца зам.	с 15 л. 3—4 дн. слаб.	24	1	25	11 м.	Экзамисл. пищев. Разр. пром. зашит, не сросся.	Лихор.	Со времени родов чувство напирания вниз. Был.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Anteflexio. Retropositio. Endometrit.	¹⁶ /хл—оп. хлорос. Abrasio. Colpoperin.-rrhaph.	Безлх. Пер прим.	²⁹ /хл—выпис. Здорова.	—
210	1907 № 340.	К. 34 л. крест. зам. дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 3—4 дн. сил., с 6 бол.	20	7	21	1 1/2 г.	Разр. пром. VII роды двойн.	Норм.	2-й год кровотечения и боли внизу живота. Опухание матки.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Descensus ut. Hypertrophia coli. Endometrit.	²⁶ /хл—оп. хлорос. Abrasio. Amput. c. alta. Colpoperin.-rrhaph.	На 8-й день после снятия швов с шейки сильное кровотеч. и лихорад. 5 дн. Пер прим.	⁹ /хл—выпис. Здорова.	Исследована вь Октябрь 1908 г., чувствует себя хорошо. Промени. хороша. Выпадения влагалища нетъ. Anteversio.
211	1907 № 344.	Г. 29 л. крест. зам.	с 14 л. 1 мкс. 3 дн. с 6 бол. го.	23	2 р. 1 преждев. 1 вык.	24	1 г. 11 м.	Разр. пром. при I род.	Норм.	Со времени I родов опухание ст-ность влагалища и боли въ послницъ. Бън.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Retroversio nob. Res. p. metrit. post. sinistra. Endometrit.	²³ /хл—оп. хлорос. Abrasio. Colpoperin.-rrhaph.	Безлх. Пер прим.	⁶ /хл—выпис. Здорова.	—
212	1907 № 355.	К. 31 г. крест. зам. дом. хоз.	с 13 л. 3 н. 6—8 дн. сил.	18	5	19	2 г. 8 м.	Разр. пром.	Хвор. послъ III род.	Послъ III родов обильная мѣсячная боля внизу, живота и при coitus'.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Hypertrophia coli. Resid. post. Endometrit. hyperplastica.	²³ /хл—оп. эвпр. Abrasio. Colpoperin.-rrhaph.	Безлх. Пер прим.	¹⁴ /хл—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лѣта, сословіе, семейное положеііе, занятіе.	Регулярн.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На которомъ году были первые роды.	Сколько лѣтъ назадъ были послѣдніе роды.	Исходъ родовъ для больной.	Послеродовой періодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный методъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана, Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
213	1907 № 356.	Р. 36 л. мѣщ. торговк. вдова.	съ 14 л. 4 н. 4—5 дн. см. съ бол.	18	8	19	3 г.	Разр. пром. при I род. не зашит.	Хвор. послѣ V род.	10 л. боли въ крестцѣ. Напряженіе на низъ. Обильными кровя.	Rupt. perin. ProL. vag. ant. et post. Retroversio mob. Hypertrophia colli. Зондъ=3½ см. Endometrit.	²⁰ /xii—оп. хлороф. Abrasio. Colporperin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	¹¹ /xii—выпис. Здорова.	—
214	1907 № 361.	К. 25 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 4—5 дн. съ бол.	20	3	21	8 м.	Разр. пром. при I род.	Норм.	3 г. боли въ крестцѣ, тяжесть внизу живота, запоры, блѣн.	Rupt. perin. ProL. v. post. Retroversio mob. Res. post. et lateralia. Endometrit.	⁷ /xii—оп. хлороф. Abrasio. Colporperin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	¹⁷ /xii—выпис. Здорова.	—
215	1907 № 363.	М. 27 л. крест. зам. крест. раб.	съ 18 л. 4 н. 3—4 дн.	19	3	20	1½ г.	Разр. пром. при I род. (трудн. продолжит.)	Хвор. послѣ I род.	7 л. выпаденіе частей, мѣшающее за послѣднее время исполнять тяжелую работу.	Rupt. perin. ProL. vag. ant. et post. complet. Cystocele et Rectocele. Hypertrophia colli. Зондъ=11 см.	¹⁴ /xii—оп. хлороф. Amput. c. alta. Colporperin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	⁶ /i—выпис. Здорова.	Послѣдована въ Сентлэбръ 1908 г., чувствуетъ себя хорошо. Выпаденія въъ. Diaphragma pelvis хорошо сокращается. Gravidia IV m.
216	1907 № 369.	В. 25 л. мѣщ. зам. дом. хоз.	съ 13 л. 4 н. 5—6 дн.	19	4	19	2 м.	Разр. пром. при I и II род. не зашит.	Норм.	Боли въ поясницѣ и внизу живота. Чувство опущенія. Бѣлн.	Rupt. perin. ProL. v. ant. Metrit. coli. Ectropion. Res. pp. metrit. sin. Retroversio mob. Endometrit.	⁷ /xii—оп. хлороф. Abrasio Amput. colli. Colporperin.-rrhaph. Discisio cicatricis in fornice.	Безлнх. Per prim. кровѣ небольш. расхожд.	²¹ /xii—выпис. Здорова.	—
217	1907 № 370.	Б. 37 л. зам. дом. хоз.	съ 21 г. 1 мѣс. 1 дн. слабо съ бол.	24	6	25	3 г. 9 м.	Разр. пром. при I род. не зашит.	Хвор.	12 л. опущеніе влагалища, боли внизу живота и въ поясницѣ. 4 г. бѣлн.	Rupt. perin. ProL. vag. ant. et post. Metrit. c. Endometrit. Ectropion. Hypertroph. c. Зондъ=8½ см. Retroversio mob.	¹⁶ /xii—оп. хлороф. Abrasio Amput. c. Colporperin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	⁶ /i—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, возраст, место жительства.	Роды.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исходь родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.
218	1907 № 376.	Г. 54 л. вдова камергера дом. хоз.	с 16 л. 3 1/2 и. 4—3 дн. с 18 л. 5 л.	20	3	21	25	Разр. пром. при I род.	Норм.	С I родовъ разнать промежности. Болъ из спина.
219	1907 № 377.	О. 42 л. в рег. зам. дом. хоз.	с 15 л. 4 и. 2 дн. слаб.	23	11	24	1 м.	Полн. разр. пром. и китки при послѣд. родахъ.	Лохор.	Со времени послѣднихъ родовъ ведержаніе газовъ и жидкаго стула.

Статусъ и диагнозъ.	Оперативный методъ и какого числа была операція.	Послѣоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
Rupt. per. Prol. vag. ant. Atrophia uteri.	¹⁵ /XII—оп. хлорое. Colporerin.-rrharh.	Одно повыш. 38,4° Per prim.	²⁹ /XII—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. completa. Prol. v. ant Resid. p. metrit. Retroflexio uteri.	²⁴ /XII—оп. хлорое. Colporerin.-rectorrh.	Безлих. Per prim.	²⁹ /XII—выпис. Здорова.	—

Группа III:

143 больных съ неполнымъ выпаденіемъ матки.

НБ ХЕНДЛ

№ по порядку.	Годы, № месяца.	Фамилия, лето, со- словие, се- мейной по- ложения, занятия.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выпадения.	На котором году были первые роды.	Сколько лет на- задь были после- дние роды.	Исходь родов для болезней.	Постродовой перiod.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный ме- тод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные ре- зультаты. Субъективные и объективные.
1	1897 № 1371.	М. 31 г. солдатки зам. прачка.	съ 15 л. 3—4 н. 6—ди. 5 л. clim.	—	9	22	20	Разр. пром.	—	Около года чув- ство отсутствия вы- хода 3 мес. назав- д после подъема тя- жести получила сра- зу выпадение частей наружу, после чего не может ни ходи- ть, ни работать. Сукровичная выд- ления и запоры.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Зонд=3 см. Prol. uteri incompletus.	¹⁴ /x—оп. хлороз. Colporrh. ant. et Colporperin.-rrhaphia.	Безлж. Per prim.	²⁹ /x—выпис. Здорова.	—
2	1897 № 1580.	Л. 31 г. мещ. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 3 д.	20	1 р. 1 вк.	23	8	Разр. пром.	Норм.	Боли въ крестцѣ. Выпад. матки. Бѣн. Носитъ кольцо.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Reclinatio ut. Зонд=9 1/2 см. Hypertroph. coll. Prol. ut. incompl.	²⁵ /x—оп. хлороз. Excisio c. (по Шре- теру) Colporperin.-ri- h.	Безлж. Per prim. кромя расхожд. по средней 4-х швов.	¹⁹ /x—выпис. Здорова.	—
3	1897 № 1617.	Б. 44 л. ж. подовни дом. хоз.	съ 13 л. 4 н. 6—8 л.	—	5 р. 1 вк.	24	14	Разр. пром.	Норм.	14 л. назадъ ро- дила очень крупнаго ребенка. Имела раз- рывы. 7 л. назадъ стала чувствовать выпадение, которое усиливалось съ те- чениемъ времени. Ча- стые позывы на мочу и дисекацию. Бѣн.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Hypertroph. coll. (p. supravag.). Зондъ 12 см. Prol. ut. incompletus. Hae- morrhoides.	¹⁴ /x—оп. хлороз. Abrasio. Amp. c. alta. Colporperin. rrih. Haemorrhoidecto- mia.	Безлж. Per prim.	¹⁵ /x—выпис. Здорова.	—
4	1897 № 1618.	И. 54 л. мещ. незам. прислуга.	съ 19 л. 3 н. 4 д. 3 съ бол. — 4 г. clim.	—	1 р. 1 вк.	31	23	Разр. пром.	Хвор.	Больна около 2-х летъ. Выпадение матки, мешающее ходить и работать. Кровянистыя выд- ления; бѣн.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Cystocele et Rec- tocele. Elong. c. part. sup- ravag. Зондъ=12 см. Ret- roversio. Prol. ut. incompl.	⁸ /x—оп. хлороз. Amp. c. alta Colpo- perin.-rrhaphia.	Безлж. Per prim. кромя небол. по- верхн. расх. въ обла- сти задней связки.	¹⁰ /1—выпис. Cystocele значительн.	—

№ по порядку.	Годъ. № месяца.	Фамилия, лѣта, со- словие се- нейшего по- ложения, занятіе.	Реульм.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На какомъ году были первые роды, сколько лѣтъ на- задъ были послед- ніе роды.	Исходъ родовъ для больной.	Постродовой периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты Субъективные и объективные.	
5	1898 № 1636.	У. 50 л. крест. зам. земледѣл.	3 г. clim.	20	12	22	10	Разр. пром.	Норм.	Послѣ послѣднихъ родовъ встала на 3-й день и съ тѣхъ поръ чувствуется на- поръ на низъ. Съ теченіемъ времени для того, чтобы по- мочиться, надо было поднять вверхъ вы- павшія части. При вправленіи болѣе нѣтъ, при вывале- ніи—тянущая боль.	Rupt. perin. ProL v. ant. et post. Cystocele, Recto- cele. ProL ut. incompl. Elong. с. Зондъ=9½ см. Retroflexio.	²⁷ /1—оп. хлороф. Amp. с. alta Col- porrh. ant. Colpo- perin.-rrh.	Безпач. Per prim.	¹⁵ /11—выпис. Здорова. Выпад. стѣ- нока нѣтъ.	Пиннетъ въ Мѣѣ 1908 г., что все время чувствовала себя очень хорошо, матка не выпадаетъ. Больная въ цѣломъ письмѣ признается въ благодарности за успѣшную опера- цію.
6	1898 № 1676.	Б. 39 л. ж. чинов дом. хоз.	съ 15 л. 3 и 5 л.	21	7 р. 1 вк.	24	5	Разр. пром.	Норм.	Послѣ У родовъ, поднявъ ребенка, по- чувствовала опуще- ніе матки. Жалуется на боли внизу живо- та послѣ ходьбы, боли въ поясницѣ передъ кровлями и боли въ ногахъ.	Rupt. perin. ProL v. ant. et post. Retroflex. mob. Зондъ=9 снт. ProL ut. incompl.	²⁰ /11—оп. хлороф. Colporrh.-rrh.	Безпач. Per prim.	²³ /11—выпис. Здорова.	Умерла въ 1906 г. До смерти не жа- ловалась на выпад- деніе.
7	1898 № 1704.	Р. 47 л. мѣщ. вдова дом. хоз.	съ 15 л. 2—4 и 7 л.	—	2	25	13	Разр. пром.	Норм.	Около 25 л. стра- даетъ опущеніемъ и выпадениемъ поло- выхъ частей, уси- лившіяся за послѣд- ніе 4 года и мѣшаю- щія ходить и рабо- тать.	Rupt. perin. ProL v. ant. et post. ProL ut. incompl.	¹⁵ /11—оп. хлороф. Colporrh. ant. Colpo- perin.-rrhaph.	Безпач. Per prim. кр. небол. мѣста во влагалищѣ.	²⁷ /11—выпис. Передняя стѣнка слегка опускается.	—
8	1898 № 1718.	Т. 40 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 2—3 мѣс. ¼—1 день.	28	5 р. 1 вк.	29	3	Разр. пром.	Норм.	Выпаденіе матки 3 года.	Rupt. perin. ProL v. ant. et post. Cystocele et Recto- cele. ProL ut. incompl. Зондъ=13 снт. Elongat с. s. vag.	¹⁵ /11—оп. хлороф. Amp. с. alta Col- porrh. ant. Colpo- perin.-rrhaphia.	Съ 4 по 9-й день темн. выше 38°, око- ло 39° выпотъ въ лѣв. параметр. за- явленіе всюдю удовлетв.	⁴ /11—выпис. Промежность солдвая. Остатки параметрита.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лѣтъ, со- стояние, се- мейное по- ложение, за- являе.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На которомъ году были первые роды.	Сколько лѣтъ на- задъ были послед- ние роды.	Источъ родовъ для болѣзней.	Исследования яичниковъ.	Анамнезъ, Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и диагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Постоперационное теченіе.	Какого числа выписана, Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты. Субъективные и объективные.
9	1898 № 1732.	С. 44 л. крест. зам. прислуга.	съ 16 л. 3 и 7 л. 5 лѣт. clim.	18	6	19	4	Разр. пром.	Норм.	Выпаденіе матки около 2-хъ лѣтъ. Вставала послѣ ро- дovъ всегда на 2— 3 день.	Rupt. perin. Prol. v. ant et post. Prol. ut. incompl. Hypertroph. p. supravagin. Rectocele. Зондъ=11¼ см. Bronchitis chronica.	½х—оп. хлороф. Amput. с. alta Colporrh. ant. Colporerin.-rtharpha.	Безлнх. Per prim.	29/х—выпис. Здорова.	—
10	1898 № 1770.	Х. 50 л. крест. горн.	съ 16 л. 4 и 3 д. 8 л. clim.	—	2	25	22	Разр. пром.	Норм.	Выпаденіе матки со времени родовъ.	Rupt. perin. Prol. v. ant et post. Prol. ut. incompl.	25/х—оп. хлороф. Amput. с. Colporrh. ant. Colporerin.-rrh.	Безлнх. Per prim.	11/хл—выпис Ощущенія ощущенія для выпаденія мтѣ.	—
11	1899 № 1861.	И. 33 л. крест. зам. полев. работ.	съ 15 л. 3 и 3 д.	17	2	19	12	Разр. пром.	Хвор.	Больна съ послед- нихъ родовъ выпаденіемъ матки, мнѣющимся при движеніяхъ.	Rupt. perin. Prol. v. ant et post. Cystocele. Recto- cele. Retroflexio. Hyper- troph. p. supragag. Ulcera с. et vag. Отечность шейки и стѣнокъ. Prol. ut. in- compl.	5/х—оп. хлороф. Amput. с. alta Colporerin.-rtharph.	Безлнх. Per prim.	22/iv—выпис. Здорова. Остатки параметрита.	—
12	1899 № 1896.	Ф. 57 л. крест. вдова прислуга.	съ 15 л. 3—4 и. 7 дней. 8 л. clim.	—	3	22	29	Разр. пром.	—	Около 15 л. замѣ- чаетъ выпаденіе, по- степенно увеличи- вающееся и мѣшаю- щее теперь дви- гаться.	Rupt. perin. Prol. v. ant et post. Prol. ut. incompl. Зондъ=14 см. Elongat. с. supragagin.	5/х—оп. хлороф. Amput. alta Colpo- perin.-rtharph.	Безлнх. Per prim. кр. небол. поверхн. расхожд.	27/х—выпис. Здорова.	—
13	1899 № 1893.	С. 47 л. ж. чивов. дом. хоз.	съ 12 л. 3 и 8 д.	16	4 р. 2 вк.	18	28	Разр. пром.	Хвор.	Около 6 л. выпаденіе матки. Боль внизу живота и въ поясницѣ. Затру- дненное мочеиспусканіе. Запоры.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. Cystocele. Retroflexio. Hypertroph. p. intermed. et supravagin. Prol. ut. part.	15/х—оп. эвир. (dilatalio cord.) Amput. с. alta Colpo- perin. ant. Colpo- perin.-rtharpha.	Безлнх. Per prim.	5/х—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятые.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Последней период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты. Субъективные и объективные.
14	1899 № 1968.	Я. 35 л. крест. немз. прислуга.	с 12 л. 3 и 6 д. стукта.	—	1	21	14	Разр. пром. продолжит. роды—3 ст.	Хвор.	Боли внизу живота. Выпадение, мятаящее ходы и работы. Кровотечение.	Rupt. perin. subcutanea. ProL. v. ant. et. post. ProL. ut. incompl. Retroflexio. Hypertroph. c. p. supravag. Endometrit. haemorrhag. Res. pp. metrit.	от 21/11 по 12/12 лечится от выпота подтяжки матки.	Безлж. Per prim.	29/11—выпис. Промежность вполне достаточна.	—
15	1900 № 1976.	П. 48 л. крест. зам. дом. хов.	с 17 л. 4 д. 3 д.	21	2	23	20	Разр. пром.	—	Выпадение матки около 20 л. Носят кольца, но безуспешно.	Rupt. perin. ant. totalis. Hypertroph. c. p. supravag. et interned. Слизистая шейки констатированного характера. Ectropion. ProL. ut. incompl.	24/11—оп. хлороэ. Amput. c. alta Colporerin-rrh.	Безлж. Per prim. кр. небол. расхожд. во влагалище.	11/11—выпис. Здорова.	
16	1900 № 1977.	Н. 45 л. крест. прачка.	с 16 л. 3 и 3—5 л.	—	3	22	17	Разр. при I род. щипцы.	Норм.	Выпадение матки с 7 год.	Rupt. perin. ant. Hypertroph. c. supravagin. (небольшое). Зонд. 8 см. ProL. ut. incompl.	22/11—оп. хлороэ. Colporrh. ant. et Colporerin-rrharph.	Безлж. на промежн. и зты. губы Hematoma; рязкое расхожд. краевыронежности раны, влагалище—per primam.	17/11—выпис. Промежность легкая per granulation.	
17	1900 № 1992.	Н. 43 л. мнц. немз. прислуга.	с 14 л. 3 и 6—7 л. слабы.	—	4	26	13	Разр. пром. щипцы при I и II род. хвор.	Посл. I род. длго. хвор.	Чувство тяжести внизу живота. Выпадение матки. Затрудненное мочеиспускание. Запор. Обильная кровь.	Rupt. perin. subcutan. inverso vag. totalis. Enterocoele. ProL. ut. incompl. Hypertroph. c. p. supravag. et ulcera—c. Endometrit. haemorrhag. Плохого питания.	12/11—оп. хлороэ. Abrasio. Amp. c. alta Coloporerin-rrharph.	Безлж. на промежн. поверхн. расхожд. краев раны. На шейке и во влагалище per prim.	27/11—выпис. Здорова. 7/11—вследствие возможности удовлетворительна.	
18	1900 № 2012.	П. 48 л. ж. чинов. вдова дом. хов.	с 14 л. 4 и 2 д. 7 л. clim.	16	5 р. 8 вк.	19	16	Разр. пром.	Норм.	4 года выпадение матки.	Rupt. perin. ProL. v. ant. et post. ProL. ut. incompl. Retroflexio. Hypertroph. c. supravag. (небольшое).	12/11—оп. хлороэ. Colporrh. ant. et Colporerin-rrharph.	3 повыш. по вечер. (38°) Per prim.	20/11—выпис. Здорова.	

БИБЛИОТЕКА
Харьковского Медицинского Института

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лѣта, со- словие, се- мейное по- ложение, занятіе.	Роды.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На которомъ году была первая рода.	Сколько лѣтъ на- задъ были послед- ние роды.	Исходъ родовъ для больной.	Послеродовой периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты. Субъективные и объективные.
19	1900 № 2038.	Д. 40 л. вдова.	съ 18 л. 3 н. 3 д.	25	2 р. 1 вк.	26	11	Разр. пром. при 1 род.	Норм.	Выпаденіе матки 1½ г., которое сна- чала удавалось впро- вить, а потомъ уда- лось. Затрудненное моченспусканіе и за- поры по 7-ми днямъ.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Cystocele. Recto- cele. Prol. ut. incompl. Retroflexio. Зондъ=12 смт. Perimetritis post. затруд- нитель выраженіе матки. Питанія слабая.	1½-оп. хлороз. Амп. с. alta Col- porrh. ant. Colpo- perin.-rrhaph.	Безлнх. Per prim.	1½-выпнс. Здорова.	—
20	1900 № 2040.	И. 39 л. мѣщ. зам. дом. хоз.	съ 14 л. — съ годъ черезъ 1—3 нед.	18	5	19	7	Разр. пром.	Норм.	Выпаденіе матки около 2-хъ лѣтъ. Затрудненное моче- испусканіе и запоры.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post Cystocele. Recto- Enterocele. Prol. ut. incompl. Elongat. с. p. intermed. et ulc. colli.	2½-оп. хлороз. Амп. с. alta Col- porrh. ant. Colpo- perin.-rrh.	На 4—5 дни темп. 38,8—39,9° вслѣдств. Naematoma. Fistula peri- naeo-vaginalis.	2½-выпнс. Fistula зажи- ваетъ рубце- ваніемъ. Остальное per prim.	—
21	1900 № 2042.	В. 36 л. мѣщ. зам. прислуга.	съ 16 л. 4 н. 6 д. — тепла. 3 н. 2 д.	18	6	19	4 (трой- ными).	Разр. пром.	Норм.	Около 2-хъ лѣтъ выпаденіе частей и 4 г. пупочная грыжа. Затрудненное моче- испусканіе.	Rupt. perin. Prol. vag. totalis ant. et post. Prol. ut. incompl. Hypertroph. с. p. supravagin. Зондъ= 15 смт.	2½-оп. хлороз. Амп. с. alta Col- porrh. ant. Colpo- perin.-rrh.	Безлнх. Per prim.	1½-выпнс. Здорова.	—
22	1900 № 2081.	А. 55 л. вдова дом. хоз.	съ 16 л. 3—4 н. 6 д. — 4 г. clim.	16	5	17	28	Разр. пром.	Хвор.	Выпаденіе около 3-хъ лѣтъ, послѣ поднятія тяжести. Гнойная выдѣленія.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post Cystocele. Prol. ut. incompl. Hypertroph. с. p. supravag. et ulcers colli. Retroversio. Зондъ=11 смт.	2½-оп. кованн. Амп. с. alta Colporrh. ant. Colporperin- rrhaphia.	Безлнх. Per prim., крова. небол. рас- ходъ передней стѣнки.	2½-выпнс. Состояніе улучшилось удо- ветворительно.	—
23	1900 № 2101.	О. 60 л. мѣщ. незам. прислуга.	съ 16 л. 4 н. 2—3 д. — 10 л. clim.	—	1	20	40	Разр. пром.	Сильно хвор.	Послѣ родовъ ста- ла замѣчать выпадѣ- ніе частей, увеличив- шіяся съ теченіемъ времени и вследствие тяжелой работы.	Rupt. perin. Prol. vag. completus. Prol. ut. incompl. Зондъ=7½ смт. Atrophia ut. senilis. Ulcers colli.	1½-оп. хлороз. Амп. с. alta Col- porrh. ant. Colpo- perin.-rrh.	Безлнх. Per prim.	1½-выпнс. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лѣтъ, со- стояние, се- мейное по- ложение, занятіе.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выпаденій.	На которыхъ году были первые роды.	Сколько лѣтъ, на- задъ были после- дніе роды.	Исходъ родовъ для больной.	Построловой періодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.
24	1901 № 2185.	Я. 52 л. мѣщ. зам. торговка.	8 а. clim.	19	15 р. 1 кв.	19	13	Разр. пром.	—	3—4 года выпале- ние матки. Паховая грыжа съ обхвѣт сторонъ (съ 1 ро- довъ).
25	1901 № 2205.	К. 35 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 16 л. 3 н. 4 д.	19	1 р. 1 кв.	20	7	Разр. пром.	Хвор. послѣ родовъ.	Выпаденіе матки. 13 л. носила кольцо, которое теперь не- держится. Бѣля.
26	1901 № 2213.	М. 50 л. вдова солд. дом. хоз.	съ 17 л. 4 н. 4—5 д. съ бол.	23	8	24	11	Разр. пром.	Норм.	3 г. выпаденіе матки послѣ под- нятія большой тѣ- лести. При выпале- ніи задерживается моча. При лессаніи нѣтъ выпаденія.
27	1901 № 2229.	П. 49 л. ж. мѣщ. дом. хоз.	съ 16 л. 3 н. 6—7 д. иногда сгустк.	21	8	22	7	Разр. пром.	Хвор. послѣ VII род. кровоте- ченіемъ съ годъ.	Около 8-ми лѣтъ выпаденіе частей.

Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послѣоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаваемые ре- зультаты. Субъективные и объективные.
Rupt. perin. Prol. v. ant. et. post. Стѣнка влагалища рзко утолщена. Hypertroph. c. supravag. Зондъ=12 смт. Retroversio. Prol. ut. incompl. Hernia ingui- nalis dextra et sin.	¹⁴ / _v —оп. хлорое. Amp. с. (по Пире- деру) Colporrh. ant. Colporerin.-rrharpha.	Безлнх. Per prim., кромѣ итск. шпилью на передн. стѣнкѣ.	¹ / _v —выпис. Здорова.	Наслѣдована въ мѣѣ 1908 г., чув- ствовала себя хоро- шо 4 года. При натуживаніи вы- падаетъ передняя стѣнка, величиною больше яйца. Матка отрозирована, не- много опущается, Retroversio. Проме- жность низкая. Грыжа попереку. Вставлено круг- лое кольцо. Испол- нить всѣ домаш- нія работы.
Prol. v. ant. totalis. Prol. ut. incompl. Ulcers colli et hypertrophia с. р. supra- vag. et. intermed. Зондъ=12 смт. Retroflexio. Endo- metrit.	⁹ / _x —оп. хлорое. Amp. colli alta. Abrasio Colporerin- rrharpha.	Безлнх. Per prim., кромѣ небольш. рас- хожд. краевъ на про- межи.	² / _x —выпис. Промежность шпилью доста- точно.	—
Rupt. perin. Prol. v. ant. et. post. Prol. ut. incompl. Elongat. p. intermed. Met- ritis. ciron. et Endometrit. Зондъ=13 смт. Diastasis l. albae.	¹⁴ / _x —оп. хлорое. Amp. с. alta (отрѣз. 6 см). Colporerin- rrharpha.	Лихорад. до 38,9° при потах. Per prim., кр. незнач. поверхн. расхожд.	⁹ / _{xi} —выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Prol. v. ant. Cystocele. Prol. ut. incompl. Retroflexio fix. Hypertroph. c. supravagin.	⁹ / _{xi} —оп. хлорое. Amp. с. alta Col- porrh. ant. Colpo- perin.-rrharph.	Безлнх. Per prim.	¹⁵ / _{xi} —выпис. Здорова.	Пинетъ въ мѣѣ 1908 г., что все время чувствуетъ себя прекрасно, за- нимается хозяй- ствомъ и ниского выпаденія нѣтъ. Принести благо- дарность.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятіе.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статусь и діагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выпискѣ.	Отдаленные результаты. Субъективные и объективные.
28	1901 № 2237.	Е. 40 л. замуж. дом. хоз.	съ 14 л. 3 н. 2—3 д. съ бол.	21	7	22	3	Разр. пром.	Норм.	Съ послѣднихъ родовъ—тяжесть внизу живота и чувство выпирания изъ передняго прохода.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. supravag. Зондъ—12 смт. Resid. post.	¹⁹ /хп—оп. хлороф. Amp. c. alta Colporerin-grharf.	Безлнх. Per prim. кромѣ нѣск. кожныхъ швовъ.	¹ /хп—выпис. Здорова.	—
29	1901 № 2262.	Р. 49 л. ж. поч. гражд. дом. хоз.	съ 16 л. 3/2 н. 3 д.	24	1	24		Разр. пром.	Хвор.	12 л. боли внизу живота и 7 мѣс. опущение матки. Бѣлн.	Rupt. per. Prol. v. ant. et post. Cystocele. Prol. uteri incompl. Retroflexio mob. Res. post. Endometrit.	⁵ /хп—оп. хлороф. Abrasio. Colporerin-grharpha.	Безлнх. Per prim.	²¹ /хп—выпис. Здорова.	Писеть, что чувствуетъ себя хорошо, занимается хозяйствомъ. Матка не выпадаетъ. Частые позывы на мочу. Черезъ годъ послѣ операциі акушерка вставила кольцо.
30	1901 № 2265.	Т. 40 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 7 д. слабн.	17	9	19	1/2	Разр. пром.	Хвор.	Выпадение матки съ родовъ, особенно усилившееся послѣ послѣднихъ родовъ.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Cystocele. Prol. ut. incompletus. Retroflexio fx. Hypertroph. c. supravagin. Зондъ—14 смт.	¹⁶ /хп—оп. хлороф. Amp. c. alta (на 6 см.) Colporerin-grh. (во время операці зондомъ протнута матка).	Безлнх. Per prim. кромѣ влагалнца на 2 см.	¹⁹ /хп—выпис. Здорова.	—
31	1902 № 2280.	С. 37 л. крест. незам. дом. хоз.	съ 14 л. 3 н. 7 д. — 14 л. clim.	19	4	20	21	Разр. пром.	Хвор.	4г. выпадение матки. Запоры и временнаи затрудненіе мочеиспусканіе.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Retroflex. fx. Elongat. c. supravagin. Зондъ—9 1/2 смт.	¹⁹ /п—оп. хлороф. Amp. c. alta Colporerin-grharf.	Безлнх. Per prim.	¹ /п—выпис. Здорова.	Писеть въ маѣ 1908 г., что чувствуетъ себя плохо. Черезъ 1/2 года послѣ операциі матка стала снова выпадать, что приспываетъ поднятію тяжести.
32	1902 № 2303.	А. 45 л. незам. портниха.	съ 17 л. 3 н. 7 д.	20	3	21	17	Разр. пром.	Хвор.	Выпадение съ послѣднихъ родовъ, ухудшившееся особенно съ годъ. Бѣлн и затрудненное мочеиспусканіе.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Cystocele. Prol. ut. incompl. (до матки на нормальн. высотѣ. Hypertroph. c. Endometrit.	⁵ /п—оп. хлороф. Abrasio Amp. c. Colporerin-grharf.	Безлнх. Per prim.	¹⁶ /ш—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и число операций.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты. Субъективные и объективные.
33	1902 № 2315.	Ш. 44 л. ж. сторожа. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 4—5 л. съ бол.	23	3 р. 3 вы.	25	13	Разр. пром.	Хвор.	После 1 родов чувство выпадения особенно усилившееся за последние 3—4 г., когда приходилось много бить на ногах.	Rupt. perin. Pro. v. ant. et post. Cystocele. Pro. ut. incompl. Retroversio. Hypertroph. c. p. supravag. Зондъ=13 см.	¹⁵ / _{iv} —оп. хлорое. Amp. c. alta Colporrin-rhaph.	Безлх. Per prim.	¹⁵ / _{iv} —выпис. Здорова.	—
34	1902 № 2328.	Р. 54 л. учительн. вдова.	съ 13 л. 3 н. 3—4 л. — 9 л. clim.	20	4	21	25	Разр. пром.	—	Около года выпадение и боли при движениях.	Rupt. perin. Pro. v. ant. et post. Cystocele. Pro. ut. incompl. Retroversio. Hypertroph. c. p. supravag. Зондъ=13 см.	¹⁷ / _{iv} —оп. хлорое. Amp. c. alta Colporrin. ant. Colporrin-rhaphia.	Безлх. Per prim.	²⁵ / _{iv} —выпис. Здорова.	—
35	1902 № 2338.	М. 38 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 3 н. 5 л.	17	3	18	12	Разр. пром. при 1 род. незаш.	Норм.	Съ 1 родов замечает усиленное выпадение матки.	Rupt. perin. Pro. v. ant. et post. et uteri incompl.	¹⁶ / _x —оп. хлорое. Amp. c. Colporrh. ant. Colporrin-rhaph. (Fritsch).	Безлх. Per prim.	⁵ / _x —выпис. Здорова.	—
36	1902 № 2353.	З. 67 л. ж. полковн. дом. хоз.	съ 13 л. 3 н. 6—7 л. — 23 г. clim.	24	11 р. 1 вы.	25	25	Разр. пром. при 1 род.	—	Опушение около 5 лет.	Rupt. perin. Pro. v. ant. (Cystocele) et post. Pro. ut. incompl. Retroversio. Зондъ=8 см. Erosiones.	¹² / _x —оп. хлорое. Colporrh. ant. et Colporrin-rrh.	Безлх. Per prim.	²⁷ / _x —выпис. Здорова.	—
37	1902 № 2356.	В. 65 л. крест. невам. праща.	7 л. clim.	—	3	—	—	Разр. пром.	—	3 г. опухение матки, съ ¼ г. после поднятия — также матка вполне выпадает.	Rupt. perin. Pro. ut. incompl. Retroflexio. Зондъ=12 см.	¹⁵ / _x —оп. хлорое. + + эвэря (артерио-склероз) Amp. c. alta Colporrin-rrh.	Безлх. Per prim. кроме 3-х швов за спайкой.	²⁶ / _x —выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № мѣсяца	Фамилія, лѣта, со- словие, се- мейное по- ложение, занятіе.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выпаденій.	На которомъ году были первые роды.	Сколько лѣтъ на- задъ были послед- ніе роды.	Исходъ родовъ для болѣзней.	Послеродовой периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзней.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты. Субъективные и объективные.
38	1902 № 2358.	Ф. 51 г. мѣн. вдова прачка.	съ 16 л. 3 и 5 д. обил. куск. — 12 л. clim.	17	8 р. 1 мѣ.	18	17	Разр. пром.	Хвор.	Около 1/4 г. выпадение частей.	Rupt. perin. ProL v. ant. et post. Cystocele. ProL ut. incompl. Retroversio. Матка нормальная.	¹⁵ /x—оп. хлороз. Colporrh. ant. et Colporperin.-rrharph.	Безлнх. Per prim.	¹⁶ /x—выпис. Здорова.	Исследована въ мѣт 1908 г. Чувствует себя все время хорошо, только моча плохо держится. При натуживаніи итъ никакого выпаденія. Газовое дно весьма крѣпко. Сохраненіе Levator'a хорошо выражено. Матка атрофирована. Паховыя грыжи. Говоритъ, что до операціи матка совсѣмъ выпадала, и теперь очень счастлива и благодаритъ. Retroversio nob.
39	1902 № 2366.	В. 50 л. мѣн. незам. прислуга.	съ 15 л. 3 и. 6—7 л. — 5 л. clim.	—	9	20	27	Разр. пром.	Хвор. послѣ II род.	Около 3-хъ лѣтъ выпаденіе. Годъ носила кольцо, которое удалено частями. Сначала оно помогло, но потомъ снова почувствовала выпаденіе и чѣмъ дальше, тѣмъ хуже.	Rupt. perin. ProL vag. et uteri incompletus.	⁵ /xi—оп. хлороз. Colporrh. ant. et Colporperin.-rrharph.	Безлнх. Per prim.	¹¹ /xi—выпис. Здорова.	—
40	1902 № 2369.	Ш. 44 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 18 л. 4 и. 4 д.	21	2	22	17	Разр. пром.	Хвор.	Выпаденіе матки и недержаніе мочи.	Rupt. perin. ProL v. ant. et post. Cystocele. ProL ut. incompl. Retroversio.	⁵ /xi—оп. хлороз. Colporrh. ant. et Colporperin.-rrharph.	Безлнх. Per prim. кроме мѣсти, незначит. расхожда на пром. и во выгала.	¹⁷ /xi—выпис. Здорова.	—
41	1902 № 2383.	Е. 45 л. зам. дом. хоз.	неправ. и кусками за послѣд. время.	—	2 р. 7 мѣ.	—	—	Разр. пром.	—	Выпаденіе матки съ динныхъ поръ.	Rupt. perin. ProL v. ant. et post. Cystocele. ProL ut. incompl. Зодт.—13 снт. Hypertroph. c. suprav. et intermed.	²⁵ /xi—оп. хлороз. + эвиръ. Amp. c. alta Colporperin.-rrharph.	Безлнх. Per prim.	⁹ /xi—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Роды.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году был первый род.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Последовали ли перебои.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты. Субъективные и объективные.
42	1902 № 2399.	К. 64 л. крест. зам. дом. хоз.	с 15 л. 3 н. 4—5 л. — 25 л. с.п.	16	5	21	27	Разр. пром.	Норм.	Выпадение матки, мучительно ходить и работать. Затрудненное мочеиспускание.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Cystocele. Prol. ut. incomplet. Elongat. c. p. interned. Зонд=9 см.	²³ / ₁₁ —оп. кокани. (emphus. pul. et arterioscleros) Amp. ut. c. alta Colporperin.-rrhaph.	На 5-й день 1°—40° в течение 7 дней (preumom. suprosa) Per prim.	²³ / ₁ —выпис. Здорова. Выпадения нет.	—
43	1903 № 2406.	Д. 55 л. крест. зам. дом. хоз.	с 16 л. 3 н. 6 л. 11 л. с.п.	18	15	19	11	Разр. пром.	Хвор. иногда кровото-чением.	Выпадение матки выпадал 2 года. Носила кольца безрезультатно. Сукрови-стая выделения 2 год.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Cystocele. Prol. ut. incomplet. Hypertroph. c. interned. et praecipue p. supravagin. Зонд=12½ см. Atrophia ut. Oedema parietam vag. ulcera port.	¹² / ₄ —оп. эвир. (arterioscleros) Amp. c. alta Colporperin.-rrhaph.	Безлж. Per prim., кровь 2-х шпал.	¹² / ₁ —выпис. Здорова.	—
44	1903 № 2429.	Б. 44 л. крест. зам. дом. хоз.	с 17 л. 3—4 н. 2 л. срутс.	19	6	22	5	Разр. пром.	Хвор. посл. II род.	7 л. выпадение матки, особенно после летних полевых работ. 3 г. выдал по поводу выпадения было сделано Amputatio colli и зашивание передней стенки.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et uteri incompletus Elongat. c. p. interned. et supravag. Endometrit.	¹⁶ / ₁₁ —оп. хлороз. Abrasio Amp. ut. c. alta et Colporperin.-rrhaph.	Безлж. Per prim.	¹⁶ / ₁₁ —выпис. Здорова.	—
45	1903 № 2424.	Н. 55 л. крест. зам. дом. хоз.	с 18 л. 3 н. 3—5 л. — 10 л. с.п.	19	5	22	20	Разр. пром.	—	Выпадение матки с 1 родов, за последние 15 л. ухудшение. Носила кольца безрезультатно. Запоры и затрудненное мочеиспускание.	Rupt. perin. subcutan. Prol. v. ant. et post et uteri incompl. Hypertroph. c. supravag. et ulcera c. Зонд=14 см.	⁸ / ₁₁ —оп. хлороз. Amp. c. alta Colporperin.-rrhaph (при отдаленн. зан. своя случайно вскрыта Дуглас).	Безлж. Per prim., кровь поверхк. расхожд. у спайки.	²⁵ / ₁₁ —выпис. Здорова.	Послеопер. в мае 1908 г. Все время чувствует себя хорошо. После операции исполнила тяжелую работу, теперь 3 года без богадьян. Промежность состоятельна. При нату-жвании немного выпячивается передняя стенка, что, впрочем, нельзя принять за рецидив. Retroversio ut. atrophic. На м.е. шейк рубец. Сокращение Levator'a хорошо выражено.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, дата, социальное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и вынашиваний.	На котором году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Полоды родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
46	1903 № 2435.	Р. 40 л. мещ. вдова прачка.	с 14 л. 3—4 н. 3—4 л. с бол. куск.	18	1	17	21	Разр. пром.	Хвор.	Опушение матки вследствие чего не может мочиться пока не вправит её. Кольца не удерживаются. Запоры 3—4 дня. Сильная кровь.	Rupt. perin. subcut. Prol. v. ant. et uteri incomplet. Elongatio colli p. supravag. et mediae. Зонд = 12 см. Metrit. chron. Endometrit haemorrhag.	²⁰ / ₁₀ —оп. хлороз. + эвир. Amp. с. alta, Abrasio, Colporrh. ant. et Colpoperin.-rrh.	Безлх. Per prim.	¹⁹ / ₁₀ —выпис. Здорова.	
47	1903 № 2476.	Ф. 47 л. крест. зам. прачка.	с 17 л. 3—4 л. 6 л. — 2 г. clim.	27	4	29	13	Разр. пром. при III род. зашт.	—	12 л. вынадеет матка и запоры.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Cystocele. Prol. ut. incompl. Hypertroph. colli.	²¹ / ₁₀ —оп. хлороз. Amp. с. alta Colporrh. ant. Colpoperin.-rthaphia.	Безлх. Per prim.	⁵ / ₁₀ —выпис. Здорова.	Исследована в мае 1908 г. Чувствует себя все время хорошо, кроме некоторых явлений со стороны мочевого пузыря. Соиты болны влза зуости. Промежность крпная и плотная. Передняя стенка при натуживании слегка опускается, но это нельзя назвать релдливомъ. Anteversio. Матка атрофирована и безъ шейки. Собрание Levator'a хорошо выражено. Анемична.
48	1904 № 2507.	К. 36 л. крест. зам. фабричн.	с 14 л. 1—3 мѣс. 5—7 дн.	16	2	24	2 м.	Разр. пром. при I род.	—	Через годъ послѣ I родовъ была сдѣлана пластика. После II родовъ стала чувствовать выпадение, постепенно увеличивавшееся.	Rupt. perin. subcutan. Prol. v. ant. et post. Cystocele. Prol. ut. incomplet. Зонд = ⁹ / ₁₀ см. Hypertroph. с. Retroflexio mob.	²⁰ / ₁₀ —оп. хлороз. Amp. с. Colpoperin.-rthaph.	Безлх. Per prim.	⁹ / ₁₀ —выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № инст.	Фамилия, дѣт., со- словие, се- мейное по- ложение, замѣт.	Родила,	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На которыхъ году были первые роды.	Сколько дѣтъ на- задъ были послѣд- ние роды.	Источъ родовъ, для большой	Послеродовой периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ я диагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операция.	Послѣоперационное течение.	Какого числа выписана, Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
49	1904 № 2552.	К. 31 г. ж. крестьян. дом. хоз.	съ 17 л. 4 н. 4 д. черезъ 7 дн.	18	3	22	2 1/4	Разр. пром.	—	Выпаденіе матки съ 1 родовъ, послѣ тяжелой деревенской работы. При лежаніи матка становилась на свое мѣсто. Обильная кровь и запоры.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Prol. ut. incompl. Зондъ— 13 1/2 смт. Elongat. c. p. mediae. Endometrit. hae- morrhag.	17 1/4—оп. хлороф. Abrasio. Амр. с. alta. Colporperin- rrhaph.	Безлѣх. Per prim.	1/11—выпсн. Здоровы.	—
50	1904 № 2601.	А. 33 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 11 л. 3 н. 5 д. сильн., съ бол. 9°.	28	4 р. 1 вк.	28	1	Разр. пром. при 1 род.; щипцы. При послѣд. тоже щипцы.	—	Выпаденіе матки съ послѣднихъ ро- довъ. Задержка мочи.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Elongatio c. media et ulcera c. Зондъ—13 смт. Retroversio. Prol. ut. in- compl.	17 1/4—оп. кистш. наркоз. Амр. с. alta (вскрыт. Дуг- лае) Colporrh. ant. Colporperin- rrrh.	2 раза по веч.—38,5° Per prim., кроме частичн. повержи. расхожд.	4 1/4—выпсн. Здоровы.	—
51	1904 № 2640.	Б. 46 л. крест. глава прачка.	съ 17 л. 4 н. 7 д.	22	9	23	7	Разр. пром.	Норм.	Выпаденіе матки. Запоры и задержка мочи.	Rupt. perin. subcut. Prol. vag. ant. et post. Prol. ut. incompl. Elongat. c. p. me- diae et supravagin. Ulcera- Ectropion. Зондъ—12 1/4 смт. Retroflexio.	15 1/2—оп. хлороф. Амр. с. alta. Colpo- perin-rrhaph.	Безлѣх. Per prim., кроме итесн. кожн. швов.	4 1/2—выпсн. Здоровы.	—
52	1904 № 2642.	Я. 63 г. крест. глава дом. хоз.	съ 21 г. 4 н. 3—4 д. — 15 л. clim.	21	5	22	15	Разр. пром.	Норм.	Чувство опущенія съ давнихъ поръ и выпаденіе матки 5 л. назадъ, послѣ подня- тія тяжести. За- поры и задержка мочи.	Rupt. perin. subcutan. Prol. v. ant. et post. Cysto- cele. Prol. ut. incompl. Elongatio c. p. mediae et supravagin Ulcera c. Ectro- pion. Зондъ—14 смт.	15 1/2—оп. хлороф. Амр. с. alta. Col- porperin-rrhaph.	Безлѣх. Per prim.	15 1/2—выпсн. Здоровы.	—
53	1904 № 2653.	А. 32 л. крест. незам. прачка.	съ 17 л. по 5—12 дней сильн., съ бол., кусв.	—	5	—	5	Разр. пром.	Норм.	Выпаденіе матки 3—4 года.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Elongatio c. p. med. Зондъ— 9 смт. Reclinatio.	15 1/2—оп. хлороф. Excisio (по Шре- леру). Colporperin- rrh.	Безлѣх. Per prim.	15 1/2—выпсн. Здоровы.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Формида, лета, семейное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов, для большой.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод в каком числе была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
54	1904 № 2671.	М. 45 л. крест. зам. дом. хоз.	с 15 л. 4 и 5 д.	19	5 р. 6 в.	20	8	Разр. пром.	Хвор.	Выпадение матки около 10 л., усилившееся за последние 2 года. Запоры.	Rupt. perin. subentan. Prol. vag. ant. totalis. Prol. ut. incompl. Elongat. c. p. intermed. et supravagin. Ectropion, Oedema colli. Зонд—14 см. Reclinatio mob.	¹² / _х —оп. хлорос. Amp. c. alta (на 7 с.) вскрыт. Ауглас.) Colporrhin.-rrhaphia.	Безлж. Per primam. кров. одного ша посредия промежя.	²⁰ / _х —выпис. Здорова.	—
55	1904 № 2674.	Г. 44 л. ж. сапожн крест.	с 17 л. 3 1/2 и. 7 л. сильн.	21	12 р. 3 вк.	22	2	Разр. пром.	Хвор.	С 1V родов выпадение матки (17 л.), сначала незначительное, и во время беременности матка вырвалась, а за последнее время рязкое ухудшение. Частые сильные кровя стусками, задержка мочи и запоры.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Cystocele. Rectocele, Prol. ut. incompl. Metritis. Endometrit.	¹⁵ / _л —оп. хлорос. Abrasio. Colporrhin.-rrhaph.	Безлж. Per prim.	²¹ / _л —выпис. Здорова.	—
56	1905 № 2686.	Г. 55 л. солдата незамуж. торговка.	с 18 л. 4 и 5 д. 6 л. clim.	—	5	21	7	Разр. пром.	Норм.	Выпадение матки 6 л. Кольца причиняли боли, бьли и жарь.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. et ut. incompl. Cystocele. Rectocele. Hypertroph. colli p. supragav. et ulcera c. Zond—13 см.	²⁰ / _л —оп. хлорос. Amp. c. alta Colporrh. ant. Colporrhin.-rrh.	Безлж. Per prim.	⁵ / _л —выпис. Здорова.	—
57	1905 № 2687.	Р. 47 л. мжн. зам.	с 19 л. 3—4 и. 7 л. сильн. 7 л. clim.	19	1	22	25	Разр. пром.	Хвор.	Выпадение матки 1/4 года. Затрудненное мочеиспускание. Запоры.	Rupt. perin. subentan. Prol. vag. ant. et post. Cystocele. Prol. ut. incompl. Elongat. c. supragav. Oedema et ulcera colli. Зонд—12 1/2 см. Матка на нормальной высоте.	²² / _л —оп. хлорос. Amp. c. alta. Colporrh. ant. Colporrhin.-rrhaph.	Безлж. Per prim.	⁵ / _л —выпис. Здорова.	Исследована в 1908 г. профессора Отт и найдена здоровой.
58	1905 № 2700.	К. 55 л. купчиха замуж. занимается торговлей.	с 14 л. 4 и 7 д. сильн. стуск. 6 л. clim.	18	14	12	14	Разр. пром.	Хвор. посл. VI род.	Выпадение матки около 20 л., сначала мало беспокоившее, больную, с 6 год ухудшившееся. Затрудненное мочеиспускание. Бьли.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. totalis. Prol. ut. incompl. Retroversio mob. Зонд—шпorma. Endometrit.	¹¹ / _л —оп. хлорос. Abrasio. Colporrh. ant. Colporrhin.-rrh.	Безлж. Per prim.	²⁵ / _л —выпис. Здорова.	Пашеть в 1908 г., что чувствует себя все время хорошо. Моча не беспокоит. Выпадения неть.

№ по порядку.	Годъ. № листа.	Фамилия, со- словие, по- ложение, защита.	Регуш.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На какомъ году были первые роды. Сколько летъ на- задъ были послѣд- ние роды.	Исходъ родовъ для больной.	Послеродовой перодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность симптомы болезни и	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
59	1905 № 2722.	К. 55 л. мѣд. зам. пращка.	съ 14 л. 3—4 н. 3—4 д. 7 л. с.п.м.	20	15 р. 1 вк.	7	Разр. пром. при послѣд род. незап.	—	Постепенное увяданіе матки, ретро- укухившияся, тѣ- перь послѣ подни- тяжести.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Prol. ut. incompl. Retrover- sio mob. Ulcera—с. Зондъ=	1/2л—оп. хлороф. Colporrh. ant. Col- porerin.-rrhaph.	Безлх. Per prim.	20л—выпис. Здорова.	—
60	1905 № 2748.	Л. 57 л. крест. вдова пращка.	съ 15 л. 4 н. 3—4 д. 7 л. с.п.м.	20	1	21	36	Разр. пром. щипцы.	Выпаденіе матк. около года. Затру- ненное мочеиспус- каніе.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. Prol. ut. incompl. Ret- roversio. Ulcera colli.	5/8л—оп. хлороф. Colporrh. ant. Col- porerin.-rrh.	Безлх. Per prim.	11/2л—выпис. Здорова.	—
61	1905 № 2745.	З. 54 л. крест. незам. прислуга.	съ 14 л. 3 1/2 н. 3—4 д. — 10 л. с.п.м.	—	1 р. 1 вк.	25	29	Разр. пром. Хвор. послѣ выкид.	Выпаденіе лѣтъ 4 успѣхъ 3 года.	Rupt. perin. Prol. vag. ant. et post. Prol. ut. in- compl. Elongat. c. p. sup- ravag. Зондъ=12 снт. De- cubitus vag. отъ кольца.	5/8л—оп. хлороф. Colporrh. ant. Col- porerin.-rrhaph.	Безлх. Per prim. кромя поверхн. расхож. у снажки.	20л—выпис. Здорова.	—
62	1905 № 2760.	Л. 27 л. ж. околод. дом. хоз.	съ 14 л. 3—4 н. 3 д. съ бол. до.	21	3 1/2 р. 1 вк.	23	11 м.	Разр. пром. Норм. вставала на 5-й день.	Послѣ I родовъ, опущеніе, постепен- но усилившияся перешедшее тепе- рь въ выпаденіе. До 3 мужества хвора, направіемъ на низъ.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Cystocoele. Prol. ut. incompl. Retroflexio mob. Elongatio c. p. supravag. et ulcera c. Пилового питанія. Анэмична.	11/2л—оп. с.м.т.п. варкоз. Amp. с. alta Colporerin.-rrhaph.	Безлх. Per prim.	1/2л—выпис. Здорова.	—
63	1906 № 2802.	Т. 46 л. крест. вдова пращка.	съ 17 л. 4 н. 6 д. — обл. сгустк.	17	9 р. 4 вк.	19	15	Разр. пром. Хвор. послѣ I род.	Выпаденіе 17 лѣтъ начала незначи- тельное, но послѣдніе годы весьма мучи- тельное; чтобы ме- диться, должны впра- вить матку.	Rupt. perin. Prol. v. ant. totalis et post. Prol. ut. incompl. Elongat. c. p. su- pravag. et. intermed. Ulcera colli. Пилового питанія.	20л—оп. хлороф. + + эмп. (vitium cordis) Amp. с. alta Colporerin.-rrhaphia.	Безлх. Per prim. кромя мѣста Нае- matom'я.	20л—выпис. Мѣсто рас- хожденія почти заруб- целось.	—

№ по порядку.	Годъ. № листа.	Фамилия, летъ, со- словие се- мейное по- ложение, занятія.	Регулярн.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выкидышей.	На какомъ году были первые роды. Сколько летъ не- плодны въ послѣд- ніе годы.	Искость родовъ для большой	Послѣдней періодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана, Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты: субъективные и объективные.
64	1906 № 2812.	В. 53 л. двор. вдова дом. хоз.	съ 14 л. 4 м. 10 л. — 12 л. сім.	16	19	17	24	Разр. пром. быстр. роды.	Норм.	Выпадение матки развились пост- роменно вслѣдствіе пр- денія изъ сани- ухудившаяся з- последнее время. Пупочная грыжа.	Rupt. perin. Prol. v. ant. totalis. et post. Prol. ut. incompl. Elongat. c. p. sup- ravag. et ulcera c. Зондъ= 14 см. Hernia umbilicalis. Cystis parietis vagin.	27/л—оп. хлороф. Amp. c. alta (искр.т. Дуглас.) Cysto- ectomia. Colporrh. ant. Colporperin- rrrh.	Съ 6-го дня лихорад. по поводу Наемато- том'ы въ заднемъ сводѣ и сѣзга. Per prim., кроме иже- шной на перед. стѣнк.	1/л—выпис. 17/л—искрыта. Наематома широкой связи въ об- ластъ пшвоз. Промежность состоятельна.
65	1906 № 2813.	П. 31 г. крест. нем. горничная.	съ 18 л. 3 1/2 н. 3 л.	—	1	22	9	Разр. пром. незаш.	Норм.	Выпадение овод' 2-хъ мѣс. вслѣдствіе паденія. Запоры.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. totalis. Prol. ut. incompl. Elongat. c. p. sup- ravag. Зондъ=13 см.	25/л—оп. хлороф. Amp. c. alta Col- porperin-rrrhph.	Безлх. Per prim.	16/л—выпис. Здорова.
66	1906 № 2847.	Ш. 43 л. мѣщ. зам. прислуга.	съ 16 л. 4 н. 1—2 л. — последнее время по 10—14 д.	20	3	21	17	Разр. пром.	Хвор.	Выпадение съ по- садныхъ родовъ 2 раза опериро- валась по этому пово- ду. 8 л. кистъ матки постоянно extra rim. Кольца — безрезу- латно. Кровотеченіе	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. totalis. Prol. ut. incompl. Elongat. c. p. sup- ravag. et ulcera c. Зондъ= 14 см. Endometrit hae- morrhagica.	27/л—оп. хлороф. Abrasio. Amp. c. alta. Colporperin- rrrhph.	Безлх. Per prim.	15/л—выпис. Здорова.
67	1906 № 2851.	Р. 38 л. крест. нем. прислуга.	съ 17 л. 4 н. 5 д. обл. стукт.	—	1	37	1	Разр. пром.	Норм.	Опухленіе частей около гола. Обиль- ная кровь.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Retroversio. Endometrit. haemorrhag.	29/л—оп. хлороф. Abrasio. Colporrh. ant. et Colporperin- rrrh.	?	14/л—выпис. ?
68	1906 № 2856.	Н. 26 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 3 н. 4 д.	19	3	20	2 г. 7 м.	Разр. пром. при I род.	—	Послѣ I родовъ опухленіе, а послѣ послѣднихъ матка стала показываться изъ половой щели.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Retroflexio mob. Зондъ= 11 см. Elong. c. p. sup- ravag.	14/л—оп. хлороф. Amp. c. alta Colporrh. ant. et Colporperin- rrrhph.	2 дня повыш. 38,2° Per prim.	29/л—выпис. Здорова.
69	1906 № 2864.	Л. 43 л.	—	—	9 р. 2 вк.	—	—	Разр. пром.	—	Выпадение матки.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Cystocoele. Prol. ut. incompl. Elongat. c. p. in- termed. Зондъ=13 см.	25/л—оп. хлороф. Amp. c. alta Colporrh. ant. et Colporperin-rrrhph.	Безлх. Per prim., кроме спайки на 5 см.	15/л—выпис. Здорова.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, год, социальное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году был первый род.	Сколько лет прошло между родами.	Искость родов или больно.	Последней период.	Анамнез. Жалоб, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
70	1906 № 2900.	Н. 70 л. мши. вдова прикладч.	ст 19 л. 4 н. 3—4 д. 20 л. clim.	21	8	22	35	Разр. пром.	—	Выпадение матки с последним роде, усилившееся за последние 5 л. и мешающее работать. Затрудненное мочеиспускание. 3 г. назад делали операцию, но безрезультатно. Теперь пришла пешком из Саратова, чтобы получить помощь. Со мной не может работать.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. p. mediae. Estrotrion. Зонд=14 см.	⁷ /x—оп. без наркоза. Amp. c. alta. ²⁵ /xi—оп. без нарк. Colporrh. ant. Colpoperin.-rrh.	Безлж. Рег prim.	¹⁷ /xi—выпис. Здорова.	—
71	1906 № 2919.	М. 50 л. крест. вдовья.	ст 15 л. 4 н. 7 д. обм. 10 л. clim.	2	2	17	28	Разр. пром.	Норм.	3 мес. опущение матки и затрудненное мочеиспускание.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et ut. incompl. Hypertroph. coli p. med.	⁹ /xi—оп. хлороф. Amp. c. alta Colporrh. ant. Colpoperin.-rrh.	Безлж. Рег. prim. часть швов на шейке не сняты из-за боли разорвать нижн. спайку.	²³ /xi—выпис. Здорова. ²⁹ /xi—амбулаторно сняты последние швы.	—
72	1906 № 2936.	П. 48 л. крест. зам. земледельца.	ст 19 л. 3—4 л. 3—4 д.	20	10	22	5	Разр. пром.	После IV род. водянка.	Выпадение матки 2 г. назад от поднятия тяжести.	Rupt. perin. Prol. v. ant. totalis et. prol. ut. incompl. Hypertroph. c. p. med. et ulceras. Зонд = 14 см. Retroflexio.	¹⁶ /xi—оп. хлороф. Amp. c. alta Colporrh. ant. Colpoperin.-rrh.	Безлж. Рег prim. кр. поверх. расхожд. мистами.	^{1/4} —выпис. Здорова.	Пингет в мае 1908 г. что здорова, матка не выдает, занимается зем. сапошничеством. Муж приносит благодарности за излечение жены.
73	1907 № 3037.	Ш. 50 л. мши. вдова дом. хоз.	ст 15 л. 4 н. 4—5 д. силь. 10 л. clim.	19	4	20	27	Разр. пром.	—	Выпадение матки 7 л. Носила кольцо, безрезультатно. Был кровянистые.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et uteri incompl. Hypertroph. c. p. med. et ulcera c.	¹² /x—оп. хлороф. Amp. c. alta Colporrin.-rrhaph.	Безлж. Рег prim.	²⁵ /x—выпис. Здорова.	—
74	1907 № 2996.	К. 37 л. крест. зам. дом. хоз.	ст 15 л. 4 н. 3—4 д.	23	8	23	5	Разр. пром.	Норм.	Выпадение матки около 6 мес. Был.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Elong. c. p. supravag. et intermed. Retroflexio. mob. Diastaz. прям. мышц. Endometrit.	²⁴ —оп. хлороф. Abrasio. Amp. c. alta Colporrh. ant. Colpoperin.-rrh.	Безлж. Рег prim.	^{9/iv} —выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ. № акта.	Фамилия, дѣта, сос- ловіе, се- мейное по- ложение, занятіе.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и вышедшей.	На которыхъ году были первые роды.	Сколько дѣтъ на- задъ были нося- щи роды.	Исходъ родовъ для больной.	Послеродовой періодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.
75	1907 № 3036.	А. 51 г. г. крест. владом. дом. хоз.	съ 15 л. 4 н. 4 л. — 4 г. clim.	20	6	21	15	Разр. пром.	Хвор. послѣ 1 род.	Выпаденіе матки 3 г. Занорм, затруд- ненное мочеиспус- каніе. Выпаденіе усиле- лось послѣ прыжка изъ окна во время пожара. 12 л. на- задъ была операція кисты яичника.
76	1907 № 3074.	Я. 43 г. мѣщ. зам.	съ 13 л. 4 н. 6 л. 6 м. clim.	20	7 р.	22	9	Разр. пром.	Хвор.	Матка выпадаетъ болѣе 10 л., что мѣшаетъ двигаться и работать. Затру- женное мочеиспус- каніе.
77	1897 № 138.	К. ? незам. фабричн.	? —	—	2	—	—	Разр. пром. незам.	Хвор. долго.	Выпаденіе матки 2 года.
78	1898 № 6.	Я. 32 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 14 л. 4 н. 3 л. слаб.	28	3	28	1 г. 5 м	Разр. пром. при 1 род.	Норм.	Выпаденіе матки съ 1 родовъ.
79	1898 № 37.	Л. 50 л. крест. владом. дом. хоз.	—	16	12	—	16	Разр. пром. 3 дѣтей и умеря во время род.	Хвор. долго и много.	20 л. выпаденіе матки.
80	1898 № 86.	С. 42 л. незам. кухарка.	съ 15 л. 4 н. 7—8 л. сильн.	20	8 р. 1 вк.	21	7	Разр. пром. послѣ 1 род. незам.	Норм.	Опушеніе и вы- паденіе матки послѣ послѣднихъ родовъ, въ слѣдствіе водянн- ка корки съ водой на 9-й день носяго ро- довъ. Сильная кровь.

Статусъ и діагнозъ.	Оперативный мо- доть и какого числа была операція.	Послѣоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты. субъективные и объективные.
Rupt. perin. Prol. v. ant. totalis et post. (ovacern). Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. p. supravag. et ulcera c. Зондъ=12 см.	$\frac{1}{2}$ х—оп. хлорое. Амп. с. alta (на 5 см.) Colporerin- grharia.	Безлнх. Per prim.	$1\frac{1}{2}$ х—выпис. Здорова.	Постластана въ сентябрь 1908 г., здорова, испол- няютъ тяжелую ра- боту. При натужив- аннн влагалищныя стѣнки не выпа- даютъ. Промеж- ность высокая, кряжкая. Матка атро- фирована.
Rupt. perin. subcutan. Prol. vag. ant. et post. ProL ut. incompl. Hypertroph. c. p. supravag.	$\frac{1}{2}$ хп—оп. хлорое. Амп. с. alta Colporrh ant. Colporerin-grh.	Безлнх. Per prim.	$1\frac{1}{2}$ х—выпис. Здорова	—
Rupt. perin. ProL v. ant. et post. ProL ut. incompl. Retroflexio. Hypertroph. c.	$\frac{2}{3}$ х—оп. хлорое. Амп. с. alta Colpo- perin-grhaph.	Безлнх. Per prim.	$1\frac{1}{2}$ х—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. ProL v. et ut. incompl. Матка не уве- личена. Anteversio. Мало- кроміе и худоба.	$\frac{2}{3}$ х—оп. хлорое. Colporerin-grhaph.	Безлнх. Per prim.	$\frac{2}{3}$ х—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. ProL v. ant. ProL ut. incompl. Ulcera colli.	$\frac{1}{2}$ хп—оп. коканп. (общая слабость) Colporrh. ant. et Colporerin-grh.	Безлнх. Per prim. кр. поперх. расхожд. у снаіяи.	$\frac{1}{2}$ х—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. ProL v. ant. et. post. ProL ut. incompl. Hypertroph. c. Retroversio. Endometrit. haemorrh. Пло- хого питанія.	$\frac{2}{3}$ хп—оп. хлорое. Abrasio. Амп. с. alta Colporerin-grhaph.	Безлнх. Per prim. кромѣ нѣск. кож- ныхъ швовъ.	$1\frac{1}{2}$ х—выпис. Здорова.	По собствен- ному желанію съ незаруб- цованною раню на про- межности и во влагалищѣ.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, дата, социальное положение, занятие.	Роды.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На каком году были первые роды.	Сколько лет назад была последняя роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.
81	1898 № 111.	А. 55 л. крест. вдова дом. хоз.	с 15 л. 4 н. 4 д. слаб. — 10 л. clim.	18	6	—	—	Разр. пром.	Норм.	3 года выпадение матки.
82	1898 № 142.	Б. 33 л. мещ. незам. кухарка.	с 14 л. 4 н. 3 д. слаб. — 7 л. clim.	16	4 р. в.	—	—	Разр. пром.	Норм.	7 л. выпадение матки. Уже 2 раза была plastica.
83	1898 № 102.	Г. 21 г. крест. незам. прислуга.	с 17 л. 3 н. 5 д. сильн. сь бол.	—	1	20	11 м	Разр. пром.	Норм.	Со времени родов выпадение.
84	1899 № 28.	П. 31 г. крест. незам. прислуга.	с 18 л. 3½ н. 5 д. слаб.	29	1	36	1½	Роды двойн. Оперативно разр. был. зашиты.	Норм.	Современн роды, выпадение матки. Боль в крестцѣ.

Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выпискѣ.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные
Rupt. perin. Prol. v. ant. et. post. Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. p. supravag. et ulcera coli. Зондъ = 11 см.	²⁵ /x—оп. хлорое. Amp. c. alta Colporrh. antrharperin.	Безлж. Per prim. кровь и иск. кожн. швовъ.	¹⁷ /x—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Prol. v. ant. et. post. Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. supravag.	²⁶ /x—оп. хлорое. Amp. c. alta Colporperin.rhaph.	Безлж. Per prim.	²² /x—выпис. Здорова.	Исследована въ мѣз 1908 г. Здорова. Промежность хороша. Выпадения никакого. Atrorph. ut. Зондъ=5½ см.
Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. totalis. Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. p. suprav. Зондъ=13 см.	¹⁴ /m—оп. хлорое. Amp. c. alta Colporperin.rhaph.	Безлж. Per prim.	³ /4—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Elongat. c. p. supravag. Colpitis. Anteversio mob. Systoma ovarii величиной сь порядочное яблоко. Endometrit. Плохого питания и анемична.	⁹ /n—оп. хлорое. Abrasio. Colposcoliotomia post. Cystostoma provariis Amp. c. alta ¹⁵ /m—Colporperin.rh.	Безлж. Per prim.	²⁵ /m—выпис. Здорова.	Исследована въ мѣз 1908 г. Чувствуеть опущение. Исполняютъ тяжелую работу. Родовъ не имѣла. Climax 3 года. Промежность — высокая, крѣпкая. Передняя стѣнка слегка опущается при натуживанн. Зондъ=6 см. Anteversio.

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, зѣта, со- словіе, се- мейное по- ложение, занятіе.	Роды.	Начало половой жизни.	Число родовъ и вынашившей.	На которыхъ году были первые роды. Сколько зѣтъ на- задъ были послѣд- ніе роды.	Исходъ родовъ для больной.	Послеродовой периодъ.	Анамнезъ, Жалобы, давность и симптомы болѣзни.	Статусъ и діагнозъ.	Оперативный ме- тодъ и какого числа была операція.	Послооперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты. Субъективные и объективные.	
85	1899 № 45.	Л. 41 г. чипл. подав. проча.	съ 15 л. 4 н. 7 д. слаб.	—	4	—	7	Разр. пром.	Норм.	Выпаденіе матки.	Rupt. perin. Prof. v. ant. Prof. ut. incompl. Hype- rtroph. c. p. supravag.	² / ₁ л—оп. хлором. Amp. c. alta Colpo- perin.-rhrph.	2 раза по вечерамъ 38,2° 39,2° Per. prim.	²² / ₁ л—выпис. Здорова.	—
86	1899 № 62.	М. 38 л. мѣщ. зам.	съ 15 л. 4 н. 2—3 д.	19	7	—	4	Разр. пром. при I род. безап.	Норм.	Съ ¹ / ₂ г. вынаде- ніе матки. Бѣли.	Rupt. perin. Prof. v. ant. Prof. ut. incompl. Elongat. c. p. intermed. et ulcera c. Retroversio. Endometrit.	¹ / ₁ л—оп. хлором. Abrasio. Amp. c. alta. Colpoperin.-rhrn.	Безлнх. Per prim. кромѣ мѣск. кожн. швовъ.	¹⁷ / ₁ л—выпис. Здорова.	—
87	1899 № 67.	Ю. 43 л. мѣщ. зам. дом. хоз.	съ 13 л. 4 н. 3—4 д. слаб. съ бол.	17	7 р. 3 вк.	—	14	Разр. пром. роды про- должит.	Хвор.	Боли внизу живо- та. Бѣли. Запоры.— Ощущеніе мелоч- кости при ходьбѣ зѣтъ 5.	Rupt. perin. Prof. v. ant. et post. Prof. ut. incompl. Hypertroph. c. Зондъ = 11 см. Metrit. chron. En- dometrit.	²³ / ₁ л—оп. хлором. Abrasio. Amp. c. alta Colpoperin.-rhrph.	Безлнх. Per prim.	¹⁴ / ₁ л—выпис. Здорова.	Плнметъ въ Маѣ 1908 г., что все время чувствуетъ себя хорошо. Выпа- денія нѣтъ.
88	1899 № 74.	Р. 33 л. мѣщ. зам.	съ 12 л. 4 н. 4 д.	25	1	29	2	Разр. пром.	Норм.	Около года чу- ство напиранія внизъ. Бѣли. Съ дѣтства (съ 12 лѣтъ) опущеніе.	Rupt. perin. subentan. Prof. v. ant. Prof. ut. in- compl. Retroversio. Endo- metrit.	² / ₁ л—оп. хлором. Abrasio. Excisiocli- poidea. Colpoperin- rhrn.	Безлнх. Per prim. кромѣ одного кожн. шва.	²⁷ / ₁ л—выпис. Здорова.	Наслѣдована въ Маѣ 1908 г., чу- ствуютъ себя здо- ровой, нѣдкій день также работает. Промѣжность ши- риной въ 3 см. попереч- ныхъ пальца, плот- ная. Levator. ani сокращается хо- рошо. При натужив- аніи легкое опу- щеніе передней стѣнки. Матка нор- мальная Anteversio.
89	1899 № 75.	Т. 38 л. ж. горн. вижен. дом. хоз.	съ 15 л. 3 1/2 н. 3 д. слаб.	20	1	—	—	Разр. пром. роды про- должит.	Хвор. долго.	Чувство опущенія около 2-хъ лѣтъ. Бѣли и запоры.	Rupt. perin. Prof. v. ant. Prof. ut. incompl. Hype- rtroph. c. Retroflexio lix. Bartholinitis chron. dextra. Endometrit.	¹ / ₁ л—оп. хлором. Abrasio. Amp. c. alta Colpoperin.-rhrph.	Безлнх. Per prim.	⁴⁰ / ₁ л—выпис. Здорова.	—
90	1899 № 89.	Ф. 51 г. вдова купца дом. хоз.	съ 13 л. 4 н. 7 д. слаб. — 2 г. clim.	29	2 р. 1 вк.	—	—	Разр. пром. Послѣ ро- довъ не лежала и работ.	—	Съ I родовъ опу- щеніе и 22 г. вы- паденіе.	Rupt. perin. Prof. v. ant. et post. Prof. ut. in- compl. Hypertroph. c.	²² / ₁ л—оп. хлором. Amp. c. alta Colporrh. ant. Colpoperin.-rhrn.	Безлнх. Per prim.	¹⁹ / ₁ л—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, лѣта, со- словие, се- мейное по- ложение, занятіе.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родовъ и выздѣлностей.	На которомъ году были первые роды.	Сколько лѣтъ на- задъ были послѣд- ніе роды.	Исходъ родовъ для больной.	Послѣдней периодъ.	Анамнезъ. Жалобы, давность и симптомы болѣзни.
91	1899 № 150.	С. 52 л. крест. незам. дом. хоз.	черезъ 3 н. 4—5 д. сильн. — 2 г. clim.	15	6	—	—	Разр. пром.	Хвор. послѣ II род.	33 г.—со времени II родовъ,—опуще- ніе, постепенное уве- личившееся и пере- шедшее въ выкиды- ше. Подвергалась ластикъ, но безъ пользы.
92	1900 № 17.	М. 52 л. крест. зам. праща.	съ 15 л. 4 н. 5 д. слабо — 3 г. clim.	20	9 р. 2 пр. вр. 1 вк.	—	8	Разр. пром.	Норм.	8 л. опущение мат- ки. Бѣли.
93	1900 № 33.	М. 48 л. мѣщ. зам. торгов.	съ 16 л. 4 н. 3 д. — 3 г. clim.	16	7 р. 1 вк.	—	17	Разр. пром.	Норм.	Послѣ послѣднихъ родовъ выделение матки, усиднѣю- щеся съ теченіемъ времени. Бѣли.
94	1900 № 130.	С. 66 л. мѣщ. зам. дом. хоз.	съ 15—16 л. 4 н. 7 д. сильн. — 14 л. clim.	21	8 р. 1 вк.	—	21	Разр. пром.	Норм.	1/2 г. болѣна. Вы- деление матки, иногда загрудное моче- испускание и запоръ.
95	1900 № 154.	К. 55 л. ж. содл. дом. хоз.	съ 13 л. 4 н. 7 д. сильн. — 5 1/2 л. clim.	22	3	—	23	Разр. пром.	Хвор. долго.	Выпадение матки лѣтъ 10. Подверга- лась ластикъ, но безъ пользы.

Статусъ и диагнозъ.	Оперативный ме- тодь и какого числа была операція.	Послѣоперационное теченіе.	Какого числа выписана. Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные ре- зультаты. Субъективные и объективные.	
—	Rupt. perin. subcut. Pro- l. v. ant. et. post. totalis. Pro. ut. incompl. Elongat. с. р. supravag. Языки на ороговѣвшей стѣнкѣ вла- галина. Зондъ=12 см. Retroflexio.	²⁷ /x—оп. хлороэ. Амп. с. alta Colporrh. aut. et Colporperin- rrh.	Безлих. Per prim. кромѣ нѣск. кожн. швовъ.	¹⁴ /xI—выпис. Здорова.	—
—	Rupt. perin. Pro. v. ant. et post. (отчасти). Pro. ut. incompl. Elongat. с. р. in- termed. Ulcera с. Retro- versio fix. Endometrit.	²⁸ /i—оп. хлороэ. Abrasio. Amp. с. alta Colporperin.-rrh.	Безлих. Per prim. кромѣ расхожд. нѣск. швовъ во влагал.	²⁸ /i—выпис. Здорова.	—
—	Rupt. perin. Pro. v. ant. Pro. ut. incompl. Hyper- troph. с. р. mediae. Retro- positio. Endometrit.	¹⁵ /ii—оп. хлороэ. Abrasio. Amp. с. alta Colporperin.-rrhaph.	Безлих. Per prim.	¹⁵ /ii—выпис. Здорова.	Письмъ въ Маѣ 1908 г., что чув- ствуетъ себя все время хорошо. Вы- деления нѣтъ. Зани- мается торговлей, при чемъ подни- маетъ большія тя- жести.
—	Rupt. perin. Pro. v. ant. Systole. Pro. ut. incompl. Hypertroph. с. р. mediae. Ulcer с. Зондъ=12 см. Тучная.	²⁹ /x—оп. безъ нарк. (vit. cordis) Амп. с. alta. Colporrh. aut. ²⁰ /x—оп. кокаи. Colporperin.-rrhaph.	Безлих. на передн. стѣнкѣ расхожд. кожныхъ швовъ. На проемъ, per prim., кромѣ 2-хъ кожн. швовъ.	¹⁴ /xI—выпис. Здорова.	—
—	Rupt. perin. Pro. v. ant. Pro. ut. incompl. Retro- versio fix. Hypertroph. р. suprav. et. inforned. Bron- chitis chron. Плохого пи- танія. Анемична.	³¹ /x—оп. хлороэ. Амп. с. alta Colpo- perin.-rrhaph.	Безлих. Per prim. кромѣ поврежн. расхожд.	¹⁸ /xi—выпис. Здорова.	Послѣдована въ маѣ 1908 г., здо- рова. Промежность широкая и плотная. Выделения нѣтъ. Levotamii хоро- шо сокращается. Retroversio fix. Вы- ражаетъ благодар- ности.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятые.	Роды.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году была первая родовая.	Сколько лет шло до первой беременности.	Исход родов, для больной.	Последовый период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана, состояние при выписке.	Отдаленные результаты. Субъективные и объективные.
96	1900 № 175.	Л. 38 л. ж. двор. дом. хоз.	с 14 л. 3 1/2 н. 3—5 л.	23	7	25	—	Разр. пром. при 1 род. неизв.	Хвор. посл. III род. (прежде врем.).	Около 13 л. опущение стенок влагалища. Бил и запоры.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. p. supravagin. et intermed. Endometrit.	2 1/2 х—оп. хлороз. Abrasio. Amp. c. alta Colporerin.-rrhrp.	Безлж. Рег прим.	14 х—выпис. Здорова.	Пинет в Мае 1908 г., что все время чувствует себя хорошо. Занимается хозяйством. Выделения нет. Родов не было. Принести благодарности.
97	1901 № 36.	А. 32 л. крест. незам. прилуга.	с 19 л. 3—4 н. 5 л.	22	5	23	1	Роды 1 безгр. 2—3 ч. разр. пром. запит.	Хвор. посл. I род.	Около года выпадение влагалища и обильная кровь.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. p. med. Res. post. Endometrit. haemorrhag.	20 д—оп. кокаи. (vit. cord.) Abrasio Amp. c. alta Colporerin.-rrhrp.	Безлж. Рег прим.	10 д—выпис. Здорова.	—
98	1901 № 56.	Б. 55 л. двор. зам. ольск. хоз.	с 15 л. 4 н. 7 л. сильн. с 6 л.	34	5	—	12	Разр. пром.	Норм.	Около 2-х лет опущение стенок влагалища.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. p. supravag. Ulcera c. Zond=15 см.	2 1/2 н—оп. хлороз. Amp. c. alta Colporrh. ant. et Colporerin.-rrh.	Лихор. Рег прим. Местаги поперх. расхожд.	2 1/2 н выпис. Здорова.	—
99	1901 № 102.	Ф. 30 л. крест. вдова глядильн.	с 13 л. 4 н. 3—4 л. слаб.	19	5	—	—	Разр. пром. 4 раза щипцы 2—симплексиотомия.	Всегда хвораю.	Выпадение матки с год. Бил.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. Endometrit.	2 1/2 н—оп. хлороз. Amp. c. alta Colporerin.-triaphia.	4 дня по 39°. Рег прим.	25 в выпис. Здорова.	—
100	1902 № 139.	Ш. 55 л. двор. вдова дом. хоз.	с 16 л. 4 н. 6 л. сильн.	23	1	—	—	Разр. пром. при 1 род щипцы.	Хвор.	25 л. выпадение матки. Начинается спинах. Бил.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. (главн. образоз). Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. p. supravag. et intermed. Endometrit.	2 1/2 х—оп. хлороз. Abrasio. Amp. c. alta Colporerin.-rrh.	Лихор. 2 дня Рег прим. Phlebitis на обоих ногах.	12 х—выпис. Здорова.	Исследована в Мае 1908 г., здорова. Спинах 2 года. Промежность хорошая. Выделения никакого. Auteversio. Zond=6 см. Levator хорошо сокращается.

№ по порядку.	Года. № листа	Фамилия, состояние, семейное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году была первая родовая деятельность.	Сколько лет назад была последняя родовая деятельность.	Весомость родов для большой.	Постродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты. Субъективные и объективные.
101	1902 № 138	С. 45 л. крест. вдова	с 13 л. 4 н. 7 л. сильно с боа.	19	5 р. 2 вк.	—	9	Разр. пром. при I род.	Норм.	Около 10 л. выпадение матки и обильная кровь. Бъли.	Rupt. perin. Profl. v. ant. et post. Cystocele et Rectocele. Profl. ut. incompl. Hypertroph. c. p. supravag. et intermed. Endometrit. chron.	² / ₁ х—оп. хлороф. Abrasio. Amp. c. alta Colporrh. ant Colporerin.-rrhaphia.	Безлж. Per. prim.	²⁴ / ₁ —выпис. Здорова.	—
102	1902 № 110.	Л. 45 л. крест. вдова прислуга.	с 18 л. 4 н. 7 л. — 1 г. clim.	20	3	—	—	Разр. пром.	Норм.	3 года выпадение матки.	Rupt. perin. Profl. v. ant. et post. Cystocele et Rectocele. Profl. ut. incompl. Oporotonic mialagica. Elongat. c. p. supravagin.	²⁵ / ₁ х—оп. хлороф. Amp. c. alta Colporerin.-rrhaph.	Безлж. Per. prim.	¹⁵ / ₁ х—выпис. Здорова.	—
103	1902 № 21.	З. 39 л. мещ. вдова прислуга.	с 14 л. 3 н. 7—8 л. сильно.	18	6	19	5	Разр. пром. при I род.	Норм.	Выпадение матки с последних родов, постепенно усиливающие с е. Бъли. Запоры. Боли в пояснице. Подвергалась уже пластикъ.	Rupt. perin. Profl. v. ant. et post. Cystocele et Rectocele. Profl. ut. incompl. Retroflexio mob. Hypertroph. c. p. supravag. Зонд= 14 см.	¹⁵ / ₁ н—оп. хлороф. Amp. c. alta Colporerin.-rrhaph.	отъ 6—11 день лихорад. (38,2°—38,9°) Per prim., кровь итса. кожи. швовъ.	⁹ / ₁ н—выпис. Здорова.	—
104	1902 № 27.	Б. 40 л. крест. вдова кухарка.	с 18 л. 2—3 н. 4—7 л. сильно с боа.	27	2	28	—	Разр. пром. при I род.	Норм.	Выпадение с 1 родовъ, постепенно усиливавшееся и мѣшающее работать. Сильная кровь, запоры и задержка мочи.	Rupt. perin. Profl. v. ant. et post. Profl. ut. incompl. Hypertroph. c. p. suprav. et intermed.	¹ / ₁ н—оп. хлороф. Amp. c. alta et Colporerin.-rrhaph.	Безлж. Per. prim.	¹³ / ₁ н—выпис. Здорова.	—
105	1903 № 22.	П. 53 л. мещ. вдова дом. хоз.	с 13 л. 3—4 н. 4 л. — 5 л. clim.	17	9	—	17	Разр. пром.	Норм.	28 л. опущение матки. Запоры.	Rupt. perin. Profl. v. ant. Cystocele. Profl. ut. incompl. Retroflexio mob. Hypertroph. c. p. intermed. Hernia inguinal. sin.	⁷ / ₁ н—оп. хлороф. Amp. c. alta et Colporerin.-rrhaph.	Одинъ разъ t°—39° Per prim. мѣстами поверх. расхожд.	²⁹ / ₁ н—выпис. Здорова.	Несъложена профессоромъ Оттъ и найдена здоровой.
106	1903 № 98.	С. 25 л. крест. незам. прислуга.	с 14 л. 2—3 н. 6—7 л. сильно с боа.	19	1	19	6	Разр. пром.	Норм.	6 л. опущение матки. Боли внизу живота и въ пояснице. Запоры. Неправильная кровь.	Rupt. perin. Profl. v. ant. Profl. ut. incompl. Elongat. c. supravag. Menorrhagia. Endometrit.	²⁹ / ₁ н—оп. хлороф. Abrasio. Amp. c. alta Colporerin.-rrh.	Безлж. Per. prim. по поверх. расхожд. краевъ раны.	²⁵ / ₁ ч—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Родила.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На каком году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов, для большой.	Постродовой аберации.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.
107	1903 № 135.	К. 32 л. ж. мещ. дом. хоз.	с 17 л. 4 н. 4—8 д.	20	2	—	11	Разр. пром. при 1 род. незнач.	Норм.	Боли внизу живота. Били. Выпадение около 3-х мёс. (после большого прыжка).
108	1903 № 179.	К. 65 л. крест. вдова дом. хоз.	с 15 л. 3—4 н. 3—4 л. с 6 л. — 8 л. clim.	17	3 р.	—	23	Разр. пром.	Норм.	15 л. выпадение матки. Подвратлась раными пластями.
109	1904 № 126.	Ф. 49 л. ж. лич. поч. гражд. дом. хоз.	с 14 л. 3—4 н. 6 д. сильн. 2 г. clim.	20	10	21	—	Разр. пром.	Норм.	С детства опущение матки, усилившееся за последнее время настолько, что мешает ходить. Гнойная выделения.
110	1904 № 156.	К. 23 л. ж. студент. курястка.	с 14 л. 4 н. 4 л. слаб. с 6 л.	22	1	23	м.	Разр. пром. (уздечка).	—	Больна с 14 л.: выпадение из влагалища. Лечилась массажем. После родов, состояние ухудшилось. Сильные запоры. Боли в спину.
111	1904 № 198.	И. 43 л. двор. зам. дом. хоз.	с 14 л. 3—4 н. 3—4 д.	20	4 р. 2 вк.	21	—	Разр. пром.	Норм.	9 л. выпадение матки, боли внизу живота, недержание мочи.

Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Постоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты. Субъективные и объективные.
Rupt. perin. Profl. v. ant. Profl. ut. incompl. Retroflexio mob. Endometrit catarrhalis.	²⁴ XI—оп. хлороэ. Abrasio Excisio c. Colporerin-rhaph.	Безлик. Per prim.	¹⁴ XI—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. subcut. Profl. v. ant. et post. Cystocele et Rectocele. Profl. ut. incompl. Стенки влагалища ороговели, и покрыты язвками. Слабого питания. Retroflexio. Зонд=12½ см. Hypertroph c. supravag.	¹¹ XI—оп. хлороэ. Amp. c. alta Colporerin-rhaph. (Fritsch).	Безлик. Per prim. срозь небольшой, по верхн. раскожд.	¹⁴ XI—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Profl. v. ant. et post. Profl. ut. incompl. Hypertroph. c. p. intermed. Ectropion et ulcera colli Zond=14 см. Endometrit.	²⁴ IV—оп. хлороэ. 4-эвир. Amp. c. alta. Abrasio. Colporerin-rh.	Одно повыш. 38,4° Расхожд. поверхн. швов. Выявление per gran. осложн. cunit.	²⁸ V—выпис. Промежность прочная. Выпадения нет.	—
Rupt. perin. Profl. v. ant. et post. Profl. ut. incompl. Insufficiencia fundi pelvis. Retrov. mob. Hypertroph. c. p. supravag. et intermed. Zond=11 см. Solinvolutio.	¹⁹ V—оп. без хлор. Amp. c. Colporerin-rh. (промежн. кожа расшита).	Безлик. Per prim.	³¹ V—выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Profl. v. ant. totalis. Profl. ut. incompl. Elongat. c. p. intermed. et supravag. Ulcera colli. Дно матки на нормальной высоте. Среднего питания.	¹⁵ X—оп. хлороэ. Amp. c. alta (cum transplant. form. ant. et post.) Colporerin-rhaphia.	2 повыш. (38°). Per prim.	⁶ XI—выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Родила.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На какомъ году были первые роды.	Сколько летъ между родами.	Сколько разъ были посещены роды.	Искоса родов. для болевой.	Послеродовой периодъ.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.
112	1904 № 240.	А. 63 л. зам. дом. хоз.	12 л. clim.	16	16	18	20	Разр. пром.	Норм.	3 г. выпадение матки; общая слабость, шумъ въ ушахъ, сонливость.	
113	1905 № 165.	П. 51 г. крест. зам. дом. хоз.	съ 13 л. 4 н. 6 д.	17	1 р. 2 жк.	18	—	Разр. пром.	Норм.	5 л. опущение матки. Гнойная бѣля.	
114	1905 № 189.	Р. 63 л. вдова протоиерея дом. хоз.	съ 17 л. 4 н. 5 д. 14 л. clim.	22	7 р. 1 пр. 1 жк.	23	27	Разр. пром. при II род.	Хвор.	Тяжесть внизу живота. Выпадение матки съ послѣднихъ родовъ. После колыма, подвергалась пластич., но безрезультатно. Теперь присоединились еще гнойная выдѣленія.	
115	1905 № 296.	Н. 37 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 20 л. 4 н. 7 д. сильн. съ бол.	20	1	37	3 м.	Разр. пром. незап.	Хвор.	Выпадение матки вообще недомоганіе.	
116	1906 № 52.	Р. 40 л. поч. гражд. зам. дом. хоз.	съ 13 л. 4 н. 5 д.	20	3	21	7	Разр. пром. при I раз.	Норм.	18 л. выпадение матки, кольца не помогали. Бѣля. Затрудненное мочеиспусканіе и дисекація.	
117	1906 № 98.	П. 48 л. крест. зам. дом. хоз.	съ 17 л. 4 н. 4 д. слаб.	17	12 р. 1 жк.	18	3 г.	Разр. пром. при I род.	Норм.	$\frac{1}{2}$ г. выпадение влагалища, затрудняющее работать. Бѣля. Кровоточив. Безрышная грыжа съ дѣтства.	

Статусъ и діагнозъ.	Оперативный методъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные результаты. Субъективные и объективные.
Статусъ и діагнозъ.	Оперативный методъ и какого числа была операція.	Послеоперационное теченіе.	Какого числа выписана Состояніе при выпискѣ.	Отдаленные результаты. Субъективные и объективные.
Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. p. supravag. Ectropion. Зондъ=16 смт. Очень упитанная особа.	$\frac{12}{11}$ —оп. экзар. Amp. c. alta (случайно вскрытъ Дуглас.) шейка отъря. на 3 см. Colporerin.-rrh.	Безлжх. Per prim.	$\frac{8}{11}$ —выпис. Здорова.	Исследована профессоромъ Оттъ и найдена здоровой.
Rupt. perin. Prol. v. ant. totalis. Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. p. med. et supravagin. Ulcera c. Зондъ=13 смт.	$\frac{16}{15}$ —оп. хлороф. Abrasio. Amp. c. alta (с. пересадк. свод.) Colporrh. ant. Colporerin.-rrh.	2 повыш. (38°) Per prim.	$\frac{11}{11}$ —выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Prol. v. ant. totalis. Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. p. intermed. et ulcera c. Metroflexio Хорошаго питания.	$\frac{16}{16}$ —оп. хлороф. Amp. c. alta Colporerin.-rrhaph.	Безлжх. Per prim. кромѣ небол. по-верхн. расходж. по-вагала.	$\frac{5}{16}$ —выпис. Здорова.	Исследована докторомъ С. въ мѣз 1908 г. Чувствуетъ себя все время хорошо. Выпаденія никакого нѣтъ.
Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Metroversio. Ectropion Истощенность. Курпозис. Зондъ=8 $\frac{1}{2}$ смт.	$\frac{11}{11}$ —оп. хлороф. Colporerin.-rrhaphia.	Одно повышенье (40°) Per prim.	$\frac{29}{11}$ —выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Prol. v. ant. Cystocelc. Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. p. intermed. et supravag. Упитанная.	$\frac{8}{11}$ —оп. хлороф. Amp. c. alta Colporerin.-rrhaphia.	Безлжх. Per prim.	$\frac{25}{11}$ —выпис. Здорова.	—
Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Cystocelc. Prol. ut. incompl. Elongat. c. p. intermed. Зондъ=10 смт. Erosiones. Плохого питания. Endometrit. Hypertrophia carinae vagin. anter.	$\frac{21}{11}$ —оп. хлороф. Amp. c. alta. Colporrh. ant Colporerin.-rrhaphia.	Лжхор. 6 дней (выше 38°) Per prim. кромѣ нѣск. кожан. швовъ.	$\frac{15}{11}$ —выпис. Здорова.	—


№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятые.	Роды.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На которых году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Насколько родов был большой.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
118	1906 № 108.	П. 49 л. крест. вдова прачка.	с 16 л. 4 н. 4-5 д.	21	2 р. 2 прер.	22	17	Разр. пром.	Норм.	Выпадение 2 г. постепенно усиливается. Выправляется при лежачем положении. Кровотечение.	Rupt. perin. Prol. v. ant. totalis. Prol. v. post. Prol. ut. incompl. Elongatio c. p. supravag. et intermed. Ulcera c. Очень упитанная особа.	²⁴ / ₁₀ —оп. хлоро. Amp. c. pltr. Colporrh. aut. Colopera. rrb.	Безлжх. Per prim. кроме итск. кож. швов.	¹⁷ / ₁₀ —выписана. Здорова. Выпадения нет.	Исследована в Маб 1908 г.; здоров. Промежность кривая. Выпадения нет. Retroversio. Зонд=6 см.
119	1906 № 124.	И. 50 л. крест. зам.	с 17 л. 4 н. 6 д. слаб.	30	4	31	10	Разр. пром.	Норм.	Выпадение матки с последних родов.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. totalis. Prol. ut. incompl. Слизистая влагалища сухая, кожистого вида, Ulcera c. Зонд=11 смт.	²⁴ / ₁₀ —оп. хлоро. Amp. c. alta Colporrin. rrb.	Лихорад. до 9-го дня (около 38°) Per prim. кроме поперхн. расхожа.	⁷ / ₁₀ —выписана. Здорова. Незначительное опущение передней стенки осталось.	
120	1906 № 150.	З. 46 л. крест. вдова дом. хоз.	с 18 л. 4 н. 3 д. сильн. с 6 л. с бол.	23	6	24	8	Разр. пром.	Норм.	Опушение со II родов, постепенно увеличивавшееся. С беременностью чувствовала себя хорошо. Матку вправляет сама. Сильная кровь.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Endometrit. haemorrhag.	¹⁷ / ₁₀ —оп. хлоро. Abrasio. Amp. c. alta Colporrin. rrb.	Безлжх. Per prim.	²⁴ / ₁₀ —выписана. Выпадения нет. С увеличением общего состояния.	
121	1906 № 177.	А. 26 л. мещ. зам. дом. хоз.	с 15 л. 3-4 н. 3-7 д. сильн. с бол.	22	1 р. 1 пр.	23	2 г. 2 м.	Разр. пром.	Норм.	Со времени родов выпадение матки (от поднятия тяжести на 6-й день после родов), которое все прогрессирует. Был.	Rupt. perin. subcut. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Retroflexio. Elongat. c. Endometrit.	²⁶ / ₁₀ —оп. хлоро. Abrasio. Amp. c. alta Colporrin. rrb.	Безлжх. Per prim.	¹¹ / ₁₀ —выписана. Здорова.	
122	1906 № 179.	П. 35 л. вдова надв. сов. дом. хоз.	с 14 л. 4 н. 7 д. с бол.	16	4 р. 2 пр.	17	30	Разр. пром.	Норм.	Около 3-х лет выпадение матки. Болит в пояснице и кровотечения.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Cystocele. Prol. ut. incompl. Hysterophr. c. intermed. Ulcera c. Зонд=11 смт. Endometrit. haemorrhag.	²⁶ / ₁₀ —оп. хлоро. Amp. c. alta Colporrin. rrb. Abrasio.	Безлжх. Per prim.	¹¹ / ₁₀ —выписана. Здорова.	Пиннет в Маб 1908 г., что здорова. Выпадения никакого нет и только временною частью позвны на мочу.

№ по порядку.	Годъ, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На котором году был первый род. Сколько лет назад были последние роды.	Исходъ родов, для больной.	Постродовой периодъ.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	
123	1906 № 233.	Е. 47 л. крест. зам. прислуга.	съ 16 л. 4 н. 5 д.	21	4	22	8	Разр. пром. Роды тяж. 2—3 сут.	Норм.	Съ последних родов выпадение матки. Носила кольца, но без пользы.
124	1906 № 279.	К. 47 л. мѣщ. зам. дом. хоз.	съ 16 л. 4 н. 3 д. сильн.	18	6	19	19	Разр. пром.	Норм.	Съ последних родов выпадение матки. Кровотечение 4 мѣсяца.
125	1906 № 282.	С. 64 л. вдова прачка.	съ 12 л. чрезъ 4 н. по 3 л. сильн. 12 л. clim.	24	5	25	19	Разр. пром.	Норм.	7 л. боли внизу живота; боли въ поясницѣ; выпадение матки при ходьбѣ, которое все прогрессируетъ. Больна съ тѣхъ поръ, какъ подняла тяжесть.
126	1906 № 325.	Д. 31 г. крест. зам. земледѣл.	съ 18 л. 4 н. 3—4 л. сильн.	21	3	21	1 г. 9 м.	Разр. пром. при 1 род.	Норм.	10 л. (со времени 1 родовъ) выпадение матки: частое мочеиспускание и разъ при этомъ. Бѣлы.
127	1906 № 336.	Л. 48 л. крест. зам. прислуга.	съ 13 л. 4 н. 2 л. слаб. — 2 г. clim.	22	2	22	24	Разр. пром.	Норм.	3 г. выпадение матки и недержание мочи.

Статусъ и діагнозъ.	Оперативный методъ и какого числа была операція.	Послѣоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выпискѣ.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.	
—	Rupt. perin. subcut. Profl. v. ant. Cystocele. Profl. ut. incompl. Elongat. c. p. intermed. et supravag. Retroversio.	¹⁵ / _x —оп. хлороф. Amp. c. alta Colporerin.-rrhaph.	Безлж. Per prim. кровя. расхожд. краевъ раны.	⁵ / _x —выпис. Здорова.	—
—	Rupt. perin. Profl. v. ant. et post. Cystocele. Profl. ut. incompl. Elongat. c. p. supravagin. et intermed. Зондъ=14 см. Слабого питания. Diabetes.	¹¹ / _x —оп. хлороф. Amp. c. alta Colporerin.-rrhaph.	2 раза повynn. (38°). На 10-й день осложн. вѣ сутки.	⁴ / _x —† 11ны разошлись (невозможно послѣдовадасмерть) на 28-й день послѣ операціи отъ Embol art. pulm. (протоколь вскрытія).	—
—	Rupt. perin. subcutan. Profl. v. ant. et post. totalis. Profl. ut. incompl. Elongat. c. p. intermed. et supravag. Зондъ=9 ¹ / ₂ см. Питанія средняго.	¹¹ / _x —оп. хлороф. +o Amputat. c. alta Colporrin. aut. et Colporerin.-rrhaph.	Безлж. Per prim.	² / _x —выпис. Здорова.	Писать въ Мѣб. 1908 г., что чувствуетъ себя все время хорошо; выпадения нѣтъ.
—	Rupt. perin. subcut. Profl. v. ant. et post. Cystocele. Profl. ut. incompl. Retroversio. Endometrit. Средняго питания.	¹⁰ / _x —оп. хлороф. Abrasio. Colporerin.-rrhaphia.	Безлж. Per prim.	²⁴ / _x —выпис. Здорова.	—
—	Rupt. perin. Profl. v. ant. totalis. Profl. v. post. Profl. ut. incompl. Erosion. Elongat.-c. Хорошаго питания.	²⁷ / _x —оп. хлороф. Amp. c. alta. Colporerin.-rrhaph.	3 раза т° выше 38° Per prim.	¹⁵ / _x —выпис. Здорова.	—

№ по порядку.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятость.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На которых году были первые роды.	Сколько лет назад были последние роды.	Исход родов для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность симптомов болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отделенные результаты: субъективные и объективные.
128	1907 № 5.	Г. 54 л. крест. вдова, крест. работ.	с 16 л. 1 м. 3—4 д. — 3 г. clim.	22	8 р. 8 вы.	23	16	Разр. пром.	Норм.	10 л. выкидыши. Кольца не помогали вставив.	Rupt. perin. Prol. v. ant. Lalis. Prol. v. post. Prol. ut. incompl. Retroflexio. longat. colli. Зонда = 5 см.	¹² / ₁₀ —оп. хлоро. —фрвр. Amp. c. alta. Colporrh. ant. Colporperin.-rrhaph.	Безилх. Per prim.	²⁵ / ₁₀ —выпис. Здорова.	—
129	1907 № 17.	М. 30 л. крест. зам. дом. хоз.	с 12 л. 3 н. 3—4 д. сильн.	22	2 р. 1 прер.	23	6	Разр. пром. роды с операций, тяжелые.	Хвор. посл. родов.	Около года выделение крови, обильн.	Rupt. perin. Prol. v. ant. ut. incompl. Retroversio. mob. Endometrit. hemorrhag.	¹² / ₁₀ —оп. хлоро. Abrasio. Amp. c. Colporperin.-rrhaph.	Безилх. Per prim.	⁹ / ₁₀ —выпис. Здорова.	—
130	1907 № 68.	П. 50 л. двор. незам.	с 13 л. 4 н. 7 д.	26	2 р. 1 вы.	27	14	Разр. пром. при I род.	Норм.	После I род. опухание и выделение крови.	Rupt. perin. subcut. Prol. ant. et. post. Prol. ut. incompl. Пахочого питания.	¹² / ₁₀ —оп. хлоро. Colporperin.-rrhaph.	Безилх. Per prim.	¹ / ₁₀ —выпис. Здорова.	—
131	1907 № 75.	Т. 33 л. фабричн.	с 17 л. 4 н. 5 д. непра.	24	5	25	1 1/2	Разр. пром.	Норм.	С последн. до выделение крови.	Rupt. perin. Prol. v. ant. post. Prol. ut. incompl. Retroversio. Endometrit. haemorrhag. Пахочого питания.	²⁵ / ₁₀ —оп. хлоро. Amp. colli. Abrasio. Colporperin.-rrh.	Безилх. Per prim.	¹⁵ / ₁₀ —выпис. Здорова.	—
132	1907 № 77.	Е. 28 л. вдова прислуга.	с 14 л. 4 н. 4 д.	20	3	21	2	Разр. пром.	Хвор. Pyelitis purulenta с выск. темпер.	Выделение мочи около 8-ми мес. ременная матка (6 мес.) выпала стично, но с выделением и в срок для благополучия.	Rupt. perin. Prol. v. ant. post. Cystoccele et Retroversio. Prol. ut. incompl. longat. c. p. intermed. et sin.	¹² / ₁₀ —оп. хлоро. Amp. c. alta. Colporperin.-rrhaph.	Безилх. Расхождение, ж. шовы. Заживл. per granulation. Mastitis.	¹⁵ / ₁₀ —выпис. Здорова.	—
133	1907 № 76.	А. 47 л. крест. вдова прачка.	с 13 л. 4 н. 6 д.	22	8	22	11	Разр. пром.	Норм.	23 г. выкидыши. Частое м. инспукация. Боль поясниц. Б. Кольца не помог. Выделено мочи ходит и работ.	Rupt. perin. Prol. v. ant. ut. incompl. Ectropion. Orit. chron. Endometrit.	¹² / ₁₀ —оп. хлоро. Abrasio. Amp. c. Colporperin.-rrhaph.	2 раза выше 38° Per prim. м. ж. шовы. расхожд. и заживл. per granul.	⁹ / ₁₀ —выпис. Здорова.	Исследована в Мат 1908 г. Чувств. себя хорошо. Промежность—2 поперечным пальцами и средней толщины. Anteversio. При натуживании слегка опускается передняя стенка.



№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На каком году были первые роды.	Сколько лет, назад были последние роды.	Исход родов, для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана, Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: Субъективные и объективные.
134	1907 № 88.	К. 37 л. крест. зам. крестьянка	с 17 л. 4 и. 3—4—5 л. сильн.	28	2	29	4	Разр. пром. при I род. щипцы.	Хвор. после I род.	2 г. опущение матки, боли в пояснице и кровотечения.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Ectropion. Anteflexio. Зонд—8 см.	²⁵ / ₁₀ —оп. хлороф. Amp. с Colporerin. r-rhaph.	Безлх. Per prim.	²⁵ / ₁₀ —выпис. Здорова.	—
135	1907 № 118.	С. 34 л. крест. зам.	с 16 л. 4 и. 3 дн. — 14 л. clim.	19	11	20	13	Разр. пром.	Норм.	15 л. выпадение матки. Подвергалась ужу пластик.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl.	¹⁵ / ₁₀ —оп. хлороф. Colporerin.-r-rhaphia.	Безлх. Per prim.	¹⁵ / ₁₀ —выпис. Здорова.	Питет в Маё 1908 г., что здорова. Выпадения нтъ.
136	1907 № 174.	Р. 54 л. вдова врач. дом. хоз.	с 15 л. 4 и. 8 д. сильн. — 5 л. clim.	18	6 р. 2 вк.	19	28	Разр. пром.	Хвор. после II род. а выкид. после.	10 л. опущение и выпадение матки. Частые позывы на мочу.	Rupt. perin. subcut. Prol. v. ant. et post. Cystocele. Prol. ut. incompl. Retroflexio. Hypertroph. с. р. Intermed. et supravagin. Зонд—12 см. Хорошего питания.	²⁵ / ₁₀ —оп. хлороф. Amp. с. alta Colporerin.-r-rhaph.	Безлх. Per prim.	¹⁵ / ₁₀ —выпис. Здорова.	Питет в Маё 1908 г., что чувствует себя хорошо. Выпадения нтъ. Швы держатся крепко.
137	1907 № 216.	Х. 47 л. крест. зам. крестьянка.	с 19 л. 4 и. 4 д. сильн.	21	12 р. 4 вк.	22	4	Разр. пром.	Норм.	6 л. опущение. Носила кольцо. Неправильная кровь в задержании мочи.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Anteflexio. Endometrit. haemorrhag. Плохого питания.	⁶ / ₁₀ —оп. хлороф. Abrasio. Colporerin. r-rhaph.	Безлх. Per prim.	²⁵ / ₁₀ —выпис. Здорова.	Постыдована в Сентябрь 1908 г., чувствует себя прекрасно, работает на поля. Выпадения нтъ. Retroversio mob, поставлено кольцо. Сокращение диафрагмы pelvis хорошо выражено. Моча плохо держится.
138	1907 № 226.	И. 58 л. крест. поденц.	? 4 и. 7 д. — 10 л. clim.	19	11 р. 1 прер. 2 вк.	20	16	Разр. пром.	Хвор. после преждеврем. родов.	Около года выпадение матки. Поксидное время бѣли и кровотечения.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Cystocele. Prol. ut. incompl. Anteflexio. Hypertroph. coli. Erosiones.	⁷ / ₁₀ —оп. хлороф. Amp. с. alta. Colporerin.-r-rhaph.	Безлх. Per prim.	²⁵ / ₁₀ —выпис. Здорова.	—

№ по порядку.	Годы, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Возраст.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На каком году были первые роды.	Сколько лет прошло между последними родами.	Исход родов, для болячей.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.	Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
139	1907 № 230.	С. 47 л. крест. зам. дом. хоз.	с 17 л. 4 н. 2 д. — 1 г. clim.	18	7	19	3	Разр. пром.	Норм.	Около года выпадение матки. Кровинистая бля.	Rupt. perin. Prol. v. ant. totalis. Prol. v. post. Prol. ut. incompl. Matka normal. Anteflexio. Hypertroph. c. p. supravagin. et intermed. Зонд = 12 см. Слизистая влагалища гипертрофирована.	¹⁷ /ix—оп. хлороз. Abrasio. Amp. c. alta Colporerin.-rrhaph.	Безлж. Per prim.	⁸ / ₈ —выпис. Здорова.	—
140	1907 № 293.	Ж. 64 л. вдова кол. сепр. дом. хоз.	с 14 л. 3 н. 7 д. — 14 л. clim.	24	5	25	27	Разр. пром.	Хвор. после II род.	Выпадение влагалища при ходьбе постепенно прогрессирующее. Разстройство мочеиспускания.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl.	²⁹ /x—оп. хлороз. Amp. c. alta et Colporerin.-rrhaph.	2 повыш. (выше 38°) Per prim.	²⁹ /xi—выпис. Здорова.	Исследована вь Сентябрь 1908 г., доктором С. Чувствует себя хорошо. Выпадения никакого.
141	1907 № 336.	Т. 35 л. крест. зам. землепаш.	с 13 л. 4 н. 7 д. — 14 л. clim.	23	4	24	2	Разр. пром.	Норм.	Сь послѣднихъ родовъ выпадение матки, боли въ поясницѣ, частые позывы на мочу, гнойный выделеніи. Послѣдъ кольцо.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Utera coll. Зонд = 8 см. Плохого питания.	¹⁹ /xii—оп. хлороз. Amp. c. alta Colporerin.-rrhaph.	2 повыш. (выше 38°) Per prim.	¹⁹ /i—выпис. Здорова.	—
142	1907 № 341.	Б. 41 г. дочь ремес. незам. поденщ.	с 16 л. 3 н. 2 д.	31	3 р. 1 прв. 1 вк.	32	4	Разр. пром. при I род. (перорация) IV род. — предтеж. ручев.	—	Сь I родовъ выпадение матки, недержание мочи при кашлѣ, боли внизу живота и въ крестцѣ. Залоры.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl.	⁵ /xii—оп. эвпр. Colporerin.-rrhaph.	Безлж. Per prim.	¹⁷ /xii—выпис. Здорова.	Исследована вь Сентябрь 1908 г., чувствует себя хорошо. Выпадения нѣтъ. Anteversio. Diaphragma pelvis хорошо сокращается.
143	1907 № 393.	Ф. 45 л. крест. вдова дом. хоз.	с 13 л. 3 1/2 нед. 5 д.	21	9	22	5	Разр. пром. при I род.	Норм.	Сь I родовъ выпадение, постепенно усиливается и 13 л. нѣтъ перешедше въ постоянное. Затрудненное мочеиспускание. Бля.	Rupt. perin. Prol. v. ant. et post. Prol. ut. incompl. Hypertroph. c. supravag. et intermed. Endometrit.	²¹ /xii—оп. хлороз. Abrasio. Amp. c. alta et Colporerin.-rrhaph.	Лихор. (6 повыш. инъ) Инъязн. Per prim.	²¹ /i—выпис. Здорова.	Исследована вь Сентябрь 1908 г. Промежность ервнкая. Выпадения нѣтъ. Снять шовъ сь промежности и 2 шва сь шейки. Anteversio. Зонд—6 1/2 см. Часто мочится.

№ по порядку.	Год, № листа.	Фамилия, имя, отчество, семейное положение, занятие.	Регулы.	Начало половой жизни.	Число родов и выкидышей.	На которых году были первые роды.	Сколько лет прошло между последними родами.	Исход родов, для больной.	Послеродовой период.	Анамнез. Жалобы, давность и симптомы болезни.
1	1898 № 1707	Н. 63 л. вдова маиора дом. хоз.	с 14 л. 3 н. 5 л. 23 г. clim.	30	7	31	23	Разр. пром при I род.	Норм.	15 лет замечает опущение матки, выходящей при каждом напряжении. Недержание мочи.
2	1899 № 1871	К. 50 л. вдов. зам. крест. работам.	с 17 л. 3—4 н. 3—4 л. 1 г. clim.	31	3	32	10	Разр. пром. при I род. щипцы.	Норм.	С I родов чувствует опущение матки, которая стала мало по малу показываться снаружи половых частей и достигла настоящей величины тогда тому назад.
3	1899 № 1903	Л. 44 л. аглиц. дом. хоз. зам.	с 16 л. 4 н. 3 л.	20	6	24	6	Разр. пром при III род.	Лихор. после послерод.	С III родов чувство тяжести и напирания на низ (16 л. наз.). После последних родов уже ясно заметила выпавшее тело между наружными половыми частями, которое теперь является при ходьбе.
4	1906 № 378	Р. 53 л. крест. зам. хлебопаш. шествов.	с 7 л. 4 н. 5 л. сид. 2 г. clim.	21	10	22	12	Разр. пром. при I род.	Норм.	Опущение матки с I родов; с последних увеличилось и стало мешать при ходьбе. При мочеиспускании приходилось вправлять выпавшую матку.

Статус и диагноз.	Оперативный метод и какого числа была операция.	Послеоперационное течение.	Какого числа выписана. Состояние при выписке.	Отдаленные результаты: субъективные и объективные.
Rupt. perin. Prol. ut. et vag. complet. Вся матка лежит extra rimam, дно матки кзади. Ulcera. Зондъ=7 см.	¹⁴ / _v опер. под эвир. Colporrh. ant. et colporerin-trharph.	Безлх. Пер. prim., кроме итск. кожи. швов.	²⁶ / _v выпис. Здорова.	Исследована доктором С. наблюдавшим все время за больной. После операции больная в течение 9 лет, т. е. до своей смерти (отъ Diabetes) выпадения не имела.
Rupt. perin. Prol. ut. et vag. complet. Ulcera c. et vag. Зондъ=6 см.	²⁶ / _v опер. под эвир. Colporrh. ant. et обширная Colporerin-trharphia.	Безлх. Пер. prim.,	¹² / _v выпис. Промежи. кряпка.	—
Rupt. perin. Prol. ut. et vag. complet. Oedema vag. et colli ut. Ulcerac. Матка вся extra rimam., дно ее обращено назад.	¹¹ / _x опер. под эвир. Colporrh. ant. et Colporerin-trharph.	Безлх. ¹² / _x Намотка правой большой губы. У швышки поверхи. расхож.	²⁸ / _x выпис. Промежи. кряпка.	Пиньетъ въ Июль 1908, что чувствует себя хорошо с колышком, которое было вставлено въ 1901 г. по поводу опущения передней стѣнки, развинувшая, по мнѣнию ее, отъ сильного хроническаго камня. Гельеръ колыша не носитъ, такъ какъ чувствуетъ себя хорошо.
Rupt. perin. Prol. ut. et vag. complet. Ulcera c. et vag. Зондъ=8 ¹ / ₂ см. Плативе удовлетворительно.	¹⁷ / ₄ опер. под эвир. Colporrh. ant. et Colporerin-trharph.	Безлх. Пер. prim. кроме итск. кожи. швов.	²⁹ / ₄ выпис. Здорова.	—

ЛИТЕРАТУРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- 1) **Schroeder:**—Handbuch der Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane. 11 Aufl. 1893. стр. 229.
- 2) **Soranus:**—Цит. по Большой Энциклопедии. Том XVII. стр. 672 и по Schroeder'у.
- 3) **Ambroise Paré:** {Цит. по Бюроковичу: Материалы къ изучению радикальнаго лечения выпадения матки. Диссертація СПб. 1893.
- 4) **Kilian:** {Erlangen. 1903.
- 5) **François Mauriceau:** {Цит. по Schlicke'у. Dissertation.
- 6) **Smellie:** {Erlangen. 1903.
- 7) **Huguier:**—Sur les allongations hypertrophie. etc. Paris. 1860.
- 8) **I. Diefenbach:**—Цит. по Schroeder'у.
- 9) **V. Langenbeck:**—Цит. по Schroeder'у.
- 10) **Simon:**—Prager Vierteljahresschrift. 1867. стр. 125.
- 11) **Hegar:**—Operative Gynäkologie. Hegar и Kaltenbach. IV. Aufl.
- 12) **Martin:**—Pathologie und Therapie der Frauenkrankheiten. Martin und Jung. 4 Aufl. Berlin-Wien. 1907.
- 13) **Fritsch:**—Die Krankheiten der Frauen. VIII Aufl. Berlin.
- 14) **Küstner:**—Grundzüge der Gynäkologie. Jena. 1893.
- 15) **Simpson:**—Цит. по Orry: Паротомія и терапия и пр. Стр. 163.
- 16) **Lawson-Tait:**—Цит. по Saenger'у: Neuere Methoden der Perinaeorrhaphie etc. Archiv. f. Geburtsh. und Gynäkologie. Bd. XXXI. Crp. 450.
- 17) **Saenger:**—Volkmann's Sammlung klinischer Vorträge. № 301.
- 18) **Neugebauer:**—Colporrhaphia mediana. Centralblatt für Gynäkologie. 1881. № 1.
- 19) **Губаревъ:**—Журнал акушерства и женск. болѣзней. Апрель. 1896.
- 20) **Halban & Tandler:**—Zur Therapie der Genitalprolapse: Myoplastische Bildung des Beckenbodens mit Hilfe des m. Le-

- vator ani und d. M. Gluteus maximus. Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäcologie. 1910. Heft. 1.
- 21) **Hegar**.—I. e. 11.
 - 22) **Olshausen**.—Centralblatt für Gynäcologie. 1886. № 43.
 - 23) **Fritsch**.—Женскія болѣзни. Переводъ съ 10 нѣмецкаго изданія. Стр. 302.
 - 24) **Küstner**.—Centralblatt für Gynäc. 1889. Стр. 567.
 - 25) **Schücking**.—Centralblatt f. Gynäc. 1891 г. Стр. 392.
 - 26) **Dührsen**.—Zeitschrift f. Geburtsh. und Gynäc. Bd. XXV. Стр. 368.
 - 27) **Лебедевъ, А. И.**.—О вагинофиксаціи, какъ оперативномъ средствѣ для исправленія перегибовъ и наклоненія матки назадъ. Врачъ. 1849. № 15
 - 28) **Mackenrodt**.—Zeitschrift für Geburtsh. und. Gynäc. Bd. XXIV. Стр. 315.
 - 29) **Alexander, W.**.—The Treatment of backward displacements. London. 1884.
 - 30) **Freund**.—1) Centralblatt f. Gynäc. 1896. № 40. 2) Archiv f. Gynäc. Bd. 36. Стр. 519.
 - 31) **Schauta**.—1) Lehrbuch der gesammten Gynäcologie. 2) Chrobak. Festschrift II. 1903.
 - 32) **Wertheim**.—1) Цит. по Döderlein'у und Kroenig'у Operative Gynäcologie. 2) Centralblatt f. Gynäc. 1899. № 14.
 - 33) **Fritsch**.—Prolapsoperationen: Centralblatt f. Gynäc. 1900. № 2.
 - 34) **Müller**.—Цит. по Hofmeier'у Gynäcologische Operationen.
 - 35) **Martin**.—Pathologie und Therapie der Frauenkrankheiten. Martin und Jung. 4 Aufl. 1907 г.
 - 36) **Снегиревъ**.—Colporrechia anterior et posterior. Труды I-го съезда общества российскихъ акушеровъ и гинекологовъ. СПб. 1904.
 - 37) **Schultze, B. S.**.—Lageveränderungen d. Gebärmutter. Berlin. 1882.
 - 38) **Bardleben, C.**.—Ueber die Lage der weiblichen Beckenorgane. Anatomischer Anzeiger. 1888.
 - 39) **Ziegenspeck**.—Archiv für Gynäcol. Bd. XXXI. Стр. 1—54.
 - 40) **Winkel**.—Lehrbuch der Frauenkrankheiten. 1890.
 - 41) **Waldeyer**.—Lehrbuch der Topographischen Anatomie. 1898.
 - 42) **Spiegelberg**.—Monatsschrift f. Geburtsh. 1869. Heft I.
 - 43) **Martin E.**.—Die Anatomie des weiblichen Beckens. Rf. Centralblatt f. Gynäc. 1910. № 44.
 - 44) **Pansch**.—Grundriss der Anatomie des Menschen. III Auflage. 1891. Стр. 357.
 - 45) **Leshaft**.—Ueber die Muskeln und Fascien der Dammgegend beim Weibe. Morpholog. Jahrbuch. Bd. IX.
 - 46) **Rauber**.—Lehrbuch der Anatomie. Leipzig. 1892. Стр. 680 u. 736.
 - 47) **Halban & Tandler**.—Anatomie und Aetiologie der Genitalprolapse beim Weibe. Wien und Leipzig. 1907.
 - 48) **Nebesky**.—Zur Aetiologie des Uterus-Prolapsus. Archiv für Geburtsh. u. Gynäc. Bd. 87. Heft 3. 1908.
 - 49) **Губаревъ**.—Оперативная гинекология. СПб. 1910.
 - 50) **Наупес**.—Americ. Journ. of Obstetr. Dec. 1908.
 - 51) **Славянский**.—Частная патология и терапия женскихъ бол. 6. СПб.
 - 52) **Halban & Tandler**.—I. e. 47.
 - 53) **Вирюковичъ**.—Материалы къ изученію радикальнаго леченія выпаденія матки и влагалища. Дисс. СПб. 1893.
 - 54) **Halban & Tandler**.—I. e. 47.
 - 55) **Вирюковичъ**.—I. e. 53.
 - 56) **Küstner**.—I. e. 14.
 - 57) **Вирюковичъ**.—I. e. 53.
 - 58) **Кирьевъ**.—Къ оперативному леченію неправильныхъ неполныхъ выпаденій матки. СПб.
 - 59) **Sinety**.—Цит. по Славянскому, I. [с. 51].
 - 60) **Schroeder-Hofmeier**.—I. e. I.
 - 61) **Fritsch**.—I. e. 23.
 - 62) **Оттъ**.—Патология и терапия неправильныхъ положеній матки. СПб. 1890.
 - 63) **Winter**.—Ursachen und Behandlung des Prolapsus uteri. Graefes Sammlung etc. Bd. V. 8.
 - 64) **Küstner**.—I. e. 14.
 - 65) **Schultze**.—I. e. 37.
 - 66) **Аrx**.—Ueber die Ursachen der natürlichen Lage der Gebärgorgane. Volkmann's Sammlung Klinischer Vorträge. Heft. 210.
 - 67) **Theilhaber**.—Zur Prolapsoperationen. Montasschrift für Geburtsh. u. Gynäc. Bd. V.

- 68) Halban & Tandler:—I. с. 47.
- 69) Kroenig:—Beiträge zur Geburtsh. u. Gynäc. Bd. XV. Heft 1. 1909.
- 70) Pankow:—Цит. по Westermарку. Труды V-го международн. Съезда по акушерству. Стр. 469.
- 71) Nebesky:—I. с. 48.
- 72) Hegar:—Hegar und Kaltenbach. Operative Gynäcologie.
- 73) Veit:—Handbuch der Gynäcologie.
- 74) Славянскій:—I. с. 51.
- 75) Снегиревъ:—I. с. 36.
- 76) Новиковъ:—Къ этиологии и хирургическому лечению выпадения матки. Труды II Съезда Общ. Россійск. акуш. и гинекологовъ. Москва. 1907.
- 77) Fehling:—Lehrbuch der Frauenkrankheiten.
- 78) Христиани:—Къ вопросу объ оперативномъ лечении выпадения матки. Диссерт. Юрьевъ. 1900.
- 79) Sitzenfrey:—Zeitschrift für Geburtsh. und Gynäc. Bd. LVIII.
- 80) Sutter:—Münchener med. Wochenschrift. 1906. № 2.
- 81) Оттъ:—Heilung des Rectalprolapsus durch Restitution des Beckenbodens. Centralblatt f. Gynäc. 1900. № 28.
- 82) Якобсонъ:—Лечение выпадения прямой кишки вегетановелиемъ мышечной силы тазового дна. Труды V-го международн. акуш.-гинекологическ. съезда. Стр. 582.
- 83) Kroenig:—Цит. по Westermарку Труды V международн. съезда по акушерству. Стр. 469.
- 84) Starr:—La Gynäcologie. Avril. 1906.
- 85) Schömacker:—Protrusions of the uterus in nulliparus women. The journal of the Americ. med. assoc. 1907. Vol. 49. № 26.
- 86) Ertzbischoff:—Contribution à l'étude du prolapsus chez les vierges et les nullipares. La Gynäcologie. Août. 1905.
- 87) Chaduc:—Aetiologie des prolapsus genitaux chez les nullipares. Ref. Centralblatt f. Gynäc. № 32. 1905.
- 88) Христиани:—I. с. 78.
- 89) Weinberg:—Цит. по Schroeder'y. Handbuch der Frauenkrankheiten etc.
- 90) Scapooni:—ibidem.
- 91) Христиани:—I. с. 78.
- 92) Вирюковичъ:—I. с. 53.

- 93) Славянскій:—Разрывъ промежности и его лечение. СПб. 1886.
- 94) Славянокая-Греншпрандъ:—Беременность и роды при целомъ разрыве промежности. Журналъ акуш. и жен. бол. 1887. Стр. 1006.
- 95) Сицинскій:—Къ казуистикѣ центральныхъ разрывовъ промежности. Журн. акуш. и жен. бол. 1895 г. Томъ IX. Май.
- 96) Saenger:—I. с. 17.
- 97) Оттъ:—Протоколъ засѣдания акушерско-гинеколог. Общества 13/IV 1895 г. Журн. акуш. и жен. бол. 1895 г. Февраль.
- 98) Мандельбергъ:—О предупреждающемъ срединномъ разрывѣ промежности во время родовъ. Диссерт. СПб. 1905 г.
- 99) Прокофьева:—Perinaetomia sub partu. Сборникъ трудовъ по акушерству и гинекологии, посвящен. Д. О. Отту по поводу 25-лѣтня его врачбн. дѣятельности. СПб. 1906.
- 100) Ахшарумовъ:—О разрывѣ промежности при родахъ. Ежегодникъ. 1896. № 39.
- 101) Ильинъ:—Сборникъ трудовъ III Съезда Общ. Россійск. акуш. и гинекологовъ. Киевъ. 1910.
- 102) Новиковъ:—I. с. 76.
- 103) Христиани:—I. с. 78.
- 104) Heftler:—Цит. по диссерт. Tarrasch'a. Würzburg. 1888.
- 105) Fetzer:—Münchener medicinische Wochenschrift. 1910. № 2.
- 106) Heimann:—In wieviel wird die Entstehung der Retroversion flexio durch längere oder kürzere Betruhe nach der Geburt beeinflusst. Monatsschrift f. Geb. u. Gynäc. 1910. Heft. 2.
- 107) Феноменовъ:—Оперативное акушерство.
- 108) Gans:—Späteresultate nach Forceps. Monatsschrift für Geburtsh. u. Gynäc. 1908. Heft. 14.
- 109) Bürger:—Prolapsus bei neugeborenem Kinde mit Spina bifida. Archiv für Gynäc. 1904.
- 110) Штромбергъ:—Случай полного выпадения влагалища и матки у 18-лѣтней первоявшей дѣвды, одержимой кифозомъ. Журналъ акуш. и жен. бол. 1896. Стр. 644.
- 111) Schauta:—I. с. 31.
- 112) Lehr:—Zur Aetiologie des Uterusprolapsus. Diss. Berlin. 1893.
- 113) Шабаевъ:—О непосредственныхъ и отдаленныхъ результатахъ оперативнаго лечения полныхъ разрывовъ промежности. Monatsschrift für Geburtsh. und Gynäc. 1910.

- 114) **Schatz**:—1) Der Geburtsmechanismus der Kopflagen. Leipzig. 2) Der intraabdominale Druck etc. Archiv f. Gynäc. Bd. IV. 1872.
- 115) **Лаврентьевъ**:—Материалы къ вопросу о силѣ и дѣйствии мышц, входящихъ въ составъ брюшной прессы. Дисс. СПб. 1884.
- 116) **Лавриновичъ**:—О лечении трудновправимыхъ и несправимыхъ заднихъ смѣщений матки методической коленно-грудной гимнастикой. Дисс. СПб. 1901.
- 117) **Прокофьева**:—Prolapsus vaginae posterior superior. Enterohydro-colpocoele vaginae post. Журн. акуш. и жен. бол. 1890. Стр. 125.
- 118) **Кѣтлинскій**:—Prolapsus uteri completus cum carcinoma portio. vaginal. incipiens. Реф. по Михнову. Систематическій указатель русской акуш.-гинекологич. литературы отъ ея возникновения до 1901 г.
- 119) **Оттъ**:—I. с. 97.
- 120) **Черновъ**:—Оперативное лечение свѣжихъ разрывовъ промежности отъ 2—7 дня. Colporrhaphia intermedia. Дисс. СПб. 1905.
- 121) **Холмогоровъ**:—Вторичный шовъ промежности между 2—20 днями послѣ родовъ. Врѣч. 1898. № 19.
- 122) **Массенъ**:—13 случаевъ вторичнаго шва послѣ родовъ. Современныя вопросы въ акушерствѣ. СПб. 1895.
- 123) **Вонштедтъ**:—Perinaeorrhaphia secundaria (10 случаевъ). Журн. акуш. и жен. бол. 1902. Т. 12.
- 124) **Вастень**:—Perinaeorrhaphia secundaria. Журн. акуш. и жен. бол. 1898. Стр. 537.
- 125) **Winkel**:—Цит. по S. Flatau. Die Retroflexio und ihre Behandlung. Leipzig. Naumann. Стр. 10.
- 126) **Ziegenspeck**:—Referatvortrag für den V internationalen gynäcolog. Kongress. Труды Съезда. СПб. 1911.
- 127) **Meyer, A.**:—Zur Klinik der Retroflexio. Deutsche medicinische Wochenschrift. 1908. № 49.
- 128) **Hermann**:—Uterine displacements. British medical. Journal. Septemb. 1908. Реф. по Jahresberichte etc. 1910.
- 129) **Ziegenspeck**:—1) Neue Prolapsoperation. Deutsche Aerztezeitung. 1900. 2) Centralblatt f. Gynäc. 1900.
- 130) **Heidenhain**:—Цит. по Halban'y & Tandler'y.

- 131) **Halban & Tandler**:—I. с. 20.
- 132) **Шабазъ**:—Myorrhaphia partis anterioris m. Levatoris ani (mm. pubo-coxae et pubo-rectalis). Новый вспомогательный методъ для восстановления тазового дна. Доклады XI-му Пироговскому Съезду. Практич. Медицина. Май 1910.
- 133) **Губаревъ**:—Оперативная гинекологія. СПб. 1910.
- 134) **Latzko**:—Ueber Prolapsoperationen: 81. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Salzburg (Vortrag) ref. по Centralblatt'y der Gynäcologie. 1910.
- 135) **Haldan & Tandler**:—I. с. 20.
- 136) **Оттъ**:—О руководящихъ основахъ при выборѣ способовъ восстановления нарушенной дѣлности тазового дна и брюшной стѣнки. Журн. акуш. и жен. бол. 1897. Т. VI.
- 137) **Оттъ**:—Vervollkommnetes Verfahren der Anlegung und Entfernung der Naht bei der normalen Perinaeorrhaphies etc. Archiv für Gynäc. Bd. XXXIX. H. 1.
- 138) **König, Franz**:—Centralblatt für Chirurgie. 1887. № 13. Стр. 226.
- 139) **Jolly**:—Die Operation des Prolapsus totalis. Zeitschrift für Geb. und Gynäc. 1910. Bd. LXVI.
- 140) **Sanders**:—Dauerergebnisse von Prolapsoperationen. Dissert. Berlin. 1903.
- 141) **Негар**:—Цит. по Вирковичу.
- 142) **Winter**:—I. с. 63.
- 143) **Klein**:—463 Colporrhaphien. Centralblatt für Gynäc. 1906. № 43.
- 144) **Вирковичъ**:—I. с. 53.
- 145) **Каннегиссеръ**:—Обзоръ дѣятельности гинеколог. отдѣленія Понивальскаго Института. 100-лѣтняя дѣятельность Импер. Кли. Понив.-Гинекологич. Института. СПб. 1898. Стр. 744.
- 146) **Cohn**:—Ueber die primären und definitiven Resultate der Prolapsoperationen. Zeitschrift f. Geburtsh. u. Gynäc. Bd. XIV. Heft 2.
- 147) **Kieme**:—Bericht über die die vom März 1887 bis März 1894 in Halle ausgeführten Prolapsoperationen. Diss. 1895.
- 148) **Asch**:—Ueber Prolapsoperationen. Dissert. Bonn. 1895.
- 149) **Humpf**:—Die Methoden der Prolapsoperationen in der Göttingener Klinik. Diss. 1895.

- 150) **Schmidt**:—Archiv für Gynäc. Bd. 48. Heft III.
 151) **Klein**:—l. c. 143.
 152) **Вирюковичъ**:—l. c. 53.
 153) **Христіани**:—l. c. 78.
 154) **Baatz**:—Dauerresultate der Prolaps- und Retroflexiooperationen. Monatsschrift f. Geb. und Gynäc. 1904. Bd. XIX.
 155) **Asch**:—Centralblatt für Gynäc. Bd. XXX. № 37. Сrp. 1028.
 156) **Sonntag**:—Plastische Operationen zur Heilung des gerissenen Dammes und der Vorfälle. Beiträge zur Geb. und Gyn. A. Hegar gewidmet. 1889.
 157) **Asch**:—l. c. 148.
 158) **Cohn**:—l. c. 146.
 159) **Dorf**:—Wiener med. Blätter. 1879.—1880.
 160) **Münchmayer**:—Ueber die in der königlichen Frauenklinik zu Dresden etc. Centralblatt f. Gynäc. 1892.
 161) **Kieme**:—l. c. 147.
 162) **Ida Schmidt**:—l. c. 150.
 163) **Meinert**:—Zur Prognose der Prolapsoperationen. Diss. Greifswald. 1897.
 164) **Fehling**:—Festschrift der Stuttgarter Aerzte. 1897. Сrp. 6.
 165) **Travalgino**:—Die Colporrhaphia anterior und Colpoperinaeorrhaphia als Prolapsoperationen. Dissert. Amsterdam. Ref. Prommels Jahresberichte. 1906.
 166) **Martin**:—l. c. 35.
 167) **Theilhaber**:—Zur Aetiologie und Therapie des Genitalprolapses. Monatsschrift. f. Geb. u. Gynäc. 1900. Bd. II. H. 2—3.
 168) **Baum**:—Die operative Behandlung der Scheiden- und Gebärmuttervorfälle. Archiv für Gynäc. Bd. 65. H. 3.
 169) **Baatz**:—l. c. 154.
 170) **Снегиревъ**:—l. c. 36.
 171) **Hegar**:—Hegar und Kaltenbach. Operative Gynäcologie. IV Auflage.
 172) **Schultze**:—Цит. по Küstner'y. Kurzes Lehrbuch der Gynäcologie.
 173) **v. Herff**:—Ueber die Dauerresultate der Prolapsoperation. Beiträge zur Geburtsh. u. Gynäc. 1901. Bd. 3. H. 3.
 174) **Baatz**:—l. c. 154.

- 175) **v. Herff**:—l. c. 173.
 176) **Schmidt**:—Bericht über die in der Klinik Schauta ausgeführten peritonealen Prolapsoperationen mit Berücksichtigung der Dauerresultate. Monatsschrift f. Geb. und Gyn. Bd. II. Heft 1.
 177) **Христіани**:—l. c. 78.
 178) **Martin**:—Verhandlungen der deutschen Gesellschaft f. Geburtsh. u. Gynäc. Würzburg. 1903. Сrp. 84.
 179) **Hohl**:—Bericht über 60 Vaginofixation des Uterus. Archiv f. Gynäc. Bd. 54. Сrp. 615.
 180) **Andersch**:—Dauererfolge der operativen Retroflexio und Prolapsbehandlung. Archiv f. Gynäc. Bd. LXV. Сrp. 217.
 181) **Baatz**:—l. c. 154.
 182) **Küstner**:—Цит. по Baatz'y. Сrp. 424.
 183) **Westermarck**:—Vergleichende Kritik der operativen Methoden bei Vorfall der Gebärmutter. Труды V междунаро. съезда по акуш. и женск. бол. Сrp. 464.
 184) **Döderlein** und **Kroenig**:—Operative Gynäcologie.
 185) **Fuchs**:—Zur plastischen Verwendung des Uterus nach Wertheim bei Operationen grosser Genitalprolapse. Monatsschrift. f. Geb. u. Gynäc. Bd. XXII. 1905.
 186) **Kirchgessner**:—Vaginale Totalexirpation bei totalem Vorfalle des Uterus. Zeitschrift. f. Geb. u. Gynäc. Bd. LVIII. 1906.
 187) **Winter**:—l. c. 63.
 188) **Bumm**:—Berichte der Sitzung der Gesellschaft für Geb. und Gynäc. zu Berlin am 22. 1. 1909. Zeitschrift f. Geb. u. Gynäc. Bd. LXV. H. 1.
 189) **Schauta**:—Discussionen auf d. 81. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Salzburg über den Vortrag Latzko: Über Prolapsoperationen. Archiv f. Gynäc. 1910.
 190) **Лебедевъ, А. И.**:—Цит. по Орлову: Клиническій отчетъ о 200 чревосъченіяхъ, произведенныхъ проф. А. И. Лебедевымъ съ 1884 по 1892 гг. Диссерт. СПб. 1893.
 191) **Орловъ, В. Н.**:—ibidem. Сrp. 313.
 192) **Снегиревъ**:—l. c. 38.
 193) **Холмогоровъ**:—Прикрѣпленіе матки къ влагалищу и пузирю при ея опущеніи, наклоненіи и загибѣ назадъ. Врачъ. 1895. № 49 и Врачъ 1897 г. № 2.

- 194) **Поповъ, Д. Д.**—Русскій Врачъ 1908 г. №№ 6, 7, 8, 10, 15. Хирург. леч. преимущ. приросших къзади загибовъ матки и пр.
- 195) **Доббертъ**.—Ist die Ventrofixation der Gebärmutter eine berechnigte Operation? St.-Petersburger med. Wochenschrift. 1903. N 21.
- 196) **Теръ-Микаэляницъ**.—Къ вопросу объ операціяхъ Hysteropexis ant. abdomin. при полныхъ выпаденіяхъ матки. Казань. Диссерт. 1892.
- 197) **Феноменовъ**.—ibidem.
- 198) **Муратовъ**.—Опришиваніи матки къ передней брюшной стѣнкѣ при полныхъ выпаденіяхъ матки. Медици. Обзоріе. 1893.
- 199) **Оленинъ**.—Hysteropexis abdominalis ant. при полныхъ выпаденіи матки. Протоколъ Тамбовскаго меиц. Общ. 1893.
- 200) **Александровъ**.—6 случаевъ выпаденія матки, оперированныхъ по Wertheim'у. Медиц. Обзоріе. 1901.
- 201) **Соловьевъ**.—Журн. акуш. и жен. бол. 1906. № 6.
- 202) **Груздевъ**.—Пренія по поводу доклада Снегирева. Труды I Съезда Общ. Россійск. акуш. и гинекологовъ. СПб. 1904.
- 203) **Вурдзинскій**.—1) idem. 2) Пренія по поводу доклада Шабакъ: «О непосредственныхъ и отдаленныхъ результатахъ оперативнаго леченія выпавшей матки». Труды III Съезда Общ. Россійск. акуш. и гинекологовъ. Киевъ. 1909.
- 204) **Холодековскій**.—Пренія по поводу доклада Новикова: къ этиологии и хирургическому леченію выпаденія матки. Труды II Съезда Общ. Россійск. акуш. и гинеко. Москва. 1908.
- 205) **Снегиревъ**.—I. с. 38.
- 206) **Христіани**.—I. с. 78. Стр. 89.
- 207) **Kirchhessner**.—I. с. 186. Стр. 242.
- 208) **Rauhut** (Halle).—Цит. по Westermarck'у. Труды V междуна-родн. Съезда по акуш. и женск. бол. СПб. 1911.
- 209) **Bumm**.—Centralblatt für Gynäcologie. 1909. Стр. 616.
- 210) **Küstner**.—Wo ist vorteilhaft die Episiotomie zwecks Erhaltung der integrierenden Dammgewebte anzulegen? Praktische Ergebnisse der Geburtshilfe und Gynäkologie. 1909.
- 211) **Снегиревъ**.—Маточныя кровотеченія. IV издание. Москва. 1907 г. Стр. 678.

Положенія.

- 1) Въ дѣляхъ профилактики выпаденія влагалища и матки необходимо внимательно осмотръть послѣ родовъ каждую промежность и, при наличности разрыва, какъ промежностнаго, такъ и влагалищнаго, обязательно зашить.
- 2) Мышечное тазовое дно и промежность лучше всего сохраняютъ свою нормальную функцію, если, гдѣ это окажется необходимымъ, дѣлать при родахъ перинеотомію, какъ это рекомендуетъ профессоръ Оттъ.
- 3) Полные разрывы промежности происходятъ, главнымъ образомъ, при наложеніи щипцовъ у первородящихъ.
- 4) Выпаденіе влагалища и матки весьма рѣдко наблюдается при полныхъ разрывахъ.
- 5) Отдаленные результаты даютъ возможность правильно оцѣнить пригодность даннаго оперативнаго метода.
- 6) Профилактической методъ леченія эклампсін даетъ хорошіе результаты.
- 7) При пластическихъ операціяхъ шелкъ является самымъ лучшимъ матеріаломъ для швовъ.
- 8) Питутринъ является лекарственнымъ средствомъ, вызывающимъ потуги.

CURRICULUM VITAE.

Карль Федорович Шабакъ, евангелическо-лютеранскаго вѣроисповѣданія, родился 18 Апрѣля 1871 года въ родовой усадьбѣ Лифляндской губерніи. Среднее образованіе получилъ въ классической гимназій въ городѣ Перновѣ. Въ 1893 году поступилъ на Медицинскій факультетъ Императорскаго Юрьевскаго университета, который окончилъ въ 1898 году.

Будучи студентомъ, былъ субассистентомъ госпитальной клиники, хирургической и акушерской поликлиникъ и находился въ лѣтнихъ командировкахъ на эпидеміи сыпного тифа въ Псковской губерніи и на Кеммерскихъ минеральныхъ водахъ. Въ началѣ 1899 года занимался въ заграничныхъ клиникахъ. Въ 1900 году былъ призванъ на военную службу, на правахъ вольноопредѣляющагося, въ 100 пѣхотный Островскій полкъ младшимъ врачомъ. Послѣ выхода въ запасъ въ Январѣ 1901 года слушалъ лекціи въ Клиническихъ Институтахъ Великой Княгини Елены Павловны и въ Повивальномъ. Съ осени того-же года поступилъ въ число врачей-экстерновъ Повивальнаго Института. Въ 1904 году былъ назначенъ ассистентомъ того-же Института. Экзамены на доктора медицины выдержалъ при Императорской Военно-Медицинской Академіи въ 1905—1906 учебномъ году.

Въ качествѣ старшаго ординатора 45-го полевого подвижнаго госпиталя участвовалъ въ русско-японской кампаніи. Съ 1910 года состоитъ консультантомъ по женскимъ болѣзнямъ при Старо-Русскихъ Минеральныхъ Водахъ. Состоитъ врачомъ специалистомъ Максимилиановской Лечебницы Краснаго Креста.

Имѣетъ слѣдующіе печатные труды:

1. О непосредственныхъ и отдаленныхъ результатахъ при хирургическомъ леченіи выпаденія влагалища и матки возстановленіемъ тазового дна. Труды третьяго

Изм.	НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
№	1-го Харьк. Мед. Института

съезда Общества Россійскихъ акушеровъ и гинекологовъ въ г. Кіевѣ.

2. О непосредственныхъ и отдаленныхъ результатахъ хирургическаго леченія полныхъ разрывовъ промежности. Сборникъ трудовъ, посвященный профессору Д. О. Отту по поводу 25-лѣтія его врачебной дѣятельности.

3. Нѣкоторыя сравнительныя статистическія данныя по акушерскому отдѣленію Императорскаго Клиническаго Повивально-Гинекологическаго Института. Тамъ-же.

4. *Über Primär- und Dauerresultate bei completen Dammrissoperationen.* Monatschrift für Gebh. u. Gynaekolog. 1910. Heft 3.

5. *Myorrhaphia partis anterioris m. Levat.-ani (m.m. pubo-coccygei et pubo-rectal.* (Новый вспомогательный методъ возстановленія тазового дна). Докладъ XI Пироговскому Съезду 1910 г. Практическая медицина—Май 1910 года.

6. *Zur Frage des Scheiden und Gebärmuttervorfalls auf Grund von 516 Colpoperinaeorrhaphien operiert in den Jahren 1897—1907 incl.* Труды V международнаго съезда по акушерству и женскимъ болѣзнямъ. СПб. Т. I.

7. Уличные роды. Четыре года клинической жизни Императорскаго Клиническаго Повивально-Гинекологическаго Института. СПб. 1911 года.

8. Темняныя предлежанія. Тамъ-же.

9. Лобныя предлежанія. Тамъ-же.

10. Лицевыя предлежанія. Тамъ-же.

11. Настоящій трудъ: «О непосредственныхъ и отдаленныхъ результатахъ оперативнаго леченія старыхъ разрывовъ промежности, выпаденія влагалища и матки возстановленіемъ тазового дна» представляетъ въ качествѣ диссертациі на степень доктора медицины.