

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

*Всеукраїнської науково-практичної
конференції лікарів-інтернів, присвяченої
105-річчю від дня заснування Полтавського
державного медичного університету*

21 травня 2026 р.



Полтава - 2026

Редакційна колегія

проф. <i>В. Ждан</i>	ректор закладу вищої освіти Полтавського державного медичного університету (головний редактор)
проф. <i>В. Дворник</i>	перший проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи
проф. <i>І. Скрипник</i>	проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти
проф. <i>І. Кайдашев</i>	проректор закладу вищої освіти з наукової роботи
доцент <i>А. Марченко</i>	директор інституту в складі закладу вищої освіти навчально-наукового інституту післядипломної освіти
доцент <i>Г. Давиденко</i>	заступник директора інституту в складі закладу вищої освіти навчально-наукового інституту післядипломної освіти
доцент <i>Л. Шилкіна</i>	заступник директора інституту в складі закладу вищої освіти навчально-наукового інституту післядипломної освіти

Конференція проводиться відповідно до Плану проведення науково-практичних заходів ПДМУ, зареєстрована в УкрІНТЕІ за №241

(82,4%), злоякісні новоутворення (Bethesda V-VI) у 9 пацієнтів (17,6%) випадків, серед яких домінував папілярний рак, включно з мікрокарциномами. У 7 пацієнтів діагностовано інцидентальний рак, не виявлений при ТАБ, що підтверджує обмежену чутливість методу при мультифокальному ураженні. Отримані результати відповідають літературним даним (10-20%) та підкреслюють діагностичні труднощі у категоріях Bethesda III-IV, так як біопсії піддається лише домінантний вузол, тоді як інші вузли залишаються поза морфологічною оцінкою.

Висновки. ТАБ є важливим методом первинної оцінки, однак при багатовузловому зобі її діагностична цінність обмежена. Висока частота інцидентального раку обґрунтовує доцільність тотальної тиреоїдектомії при компресійному синдромі як оптимального лікувально-діагностичного підходу, що забезпечує остаточну морфологічну верифікацію та виключення прихованої злоякісності.

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНOSTI НА ГАСТРОЕНТЕРОКОЛІТИ ВСТАНОВЛЕНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2021-2025 РОКИ

Снітко В., Монакова О.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Чумаченко Т.

Кафедра епідеміології

Харківський національний медичний університет

Актуальність. Гострі кишкові інфекції посідають друге місце в структурі інфекційної захворюваності після грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для розробки ефективних профілактичних заходів з урахуванням регіональних особливостей необхідною умовою є проведення якісного епідеміологічного моніторингу гастроентероколітів встановленої етіології (ГЕК в/е).

Мета. Оцінка захворюваності на ГЕК в/е у Полтавській області за період 2021-2025 рр.

Методи дослідження. Проведено ретроспективний епідеміологічний аналіз даних статистичних звітів ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» за 2021-2025 рр. Дослідження є частиною науково-дослідної роботи, №ДР 0126U002131.

Основні результати. За період 2021-2025 рр. у Полтавській області зареєстровано 4290 випадків ГЕК в/е. Середній багаторічний показник

захворюваності (СБПЗ) склав 63,45 на 100 тис. населення. Найнижчий рівень захворюваності на 100 тис. населення зафіксовано у 2022 р. – 10,70, максимальний у 2023-2024 рр. – 85,97 та 97,80 відповідно. У 2025 р. захворюваність дещо знизилась, проте перевищувала СБПЗ, було зареєстровано 978 випадків (72,31 на 100 тис. населення). В етіологічній структурі випадків у 2025 р. переважали ротавіруси, частка яких сягала 18,5%. Частка кампілобактеріозу та ієрсиніозу склала 0,8% та 0,2% відповідно, 80,5% випадків було спричинено іншими збудниками. За період спостереження встановлена літньо-осіння сезонність із максимальною кількістю випадків у липні-серпні. Аналіз вікової структури захворюваності в середньому показав превалювання частки дорослих (18 р. та старше), питома вага яких склала 38,2 % та дітей 1-4 років, частка яких дорівнювала 31,6%. У професійно-побутових групах зросли частки організованих дітей (питома вага захворілих дошкільнят зросла з 23,1 % у 2021 р. до 32,5% у 2025 р., школярів – з 9,4% у 2021 р. до 17,5% у 2025 р.) та студентів, питома вага яких зросла з 16,8 % у 2021 р. до 17,5 % у 2025 р., за рахунок зменшення частки непрацюючих з 20,7% у 2022 р. до 6,2% у 2025 р. Серед факторів передачі провідну роль відігравали харчові продукти (71,2%) та вода (26,8%). Джерело інфекції не встановлено у 63,3% випадків.

Висновки. Епідеміологічний нагляд за ГЕК в/е потребує покращення. Значна частка дітей 1-4 років серед захворілих ГЕК в/е та домінування ротавірусів у етіологічній структурі збудників обґрунтовує впровадження вакцинопрофілактики ротавірусної інфекції у Полтавській області. Залучення до епідемічного процесу організованих дітей потребує контролю за дотриманням правил біобезпеки у дитячих колективах. Провідна роль харчового та водного шляхів передачі у поширенні збудників ГЕК диктує необхідність посилення санітарно-епідеміологічного нагляду за об'єктами громадського харчування та якістю питної води. Високий відсоток невстановлених джерел інфекції потребує покращення епідрозслідування та впровадження сучасних методів лабораторної діагностики.

41	БРОНХОЛЕГЕНЕВА ДИСПЛАЗІЯ: ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ <i>Пивоваренко А., Кезіна А., Перепьолка М.</i>	57
42	ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДИК ГЕМОСТАЗУ ПРИ ГОСТРИХ КРОВОТЕЧАХ З ВАРИКОЗНО-РОЗШИРЕНИХ ВЕН СТРАВОХОДУ У ПАЦІЄНТІВ З ВНУТРІШНЬ- ОПЕЧІНКОВОЮ ПОРТАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ <i>Присяжний Д.</i>	58
43	ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНАЦІЇ PENG-БЛОКУ З БЛОКАДОЮ ЛАТЕРАЛЬНОГО ШКІРНОГО НЕРВА СТЕГНА ПРИ ТОТАЛЬНОМУ ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА <i>П'ятибратов О., Сенько А., Кузьменко М.</i>	60
44	ОЦІНКА ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО ГОСТРИХ В'ЯЛИХ ПАРАЛІЧІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПЕРІОД 2020-2025 РОКІВ <i>Рева М., Монакова О.</i>	61
45	ХІРУРГІЧНА ПАТОЛОГІЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ <i>Савченко Ю., Сичевська А.</i>	63
46	АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ СУЧАСНОЇ ТЕРАПІЇ <i>Сафонова А.</i>	64
47	ЛІКУВАННЯ ТРАВМИ НИРКИ У ДІТЕЙ <i>Сема Р., Біденко Д.</i>	65
48	ОСОБЛИВОСТІ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ МОЛОДОГО ВІКУ <i>Сидоренко О., Гук Я., Бедрик М., Бурей А., Лень А., Шешеня А.</i>	66
49	ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ТАБ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ГІСТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ БАГАТОВУЗЛОВИМ ЗОБОМ ІІ СТУПЕНЯ З КОМПРЕСІЙНИМ СИНДРОМОМ <i>Сидоренко А.</i>	68
50	РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНOSTІ НА ГАСТРОЕНТЕРОКОЛІТИ ВСТАНОВЛЕНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2021-2025 РОКИ <i>Снітко В., Монакова О.</i>	69