

Серія диссertaцій, допущенихъ къ зашитѣ въ Императорской
Военно-Медицинской Академіи въ 1894—1895 учебномъ году.

№ 48.

БІБЛІОТЕКА

Харьвського Медичн. Інституту

№

Шифр

13-38

7-НОЯ 2012

О ЛЕЧЕБНОМЪ ЗНАЧЕНІИ

ПЕРЕВІРНО

ЯГОДНАГО ХВОЙНИКА

(Ephedra vulgaris).

615.1+615.3

13-38

3252
1947

ДИССЕРТАЦІЯ

НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

Николая Вестенрихъ,

младшаго судового врача 17 флотскаго экипажа.

Цензорами диссертациі, по порученію Конференціи, были: профессора
Ю. Т. Чудновскій, С. А. Прибытень и приватъ-доцентъ В. П. Доброклонскій.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
3252 1-го Харьк. Мед. Института

Переучен
1966 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія А. С. Хомскаго и К°, Литейный проспектъ, № 43.
1895.

64853

3252

1950

Перс. 60

7-ноя 2002

Докторскую диссертацию лекаря Николая Николаевича Вестеррика под заглавіем „О лечебномъ значеніи ягодног хвойника (*erhedra vulgaris*)“ печатать разрѣшается, съ тѣмъ чтобы по отпечатаніи ея 125 экземпляровъ было представлено въ Конференцію ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академіи, а остальные, 375 экземпляровъ—въ академическую бібліотеку.

С.-Петербургъ, 18 Февраля 1895 г.

Ученый Секретарь,

Профессоръ А. Діанинъ.

5381/9

I.

Въ началѣ 70-хъ годовъ въ Бузулукскомъ уѣздѣ, Самарской губерніи, сталъ распространяться слухъ, что крестьянинъ села Виловатаго Федоръ Кузьмичъ Моховиковъ удачно лечитъ отваромъ какой-то травы застарѣлые случаи ревматизма и хроническаго расстройства пищеваренія; что благотворное дѣйствіе его средства испытали не только сосѣди-крестьяне, но также и окрестные помѣщики и купечество изъ города Бузулука.

Послѣ открытія Оренбургской желѣзной дороги, прошедшей въ пяти верстахъ отъ села Виловатаго, извѣстность Кузьмича, какъ привыкли его называть односельчане-крестьяне, стала быстро распространяться за предѣлы Самарской губерніи. Къ нему поѣхали больные со всѣхъ сторонъ Россіи, а въ началѣ 80-хъ годовъ у него нерѣдко бывали иностранные больные — французы, нѣмцы, англичане. Число пассажирскихъ билетовъ, взятыхъ до станціи Марычевки (ближайшей къ селу Виловому), неопровержимо доказываетъ, что къ Кузьмичу изъ одной Самары пріѣзжало больныхъ болѣе 10.000 человекъ въ годъ.

Впослѣдствіи число посѣтителей Кузьмича значительно уменьшилось, такъ какъ онъ отчасти изъ корыстолюбія, отчасти изъ желанія покрыть затраты, сдѣланныя имъ на пріобрѣтеніе и доставку изъ окрест-

ностей г. Уральска травы, сталъ лечить своимъ средствомъ всевозможныя болѣзни, причемъ леченіе его оказалось уже неудачнымъ.

Такъ какъ этотъ замѣчательный знахарь держалъ свое средство въ тайнѣ, то многіе заинтересовались разоблачить ее и тщательно выслѣживали Кузьмича, но все было напрасно.

Только въ 1884 году ученому лѣсоводу Партанскому¹⁾ удалось напасть въ Бузулукскомъ лѣсу на незнакомое растеніе, то самое, которое окрестные крестьяне собирали для Кузьмича.

Это растеніе послѣ ближайшаго ознакомленія съ нимъ Партанскаго оказалось ягоднымъ хвойникомъ. Для опредѣленія рода и семейства Партанскій воспользовался нѣмецкими руководствами, такъ какъ въ русскихъ не помѣшено описанія этого растенія. Благодаря „*Illustrierte deutsche Flora v. Wagner 1882 г.*“ онъ опредѣлилъ семейство Gnetaceae и родъ Ephedra.

Въ капитальномъ сочиненіи Ledebour (*Flora Rossica 1853 г.*) описаны признаки всѣхъ видовъ Ephedrae, водящихся въ Россійской Имперіи; между этими видами найденное въ Бузулукскомъ лѣсу растеніе было опредѣлено, какъ *Ephedra vulgaris var. submonostachya*.

„Ephedra относится къ типу растеній голосѣмянныхъ (gymnospermae), къ ихъ подтипу drupiferae (такъ называемыя ягодныя голосѣмянныя), которыхъ плодъ не шишка, а ложная ягода (drupa), и къ ихъ третьему классу gnetaceae s. gurtaceae (чистохвойниковыя). Къ этому классу относятся три семейства: gnetaceae, ephedraceae и Welwitsziaceae“.

„Ephedraceae (хвойниковыя), какъ и другія Gnetaceae, интересны въ ботаническомъ отношеніи тѣмъ, что составляютъ связующее звено между растеніями

покрытосѣмянными и голосѣмянными (angio- и gymnospermae). Съ покрытосѣмянными они схожи тѣмъ, что имѣютъ въ своей древесинѣ настоящіе сосуды; съ голосѣмянными же хвойниковыя сходны во всемъ остальномъ и особенно въ томъ, что какъ и послѣднія, имѣютъ болѣе чѣмъ двѣ сѣмянодоли и вмѣстѣ съ ними принадлежать къ многосѣмянодольнымъ (polycotyledones)“.

„Названіе трава въ ботаническомъ смыслѣ абсурдно, такъ какъ хвойниковыя суть растенія безлистные. Это небольшіе кустики, похожіе на хвощи, имѣютъ тонкіе и длинныя членистыя стебли и вѣтви, лишенные листьевъ, но покрытыя хлорофильнымъ зеленымъ слоемъ, который служитъ для дыханія ихъ, замѣняя листья; листья же ихъ атрофированы, очень малы, превращены въ двузубыя чешуйки — иглы. Слизистыя сладковатыя съѣдобныя ягоды (ложная ягода — drupa) этихъ кустикавъ употребляютъ въ пищу, особенно плоды *Ephedra monostachya* — степной малины Сибири, которую очень любятъ киргизы и калмыки“.

„Изъ двадцати извѣстныхъ видовъ Ephedraceae въ сѣверномъ полушаріи живутъ только четыре ихъ вида, притомъ большею частью въ восточномъ полушаріи, а именно: *Ephedra maritima* (щетинолистникъ), *Ephedra monostachya* (малинникъ, степная малина Сибири и западной Азіи), *Ephedra distachya* (наседникъ, горный хвойникъ Южной Европы) и *Ephedra vulgaris* (хвойникъ ягодный, Кузьмичева трава Самарской и Саратовской губерній)“²⁾.

Сычевъ³⁾ считаетъ болѣе вѣроятнымъ, что описываемые виды хвойника суть разновидности, такъ какъ онъ не нашолъ въ существующихъ ботаническихъ источникахъ достаточныхъ данныхъ для раз-

сматриванія видовъ хвойника какъ видовъ. Онъ описывается также на мѣнѣе профессора И. И. Горожанкина, который въ личномъ съ нимъ разговорѣ высказался, что означенныя видовыя названія не должны выражать собою ничего, кромѣ указанія на различіе мѣстности произрастанія растенія.

Авторъ думаетъ, что это подтверждается существованіемъ массы народныхъ названій хвойника въ зависимости отъ мѣста родины, таковы: калмыцкая малина, калмыцкій ладанъ, конскій хвостъ, хвойникъ ягодный, стоузелникъ, насѣдникъ, стѣнникъ, бирючьи ягоды, джоризъ-дена (Грузія), чергакъ (Арменія), катырь-койрухъ (Мингрелія).

Хвойникъ имѣетъ многолѣтній, деревянистый корень, безъ замѣтныхъ годичныхъ слоевъ, проникающій глубоко въ почву въ вертикальномъ направленіи; изъ вершины корня лучеобразно расходятся во всѣ стороны подземныя корневища, схожія по виду съ корнями сарсапарилы. Изъ корневищъ поднимаются надъ поверхностью земли пучки тонкихъ цилиндрическихъ, суставчатыхъ стебельковъ съ немногими супротивными, прижатыми къ стеблю вѣтками. Самые развитые стебли достигаютъ одного фута вышины.

Хвойникъ растеніе двудомное; онъ цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ и даетъ красныя шаровидныя ложныя ягоды. Онъ не слишкомъ разборчивъ на составъ почвы: такъ онъ растетъ и на песчаныхъ пригоркахъ и на лобовинахъ каменистыхъ горъ, гдѣ почва сплошь состоитъ изъ известковой гальки, еле связанной мергелисто-черноземнымъ суглинкомъ. Растеніе это не боится засухъ и обладаетъ способностью снова отрастать отъ горизонтальныхъ корневищъ, даже въ томъ случаѣ, когда всѣ надземныя зеленныя части растенія будутъ оборваны.

До начала XVII столѣтія растеніе это не носило настоящаго названія и описывалось различными учеными подъ именами *Equisetum* (хвощъ), *Polygonum bacciferum* (горецъ), *Uva marina* и т. п. Родъ *Ephedra* былъ окончательно установленъ Tournefort'омъ (1703 г.) и принятъ Linné'емъ (*Genera plantarum* 1737 г.).

Изъ сообщенной Г. А. Десятовымъ „Вѣстнику Общественной Гигіены“ выписки изъ Академическихъ извѣстій 1780 г. ³⁾ видно, что докторъ Эрихъ, путешествовавшій между калмыками по порученію Академіи Наукъ, между прочимъ узналъ отъ нихъ, что они лечатъ ломоту степной малиной (*Ephedra monostachya*). Крѣпкій отваръ стеблей этого растенія они пьютъ большими приемами, причемъ послѣ перваго же приема наступаетъ пототдѣленіе и облегченіе болей.

Pieger въ 1842 году въ своемъ лексиконѣ ⁴⁾ упоминаетъ о двухъ видахъ рода *Ephedra*: 1) *monostachya* со съѣдобными ягодами, произрастающемъ въ Сибири и на Дону, и 2) *distachya*, растущемъ на скалахъ и на пескѣ около Средиземнаго моря. Онъ говоритъ, что листья и сережки (*Kätzchen*) обоихъ видовъ были нѣкогда оффициальнымъ препаратомъ.

Krebel ⁵⁾ говоритъ, что противъ кашля и вообще при грудныхъ болѣзняхъ калмыки употребляютъ кашлицу, приготовленную изъ сока ягодъ *Ephedra monostachya*.

Meyer ⁶⁾, который въ своемъ сочиненіи подробно описываетъ ботаническіе признаки и свойства хвойника, говоритъ, что отваръ хвойника вызываетъ потъ, для усиленія котораго больного кладутъ въ постель и накрываютъ теплымъ одѣяломъ.

Во Франціи сокъ плодовъ *Ephedra distachya* считается полезнымъ при тифѣ; зеленые стебли и

спѣлыя ягоды въ видѣ отвара употребляются при дизентеріи. Бурятскіе знахари пользуются въ Сибири большою извѣстностью,—къ нимъ обращаются больные, одержимые упорными хроническими болѣзнями. При леченіи ревматизма и катарровъ буряты употребляютъ отваръ хвойника.

Эти послѣднія свѣдѣнія объ употребленіи хвойника приводить въ своей брошюрѣ Портанскій, не указывая литературныхъ источниковъ, изъ которыхъ онъ ихъ заимствовалъ.

Отецъ Федора Кузьмича Моховикова вывезъ это средство изъ Сибири и передалъ своему сыну.

Знахарь Кузьмичъ для изготовленія своего лекарства беретъ не только стебли, но и корнища растенія, варить траву долгое время въ котлахъ, затѣмъ крѣпкій бураго цвѣта отваръ разбавляетъ по вкусу водою и заправляетъ „на глазъ“ мятнымъ масломъ. Больныхъ онъ снабжаетъ четвертными бутылками лекарства и предписываетъ имъ не пить водки и вина во время леченія и принимать отваръ по $\frac{1}{2}$ или по цѣлой рюмкѣ 3—4 раза въ день, лучше за полчаса до принятія пищи.

Первое клиническое изслѣдованіе ягоднаго хвойника произвелъ д-ръ Бѣхтинъ ¹⁾ въ клиникѣ профессора Л. В. Попова въ 1891 году.

Средство это онъ примѣнялъ въ видѣ настое-отвара, который приготавливалъ изъ стеблей и корневищъ растенія, настаивая продолженіе 12 часовъ и затѣмъ уваривая настой втеченіе столькихъ же часовъ. Приготовленный такимъ образомъ отваръ (отвѣчающій приблизительно *infuso—decocto* изъ $\frac{1}{2}$ на $\frac{3}{4}$ *colaturae*) онъ давалъ черезъ два часа по столовой ложкѣ 16 больнымъ.

„Самый рѣзкій эффектъ получился при остромъ

суставномъ и мышечномъ ревматизмѣ. Уже на другой день послѣ полученія лекарства боли становились значительно меньше; пульсъ и дыханіе, приобретаая въ силѣ, становились рѣже; температура падала обыкновенно на 5—6-ой день заболѣванія, опухоль суставовъ пропадала, и спустя какую-нибудь недѣлю—полторы больные чувствовали себя совершенно здоровыми. Обыкновенно на 3—4-ый день пользованія этимъ средствомъ количество мочи у этихъ больныхъ начинало съ каждымъ днемъ становиться все больше и больше“.

„Такой же хорошій, но не настолько рѣзкій и быстрый результатъ получился при хроническомъ суставномъ и мышечномъ ревматизмѣ“. „Случаи съ сѣдалищной невралгіей и ревматической остеоміаліей дали только небольшое и временное улучшеніе“.

Кромѣ того авторъ замѣтилъ усиливающее кишечную перистальтику дѣйствіе средства.

По ходатайству Медицинскаго Департамента передъ Г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія образованы были во всѣхъ русскихъ Университетахъ коммисіи изъ гг. профессоровъ для рѣшенія вопроса, оправдывается ли клиническими наблюденіями столь широкое распространеніе въ публикѣ ягоднаго хвойника. Это ходатайство было вызвано чрезчуръ настойчивымъ рекламированіемъ травы услужливыми торговцами.

Изъ Московскаго Университета дали отзывъ гг. профессоры Остроумовъ, Филатовъ и Павлиновъ.

Профессоръ Остроумовъ ²⁾ назначалъ отваръ хвойника изъ 4,0 на сутки или 3—4 приѣма въ день жидкой вытяжки въ шести случаяхъ пораженія суставовъ, двухъ случаяхъ катарра толстыхъ кишокъ съ запоромъ и четырехъ случаяхъ нервной диспепсіи желудка.

Кромѣ одного случая отваръ переносился желудкомъ хорошо, но на диспепсію дѣйствіе было или слабое или никакого; послабляющее дѣйствіе отвара замѣчено въ двухъ случаяхъ; на припадки острого и хроническаго суставнаго ревматизма отваръ не оказывалъ замѣтнаго дѣйствія. Въ одномъ случаѣ подостраго суставнаго ревматизма уменьшились боли, но прошли лишь при назначеніи салициловаго натра. На основаніи своихъ наблюденій профессоръ пришолъ къ заключенію, что хвойникъ средство невѣрное, хотя повидимому и безвредное.

Профессоръ Филатовъ²⁾ испытывалъ жидкую вытяжку хвойника въ трехъ случаяхъ хроническаго катара тонкихъ кишокъ и въ двухъ случаяхъ привычнаго запора вслѣдствіе атоніи кишечника, — всѣ пять случаевъ у маленькихъ дѣтей. Вытяжка, даваемая втеченіе двухъ недѣль, отъ полъ до чайной ложки нѣсколько разъ въ день, переносилась хорошо, но желательнаго дѣйствія не оказала ни разу.

Профессоръ Павлиновъ³⁾ давалъ жидкую вытяжку хвойника въ одиннадцати случаяхъ, куда относятся четыре случая острого, четыре подостраго суставнаго ревматизма, остальные три случая порокъ сердца и диспепсія. Вытяжку онъ давалъ отъ 4 до 6 чайныхъ ложекъ въ день втеченіе 3—30 сутокъ, вмѣстѣ съ тѣмъ примѣнялъ другія средства — содержаніе въ теплѣ, мушки, іодъ, ванны, наркотическія. Въ одномъ упорномъ случаѣ ревматизма вначалѣ боли уменьшились отъ хвойника, но дальнѣйшаго улучшенія не послѣдовало, такъ-что пришлось обратиться къ салициловому натру. Еще въ двухъ случаяхъ можно было отмѣтить улучшеніе отъ хвойника. На основаніи своихъ изслѣдованій профессоръ пришолъ къ выводу, что лекарственное значеніе хвойника ничтожно.

Профессоръ Оболенскій⁴⁾ въ Харьковѣ много разъ назначалъ ягодный хвойникъ больнымъ съ острымъ и хроническимъ суставнымъ ревматизмомъ, но никогда не наблюдалъ замѣтно хорошаго дѣйствія. Какъ stomachicum хвойникъ приноситъ пользу, но не имѣетъ преимущества передъ другими подобными средствами.

Профессоръ Засѣцкій⁵⁾ въ Казани примѣнялъ настоенно-отваръ ягоднаго хвойника въ нѣсколькихъ случаяхъ острого и хроническаго суставнаго ревматизма. При хроническомъ ревматизмѣ онъ ни разу не видѣлъ рѣшительно никакого дѣйствія; при острыхъ формахъ хвойникъ оказался повидимому полезнымъ въ смыслѣ ослабленія болей и уменьшенія опухшихъ суставовъ, но въ этомъ отношеніи онъ уступаетъ салициловому натру. Исправленія запоровъ отъ употребленія хвойника профессоръ ни разу не видѣлъ, иногда при употребленіи этой травы онъ наблюдалъ появленіе поноса съ болями въ животѣ.

Профессоръ Левашовъ⁶⁾ не могъ убѣдиться въ дѣйствіи хвойника ни на суставной острый и хроническій, ни на мышечный ревматизмъ; въ нѣсколькихъ случаяхъ онъ наблюдалъ нѣкоторое улучшеніе аппетита и благопріятное дѣйствіе на перистальтику кишокъ въ смыслѣ временнаго устраненія запора.

Профессоръ Образцовъ⁷⁾ въ Кіевѣ давалъ отваръ ягоднаго хвойника изъ 20,0 на 200,0 воды по 3—6 столовыхъ ложекъ въ день восьми больнымъ: въ трехъ случаяхъ острого и двухъ хроническаго суставнаго ревматизма, въ двухъ случаяхъ хроническаго мышечнаго ревматизма и въ одномъ случаѣ брюшной водянки вслѣдствіе отвердѣнія (cirrhosis) печени.

Только въ одномъ случаѣ мышечнаго ревматизма замѣчено слабое дѣйствіе отвара въ видѣ уменьшенія

более; во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ вліянія его на температуру тѣла, припуханіе и боль въ суставахъ, мышечныя боли, дыханіе, пульсъ, мочеотдѣленіе и стулъ не обнаружено. Изъ этихъ наблюдений профессоръ дѣлаетъ выводъ, что лечебное дѣйствіе хвойника довольно слабое и не стоитъ соотвѣтствію съ его огромнымъ распространеніемъ.

Профессоръ Л. В. Поповъ¹¹⁾, кромѣ вышеупомянутой работы Бѣхтина изъ его клиники, произвелъ еще семь наблюдений.

„Изъ семи случаевъ полиартрита два были осложнены сторонними процессами; въ нихъ дѣйствіе хвойника были одинаково безуспѣшно, какъ и другихъ противоревматическихъ средствъ. Въ одномъ случаѣ ревматическій полиартритъ былъ осложненъ воспаленіемъ серозныхъ—плевры, перикардія и эндокардія, и въ немъ какъ хвойникъ, такъ и другія противоревматическія средства оказывали весьма малый эффектъ“.

„Въ двухъ случаяхъ остраго ревматическаго полиартрита эффектъ отъ хвойника былъ блистательный и быстрый, при этомъ въ одномъ изъ нихъ были испробованы прежде съ неудовлетворительнымъ результатомъ многія обычныя противоревматическія средства. Въ одномъ остромъ полиартритѣ эффектъ отъ хвойника былъ нерѣшительный, хотя замѣтный въ благопріятномъ направленіи. Въ одномъ подостромъ полиартритѣ боли значительно уменьшились, температура понизилась, моча значительно прибавилась въ своемъ количествѣ (это наблюдалось и въ другихъ подобныхъ случаяхъ) и содержаніе бѣлка въ ней уменьшилось“.

По заключенію профессора хвойникъ при ревматическомъ воспаленіи суставовъ и мышцъ имѣетъ серьезное лечебное значеніе.

Очевидно, что съ цѣлью выяснитъ то или другое значеніе ягоднаго хвойника для медицины, необходимо было произвести возможно большее число наблюдений и такимъ путемъ исключить вліяніе тѣхъ случайностей, которыя нерѣдко служили поводомъ сначала къ быстрому распространенію многихъ уже средствъ, а затѣмъ къ быстрому же ихъ забвенію.

Въ этихъ видахъ профессоръ Ю. Т. Чудновскій предложилъ мнѣ заняться изученіемъ этого средства.

Я съ удовольствіемъ воспользовался предложеніемъ и употребилъ всѣ старанія, чтобы быть безпристрастнымъ наблюдателемъ и подойти возможно ближе къ рѣшенію вопроса о пригодности для медицины ягоднаго хвойника. Съ этою цѣлью я занялся химическимъ изслѣдованіемъ ягоднаго хвойника и одновременно испытывалъ дѣйствіе отвара изъ него на больныхъ.

II.

Такъ какъ химическій составъ ягоднаго хвойника былъ изслѣдованъ уже нѣкоторыми авторами, то интересно познакомиться съ полученными данными.

Въ 1887 году профессоръ Nagai¹²⁾ въ Токио открылъ въ разновидности ягоднаго хвойника *Erhedra vulgaris* var. *helvetica* жидкій кислородъ содержащій алкалоидъ и назвалъ его эфедриномъ. Послѣ этого нѣсколько химиковъ и фармацевтовъ занялись химическимъ изслѣдованіемъ хвойника.

Полный анализъ травы сдѣлалъ магистръ Шперъ¹³⁾ въ лабораторіи профессора Драгендорфа. Онъ работалъ надъ другимъ видомъ хвойника, полученнаго имъ сначала изъ Екатеринослава, затѣмъ изъ Тифлиса, *Erhedra manostachya*, но такъ какъ виды хвойника

научно не разграничены³⁾, то результаты изслѣдованія Шпера заслуживаютъ полнаго вниманія.

Порошокъ хвойника, по словамъ Шпера, обработанный различными растворителями, отдаетъ имъ слѣдующія количества вещества. Петролейный эфиръ извлекаетъ изъ травы 2,19%, изъ корней 0,76%. Эта вытяжка содержитъ небольшое количество эфирнаго масла (0,5%), улетучивающагося при 110° Ц., остальное представляетъ смѣсь растительнаго воска съ жиромъ; температура плавленія смѣси 58° Ц.

Сѣрный эфиръ послѣ предварительной обработки травы петролейнымъ эфиромъ извлекаетъ изъ нея 1,36%, изъ корней 0,075%, причемъ изъ травы вмѣстѣ съ другими веществами извлекается и часть алкалоида; вытяжка изъ корней никакихъ реакцій на содержаніе алкалоида не давала.

Послѣдовательно примѣненный абсолютный спиртъ извлекаетъ изъ травы 11,02%, изъ корней 6,199% вещества. Въ этомъ числѣ вытяжка травы содержитъ до 5% дубильной кислоты, повидимому новой, не подходящей по свойствамъ ни къ одной изъ пока извѣстныхъ. Кромѣ того сѣрный эфиръ извлекалъ изъ нея пирокатехинъ, количество котораго съ точностью не определено.

Составъ спиртной вытяжки корней ближе не изслѣдованъ, но во всякомъ случаѣ въ ней не содержится замѣтныхъ количествъ физиологически дѣйствующихъ веществъ.

Извлеченіе водою необработаннаго ничѣмъ порошка травы указало на содержаніе въ немъ 18,52% и въ корняхъ 10,08% вещества, въ которомъ найдены растительная слизь и сахаръ, а въ корняхъ крахмалъ.

Вмѣстѣ съ другими веществами изъ травы переходитъ въ водный растворъ и алкалоидъ.

Шперъ убѣдился въ присутствіи послѣдняго, извлекая порошокъ растенія водою въ 40° Ц., подкисленную уксусною кислотой, причемъ сгущенная вытяжка освобождалась отъ слизи прибавленіемъ большого количества спирта, подщелачивалась амміакомъ и извлекалась различными растворителями. Хлороформъ и эфиръ дали безформенные, бурые осадки, заключавшіе слѣды плохо образованныхъ кристалловъ, и только многократное перекристаллизованіе изъ эфира дало болѣе чистую кристаллическую массу. Эти остатки въ кислотѣ водномъ растворѣ давали съ наиболѣе употребительными реактивами на алкалоидъ явныя помутненія, яркаго окрашиванія ни одинъ реактивъ не давалъ.

Для полученія алкалоида Шперъ извлекалъ отвѣшенныя количества травы и корней при 40° Ц. спиртомъ 80°, примѣняя на одну часть сухого порошка четыре части спирта; извлеченіе продолжалось по восьми дней и повторялось нѣсколько разъ. Соединенныя спиртовые вытяжки соотвѣтственныхъ частей растенія были освобождены отъ спирта перегонкой при уменьшенномъ давленіи и температурѣ 70° Ц. (изъ опасенія разрушить алкалоидъ) и разбавлены водою для выдѣленія смолы. Полученныя жидкости, имѣвшія кислую реакцію, вначалѣ извлекались эфиромъ (причемъ изъ травы полученъ пирокатехинъ, а изъ корней незначительный аморфный остатокъ), затѣмъ подщелочены содою и вновь извлекались эфиромъ до прекращенія окрашиванія послѣдняго.

Послѣ отгонки эфира корень далъ незначительный безформенный осадокъ, не содержащій алкалоида, а трава дала въ осадкѣ окрашенную массу, пронизанную кристаллами. Очищеніе алкалоида отъ смолистой примѣси стоило многихъ трудовъ и удалось

только путем многократнаго растворенія перваго (алколоида) въ эфирѣ и прибавленія петролейнаго эфира, причемъ часть смолы выдѣлялась въ видѣ хлопьевъ; смѣсь того и другаго эфира отгонялась, кристаллическая масса растворялась въ разведенной соляной кислотѣ и перекристаллизовывалась.

Соляно-кислое соединеніе разлагалось содою и свободное основаніе растворялось въ эфирѣ, изъ котораго алкалоидъ выдѣлялся въ видѣ бѣлыхъ, одноклиномѣрныхъ столбиковъ. Выходъ былъ невеликъ и послѣ очищенія получился около 2 граммъ, что отъвѣчало 0,03% содержанія въ травѣ чистаго алкалоида.

Далѣе Шперъ сжегъ свой алкалоидъ и вывелъ формулу для него $C^{13}H^{10}NO$; затѣмъ получилъ кристаллическія соединенія съ золотомъ, платиною и галлоидами. Хлористо-водородное соединеніе представляетъ гексагональные столбики, въ спиртѣ и водѣ весьма легко растворимо, въ эфирѣ, хлороформѣ и бензолѣ съ трудомъ; точка плавленія $207^{\circ} C.$, тогда какъ свободнаго алкалоида $112^{\circ} C.$ Отношенія алкалоида къ реактивамъ мало характерно. Растворенный въ подкисленной водѣ (1:500) онъ даетъ желтоватые осадки или муть съ іодистымъ калиемъ—висмутомъ, іодистымъ калиемъ—ртутью, іодистымъ калиемъ—кадмиемъ, фосфорномолибденовою кислотою, фосфорновольфрамовою и пикриновою кислотами, съ іодомъ въ іодистомъ калии.

Этотъ алкалоидъ обладаетъ весьма слабымъ физиологическимъ дѣйствіемъ, чѣмъ отличается отъ эфедрина Nagai. Послѣдній разнится и въ другихъ отношеніяхъ: такъ онъ имѣетъ точку плавленія $210^{\circ} C.$, тогда какъ солянокислая соль его, кристаллизующаяся въ иглахъ, плавится при $216^{\circ} C.$; кромѣ того самая формула его строенія выражается иначе ($C^{13}H^{10}NO$).

Физиологическое дѣйствіе эфедрина на организмъ изслѣдовано студентомъ Kinnosuke Miura. "1) 10% растворъ солянокислаго эфедрина рекомендуется имъ въ качествѣ расширяющаго зрачокъ средства.

У 18 лицъ, изслѣдованныхъ въ этомъ направленіи, уже черезъ 40—60 минутъ послѣ впусканія 1—2 капель раствора наступало сильное расширеніе зрачковъ, продолжавшееся 5—20 часовъ безъ одновременнаго паралича аккомодациі или какихъ-либо другихъ побочныхъ явленій; внутриглазное давленіе не измѣняется; при раздраженіи радужной оболочки дѣйствія не происходятъ. Miura предполагаетъ, что это средство можетъ съ успѣхомъ замѣнить гоматропинъ.

При впрыскиваніи солянокислой соли подъ кожу въ количествѣ 8—10 мгрм. средней величины лягушкѣ наступало замедленіе, а позднѣе остановка сердцебіенія и дыханія; у млекопитающихъ (собака и кроликъ) наступаетъ вначалѣ учащеніе сердцебіенія и дыханія, затѣмъ внезапная остановка ихъ при обшихъ судорогахъ и повышеніи температуры въ прямой кишкѣ; зрачки рѣзко расширяются. Смертельная доза для кролика 0,3—0,5 граммъ, а для собаки 0,22 граммъ на кило.

Другое изслѣдованіе въ томъ же направленіи принадлежитъ д-ру Inoue "2) въ Токио.

Профессоръ Кобертъ "3) въ Юрьевѣ производилъ опыты надъ животными съ солянокислымъ эфедриномъ Nagai. Приѣмъ внутрь 0,2 грамма вызывалъ у кошекъ и собакъ рѣзкіе припадки отравленія: у животныхъ сначала появлялось сильное возбужденіе и судороги, затѣмъ наступала вялость, и лишь весьма медленно оно оправлялось; глаза въ первомъ періодѣ отравленія далеко выступали изъ глазницъ, причемъ зрачки были чрезмѣрно расширены.

17
3252
НАУЧН. БИБЛИОТЕКА
1-го Харьк. Мед. Института

64253

БИБЛИОТЕКА
Харьковского Медицинскаго Института
М. 1624
8-38

1936
ЕРЕВАН

Какъ Шперъ, такъ и Nagai имѣли возможность приготовить лишь незначительное количество алкалоида. Въ большихъ размѣрахъ эта работа была произведена на химическомъ заводѣ Merck въ Дармштатѣ. Свойства полученнаго на заводѣ алкалоида (псевдоэфедрина) изслѣдованы химиками Ladenburg'омъ и Oelschlägel'емъ ¹⁰⁾.

Для получения псевдоэфедрина порошокъ растенія *Ephedra vulgaris* извлекаютъ спиртомъ, спиртъ отгоняютъ, къ остатку прибавляютъ амміаку и извлекаютъ его хлороформомъ; остающійся послѣ отгонки послѣдняго алкалоидъ превращаютъ въ солянокислую соль и очищаютъ многократной перекристаллизацией изъ смѣси спирта съ эфиромъ. Солянокислая соль образуетъ безвѣтвистыя мелкія иглы, легко растворимыя въ водѣ и спиртѣ, и имѣетъ составъ $C_{10}H_{15}NOHCl$; точка плавленія ея при 174° Ц.

Свободный алкалоидъ получается изъ эфира въ видѣ красивыхъ, удобоизмѣримыхъ кристалловъ, которые плавятся при 114° — 115° Ц. и обладаютъ слабымъ, но весьма приятнымъ запахомъ. При окисленіи хамелеономъ эфедринъ Merck, какъ и Шпера, одинаково даютъ бензойную кислоту. Filehne ¹¹⁾ изслѣдовалъ молекулярное строеніе псевдоэфедрина и нашелъ возможнымъ выразить его формулою $\begin{matrix} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{NH} \\ | \\ \text{C}(\text{OH})\text{C}_2\text{H}_5 \end{matrix}$.

Относительно фізіологическаго дѣйствія псевдоэфедрина есть работа изъ лабораторіи доктора Albertoni въ Болоньѣ—дра de Vriese ¹²⁾. При впусканіи въ глазную мѣшокъ раствора солянокислой соли происходитъ постепенное расширеніе зрачка, которое продолжается 6—9 часовъ и медленно проходитъ. Важно то, что это средство не вызываетъ ни воспаленія, ни

измѣненія въ рефракціи и аккомодации. De Vriese полагаетъ, что расширеніе зрачка происходитъ вслѣдствіе легкаго пареза окончаній глазодвигательнаго нерва и полнаго паралича сужающихъ зрачокъ мышцъ.

Günsburg ¹³⁾ говоритъ, что объясненіе de Vriese стоитъ въ явномъ противорѣчій съ заявленіемъ его о неизмѣняемости аккомодации. Онъ самъ (Günsburg) изслѣдовалъ средство въ клиникѣ профессора Magnus на 120 лицахъ, примѣняя 10, 15, 20 и 25% растворы, и дѣлалъ опыты на животныхъ. Изъ опытовъ слѣдуетъ, что расширеніе зрачка происходитъ вслѣдствіе возбужденія сочувственнаго нерва; одновременно происходитъ сокращеніе сосудовъ соединительной оболочки при 10—15% растворѣ; при 20—25% растворѣ наоборотъ сосуды расширяются. Изъ 120 больныхъ у 96 ближайшая точка не измѣнилась, у остальныхъ она нѣсколько удалась.

Профессоръ Догель ⁹⁾ изслѣдовалъ дѣйствіе того же алкалоида. Введеніе 2% воднаго раствора солянокислой соли на соединительную оболочку вѣка собаки и кошки вызываетъ спустя 15 минутъ значительное, хотя не до maximum'a расширеніе зрачка, продолжающееся 6 часовъ.

Раздраженіе головного отрѣзка сочувственнаго нерва на шеѣ обуславливаетъ при этомъ расширеніе зрачка до maximum'a. Причиною этого расширенія авторъ считаетъ ослабленіе дѣятельности глазодвигательнаго нерва на суживающую мышцу зрачка.

Послѣ введенія $\frac{1}{2}$ куб. см. 2% раствора подъ кожу лягушкѣ получается замедленіе сердцебіенія и позднѣе остановка сердца въ діастолѣ; нѣчто подобное наблюдается у млекопитающихъ. Профессоръ пришло къ выводу, что солянокислый псевдоэфедринъ ослабляетъ дѣятельность блуждающаго нерва и сосу-

двигательнаго центра. Опыты надъ лягушкой и собакой съ настоен-отваромъ изъ ягоднаго хвойника имѣють большое сходство по отношенію измѣненій въ кровообращеніи съ дѣйствіемъ алкалоида.

Послѣ обнародованія изслѣдованій Ladenburg'a и Oelschlägel'я Merck²⁰⁾ выдѣлили изъ ягоднаго хвойника (*var. helvetica*) алкалоидъ, тождественный съ полученнымъ впервые Nagai эфедриномъ и изслѣдовали его химически. Выдѣленный по способу Шпера и извлеченный эфиромъ алкалоидъ представлялъ кристаллическую массу, которая не разрушаясь кипѣла при 255° Ц., тогда какъ солянокислая соль его, кристаллизовавшаяся въ бѣлыхъ иглахъ, плавилась при 214—215° Ц. Merck же получилъ хорошо кристаллизующіяся соединенія алкалоида съ золотомъ, платиною и ртутью.

Кромѣ упомянутыхъ авторовъ, связавшихъ свое имя съ эфедриномъ, химическое изслѣдованіе ягоднаго хвойника производилось еще въ Московскомъ Фармакологическомъ Институтѣ. Оно было направлено главнымъ образомъ на полученіе алкалоида, физиологическое дѣйствіе котораго затѣмъ испытывалось на животныхъ.

Способъ, употреблявшійся лаборантомъ Ижевскимъ, представлялъ сочетаніе способовъ Шпера и Ladenburg'a. Алкалоидъ кристаллизовался изъ эфира въ длинныхъ иглахъ; послѣ нѣсколькихъ перекристаллизаций и очистки эфедринъ получился въ видѣ бѣлыхъ довольно толстыхъ столбиковъ; точка плавленія его оказалась равною 114° Ц., т. е. лежитъ между точками плавленія, данными Шперомъ и Ladenburg'омъ.

Такъ какъ при небольшомъ количествѣ выдѣленнаго алкалоида невозможно ручаться за чистоту его,

и такъ какъ у другихъ изслѣдователей кромѣ Merck'a было тоже мало вещества, то профессоръ Богословскій²⁾, сообщавшій объ этой работѣ, полагаетъ, что указанныя отличія происходили отъ нечистоты препарата, и что всѣми изслѣдователями въ сущности полученъ одинъ и тотъ же алкалоидъ. Химическое изслѣдованіе Ижевскаго еще не закончено.

Для физиологическихъ опытовъ профессоръ Богословскій бралъ солянокислый эфедринъ Merck'a и приготовленія Ижевскаго, а также водную вытяжку (*extractum spissum* 2-ой степени) хвойника.

Какъ при введеніи вытяжки въ желудокъ собаки и впрыскиваніи алкалоида (въ количествѣ 0,001—0,005 грм. солянокислой соли на кило вѣса животнаго) подъ кожу, такъ и при введеніи этихъ препаратовъ прямо въ сосуды получилось одно и тоже дѣйствіе. Вначалѣ учащеніе дыханія съ удлинениемъ выдоха, нѣкоторое пониженіе кровяного давленія и учащеніе сердцебиенія, затѣмъ замедленіе дыханія и сердцебиенія до половины первоначальной величины и повышеніе кровяного давленія, наконецъ возвращеніе сокращеній сердца къ нормѣ или даже вторичное учащеніе ихъ; при этомъ рѣзкое расширеніе зрачковъ, слюноотеченіе и тошнота, особенно при введеніи въ желудокъ, и общее угнетенное состояніе. Черезъ нѣкоторое время животное оправлялось, даже при введеніи большихъ дозъ; смертельнаго отравленія достигнуть не удалось.

Замедленіе пульса, по мнѣнію профессора, зависитъ отъ возбужденія аппарата блуждающаго нерва въ сердцѣ, а повышеніе кровяного давленія—отъ возбужденія сосудодвигательнаго центра, но главнымъ образомъ отъ усиленія работы самой сердечной мышцы. Расширеніе зрачковъ профессоръ приписываетъ возбужденію нервныхъ окончаній сочувственнаго нерва.

На основаніи своихъ опытовъ профессоръ причисляетъ ягодный хвойникъ къ группѣ сердечныхъ средствъ 2-го порядка, представителемъ которыхъ служитъ кофеинъ. Онъ полагаетъ, что этими свойствами алкалоида можно объяснить необычайный успѣхъ, которымъ пользовался знахарь Кузьмичъ; неудачные результаты, полученные клиницистами, по мнѣнію профессора, происходили отъ примѣненія слишкомъ малыхъ дозъ.

По поводу этого послѣдняго заключенія профессора можно сказать, что дозы, примѣнявшіяся у постели больныхъ изслѣдовавшими хвойникъ клиницистами, не отличались отъ дозъ, которыя давалъ своимъ больнымъ докторъ Бѣхтинъ; далѣе, профессоръ Образцовъ примѣнялъ средство въ гораздо болѣе крѣпкихъ отварахъ, и наконецъ, какъ выяснится изъ дальнѣйшаго изложенія, мнѣ удалось испытать на больныхъ отвары, крѣпость которыхъ превосходила всѣ до сихъ поръ изслѣдованные на людяхъ отвары.

Этими изслѣдованіями вопросъ объ эфедринѣ еще не исчерпанъ. Такъ въ Варшавскомъ Университетѣ производится анализъ надъ большимъ количествомъ ягоднаго хвойника профессоромъ Давыдовымъ, однако это изслѣдованіе еще не закончено.

III.

При изученіи лечебныхъ свойствъ ягоднаго хвойника у постели больного, мнѣ было интересно провѣрить добытыя уже данныя относительно химическаго состава травы и опредѣлить хотя приблизительно, какое количество физиологически дѣйствующаго вещества алкалоида можетъ переходить въ лекарственный приемъ средства.

Съ этою цѣлью мною произведено въ химической лабораторіи Кронштадтскаго Морского Госпиталя систематическое изслѣдованіе *Ephedra vulgaris*. Не буду говорить о способѣ изслѣдованія, такъ какъ я придерживался способовъ, употребляемыхъ въ лабораторіи Драгендорфа, которымъ слѣдовалъ и Шперъ.

Изъ 20 граммъ сухого порошка зеленыхъ частей растенія петролейный эфиръ извлекалъ 1,68% вещества, плавившагося при 61° Ц. и состоявшаго главнымъ образомъ изъ воска. Количество содержавшагося въ этомъ остаткѣ эфирнаго масла опредѣлилось въ 0,12%. Обыкновенный эфиръ, послѣдовательно примѣненный, извлекалъ изъ той же порціи 1,22% вещества. Водная поокисленная вытяжка изъ эфирной вытяжки съ реактивами на алкалоидъ не дала ни мути, ни осадковъ; точно также въ ней не оказалось и слѣдовъ глікозида.

Спиртъ въ 95° извлекалъ изъ той же порціи, обработанной петролейнымъ и обыкновеннымъ эфиромъ, 11,22% сухого остатка, въ которомъ содержалось 10,99% органическаго вещества; въ водный растворъ перешло изъ спиртной вытяжки 3,65% вещества. Всѣ эти данныя провѣрялись нѣсколько разъ.

Порція сухого порошка растенія въ 103,5 граммъ извлекалась водянымъ паромъ, который охлаждался въ холодильникѣ, и водный перегонъ тщательно извлекался посредствомъ взбалтыванія съ петролейнымъ эфиромъ. Послѣ выпариванія послѣдняго при обыкновенной температурѣ получилось желтое съ ароматическимъ запахомъ эфирное масло, содержаніе котораго, перечисленное на 100 граммъ травы, оказалось равнымъ 0,133 граммъ, т. е. согласно первому опредѣленію, произведенному другимъ способомъ. Въ перегонной водѣ испытывалось присутствие салициловой и бензойной кислотъ съ отри-

пательнымъ результатомъ. Съ растворомъ брома въ хлороформѣ эфирное масло не дало окрашиванія.

Водная вытяжка изъ спиртной вытяжки при испытаніи на алкалоидъ дала бурые осадки съ реактивами Erdmann'a, Fröhde и фосфорномолибденовокислымъ натромъ. Подщелоченный водный растворъ извлекался послѣдовательно петролейнымъ эфиромъ, обыкновеннымъ, бензиномъ и хлороформомъ; только послѣдній далъ въ остаткѣ послѣ испаренія окрашенную массу, пронизанную кое-гдѣ кристалликами, однако при перекристаллизованіи и эти слѣды кристалловъ утеряны.

Изъ этого стало очевиднымъ, что съ малыми количествами травы (изслѣдовались порціи сухого порошка по 20 граммъ) не стоило работать. Водная вытяжка изъ спиртной вытяжки указала на присутствіе какого-то дубильнаго вещества (бурозеленый осадокъ отъ полуторохлористаго желѣза), выдѣлить который уксуснымъ эфиромъ не удалось.

Задавшись цѣлю добыть алкалоидъ и опредѣлить содержаніе его въ растеніи, я занялся этимъ въ химической лабораторіи профессора А. П. Діанина.

Мною взяты двѣ порціи очищенной и превращенной въ порошокъ высушенной травы ягоднаго хвойника изъ двухъ различныхъ кудей, полученныхъ одинъ зимою, другой ранней осенью. По 500 граммъ того и другого порошка извлекались четвернымъ объемомъ (2000 граммъ) спирта въ 80° при 40° Ц. втеченіе 6—8 дней три раза, такъ что послѣднія порціи спирта почти не были окрашены. Дальнѣйшій ходъ изслѣдованія опускаю, такъ какъ онъ въ точности повторяетъ способъ Шпера, описанный уже мною подробно.

Солянокислая соль алкалоида получилась въ ви-

дѣ окрашенной массы сырого вещества, пронизаннаго бѣлыми шелковистыми иглами; вторично перекристаллизованная изъ основанія соль получилась въ болѣе чистомъ видѣ въ количествѣ 0,35 граммъ на 500,0 порошка первой порціи травы или 0,07%. Чистаго основанія, выкристаллизовавшагося изъ эфира въ видѣ одноклиномѣрныхъ столбиковъ, оказалось 0,17 граммъ, или 0,034%, что вполне тождественно съ цифрою Шпера.

Изъ другой порціи травы получилось чистаго основанія, почти безцвѣтнаго (тогда какъ въ первой порціи онъ былъ все таки окрашенъ) 0,3 граммъ, или 0,06%. Точка плавленія свободного алкалоида 115°—118° Ц, а солянокислой соли его 174° Ц.

Съ обычными реактивами алкалоидъ даетъ мути или желтоватые осадки. Въ спиртѣ онъ растворяется очень легко, нѣсколько труднѣе въ эфирѣ и съ большимъ трудомъ въ водѣ. Слѣдовательно это тотъ же самый алкалоидъ, который выдѣленъ въ Московскомъ Институтѣ подъ названіемъ эфедрина и на заводѣ Мерекъ подъ названіемъ псевдоэфедрина.

Другія полученные мною данныя почти тождественны съ данными Шпера.

Испытаніе солянокислой соли алкалоида въ качествѣ расширяющаго зрачокъ средства показало его слабое дѣйствіе. Черезъ 20 минутъ послѣ впусканія 1—2 капель 10% воднаго раствора получалось наибольшее расширеніе зрачка не до maximum'a, державшееся менѣе сутокъ; измѣненія аккомодации не произошло.

Если предположить, что при приготовленіи настое-отвара въ него перейдетъ все количество заключающагося во взятой порціи травы алкалоида, то въ настое-отварѣ изъ 5—15 грм. травы (суточной порціи

большого) будетъ содержаться 0,006—0,018 грм. солянокислаго эфедрина, а въ болѣе крѣпкомъ отварѣ изъ 15—40—60 грм. травы на сутки той же соли алкалоида будетъ содержаться 0,018—0,048—0,072 грм.

Я вполне присоединяюсь къ мнѣнію профессора Богословскаго, что различныя свойства алкалоида, добытаго изслѣдователями, обусловливаются невозможностью вполне освободить вещество отъ прелѣдующей его смолистой примѣси.

Въ заключеніе считаю своимъ долгомъ искренно поблагодарить завѣдующаго химической лабораторіей Кронштадтскаго Госпиталѣ доктора Ф. И. Шидловскаго и профессора А. П. Діанина за ихъ постоянную помощь въ работѣ и внимательное отношеніе ко мнѣ.

IV.

Свои наблюденія надъ дѣйствіемъ ягоднаго хвойника на больныхъ я производилъ сначала въ Кронштадтскомъ Морскомъ Госпиталѣ, затѣмъ въ Александровской больницѣ для чернорабочихъ втеченіе всего 1894 года, исключая трехъ дѣтнихъ мѣсяцевъ.

Для этой цѣли выписаны два пуда травы изъ Самарской губерніи отъ аптекаря Зейдлера въ Екатеринштадтѣ (первый пудъ полученъ въ Декабрѣ 1893 года, второй въ Августѣ 1894 года); послѣ израсходованія ихъ еще $\frac{1}{2}$ пуда приобрѣтены въ Русскомъ Обществѣ торговли аптекарскими товарами.

Изъ этой травы готовился настой и настое-отваръ слѣдующимъ образомъ. Брались одни зеленныя части растенія, изрѣзывались ножницами на мелкіе кусочки и толклись въ металлической ступкѣ до тѣхъ

поръ, пока получался ароматическій порошокъ и измочаленныя волокна; эта масса взвѣшивалась, отдавалась кипяткомъ въ специально заказанной герметически закупоривающейся металлической банкѣ и держалась въ кипящей водѣ втеченіе 12 часовъ. Затѣмъ въ открытой кастрюлѣ настоей выпаривался на вольномъ огнѣ до трехъ четвертей прежняго объема жидкости, охлаждался и процеживался черезъ тряпицу.

При кипяченіи замѣчательно душистый настой терялъ свой запахъ, а комната наполнялась приятнымъ ароматомъ. Въ виду этого явленія, указывавшаго на присутствіе въ травѣ эфирнаго масла, я предполагалъ, что послѣднее можетъ играть роль въ дѣйствіи хвойника на организмъ, и потому настаивалъ траву въ герметически закупоренномъ сосудѣ. Такъ-какъ при увариваніи масло могло улетучиться, то одно время давался больнымъ чистый настой, герметически приготовленный, что имѣло мѣсто въ наблюденіяхъ X, XI, XII, XIII, XIV, XIX, XX, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XLIII, XLIV, XLIX и LI; въ наблюденіяхъ же XVI, XVII, XVIII, XXXIX и XLVII давался сначала настой, потомъ настое-отваръ или наоборотъ. Эта попытка не привела ни къ какимъ результатамъ, такъ-какъ разницы въ дѣйствіи настоя и настое-отвара не оказалось никакой.

Что касается вопроса, употреблять ли для отвара и корень растенія или только одніе зеленныя части, то я остановился на послѣднемъ. Точкою опоры мнѣ служилъ тотъ фактъ, что народы, у которыхъ въ ходу хвойниковыя (Французы, буряты и калмыки въ Россіи), пользуются только зелеными частями и плодами растенія, и что, съ другой стороны, дѣйствующее вещество—алкалоидъ, какъ показало химическое из-

слѣдованіе, заключается преимущественно въ зеленыхъ частяхъ и почти совершенно отсутствуетъ въ корневищахъ. Такой же способъ приговленія совѣтуется въ книжкѣ Партанскаго, знатока этой травы, впервые обнародованной имъ. Самъ Кузьмичъ и первый изслѣдователь хвойника Бѣхтинъ употребляли въ дѣло и корни.

Охлажденные настой и настое-отваръ изъ 5,0—60,0 травы на 200,0—400,0 solaturae мною назначались или раздѣльными приемами 3—6 разъ въ день, или же на одинъ приемъ сразу.

Всѣ мои наблюденія раздѣляются на двѣ большія группы. Въ Кронштадтскомъ Госпиталѣ я давалъ настой и настое-отваръ изъ 4—15 грм. на сутки, примѣняя кромѣ того мѣстное лечение въ видѣ согрѣвающихъ компрессовъ, ватныхъ повязокъ, растиранія суставовъ и ваннъ. Въ Александровской же больницѣ мною примѣнялся исключительно настое-отваръ изъ 15—40 и до 60 грм. на сутки, причемъ тщательно избѣгались всякія другія мѣстныя или общія средства. Къ первой же группѣ относятся и параллельныя наблюденія какъ съ леченіемъ салициловымъ натромъ и другими средствами, такъ и безъ всякаго леченія.

Всѣхъ случаевъ прошло подѣ моимъ наблюденіемъ, послѣ исключенія неясныхъ и сомнительныхъ, а также случаевъ повторнаго заболѣванія одного и того же лица, — 94.

Къ первой группѣ относятся: десять случаевъ острого, пять подострого и шесть хроническаго суставнаго ревматизма, пользованныхъ хвойникомъ; восемь случаевъ острого, два подострого и три хроническаго суставнаго ревматизма, пользованныхъ салициловымъ натромъ; одинъ случай острого суставнаго ревматизма безъ всякаго леченія; четыре случая катарра желудка,

пользованные хвойникомъ; тринадцать случаевъ сывороточнаго выпотного плеврита, леченныхъ хвойникомъ; семь случаевъ такого же плеврита, леченныхъ салициловымъ натромъ, и десять случаевъ съ другимъ леченіемъ или безъ всякаго леченія.

Всѣ эти 69 случаевъ наблюдались втеченіе первыхъ шести мѣсяцевъ 1894 года въ Кронштадтскомъ Госпиталѣ у матросовъ въ возрастѣ 21—26 лѣтъ и у нѣсколькихъ рядовыхъ того же возраста; сюда же относятся Фельдшерскій ученикъ 19 лѣтъ, гимназистъ 17 лѣтъ и вдова чиновника 57 лѣтъ.

Ко второй группѣ относятся: десять случаевъ острого, три подострого, четыре хроническаго суставнаго ревматизма и одинъ случай мышечнаго; два случая сѣдалищной невралгіи, два случая сердечнаго порока и одинъ случай хроническаго паренхиматознаго воспаленія почекъ—всѣ двадцать два случая, пользованные хвойникомъ; два случая острого суставнаго ревматизма при леченіи салициловымъ натромъ и одинъ случай безъ всякаго леченія.

Эти остальные двадцать пять случаевъ наблюдались въ Александровской больницѣ втеченіе Октября, Ноября и Декабря 1894 года. Острый суставной ревматизмъ наблюдался у десяти чернорабочихъ въ возрастѣ 15—20 лѣтъ, у одного торговца 27 лѣтъ и одного таксировщика 41 года; подострая форма наблюдалась у крестьянина 50 лѣтъ и у двухъ липъ, крестьянина и мѣшанина, 15 лѣтъ. Хроническій суставной и мышечный ревматизмъ и сѣдалищная невралгія наблюдались у шести крестьянъ разнаго рода занятій въ возрастѣ 30—50 лѣтъ и у одного мѣшанина — папиросника 19 лѣтъ. Одинъ случай сердечнаго порока наблюдался у отставнаго солдата — банщика 52 лѣтъ; другой случай у дѣвицы — мѣшанки

44 лѣтъ; наконецъ случай хроническаго воспаленія почекъ наблюдался у дѣвушки—крестьянки 17 лѣтъ.

Слѣдовательно всего проведено 60 случаевъ леченія однимъ только ягоднымъ хвойникомъ.

При назначеніи этого средства я тщательно старался устранить психическое вліяніе, скрывая отъ больныхъ названіе лекарства.

Обращаясь теперь къ опѣнкѣ полученныхъ результатовъ.

При изученіи клиническаго теченія остраго суставнаго ревматизма необходимо помнить, что это есть въ большинствѣ случаевъ циклическая болѣзнь, могущая оканчиваться благополучно и безъ всякаго леченія; при чемъ температура падаетъ болѣе или менѣе рѣзко на 7—8-ой день заболѣванія, частота пульса и дыханія соотвѣтственно этому уменьшаются, суточное количество мочи послѣ паденія температуры и даже въ подострыхъ случаяхъ при неизмѣнно нормальной температурѣ рѣзко увеличивается (кромѣ случаевъ съ сильнымъ потоотдѣленіемъ—см. наблюденіе X), вѣсъ тѣла повышается, нерѣдко бываетъ критическій потъ.

Естественное теченіе этой болѣзни описано въ наблюденіяхъ XXXV и LXXXII.

Послѣ первоначальнаго рѣзкаго замедленія пульса обыкновенно опять учащается, причемъ или не превышаетъ нормы или превышаетъ ее, доходя иногда до 80 и болѣе въ минуту (тѣ же наблюденія); то же самое бываетъ при леченіи болѣзни какъ салициловымъ натромъ (см. XXVI), такъ и хвойникомъ.

Разбирая наблюдаемые случаи, я принималъ во вниманіе день паденія температуры, рѣзкость этого паденія и всю продолжительность болѣзни.

Настое-отваръ хвойника въ моихъ случаяхъ не

Оказывалъ никакого вліянія на теченіе остраго суставнаго ревматизма, салициловый же натръ въ большинствѣ случаевъ довольно рѣзкое. Это выяснилось какъ при употребленіи малыхъ (5—15 грм. на сутки) дозъ хвойника, такъ и большихъ (15—60 грм. на сутки), что весьма наглядно представляетъ предлагаемая таблица.

Наблюденія въ Александр. больницѣ.					Наблюденія въ Кронштадт. Госпиталѣ *).														
Большія дозы хвойника.					Малыя дозы хвойника.					Салициловый натръ.									
Продолжительность болѣзни въ дняхъ.			День паденія температуры.	Рѣзкое паденіе температуры.	Нерѣзкое.	Продолжительность болѣзни въ дняхъ.			День паденія температуры.	Рѣзкое паденіе температуры.	Нерѣзкое.	Продолжительность болѣзни въ дняхъ.			День паденія температуры.	Рѣзкое паденіе температуры.	Нерѣзкое.		
LXXIII.	18	12	+	VI.	18	10	+	XXII.	22	8	+								
LXXII.	38	12	+	VII.	85	20	+	XXIII.	26	13		+							
LXXI.	34	21	+	IX.	17	17	+												
LXXVIII.	18	16	+	X.	15	11	+	XXIV.	18	6	+								
Среднее 27 Ср.					Среднее 34 Ср.					Среднее 22 Ср.					Заслѣзованіе 1-й разѣ.				
дней. 15					дня. 14					дня. 9									
LXXXVII.	43	13	+	I.	64	24	+	XXV.	14	11	+								
				II.	16	9	+	XXVI.	19	13	+								
LXXIV.	18	16	+	III.	24	13	+	XXVII.	11	8	+								
				IV.	31	9	+	XXVIII.	39	5	+								
				V.	23	21	+	XXIX.	8	4	+								
LXXXVI.	12		+	VIII.	61	12	+	LXXXIV* 16	8	4	+								
								LXXXIII* 12	7	7	+								
Среднее 24 Ср.					Среднее 36 Ср.					Среднее 17 Ср.					Заслѣзованіе 2-ой и 3-ей разѣ.				
дня. 15					дней. 15					дня. 8									

Заболѣваніе 1-й разъ.

Заболѣваніе 2-ой и 3-й разъ.

*) Кромѣ отмѣченныхъ звездочкой случаевъ, наблюдавшихся въ Алекс. больницѣ. Тоже относится къ меньшей таблицѣ.

Безъ леченія.				
Продолжи- тельность болѣзни въ дняхъ.	День нае- днѣ темпе- ратуры.	Рѣзкое па- деніе тем- пературы.	Нерѣзкое.	
XXXV.	18	10		+
LXXXII*.	10	6		+
LXXIV*.		8		+
LXXVI*.		8		+
Среднее 14 дней.	Ср.	8		

Изъ этой таблицы видно, что, тогда какъ при леченіи хвойникомъ болѣзнь тянулась 24—36 дней, а температура падала нерѣзко на 15-ый день болѣзни, при леченіи салициловымъ натромъ больной выписывался на 17—22-ой день заболѣванія, послѣ того какъ температура рѣзко пала на 8—9-ый день. Безъ всякаго лекарственнаго леченія средняя продолжительность болѣзни въ двухъ случаяхъ выразилась цифрою 14, а день нерѣзкаго паденія температуры цифрою 8 (тѣ же два случая съ прибавленіемъ двухъ другихъ, гдѣ леченіе примѣнялось послѣ паденія температуры).

Въ таблицѣ мною не помѣщены запущенные случаи остраго суставнаго ревматизма (LXX и LXXV), причемъ больные поступили въ больницу въ концѣ второй недѣли заболѣванія; въ этихъ двухъ случаяхъ хвойникъ, примѣнявшійся въ большихъ дозахъ втеченіе 28 дней (LXX) и 17 дней (LXXV), не принесъ никакой пользы больнымъ, тогда какъ іодистый калий

въ одномъ и салициловый натръ въ другомъ случаѣ поставили больныхъ на ноги.

Мы видимъ, что случаи, леченные салициловымъ натромъ, протекали почти тождественно съ легкими случаями, предоставленными самимъ себѣ, тогда какъ при леченіи хвойникомъ теченіе болѣзни было совершенно иное.

Въ подострыхъ и хроническихъ формахъ суставнаго ревматизма принималось во вниманіе прекращеніе болѣе и мѣстныя измѣненія суставовъ, а также продолжительность болѣзни.

Позволю себѣ для большей наглядности привести вкратцѣ пять случаевъ подостраго, затѣмъ шесть случаевъ хроническаго суставнаго ревматизма первой группы, проведенныхъ при леченіи хвойникомъ.

1) Рядовой 23 л. К — ъ (XI). Постоянная боль въ нѣсколькихъ суставахъ. Настой хвойника получалъ съ 5-го дня болѣзни изъ 15,0 на сутки втеченіе 10 дней, изъ 8,0—4 дня и изъ 5,0—2 дня. Значительное облегченіе получилъ на 15-ый день болѣзни одновременно съ уменьшеніемъ на нѣсколько десятыхъ градуса нормальной же температуры.

2) Матрость 21 г. О — ъ (XII). Настой хвойника получалъ съ 17-го дня болѣзни изъ 8,0—12 дней, изъ 10,0—3 дня и изъ 15,0—6 дней. Ломота исчезла на 29-ый день болѣзни. Выписанъ на 39-ый день болѣзни.

3) Матрость 22 л. С — ъ (XIII). Настой хвойника получалъ съ 7-го дня болѣзни изъ 15,0—6 дней, изъ 8,0—14 дней, изъ 5,0—2 дня. Ломота прекратилась на 12-й день болѣзни вмѣстѣ съ уменьшеніемъ нормальной температуры на нѣсколько десятыхъ градуса. Выписанъ на 31-ый день болѣзни.

4) Кочегаръ 23 л. П — ъ (XIV). Настой хвойника

получалъ съ 16-го дня болѣзни изъ 15,0 — 7 дней и изъ 10,0—3 дня. Боли уменьшились вмѣстѣ съ паденіемъ до нормы подлихорадочной температуры. Выписанъ на 55-ый день болѣзни.

5) Гимназистъ 17 лѣтъ К—ъ (XV). Настояе-отваръ хвойника изъ 5,0 получалъ втеченіе 30 дней безъ всякой пользы.

6) Матросъ 25 лѣтъ Б—ъ (XVI). Хроническій суставной (какъ и слѣдующіе пять случаевъ) ревматизмъ, образовавшійся изъ острой формы. Настояе-отваръ хвойника изъ 5,0 на сутки получалъ 24 дня. Выписанъ со значительнымъ облегченіемъ и нѣсколько уменьшившеюся опухолью суставовъ. Черезъ три недѣли прибылъ опять съ рѣзко припухшими колѣнными суставами. Настояе-отваръ хвойника получалъ изъ 8,0—5 дней, изъ 10,0—6 дней и опять изъ 8,0—6 дней; потомъ настой хвойника изъ 8,0 — 15 дней. Выписанъ на 49-ый день послѣ возвращенія въ Госпиталь: ломота прекратилась, боли при движеніи и измѣненіе суставовъ остались. Количество мочи все время постепенно уменьшалось; въ послѣдніе дни леченія хвойникомъ пульсъ участился до 96 въ минуту.

7) Фельдшерскій ученикъ В—ъ 19 лѣтъ (XVII). Получалъ настояе-отваръ изъ 5,0 на сутки 18 дней и изъ 10,0—одинъ день. Боли не уменьшились; въ такомъ состояніи выписанъ. Черезъ мѣсяцъ прибылъ вновь. Получалъ настой хвойника изъ 8,0 — 9 дней, изъ 10,0—9 дней, опять изъ 8,0 — 10 дней и изъ 5,0 — 5 дней. Выписанъ на 41-ый день со значительнымъ улучшеніемъ: боли остались только при движеніи. Количество мочи нѣсколько увеличилось.

8) Матросъ 25 лѣтъ П—ій (XVIII). Перенесъ обостреніе хроническаго суставнаго ревматизма, съ

чѣмъ лежалъ съ 28 Апрѣля по 7 Мая; ломота исчезла осталась боль при хожденіи. Выписанъ. 8 Мая вернулся опять съ жалобами на ломоту. Получалъ настояе-отваръ изъ 8,0—8 дней, изъ 5,0—8 дней и опять изъ 8,0 — 2 дня. Ломота прекратилась уже на 3-ий день лежанія въ Госпиталѣ, боль при движеніи осталась неизмѣнною. Выписанъ на 80-ый день съ нѣкоторымъ облегченіемъ. Количество мочи постепенно уменьшалось до самаго конца; въ концѣ пульсъ участился до 84 въ минуту.

9) Стрѣлокъ 24 лѣтъ К—ъ (XIX). Настой хвойника изъ 8,0 на сутки принималъ 23 дня безъ всякой пользы. Количество мочи за время леченія нѣсколько увеличилось. Выписанъ на 156-ой день болѣзни.

10) Комендоръ 26 лѣтъ Б—ъ (XX). Получалъ настой хвойника изъ 8,0 — 23 дня безъ облегченія болей. Выписанъ на 136-ой день болѣзни.

11) Вдова чиновника 57 лѣтъ И—а (XXI). Получала настояе-отваръ хвойника изъ 5,0 на сутки втеченіе 3 недѣль безъ вліянія на боли въ суставахъ.

Во всѣхъ этихъ одиннадцати случаяхъ больные никогда не потѣли, исключая 8-го случая, гдѣ больной иногда потѣлъ по ночамъ.

Приведу для сравненія два случая подострого, затѣмъ три случая хроническаго суставнаго ревматизма первой группы при леченіи салициловымъ натромъ.

1) Машинистъ 25 лѣтъ Т—ъ (XXX). Съ 14-го дня болѣзни получалъ салициловый натръ по 0,9—5 дней и по 1,8—7 дней; на 23-ий день болѣзни боли исчезли, остались только при движеніи. Затѣмъ лежалъ долго вслѣдствіе болей въ области сердца.

2) Рядовой 21 г. П—ъ (XXXI). Получалъ салициловый натръ по 3,6—4 дня, по 7,2—3 дня и опять

по 3,6—6 дней. На 14-й день лечения значительное улучшение. Выписанъ на 51-ый день болѣзни.

3) Рядовой 22 л. З—ъ (XXXII). Обострение хронического суставного ревматизма. Съ 5-го дня болѣзни получалъ салициловый натръ по 7,2—9 дней. На 14-ый день болѣзни значительное облегчение. Выписанъ почти здоровымъ на 37-ой день.

4) Машинистъ 22 л. С—ъ (XXXIII). Съ 8-го дня болѣзни получалъ салициловый натръ по 1,8, затѣмъ по 3,6 въ день; на 10-ый день (черезъ два дня послѣ назначенія лечения) ломота исчезла, боли при ходьбѣ остались. На 16-ый день опухоль суставовъ значительно опала. Выписанъ здоровымъ на 70-ый день.

5) Матросъ 22 л. В—ъ (XXXIV). Обострение хронического суставного ревматизма. Температура пала на 10-ый день. Съ этого дня получалъ салициловый натръ по 3,6 въ день 7 дней; на 16-ый день со времени обострения значительное облегчение. Выписанъ на 76-ый день болѣзни.

Послѣ разсмотрѣнія приведенныхъ 16 случаевъ первой группы наблюдений не мѣшаетъ бросить взглядъ на слѣдующіе три случая подострого, четыре случая хронического суставного и одинъ случай мышечнаго ревматизма второй группы, проведенныхъ при лечении большими дозами хвойника.

1) Мѣщанинъ 15 лѣтъ Р—ъ (LXXIX). Лечение хвойникомъ нельзя было долго провести, такъ-какъ онъ вызывалъ рѣзкіе припадки отравленія, въ видѣ повышенія температуры, озноба, головной боли и рвоты.

2) Крестьянинъ 50 лѣтъ В—ъ (LXXX). Принималъ настое-отваръ хвойника изъ 40,0 на сутки съ 4-го дня болѣзни втеченіе 13 дней съ небольшимъ перерывомъ. Повидимому хвойникъ нѣсколько облег-

чилъ боли въ суставахъ. Выписанъ на 24-ый день болѣзни. При лихорадочной температурѣ больной несильно потѣлъ.

3) Крестьянинъ 15 лѣтъ С—ъ (LXXXI). Настое-отваръ хвойника получалъ съ 9-го дня болѣзни изъ 40,0 втеченіе 8 дней. Боли нисколько не уменьшились. Подъ вліяніемъ іодистаго калия быстро поправился и выписанъ на 22-ой день болѣзни.

4) Мѣщанинъ 17 лѣтъ Л—ъ (папиросникъ) (LXXXV). Получалъ настое-отваръ хвойника изъ 15,0—5 дней, затѣмъ изъ 20,0—13 дней безъ всякаго вліянія; 4 дня изъ 30,0. Эта доза вызвала скоропребывающее потогонное и болеутоляющее дѣйствіе; далѣе приемы изъ 40,0 на сутки втеченіе 6 дней не оказали никакого вліянія. Количество мочи за это время нѣсколько увеличилось, пульсъ все время держался около 80 въ минуту. Сталъ поправляться подъ вліяніемъ іодистаго калия.

5) Крестьянинъ 33 лѣтъ Т—ъ (LXXXVI). Послѣ первыхъ же часовъ лечения хвойникомъ (изъ 15,0 на сутки) совместно съ горячей ванной въ 30° R наступило рѣзкое облегчение болей, которое скоро смѣнилось ухудшеніемъ. Изъ 15,0 настое-отваръ принимался 5 дней, изъ 20,0—13 дней, изъ 30,0—4 дня. На 4-ый день приемовъ 30,0 скоропребывающее потогонное и болеутоляющее дѣйствіе. Далѣе 6 дней принимался настое-отваръ изъ 40,0. 1-ый день приемовъ 40,0 принесъ нѣкоторое облегчение, которое смѣнилось ухудшеніемъ вмѣстѣ съ головною болью и рвотою. Количество мочи за время лечения хвойникомъ нѣсколько увеличилось. Подъ вліяніемъ салициловаго натра, а затѣмъ іодистаго калия больной быстро поправился и выписанъ на 14-ый день болѣзни.

6) Крестьянинъ 39 лѣтъ П—ъ (LXXXVII). По-

раженіе одного сустава (лѣваго плечевого). Съ 15-го дня болѣзни больной принималъ настое-отваръ хвойника изъ 40,0 на сутки втеченіе 10 дней. На 2-ой же день леченія дѣйствіе потогонное и болеутоляющее. Выписанъ поправляющимся на 42-ой день болѣзни.

7) Крестьянинъ 46 лѣтъ Д—ъ (швейцаръ) (LXXXVIII). Хроническій ревматизмъ подагрическаго характера. Настое-отваръ изъ 40,0 хвойника принималъ 14 дней безъ всякой пользы. Пульсъ все время держался около 80 въ минуту. Больной не потѣлъ.

8) Полицейскій служитель 33 лѣтъ Б—ъ (LXXXIX). Мышечныя боли. Настое-отваръ хвойника изъ 40,0 на сутки принималъ 16 дней. Совмѣстно съ употребленіемъ горячаго чаю хвойникъ далъ вначалѣ нѣкоторое облегченіе, затѣмъ не оказывалъ никакого дѣйствія. Выписанъ на 34-ый день болѣзни съ нѣкоторымъ облегченіемъ.

Изъ обзора всѣхъ приведенныхъ 24 случаевъ мы видимъ, что въ первыхъ одиннадцати, леченныхъ небольшими дозами хвойника, дѣйствіе послѣдняго было нѣсколько большее, чѣмъ въ восьми послѣднихъ случаяхъ, пользованныхъ большими дозами хвойника. Это необходимо объяснить примѣненіемъ мѣстнаго леченія и ваннъ. Во всякомъ случаѣ дѣйствіе хвойника выразилось только въ видѣ облегченія ломоты, если это улучшеніе мы захотимъ приписать хвойнику; боли же при движеніи и патологическія измѣненія суставовъ оставались прежними. Салициловый натръ гораздо скорѣе и прочнѣе устранилъ ломоту, хотя тоже мало вліялъ на мѣстныя измѣненія.

Въ восьми послѣднихъ случаяхъ второй группы наблюденій при леченіи большими дозами хвойника получилось лишь скоропреходящее дѣйствіе его въ видѣ уменьшенія болей вмѣстѣ съ появленіемъ пото-

отдѣленія, причемъ боли скоро возвращались или даже усиливались. Улучшеніе было замѣтнѣе, когда пріемы отвара хвойника совпадали съ горячей ванной или когда они запивались горячимъ чаемъ. Прочное и окончательное улучшеніе достигалось только пріемами йодистаго калия въ большихъ дозахъ наряду съ мѣстнымъ леченіемъ.

Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ случаевъ (XVII, LXXXV и LXXXVI) было замѣчено увеличеніе количества мочи за время леченія хвойникомъ; въ другихъ случаяхъ (XVI и XVIII) наоборотъ количество мочи уменьшилось за это время.

Вообще нужно сказать, что ревматизмъ, даже и въ хронической формѣ, представляетъ изъ себя болѣзнь, въ которой измѣненіе количества мочи нельзя приписывать вліянію какого-либо средства, такъ какъ въ этой болѣзни имѣютъ мѣсто колебанія нормальной температуры (въ предѣлахъ нормы), которыя не остаются безъ вліянія на выдѣленіе мочи. Кромѣ того самыя боли рѣзко измѣняютъ количество выдѣленій. Тоже самое нужно сказать и про частоту пульса. Между прочимъ въ случаяхъ LXXXV и LXXXVIII пульсъ, несмотря на леченіе хвойникомъ, держался на 80 въ минуту, а въ случаяхъ XVI и XVIII, при постоянномъ уменьшеніи суточного количества мочи втеченіе леченія хвойникомъ, произошло рѣзкое учащеніе пульса въ концѣ леченія.

Въ одномъ случаѣ (XC) сѣдалишной невралгіи отъ хвойника незамѣтно было никакого улучшенія, въ другомъ (XCI) рѣзкое ухудшеніе. Въ послѣднемъ случаѣ каждый разъ при назначеніи хвойника боли переходили на другую здоровую ногу и даже въ *renis*. Количество мочи въ обоихъ случаяхъ нѣсколько увеличилось за время леченія хвойникомъ.

Перейдемъ теперь къ разбору леченія хвойникомъ сывороточнаго выпотнаго плеврита.

Прежде всего считаю необходимымъ упомянуть, что для наблюденія брались только чистые случаи, гдѣ не удавалось найти ни въ мокротѣ бугорковыхъ палочекъ, ни измѣненій въ легочныхъ верхушкахъ; всѣ же сомнительные случаи отброшены мною при окончательной обработкѣ.

Всѣ 30 случаевъ плеврита наблюдались въ Кронштадтскомъ Госпиталѣ у матросовъ въ возрастѣ 21—25 лѣтъ и у нѣсколькихъ рядовыхъ того же возраста.

Всякому, изучающему вліяніе какого-либо средства на теченіе плеврита, надо помнить, что первичный плевритъ, предоставленный самому себѣ, протекаетъ часто вполне благопріятно; спустя полторы-двѣ недѣли температура падаетъ болѣе или менѣе рѣзко, пульсъ и дыханіе соотвѣтственно этому замедляются, количество мочи увеличивается, больной потѣетъ, и выпоть всасывается (см. XLIII и LXI).

Всѣ тѣла при незначительномъ выпотѣ могутъ съ самаго начала повышаться; болѣею же частью всѣ тѣла рѣзко понижается по мѣрѣ увеличенія выпота и въ самомъ началѣ всасыванія его, а затѣмъ начинаетъ медленно, но непрерывно повышаться. Это видно изъ моихъ наблюденій какъ въ случаяхъ безъ всякаго леченія, такъ и въ случаяхъ, леченныхъ хвойникомъ, салициловымъ натромъ или другими средствами.

При значительномъ выпотѣ дыханіе нерѣдко учащается вскорѣ послѣ паденія температуры, и тогда кривая числа дыханій перестаетъ быть параллельной кривой пульса и даже рѣзко расходится съ нею; это бывало какъ въ случаяхъ безъ всякаго леченія (LXIII и

LXIX), такъ и въ случаяхъ при леченіи хвойникомъ (XLV и XLIX) и при леченіи салициловымъ натромъ (LXI).

Пульсъ послѣ паденія температуры стоитъ на низкой цифрѣ, иногда же рѣзко учащается на одинъ-два дня или постепенно учащается втеченіе многихъ дней; въ моихъ случаяхъ это было какъ при леченіи хвойникомъ, такъ и при леченіи салициловымъ натромъ (LXVII) и безъ всякаго леченія (LX).

Не будучи въ состояніи дать точнаго объясненія этимъ отклоненіямъ отъ нормы дыханія и пульса, я упоминаю о нихъ потому, что они нерѣдко встрѣчались у моихъ больныхъ плевритомъ, леченныхъ хвойникомъ, и могутъ быть по первому впечатлѣнію приписаны вліянію хвойника.

Въ тѣхъ случаяхъ плеврита (болѣею частью тяжелыхъ), гдѣ температура долго держится на высокихъ цифрахъ или, упавъ до нормы, вновь повышается, — и количество мочи не увеличивается или, если увеличилось раньше, уменьшается; тоже самое нужно сказать про колебанія пульса и дыханія, — и все это совершенно не зависитъ отъ способа леченія. Суточное количество мочи совершенно соотвѣтствуетъ количеству принимаемой за сутки жидкости; параллельность кривыхъ, изображающихъ эти двѣ величины, отмѣчена въ большинствѣ моихъ исторій болѣзни.

Отсюда слѣдуетъ выводъ, что всѣ эти клиническія данныя — пульсъ, дыханіе, моча и потъ представляютъ явленія, идущія рука объ руку съ состояніемъ температуры тѣла, и потому измѣненія этихъ данныхъ не могутъ быть приписываемы тому или другому лечебному средству.

Слѣдовательно, говорить о мочегонномъ или пото-

гонномъ дѣйствиі какого-либо средства, примѣннаго для леченія плеврита, ошибочно.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній обращусь къ теченію моихъ случаевъ плеврита при леченіи хвойникомъ, салициловымъ натромъ и безъ всякаго леченія.

Для того, чтобы разобратъяся точнѣе въ дѣйствиі этихъ средствъ, я обращалъ вниманіе на степень заболѣванія и на продолжительность болѣзни. По высотѣ выпота всѣ случаи я раздѣлилъ на легкіе, средніе и тяжелые, причемъ къ первымъ отнесъ заболѣванія, гдѣ выпотъ по лопаточной линіи не достигаетъ нижняго угла лопатки, ко вторымъ тѣ заболѣванія, гдѣ выпотъ достигаетъ его или немного переходитъ, и, наконецъ, къ тяжелымъ отнесъ тѣ случаи, гдѣ выпотъ стоитъ гораздо выше нижняго угла лопатки сзади или доходитъ до ключицы спереди.

Оказалось, что какъ въ легкихъ случаяхъ, такъ и въ среднихъ и тяжелыхъ продолжительность болѣзни была приблизительно одна и таже и при леченіи хвойникомъ, и при безразличномъ или смѣшанномъ леченіи; тогда какъ при салицилово-натровомъ леченіи она была почти вдвое короче. Справедливость моихъ словъ всего лучше выяснится послѣ разсмотрѣнія приложенной таблицы.

	Леченіе хвойникомъ.		Леченіе салициловымъ натромъ.		Леченіе смѣшанное или безъ леченія.	
	Продолжительность леченія.	Продолжительность болѣзни.	Продолжительность леченія.	Продолжительность болѣзни.	Продолжительность леченія.	Продолжительность болѣзни.
Легкіе случаи.	18 дней настое-отваръ изъ 8,0	35 дней XL.			Ни какого.	86 дней LX. 36 " LXI. 15 " LXII. 49 " LXIII. среднее 34 дня.
Средніе случаи.	71 день настое-отваръ изъ 8,0 33 дня — " 10,0 15 дней — " 8,0 6 — " 8,0 21 день настое-отваръ изъ 8,0—10,0 18 дней — изъ 8,0	200 дней XLI. 42 " XLII. 57 " XLIV. 41 " XLVI. 72 " XLIII. 108 " XLIV. среднее 89 дней.	32 дня по 2,0 13 дней по 2,0—4,0	58 дней LIV. 55 " LIII. среднее 56 дней.	86 дней салицил. натръ съ 10,0от. натромъ. 8 дней хвойникъ никакого	150 дней LXIV. 65 " LXV. 36 " LXVI. среднее 80 дней.
	69 дней настое-отваръ изъ 10,0 34 дня — " 10,0 25 дней — " 8,0 17 " — " 8,0 28 дней настое-отваръ изъ 8,0 17 " — " 8,0	100 дней XLVIII. 135 " XLVIII. 127 " LI. 60 " LI. 68 " XLIX. 74 " LI. среднее 94 дня.	12 дней по 4,0 10 " 4,0 7 " 4,0 10 " 4,0 16 " 4,0 среднее 52 дня.	88 дней LV. 62 " LVI. 46 " LVII. 18 " LVIII. 45 " LIX. среднее 52 дня.	39 дней смѣшанное. 17 дней напер-отынка съ 10,0. кал. 7 дней хвойникъ.	134 дня LXVII. 106 " LXVIII. 63 " LXIX. среднее 101 день.

Въ этой таблицѣ кромѣ времени лежанія больного въ Госпиталѣ отмѣчена продолжительность пользования его тѣмъ или другимъ средствомъ. Правда большинство больныхъ, послѣ прекращенія спеціальнаго леченія хвойникомъ или салициловымъ натромъ, еще нѣкоторое время пользовалось приемами іодистаго калия, слѣдовательно продолжительность лежанія больного въ Госпиталѣ не выражаетъ собою продолжительности пользования спеціальнымъ средствомъ. Тѣмъ не менѣе ввиду того, что первоначальное леченіе несомнѣнно играло весьма важную роль и давало то или иное направленіе всему ходу болѣзни, и такъ какъ съ другой стороны больные выписывались всѣ приблизительно въ одномъ состояніи хорошаго общаго поправленія и установленія стойкихъ мѣстныхъ измѣненій плевры, то я и позволилъ себѣ воспользоваться продолжительностью лежанія больного въ Госпиталѣ, какъ мѣриломъ цѣлесообразности того или другого леченія.

Изъ таблицы очевидно, что салициловый натръ несомнѣнно оказывалъ благоприятное вліяніе на теченіе плеврита, тогда какъ хвойникъ не оказывалъ на него никакого вліянія.

При катаррахъ желудка (только одинъ случай былъ чистый, другіе три были осложнены малокровіемъ и ревматизмомъ) получилось нѣкоторое улучшеніе въ видѣ уменьшенія отрыжки и болѣе подѣлжечкой и усиленія аппетита. Въ двухъ случаяхъ это улучшеніе необходимо приписать устраненію запора. Вообще запоръ былъ устраненъ хвойникомъ (малыми дозами) въ случаяхъ XXI, XXXVI, XXXIX и XLVII изъ первой группы наблюдений; въ третьемъ изъ нихъ (XXXIX) вначалѣ хвойникъ вызывалъ стулъ, а за-

тѣмъ опять приходилось прибѣгать къ посредству опорожняющихъ.

Нормальныя испраженія сдѣлались жидкими втеченіе леченія хвойникомъ въ случаяхъ IX, XLIII, XLVIII и LI первой группы наблюдений.

Не смотря на леченіе малыми дозами хвойника, въ слѣдующихъ случаяхъ остраго суставнаго ревматизма приходилось ставить опорожняющее: I, III, X и XLIII.

Нѣкоторому вліянію на кишечную перистальтику малыхъ дозъ (5,0—15,0 на сутки) хвойника я могу противопоставить наблюденія второй группы, гдѣ ни разу не наблюдалось усиливающего движеніе кишокъ дѣйствія хвойника.

Такъ какъ ни плевритъ, ни ревматическія заболѣванія, какъ я указалъ выше, не представляютъ удобства для изученія мочегоннаго и потогоннаго дѣйствія какого-либо средства, то я воспользовался тремя случаями сердечныхъ заболѣваній и однимъ случаемъ хроническаго паренхиматознаго воспаленія почекъ для испытанія хвойника въ этомъ направленіи. Эти четыре случая наблюдались въ Александровской больницѣ и пользованы были большими дозами (40,0 на сутки) хвойника.

Количество мочи повидимому увеличилось при усталомъ сердцѣ (cor lassum—XCII) и при воспаленіи почекъ (XCIV); но въ обоихъ случаяхъ отеки не уменьшились, какъ показало точное измѣреніе окружности голеней, а во второмъ случаѣ бѣлокъ въ мочѣ увеличился болѣе чѣмъ вдвое. Кромѣ того въ первомъ случаѣ получилось рѣзкое ухудшеніе въ послѣдніе дни (леченіе продолжалось 15 дней) пользованіе хвойникомъ въ видѣ усиленія кашля, повышенія тем-

пературы и кровохарканія, чего ранѣе никогда не бывало.

Во второмъ случаѣ больная все время леченія хвойникомъ потѣла, тогда какъ раньше этого никогда не замѣчала; въ первомъ случаѣ больной потѣлъ только первую недѣлю леченія.

Въ двухъ случаяхъ тяжелаго сердечнаго порока (одинъ изъ нихъ описанъ въ набл. ХСІІІ, другой со- всѣмъ не описанъ вслѣдствіе кратковременности наблюденія) получилось рѣзкое ухудшеніе всѣхъ явленій при леченіи хвойникомъ. Въ случаѣ ХСІІІ стойкое улучшеніе, вызванное наперстянкой, держалось нѣсколько дней при безразличномъ леченіи, но уже скоро послѣ назначенія настое-отвара хвойника изъ 40,0 на сутки количество мочи рѣзко уменьшилось, пропалъ сонъ и аппетитъ, одышка не позволяла ложиться. Наперстянка, вновь назначенная послѣ восьмидневнаго пользованія хвойникомъ, быстро поправила больную.

Во второмъ случаѣ (недостаточность двустворки у 46-лѣтняго мѣшанина) примѣненіе той же дозы хвойника втеченіе двухъ сутокъ сопровождалось такимъ рѣзкимъ усиленіемъ перебоевъ сердца и одышки, что пришлось обратиться къ наперстянкѣ изъ опасенія потерять больного.

Для выясненія дѣйствія средства на пульсъ и кровяное давленіе мною снято 454 сфигмограммы посредствомъ прибора Ричардсона и столько же разъ измѣрено кровяное давленіе водянымъ сфигмоманометромъ Баша, причемъ подъ влияніемъ хвойника не замѣчено никакихъ характерныхъ измѣненій; въ наблюденіяхъ ХСІІ, ХСІІІ и ХСІV отмѣчено ничтожное измѣненіе сфигмограммъ.

Состояніе зрачковъ отмѣчалось мною въ слѣдующихъ десяти наблюденіяхъ изъ первой группы:

VІІІ, ІХ, XII, XIII, XVІІІ, XLIV, XLV, XLVI, XLVІІІ и LI. Только въ LI, XII и XVІІІ состояніе зрачковъ отмѣчено до леченія хвойникомъ и втеченіе леченія, причемъ въ LI случаѣ они замѣтно расширились, а въ XII и XVІІІ зрачки, и ранѣе назначенія хвойника широкіе, оставались такими втеченіе леченія имъ. Въ остальныхъ случаяхъ состояніе зрачковъ отмѣчалось послѣ назначенія хвойника, причемъ, вначалѣ нормальные, зрачки расширялись и вновь сужались. Всѣ эти наблюденія неточны, такъ какъ состояніе зрачковъ отмѣчалось „на глазъ“ при разсѣянномъ свѣтѣ.

Во второй группѣ наблюденій діаметръ зрачковъ измѣрялся сантиметровою линейкою при искусственномъ освѣщеніи одинаковой силы въ затемненной комнатѣ въ случаяхъ LXXXV, LXXXVI, XC и XCI, причемъ только въ LXXXV получилось стойкое равномерное расширеніе. Въ другихъ случаяхъ (LXXXIV, LXXXVII, LXXX, LXXXI и LXXXVII) діаметръ зрачковъ измѣрялся тою же линейкою, но при разсѣянномъ дневномъ освѣщеніи; въ случаяхъ LXXX и LXXXVII не получилось расширенія зрачковъ, въ LXXXVII отмѣчено одинъ разъ неравномерное расширеніе зрачковъ, въ остальныхъ случаяхъ наблюдалось равномерное расширеніе ихъ.

Что касается явленій отравленія, то въ первой группѣ наблюденій они встрѣчались только у малокровныхъ лицъ въ видѣ усиленія головокруженія, иногда учащенія сердцебіенія, тошноты, рвоты и поноса.

За то во второй группѣ головокруженіе, головная боль, преимущественно въ вискахъ, кровотеченіе изъ носа, тошнота, рвота, стѣсненіе въ груди и сердцебіеніе—были нерѣдкими явленіями и въ нѣкоторыхъ случаяхъ заставляли отказаться отъ продолженія ле-

ченія (см. LXX, LXXIII, LXXV, LXXVII, LXXIX, LXXX, LXXXIX, LXXXVI, XCI, XCII и XCIV).

V.

Итакъ при остромъ суставнымъ ревматизмѣ, сѣдалищной невралгіи и при плевритѣ не замѣчено никакого дѣйствія ягоднаго хвойника.

Изъ трехъ случаевъ сердечныхъ заболѣваній въ одномъ отмѣчено слабое потогонное и мочегонное дѣйствіе средства безъ вліянія на самое теченіе болѣзни; такое же самое дѣйствіе и тоже безъ всякой пользы для больной хвойникъ оказалъ въ случаѣ хроническаго воспаленія почекъ.

Нѣкоторое благопріятное дѣйствіе хвойника наблюдалось при пораженіяхъ желудка; въ небольшомъ числѣ случаевъ отваръ ягоднаго хвойника усиливаль кишечную перистальтику и устраняль запоры.

Слабое вліяніе хвойникъ оказалъ въ подострыхъ и хроническихъ случаяхъ суставнаго ревматизма, причѣмъ попутно въ большинствѣ этихъ случаевъ отмѣчено мочегонное и въ нѣкоторыхъ случаяхъ потогонное дѣйствіе средства.

Однако, какъ я уже говорилъ выше, заболѣванія ревматическія не пригодны для сужденія о мочегонномъ дѣйствіи какого-либо средства. Слѣдовательно, съ достаточною вѣроятностію можно установить только потогонное дѣйствіе большихъ дозъ ягоднаго хвойника.

Профессоръ Богословскій на основаніи своихъ опытовъ съ эфедриномъ надъ животными причисляеть этотъ алкалоидъ къ числу хорошо дѣйствующихъ сердечныхъ средствъ и сравниваетъ его съ кофеи-

номъ. Исторіи болѣзни моихъ сердечныхъ больныхъ, пользованныхъ хвойникомъ, ясно показываютъ, что переносить результаты полученнаго на животныхъ дѣйствія эфедрина на больного человека было-бы преждевременно.

Подводя итоги всему сказанному, я прихожу къ слѣдующимъ выводамъ.

1) Ягодный хвойникъ есть средство безразличное, хотя и не особенно вредное.

2) Въ немъ содержится алкалоидъ эфедринъ въ количествѣ 0,03—0,06%.

3) Алкалоидъ этотъ не пригоденъ въ качествѣ расширяющаго зрачокъ средства, такъ-какъ онъ не парализуетъ аккомодациі.

4) Настоя-отваръ хвойника въ большихъ дозахъ дѣйствуетъ иногда потогонно и мочегонно.

5) Въ малыхъ дозахъ онъ иногда усиливаетъ движеніе кишокъ.

6) Какъ противоревматическое этотъ отваръ есть весьма сомнительное средство.

7) Какъ сердечное абсолютно не выдерживаетъ критики.

8) Въ рекламахъ достоинства его неизмѣримо преувеличены.

Пользуясь случаемъ, не могу не выразить искренней благодарности Главному Доктору Кронштадтскаго Морского Госпиталѣ М. М. Акинфьеву и Главному Врачу Александровской больницы профессору В. П. Доброклонскому за ихъ теплое отношеніе ко мнѣ и доброе участіе.

УКАЗАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ.

- 1) Партанскій. *Ephedra vulgaris*. Средство Знахаря Кузьмича. 1892 г.
- 2) Отзывъ Коммисіи Московскаго Университета. Сообщение Предсѣдателя Общества Русскихъ врачей въ Москвѣ Н. О. Миллера.
- 3) Сычевъ. Матеріалы для ближайшаго знакомства съ *Ephedra vulgaris*. *Eph. monostachya et distachya*. 1894 г. Москва.
- 4) Pierer. *Universal-Lexicon*. 1842 г.
- 5) Krebel. *Volksarzneimittel in Russland*. *Medicinische Zeitung Russland*. 1845 г. стр. 21.
- 6) *Versuch einer Monographie der Gattung Ephedra*. 1846 г. Цитир. по Сычеву.
- 7) Къ вопросу о дѣйстви *Ephedra vulgaris*. Больничная Газета Боткина. 1891 г. № 19.
- 8) Отзывъ Коммисіи Харьковскаго Университета.
- 9) Отзывъ Коммисіи Казанскаго Университета.
- 10) Отзывъ Коммисіи Университета Св. Владиміра.
- 11) Отзывъ Коммисіи Импер. Военно-Медиц. Академіи.
- 12) Bunzl. *Pharmaceut. Zeitung*. 1887 г. р. 621. Цитир. по Шперу.
- 13) Шперъ. Фармацевтический Журналъ. 1892 г. № 1—7.
- 14) *Berliner Klin. Wochenschrift*. 1887 г. № 38.
- 15) *Zehenders Klin. Monatsblatte*. XXVII jahrg. Цит. по Günsburg.
- 16) *Berichte der Deutsch. Chem. Gesellschaft*. 1889 г. р. 1823.
- 17) *Virchow Archiv band*. 124. р. 93. 1891 г.
- 18) *L'éphédrine et la pseudoéphédrine Annales d'occulistiques*.
- 19) *Virchow Archiv ibidem*. р. 75.
- 20) *Bericht über das Jahr 1893* г. № 95.

Примѣчаніе. Отзывы Коммисій русскихъ Университетовъ хранятся въ рукописяхъ въ Дѣлѣ объ *Ephedra vulgaris* въ Медицинскомъ Департаментѣ Министерства Внутр Дѣлъ. Воспользоваться этими отзывами для обнародованія ихъ въ моемъ сочиненіи мнѣ лично разрѣшено Г. Директоромъ Медицинскаго Департамента.

ИСТОРІИ БОЛѢЗНИ.

Представляя на слѣдующихъ страницахъ своей клинической матеріалъ, состоящій изъ 94 исторій болѣзни, считаю необходимымъ предпослать имъ нѣсколько словъ.

Ради сбереженія мѣста допущены нѣкоторые сокращенія въ письмѣ.

Такъ температура изображается одною буквою *t*°. При ваннахъ необозначено температуры ихъ,—всегда назначались ванны въ 29° R, кромѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ это указано въ текстѣ. Частота пульса и дыханія въ минуту обозначается просто словами „пульсъ“ столько-то, „дых.“ столько-то.

При назначеніи хвойника обозначено только „infusum erphedrae“ и „inf—decoctum (erphedrae)“ изъ такого-то количества травы „на сутки“—слѣдуетъ разумѣть infusum и infuso—decoctum erphedrae vulgaris изъ указанного количества травы на 200,0—300,0 solaturae для приѣмовъ раздѣльными дозами втеченіи сутокъ. При другихъ средствахъ (морфій, кодеинъ, сенега) не всегда обозначена доза, — надо разумѣть обычные дозы этихъ средствъ.

Тамъ, гдѣ не указано порціи пищи, слѣдуетъ подразумевать „2-ая порція съ жаркимъ, полъ кружки молока“, чего я придерживался почти во всѣхъ случаяхъ.

Въ описаніяхъ плеврита не указано, первый или второй разъ больной переноситъ эту болѣзнь; надо помнить, что всѣ описанные мною случаи (кромѣ LIV, гдѣ это указано) заболевания первый разъ.

Также опущены въ исторіяхъ болѣзни результаты изслѣдованій мочи больныхъ плевритомъ на реакцію Эрлиха; такъ какъ эта реакція даетъ положительный результатъ помимо различныхъ болѣзней при бугорчаткѣ, то я прибѣгалъ къ этой реакціи у всѣхъ больныхъ плевритомъ, — вездѣ получился отрицательный результатъ кромѣ одного случая (II), гдѣ это отмѣчено въ текстѣ.

Для опредѣленія высоты выпота я пользовался двумя линиями—лопаточной и передней подмышечной, а какъ опредѣленной точкой для обозначенія этой высоты пользовался нижнимъ угломъ лопатки сзади и ребрами спереди. Въ исторіяхъ болѣзни высота выпота просто указана словами „сзади съ угла лопатки“ (по лопаточной линіи съ нижняго угла лопатки до низу притупленіе звука), „сзади на 4 пальца выше угла“ (по лопаточной линіи на 4 пальца выше нижняго угла лопатки и до низу притупленіе звука). Точно также просто сказано „по подмышечной“, слѣдуетъ разумѣть „по передней подмышечной линіи“.

І ГРУППА.—КРОНШТАДТСКІЙ ГОСПИТАЛЬ.

А. 10 случаевъ остраго суставнаго ревматизма; леченіе хвойникомъ.

І. Машинный квартирмейстеръ Авонасій К. 27 лѣтъ. Поступилъ въ госпиталь 7 января 1894 г., выписанъ 9 марта того-же года. Одинъ разъ уже перенесъ эту болѣзнь. Заболѣлъ 5 января болями въ правомъ локтевомъ и плече-ключичномъ сочлененіяхъ; измѣненій въ очертаніи суставовъ нѣтъ. Сердце нормально. Аппетита нѣтъ, стулъ исправенъ. t° 37,9, вечеромъ 38 $^{\circ}$, 5. 9 января. Сильная боль съ вечера въ паховой и въ поясничной областяхъ. Не спалъ ночь. Herpes labialis. Назначено: Morphii pur. 0,01 порошекъ на ночь; ванна, 2-я порція съ жаркимъ. T° 38,2—38,6. 10 января. Боли по прежнему, спалъ плохо, не потѣлъ, t° 38,4—39,1. Назначено: Infusio ephedrae vulgaris изъ 10,0 на сутки часовыми приемами. 11. Въ поясницѣ болей нѣтъ. Сильная боль въ суставахъ правой руки и голеностопныхъ; спалъ плохо, потѣлъ, t° 38,3—38,9. Ванна. 12. Съ 12 часовъ ночи чувствуетъ себя хуже. Языкъ обложенъ, стула 2 дня не было, t° 38,4—39,1. Ol. Ricini 30,0. Клизма. Прибавлено $\frac{1}{4}$ кружки молока. 13. Ночью сильныя боли не даютъ спать, теперь легче — поднимаетъ правую руку. Не потѣлъ, t° 38 — 39. 14. Появились ночью боли и небольшая припухлость въ лучезапястныхъ суставахъ; прежнія боли in statu. Не потѣлъ, t° 37,8—39. Ванна. 15. Боли въ правой кисти и всей рукѣ меньше; въ лѣвомъ плечевомъ суставѣ появился сильныя боли; ноги сильно болятъ. Спитъ плохо, t° 37,9—38,6. Назначено: принимать всю порцію хвойника въ 1 приемъ на ночь. 16. Правое лучезапястное сочлененіе опало, боли небольшія; въ голеностопныхъ суставахъ небольшая боль, опухоли нѣтъ. Ночью не сильно потѣлъ, чувствуетъ себя лучше, t° 37,9—39,6. 17. Боли въ лѣвой рукѣ прошли, опять боли въ правой кисти, здѣсь неболь-

шая припухлость. Ночью сильно потѣлъ. Аппетитъ плохъ. Назначено: *t-rae chinae compositae* по 20 кап. 2 раза въ день, t° 37,8—38,9. 18. Затрудненіе мочеиспусканія и боли въ мочевомъ пузырьѣ; ноги болятъ меньше, t° 37,4—38,6. Ванна. 19. Боли въ лѣвой рукѣ меньше; чувствуетъ себя хорошо послѣ ванны; ночью потѣлъ не сильно. Мочеиспусканіе нормально, t° 37,3—38,6. 20. Потѣлъ не сильно. Назначено давать *inf-decostum ex 5,0* на одинъ приемъ. 21. Порядочно потѣлъ, боли значительно меньше, держатся въ лѣвомъ плечевомъ суставѣ, t° 37,6—38,2. 22. Боли и припухлость въ правомъ лучезапястномъ сочлененіи. Порядочно потѣлъ. Ванна, t° 37,6—38. 23. Чувствуетъ себя гораздо лучше; боль въ лучезапястномъ суставѣ незначительна. Сидитъ. Ночью сильно потѣлъ, t° 37,4—37,9. 24 и 25. T° пала вечеромъ до 37,7. 26. Появились боли въ области лѣваго голеностопнаго сустава и въ поясницѣ. Не потѣлъ, t° 37,3—38,3. Въ слѣдующіе дни боли продолжаются то въ одномъ, то въ другомъ суставѣ, несмотря на назначеніе съ 1-го февраля массажа. Съ 4-го февраля больному давалось по 8,0 травы въ настои-отварѣ въ 3 приема 15 дней. 14 февраля болѣе нигдѣ нѣтъ. 15. Незначительная въ лучезапястныхъ суставахъ. 16. При стояніи боли въ ногахъ; въ рукахъ слабость. 21. Съ ночи боль во внутреннемъ мышцѣкѣ праваго голеностопнаго сустава. Назначено: *inf-dec. ex 5,0* на сутки. 25. Боли при движеніи въ ногахъ. Хвойникъ отмигнуть. 2 марта. Незначительная боль въ грудино-ключичномъ сочлененіи. 6. Поправляется. 9. Выписанъ. T° съ 27 января была все время нормальная отъ 36,8 до 37,4 утромъ и отъ 37,5 до 37,8 вечеромъ. Кривыя пульса и дыханія шли почти параллельно. Пульсъ 12 января поднялся до 78, 15-го опустился до 54, 19-го снова поднялся до 74, къ 27-му до 84: съ 28 января былъ нормаленъ по 5 февраля; 6-го 80; отъ 12-го до 15-го—60; 17-го 84; затѣмъ колебался отъ 60 до 70. Число дыханій колебалось около 90 до 17 января, когда поднялось до 108, затѣмъ выскѣлъ съ паденіемъ t° пало и держалось до 18 февраля около 96; затѣмъ до конца колебалось около 90. Кривыя мочи и удѣльнаго вѣса ея были совершенно параллельны, а также кривая, показывающая суточное количество потребляемой жидкости. Количество мочи 18 января 1000 кс. за сутки, медленно поднималось, достигнувъ 22-го до 1400 кс., а 26-го—2200 кс., затѣмъ колебалось отъ 1000 кс. до 2000 кс.; 15-го

и 16-го февраля достигло 2500 кс., даѣе опять колебалось отъ 1000 кс. до 2000 кс., дѣлая крупные размахи. Вѣсъ тѣла, измѣряемый послѣ паденія t° съ 24-го января, медленно, но непрерывно повышался до послѣдняго дня: начиная со 139 ф. до 155 ф. въ день выписки. Большой выписанъ здоровымъ; сердце осталось непораженнымъ втеченіе болѣзни.

II. Воспитаникъ Кронштадтской Фельдшерской школы Николай С. 16 лѣтъ. Прибылъ 18 февраля, выписался 3 марта 1894 года. Уже перенесъ суставной ревматизмъ лѣтомъ 1893 года. Съ тѣхъ поръ осталось сердцебіеніе. 19 февраля. Захворалъ въ среду 16 февраля сердцебіеніемъ и болью въ ногахъ. Оба колѣна болѣзненны при давленіи и покоѣ; очертанія суставовъ измѣнены, *patellae* подвижны. Границы сердца нормальны; 1-ый тонъ у верхушки замѣненъ шумомъ, 2-ой неясенъ. Ночью немного потѣлъ. t° 38,8—38,7. Пульсъ 104, дыханій 28. 20. Пульсъ 96, дых. 32. Не потѣлъ, спалъ хорошо. Боли по старому. t° 38,6—38,9. Назначена перевязка суставовъ бѣлымъ масломъ съ хлороформомъ. Молочная порція. 21. Не потѣлъ. Пульсъ 104, дых. 36. Боли въ колѣняхъ меньше. t° 38,6—38,4. Назначено *inf-decostum erpethrae ex 5,0* на сутки въ 3 приема. Ванна 29 $^{\circ}$ R. 22. Пульсъ 100, дых. 34. Въ колѣняхъ почти нѣтъ болѣзненности, не потѣлъ, t° 38,3—38. 23. Пульсъ 88, дых. 32. Боли въ колѣняхъ нѣтъ, не потѣлъ; сердце *in statu*, t° 37,3—38. 24. Боли и измѣненія очертаній суставовъ нѣтъ; не потѣлъ. Пульсъ 98, дых. 28. t° 36,8—36,8. 25. Пульсъ 90, дых. 18. t° 36,5—36,8. Слѣдующіе дни t° нормальна; болѣе нигдѣ нѣтъ. Пульсъ къ 27-му упалъ до 76, а къ 1-му марту опять поднялся до 94. Число дыханій къ 28 февраля поднялось до 24. 2 февраля хвойникъ отмигнутъ. Больной выписанъ съ тѣми же измѣненіями въ сердцѣ. Количество мочи до 23 февр. было 400—450 кс. за сутки, къ 24-му поднялось до 750, а къ 27-му до 1000 кс. и такъ держалось до конца.

III. Рядовой 147 Самарскаго полка Григорій Е. 23 лѣтъ. Поступилъ 24 февраля, выписанъ 13 марта 1894 года. 25. Больной лежалъ въ Петергофскомъ лазаретѣ острымъ суставнымъ ревматизмомъ съ 15 дек. 1893 г. по 15 февраля 1894 г.; лечили компрессами и хининомъ. 17 февраля опять распухло колѣно лѣвой ноги, правый лучезапястный суставъ и сочлененія пальцевъ лѣвой ноги. *Sttus praesens*: тѣ же измѣненія

суставовъ. Границы сердца—сверху 3-е ребро, слѣва сосковая линия, справа нормальна; 1-й тонъ у верхушки замѣненъ шумомъ. Пульсъ 86, дых. 32. t° 37,5—38,3. Назначено inf-dec. ephedrae черезъ 2 часа изъ 10,0 на сутки. Перевязка суставовъ деревяннымъ масломъ и ватой. 2-я порція съ жаркимъ. 26. Пульсъ 90, дых. 34. Не потѣлъ. Стулъ былъ, языкъ чистый, аппетитъ хороший. Боли въ пальцахъ ноги прошли, колѣно по старому; лучезапястное сочлененіе гораздо меньше болитъ; появилась боль въ пальцахъ правой руки. t° 37,6—38,6. 27. Пульсъ 80, дых. 28. Ночью ломило колѣно, теперь гораздо лучше. Въ пальцахъ правой руки боли держатся; появилась боль въ локтѣ. Не потѣлъ. Границы сердца нормальны, 1-й тонъ съ шумомъ. Стула не было. t° 37—37. 28. Пульсъ 80, дых. 30. Боли въ колѣнѣ значительно меньше; рука совѣтъ не болитъ, припухлость опала. Не потѣлъ. t° 36,8—37,5. 1 марта. Пульсъ 72, дых. 24. Не потѣлъ. Немного ломило суставы ночью, теперь болѣе нѣтъ даже при давленіи; очертанія колѣна нормальны. t° 37,8—37,7. 2. Пульсъ 66, дых. 24. Потѣлъ, небольшія боли ночью. t° 36,8—37,4. 3. Ночью ощущение зуда въ колѣнѣ; немного потѣлъ. Пульсъ 68, дых. 30. t° 36,7—37,2. Перевязку съ суставовъ снять, inf-dec. давать изъ 8,0 на сутки. Ванна. Далѣе t° нормальна до конца; больной жалуется на зудъ въ колѣнѣ и боли при хожденіи въ немъ. Въ сердцѣ по прежнему 1-й тонъ замѣненъ шумомъ. 8. Хвойникъ оставленъ. 9. Больной чувствуетъ себя здоровымъ. Пульсъ 5-го числа 56, затѣмъ, постепенно повышался, достигъ 10-го числа 74, а къ 13-му опять упалъ до 56. Число дыханій колебалось отъ 27 до 30. Кривыя мочи и удѣльнаго вѣса ея совершенно параллельны. Количество мочи 25 и 26 февраля было за сутки по 1150 к.; 28-го поднялось до 1600 к. и держалось около этой цифры съ небольшими колебаніями до конца. Вѣсъ тѣла съ 5 марта (135½ ф.) постепенно повышался, достигнувъ въ день выписки 14 марта 141 фунтовъ. Съ 1-го марта по 8-ое больной каждую ночь немного потѣлъ. Выписанъ съ тѣми же измѣненіями въ сердцѣ на 25-й день болѣзни.

IV. Рядовой Григорій Е. 22 лѣтъ. Прибылъ 24 февраля, выписанъ 24 марта 1894 года. Лежалъ въ Госпиталѣ съ 5 февраля по 21 съ острымъ суставнымъ ревматизмомъ; по выходѣ изъ Госпиталя ноги въ тотъ же день опять заболѣли. 25 февраля. Припухли оба колѣнные сустава, очертанія ихъ

рѣзко измѣнены; правый голеностопный припухъ съ внутренней стороны. Границы сердца нормальны, 1-й тонъ у верхушки нечистъ. Аппетитъ плохъ, стулъ задержанъ. t° 38,3—38,6. Назначено: Ol. Ricini 30,0. Перевязка суставовъ дерев. масломъ и ватой. Inf-dec. ephedrae черезъ 2 часа изъ 10,0 на сутки. Пульсъ 84, дых. 26. Количество мочи 1500 к. с. за сутки. 26. Пульсъ 86, дых. 28. Не потѣлъ. Боль въ лѣвомъ колѣнѣ меньше, въ правомъ по старому; появилась боль въ пальцахъ лѣвой стопы, припухлости нѣтъ. Ванна. t° 37,7—37. Количество мочи за сутки (за 26-е число) 2750 к. с. 27. Ночью потѣлъ. Пульсъ 78, дых. 30. Боли нѣсколько меньше. t° 37,5—37,5. Мочи за сутки 1350 к. с. 28. Не потѣлъ. Пульсъ 68, дых. 26. Боли въ лѣвомъ колѣнномъ сгибѣ и въ пальцахъ лѣвой ноги. Опухоль колѣнныхъ суставовъ опала. Въ лѣвомъ паху — увеличенная болѣзненная железа. t° 37,0—37,2. Количество мочи за сутки 2700 к. с. 1 марта. Боли въ суставахъ нѣтъ ни при покой, ни при давленіи. Не потѣлъ. Ванна. 3. Ввѣра появилась боль въ правомъ голеностопномъ суставѣ; припухлость здѣсь по старому. Въ паху боль меньше. 4. Боли въ голеностопномъ суставѣ исчезли; не потѣлъ. Въ колѣнныхъ боль при давленіи и ходьбѣ. Снять повязку съ суставовъ. Назначено inf-dec. изъ 8,0 на сутки и массажъ. 6. Ночью были боли въ правомъ плечевомъ суставѣ. 8. Боли въ лѣвой голени ночью, колѣни ноютъ. 9. Обѣ голени ноютъ, трудно ходить. 11. Боли въ голеняхъ; inf-dec. принимать изъ 4,0 на сутки. 13. Тоже. 1-й тонъ въ сердцѣ глуховатъ; ванна. 14. Ночью сильно ломили ноги. 15. Ломота въ голеностопныхъ и колѣнныхъ суставахъ. 18. Ломоты нѣтъ; слабость при ходьбѣ. Хвойникъ оставить. 19. Съ ночи ноютъ суставы рукъ. 22. Ломота въ правомъ голеностопномъ суставѣ. Ванна. 23. Ломоты нѣтъ; слабость въ ногахъ. 24. Тоже. Выписанъ. 1-й тонъ въ сердцѣ глухъ. t° колебалась съ 1-го марта до конца отъ 36,4 до 37,5. Количество мочи 2 марта 1500 к. с.; 5-го—800 к. с.; слѣдующіе дни держалось на 1400 к. с.; 13-го поднялось до 2200 к. с.; 14-го—1150 к. с.; затѣмъ, постепенно уменьшаясь, дошло 20-го до 400 к. с. и опять поднялось къ 22-му до 1000 к. с. Совершенно параллельно съ кривой количества мочи идетъ кривая уд. вѣса и кривая количества принимаемой за сутки жидкости. Пульсъ 2 марта 60, 3-го—76, держится около 70, 9-го поднялся до 88, къ 16-му опустился до 70; 17-го—86,

18-го—72 и около 70 колеблется до конца. Кривая числа дыханий совершенно параллельна кривой пульса. Выписанъ на 81-й день болѣзни. Всѣ тѣла съ 5-го марта (142 ф.) постепенно поднялся ко двю выписки до 150 ф.

V. Кочегаръ Карлъ С. 22 лѣтъ. Прибылъ 27 февраля, выписанъ 19 марта 1894 года. Уже перенесъ острый суставной ревматизмъ въ сентябрѣ 1893 г., лечился салициловой кислотою (см. ниже). 27. Болень 3-й день опухолью и болью въ колѣнныхъ суставахъ. Послѣдніе измѣнены въ очертаніяхъ, горячи; чашки подвижны. Языкъ чистъ, стулъ нормален; не потѣеть. Сердце нормально. t° 37,8—38,6. 28. Пульсъ 82, дых. 22. Не потѣеть, стула нѣтъ 2 дня. t° 37,9—38,6. Назначено: Ol. Ricini 30,0. Перевязка суставовъ деревяннымъ масломъ и ватой. Молочная порція. 1. Пульсъ 88, дых. 24. 2 раза жидкій стулъ. Не потѣлъ. Боли по прежнему. t° 38,0—38,4. 2. Пульсъ 84, дых. 24. Не потѣлъ. Тѣже боли. Границы сердца нормальны; 1-й тонъ у верхушки сопровождается шумомъ душаго характера. Назначено Inf-des ephedrae черезъ 2 часа изъ 10,0 на сутки. t° 37,9—38,1. 3. Пульсъ 90, дых. 26. Ночью появились боли въ правомъ голеностопномъ суставѣ; въ немъ снаружи краснота. Не потѣлъ. t° 37,8—38,1. 4. Пульсъ 88, дых. 18. Болей въ голеностопномъ суставѣ нѣтъ; колѣни немного болятъ, очертанія приближаются къ нормѣ. Не потѣлъ. t° 37,6—38,3. Ванна. 5. Болей въ колѣняхъ нѣтъ; заболѣли ночью оба большіе пальца на обоихъ стопахъ. Пульсъ 86, дых. 24. Не потѣлъ. t° 37,7—37,6. 6. Пульсъ 76, дых. 24. Боли держатся въ большихъ пальцахъ. Очертаніе колѣня нормально. Не потѣлъ. Въ сердцѣ тоже. t° 37,1—37,6. 7. Пульсъ 84, дых. 24. Болей нѣтъ въ пальцахъ, опухоль исчезла; препятствие при сгибаніи въ колѣнныхъ сгибахъ. Принимать infuso-decostum изъ 8,0 на сутки. t° 37,2—37,7. 2-я порція съ жаркимъ. 8. Боли при движеніи въ колѣняхъ. 11. Боли немного меньше. Inf-des. изъ 4,0 на сутки. Ванна. 13. Появились боли въ правомъ лучезапясномъ суставѣ, опухоли нѣтъ. Ходить больно. Inf-dec. изъ 8,0 на сутки. 14. По прежнему. 15. Боли въ лучезапясномъ суставѣ незначительны; въ колѣняхъ нѣтъ. 18. Хвойникъ оставить. 19. Сердце по прежнему. Выписанъ здоровымъ на 23-й день болѣзни. t° съ 7-го числа постепенно поднималась до 37,9—10-го числа, затѣмъ колебалась отъ 37,2 до 37,5. Пульсъ, постепенно учащаясь, дошелъ

12-го до 98, къ 16-му упалъ до 80, съ какимъ больной выписанъ. Число дыханій увеличивалось совершенно параллельно пульсу, но maximum'a (32) достигло 11-го числа, далѣе параллель сохранялась. Количество мочи, начиная отъ 850 кс. за сутки 28 февраля, постепенно поднималось и достигло 2000 кс. за 7 марта; къ 9-му упало до 1400 кс., держалось такъ 4 дня, поднялось 14-го до 1750 кс. и около этой цифры колебалось до конца. Кривая уд. вѣса мочи параллельна кривой количества. Всѣ тѣла съ 5-го числа (125 ф.) очень умеренно повышались до 128 ф.—19-го марта. Больной никогда не потѣлъ.

VI. 2 Кронштадтскаго батальона рядовой Матвій К. 21 года. Прибылъ 27 марта, выписанъ 10 апрѣля 1894 г. 1-й разъ въ Госпиталѣ. 27. Заболѣлъ 23 марта болью въ обоихъ колѣнныхъ и голеностопныхъ суставахъ. Оба колѣна горячи, очертанія измѣнены; голеностопные суставы тоже припухли оваружи. Сильныя боли. Кашель начался недѣлю назадъ; въ легкихъ никакихъ измѣненій. Сердце нормально. t° 39,4. 28. Тоже. Пульсъ 96, дых. 22. Перевязать суставы ватой. Молочная порція. t° 38,3—39,8. 29. Пульсъ 96, дых. 28. Боли меньше, не потѣлъ. Измѣненіе очертаній и жаръ по прежнему. t° 38,3—39,6. Назначено: Inf-des. ephedrae черезъ 2 часа изъ 10,0 на сутки. 30. Боли при покоѣ нѣтъ; при вставаніи болѣ. Припухлость и боль въ 2 пальцахъ лѣвой кисти. t° 37,6—38,3. 31. Болей нигдѣ нѣтъ при покоѣ; при ходьбѣ небольшая боль. Припухлость въ пальцевыхъ суставахъ держится. Пульсъ 72, дых. 20. t° 37,4—37,7. Inf-dec. изъ 8,0 на сутки. 1 апрѣля. Въ пальцахъ руки боли прошли, опухоль исчезла. t° 37,1—37,8. Краснота и припухлость оланстой гартани; охриплость недѣли 3. 2. Хвойникъ оставить. 3. Незначительная боль при ходьбѣ. 9. Боли нѣтъ. 10. Выписанъ на 18-й день болѣзни. Температура съ 2 апрѣля колебалась отъ 37 $^{\circ}$ до 37,5 до конца. Пульсъ 1 апр. 64, 3 апр. 56, затѣмъ, постепенно повышаясь, достигъ 76—8 апр.; 9-го 60. Число дыханій 1—5-го числа 24; 6—10-го 28. Количество мочи съ 29 апр., когда было 600 кс. за сутки, постепенно увеличивалась, дошло до 2150 кс. 4 апрѣля; 5-го 1300 кс. и на этой цифрѣ держалось до конца. Уд. вѣс мочи 1,025 29 апрѣля; кривая совершенно параллельна кривой количества мочи и кривой количества потребляемой въ сутки жидкости. Всѣ тѣла 28 апрѣля 149 ф.; 2 апрѣля

140 ф. и съ незначительными колебаніями такъ держался до конца.

VII. Кочегаръ Матвѣй М. 23 лѣтъ. Прибыль 23 марта, выписанъ 14 іюня 1894 года. 23. Прежде ревматизма никогда не было. Заболѣлъ вчера болями въ колѣняхъ, особенно правомъ, въ лѣвомъ голеностопномъ и лѣвомъ лучезапястномъ суставахъ; въ другихъ суставахъ боли меньше. Лѣвый колѣнный суставъ горячъ. Лѣвый голеностопный и лучезапястный припухши. Аппетита нѣтъ, языкъ чистый. Назначено: Inf-dec. еrhdrae черезъ 2 часа изъ 10,0 на сутки; перевязка деревяннымъ масломъ и ватою. Молочная порція. t° 38,7—39,5. Сердце нормально. 24. Пульсъ 104, дыханіе 28. Не потѣлъ. Боли появились и въ правомъ лучезапястномъ суставѣ, припухлости нѣтъ; въ прежнихъ мѣстахъ по старому. t° 38,7—39,5. 25. Боли меньше; дыханіе 26. Пульсъ не ощущается вслѣдствіе припухлости суставовъ. t° 38,9—39,1. 26. По старому. t° 38,1—38,7. 27. Новыхъ поражений нѣтъ. t° 38,4—38,7. 28. Боли въ лучезапястныхъ суставахъ по старому; въ лѣвомъ плечевомъ тоже. Въ суставахъ ногъ нѣтъ болей при покое и давленіи. Порядочно потѣлъ. Аппетитъ нормальный. t° 38,5—38,8. 29. Боли въ кистяхъ меньше; ломота въ колѣнныхъ суставахъ, небольшой потъ. t° 38,7—39,3. 30. Спать лучше. Сильныя боли въ правой кисти и ногахъ. Не потѣлъ. Сердце безъ измѣненій. Inf-dec. изъ 15,0 на сутки. t° 38,8—39,5. 31. Немного потѣлъ. Боли во всей лѣвой рукѣ, особенно лучезапястномъ суставѣ. Боли въ правой кисти меньше. t° 38,6—39,4. 2-ая порція съ жаркимъ, $\frac{1}{2}$ кружки молока. 1 апрѣля. Боли въ ногахъ нѣтъ; въ лучезапястныхъ и плечевыхъ суставахъ сильныя боли; не потѣлъ. t° 39—39,4. Хвойникъ оставить. Назначено natri salicyl. 0,6 6 порошковъ въ день. 2. Боли въ рукахъ по старому. Не потѣлъ. Плохо спалъ. t° 38,5—39,1. Ванна. 3. Боль уменьшилась, спать хорошо; не потѣлъ. Отекъ обѣихъ стопъ. t° 38,4—38,6. 4. Боль въ лѣвой кисти держится; сильная—въ плечевыхъ суставахъ; правая кисть здорова; ноги почти не болятъ; плохо спать. t° 38,1—38,2. 5. Сильная боль въ правомъ локтѣ и плечѣ, въ лѣвомъ меньше. Не потѣлъ. t° 38,1—38,7. 6. Сильныя боли въ суставахъ правой руки, въ лѣвой меньше. Не потѣлъ. Границы сердца нормальны; 1-ый тонъ у верхушки не чистый. t° 37,9—38,3. 7. Боль въ правой кисти. Въ обѣихъ кистяхъ тылъ отеченъ;

боль въ колѣняхъ; голеностопные суставы почти нормальны. Тылъ лѣвой стопы отеченъ. Пульсъ 72, дыханіе 28. t° 37,8—38,6. Natri salicyl. 0,9—6 порошковъ. 8. Боли въ лѣвой кисти. Въ плечахъ затруднено движеніе. Не потѣлъ, спать плохо. t° 38—38,7. N. Salicylio. 1,2 6 порошковъ. 9. Пульсъ 80, дыханіе 20. Боль въ лѣвомъ локтѣ и плечѣ, въ правомъ колѣнѣ. t° 37,9—37,5. 10. Немного потѣть. Боли держатся. t° 37—37,2. 11. Боли нигдѣ нѣтъ. Слабость. Салиц. натра 0,6—6 порошковъ. Ванна. t° 37,2—37,1. Затѣмъ t° нормальна, болей нѣтъ. 3 порошка въ день салициловаго натра. 14. Снова боли въ обѣихъ голеностопныхъ суставахъ, припухлости у внутреннихъ мышечкѣвъ. Перебои. 1-й тонъ въ сердцѣ нечистый. t° 37,1—37,9. Назначено 6 порошковъ салициловаго натра. t° 15-го 38,4; 18-го 38,8; къ 21 ому упала до 37,7; 23-го 38—38,9; 24-го 38,2—38,6; 25-го 37,6—38,2; 26-го 37,7—37,6; 27-го 37,1—37,9; 28-го 37,3—37. Далѣе недѣли 2 t° колебалась отъ 37 до 37,5 и наконецъ установилась на 37°. Все это время боль держалась въ лучезапястномъ суставѣ при покое, въ плечевыхъ, локтевыхъ и колѣнныхъ суставахъ при движеніи. 22-го числа появился шумъ въ ушахъ и жидкій стулъ; салициловаго натра назначено 3 порошка. 23—опять боли въ ногахъ. 1 мая. 1-ый тонъ въ сердцѣ замѣненъ шумомъ. 2. Заболѣлъ правый голеностопный, лѣвый тазобедренный суставы. 4. Ноги болятъ при ходбѣ, боль въ шеѣ, въ плечевыхъ суставахъ. 16. Ломота въ рукахъ временами, боль при движеніи; ноги здоровы. 21. Боли въ плечахъ при движеніи; суставы ногъ нормальны. 24. Отправленъ для поправленія на дачу. Въ сердцѣ 1-й тонъ съ шумомъ. Выписанъ 14 іюня хорошо поправившимся на 85-ый день болѣзни. Пульсъ вмѣстѣ съ повышеніемъ t° 16 апрѣля поднялся до 96, около этой цифры держался нѣсколько дней и уже 23-го числа упалъ до 80, а къ 6-му маю до нормы, затѣмъ колебался около 60 до конца. Число дыханій колебалось отъ 18 до 24 во время повышенія температуры и дней 10 еще, затѣмъ держалось около 20. Кривыя количества мочи и ея удѣльнаго вѣса совершенно параллельны, какъ и въ другихъ случаяхъ. Количество мочи 24 марта 1700 к. с., уже 25-го—2700 к. с., а 26-го 1300 к. с.; къ 29-му поднялось до 3000 к. с., къ 1-му апрѣля постепенно упало до 1500 к. с. и держалось около этой цифры до 6-го числа, когда увеличилось до 2800 к. с.; вмѣстѣ съ па-

денієм t° упало къ 11-му до 1,300 к. с., къ 14-му поднялось до 3200 к. с., а къ 22-му упало до 1000 к. с. Послѣ паденія t° повысилось 1-го мая до 2100 к. с. и колебалось отъ 1500 к. с. до 2500 к. с. до конца.

VIII. Матросъ Владиміръ В. 22 лѣтъ. Прибылъ 3 апрѣля, выписанъ 1 іюня 1894 года. Ноги ломаютъ уже года два. 3. Заболѣлъ вчера болями въ ногахъ, вчера въ правой, сегодня въ лѣвой. Голеностопные суставы сильно болѣзненны и припухши; колѣнные мало измѣнены въ очертавіяхъ. При движеніи боль въ правомъ плечѣ и бокахъ. Сердце нормально. Не потѣлъ. Стулъ нормальный. t° вечеромъ 39,8. Назначено: inf-dec. ephedrae черезъ 2 часа изъ 10,0 на сутки. Перевязка суставовъ масломъ и ватою. 4. Пульсъ 84, дыханіе 33. Боли держатся; прибавилась въ тазобедренныхъ суставахъ; снадь плохо, не потѣлъ. t° 38,6—39,4. Молочная порція. 5. Пульсъ 80, дых. 48. Боль по старому; ночью сильно потѣлъ. Аппетита нѣтъ. t° 38,4—39,8. 6. Боли въ колѣняхъ остались при движеніи, въ тазобедренныхъ и плечевомъ правомъ держится. Спаль плохо, не потѣлъ. Небольшой кашель. Пульсъ 80, дых. 30. t° 38,6—38,8. Назначено: Decoctum Senegae ex 8,0—200,0, liq. amn. anis. 4,0—4 ложки въ день. 2-ая порція съ жаркимъ, $\frac{1}{2}$ лимона. 7. Пульсъ 64, дых. 26. Сильная боль въ правомъ плечѣ и во всей правой рукѣ; въ ногахъ меньше. Сердце нормально. t° 38—38,8. Inf-dec. изъ 15,0 на сутки. 8. Пульсъ 72, дых. 40. Боль въ правомъ плечѣ и кисти сильная. Спаль хорошо, сильно потѣлъ. t° 38,7—38,6. 9. Пульсъ 68, дых. 32. Отъ сильной боли не спалъ, не потѣлъ. Въ лѣвой рукѣ и ногахъ боли нѣтъ. t° 38,2—38,4. 1-ый тонъ въ сердцѣ нечистый. 10. Боли въ обѣихъ кистяхъ и плечахъ. Немного потѣлъ. Въ ногахъ—затрудненіе при движеніи. t° 38,1—38,4. 11. Прибавилась боль въ лѣвой стопѣ; немного потѣлъ. t° 38,3—38,2. 12. Въ лѣвой кисти боли меньше. Потѣлъ. t° 38—38,1. 13. Пульсъ 52, дых. 24. Ночью сильно потѣлъ. Небольшая боль въ правомъ плечѣ; голеностопный суставъ чувствителенъ къ давленію. t° 37,6—37,5. Назначено Inf-dec. изъ 10,0 на сутки. Ванна. Затѣмъ температура колеблется отъ 36,6 до 37,6—37,7 втеченіе 30 дней. Въ правомъ плечѣ боль при движеніи, ночью ломота; при покоѣ ломота въ правомъ лучезапястномъ сочлененіи; въ ногахъ (колѣнныхъ и голеностопныхъ) боль при движеніи. Припухлость праваго голеностопнаго су-

става держится. Съ 27 октября больной получаетъ inf-dec. ephedrae изъ 8,0 на сутки. 17, 18, 19 и 20 апрѣля б. потѣлъ ночью; затѣмъ пота никогда не было. 29 и 30 апрѣля боль въ правомъ плечевомъ суставѣ усилилась; въ другихъ суставахъ ломота временами. Назначено inf-dec. изъ 5,0 на сутки. Декотъ сенегги оставить. 4. По старому; ноги ломаютъ ночью. Градусы сердца нормальны; 1-ый тонъ съ шумомъ. Inf-dec. изъ 8,0 на сутки. 6. Опухъ правый голеностопный суставъ. 7. Опухоль опала послѣ перевязки сустава. 11. Зрачки расширены (при разсѣянномъ свѣтѣ). По старому. Одышка. Въ легкихъ нѣтъ измѣненій, капля нѣтъ. Боль въ грудныхъ мышцахъ. Постоянныя жалобы на колотье въ правомъ плечѣ. 16. Назначено принимать Inf-dec. изъ 10,0 на сутки. Ванна. 18. Вчера была одышка и сердцебіеніе. (Одышка бывала и раньше при сильномъ бѣгѣ). Хвойникъ оставить. 19. Колитъ бокъ и плечо; ноги ломаютъ постоянно. Тоже самое и дальше, временами приступы сердцебіенія. Зрачки б. ч. нѣсколько расширены. Температура съ 11 мая до конца колебалась около 37°. 25-го опять назначено inf-dec. ephedrae изъ 10,0 на сутки. Ванна; массажъ суставовъ. Ломота въ плечѣ и ногахъ продолжается; при давленіи на голеностопный суставъ боль. 30. Правое плечо даетъ поднимать руку, не ломить; въ стопахъ небольшая ломота. Одышка уменьшилась. Въ сердцѣ то же. 1 іюня хвойникъ оставить. Небольшая боль въ плечѣ и ногахъ держится. Выписанъ въ такомъ состояніи. Пульсъ съ 15-го октября (50) постепенно участился до 76 къ 22-му; нѣсколько колебался достигъ 6 мая 80; опять колебался около 70 и къ 24-му мая участился до 84; затѣмъ опять нормальный (70). Число дыханій колебалось отъ 24 до 32, а 17-го и 18 мая (время сильной одышки) достигло 40; 19 и 20—по 24; 21-го опять 40, а 27-го даже 44, затѣмъ ко дню выписки опустилось до 30. Кривыя количества мочи, уд. вѣса ея и количества выпиваемой за сутки жидкости совершенно параллельны. Количество мочи 4 апрѣля 1400 к. с.; 5—8-го около 1900 к. с.; къ 10-му упало до 1000 к. с.; 11-го опять 1950 к. с.; 22-го опять 1900 к. с.; затѣмъ колебалось около этого, а 8 мая достигло 2600 к. с.; слѣдуютъ колебанія отъ 2000 до 2500 к. с.; а съ 20 мая отъ 1600 до 2000 к. с. Всѣхъ тѣла, измѣряемый съ 25 апрѣля (147 $\frac{1}{2}$ ф) постепенно увеличивался, достигнувъ въ день выписки (на 61-й день заболѣванія) 159 ф.

IX. Матросъ Николай Б. 21 г. Прибылъ 25 апрѣля, выписался 10 мая 1894 г. 1-ый разъ въ Госпиталь. 25. Заболѣлъ вчера—бросило въ ознобъ и появилась боль въ голеностопныхъ суставахъ и правомъ колѣнномъ; въ послѣднемъ замѣтна припухлость, сгибаніе сильно затруднено. Сердце нормально. Незначительный кашель; въ легкихъ нѣтъ измѣненій. t° вечеромъ 39,2. 26. Ночь провести плохо вслѣдствіе болей. t° 38,2—39,2. Назначено *inf dec. ephedrae* изъ 10,0 на сутки. Молочная порція. 27. Пульсъ 112, дых. 28. Ночью заболѣлъ лѣвый локтевой суставъ. Порядочный кашель. t° 38,1—38,9. Перевязка суставовъ дерев. масломъ п ватой. *Sibii sulfur*, аур. 0,03, *ammonii chlorati* 0,6 mfr. S. 3 порошка въ день. 28. Пульсъ 116, дых. 30. Боли въ ногахъ только при ходьбѣ; въ плечѣ и локтѣ по старому; сильно потѣлъ. t° 38,8—39,6. Головная боль. Языкъ обложенъ, стула не было, аппетитъ плохъ. Кашель. Въ легкихъ справа около лопатки сухіе хрипы. 29. Пульсъ 104, дыханіе 26. Порядочно потѣлъ. Боли во всей лѣвой рукѣ; въ ногахъ легче; въ правой кисти небольшія боли. Насморкъ. Плохо спалъ. t° 38,4—38,8. 30. Пульсъ 96, дыханіе 24. Головная боль. Въ правомъ лучезапястномъ суставѣ сильная боль и припухлость. Потѣлъ ночью. Стулъ 1 разъ; аппетитъ плохъ. Въ сердцѣ 1-ый тонъ у верхушки съ шумомъ. Принимать *inf dec.* изъ 15,0 на сутки. t° 39—39,1. 1 мая. Головъ легче. Кашель небольшой; потѣлъ. Боли во всей правой рукѣ, въ лѣвой меньше. Не спалъ. t° 38,3—38,4. 2. Боли въ правой рукѣ, въ лѣвыхъ колѣнномъ и голеностопномъ суставахъ. Потѣлъ. Голова не болитъ. t° 38,4—38,8. 3. Въ правой руки болей нѣтъ, въ лѣвой усилились. Ноги не болятъ. Потѣлъ. Въ легкихъ сухіе хрипы. t° 38,3—38,5. 4. Болей нигдѣ нѣтъ, кромѣ лѣваго тазобедреннаго сустава. Границы сердца нормальны, 1-ый тонъ съ шумомъ. t° 37,5—38,2. Ванна. 5. Боль въ лѣвомъ колѣнномъ суставѣ и бедрѣ. Кашель небольшой; немного потѣлъ. Боль въ животѣ и жидкій стулъ. t° 37,6—38,1. Согрѣвающимъ компрессъ на животъ. 6. Пульсъ 56, дыханіе 21. Боль въ правой кисти и лѣвомъ колѣнѣ. Спитъ плохо, не потѣлъ. Стулъ жидкій. t° 37,7—37,8. 7. Ломота меньше. Пульсъ 56, дыханіе 20. t° 37,6—37,5. 8. Ломоты нигдѣ нѣтъ. Боль въ плечахъ и правой кисти при движеніи. Пульсъ 48, дых. 21. Не потѣлъ. t° 37,3—37,2. *Inf dec.* давать изъ 8,0 на сутки. Ванна. 9. Болей нѣтъ и при движеніи.

Пульсъ 52, дых. 22. Не потѣлъ. Зрачки умеренно расширены t° 37—36,9. Оставить хвойникъ. 10. Пульсъ 52, дых. 20. Въ сердцѣ то же. Выписанъ на 17-ый день. Кривизна количества мочи и уд. вѣса ея параллельны. Количество мочи за 27, 28, 29 и 30 числа по 1000 к. с.; колебалась оно поднялось 2 мая до 1300 к. с., 5 мая до 1500 к. с., 7-го до 1750 к. с. 13 мая больной поступилъ въ Госпиталь вторично. t° 39,2. 14. Заболѣлъ въ тотъ же день, когда выписался. Ломили лучезапястные и плечевые суставы. Въ лазаретѣ помазали іодомъ. Теперь боли только при движеніяхъ въ этихъ суставахъ. Пульсъ 56, дых. 18. t° 37,3—37,8. Растираніе суставовъ *linim. volatili*. 2-ая порція съ жаркимъ. 15. Ломота въ лѣвомъ бедрѣ. Пульсъ 58, дых. 18. Не потѣлъ. Назначено *inf dec. ephedrae* изъ 5,0 на сутки. t° 37,3—37,6. 16. Ломота временами. Не потѣлъ. Пульсъ 52, дых. 20. t° 37,2—37,5. 17. Тоже. Пульсъ 52, дых. 22. t° 37,1—37,3. 18. Ломота въ правомъ плечѣ, въ лучезапястныхъ суставахъ боль при движеніи. Не потѣтъ. Пульсъ 48, дых. 20. t° 37—37,2. Болитъ животъ. 19. Пульсъ 52, дых. 16. Не потѣлъ. Жидкій стулъ 1 разъ. Постоянное головокруженіе. t° 36,9—37,2. 20. Зрачки нѣсколько расширены. Не потѣтъ. Стулъ нормальный. Пульсъ 56, дых. 24. t° 36,8—37,1. 21. Появилась боль въ правомъ плечѣ при покоѣ. Пульсъ 70, дых. 26. Не потѣлъ; зрачки по старому. t° 37,7—38,1. 22. 2-ой день головная боль. Не потѣлъ. Пульсъ 82, дых. 16. t° 38—38,5. Зрачки нормальны. 23. Боль въ головѣ, плохо спалъ; не потѣлъ. Пульсъ 70, дых. 26. t° 38,2—38,7. Зрачки нѣсколько расширены. Хвойникъ оставить. 24. Зрачки нормальны. Головная боль не даетъ спать. Въ плечахъ боль при движеніи. Пульсъ 76, дых. 24. t° 38—39,5. 25. Тоже. Боль въ локтяхъ и плечѣ. Не потѣтъ. Пульсъ 80, дых. 22. t° 38,5—39,2. 26. Тоже; порядочно потѣлъ. Пульсъ 96, дых. 24. t° 38,6—39,8. Назначено *Natri salic.* 0,6 3 пор. въ день. 27. Ломота въ лѣвомъ плечѣ и боль при давленіи. Пульсъ 84, дых. 24. DS. 6 порошковъ. t° 38,4—38,6. 28. При покоѣ болей нигдѣ нѣтъ. Пульсъ 76, дых. 18. Не потѣлъ. t° 38,5—38,7. 29. t° 37,6—37. 30. Голова не болитъ. Боль при движеніи въ плечевомъ суставѣ. t° 36,7—37,2. Пульсъ 52, дых. 26. Далѣе t° нормальна. Боли при движеніи. 2 июня 6. Отправленъ на дачу. Выписанъ 22-го числа на 43-й день болѣзни (рецидива). Количество мочи колебалось около 2500 к. с.; 22 мая съ повы-

шеніем t° упало до 1500 к. с., къ 24-му поднялось до 2300 к. с. п., постепенно уменьшаясь, упало въ день паденія t° до 1500 к. с. Кривая уд. вѣса мочи и количества выпиваемой жидкости параллельна кривой мочи. Вѣсъ тѣла повышался съ 18 мая (131 ф.) къ 3 іюня до 140 ф.

Х. Кочегарный квартирмейстеръ Федоръ К. 25 лѣтъ. Прибылъ 8 мая, выписанъ 22 мая 1894 года. 9. Заболѣлъ вчера домою въ колѣнныхъ суставахъ и пяткахъ. Очертанія не измѣнены. Чашки подвижны. При давленіи боли не усиливаются, при движеніи сильнѣе. Не потѣлъ ночью. Языкъ нѣсколько обложенъ. Границы сердца нормальны; вмѣсто 1-го тона у верхушки шумъ. Т° 38,5—39. Пульсъ 108, дых. 28. Ванна. Перевязка суставовъ дерев. масломъ и ватой. 10. Боли въ колѣняхъ нѣтъ и при движеніи. Боль въ груди, кашля нѣтъ; въ легкихъ никакихъ измѣненій. Не потѣлъ. Пульсъ 104, дых. 28. Насморкъ. Т° 39—39,7. Назначено Inf. erpethrae изъ 8,0 на сутки. 11. Ломота ногъ въ стопахъ и лѣвомъ колѣнѣ усилилась. Не спитъ, не потѣлъ. Пульсъ 88, дых. 32. Т° 38,8—38,8. 12. Грудь не болитъ. Ломота въ лѣвой ногѣ по старому. Спаль, умеренно потѣлъ. Пульсъ 88, дых. 36. Т° 38,7—38,9. 13. Ломоты нигдѣ нѣтъ; ходитъ больно. Спаль, не много потѣлъ; стула нѣтъ 2 дня. Пульсъ 84, дых. 28. Т° 38,8—39. Ванна. Клизма. 14. Ломить поясница. Лѣвый лучезапястный суставъ припухъ, очень чувствителенъ къ давленію. Пульсъ 84, дых. 28. Аппетитъ плохъ. Inf. erpethrae давать изъ 10,0 на сутки. Т° 38,4—39,1. 15. Боль въ поясницѣ небольшая. Въ лучезапястномъ суставѣ нѣтъ боли, боль въ пальцахъ лѣвой кисти. Пульсъ 72, дых. 34. Т° 38,3—38,7. 16. Тоже; при движеніи боль въ пальцевыхъ суставахъ и въ лѣвомъ колѣнѣ. Умеренно потѣть. Пульсъ 68, дых. 18. Т° 38—38,5. 17. При покоѣ незначительная боль въ пальцахъ лѣвой руки. Потѣлъ. Пульсъ 68, дых. 32. Т° 37,2—37,7. 18. Незначительная боль при движеніи лѣвой кисти. При давленіи нѣтъ боли. Потѣлъ. Т° 37,3—37,5. 19. Inf. erpethrae давать изъ 8,0 на сутки. Т° 37,1—37,4. 20. Боль при движеніи въ правомъ голеностопномъ суставѣ; немного потѣлъ. Т° 37—37,3. 21. Нигдѣ боли нѣтъ; потѣлъ. Т° 36,9—37,1. 22. Не потѣлъ. 1-й тонъ въ сердцѣ съ шумомъ. Хвойникъ оставить. Выписанъ на 15-й день болѣзни. Пульсъ съ 17-го числа постепенно упалъ до 56—21 мая; число дыханій, тоже пони-

жаясь, дошло до 24. Кривая количества мочи совершенно параллельна кривой уд. вѣса и совершенно расходится съ кривой количества выпиваемой жидкости. Тогда какъ послѣднее постепенно увеличивалось, количество мочи съ 1-го дня (2250 кс.) постепенно уменьшалось и дошло 16-го до 1500 кс. а 20-го до 1000 кс. Больной потѣлъ до послѣдняго дня.

Б. 5 случаевъ подостраго суставного ревматизма; лечение хвойникомъ.

XI. Молодой солдатъ Карлъ К. 23 лѣтъ. Прибылъ 19 апрѣля, выписанъ 16 мая 1894 года. 1-й разъ въ госпиталь. 20. Болеяъ 5-й день. Прежде никогда ревматизма не было. Боль во всей правой рукѣ, сегодня появилась въ лучезапястномъ суставѣ. Тазобедренные, колѣнные и голеностопные суставы болѣзненны; лѣвый голеностопный припухъ. Сердце нормально; аппетита нѣтъ; кожа влажна. Т° 37,5—37,7. Назначено Inf. erpethrae изъ 15,0 на сутки. Перевязка суставовъ дерев. масломъ и ватой. Ванна. Молочная порція. 21. Т° 37,6—37,7. Боли по старому, спалъ плохо. 22. Прибавилась боль въ лѣвомъ плечевомъ суставѣ. Не потѣлъ. Т° 37,2—37,7. 23. Не потѣлъ, боли по прежнему. Т° 37—37,6. 24. Т° 37,1—37,4. 25. Боли по старому. Не потѣть. Спитъ плохо. Т° 37—37,6. 26. Тоже. Т° 37,1—37,4. 27. Боли въ лѣвомъ колѣнѣ и правомъ голеностопномъ суставѣ; въ правой кисти; въ правомъ колѣнѣ боль меньше. 28. Въ правомъ голеностопномъ суставѣ боли нѣтъ. Въ другихъ мѣстахъ по старому. Не потѣть. 29. Небольшія боли въ правой кисти, въ ногахъ меньше. Ванна. 30. Незначительная боль при движеніи въ правой кисти, лѣвомъ колѣнѣ и голеностопномъ суставѣ. Inf. erpethrae изъ 8,0 на сутки. 1. Тоже. Сердце нормально. 2 и 3 тоже; не потѣть. 4. Тоже; при давленіи боли нѣтъ. Inf. erpethrae давать изъ 6,0 на сутки. Ванна. 5 и 6 тоже. Переведенъ въ хирургическое отдѣленіе для вылушенія атеромы на лѣвой щекѣ, отсюда выписанъ 16 мая на 31-й день заболѣванія. Т° съ 27 апрѣля до конца была въ предѣлахъ 36,8—37,4. Пульсъ 72—20 апрѣля, къ 22-му упалъ до 52 и на этой низкой цифрѣ держался до 28 го, когда въ 2 приема достигъ 72 и такъ держался до конца. Кривая числа дыханій параллельна кривой пульса: съ 20 до 26-го по 18, 28-го 24, а 2-го мая даже 23, затѣмъ опять 24. Кривыя количества мочи и уд. вѣса ея совершенно параллельны. Количество мо-

чи 22 и 23-го числа по 900 кс. ступенями поднималось: 24-го 1100 кс., 26-го 1400 кс., 29-го 1700 кс.; затѣм колебалось около 1500 кс. Всѣ тѣла все время были почти одинаковы 140 ф. Большой никогда не потѣлъ.

ХІІ. Матросъ Иванъ О. 21 г. Прибылъ 2 мая, выписанъ 25 мая 1894 года. 2. Боленъ съ половини апрѣля, когда заболѣли и опухли суставы. Тогда пролежалъ 2 дня въ лазаретѣ, гдѣ дали по 2 порошка въ день. Съ тѣхъ поръ постоянныя боли. Теперь рѣзкой припухлости нигдѣ нѣтъ; опухиваніе колѣнныхъ и голеностопныхъ суставовъ болѣзненно; боли въ лучезапястныхъ суставахъ. Сердце нормально. Аппетитъ и стулъ нормальный. Не потѣлъ. Ванна. Растираніе суставовъ летучею мазью. 3. Тоже. Не потѣлъ. Назначено *inf. erhedrae* изъ 8,0 на сутки. 4-я порція съ жаркимъ. 4. Ломота въ колѣнныхъ и голеностопныхъ, плечевыхъ и лучезапястныхъ суставахъ. 5. По старому, не потѣлъ. 6. Боль въ суставахъ лѣвой ноги сильнѣе, въ правой по старому. 7. Тоже. *Inf. erhedrae* принимать изъ 10,0 на сутки. 8. Со вчерашняго дня боли хуже. Въ суставахъ лѣвой руки небольшія, въ правой сильныя боли. Ванна. 9. Въ правой ногѣ боли меньше; колѣни болятъ при движеніи. Въ рукахъ боли меньше. 10. Боли въ лѣвой ногѣ хуже. Зрачки нормальны (разсѣянный свѣтъ). *Inf. erhedrae* изъ 15,0 на сутки. 11. Тоже. Зрачки нормальны. 12. Боль въ лѣвомъ колѣнномъ суставѣ. 13. Боль въ лѣвомъ колѣнѣ не даетъ спать; въ другихъ суставахъ боли нѣтъ. Ванна. 14. Боль въ лѣвомъ колѣнѣ меньше, боль въ голеностопномъ лѣвомъ суставѣ. 15. При покоѣ боли нѣтъ, ломота при ходьбѣ и стояніи. 16. Давно понемногу капляетъ; въ лѣвой верхушкѣ легкаго ничтожное припухленіе. *Inf. erhedrae* изъ 8,0 на сутки. 17, 18, 19, 20, 21 и 22 то же самое. Образовался чирій на лѣвой голени, вскрылся 23-го числа. Боли при давленіи въ колѣнныхъ суставахъ нѣтъ, ходить свободнѣе. *Inf. erhedrae* изъ 5,0 на сутки. 24. Ходить довольно свободно. Хвойникъ оставить. 25. Ходить свободно, суставы нормальны. Выписанъ на 39-й день болѣзни. Температура со 2-го по 8-ое мая была отъ 36,6 до 37,4; отъ 8-го по 13-ое 36,6—37; къ 15-ому поднялась утромъ до 37,6, а уже вечеромъ была 36,9 и на этой цифрѣ держалась до конца. Пульсъ съ 3-го по 12-ое мая былъ 60, только 8 мая 52; 13 мая—68; затѣм колебался отъ 60 до 62, а 23-го опять достигъ 68. Число дыханій пер-

вые 7 дней было по 20, слѣдующіе 5 дней по 18, затѣм, колеблясь, поднялось къ 19-му до 24, а къ 23-му опять упало до 18. Количество мочи 3 мая 2150 кс., уже 4-го 2900 кс., а 6-го—3500; 7-го мая въ день ухудшенія болѣе оно упало до 2500 кс., колебалось втеченіе 10 дней отъ 2300 кс. до 2900 кс.; 19-го упало до 1500 кс.; 20 и 21-го по 2100 кс.; 22-го 1250 кс.; а съ 23-го по 2100 кс. Уд. вѣсъ мочи колебался отъ 1,017 до 1,010. Большой никогда не потѣлъ. Всѣ тѣла съ 3 мая (153 ф.) постепенно поднимался, достигнувъ 23 мая до 156½ ф.

ХІІІ. Матросъ Дмитрій С. 22 лѣтъ. Прибылъ 3 мая, выписанъ 26 мая 1894 года. Прежде ревматизма не было. 3. то вечеромъ. 38. Лежалъ 5 дней въ лазаретѣ; тамъ мадали іодомъ суставы и одинъ день дали 3 порошка. Боли въ колѣнныхъ и голеностопныхъ суставахъ. Лѣвое колѣно и оба голеностопные сустава припухли. Сердце нормально. Капель давленій; въ легкихъ никакихъ измѣненій. 4. то 37—37,2. Назначено *inf. erhedrae* изъ 15,0 на сутки черезъ 2 часа. Перевязка суставовъ дерев. масломъ и ватой. 5. Боли по старому при движеніи, при покоѣ болѣе нѣтъ. Не потѣлъ. Ванна. 6. Тоже. 7. Со вчерашняго дня ломота въ голеностопныхъ суставахъ; въ колѣняхъ боль при ходьбѣ. 8. Тоже. Назначено *co-deini* 0,008 — 3 порошка въ день. 9. Ломоты нѣтъ. Боль при движеніи. Лѣвый голеностопный суставъ болѣзненъ при давленіи. Капель меньше. 10. При движеніи боль меньше. *Inf. erhedrae* принимать изъ 8,0 на сутки. 11. Заболѣла поясница. 13. Ходить легче, поясница не болитъ. 15. Ходить больнѣе. Зрачки нормальны. 17. Ходить мѣшаешь боль въ лѣвомъ колѣнѣ. Опухоль суставовъ опала. Повязку снять — назначенъ массажъ. 18. Тоже. Зрачки нѣсколько расширены. Ванна. 19. Появилась боль и припухлость железокъ въ лѣвомъ паху. Немного знобитъ. Смазываніе іодомъ паха. 21. Боли въ паху нѣтъ, железки увеличены. При хожденіи боли держатся. 22. Зрачки нормальны. Ходить легче. Капель незначительный. 23. Зрачки нѣсколько расширены; железки уменьшились въ объемѣ. 24. Зрачки нормальны. *Herpes labialis*. Боли при ходьбѣ. *Inf. erhedrae* изъ 5,0 на сутки. 25. Боль послѣ ходьбы. Сердце нормально. Ванна. 26. Ходить не больно. Очертанія суставовъ нормальны. Хвойникъ оставить. Выписанъ на 29-й день болѣзни. Температура колебалась съ 5-го мая по 18-е

отъ 36,7 до 37,5. 19 мая утромъ 36,9, вечеромъ 40; 20 мая 37,1—38,6; съ 21-го опять нормальна 36,8—37. Пульсъ держался довольно ровно около 62; 19-го 84; съ 20-го опять 60 и даже 52—24 мая. Число дыханій держалось съ небольшими колебаніями почти все время на 32. Кривыя количества мочи и уд. вѣса ея параллельны; количество мочи съ 17-го числа (1500 к. с.) постепенно поднялось къ 25-му до 1800 к. с. Вѣсъ тѣла съ 5 мая 150 ф. постепенно увеличился до 155 ф. ко дню выписки. Больной никогда не потѣлъ.

XIV. Кочегаръ Емельянъ П. 23 лѣтъ. Прибылъ 27 мая, выписанъ 5 іюля 1894 года. Лежалъ въ Госпиталѣ съ 30-го апрѣля по 9 мая сего года ломотою въ суставахъ и поясницѣ при нормальной температурѣ, суставы не измѣнены. Несмотря на леченіе іодистымъ калиемъ (по 1,2 въ день) 5 мая появилась боль и припухлость въ правомъ лучезапястномъ суставѣ. Выписанъ не совсемъ здоровымъ. Боли вернулись уже 11 мая. 27. Боли въ спинѣ и во всѣхъ суставахъ, особенно колѣнныхъ; они измѣнены въ очертаніяхъ и горячи. Границы сердца нормальны; 1-й тонъ у верхушки нечистый. Иногда по вечерамъ знобитъ, никогда не потѣетъ. Назначено *inf. erhedrae* изъ 15,0 на сутки. Перевязка суставовъ ватой и вазелиномъ. Массажъ. Ванна. t° 33,4. 23. Спаль плохо, не знобило, не потѣлъ. Ночью была очень сильная ломота, особенно праваго колѣна; оно очень чувствительно къ давленію. t° 37,2—38. 30. При покоѣ и давленіи боль въ пальцѣ лѣвой кисти, который припухъ. При движеніи боль въ локтевыхъ и колѣнныхъ суставахъ. Сильно потѣлъ. Жидкій стулъ 3 раза. Колѣни еще припухли, горячи, сильно болѣзненны. t° 37,5—37,4. 31. Съ ночи сильная боль и опухоль въ лѣвомъ лучезапястномъ суставѣ. Не спалъ ночь. Ноги не болятъ. t° 37,2—37,5. 1. При покоѣ нигдѣ болѣй нѣтъ. Въ лѣвомъ лучезапястномъ суставѣ боль при движеніи; въ другихъ суставахъ незначительная боль. Ходить. 2. При давленіи боль въ пальцахъ лѣвой кисти. Тоны сердца глуховаты. Боль въ спинныхъ позвонкахъ. 3. Въ пальцахъ лѣвой руки боль только при движеніи. Опухли нигдѣ нѣтъ. При хожденіи боль въ колѣнныхъ сгибахъ. Тоны сердца чисты. *Inf. erhedrae* давать изъ 10,0 на сутки. 4. Ночью ломота въ правой кисти и локтѣ; давленіе на больномъ пальцѣ болѣзненно. Спина по старому. Ноги болятъ послѣ ходьбы. Перевязку суставовъ оставить. Ванна. 5. Вре-

нами перебои въ сердцѣ, тоны чисты. Въ лучезапястномъ суставѣ боль временами. При ходьбѣ въ колѣняхъ усилилась. 6. Ходить не больно. Боль въ пальцахъ при движеніи, ночью въ локтевыхъ суставахъ. Хвойникъ оставить. Отправленъ на Госпитальную дачу. Тамъ получалъ іод. калий (по 1,2). Выписанъ на 55-й день болѣзни. 29 іюня при моемъ посѣщеніи дачи больной жаловался на постоянную боль въ правомъ плечѣ, а въ колѣняхъ при ходьбѣ. Температура со 2-го іюня, постепенно ниспадая, дошла до 36°, 6. къ 6 іюня. Пульсъ 28 мая—76; далѣе, ступенеобразно замедляясь, достигъ 6 іюня 48. Число дыханій колебалось отъ 20 до 24. Количество мочи 28 мая 800 кс., уже къ 30-му дошло до 1250 кс. п, опустившись ниже 1-ой цифры (800), къ 3 іюня снова поднялось до 1500 кс., затѣмъ вновь уменьшилось до 1000 кс. Уд. вѣсъ колебался соотвѣтственно количеству мочи отъ 1,015 до 1,010. Кромѣ одной ночи больной не потѣлъ. Вѣсъ тѣла держался около 150 ф., очень медленно, но непрерывно повышаясь.

XV. Сынъ поручика Арсеній К. 18 лѣтъ. Прибылъ 10 декабря 1893 года, выписанъ 19 марта 1894 года. 1-й разъ перенесъ ревматизмъ въ 1892 году, съ тѣхъ поръ онъ нѣсколько разъ повторялся. Въ первый же разъ былъ эндокардитъ, послѣ котораго осталась *insufficiencia v. bicuspidalis*. Въ настоящее время припухли лѣвый локтевой, лѣвый колѣнный и правый тазобедренный суставы. Назначенъ салциловый натръ съ *infusum digitalis*. 13. Боль въ рукахъ и ногахъ меньше. 16. Болѣй нигдѣ нѣтъ. 19. Двигается безъ болей. 20. Небольшія боли въ локтѣ. Подъ вліяніемъ салцилового натра боли стихли. Противъ измѣненій суставовъ назначенъ іод. калий въ небольшой дозѣ. 29 дек.—2 января болѣй нѣтъ. 3. Снова боль въ колѣнѣ и большомъ пальцѣ лѣвой руки. 4. Назначенъ отваръ брусники. 7. Опухоль опала, боли меньше. 8. Небольшая боль въ колѣнномъ правомъ суставѣ. Далѣе опять леченіе іодистымъ калиемъ и ваннами въ 30° R. Боли прекращались и вновь появлялись въ томъ или другомъ изъ прежде пораженныхъ суставовъ. 15 февраля. Болѣй нѣтъ. Сердцебиеніе. Измѣненіе формы колѣннаго лѣваго сустава. 17. Назначено *Inf.-dec. erhedrae* изъ 8,0 на сутки. 20. Боли и тугая подвижность въ колѣнныхъ суставахъ. 22. Боли нѣтъ. 24. Тоже. Сердцебиеніе продолжается. 3. Боли въ колѣнѣ держатся. 4. Ночью было сердцебиеніе; боль въ лѣвомъ голеностопномъ

суставѣ. 5. Боли нигдѣ нѣтъ. 10. Одышка и сердцебиеніе по прежнему. Болей нѣтъ. 12. Появилась боль и припухлость въ правомъ лучезапястномъ сочлененіи. Назначены порошки салицилового натра съ антифебриномъ. 13. Припухлость и боли меньше. 15. Въ рукѣ болей нѣтъ. Сердцебиеніе продолжается. Самочувствіе хорошее. 19. Хвойникъ оставить. Выписанъ съ явленіями недостаточности дружворки. Температура въ первые 3 дня съ поступления больного была повышена до 39° вечеромъ, затѣмъ все время была нормальна, колебалась отъ 36,6 до 37,5. Количество мочи за время пріемовъ хвойника колебалось незначительно отъ 1300 кс. до 1600 кс. Всѣхъ тѣла держался на 3 п. 8 ф.

В. 6 случаетъ хроническаго суставнаго ревматизма; леченіе хвойникомъ.

XVI. Матросъ Петръ Б. 27 лѣтъ. Прибылъ 1 ноября 1893 г., выписанъ 1 февраля 1894 г. Заболѣлъ около 1 ноября болями въ голеностопныхъ, колѣнныхъ и лѣвомъ локтевомъ суставахъ. Всѣ они припухли. Сначала подъ вліяніемъ порошковъ салицилового натра (по 2,4 въ день) боль уменьшилась, но опухоль осталась по прежнему. Затѣмъ больной получалъ *salutio kalii iodati* (0,9 въ сутки) недѣли 2; потомъ *patri salicylici* и *iodati aa* (по 1,2 въ сутки) совмѣстно съ ваннами—боль уменьшилась, но скоро опять усилилась; припухлость осталась въ колѣнныхъ суставахъ. За все время пользованія послѣднимъ средствомъ (съ 8 декабря по 5 января) больной потѣлъ порядочно каждую ночь; всѣхъ тѣла все время повышался. Температура, вначалѣ державшаяся на 38°, дала повышеніе 21 ноября до 39,6; затѣмъ колебалась около 37,5. Съ 9 по 15 декабря вторичное повышеніе до 39,6, державшееся нѣсколько дней. Съ 15 числа *t* нормальна, въ концѣ мѣсяца поднималась на нѣсколько дней до 38 и опять держалась на 37°—37,2. 8 января. Припухлость въ колѣнныхъ суставахъ, особенно правомъ. Появилась боль въ лѣвомъ локтѣ и плечѣ. Назначено *Inf. decostum erphedrae vulg.* черезъ 2 часа изъ 5,0 на сутки. 9. Боль по прежнему; днемъ нѣсколько потѣть. 10. По старому, не потѣлъ. Пульсъ 90, дых. 18. 11. Тоже. Немного потѣлъ днемъ. Ванна. 12. Въ колѣнныхъ сгибахъ боль меньше. 13. Усилилась. 14. Опять меньше. Не потѣлъ. Ванна. 15. Боль меньше, опухоль нѣсколько опала. Послѣ ванны потѣлъ. 17. Принимать весь отваръ (изъ 5,0) за 1 при-

емъ вечеромъ. 19. Потѣлъ. 20. Боль въ правомъ колѣнѣ продолжается. Потѣлъ. Ванна. 21. Боль меньше. Смазываніе колѣнныхъ суставовъ іодомъ. 25. Боль меньше, не потѣть. 26. Назначенъ массажъ суставовъ. 28. Боли меньше. 1 февраля. Боли гораздо меньше; опухоль держится. Выписанъ. За это время (съ 8 января) температура колебалась отъ 36,8 до 37,4; втеченіе 16—22 января опять повышеніе до 37,6. Пульсъ 9 числа 90, затѣмъ колебался отъ 70 до 80, а къ 28 января снова поднялся до 90. Число дыханій держалось на 18—20, съ 20 по 24 января на 24. 25 января 28, затѣмъ опять 24. Кривныя количества мочи и уд. вѣса ея соответствуютъ одна другой. Количество мочи за 8 января (день назначенія хвойника) 3000 кс., уже на слѣдующій день 2000 кс., а 11-го даже 1300 кс.; повышаясь опять, оно достигло 3000 кс. 15-го числа, затѣмъ колебалось отъ 2000 до 2500 кс. Всѣхъ тѣла продолжалъ повышаться все время отъ 54 кило (16 января) до 57 кило въ день выписки.

21 Февраля больной прибылъ въ госпиталь вторично и лежалъ по 29 марта 1894 года. Уже черезъ недѣлю послѣ выписки—заболѣли колѣнные суставы. Небольшое измѣненіе очертаній и повышеніе мѣстной *t*°, въ правомъ суставѣ *patella* подвижна. Правый голеностопный суставъ тоже болитъ. *t*° 37,8. 22. Тоже, *t*° 36,8—37,5. Ванна. 23. Назначено *inf. dec. erphedrae* изъ 8,0 на сутки. Втираніе летучей мази и перевязка дерев. масломъ. 24 и 25. Боль нѣсколько меньше. 26. Боль праваго голеностопнаго сустава прошла. 28. Опухоль нѣсколько меньше. *Inf. dec.* принимать изъ 10,0 на сутки. 1. Ночью боли меньше. Ванна. Массажъ. 2. Боли и припухлость. 5. Въ правомъ колѣнѣ боли меньше. 6. Опухоль лѣваго колѣннаго сустава увеличилась—эластическая опухоль по бокамъ *patellae*; боли въ немъ усилились. *Inf. dec.* давать изъ 8,0 на сутки. 7. Ванна. 8. При ходьбѣ хрустъ въ колѣняхъ, опухоль держится. 10. Боли меньше. 11. Чувствуетъ себя лучше. 13. Назначено *inf. erphedrae* изъ 8,0 на сутки. 14. Въ колѣняхъ боли меньше; появилось затрудненіе при движеніи праваго локтя; измѣненій сустава нѣтъ. 15. Боль въ колѣняхъ незначительна, локоть меньше болитъ. Ванна. 18. Боли при движеніи. 19. Ночью ломило колѣни. 20. Ломоты нѣтъ; при движеніи боль сильнѣе. 23. Ночью колотье въ колѣняхъ. Припухлость по старому, въ лѣвомъ колѣнѣ весьма рѣзка. Смазываніе *t-ra jodi*. Ванна.

25. Боли меньше. 28. Боли въ колѣняхъ послѣ ходьбы. Опухоль по старому. Хвойникъ оставить. 29. Выписанъ въ такомъ состояніи. Температура все время колебалась отъ 37° до 37,5. Пульсъ вначалѣ держался около 70, къ 6-му марту участился до 78, а къ 11-му до 82; затѣмъ колебался на 74—78, 26 го марта 96, 29-го опять 72. Число дыханій держалось все время на 22—24, только 24-го марта 28. Кривыя количества мочи и уд. вѣса ея совершенно параллельны. Количество мочи съ 24 февраля (2000 кс.) все время постепенно понижалось: такъ 3 марта еще 2000 кс., 8-го и 9-го уже 1800 кс., 12-го и 15 го 1600 кс., 18-го—1500 кс., 22-го 1300 кс., 25-го—1000 кс. Количество же принимаемой въ сутки жидкости все время, незначительно колеблѣсь, держалось на одной цифрѣ. Вѣсъ тѣла все время постепенно повышался: 142 ф. 25-го февраля и 147 ф. 23 марта. Больной не потѣлъ.

XVII. Ученикъ фелдшерской школы Константинъ В. 19 лѣтъ. Прибылъ 10 января, выписанъ 6 февраля 1894 года. Лежалъ въ госпиталѣ 3 раза съ тою же болѣзью; послѣдній разъ въ ноябрѣ 1893 года, при чемъ съ нимъ былъ припадокъ психическаго разстройства—бред; выписанъ не совсѣмъ поправившимся. Теперь заболѣлъ 9 января болѣю въ лѣвомъ голеностопномъ суставѣ, всей голени и колѣнѣ. Измѣненія суставовъ не замѣтно. Головокруженіе и боль въ ней. Ванна. 12. Кромѣ прежней боль въ икрахъ. 13. Назначено *inf. dec. erhedrae* черезъ 2 часа изъ 5,0 на сутки. 14. Боли немного меньше. 16. Продолжаются. 17. Тоже. 19. Кромѣ прежнихъ боли въ правомъ тазобедренномъ суставѣ, немного потѣеть. 20. Немного потѣть днемъ. 21. Голень доить ночью. 22. Назначено давать весь *inf. decoctum* на 1 приемъ (изъ 5,0). 25. Боль въ лѣвомъ колѣнномъ и тазобедренномъ суставѣ. Головокруженіе. 26. Въ тазобедренномъ суставѣ боль усилилась. 28. Ванна. 29. Боли меньше. 1. Опять усилилась боль. 3. Тоже. Назначено *inf. dec.* изъ 10,0 въ 2 приема. 4. Боли продолжаютъ. Оставить хвойникъ. 6. Выписанъ. Температура все время держалась около 37°, колебалась отъ 36,8 до 37,5. Пульсъ со дня назначенія хвойника—62 скоро поднялся до 72, затѣмъ колебался около 70, а къ 28-му поднялся до 78 и, постепенно понижаясь, упалъ до 60 къ 4 му февралю. Число дыханій отъ 20—12 января, постепенно учащаясь, достигло 26—18 го, 23—26 го, 34—4 го. Кривыя количества мочи и уд.

вѣса ея параллельны. Количество мочи 1000 к. с. 11-го января, за 1-ый день назначенія хвойника поднялось до 1900 к. с., къ 15-му до 2100 к. с., къ 20-му до 2300 к. с.; на слѣдующій день 1250 к. с., 24-го опять 2100 к. с., а 27-го 2650 к. с.; къ 3 февраля упало до 1200 к. с. 3 марта больногъ возвратился въ госпиталь и лежалъ до 10 апрѣля того же года. 3. Боленъ 3-й день болями въ обоихъ тазобедренныхъ и колѣнныхъ суставахъ. Припухлости рѣзкой нѣтъ. При давленіи суставы болѣзненны. Сердце нормально. Боль въ вискахъ по вечерамъ. Послѣднія 2 дня принялъ по 1,8 салициловаго натра безъ пользы. Назначена перевязка суставовъ деревяннымъ масломъ и ватой. 4. Тоже. Ванна. 5. Боли по прежнему; ходить трудно. 6. Назначено *inf. erhedrae* изъ 8,0 на сутки. 7 и 8. Боль въ правомъ локтѣ, старыя боли держатся. 10. Локоть не болитъ, ноги по старому. 11. Въ лѣвой ногѣ боли меньше, въ правой по старому. 13. Ночью ломота въ лѣвомъ боку—въ мышцахъ. 14. Боли въ суставахъ усилились. 15. Тоже; бокъ прошелъ. Назначено *inf. erhedrae* изъ 10,0 на сутки. 16. Въ правой ногѣ меньше боли. 17. Нѣтъ; въ лѣвой по старому. 18. Въ лѣвой ногѣ боль ночью, днемъ при движеніи. 22. Боли въ обоихъ колѣняхъ. 24. Въ лѣвомъ колѣнѣ меньше. Головокруженіе по утрамъ. Разгибать лѣвую ногу трудно, правую легко. *Inf. erhedrae* изъ 8,0 на сутки. Ванна. 25. Боли въ лѣвомъ плечѣ и колѣнѣ. 28. Тоже; правое колѣно незначительно болитъ. Головная боль по утрамъ. 31. Боли меньше. 2. Голова не болитъ. Небольшая боль въ лѣвомъ колѣнѣ. 3 *Inf. erhedrae* изъ 5,0 на сутки. 5 и 6 боли меньше. 8. Боли небольшія. Хвойникъ оставить. 9. Болей нѣтъ. Затрудненіе при ходьбѣ. 10. Выписанъ. Температура колебалась отъ 37,2 до 37,5, нѣсколько повысилась втеченіе 11—19 марта, достигнувъ *maximum'a* 38° 15-го числа; опять держалась въ прежнихъ границахъ, давъ повышеніе по вечерамъ 28 марта 38,5 и 29-го 37,8. Пульсъ вначалѣ держался на 58, 10 марта—66, а 14-го 72; затѣмъ держался на 60, пока не далъ учащенія до 84—26 марта; уже 27-го упалъ на 68, а далѣе держался на 64. Число дыханій вначалѣ рѣдкаго (14—16) дало учащеніе до 36—14 марта; на другой же день 16, затѣмъ поднялось до 20 и 22. Кривыя количества мочи и уд. вѣса ея параллельны, а также кривая количества выпиваемой за сутки жидкости. Вначалѣ 1800 к. с. количество

мочи далѣ колебалось отъ 1000 до 1500 к. с.; 17-го рѣзко упало до 700 к. с. и поднялось до 2000 к. с. 19-го; колебалось нѣсколько дней около 1500 к. с., опять упало до 600 к. с. 25-го, а къ 31-му поднялось до 1800 к. с., колебалось далѣ отъ 1000 до 1500. Всѣхъ тѣла 114 ф., нѣсколько понизившись, ко дню выписки достигъ прежней цифры.

XVIII. Матрость Николай П., 25 лѣтъ. Прибылъ 28-го апрѣля, выписанъ 6 мая 1894 года. Въ мартѣ мѣсяцъ лежалъ острымъ суставнымъ ревматизмомъ въ Госпиталѣ; лечили порошками, затѣмъ іодистымъ калиемъ. Давно боли въ колѣнныхъ, голеностопныхъ суставахъ, въ поясницѣ, лопаткахъ, плечахъ, икрахъ. Границы сердца нормальны; 1-й тонъ у верхушки съ шумомъ. 29. Сильная ломота ночью, плохо спить. Назначено растираніе летучею мазью. *Inf. decostum ephedrae* изъ 5,0 на сутки. Ванна. 30. Ночью потѣлъ. Боли продолжаютъ. 1. Боли меньше, потѣлъ. Небольшой кашель, одышка; въ легкихъ никакихъ измѣненій. 2. Боли въ суставахъ продолжаютъ, въ колѣняхъ нѣтъ, въ икрахъ меньше. 3. Боли въ ногахъ при хожденіи. 6. Тоже. Выписанъ въ этомъ состояніи. Въ сердцѣ шумъ. Температура только 29-го апрѣля 37,8, остальные вечера по 37,6, съ 3-го числа по 37. До 3-го числа потѣлъ по ночамъ. 10 мая большой снова поступилъ въ Госпиталь, гдѣ лежалъ до 26 іюля. Ломота вернулась на другой день послѣ выписки — 7 мая. Правый голеностопный суставъ опухши и сильно болѣзненъ при давленіи. Ломота въ немъ и въ икрахъ. 1-й тонъ въ сердцѣ съ шумомъ. Небольшой кашель. Въ легкихъ нѣтъ измѣненій. Растирать суставы летучею мазью. Ванна. 11. Не спалъ отъ боли. По ночамъ познѣваетъ. Не потѣлъ. Назначено *inf. ephedrae* изъ 8,0 на сутки. 12. Ломота меньше; ночью умеренно потѣлъ; боль при движеніи. 13. Ночью кололо ноги, теперь боль при движеніи. Немного потѣлъ. 14. Тоже. 15. Небольшая боль временами въ правомъ голеностопномъ суставѣ. Не потѣть. 17. Ломоты нѣтъ, ходить больно; не потѣлъ. 18. При давленіи боль въ правомъ голеностопномъ суставѣ, припухлость по старому. *Inf. ephedrae* изъ 5,0 на сутки. 19 и 20. Незначительно потѣть. 23, 24, 25. Боль при ходьбѣ въ суставахъ. 26. Съ утра ходить труднѣе. Сильно потѣлъ. 27. Тоже. *Inf. ephedrae* изъ 8,0 на сутки. 30. Ходить нѣсколько легче. Хвойникъ оставить. Отправленъ на дачу. Тамъ получалъ іод. натрѣ. Боли

по ночамъ. 29 іюня. При движеніи боль не особенно сильная. Выписанъ 26 іюля. Температура все время кромѣ 1-го вечера (37,7) колебалась отъ 36,6 до 37. Пульсъ съ 80 (12 мая) постепенно падалъ до 56 (17—19 мая), затѣмъ постепенно поднимался до 84 (26 мая) и опять упалъ до 64 (28—30 мая). Число дыханій только 12 мая дошло до 30, остальные дни колебалось отъ 20 до 25. Кривая уд. вѣса мочи и ея количества параллельны. Количество мочи держалось на 1300—1400 до 18 мая, затѣмъ колебалось около 1000 к. с. Всѣхъ тѣла постепенно повышались со 149 ф. (13 мая) до 155 ф. (31 мая). Зрачки все время (и до пріемовъ хвойника) были нѣсколько расширены.

XIX. Стрѣлокъ Василій К. 24 лѣтъ. Прибылъ 9 мая, выписанъ 6 сентября 1894 года. Въ лазаретъ на суднѣ Генералъ Адмиралъ прибылъ 2 апрѣля. Боли въ плечевыхъ и колѣнныхъ суставахъ; припухлость послѣднихъ и голеностопныхъ. ⁴ все время нормальна (нѣсколько разъ вечеромъ была 37,7); получалъ салициловый натрѣ въ небольшихъ дозахъ. Улучшенія не было. 10 мая. Лѣвое колѣно и оба голеностопные сустава измѣнены въ очертаніяхъ; при покоѣ и давленіи боли нѣтъ. Боль при движеніи въ этихъ, а также въ плечевыхъ и локтевыхъ суставахъ. Сердце нормально. Шумъ въ ушахъ. Назначено *inf. ephedrae* изъ 8,0 на сутки. Растираніе летучею мазью. Ванна. 11 и 12. Не потѣлъ. 13. Шумъ въ ушахъ меньше. 18. Небольшая ломота въ голеностопныхъ суставахъ и колѣнныхъ, 19 и 20. Тоже. 21. Боль въ голеностопныхъ суставахъ, усиливается при движеніи. 25. При движеніи боль по старому. Ходить очень трудно. 2 іюня. Боль въ плечевыхъ суставахъ, усиливающаяся при движеніи. Боль при давленіи и измѣненіе очертаній лѣваго колѣна и обоихъ голеностопныхъ суставовъ. Поносъ 7 разъ. Оставить хвойникъ. Отправленъ на дачу. Тамъ лечили салициловымъ натромъ по 1,0 3 порошка въ день. 29. іюня. Боль въ ногахъ послѣ ходьбы. 23 августа. Боль при ходьбѣ. Выписанъ 6 сентября. Температура колебалась отъ 37 до 37,5; только 14, 15 и 16 мая поднялась вечеромъ до 38. Пульсъ съ 52 (11 мая) постепенно поднялся до 72 (къ 18 мая), держался на 68, а 27—30 мая достигъ 76. Число дыханій колебалось отъ 18 до 24, 28 мая поднялось до 28, затѣмъ опять 24. Количество мочи отъ 850 к. с. (12 мая), колебалось, постепенно увеличивалось, достигнувъ 16-го 1250 к. с., 21-го 1400 к. с.; 26-го 1900 к. с.;

уже 27 мая 1000 к. с., а 30—2-го числа около 500 к. с. Кривая уд. вѣса мочи параллельна кривой количества ея. Вѣсъ тѣла съ 17 мая (152 ф.), постепенно увеличиваясь, дошелъ до 154 ф. въ день выписки. Больной никогда не потѣлъ.

XX. Комендоръ Вареоомей Б. 26 лѣтъ. Прибылъ въ Госпиталь 9 мая, выписанъ 6 сентября 1894 года. Въ лазаретъ судна Генераль Адмиралъ поступилъ 26 апрѣля съ жалобами на боли въ плечевыхъ и локтевыхъ, а особенно въ колѣнныхъ суставахъ. Назначенъ салициловый натръ въ небольшой дозѣ. 30. Колѣни стали опухать. 1. Припухлость усилилась. 3. Боли и припухлость меньше. 6. Въ колѣнныхъ суставахъ боли небольшие, измѣненій формы нѣтъ. Голеностопные опухши, не даютъ ходить. 7. Небольшая боль въ лучезапястныхъ суставахъ, въ нижнихъ ребрахъ справа около *sternum*. 8. Въ колѣняхъ боли усилились. Отправленъ въ Госпиталь. Температура за время лежанія въ лазаретѣ колебалась отъ 37,6 до 38,3. По ночамъ знабило и потѣлъ. 10 мая. Ломоты при покоѣ нигдѣ нѣтъ. При движеніи боль въ колѣнныхъ и голеностопныхъ, лучезапястныхъ и локтевыхъ суставахъ; къ давленію чувствительны колѣнные и голеностопные. Рѣзкихъ измѣненій въ суставахъ нѣтъ. Сердце нормально. Назначено *Inf. erhedrae* изъ 8,0 на сутки въ 3 приема. Растираніе лентуей мазью. Ванна. 11 и 12. тоже. 13. Ночью заболѣла грудь. 14. Грудь болитъ меньше. 15. Постоянно познабливаетъ. Ванна. 15. Ходить и стоять больно по старому. 21. Знаобить меньше. 25. Боль при ходьбѣ по старому, при давленіи суставы болѣзненны. 27. Въ голеностопныхъ суставахъ движенія стали труднѣе. 30. Боль меньше при движеніи въ колѣняхъ, въ голеностопныхъ больше. 1. Тоже. 2. Не можетъ наступать на пятки; въ колѣняхъ небольшие боли. Боли при движеніи; при давленіи нѣтъ. Хвойникъ оставить. Отправленъ на дачу.—8. Сильныя боли въ ногахъ. Назначенъ салициловый натръ 3 порошка по 1,0. 17. Боли въ ногахъ очень сильныя. Затѣмъ 6. получалъ отваръ бруслики. 29. Юня. Боли послѣ ходьбы меньше, ходить съ палкою. 23 Августа. Боли послѣ ходьбы. 6 Сентября выписанъ. Температура во время приемовъ хвойника была вначалѣ нормальна, затѣмъ подлихорадочная, доходя по вечерамъ втеченіе 7 дней до 38°, а 18-го Мая даже до 38,7; далѣе опять колебанія отъ 37,4 до 38°, а 27 мая опять 38,6. На дачѣ

во время появленія болей температура достигала по вечерамъ до 38,5, опускаясь до нормы по утрутамъ. Пульсъ до 14 мая нормальный (72), уже 15 мая 80, затѣмъ колебался отъ 72 до 80, а 30 и 31 мая поднялся даже до 84. Число дыханій все время въ предѣлахъ 18—24, только 2 юня—28. Количество мочи съ 650 кс. (10 мая) непрерывно, но съ колебаніями увеличивалось, дойдя до 1500 кс. (21 мая) и до 1850 кс. (25 мая), затѣмъ 27 числа уменьшилось и держалось около 1000 кс. Кривая уд. вѣса мочи (1,015—1,020) совершенно параллельна кривой количества мочи. Вѣсъ тѣла съ 11 мая (161 ф.) держался на одной величинѣ, а къ 30-му даже упалъ до 158 ф. Больной никогда не потѣлъ въ госпиталѣ. Врачки при разсѣянномъ свѣтѣ были все время нормальны.

XXI. Вдова чиновника И. 57 лѣтъ. Лежитъ много лѣтъ въ Кронштадтскомъ госпиталѣ, страдаетъ *arthritis deformans* и параличемъ конечностей. По усиленной просьбѣ больной ей назначено *inf-dec. erhedrae* изъ 5,0 въ 2 приема. Вначалѣ появилось облегченіе въ видѣ уменьшенія сильныхъ болей во всѣхъ суставахъ втеченіе ночи. Больная даже стала шевелить пальцами одной руки. Стулъ сталъ появляться 1 разъ въ 1—2 дня, тогда какъ прежде запоры бывали по нѣдѣлѣ и больше. Уменьшилась боль въ груди, обильная прежде мокрота исчезла. Приемы хвойника продолжались около 3 недѣль. Уже скоро боли вернулись съ прежнею силою, хотя стулъ остался исправнымъ. Ввиду полной бесполезности (за исключеніемъ несомнѣнно психическаго эффекта вначалѣ) приемовъ лекарства прекращены.

Г. 8 случаевъ остраго суставнаго ревматизма; леченіе салициловымъ натромъ.

XXII. Кочегаръ Карлъ С. 22 лѣтъ. Прибылъ 25 сентября, выписанъ 19 октября 1893 года. Ревматизма никогда не было. 26 сентября. Боленъ 4-ый день болью при глотаніи. Сильная краснота и опухоль праваго миндалика и всей правой половины мягкаго неба. Стулъ 3 раза. t° 37,5—37,5. 27. Припухлость меньше, глотаніе свободно. (Полосканіе *Kali chlorici*, согрѣв. компрессы) t° 37,2—37,9. 28. Жалобы на боль въ правой стопѣ. Объективныхъ измѣненій нѣтъ. T° 37,5—38,9. 29. Сильныя боли обоихъ голеностопныхъ и лѣваго колѣннаго сустава. Назначена салициловая кислота съ содою въ микстурѣ—4,0 на сутки, t° 38,5—39,1. 30. T° 38—39.

1 октября. Появилась боль въ лѣвомъ лучезапястномъ суставѣ. Т° 38—38,8. 2. Сильная боль и краснота обѣихъ лучезапястныхъ суставовъ. Т° 37,3—38,5. 3. Значительная опухоль справа. Т° 37,6—38,8. 4. Воли держатся, т° 37,3—37,9. 5. Т° 37—37,3. 6. Опухоль опала, боли небольшія. Т° 36,8—36,6. 7. Поправляется. Т° 36,7—36,9. Въмѣсто салициловой кислоты назначена ея натровая соль 4,0 на сутки. 8. Болей нигдѣ нѣтъ. Движеніе въ суставахъ безболѣзненно, очертанія ихъ нормальны. Сердце безъ измѣненій. 13. Болѣзненность при давленіи въ голеностопныхъ и локтевыхъ суставахъ. 15. Болѣзненность въ лѣвомъ голеностопномъ суставѣ. 16. Поправляется. 19. Выписанъ здоровымъ на 22-ой день со дня заболѣванія суставовъ. Температура съ 7 октября колебалась отъ 36,8 до 37,3.

XXIII. Матрость Иванъ Ф. 21 года. Прибылъ 11 апрѣля, выписанъ 4 мая 1894 года. Никогда ревматизма не было. 11. Болеетъ 3 дня болями въ колѣнныхъ, локтевыхъ, голеностопныхъ суставахъ. Сильная боль въ колѣнныхъ; рѣзкой припухлости здѣсь нѣтъ. Сердце нормально. Языкъ обложенъ, аппетита нѣтъ. т° 39,5—39,4. Назначенъ салициловый натръ по 1,2 6 порошковъ. Перевязка суставовъ ватой. 12. Спалъ ночь, сильно потѣлъ; кожа влажная. Боли держатся при покоѣ и давленіи. т° 39—39,1. 13. Сильно потѣлъ ночью, спалъ. Сильныя боли въ лѣвомъ лучезапястномъ, обѣихъ локтевыхъ, лѣвомъ голеностопномъ суставахъ; въ колѣняхъ боли меньше. т° 38,8—38,6. Ванна. 14. Не потѣлъ. Сильныя боли и припухлость держатся въ лѣвой кисти; въ другихъ суставахъ не рѣзкія боли. т° 38—38,2. 15. Боли въ лѣвой кисти меньше, припухлость держится. Въ лѣвомъ колѣнномъ суставѣ боль. Немного потѣлъ. т° 38,1—37,6. 16. Рѣзкая припухлость обѣихъ колѣнныхъ суставовъ и лѣваго голеностопнаго снаружи; боль и краснота. 1-й тонъ въ сердцѣ нечистый. Плохо спалъ, не потѣлъ. т° 37,8—38,8. 17. Въ лѣвой ногѣ сильная боль, не потѣлъ. т° 37,2—37,2. 18. Потѣлъ. Въ лѣвомъ голеностопномъ суставѣ сильныя боли; въ другихъ—небольшія. т° 37—37,7. 19. Потѣлъ порядочно. Боль въ лѣвой ногѣ. т° 36,2—37,5. Назначенъ салиц. натръ по 0,6 6 порошковъ. 20. Боли въ суставахъ ногъ нѣтъ, очертанія нормальны. Въ локтяхъ небольшія боли. Потѣлъ. т° 36,7—37,6. Ванна. 21. Болей нѣтъ. т° 36,6—36,7. 3 порошка. 22. Тоже, т° 36,8—36,9. 23. Послѣ ходьбы ломаютъ колѣни. Порошки оставить. 24 и

25 тоже. Въ лѣвомъ голеностопномъ суставѣ боль усилилась. Опять принимать 6 порошковъ по 0,6. 1-й тонъ въ сердцѣ съ шумомъ. 26. Боль меньше. 3 порошка въ день. Ванна. 27. Головокруженіе. 28. Вчера вечеромъ болѣла голова и рвало. Боль въ суставахъ ногъ при ходьбѣ. Оставить салициловый натръ. 29. Голова болитъ сильнѣе. Ванна. 30. Боль въ груди и колотье въ лѣвомъ боку; въ легкихъ нѣтъ измѣненій. Боли при ходьбѣ. 1-й тонъ въ сердцѣ съ шумомъ. 2 и 3 боли меньше. 4. Болей при движеніи нѣтъ. Шумъ въ сердцѣ. Выписанъ на 26-ой день болѣзни. Температура съ 23 апрѣля колебалась отъ 36,8 до 37,5. Пульсъ съ 12-го апрѣля (83) постепенно замедлялся соотвѣтственно паденію температуры; 21 апрѣля упалъ до 40, затѣмъ постепенно поднялся до 64. Число дыханій сначала 24—28, затѣмъ держалось на 24 и наконецъ на 20. Количество мочи 500 кс.—13 апрѣля, уже 15-го—1600 кс., постепенно падало къ 20-му (300 кс.) и опять поднималось 23 апрѣля до 1800 кс., затѣмъ держалось на 1100 кс. Уд. вѣсъ мочи во время высокой температуры былъ въ предѣлахъ 1,024—1,029; во время безлихорадочное постепенно поднялся до 1,010 28 апрѣля. Вѣсъ тѣла съ 22 числа постепенно увеличился.

XXIV. Канониръ Крѣп. Артиллеріи Иванъ Б. 22 л. Прибылъ 24 іюля, выписанъ 8 августа 1894 года. Прежде никогда ревматизма не было. 24. Болеетъ 3-й день болями и опухолью въ колѣнныхъ суставахъ, знобомъ и жаромъ съ потомъ. Другіе суставы не пораженны; припухлость и повышеніе мѣстной температуры. Границы сердца нормальны; 1-й тонъ у всѣхъ отверстій замѣненъ шумомъ. Въ околоткѣ получилъ 1-й день 3, 2-й день 6, сегодня 4 порошка салицил. натра. т° 39,6. 25. Потѣлъ. Боль въ колѣняхъ меньше, появилась въ лѣвомъ тазобедренномъ суставѣ. Языкъ обложенъ, стула не было. Назначено ol. Ricini 30,0. Салициловаго натра по 1,2—6 порошковъ, перевязка суставовъ ватой. т° 38,4—38,5. 26. Потѣлъ всю ночь, чувствуетъ себя легче. Боли небольшія; можетъ ходить. Перевязку снять. т° 37,7—37,5. Въ сердцѣ тоже. 27. Болей при покоѣ, движеніи и давленіи нѣтъ. Не потѣлъ. Принимать 6 порошковъ по 0,6. т° 37,6—37,3. 28. Боли при ходьбѣ. Давать 3 порошка. т° 37,5—37,6. 29. Съ ночи появилась опухоль, краснота и боль въ правомъ голеностопномъ суставѣ. Колѣни не болятъ. Спалъ хорошо, не потѣлъ. т° 37,4—37,8. Перевязка

ватою. 6. Порошковъ салициловаго натра по 0,6. 30. Боли меньше; не потѣлъ. т° 37—37,2. 31. Боли незначительныя въ голеностопномъ суставѣ, небольшая припухлость, жара нѣтъ. Не потѣлъ. Перебои въ сердцѣ. т° 36,8—37,2. 3 порошка на день. 1 августа. Боль при ходьбѣ. Перевязку снять, массажъ. Порошки оставить. т° 37—37,8. 2. Ночью появилась боль и припухлость въ лѣвомъ голеностопномъ суставѣ; въ правомъ боли нѣтъ, опухоль держится. Плохо спалъ, не потѣлъ. т° 36,6—37,6. Назначено 6 порошковъ салициловаго натра по 0,6. 3. Боли въ суставѣ только при стояніи и хожденіи. Спалъ, не потѣлъ. т° 37,3—37,4. 3 порошка въ день. 4. Правый голеностопный суставъ болитъ при ходьбѣ сильнѣе чѣмъ вчера. Сильно потѣлъ. Темнота въ глазахъ. т° 36,6—37,4. 5. Въ лѣвомъ голеностопномъ боли нѣтъ, въ правомъ при ходьбѣ. Измѣненія очертаній незначительны. Не потѣлъ. т° 36,6—36,7. Порошки оставить. 6. Болей при ходьбѣ нѣтъ. т° 36,8—37,6. 7. т° 37,1—36,9. Здоровъ. Въ сердцѣ шумъ по старому. 8. Выписанъ на 18-й день болѣзни.

XXV. Матросъ Василій Б. 24 лѣтъ. Прибылъ 14 марта, выписанъ 2 апрѣля 1894 года. Въ 1892 году лежалъ въ госпиталѣ ревматизмъ, лечили порошками салициловаго натра. 14. 4 дня ломота въ правомъ ухѣ, чего прежде никогда не было. 18 и 19. Течи нѣтъ. Краснота барабанной перепонки. Температура 14—18 нормальна (36,8—37,3). 19 марта т° 38—38,3. 20. т° 38,5—37,5. 21. т° 38,5—38,4. Боли въ ухѣ прошли. 22. т° 38—39. 20 и 21 числа больноі получилъ по 2 порошка салициловаго натра въ день (по 0,6 каждый). 23. 3-й день боль въ колѣнныхъ и голеностопныхъ суставахъ; небольшая припухлость колѣнъ, особенно праваго. Границы сердца нормальны; 1-й тонъ у верхушки нечеткій. Назначено салициловаго натра по 0,6 порошковъ въ день; согревающіе компрессы на суставы. т° 38,4—39,6. 2 ночи не спалъ. 24. Боли въ колѣняхъ меньше; въ голеностопныхъ суставахъ сильныя боли. Не спалъ. Аппетита нѣтъ. т° 38,7—39,5. Пульсъ 100, дых. 32. 25. Боли меньше. т° 38,5—38,7. 26. т° 38,2—38,7. 27. т° 37,8—38,7. Боли только при ходьбѣ, при покоѣ нѣтъ. Въ сердцѣ тоже. 2 порошка въ день. Ванна. 29. Не потѣлъ. т° 36,7—37,6. Боли при ходьбѣ. Спять хорошо. Пульсъ 56, дых. 28. Оставить салициловый натръ. 30. Не потѣлъ. т° 36,6—37,5. Усталость послѣ ходьбы; болей нѣтъ. Пульсъ

60, дых. 26. Аппетитъ плохъ. 31. Слабость въ ногахъ, аппетитъ лучше. Пульсъ 64, дых. 29. т° 36,7—37,2. 1. Здоровъ. т° 36,9—37,2. Пульсъ 75, дых. 24. 2. Пульсъ 60, дых. 30. Выписанъ здоровымъ на 14-й день заболѣванія суставовъ. Кривизны количества мочи и уд. вѣса ея совершенно параллельны. Количество мочи съ 23 марта (1200 кс.) рѣзко поднялось до 2900 кс. къ 26-му марта, къ 28-му упало до 1350 кс. и опять увеличилось въ 2 пріема—2000 кс. 30 марта и 2300 кс. 1 апрѣля. Вѣсъ тѣла повышался съ 29-го по 3 апрѣля (раньше не измѣрялся).

XXVI. Водолазъ Василій К. 24 лѣтъ. Прибылъ 24 апрѣля, выписанъ 3 мая 1894 года. Перенесъ одинъ разъ острый суставной ревматизмъ въ этомъ году. 24. Болеетъ больше недѣли болью въ лѣвомъ колѣнѣ и правомъ тазобедренномъ суставѣ, въ поясницѣ. Правое колѣно припухло, движенія болѣзненны. Языкъ обложенъ. Сердце нормально. 25. Спалъ хорошо, немного потѣлъ. т° 38,7 вечеромъ. Ванна. 26. Пульсъ 64, дых. 24. т° 37,6—37,8. Боли, припухлости и повышеніе мѣстной температуры держатся въ тѣхъ же суставахъ. Назначено 6 порошковъ въ день салициловаго натра по 0,6; перевязка колѣна, массажъ. 27. Пульсъ 62, дых. 22. т° 37,1—37,3. Болей почти нѣтъ, въ поясницѣ меньше. 28. Пульсъ 60, дых. 18. т° 37,2—37,4. Боль въ колѣнѣ при давленіи; въ тазобедренномъ суставѣ нѣтъ боли. 3 порошка въ день. 29. Боль въ колѣнѣ при движеніи. Пульсъ 68, дых. 20. т° 36,7—37. Сердце нормально. Салициловый натръ оставить. 30. т° 36,8—36,9. Пульсъ 72, дых. 22. 1 мая. Пульсъ 72, дых. 21. т° 36,9—37. Боли въ колѣнномъ сгибѣ при ходьбѣ. 2. Пульсъ 84, дых. 22. т° 36,8—37,2. 3. Болей нѣтъ при ходьбѣ. Пульсъ 80, дых. 20. Выписанъ. Вѣсъ тѣла отъ 25 апрѣля (154½ ф.) постепенно повышался до 161 ф. въ день выписки.

XXVII. Кочегаръ Кузьма Ч. 24 лѣтъ. Прибылъ 16-го мая, выписанъ 25-го мая 1894 г. Въ 1891 г. перенесъ острый суставной ревматизмъ 17-го мая. Болеетъ 3-й день болями въ колѣнныхъ, голеностопныхъ и локтевыхъ суставахъ. Въ голеностопныхъ—припухлость и повышеніе мѣстной температуры; въ колѣнныхъ незначительная припухлость. Границы сердца нормальны, тоны чисты; иногда перебои. Заболѣть и потѣть ночью. Языкъ обложенъ, аппетитъ плохъ. На тѣлѣ сыпь розеолезнаго характера. т° 38,2—38,7. Назначена ванна;

перевязка суставовъ масломъ и ватой; салициловый натръ по 0,6—6 порошковъ въ день. 18. t° 38,3—39,4. Ломота въ колѣняхъ; въ голеностопныхъ суставахъ давленіе болѣзненно; въ нихъ и локтевыхъ ломоты нѣтъ. Знобило и потѣлъ. Сыпь исчезла вчера вечеромъ. Пульсъ 64, дых. 26. 19. t° 37,3—38,3. Пульсъ 72, дых. 20. Спалъ хорошо, не потѣлъ. Ломота въ колѣняхъ меньше. 20. t° 37,6—37,8. Пульсъ 64, дых. 24. Незначительная боль въ лѣвомъ колѣнѣ. При давленіи боль во всѣхъ пораженныхъ суставахъ; опухоль опала; немного потѣлъ. 21. t° 37,5—37,6. Пульсъ 56, дых. 20. Тоже. Въ колѣняхъ боль при ходьбѣ. Тоны сердца глуховаты. 22. t° 37,2—37,4. Пульсъ 60, дых. 24. Боль при ходьбѣ незначительная. Не потѣлъ. 2 порошка въ день. 23. t° 37—37,3. Пульсъ 60, дых. 24. 1-й тонъ въ сердцѣ съ шумомъ. Ванна. 24. t° 37,1—37,2. Чувствуетъ себя здоровымъ. Салициловый натръ оставить. 25. t° 36,8. Пульсъ 64, дых. 24. Въ сердцѣ тоже. Выписанъ на 11-ый день заболѣванія. Количество мочи по 1000 к. с. 18 и 19 го мая, по 1200 к. с. 20 и 21-го мая, 1500 к. с. 23-го мая и 900 к. с. 25-го мая.

XXVІІІ. Ояъ же. Прибылъ 6-го іюня, выписанъ 12-го іюля 1894 года. 6-го іюня. Боленъ 3 й день болью въ суставахъ. Боли начались скоро послѣ выхода изъ госпитала—(26-го мая). Опухли оба колѣнные и голеностопные суставы; сильно болѣзненны эти и локтевые суставы. Знобить и потѣть сильно 3-ю ночь. Языкъ обложенъ. 1-й тонъ въ сердцѣ съ шумомъ. Назначено 6 порошковъ салициловаго натра по 1,2. Перевязать суставы. t° 39,4 вечеромъ. 7. Не спалъ ночь, сильно потѣлъ. Появилась боль и припухлость въ локтевыхъ и лучезапястныхъ суставахъ. t° 38—38,8. 8. t° 37,4—37,5. Ломоты вездѣ нѣтъ. При давленіи и движеніи боль въ пораженныхъ суставахъ. Немного потѣлъ. 9. Боль при движеніи въ кистяхъ и колѣняхъ; немного ходить. t° 36,4—36,4. Пульсъ 54, дых. 24. Не потѣлъ. Ошупываніе суставовъ болѣзненно. Перевязку снять. 3 порошка въ день. 10. Тоже. t° 36,6—36,7. Не потѣлъ. 11. Боль при движеніи въ колѣняхъ, небольшая въ правой кисти. Опухли нѣтъ. При давленіи боль въ правой кисти и въ колѣнныхъ сгибахъ. Не потѣлъ. 12. Тоже. 13. При давленіи боли нѣтъ. Послѣ ходьбы ломота въ колѣняхъ. Пульсъ 60, дых. 24. 1 порошокъ въ день. Ванна. 15. Тоже. Салициловый натръ оставить. Пульсъ

68. 16. Послѣ ходьбы ноютъ колѣнные и голеностопные суставы. Отправленъ на дачу. 29-го іюня. При давленіи боли нѣтъ; небольшія боли утромъ. 9-го іюля. Чувствуетъ себя здоровымъ. 12. Выписанъ на 39-й день заболѣванія. Температура съ 10-го іюня держалась въ границахъ 36,7—37. Кривыя количества мочи за сутки, уд. вѣса ея и количества выпиваемой жидкости въ сутки—параллельны. Количество мочи 13-го іюня—1000 кс., 8—350 кс., 9, 10 и 11—по 600 кс. и 17 числа 1000 кс. Вѣсъ тѣла съ 9-го числа 142 ф. постепенно повысился до 146 ф. къ 17 іюня.

XXIX. Машинистъ Янъ П. 25 лѣтъ. Прибылъ 25-го іюня, выписанъ 1-го іюля 1894 года. 3 раза перенесъ острый суставной ревматизмъ. 25. Боленъ со вчерашняго дня болями и опухолью лѣваго лучезапястного и обонхъ колѣнныхъ суставовъ. Границы сердца нормальны. 1-й тонъ замѣненъ шумомъ. Ночью потѣлъ. t° вечеромъ 38,5. Назначено 6 порошковъ въ день салициловаго натра по 0,6. Перевязать суставы ватой и вазелиномъ. Ванна. 26. Боли усилились въ колѣняхъ, плохо спалъ ночь, немного потѣлъ. t° 37,5—38,5. Назначено 6 порошковъ по 1,2. 27. Болей нигдѣ нѣтъ. Опухоль опала. При движеніи и давленіи боли въ суставахъ. Сильно потѣлъ. t° 37,2—37,5. Опять 6 порошковъ по 0,6. 28. Боли небольшія при стояніи и хожденіи. Немного потѣлъ. t° 36,7—36,8. Принимать 3 порошка. 29. Немного болить поясница. Въ сердцѣ тѣ же явленія. t° 36,6—36,8. 1 порошокъ въ день. 30. Здоровъ. t° 36,5—36,6. Въ сердцѣ тоже. 1. Выписанъ на 8-й день заболѣванія. Салициловый натръ оставить 30-го іюня.

Д. 2 случая подострого суставного ревматизма. Лечение салициловымъ натромъ.

XXX. Машинистъ Василій Т. 25 лѣтъ. Прибылъ 21 мая, выписанъ 30 августа 1894 г. 21. Боленъ 2 недѣли болями въ колѣнныхъ, голеностопныхъ и локтевыхъ суставахъ. Измѣненій въ нихъ нѣтъ; при давленіи боль. Границы сердца нормальны, тоны чисты. Старый кашель. Въ легкихъ надъ лопатками сухіе хрипы. Назначено растираніе суставовъ летучею мазью; ванна; Доверовы порошки. 22. Ломота продолжается. Назначено салициловаго натра по 0,3 3 порошка. 24. Ломота немного меньше; ходить больно. 4 порошка въ день. 25. Тоже.

Ванна. 26. Стулъ жидкій 3 раза; головокруженіе. 27. Боль въ пяткахъ при движеніи. Въ локтевыхъ суставахъ боль при покоѣ и давленіи. У верхушки сердца систолическій шумъ. Принимать 3 порошка салициловаго натра по 0,6. 28. Ломота гораздо меньше въ правомъ плечѣ, колѣняхъ и пяткахъ при покоѣ и движеніи. Давленіе болѣзненно только въ пяткахъ. 30. Ломоты нѣтъ. При ходьбѣ боли въ пяткахъ, при сгибаніи въ колѣняхъ и локтяхъ. 31. Принимать 2 порошка. Ванна. 1. Боль при давленіи въ локтяхъ; при ходьбѣ незначительная боль въ пяткахъ. Въ сердцѣ тоже. 2. Незначительная боль при движеніи въ колѣнныхъ и локтевыхъ суставахъ. Салициловый натръ оставить. Отправленъ на дачу. Тамъ опять появилась ломота въ плечахъ, подъ вліяніемъ салициловаго натра прошла. 15 іюня. Болей нигдѣ нѣтъ. Затѣмъ появился поносъ, колюція боли въ области сердца и сердцебиеніе. 30 августа выписанъ. Температура все время нормальная (36,8—37,2). Количество мочи 1700 кс. (25 и 26 мая) уменьшилось до 1500 кс. къ 31 мая и до 800 кс. ко 2-ому іюня. Больной никогда не потѣлъ. Всѣхъ тѣла повышались.

XXXI. Рядовой Мовша П. 21 года. Прибылъ 23 іюня, выписанъ 26 іюля 1894 г. 23. Боленъ болѣе 2 недѣль болями въ голеностопныхъ, колѣнныхъ, локтевомъ и лучезапястномъ суставахъ правой руки. Голеностопные измѣнены въ очертаніяхъ. Боли при покоѣ и движеніи. На голени пигментация и рубцы отъ язвъ. Полгода назадъ началась ломота въ голенихъ. Сердце нормально. t° 37,7. 24. Вчера вечеромъ ангиоли. Правый лучезапястный суставъ припухъ, сильно болѣзненно. Стула не было. Назначено: salomelanos 0,5; 6 порошковъ по 0,6 салициловаго натра. Перевязка суставовъ ватой и растираніе летучею мазью. Ванна. t° 38—38,2. 25. Боли меньше, спать, не потѣлъ. Появилась боль въ лѣвомъ лучезапястномъ суставѣ. Боль при глотаніи; стулъ жидкій 5 разъ. t° 37—37,6. 26. Ночью сильно болѣли колѣнные и голеностопные суставы; въ правой кисти боли нѣтъ, давленіе почти безболѣзненно. Головокруженіе. Стулъ 2 раза. t° 37,6—37,7. 27. Боли при сгибаніи въ правомъ колѣнномъ и голеностопномъ и лѣвомъ голеностопномъ суставахъ, при давленіи небольшая боль. Потѣлъ. t° 37,7—37,5. 28. Появилась ломота въ правыхъ лучезапястномъ, локтевомъ и колѣнномъ суставахъ; 1-ый еще опухши. Плохо спать, потѣлъ. Боль въ животѣ и жидкій стулъ 2 раза. Назначено са-

лициловаго натра по 1,2 6 порошковъ; 10 капель t-гае оріи 2 раза въ день. t° 37,5—37,8. 29. Ломота временами; ночью сильно потѣлъ. t° 37,1—37,4. 30. Въ правой кисти боль и припухлость держится. Потѣть цѣлый день. Стулъ жидкій. 1. Боль въ правомъ голеностопномъ суставѣ, при давленіи усиливается. Ночью ломота во всѣхъ суставахъ. Не потѣлъ; стулъ жидкій. 3 порошка въ день. 2. Ночью ломло правый лучезапястный суставъ; боль при ходьбѣ въ колѣнныхъ сгибахъ. 3. При давленіи и движеніи боль въ правомъ лучезапястномъ суставѣ. Не потѣлъ. Назначено 4 порошка въ день по 0,6. 4. Тоже. 5. По ночамъ сильная боль въ суставахъ. Потѣлъ. Голеностопные суставы цѣсколько измѣнены въ очертаніяхъ. 6. Незначительная боль въ правой кисти, въ правомъ локтѣ. Въ ногахъ боли при ходьбѣ. На легочной артеріи 1-ый тонъ сердца замѣненъ шумомъ. 7. Ноги почти не болятъ; опухоль праваго лучезапястного сустава держится. Сильно потѣлъ. 6 порошковъ салициловаго натра по 0,6. 8. Ноги болятъ при ходьбѣ и стояніи. 4 порошка въ день. Ванна. 10. Ломоты нѣтъ. Боли при стояніи и ходьбѣ. Порошки оставить; капли ошіи тоже. Стулъ нормальный. Отправленъ на дачу. 13. Боли только въ подошвахъ. 26. Выписанъ. Температура съ 29 іюня была все время нормальной, колебалась отъ 37 до 37,5.

Е. Случай обостреннаго хроническаго суставнаго ревматизма; леченіе салициловымъ натромъ.

XXXII. Рядовой Прокофій З. 21 года. Прибылъ 23 мая, выписанъ 25 іюня 1894 года (1-ый разъ лежалъ по поводу хронич. ревматизма и катарра желудка—см. ниже). 23. Боленъ 4-ый день болью въ суставахъ. Пораженъ правый лучезапястный, лѣвые локтевой и колѣнный суставы. Сердце нормально. t° вечеромъ 38,5. 24. Въ лѣвомъ лучезапястномъ суставѣ появилась сильная боль и припухлость. Правое колѣно ломитъ меньше, лѣвое по старому. t° 37,6—38,4. Назначено 6 порошковъ въ день салициловаго натра по 1,2. Перевязка суставовъ ватой и масломъ. Ванна. 25. Потѣлъ, спать лучше. Боли меньше, при дотрогиваніи еще сильная боль. t° 37,2—38. 26. Правый лучезапястный суставъ опалъ, не болитъ. Лѣвую руку и ногу ломитъ, боль при давленіи. Немного потѣлъ, знобитъ. t° 36,7—37,7. 27. Ломота въ лѣвомъ голеностопномъ и правомъ лучезапястномъ суставахъ, немного потѣлъ.

то 36,6—37,6. 28. Опухоль лучезапястного лѣваго опала. Ломота временами. Спаль хорошо, сильно потѣлъ. то 36,7—37,4. 29. Ломота продолжается, потѣлъ. то 37,1—36,6. 30. Въ лучезапястномъ лмота сильнѣе, плохо спалъ; ноги больно сгибать. то 36,5—36,8. Ванна. 31. Ломота временами. Въ лѣвомъ колѣнѣ сильная боль при движеніи и давленіи; въ другихъ суставахъ небольшая. Сильно потѣлъ. то 36,6—37,3. 1. Чувствуетъ себя лучше. Не потѣлъ. Ломота въ лѣвомъ колѣнѣ. то 36,6—37,4. 2. Ломота въ суставахъ временами; при давленіи боли нѣтъ; ходить свободно. 2 порошка (по 0,6) въ день. 4. Отправленъ на дачу. 8. Незначительная припухлость и боль держатся въ лѣвомъ колѣнѣ. Приемы iod. натра въ малыхъ дозахъ. 19. Припухлости нѣтъ. Ходить свободно. 21. Здоровъ. 25. Выписанъ. Температура вначалѣ повысилась на дачѣ, достигнувъ 38,6; вмѣстѣ съ тѣмъ усиленіе болей въ лѣвомъ колѣнѣ и катарральная ангина. Черезъ нѣсколько дней температура пала. Количество мочи 1100 кс. 25 мая, упавъ до 750 кс. 26-го, затѣмъ увеличивалось до 2100 кс. 29-го и 2600 кс. 1 июня. Кривыя количества мочи и уд. вѣса ея параллельны. Пульсъ вначалѣ (26—28) 68, къ 31-ому участился до 84, затѣмъ упалъ до нормы.

Ж. 2 случая хроническаго суставнаго ревматизма; леченіе салициловымъ натромъ.

XXXIII. Машинистъ Никита С. 22 лѣтъ. Прибылъ 24 мая, выписанъ 26 іюля 1894 года. 2-ой разъ въ Госпиталѣ. 24. Боленъ съ недѣлю лмотою и болью при ходьбѣ въ пяткахъ. Правый голеностопный суставъ измѣненъ въ очертаніяхъ, давленіе не болѣзненно. Сердце нормально. Въ лазаретѣ мазали ногу іодомъ, давали по 1 порошку салиц. натра 3 дня. Назначено растираніе летучей мазью. Ванна. 25. Временами лмота въ суставахъ, при движеніи постоянная боль. Назначено 3 порошка салициловаго натра по 0,6. 26. Ломота не даетъ спать. 6 порошковъ въ день. 27. Ломоты нѣтъ. Боли при движеніи въ пяткахъ; опухоль по прежнему. 3 порошка въ день. 28. Тоже. 30. Ходить легче, лмоты нѣтъ. 2 порошка. Ванна. 31. Тоже; при давленіи боли нѣтъ, опухоль держится. Салициловый натръ оставить. 1. Боли по старому при наступаніи на пятки. 2. Ломота при ходьбѣ въ лѣвомъ колѣнѣ, въ пяткахъ по старому. При давленіи боль въ лѣвомъ колѣнѣ и

голеностопныхъ суставахъ; опухоль послѣднихъ нѣсколько опала. Отправленъ на дачу. Тамъ опять лечили салициловымъ натромъ (3 порошка въ день по 1,0). 29 іюня. Боли послѣ ходьбы въ пяткахъ. Съ 30 іюня получалъ отваръ брусники. 16. Боли меньше. 17—23. Боли нигдѣ нѣтъ. 26. Выписанъ. Температура держалась все время около 37, колебалась отъ 36,3 до 37,4.

XXXIV. Матрость Владиміръ В. 22 лѣтъ (см. выше). Прибылъ 9 іюня, выписанъ 16 августа 1894 года. 10. Боленъ давно. Послѣ выписки изъ госпитала (1 іюня) сейчасъ же заболѣли и опухли голеностопные суставы; боль при движеніи въ правомъ плечѣ и не проходила. При покоѣ постоянная боль въ голеностопныхъ и тазобедренныхъ суставахъ, въ лучезапястныхъ временами. Правая граница сердца съ праваго края грудины, другія нормальны; 1-ый тонъ вездѣ замѣненъ шумомъ; одышка и сердцебіеніе при движеніи. Назначено 6 порошковъ салициловаго натра по 0,6. Ванна. Массажъ суставовъ. 11. Боли по прежнему; въ тазобедренномъ суставѣ движеніе легче. 12. Ноги лмотать меньше. 13. Ломота меньше. Плечо по старому. Не потѣлъ; движенія легче. 14. Ломота усилилась. 15. Въ плечахъ боль меньше, въ ногахъ по старому. Не потѣть. Одышка и сердцебіеніе каждый день. 16. Плечо при давленіи и покоѣ не болитъ, временами ломитъ. Ноги по старому лмотать, не даютъ спать. Отправленъ на дачу. Тамъ лечили іодистымъ калиемъ съ салициловымъ натромъ въ малыхъ дозахъ. 29 іюня. Плечо почти не болитъ; ноги болятъ при движеніи. Затѣмъ больной медленно поправлялся и выписанъ 16 августа. Температура была все время нормальна. Вѣсъ тѣла повышался.

3. Случай остраго суставнаго ревматизма съ мѣстнымъ леченіемъ.

XXXV. Кочегаръ Федоръ Н. Прибылъ 19 апрѣля, выписанъ 4 мая 1894 года. 2 года тому назадъ перенесъ легкую форму суставнаго ревматизма. 19. Боленъ 3-й день болью и опухолью въ лѣвомъ лучезапястномъ и припухлостью безъ боли въ лѣвомъ голеностопномъ суставѣ (въ немъ боль держалась 3 дня, затѣмъ прошла). Сердце нормально. Назначена перевязка ватой и масломъ сустава. Ванна. то вечеромъ 38,6. 20. Тоже. Не потѣлъ. то 37,2—37,9. 21. Не потѣлъ. Боли по старому. то 37,2—38,2. 22. Боль въ лучезапястномъ суставѣ

прошла; опухоль меньше; боли въ лѣвомъ колѣнномъ суставѣ. Сердце нормально. t° 37,6—37,7. 23. Боли меньше. Назначено растираніе летучею мазью суставовъ. t° 37,6—38,2. 24. t° 37,7—37,9. 25. Боли незначительныя въ лучезапястномъ сочлененіи. t° 37,4—37,8. 26. Тоже. t° 37,3—37,1. Ванна. 27. Тоже. t° 37,2—37,3. 28. Болей нѣтъ нигдѣ. Суставы нормальны. Въ сердцѣ перебои; 1-й тонъ нечистый. t° 37—37,4. 30. Перебои нѣтъ. 1-й тонъ нечистый. 1. 1-й тонъ замѣненъ шумомъ. 2. Границы сердца нормальны, систолическій шумъ у верхушки. Чувствуетъ себя здоровымъ. t° 36,8—37,6. 3. Тоже. t° 36,6—37,4. Выписанъ. Пульсъ 20—24 апрѣля нормальный (72), къ 27-му упалъ до 64; 29 апрѣля 72, а 30—1—2 по 88. Число дыханій только 22 и 23 апрѣля 18, остальные дни по 24; къ 30-му увеличилось до 28. Кривыя количества мочи и ея уд. вѣса параллельны. Количество мочи 22 и 23 апрѣля по 1700 кс. за сутки, 24-го 1200 кс., а 25-го даже 1050 кс; но уже 26-го по 2100 кс; 27 апрѣля опять меньше (1250 кс), 28 и 29-го по 2000 кс; 30 и 1-го по 1400 кс, а 2—3—4 мая по 2400 кс. Вѣсъ тѣла постепенно увеличивался съ 153½ ф. (20 апрѣля) до 157 ф. (4 мая).

И. 4 случая хроническаго катарра желудка. Лечение хвойниками.

XXXVI. Матросъ Егоръ М. 22 лѣтъ. Прибылъ 15 июня, выписанъ 28 июня 1894 года. 15. Боленъ съ мѣсяць болью въ груднѣхъ. Въ обоихъ легкихъ выслушиваются кое-гдѣ сухіе хрипы. Языкъ обложенъ; животъ вздутъ и болѣзненъ; стулъ задержанъ; изжога. Тошноты и рвоты не бываетъ. Дано ol. Ricini 30,0. 16. Стула не было; аппетита нѣтъ. Послѣ ѣды становится тяжелѣе. Назначено ol. Ricini 30,0. Ванна. Молочная порція. 17. Боль въ спинѣ, послѣ ѣды изжога. Языкъ обложенъ, аппетитъ плохъ. Стулъ былъ; не потѣлъ. Назначено infusum erhedrae изъ 8,0 на сутки въ 3 приема. 18. Стулъ 1 разъ жидкій. Боли въ груднѣхъ и спинѣ. Со вчерашняго утра ломятъ глаза. 19. Боль въ груднѣхъ и спинѣ усилилась. Стулъ 1 разъ жидкій; изжога продолжается. Глаза не болятъ. Немного потѣлъ. 20. Въ спинѣ сильная боль. Боль подъ ложечкой, аппетитъ плохъ, стулъ нормальный. Немного потѣлъ. Въ животѣ gorgillement. 21. Тоже, немного потѣлъ. Назначена 2-ая порція съ жарикомъ. 22. Въ спинѣ и груди боль по старому, подъ ложечкой меньше. Аппетитъ лучше; стулъ 3

раза нормальный. Языкъ нѣсколько обложенъ. Потѣлъ незначительно. Ванна. 23. Аппетитъ лучше; стулъ 1 разъ нормальный. 24. Боль подъ ложечкой усилилась съ того дня, какъ стала ѣсть горячій супъ. Стулъ 1 разъ жидко. Спина болитъ по старому. 25. Стулъ 2 раза жидкій. Языкъ почти нормальный. Отрыжки и изжоги не бываетъ. Боль по старому въ спинѣ. 26. Опять появилась боль подъ ложечкой, отрыжка усилилась. Стулъ 1 разъ жидко. Аппетитъ удовлетворительный; немного потѣлъ по ночамъ. Незначительный кашель; верхушки легкихъ нормальны. 27. Боль подъ ложечкой меньше, спина и грудь по старому; при движеніи рукъ боли въ спинѣ и груди усиливаются (мышечныя?). Отрыжка продолжается, аппетитъ лучше, стулъ кашицеобразный. 28. Въ спинѣ боль по старому; въ груди и подъ ложечкой меньше. Стулъ 1 разъ нормальный. Отрыжки нѣтъ. Аппетитъ лучше. Немного потѣлъ каждую ночь. Хвойникъ оставить. Выписанъ изъ госпиталя. Температура все время была нормальна (37—37,4). Пульсъ 60—17 июня, 52—18-го, 64—19-го; затѣмъ, упавъ до 56, къ 23-му поднялся до 64, а къ 26-ому до 68. Число дыханій кромѣ 18 июня (26) держалось все время на 22—24; 25-го июня опять 26, а 27-го даже 30. Кривыя количества мочи и ея уд. вѣса параллельны. Количество мочи съ 700 кс. (18 июня) поднялось до 1200 кс. къ 21-ому и съ колебаніями держалось на этой величинѣ. Сообразно количеству мочи увеличилось количество поглощаемой за сутки жидкости. Вѣсъ тѣла со 115 ф. (18 июня), нѣсколько уменьшившись вначалѣ, постепенно увеличился до 119¼ ф.

XXXVII. Рулевой Михаилъ К. 27 лѣтъ. Прибылъ 17 июня, выписанъ 28 июня 1894 года. Лежалъ 5 разъ въ здѣшнемъ госпиталѣ. 18. Боленъ 5-ый годъ. Жалуются на боль подъ ложечкой, отрыжку, иногда изжогу послѣ ѣды. Языкъ обложенъ; животъ мягокъ, болѣзненъ подъ ложечкой. Аппетитъ хорошій, стулъ ежедневно 1 разъ нормальный. Въ правомъ легкомъ сзади пальца на 4 ниже угла лопатки небольшое притупленіе, дыханіе нормальное. Прежде болѣлъ бокъ. 19. Каждую ночь немного потѣлъ. Кашля нѣтъ. Сердце нормально. Назначено inf. erhedrae vulg. изъ 8,0 на сутки въ 3 приема. Ванна. 20. Боль подъ ложечкой, усиливающаяся послѣ ѣды, отрыжка. Аппетитъ хорошій. 21. Спитъ плохо. Жалуются на горечь во рту. Стулъ нормальный. 22. Спитъ лучше. Боль

подъ ложечкой меньше; немного потбѣтъ ночью. 23. Изжога съ горечью во рту. Не потбѣлъ. Стулъ нормальный. Плохо спалъ. 24. Ощущеніе тяжести подъ ложечкой при вздохѣ, при давленіи адѣсь боль. Отрыжка и изжога меньше. Языкъ не совсѣмъ чистый. 25. Спалъ хорошо. Изжоги и боли при давленіи нѣтъ, отрыжка очень рѣдко. Стулъ и аппетитъ нормальный. Ванна. 26. Отрыжка рѣдко по прежнему. Послѣ ѣды тяжело дышать. 27. Танущее ощущеніе подъ ложечкой. Появилась изжога. Языкъ обложенъ. 28. Тяжесть подъ ложечкой меньше, отрыжка рѣдко. Стулъ нормальный. Чувствуетъ себя значительно лучше противъ прежняго. Хвойникъ оставить. Выписанъ. Температура все время нормальна (36,7—37,2). Пульсъ 76—19 іюня, 56—20-го, а съ 21 іюня колебался отъ 64 до 68. Число дыханій 19 и 20 іюня 20, къ 23-му упало до 17, къ 26-ому постепенно поднялось до 22. Кривыя количества мочи и ея уд. вѣса совершенно параллельны. Количество мочи 1750 кс. за 19 іюня, уже 20-го 2400 кс., а 21-го 1300 кс.; къ 23-му увеличилось до 1800 кс. и, уменьшившись до 600 кс. 26 іюня, 27-го достигло опять до 1650 кс. Вѣсъ тѣла со 113 ф. (20 іюня) поднялся до 118 ф. (28 іюня).

XXXVIII. Матросъ Михайлъ Л. 27 лѣтъ. (Сторожъ въ домѣ Главнаго Командира). Прибылъ 4 іюня, выписанъ 5 іюля 1894 года. Диагнозъ: Catarrhus gastricus chronicus. Anaemia. 5. Боленъ мѣсяца 3—болью приступами подъ ложечкой, тошнотой, сердцебіеніемъ, головокруженіемъ. Слабость въ ногахъ, аппетитъ плохъ, стулъ жидкій (послѣднее продолжается лѣтъ 5). Шумъ въ правомъ ухѣ около 3 лѣтъ. (Catarrhus tubae Eustachii—диагнозъ отіагра); небольшое воспаленіе зѣва. Назначено inf. erhedrae vulg. изъ 8,0 на сутки въ 3 приема. Ванна. 2-ая порція съ жаркимъ. 6. Не потбѣтъ; спать не особенно хорошо. Боли въ поясницѣ. 7. Боль подъ ложечкой и въ поясницѣ. Временами тошнота, аппетитъ плохъ. Сердце совершенно нормально. Пульсъ 88, дых. 20. Языкъ обложенъ. 8. Пульсъ 72, дых. 24. Стулъ 3 раза (2 раза жидко). Временами тошнота. Ванна. 9. Ночью 2 раза тошнило. Стулъ жидкій 2 раза. Головокруженіе. Жалобы на сердцебіеніе. Пульсъ 64, дых. 20. 10. Стулъ жидкій 3 раза. Тошнота, боль подъ ложечкой продолжаютъ. Пульсъ 64, дых. 26. 11. Тоже. Стулъ жидкій 1 разъ. Пульсъ 68, дых. 20. Назначено еще Atropini sulfur. 0,06—8,0 аq. d. Впускать одну каплю въ ухо. 12. Вечеромъ

немного потбѣлъ. Аппетитъ плохъ, языкъ обложенъ. Стулъ 2 раза жидкій. 13. Боли подъ ложечкой меньше. Спалъ хуже. Ломота въ ногахъ. Потбѣлъ. Шумъ въ ухахъ по старому. 14. Шумъ въ ухахъ меньше. Головокруженіе чаще чѣмъ прежде; спалъ хорошо, потбѣлъ. Ломота въ ногахъ меньше. Аппетитъ лучше. Прибавлено къ порціи 2 яйца. 15. Спалъ хорошо; съ утра болитъ голова. Головокруженіе и шумъ въ ухахъ меньше. Тошнота по прежнему. Не потбѣлъ. 16. Тошнота меньше. Боли въ поясницѣ и ногахъ по старому. Стулъ 2 раза кашицеобразный. Не потбѣлъ. Спалъ плохо отъ боли въ поясницѣ. Хвойникъ и атропинъ оставить. Отправленъ на дачу. Тамъ значится все „лучше“. 5 іюля выписанъ. Температура колебалась отъ 36,8 до 37,4, 2 раза поднявшись вечеромъ до 37,6. Пульсъ съ 11 іюня постепенно поднялся до 76 (13 іюня) и до 80 (16 іюня). Число дыханій 20—24 первые дни, 26—10 іюня, затѣмъ 18—22. Кривыя количества мочи и ея уд. вѣса параллельны. Количество мочи 1600 кс. 7 іюня, 8 и 9—2000 кс., затѣмъ постепенно уменьшилось до 1500 кс. (13 іюня) и опять поднялось до 2700 кс. къ 15 іюня. Вѣсъ тѣла все время повышался.

XXXIX. Молодой солдатъ Прокофій З. 22 лѣтъ. Catarrhus gastricus chronicus. Rheumatismus articularis chronicus. Больной по 29 марта 1894 года лежалъ въ нервномъ отдѣленіи для наблюденія, такъ-какъ онъ будто-бы страдалъ припадками съ потерей сознанія и судорогами. Втеченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ лежанія въ госпиталѣ припадковъ не наблюдали. На самомъ-же дѣлѣ больной страдалъ хроническимъ катарромъ желудка (боль подъ ложечкой, рвота по временамъ, сильный запахъ изо рта, запоръ по нѣскольку дней, отсутствіе аппетита, горечь во рту). Иногда на нѣсколько дней всѣ эти явленія пропадали. Съ 10-го января больной перенесъ острый суставной ревматизмъ (или обостреніе хронической формы), весьма быстро принявшій хроническое теченіе. 30-го марта. Ломота въ колѣнныхъ, голеностопныхъ, плечевыхъ и локтевыхъ суставахъ; боль въ спинѣ и поясницѣ. Ломота въ ногахъ продолжается 4 года. Видимыхъ измѣненій въ суставахъ нѣтъ. Боль подъ ложечкой, послѣ ѣды кислая отрыжка. Языкъ обложенъ. Стула нѣтъ 3 дня. Сердце нормально. 31. Тоже. Стула нѣтъ 4-й день. Языкъ обложенъ; аппетитъ плохъ. По утрамъ бываютъ знобы. Назначено inf-decoctum erhedrae

vulg. изъ 5,0 на 2 приема. Ванна. 1-го апрѣля. Боли въ правой ногѣ и рукахъ нѣтъ; колющая боль въ груди. Стула не было. Аппетитъ лучше. Назначено inf-dec. изъ 8,0 на сутки въ 3 приема. Клизма. 2. Сильно потѣлъ. Ломота въ конечностяхъ меньше, въ спинѣ продолжается. Стулъ былъ послѣ клизмы. Языкъ обложенъ, запахъ изо рта. 3. Тоже. Стула не было. 5. Подъ ложечкой боли нѣтъ, языкъ чистый. Стулъ былъ, аппетитъ лучше. Болей въ суставахъ нѣтъ. Не потѣлъ. 6. Ломота въ лѣвомъ колѣнѣ, плохо спалъ. Боль подъ ложечкой, горечь во рту. Стулъ былъ. 7. Ломота въ лѣвомъ колѣнѣ, спинѣ, схватками въ рукахъ. Стула не было; языкъ обложенъ. Растирать конечности летучею мазью. 8. Ломота въ обоихъ колѣняхъ и спинѣ. Боль подъ ложечкой. Языкъ обложенъ, стула не было. Въ правомъ колѣнѣ боль только при движеніи. Клизма. Ванна. 9. Боль въ спинѣ и ногахъ меньше. Аппетитъ плохъ, языкъ обложенъ. 10. Боль подъ ложечкой незначительная, въ суставахъ нѣтъ. Стула не было. 11. Болей нигдѣ нѣтъ. Стулъ былъ, языкъ чистый. 1-я порція. 12. Стулъ былъ. 13. Не было стула. 14. Стула не было. Боль подъ ложечкой и въ спинѣ, запахъ изо рта. Языкъ обложенъ. 2-я порція съ жаркимъ; $\frac{1}{2}$ кружки молока. 15. Временами колющі боли въ груди, боль подъ ложечкой; запахъ изо рта, горечь во рту. 16. Тоже. Стула 3 дня не было. Колотье въ паткахъ. Клизма. 17. Тоже. Стулъ послѣ клизмы. 18. Аппетитъ лучше, боль подъ ложечкой меньше, стула не было. Боль въ ногахъ и спинѣ. 19. Аппетитъ плохъ; боль въ стопахъ; стула не было. 20. Стула не было. Клизма. 21. Аппетитъ лучше. Стула не было. 22. Боль въ ногахъ, спинѣ и груди; днемъ сильно потѣлъ. Боль подъ ложечкой. Аппетитъ хуже. Стула не было. Назначено вмѣсто настоѣ отвара infusum erhedrae изъ 8,0 на сутки. 23. Потѣлъ. Боль въ лѣвомъ боку. Въ легкихъ ничего характернаго, слабый выдохъ въ верхушкахъ. Боль въ ногахъ и подъ ложечкой. Стула не было. Запахъ изо рта, отрыжка послѣ ѣды. 25. Стула нѣтъ 5-й день. Аппетита нѣтъ. Боль въ рукахъ, ногахъ, во всемъ животѣ. Назначена клизма. Молочная порція. 26. Стулъ послѣ клизмы. Болей въ ногахъ нѣтъ. 27. Опять боли. Стула не было. Клизма. 28. Стулъ послѣ клизмы. Запахъ изо рта. Вчера было кровотеченіе изъ носа. Ванна. 29. Аппетитъ хорошій, боль подъ ложечкой временами. Стула не было, языкъ

чистый. 2-я порція съ жаркимъ, $\frac{1}{4}$ кружки молока. 30. Стулъ былъ. 1. Болей нигдѣ нѣтъ. Подъ ложечкой боль, тошнота, отрыжка. Стулъ былъ. 2. Потѣлъ. Боль подъ ложечкой. 3. Стула нѣтъ 2-й день. Вечеромъ бросаетъ въ жаръ; не потѣлъ. Вчера тошнило и рвало. Боль въ конечностяхъ и спинѣ. Клизма. 4. Тоже. Хвойникъ оставить. 5. Стула не было. Вчера рвало. Горячникъ подъ ложечку. 6. Стула не было. Запахъ изо рта; немного потѣлъ. Клизма. 7. Боль подъ ложечкой, запахъ изо рта, тошноты нѣтъ. Выписанъ. Температура съ 1 апрѣля—3 дня, опускаясь утромъ до 36,6, вечеромъ поднималась до 37,5 и 37,6, а 3 и 4-го даже до 38,2 и 38. Затѣмъ колебалась въ предѣлахъ нормы, поднявшись 9 апрѣля до 37,8, затѣмъ до той же цифры 13, 14, 17, 18, 23 апрѣля, а 25-го до 38. Съ 30 апрѣля по 3 мая опытъ повшенія (37,8—30-го, 38,1—1 и 3 мая; а 2-го 38,9). Пульсъ 80—1 апрѣля, 64—5-го, опять 80—7 и 8-го, затѣмъ 64—72, 21 апрѣля поднялся до 92, 23 и 24-го до 88, столько же 28 апрѣля и 7 мая, остальные дни 72—76. Число дыханій держалось на 27—30 отъ 1 до 9 апрѣля, на 20—28 9—21 апрѣля и такъ до конца, исключая 22 апрѣля (32). Кривыя количества мочи, уд. вѣса ея и количества выпиваемой за сутки жидкости совершенно параллельны. Количество мочи съ 2700 кс. (30 марта) упало до 1200 кс. (3 апрѣля), увеличилось до 3500 кс. (11 апрѣля), постепенно упало до 800 кс. (17 числа) и опять увеличилось до 1900 кс. (20 апрѣля) и до 3000 кс. (30 апрѣля); уменьшилось до 2000 кс. (3 мая) и до 1500 кс. (6-го). Вѣсъ тѣла со 135 ф. (3 апрѣля) повысился до 140 ф. (15 апрѣля) и такъ держался до конца.

1. 13 случаевъ плеврита; лечение хвойникомъ.

XXXX. Легкій случай. Матросъ Александръ Г. 22 лѣтъ. Прибылъ 8 марта, выписанъ 3 апрѣля 1894 года. Pleuritis ex. dexta. 8 марта. t° 40,3 вечеромъ. Заболѣлъ съ недѣлю назадъ сильною болью въ правомъ боку, внобомъ и жаромъ съ потомъ (уже мѣсяца $1\frac{1}{2}$ слегка болятъ бока). Въ правомъ боку сзади притупленіе звука на 3 пальца ниже угла лопатки, дыханіе и голосовое дрожаніе ослаблено; по подмышечной линіи рѣзкаго притупленія нѣтъ. Языкъ обложенъ. Назначено валомила 0,3 1 порошокъ; согревающей компрессъ на бокъ. 2-я порція. 9. Стулъ 3 раза, 2 раза рвало. Назначено 3 порошка морфія

по гр. $\frac{1}{2}$. t° 37,8—38,6. 10. Немного потѣлъ. Сильный кашель и боль въ груди. Стула не было. Ванна. t° 38,2—37,9. 11. Тоже. Потѣлъ. Стула не было. 5 порошковъ морфія; ol. Ricini 30,0. t° 38,7—39. 12. Сильно потѣлъ, стулъ 4 раза. Сильный кашель и боль въ боку. t° 38,2—38,8. 13. Не потѣлъ. Стула не было. t° 37,7—38,7. 14. Потѣлъ; кашель меньше. 3 порошка морфія. Клизма. t° 38—38,5. 15. Потѣлъ. Приглушеніе сзади на 1 палецъ ниже угла лопатки, по подмышечной съ 5 го межребернаго промежутка. Голосовое дрожаніе и дыханіе здѣсь ослаблены. Боль въ боку сильная. Назначено *inf-decostum erhedrae* изъ 8,0 на сутки. t° 38,1—38,6. 16. Сильно потѣлъ. t° 37,3—38,4. 17. Кашель меньше; немного потѣлъ. t° 37,6—38,2. Ванна. 18. Немного потѣлъ. Одышка и боль въ боку. t° 37,7—38,3. 19. Не потѣлъ. t° 37,6—38,1. 20. Не потѣлъ. t° 37,5—37,9. Приглушеніе сзади на 3 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. 21. Не потѣлъ. 23. Одышка и боль меньше. Приглушеніе сзади на прежнемъ уровнѣ; по подмышечной нѣтъ. 26. Колотья въ боку нѣтъ, небольшой кашель; одышки нѣтъ. 29. Приглушеніе сзади въ прежней границѣ. 30. Чувствуетъ себя здоровымъ, *inf-dec.* изъ 5,0 на сутки. 31. Приглушеніе сзади на 4 пальца ниже угла лопатки. Не потѣть. Компрессъ снять. 2. Хвойникъ оставить. 3. Явления въ легкихъ тѣже. Выписанъ на 34-й день заболѣванія. Температура 21 марта 37,7—37,8, съ 22-го числа нормальна. Пульсъ 80 10 марта, постепенно упалъ до 58 кѣ 17 марта, держался на 72 (18—21), а остальные дни на 62. Число дыханій до 25 марта было 18—20, 25—27 марта по 25, затѣмъ 15—20. Кривыя количества мочи и ея уд. вѣса параллельны. Количество мочи съ 300 к. с. (11 марта, увеличилось до 1500 к. с. (12-го) и до 1700 к. с. (13—18—21 марта), затѣмъ упало до 1300 к. с. (1 апр.). Вѣсъ тѣла держался на одной величинѣ (125 ф.). Больной не потѣлъ послѣ паденія температуры.

6 среднихъ случаевъ.

XII. Матросъ Иванъ В. 23 лѣтъ. *Pleuritis exud. dextra*. Прибылъ 4 января, выписанъ 19 іюля 1894 года. Лежалъ 1 разъ съ сухимъ плевритомъ правой стороны въ 1893 году. 4. Заболѣлъ 31 декабря 1893 года. Колотья въ правомъ боку, незначительный кашель. Приглушеніе сзади немного выше угла лопатки, голосовое дрожаніе мало замѣнено, дыханіе почти

отсутствуетъ. По подмышечной приглушеніе неполное съ 4 ребра, дыханіе и дрожаніе очень ослаблены; здѣсь выслушивается шумъ тренія плевры. Назначена ванна. Доверовахъ порошковъ по 0,3—3 въ день. Согрѣвающий компрессъ на бокъ. 2-ая порція, $\frac{1}{2}$ кружки молока. 8. Назначенъ *inf-decostum erhedrae* изъ 5,0 на сутки. 9. Небольшое головокруженіе, постоянно внобить. Одышка и боль въ боку нѣтъ; спать на правомъ боку нельзя. Кашель небольшой. 12. Временами колотья въ боку. Компрессъ снять. Приглушеніе въ боку на прежнемъ уровнѣ. 14. Головокруженія нѣтъ. Одышка, кашель небольшой. 15. Поносъ 5 разъ. Назначенъ *inf-dec.* изъ 5,0 на 1 приемъ; 5 капель опія 3 раза въ день. 16. Капля нѣтъ, стулъ нормальный. *Inf-dec.* изъ 10,0 на 1 приемъ. 18. Колотья въ боку нѣтъ. Приглушеніе въ прежнихъ границахъ. 21. Приглушеніе на 2 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра; дыханіе и голос, дрожаніе ослаблены. Боль въ груднѣ. 27. Приглушенія по подмышечной нѣтъ, сзади по старому. Шумъ тренія въ подмышечной области. Ванна. 3. Приглушеніе сзади на 1 палецъ ниже угла лопатки, дыханіе и голосовое дрожаніе здѣсь отсутствуютъ. Боль въ груди по вечерамъ. 9. Назначено *inf-dec.* изъ 5,0 на 1 приемъ. 11. *Inf-dec.* изъ 8,0 на сутки. 20. Приглушеніе сзади на 3 пальца ниже угла лопатки, дрожаніе и дыханіе ослаблены. Боль въ груднѣ. 24. Хвойникъ оставить. Ванна. 26. Приглушеніе въ прежнихъ границахъ. Назначено желѣзо въ порошкахъ. 1 марта тоже. 2. Грудь болитъ больше; голокруженіе и сердцебіеніе по ночамъ. 4. Боль въ боку хуже, одышка. Опять назначено *inf-dec. erhedrae* изъ 8,0 на сутки. 7. Приглушеніе сзади не полное съ самого низу; голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены съ угла лопатки. 14. Чувствуетъ себя хуже, появился ночью капель. Мѣсто тѣ же явленія. 17. Назначено *inf. erhedrae* изъ 8,0 на сутки. 20. Боль въ боку усиливается къ вечеру; немного потѣть; одышка при ходьбѣ. 24. Кашель незначительный. 29. Боль въ груднѣ держится, въ боку меньше. 30. Хвойникъ оставить. 1 апрѣля. Приглушенія въ боку почти нѣтъ, дыханіе и голосовое дрожаніе ослаблены съ угла лопатки (сращенія). Далѣе постоянныя жалобы на боль въ боку, груднѣ, головокруженіе. Больной получаетъ мышьякъ, затѣмъ хининъ и по случаю присоединившагося поноса—висмутъ съ опіемъ. 26 мая от-

правленъ на дачу. 29 июня. Бокъ почти не болитъ. Чувствуетъ себя хорошо. Явленія въ плеврѣ по старому (срашенія). 19 іюля выписанъ. Лежалъ въ Госпиталѣ около 200 дней. Бугорковыхъ палочекъ въ мокротѣ не найдено. Верхушки легкихъ совершенно нормальны. Температура вначалѣ (4—14 января) держалась на 39 съ послаблениями до 38,2—38,4 по утрамъ; 14 января пала до 37,9, а 15-го до 37,2. Затѣмъ температура колебалась отъ 37 до 38 до 25 февраля, давъ нѣсколько вечеровъ повышение до 38,6. 26-го и 28 февраля температура вечеромъ 38,8 и 38,9, далѣе колебалась отъ 37,4 до 38,4 вплоть до 10 апрѣля, давъ только 2 раза повышение до 39. Съ 10 апрѣля до 10 іюня температура колебалась отъ 37 утромъ до 38,4, нѣсколько разъ выше вечеромъ. Съ 11 іюня до конца температура почти нормальна (2 раза повышение до 37,8 и 38). Пульсъ вначалѣ 80 нѣсколько дней, послѣ паденія высокой т° упалъ до нормы (72) и такъ держался отъ 14 до 27 января. Здѣсь онъ нѣсколько дней держался на 80, но 6 февраля достигъ 110 и около мѣсяца сильно колебался, постепенно ниспадая до нормы и временами (дней черезъ 6) поднимаясь до 100; далѣе продолжалъ то же самое, но поднимался уже до 90, а съ 1 мая колебался отъ 70 до 80. Число дыханій колебалось все время отъ 25 до 35 въ минуту соответственно пульсу. Количество мочи 2900 кс. 6 января, уже 3000 кс. въ день назначенія хвойника (8-го) и 3500 кс. 9 января; упавъ постепенно вмѣстѣ съ паденіемъ температуры до 2000 кс., 16 января оно опять 3700 кс. и держалось такъ до 27 января, когда уменьшилось до 2400 кс. До конца февраля количество мочи колебалось отъ 2000 кс. до 2500 кс., а далѣе отъ 1500 кс. до 2000 кс. Кривая уд. вѣса мочи параллельна кривой количества ея. Вѣсъ тѣла отъ 165 ф. (7 января) постепенно поднялся до 174 ф. (10 марта), затѣмъ понижался, достигнувъ прежней цифры (165 ф.) къ 1 мая и опять сталъ повышаться. Больной за исключеніемъ 2—3 дней, причемъ было временное паденіе высокой температуры, не потѣлъ.

XLII. Старшій комендоръ Иларіонъ Р. 27 лѣтъ. Прибылъ 5 января, выписанъ 25 февраля 1894 года. Perityphlitis. Pleuritis exud. dextra. 6 января. Боли въ правой половинѣ живота 4-й день. Въ правой подвздошной области небольшое притупленіе звука, болѣзненность. Вечеромъ 5 числа поставлено 12 пиявокъ на это мѣсто. Припухлости нѣтъ. 7. Боль

меньше. Опій. Клизма. Боли въ поясницѣ. 10. Боли въ животѣ меньше, болѣзненность въ правомъ подреберьѣ. 14. При изслѣдованіи груди найдено справа притупленіе звука съ угла лопатки, по подмышечной съ 5 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены. Лѣвое легкое нормально. Кашля нѣтъ. Назначенъ согрѣвающий компрессъ на бокъ. Салициловый натръ съ іодистымъ натромъ на 4,0—200,0 аq. d. 4 ложки въ день. 15. Боли въ животѣ нѣтъ, запоръ. 18. Выпотъ въ томъ же положеніи. Оставить микстуру. 19. Притупленіе сзади на 2 пальца выше угла лопатки, по подмышечной съ 5 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе почти отсутствуютъ. Боли въ боку небольшія, кашля нѣтъ. 21. Тѣ же явленія. 23. Боль въ боку и правомъ плечѣ. Назначено infusoctum erhedae изъ 5,0 на 1 приемъ вечеромъ. 25. Притупленіе сзади на 1 палецъ ниже, по подмышечной по старому. Одышка и боль въ боку; немного потѣлъ. 26. Боль усилилась въ боку и животѣ; стулъ жидкій (наканунѣ по случаю запора получилъ ревенъ). Одышка. Согревающий компрессъ на бокъ. 27. Стулъ нормальный, одышка; inf-dec. изъ 10,0 на 1 приемъ вечеромъ. 28 и 29 боль въ боку. Смазать бокъ іодомъ. 31. Сильный кашель. Порошокъ морфія 0,01 на ночь. 1. Кашель меньше, боль въ боку меньше. 2. Притупленіе сзади на 3 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Кашель порядочный. Не потѣть. Порошки морфія оставить. 3. Ночью сильно потѣлъ, кашель усилился. Порошки сурьмы съ морфіемъ. 4. Не потѣлъ. Кашель меньше. 5. Кашель небольшой. 7. Колотье въ боку прошло. 9. Inf-dec. изъ 5,0 на приемъ вечеромъ. 11. Потѣлъ, утромъ немного знобитъ. Притупленіе въ груди по прежнему. Inf-dec. изъ 8,0 на сутки. Ванна. 13. Кашель усилился. 18. Боли въ боку совсѣмъ нѣтъ. Притупленіе сзади на 4 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра, голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены. 19. Порошки оставлены. 21. Притупленіе какъ и 18 числа. Массажъ бока. 24. Хвойникъ оставить. Ванна. 25. Притупленія сзади почти нѣтъ, по подмышечной съ 6 ребра; дыханіе ослаблено, голосовое дрожаніе вездѣ нормально. Выписанъ на 42-ой день послѣ rozpoznania плеврита. Температура вначалѣ (3—16 января) колебалась около 38° (утромъ 37,5, вечеромъ до 38,5), 17—24 января по вечерамъ была не выше 37,6, а съ 26 по 31 число достигала по вечерамъ до 38,5. Съ 1 февраля (37,4) температура посте-

пено повышалась до 38,7—7 числа и также постепенно упала до нормы к 16 февраля. Пульс держался на 70—84 до 4 февраля, когда резко поднялся до 102 (6-го) и до 104 (9-го); упал к 14-ому до 60, опять подъем до 96 16 февраля, затем держался на 72, поднявшись до 84 23 февраля. Число дыханий в минуту, поднявшись от 26 (20 января) на 34— (27-го), упало до 26 (28-го); затем постепенно уменьшалось до нормы (21 февраля), давая учащение до 30 в течение 8—13 февраля. Кривая количества мочи, ее уд. веса и количества выпиваемой за сутки жидкости параллельны. Количество мочи с 1800 кс. (20 января) увеличилось до 2500 кс. (21-го) и 2750 кс. (24-го); держалось на 2800 кс., уменьшилось на один день (3 февраля) после падения температуры до 1400 кс., далее, постепенно уменьшаясь вместе с падением температуры до 1600 кс. (14 февраля), резко поднялось до 2900 кс. (16-го), далее колебалось от 1800 кс. до 2500 кс. Больной потел несколько ночей вместе с колебаниями температуры и при нормальной температурѣ 1-ые 2 дня после назначения хвойника.

XLIII. Квартирмейстеръ Павелъ Б. 31 г. *Pleuritis exud sinistra*. Прибылъ 9 апрѣля, выписанъ 17 юня 1894 года. 9. Боленъ 3 дня—аномомъ и колотьемъ въ лѣвомъ боку, небольшимъ кашлемъ. Въ легкихъ рѣзкаго притупленія нѣтъ, съ лѣвой стороны груди ослаблено дыханіе и голосовое дрожаніе. Въ обоихъ легкихъ незначительное количество разсыянныхъ сухихъ хриповъ. Сердце нормально. Языкъ обложенъ, стулъ нормальный. Потѣлъ ночью. т° 39,2. 10. Проливной потъ ночью. т° 39—39. Согревающимъ компрессъ на бокъ. 11. Не потѣлъ. т° 38,8—39,6. Притупленіе груди слѣва на 4 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра; дыханіе и голосовое дрожаніе ослаблены въ границахъ притупленія. 3 порошка морфія (по 0,01) въ день. 12. Сильно потѣлъ. т° 38,6—39,4. Смазать бокъ іодомъ. Ванна. 13. Боли въ боку меньше, потѣлъ. Въ верхушкахъ легкихъ измѣненій нѣтъ. т° 38,8—39,8. 14. Небольшой кашель, ощущеніе пустоты въ лѣвомъ боку. Притупленіе груди значительное съ угла лопатки, голосовое дрожаніе очень ослаблено, дыханіе отсутствуетъ; по подмышечной по старому. Потѣлъ. т° 38,7—39,9. 15. Сильно потѣлъ, небольшая одышка. т° 38,4—39,9. Ванна. 16. Притупленіе въ прежнихъ границахъ. т° 38,5—39,7. 17. т° 38,9—38,9

18. Притупленіе груди по прежнему, по подмышечной съ 4 ребра. При изслѣдованіи мокроты бугорковыхъ палочекъ не найдено. т° 38—37,3. 19. Кашель и боль въ груди. Не потѣлъ. т° 38,2—39,4. 20. Потѣлъ. т° 37,8—38,9. Массажъ бока. 21. Не потѣлъ. Выпотъ по старому. Назначено *infusum ephedrae* изъ 8,0 на сутки. т° 37,5—39,1. 22. Не потѣлъ. т° 38,4—39,1. 23. Стула не было. т° 37,9—39. Ванна. 2 порошка ревеня по 0,3. 24. т° 37,9—38,7. 25. Потѣлъ. *Infusum* давать изъ 10,0 на сутки. Выпотъ въ прежнихъ границахъ. т° 38—38,3. 26. Не потѣлъ. т° 38,1—38,2. Ревень оставить. 27. Не потѣлъ. Кашель. т° 37,9—37,5. 28. Небольшая одышка, кашель. Притупленіе груди на 1 палецъ выше угла лопатки, по подмышечной съ 7 ребра. Дыханіе и голосовое дрожаніе ослаблены. т° 37,3—38,9. 29. Потѣлъ. т° 37,4—37,8. 30. Стулъ жидкій 2 раза. Сильно потѣлъ т° 37—37,7. Ванна. 1. Стулъ жидкій, боль въ боку. Не потѣлъ. По вечерамъ одышка. Притупленіе по старому. 2. Стулъ нормальный. Не потѣлъ. Чувствуетъ себя лучше. 4. Немного потѣлъ. Притупленіе по старому. 5 и 6. Не потѣлъ. 7. Стула нѣтъ 2-й день. Притупленіе незначительное съ угла лопатки, дыханіе и голосовое дрожаніе ослаблены. Не потѣлъ. 8. Стула нѣтъ 3-й день. Клизма. 10. Притупленіе по старому. 11. Стула нѣтъ 2-й день, значительно потѣлъ. Клизма. 12. Притупленіе нѣтъ ни груди, ни по подмышечной, голосовое дрожаніе нормально; дыханіе ослаблено подъ угломъ лопатки. Хвойникъ оставить. 14. Небольшое колотье въ боку, одышка. Не потѣлъ. 15. Немного потѣлъ. 16, 17 и 18. Одышка и небольшая боль въ боку. 20. Немного потѣлъ. 24. Боль въ боку, кашель небольшой. Отправленъ на дачу. Тамъ получалъ мышьякъ. 1 юня. Самочувствіе лучше. 10. Чувствуетъ себя здоровымъ. 17. Выписанъ на 72-й день заболевания. Температура съ 1 мая до конца колебалась отъ 37,2 до 37,8, только 3 мая вечеромъ 38. Пульсъ колебался отъ 64 до 72 до самаго паденія температуры, когда и онъ упалъ до 56—64; съ 6 мая до конца пульсъ колебался опять отъ 60 до 72. Число дыханій въ минуту 24 вместе съ 1-мъ и 2-мъ повышениемъ температуры поднялось до 32; 30 апрѣля оно поднялось до 36, а 5 мая даже до 40, затемъ колебалось отъ 26 до 36. Количество мочи съ 800 кс. за 14 апрѣля увеличилось до 1200 кс. 19-го и до 1800 кс. 22-го, затемъ, несколько уменьшившись, оно послѣ 2-го паденія т° увеличилось до 1800 кс., а послѣ

3-го паденія т° (30 апрѣля) увеличилось до 2400 кс. къ 5 мая и далѣе колебалось отъ 1500 кс. до 2200 кс. Кривая уд. вѣса мочи параллельна кривой количества мочи и кривой количества принимаемой въ сутки жидкости.

XLIV. Матросъ Осипъ С. 22 лѣтъ. *Pleuritis exud. sinistra*. Прибылъ 4 мая, выписанъ 16 августа 1894 года. 4. Боленъ 3 дня головною болью, болью въ лѣвѣмъ боку, кашлемъ, знобомъ и потомъ. Въ груди сзади слѣва притупленіе звука неполное съ угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра; дыханіе и голосовое дрожаніе въ границахъ притупленія отсутствуютъ. Въ верхушкахъ легкихъ пзмѣненій нѣтъ. т° 38,8. Ванна. Согрѣвающий компрессъ на бокъ. 5. Знобило и потѣлъ. т° 37,5—38,6. 6. Не знобило, потѣлъ. Сильный кашель ночью. т° 36,6—38,8. 2-ая порція. Отваръ сенегг. Притупленіе сзади на 2 пальца ниже угла лопатки не полное, по подмышечной полное съ 6 ребра; дыханіе и голосовое дрожаніе отсутствуютъ въ границахъ притупленія. 7. Немного потѣлъ. т° 36,8—38,4. Прибавить $\frac{1}{2}$ кружки молока. 8. Знобило и потѣлъ. т° 36,7—38,6. Притупленіе сзади на 1 палецъ выше угла лопатки, по подмышечной съ 4 ребра; въ этихъ границахъ голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ. Назначено *infusum erpethrae*. изъ 8,0 на сутки. 9. Сильно потѣлъ. т° 37,4—38. 10. Потѣлъ. Кашель небольшой. Боль въ боку меньше, боль въ грудинахъ т° 37,5—37,8. Временами головная боль. Зрачки нѣсколько расширены (въ разсѣянномъ свѣтѣ). Притупленіе сзади съ угла лопатки довольно рѣзкое, по подмышечной съ 3 ребра неполное; въ этихъ границахъ дыханіе и голосовое дрожаніе отсутствуютъ. 11. Не потѣлъ; зрачки по старому. т° 36,8—37,6. Въ мокротѣ бугорковыхъ палочекъ нѣтъ. 12 и 14 явленія въ плеврѣ по старому. Температура 12—15 нормальна. 14 и 15. Большой потѣлъ. Зрачки нормальны. 16. т° 37—39,1. Притупленіе сзади по старому, по подмышечной съ 5 ребра. 17. т° 37,2—38,9. Потѣлъ. Зрачки расширены; со вчерашняго дня головокруженіе. Боль въ боку небольшая. 18. т° 37,5—38,4. Головокруженіе, зрачки расширены. Потѣлъ. Въ плеврѣ явленія по старому. *Infusum erpethrae* изъ 5,0 на сутки. 19. т° 37,3—38. Сильно потѣлъ; головокруженія нѣтъ. Ванна. Зрачки почти нормальны. 20. т° 37—37,4. Зрачки нормальны. Не потѣлъ. Притупленіе сзади по старому, по подмышечной съ 6 ребра. 21 и 22. Не потѣтъ. 23. Зрачки расширены. Не

потѣтъ. 24. Зрачки нормальны. Незначительная боль въ боку; капля нѣтъ. Притупленіе на 1 палецъ ниже угла лопатки сзади, по подмышечной въ самомъ низу; голосовое дрожаніе ослаблено въ этихъ предѣлахъ, дыханіе отсутствуетъ. 25. Зрачки расширены, головная боль. 26. Бокъ немного болитъ. Явленія въ плеврѣ тѣже. Хвойникъ оставить. Отправленъ на дачу. Тамъ получалъ салициловый натръ съ наперстянкой, затѣмъ мышьякъ. 29 июня. Чувствуетъ себя здоровымъ. Колотья въ боку, кашля нѣтъ. Притупленіе нерѣзкое сзади съ угла лопатки, по подмышечной съ 3 ребра; дыханіе и голосовое дрожаніе ослаблены (срашенія?). Затѣмъ получалъ іодистый калий. 16 августа выписанъ на 103-ой день болѣзни. Температура съ 20 мая нормальна; 4—5 іюня повышеніе до 38° по вечерамъ, а съ 16 го, по 27 іюня температура колебалась отъ 37,8 до 38,6 и разъ до 38,9; далѣе температура нормальна до конца. Пульсъ колебался отъ 72 до 80 до 16 мая, когда вмѣстѣ съ повышеніемъ т° участился до 96, затѣмъ вмѣстѣ съ температурой упалъ до 68 (21 мая), а къ 25-ому опять поднялся до 84. Число дыханій съ 20 (6 мая) увеличилось до 32 (къ 10 мая) и съ перемежками держалось на этой цифрѣ до 22 мая, когда достигло 36 и до 40 (24 мая). Количество мочи 650 кс.—17 мая, вмѣстѣ съ паденіемъ температуры постепенно увеличилось до 2450 кс. къ 23 мая, затѣмъ уменьшилось до 1600 кс. Кривая количества мочи вполне параллельна кривой уд. вѣса ея и кривой количества принимаемой за сутки жидкости. Вѣсъ тѣла все время постепенно понижался вплоть до 16 іюля, когда началъ повышаться.

XLV. Матросъ Егоръ Н. 22 лѣтъ. *Pleuritis exud. sinistra*. Прибылъ 2 мая, выписанъ 21 іюня 1894 г. 1-ый разъ въ Госпиталь. 2. Боленъ недѣлю болью въ лѣвой половинѣ груди и кашлемъ. Притупленіе звука сзади слѣва съ угла лопатки, по подмышечной съ 4 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе въ этихъ предѣлахъ отсутствуютъ. Сердце нормально. Въ верхушкѣ лѣваго легкаго попадаютъ свисты. Кашель небольшой, по вечерамъ знобитъ; потѣтъ каждую ночь. Согрѣвающий компрессъ на бокъ; массажъ. Ванна. 2-ая порція. 3. Тоже. 4. Кашель усилился; плохо спать, не потѣлъ. Отваръ сенегг. 5. Тоже. Потѣлъ. 6. Кашель меньше, немного потѣлъ. Притупленіе въ прежнихъ границахъ. 8. Кашель незначительный, боль меньше. Притупленіе сзади на 2 пальца выше угла лопатки,

по подмышечной съ 4 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуют въ этихъ границахъ. Назначено *inf-decoctum erhedrae* изъ 8,0 на сутки. Прибавить $\frac{1}{2}$ кр. молока. 9. Мало потѣлъ. Зрачки нормальны (при разсѣянномъ свѣтѣ). 10. Немного потѣлъ. Притупленіе по старому. Надъ лѣвой ключицей пакетъ увеличенныхъ железъ. 11. Не потѣтъ. Зрачки умѣренно расширены. Въ мокротѣ бугорковыхъ палочекъ не найдено. Вавна. 12. Зрачки нормальны. Притупленіе сзади неполное съ угла лопатки, по подмышечной полное съ 4 ребра; голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуют въ границахъ притупленія сзади, ослаблены по подмышечной. 13—16. Не потѣтъ. Зрачки нормальны. 17. Тоже, притупленіе сзади по старому, по подмышечной съ 5 ребра. 19. По подмышечной притупленіе съ 6 ребра, сзади по старому. Голосовое дрожаніе и дыханіе сзади отсутствуют на 3 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. 20—23. Зрачки нормальны. Не потѣтъ. Явленія въ плеврѣ тѣ же. 24. Тоже. Хвойникъ оставить. Отправленъ на дачу. Тамъ онъ получалъ іодный кадій. 13 июня. Выпотъ по старому. 18. Выпотъ не совершенно всосался. Больной отлично поправился. 21. Выписанъ на 57-ой день болѣзни. Температура кромѣ 2 мая (37,9) все время нормальна (36,6—37,3). Пульсъ 80—5 мая, уже 8 мая (день назначенія хвойника) 88, послѣ 12 мая сталъ постепенно понижаться до 64 (17 мая), затѣмъ опять повышаться до 88 (22 мая). Число дыханій 36—отъ 5 до 8 мая, упало до 32 (10 мая), до 30 (18 мая) и до 24 (23 мая). Кривыя количества мочи за сутки, уд. вѣса ея и количества принимаемой за сутки жидкости параллельны. Количество мочи 850 кс. 3 мая, уже 1900 кс. 7 мая, 2000 кс. 12 мая, упало до 1900 кс. 18 мая и до 1800 кс. 23 мая. Вѣсъ тѣла, повысившійся въ 1-ую недѣлю на 5 фунтовъ, вѣскольکو времени держался на одной цифрѣ, затѣмъ понизился ко дню отправленія на дачу до прежней величины (139 ф.).

XLVI. Матросъ Василій Р. 22 лѣтъ. *Pleuritis exud. dextra*. Прибылъ 16 мая, выписанъ 21 июня 1894 г. 16. Болѣнь 5-ый день кашлемъ, колотьемъ въ правомъ боку, знобомъ и потомъ. Ломота въ нижнихъ конечностяхъ. Сзади справа притупленіе звука на $1\frac{1}{2}$ пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе ослаблено въ границахъ притупленія, дыханіе ослаблено во всей правой поло-

винѣ груди. Шумы тренія плевры. Верхушки легкихъ нормальны. t° 38,9. 17. Тоже, t° 38,9—39,3. 18. Кашель сухой, колотье въ боку. t° 38,3—39,2. Назначенъ согревающий компрессъ на бокъ. 2-ая порція, $\frac{1}{2}$ кружки молока. 19. Пульсъ 76, дыханій 28. Одышка, кашель небольшой. Вавна. t° 38,4—38,5. 20. Пульсъ 76, дыханій 26. Сильный кашель. Немного потѣлъ. t° 37,8—38,4. Притупленіе сзади рѣзкое съ угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуют въ границахъ притупленія. Шумовъ тренія нѣтъ. Боль въ боку. Назначено 3 порошка коденна съ содоу. *Inf-decoctum erhedrae* изъ 8,0 на сутки. 21. Потѣлъ. Пульсъ 86, дыханій 30. t° 37,7—38,3. Постоянная головная боль. Зрачки нормальны (разсѣянный свѣтъ). 22. Потѣлъ. Пульсъ 84, дыханій 22. Голова не болитъ. Зрачки по старому. Притупленіе сзади по старому, по подмышечной съ 5 ребра. t° 37,6—38,4. 23. Кашель меньше, не потѣлъ. Пульсъ 84, дыханій 28. Боль въ груди по старому. Шумъ въ головѣ (былъ и раньше). Зрачки вѣскольکو расширены. t° 38,2—38,2. 24. Не потѣлъ. Боль въ груди меньше. Пульсъ 76, дыханій 26. t° 37—37,4. Зрачки нормальны. Явленія въ плеврѣ по старому. 25. Пульсъ 84, дыханій 24. Не потѣлъ. Зрачки нормальны. 26. Пульсъ 84, дыханій 24. Не потѣлъ. Грудь болитъ не сильно. Притупленіе въ прежнихъ границахъ. Хвойникъ оставить. Отправленъ на дачу. 10 июня. Поправляется. 21. Выпотъ въ плеврѣ нѣтъ, дыханіе всюду слышно, но ослаблено. Срашенія въ плеврѣ. Выписанъ на 41-ый день заболѣванія. Температура съ 25 мая была нормальна, колебалась отъ 36,5 до 37,5. Кривыя количества мочи и ея уд. вѣса параллельны. Количество мочи съ 800 кс. (19 мая) увеличилось постепенно до 1450 кс. (25 мая). Вѣсъ тѣла со 144 ф. (17 мая) поднялся до 160 ф. къ 19 июня.

6 тяжелыхъ случаевъ плеврита.

XLVII. Матросъ Василій Д. 26 лѣтъ. *Pleuritis exudativa sinistra*. Прибылъ 2-го марта, выписанъ 20-го мая 1894 г. 2. Заболѣлъ 5 дней тому назадъ кашлемъ, болью въ лѣвомъ боку, ознобомъ и головною болью. Притупленіе нѣрѣзкое сзади слѣва на 3 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены въ этихъ границахъ. Верхушки легкихъ нормальны; подъ лѣвой клю-

чащей сухие хрипы. Назначено 3 Доверовых порошка по 0,3. Согревающий компресс на бокъ. t° 38,2. 3. Сильный кашель, всю ночь потѣлъ. t° 38,3—38,7. 4. Тоже. t° 38,1—39,0. Притупленіе сзади съ угла лопатки, по подмышечной по старому. 5. Кашель небольшой; головная боль. t° 38,5—39,4. 6. Тоже. t° 38,3—39,3. 7. Боль въ боку и головѣ. Притупленіе сзади полное съ нижней трети лопатки, по подмышечной какъ раньше. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуют въ этихъ границахъ. Назначено *inf-decoctum ephedrae* изъ 8,0 на сутки. 8. t° 38,5—38,2. 9. t° 37,9—39,2. 10. Съ утра головная боль усилилась. Аппетитъ плохъ, языкъ обложенъ. Кашель незначительный. Ванна. t° 38,8—38,5. 11. Сзади притупленіе съ $\frac{1}{4}$ лопатки, по подмышечной съ 5 ребра. Голосовое дрожаніе ослаблено, дыханіе почти отсутствуетъ въ этихъ границахъ. Шумы тренія плевры. t° 38,7 — 38,2. 12. Чувствуетъ себя лучше. t° 38,3—38,6. 13. Кашель прекратился, колотья въ боку нѣтъ. t° 37,3—38,3. 14. Головная боль и боль въ боку. Явленія въ плеврѣ по старому. t° 38,2—38,5. 15. t° 37,6—38,1. 18. Головная боль усилилась. Притупленіе сзади по старому, по подмышечной съ 4 ребра. 20. Послѣ приѣмовъ травы тошнило. Состояніе плевры тоже. 21. Головная боль сильнѣе, не тошнило; одышка нѣтъ. 22 и 23. Тоже. 24. Притупленіе сзади на 2 пальца выше угла лопатки не полное, по подмышечной съ 6 ребра полное. Голосовое дрожаніе отсутствуетъ, дыханіе очень ослаблено въ границахъ притупленія. 26. Утромъ очень знобило. 28. Боль въ лѣвомъ боку сильнѣе. Притупленіе по старому. 31. Головная боль и боль въ боку усилилась. Хвойникъ оставить. 1. Появился кашель; аппетитъ и сонъ плохъ. 3. Притупленіе сзади рѣзкое съ половины лопатки, по подмышечной съ 4 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ границахъ. Назначено *infusum ephedrae* изъ 8,0 на сутки. 5. Одышка, аппетитъ лучше. 7. Притупленіе сзади съ *spina scapulae* неполное, спереди съ 3 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе очень ослаблены. *Inf. ephedrae* изъ 10,0 на сутки. 8. Кашель рѣже, голова и бокъ болятъ. 10. Утромъ тошнило. 11. Кашель сильнѣе, не тошнило. Притупленіе сзади на 4 пальца выше угла лопатки, по подмышечной съ 4 ребра; голосовое дрожаніе отсутствуетъ, дыханіе очень ослаблено въ этихъ границахъ. Постукиваніе грудной клѣтки болезненно. Порошки морфія. 14. Чувствуетъ

себя хуже: головная боль и одышка. Притупленіе по старому. 17. Лучше, голова болитъ меньше. 18, 21 и 25. Выпотъ въ прежнемъ положеніи. Стулъ всегда черезъ 2—3 дня. 27. Назначено *inf-decoctum ephedrae* изъ 8,0 на сутки. 29. Животъ рѣзало въ подреберьяхъ, стулъ жидкій 3 раза. Голова болитъ сильнѣе. 30-го апрѣля и 3-го мая—выпотъ по старому. 1, 2, 3—стулъ 2—3 раза въ день кашицеобразный. Капля нѣтъ. Морфія оставить. 6. Притупленіе сзади на 3 пальца выше угла лопатки, по подмышечной по старому. Стулъ нормальный. 12. Притупленіе сзади рѣзкое на 3 пальца выше угла лопатки; голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены въ этихъ границахъ, дыханіе отсутствуетъ только съ угла лопатки до низу; по подмышечной притупленіе по старому. 14. Головная боль и боль въ боку, одышка продолжается. Притупленіе сзади не рѣзкое выше половины лопатки; голосовое дрожаніе отсутствуетъ съ угла лопатки; дыханіе ослаблено, но всюду слышно. Въ подмышечной области по старому. 18. Притупленіе по прежнему. Голосовое дрожаніе только ослаблено съ угла лопатки до низу, дыханіе тоже ослаблено. По подмышечной притупленіе по прежнему съ 4 ребра, голосовое дрожаніе ослаблено, дыханіе отсутствуетъ. Хвойникъ оставить. Компрессъ снять. Массажъ бока. 20. Въ томъ-же состояніи уволенъ на годъ на поправку (84-й день болѣзни). Бугорковыхъ палочекъ въ мокротѣ при многократномъ исследованіи не найдено. При пробномъ проколѣ получена сывороточная жидкость. Температура съ 15-го марта до 10-го апрѣля представляла волнообразныя колебанія въ предѣлахъ 37,5 — 38,6; только разъ 26-го марта поднялась до 39,8. Съ 10-го апрѣля по 16-ое она представляла размахи отъ 37,2 до 39, а съ 13-го по 20 апрѣля отъ 36 до 39. Далѣе идутъ опять волнообразныя колебанія въ предѣлахъ 37 — 37,9. Пульсъ отъ 82 (5 марта) участился до 88 (10 марта) и постепенно упалъ до 60 (19 марта). Опять подъемъ постепенный до 90 (27-го) и даже до 96 (1-го апрѣля) и паденіе до 72 (6 апр.). Далѣе идетъ колебаніе втеченіе 10 дней отъ 80 до 90 и втеченіе 10 же дней отъ 70 до 80. Отъ 26 апрѣля по 5 мая пульсъ нормальный (72), а затѣмъ до конца идутъ колебанія отъ 60 до 80. Число дыханій въ минуту 1-ые 10 дней колебалось отъ 30 до 35, затѣмъ 20 дней отъ 30 до 40, а съ 6 апрѣля идутъ колебанія отъ 32 до 44 съ однимъ рѣзкимъ подъемомъ до 56

(15 апрѣля—махімум вылота) и съ другимъ до 48 (26 апрѣля). Количество мочи отъ 900 кс. (6 марта), державшись такъ до 13 марта, постепенно увеличилось до 1700 кс. (18-го) и до 2000 кс. (23 марта); затѣмъ постепенно же упало до 500 кс. (30 марта), держалось около 1000 кс. до 20 апрѣля (втеченіе махімум'а вылота), поднялось до 1800 кс. къ 23-му, упало до 700 кс. 2 мая и окончательно поднялось до 1800 кс. (6 мая). Крпвая уд. вѣса мочи параллельна кривой количества ея. Больной съ самаго начала болѣзни все время потѣлъ сильно вплоть до установленія температуры на низкихъ цифрахъ, когда сталъ потѣть изрѣдка и понемногу (съ 20 апрѣля по 6 мая); съ 6 мая опять сильно потѣть при явленіяхъ всасыванія выцота. Вѣсъ тѣла въ 1-ые десять дней повысился на 5 фунтовъ, затѣмъ (съ 16 марта) все время постепенно падалъ, достигнувъ къ дню отправленія на поправку 148 ф. (на 13 фунтовъ меньше первоначальнаго вѣса).

XLVIII. Новобранецъ Дмитрій В. 21 года. Pleuritis exud. dextra. Прибылъ 6 апрѣля, выписанъ 16 августа 1894 года. 7 апрѣля. Боленъ 4 дня болѣю въ правомъ боку, кашлемъ, звонбѣю и потомъ. Притупленіе звука сзади справа въ груди съ угла лопатки, по подмышечной съ 7 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе очень ослаблены въ границахъ притупленія. Верхушки легкихъ нормальны. Сердце здорово. Аппетитъ плохъ; стулъ исправный. Назначенъ отваръ сенегу. Ванна. 9 и 10 тоже. 10. Притупленіе сзади по старому, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуют въ этихъ границахъ. 11. Боль въ боку, сильный кашель. На ночь порошокъ морфія. 12 и 13. Кашель меньше. 15. Согрѣвавшій компрессъ на бокъ. 17. Небольшая боль при глотаніи; боль приступами въ ногахъ. 18. Головная боль и головокруженіе. Кашель небольшой. Морфій оставить. 19. Тошнило и 1 разъ вырвало. Боль въ груди. Назначено растараніе груди летучей мазью. 20. Не тошнило, не рвало. Назначено inf. decoctum erichae изъ 10,0 на сутки. 11, 15, 18, 20 и 22 притупленіе держалось въ прежнихъ границахъ. 25. По утру тошнить, вчера вырвало послѣ хвойника. Кашель сильный, не даетъ спать. Сенегу оставить. Назначены порошки сурымъ 5 въ денъ. 26. Не тошнило, не рвало. Одышка меньше. Притупленіе сзади полное съ половины лопатки, по подмышечной съ 3 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ

этихъ границахъ. Ванна. 27 и 28. Голова болить меньше. Плохой сонъ. Одышка; боль въ боку по прежнему. 30. Притупленіе сзади на 4 пальца выше угла лопатки, по подмышечной со 2 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ границахъ. 1. Сильный кашель, одышка. Зрачки умѣренно расширены (при разсѣянномъ свѣтѣ). Зноба не бываетъ. 3. Тоже. Боль въ краяхъ (прежде болѣли суставы). Голова не болить. 4. Одышка и кашель меньше. 5. Стулъ 2 раза жидкій; боль при давленіи въ области пупка. Съ 21 апрѣля (20-го назначенъ хвойникъ) до 2 мая больной страдалъ ежедневными кровотеченіями изъ носа. 8. Притупленіе сзади по старому, по подмышечной съ 4 ребра не рѣкое; голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ границахъ. 10. Зрачки умѣренно расширены. Одышка и боль въ груди по старому. Притупленіе сзади нѣсколько ниже, по подмышечной по старому. 11. Боль въ груди и кашель меньше. Зрачки по старому. 12. Притупленіе сзади полное съ угла лопатки, по подмышечной неполное съ 4 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены въ этихъ границахъ. Притупленіе сзади по старому, по подмышечной съ 5 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены въ этихъ границахъ. 15 и 16. Зрачки нормальны. 17 и 18. Зрачки нѣсколько расширены. 19—24. Зрачки нормальны. 17, 20, 22 и 24. Притупленіе въ прежнемъ положеніи. 24. Хвойникъ оставить. Отправленъ на дачу. Тамъ получалъ іодистый калий по 1,0 въ сутки и желѣзо. 13 июня. Выпотъ въ прежнемъ состояніи. 22 июня. Опять ознобы по вечерамъ. 29 июня. Выпотъ безъ измѣненія. 8 июля. Выпотъ быстро всасывается. Явленія обширныхъ сращеній. 1 августа. Выпота почти совсѣмъ нѣтъ. Больной отлично поправился. 16 августа. Выписанъ на 135-й день болѣзни. При многократномъ изслѣдованіи бугорковыхъ палочекъ въ мокротѣ не найдено. При пробномъ проколѣ получена чистая сывороточная жидкость. Температура 7 апрѣля 37,8, уже 8-го 36—37,1; далѣе до 17 апрѣля колебалась около 37. Съ 17 апрѣля по 9 мая (22 дни) идетъ рѣзкій приступъ повышения температуры. 17 апр. 39,7, 18-го 38,3—39, далѣе идетъ колебаніе тѣ около 38, причемъ наивысшій пунктъ всей волнообразной кривой (39) былъ вечеромъ 29 апрѣля. Съ 9 мая температура колебалась отъ 37—37,7. На дачѣ съ 13 по 19

июня рѣзкіе размахи t° отъ 36,2 до 38, затѣмъ до конца температуры нормальна. Пульсъ вначалѣ держался на 60—70 въ минуту, съ 17 апрѣля вмѣстѣ съ повышеніемъ температуры до паденія ея колебался отъ 80 до 92, раза 2 достигая до нормы. Послѣ паденія температуры держался на 70, а къ 24 мая постепенно поднялся до 84. Число дыханій соответственно пульсу колебалось отъ 30 до 40, а далѣе отъ 26 до 30. Количество мочи отъ 1000 кс. дошло до 1800 кс. 18 мая, затѣмъ постепенно уменьшилось до 1000 кс. Кривая уд. вѣса мочи параллельна кривой суточного количества мочи и количества выпиваемой за сутки жидкости. Вѣсъ тѣла со 166 ф. (5 апрѣля) постепенно упалъ до 137 ф. къ 12 мая (время всасыванія выпота), затѣмъ сталъ медленно повышаться. Больной потѣлъ только нѣсколько ночей за свою болѣзнь какъ до леченія хвойникомъ, такъ и послѣ.

XLIX. Матросъ Павелъ Ю. 21 года. *Pleuritis exud. sinistra*. Прибылъ 21 апрѣля, выписанъ 21 іюня 1894 года. 22. Боленъ съ недѣлю кашлемъ и болью въ груди, знобомъ вначалѣ заболѣванія. Въ лѣвой половинѣ груди притупленіе звука спереди съ ключицы до низу полное, сзади со *spina scapulae* неполное. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ границахъ притупленія. Верхушки легкихъ нормальны. Сердце нормально. Больной чрезвычайно хорошо упитанъ. t° 37,6—38,1. Ванна. 23. Одышки почти нѣтъ, кашель небольшой. Назначены порошки сурьмы. t° 37,7—37,8. 24. t° 37,8—37,5. 25. t° 37,4—37,3. 26. Притупленіе въ тѣхъ же границахъ. Не знобитъ, не потѣетъ. 27. Небольшая одышка. Согревающій компрессъ на бокъ. *Infusum erhedrae* изъ 5,0 на сутки. 30. Кашель и колотье въ боку небольшіе. Боль въ груди. Притупленіе по старому. *Infusum erhedrae* изъ 8,0 на день. 2 мая. Кашель при лежаніи на боку, одышка по старому. Притупленіе сзади по прежнему, спереди неполное съ ключицы, полное съ 4 ребра; голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ границахъ полного притупленія, выше ослаблены. 3. Днемъ и ночью потѣлъ 5. Притупленіе сзади съ $\frac{1}{4}$ лопатки, по подмышечной съ 4 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены въ этихъ границахъ. 11. Боли меньше, одышки нѣтъ. Притупленіе сзади съ угла лопатки, по подмышечной съ 4 ребра; голосовое дрожаніе ослаблено, дыханіе отсутствуетъ въ границахъ притупленія. 12. Кашля

нѣтъ; боль при вѣдохѣ и давленіи подъ лѣвой ключицей. 13. 17 и 19. Притупленіе въ прежнихъ границахъ. 22. Притупленіе сзади пальца на 2 ниже угла лопатки, по подмышечной съ 5 ребра; голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ границахъ. 26. Небольшая боль подъ лѣвой ключицей. Притупленіе сзади по старому, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ границахъ притупленія. Хвойникъ оставить. Отправленъ на дачу. Тамъ безъ всякаго леченія хорошо поправился; въ плеврѣ остались значительныя сращения. Выписанъ 21 іюня на 68-й день заболѣванія. Въ мокротѣ бугорковыхъ палочекъ не найдено. Температура съ 27 апрѣля нормальна, только со 2 до 10 мая представляла волнообразный подъемъ, высшая точка котораго 4 мая не превысила 37,7 вечеромъ. Пульсъ колебался все время отъ 72 до 84 въ минуту. Число дыханій въ минуту сначала колебалось отъ 20 до 28, а съ 8 мая держалось на 24. Количество мочи отъ 900 кс. 24 апрѣля постепенно поднялось до 1400 кс. (27 апрѣля), до 1500 кс. (29-го), до 2000 кс. (6 мая) и до 2300 кс. (9 мая), а далѣе съ временнымъ уменьшеніемъ поднялось даже до 2450 кс. (19 мая), затѣмъ упало до нормы (1500 кс.). Кривая уд. вѣса мочи параллельна кривой количества мочи. Вѣсъ тѣла до 6 мая постепенно понижался, затѣмъ сталъ повышаться. Кромѣ одной ночи (2 мая) больноіе никогда не потѣлъ.

L. Горнистъ Томасъ В. 26 лѣтъ. *Pleuritis exud. dextra*. Прибылъ 23 апрѣля, выписанъ 23 августа 1894 года. 23. Боленъ 6 дней колотьемъ въ груди, сухимъ кашлемъ, знобомъ и головною болью. Въ правомъ боку сзади притупленіе звука полное съ угла лопатки, по подмышечной съ 3 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ границахъ притупленія. Верхушки легкихъ нормальны. Сердце здорово. t° 38,7—38,5. 24. t° 38,7—39. 25. t° 38,4—38,8. Притупленіе въ прежнихъ границахъ. Ванна. Порошки сурьмы. Согревающій компрессъ на бокъ. 26. t° 38,3—38,9. Ночью знобило и потѣлъ. Боли въ боку нѣтъ, кашель небольшой. 27. t° 38,2—39,3. Кашля нѣтъ, сильно потѣлъ; боль въ груди. Притупленіе сзади на 4 пальца выше угла лопатки, по подмышечной съ 4 ребра, голосовое дрожаніе отсутствуетъ, дыханіе ослаблено въ этихъ границахъ. 28. t° 37,8—38,9. 29. t° 37,4—39. 30. t° 37,1—38,5. Притупленіе въ старыхъ границахъ.

Назначено *inf-decoctum ephedrae* изъ 8,0 на сутки. 1 мая t° 37,1—38,8. Болей и одышки нѣтъ. Ванна. 2. t° 37,2—38,2. 3. t° 37—38. 3 и 5. Притупленіе по старому. 7. Притупленіе сзади полное съ нижней трети лопатки, по подмышечной съ 4 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуют въ границахъ полнаго притупленія. Ванна. 9. Притупленіе сзади на палецъ ниже. 13. Притупленіе по подмышечной съ 5 ребра, голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены; сзади притупленіе въ прежнемъ положеніи. 15, 17 и 19—притупленіе по прежнему. 17. Компрессъ святой. Назначенъ массажъ бока. 21. Притупленіе сзади рѣзкое съ угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе очень ослаблены въ этихъ границахъ. Дыханіе слабо почти во всемъ правомъ легкомъ. 23 и 25. Притупленіе по прежнему. Выше притупленія слышны шумъ тренья плевры. 26. Хвойникъ оставить. Отправленъ на дачу. 13—16 іюня была кровь въ мокротѣ. Больной получалъ мышьякъ. 29 іюня. Чувствуетъ себя здоровымъ. Притупленіе сзади полное съ угла лопатки, дыханіе отсутствуетъ, голосовое дрожаніе почти нормально. По подмышечной притупленіе съ 5 ребра, дыханіе и голосовое дрожаніе здѣсь отсутствуютъ. Выше шумъ тренья плевры. 1 августа. Назначенъ іодистый калий и капли креовата. 23 августа. Притупленіе сзади на 3 пальца ниже угла лопатки рѣзкое, по подмышечной съ 7 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены въ этихъ предѣлахъ. Шумъ тренья плевры. Выписанъ въ этомъ состояніи на 127-ой день заболѣванія. При изслѣдованіи мокроты бугорковыхъ палочекъ не найдено. При пробномъ проколѣ получена сывороточная жидкость. Температура съ 4 мая была нормальна все время кромѣ 13 и 14 мая, когда были повышенія по вечерамъ до 37,8 и 37,6. Пульсъ 100 въ минуту 24 апрѣля, упалъ до 88 (28-го) и до 80 (30 апрѣля), далѣе поднялся къ 8 мая до 84, а къ 16-ому до 88 и держался около 90 съ колебаніями. Число дыханій 21 въ минуту—24 апрѣля, 32—27-го и 36—1 мая, далѣе вмѣстѣ съ паденіемъ температуры упало до 24 къ 4 мая и держалось такъ до 15 мая, а затѣмъ было нормально. Кривыя суточного количества мочи, уд. вѣса ея и количества принимаемой за сутки жидкости совершенно параллельны. Количество мочи отъ 450 кс. (за 29 апрѣля) повысилось до 800 кс. (1 мая) и до 1500 кс. ко дню наденія

температуры (5 мая); далѣе, продержавшись въ предѣлахъ 1000—1500 кс., увеличилось до 1700 кс. (12 мая) и до 2400 кс. (19 мая), а къ 23-ему уже упало до 2100 кс. и даже до 1500 кс. къ 25-ому мая. Всѣхъ тѣла падалъ постепенно до 10 мая (начало всасыванія выпота), затѣмъ все время повышался. Большой потѣлъ 2 ночи во время высокой температуры и послѣ 2 ночи при концѣ лихорадки.

II. Матросъ Давидъ Л. 21 года. *Pleuritis exud. dextra*. Прибылъ 2 мая, выписанъ 28 іюня 1894 года. 2 мая. Давно чувствуетъ колотье въ правомъ боку и кашляетъ. Въ правомъ боку сзади притупленіе звука съ угла лопатки, голосовое дрожаніе и дыханіе замѣтно ослаблены. Верхушки легкихъ нормальны; сердце безъ измѣненій. t° 39. 3. Сильное колотье въ боку. Назначенъ согрѣвающий компрессъ на бокъ; капли съ морфіемъ. t° 38,3—38,9. 4. t° 38,2—39,1. 5. Притупленіе сзади на 3 пальца выше угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ границахъ. Кашель мѣшаетъ спать. t° 38,4—38,6. Ванна. 6. Головная боль. t° 38,2—38,7. 7. Тоже, вало послѣ морфія. t° 37,8—38,7. Выѣсто морфія назначенъ кодеинъ. 8. Кашель меньше, не вало. t° 38,4—37,7. Голова болитъ меньше. 9. Головная боль. Зрачки нормальны. t° 37,6—38,5. Притупленіе сзади на 4 пальца выше угла лопатки, по подмышечной съ 3 ребра; голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ границахъ. Назначено *infuso-decoctum ephedrae* изъ 8,0 на сутки. 10. Боль въ боку. Зрачки умѣренно расширены. Стулъ 2 раза кашцеобразный. t° 37,8—38,3. 11. Притупленіе сзади на 3 пальца выше угла лопатки, по подмышечной съ 5 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ границахъ. t° 37,1—38. 12. Стулъ 2 раза кашцеобразный. Зрачки нормальны. Головная боль. 13 и 15. Притупленіе въ прежнихъ границахъ. Зрачки нормальны. Стулъ нормальный. 16. Голова болитъ меньше, кашель незначительный. 17. Зрачки нѣсколько расширены. Притупленіе сзади на 2 пальца выше угла лопатки, по подмышечной по старому; голосовое дрожаніе здѣсь ослаблено. Дыханіе ослаблено по всему правому легкому. 18. Зрачки нѣсколько расширены. 19. Зрачки нормальны. Притупленіе сзади на палецъ выше угла лопатки. 21. Притупленіе сзади съ угла лопатки, по подмышечной съ 5 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ

границахъ. Голова немного болитъ. Зрачки нормальны. 23. Притупленіе по старому. 25. Зрачки нормальны. Притупленіе сзади на $1\frac{1}{4}$ пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 4 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуют въ границахъ притупленія. Дыханіе еще нѣсколько выше очень слабое. 26. Хвойникъ оставить. Отправленъ на дачу. Тамъ получалъ іодистый натръ въ малыхъ дозахъ. 12 іюня. Больной чувствуетъ себя хорошо. Дыханіе въ правомъ боку еще ослаблено. Выписать 28 іюня на 57-ой день со дня поступленія въ Госпиталь. При повторномъ изслѣдованіи бугорковыхъ палочекъ въ мокротѣ не найдено. Эрлиховскій реактивъ въ мочѣ далъ положительный результатъ (окраску). Температура съ 11 мая дала волнообразный подъемъ, наивысшая точка котораго 38,5 пришла съ 14 мая; съ 22 мая температура нормальна, колеблясь въ предѣлахъ 36,5—37,5. Пульсъ 108—2 мая; вмѣстѣ съ паденіемъ температуры упалъ до 64—9 мая (день назначенія хвойника); на другой же день 84 и постепенное паденіе до нормы къ 19-му мая. Число дыханій соответственно пульсу съ 40.—4 мая упало до 24 къ 15 мая, затѣмъ еще разъ поднялось до 30. Кривая количества мочи за сутки параллельна кривой уд. вѣса ея. Количество мочи 500 кс. за 6 мая, постепенно увеличивалось до 1000 кс. (9 мая), до 1250 кс. (13 мая), до 1500 кс. (16-го), до 2000 кс. (19 мая), и, наконецъ, до 2900 кс. (23 мая); къ 26-ому оно уменьшилось до 2000 кс. Больной съ 5 мая до 25 мая всѣ ночи порядочно потѣлъ. Вѣсъ тѣла постепенно понижался до 14 мая, а отсюда до конца повышался.

II. Матрость Григорій И. 21 года. Прибылъ 30 апрѣля, выписанъ 12 іюля. *Pleuritis exud. sinistra*. 30. Давно кашляетъ; колотье въ правомъ боку, часто знобитъ и потѣетъ. Одышка нѣтъ. Притупленіе въ лѣвомъ боку сзади неполное со *spina scapulae*, полное на 1 палецъ выше угла лопатки, по подмышечной съ 4 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуют въ границахъ полного притупленія. Въ правомъ легкомъ жесткое дыханіе. Въ верхушкахъ легкихъ выдохъ, особенно справа. Сердце нормально. t° 38,7. 1. Колотье въ боку небольшое. Капли съ морфіемъ. t° 37,7—38,8. 2. t° 37,6—38,7. 3. t° 37,5—39,4. 4. t° 37,8—38,6. 5. t° 37,4—38. Морфій оставить. Порошки сурьмы. Согревающий компрессъ на бокъ. Ванна. 6. Кашель и боль въ боку меньше. 8. Кашля нѣтъ. 5, 7 и 9. Явленія въ плеврѣ безъ измѣненій. 9. Назначено

infusum ephedrae изъ 8,0 на сутки. 10. Боли въ боку нѣтъ. Боль въ груди нѣтъ. 11. Притупленіе сзади по старому, по подмышечной съ 5 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены. 13. Кашель и боль въ груди въ незначительной степени. Притупленіе сзади съ угла лопатки болѣе рѣзкое, по подмышечной съ 4 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены въ этихъ границахъ. 18. Вчера тошнило и рвало (прежде этого не бывало). Порошки сурьмы оставить. Ванна. 19. Не тошнило, не рвало. Боли въ груди нѣтъ. Одышка и тяжесть въ груди. 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 29 мая. Притупленіе въ прежнемъ состояніи. 25 мая. Хвойникъ оставить. Отправленъ на дачу. Тамъ получаетъ наперстянку. 29 іюня. Чувствуетъ себя давно здоровымъ. Притупленія сзади рѣзкаго нѣтъ, нерѣзкое со *spina scapulae* до низу; по подмышечной съ 4 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе очень ослаблены, съ угла лопатки до низу отсутствуют. 12 іюля выписанъ въ такомъ же состояніи (какъ и 29 іюня) на 74-ый день со дня поступленія въ госпиталь. Повторное изслѣдованіе мокроты не обнаружило присутствія бугорковыхъ палочекъ. Температура съ 7 мая была нормальна кромѣ повышеній по вечерамъ до 38° (10 и 13 мая) и до 38,4 (17 мая). На дачѣ температура колебалась отъ 37° до 38° съ 1 іюня по 10-ое; 17 іюня дала повышение до 39° и нѣсколько дней держалась на 38°, затѣмъ опять нормальна. Пульсъ 84 въ минуту упалъ до 72 (5 мая) и держался такъ до 17 мая, затѣмъ колебался отъ 60 до 70. Число дыханій колебалось отъ 20 до 24 въ минуту. Количество мочи 1150 кс. за 5 мая, упало до 500 кс. 8 мая и увеличилось до 2000 кс. 10 мая; уже на другой день 850 кс. и на этой цифрѣ держалось до конца. Кривая уд. вѣса мочи параллельна кривой количества мочи. За исключеніемъ нѣсколькихъ ночей при прекращеніи лихорадки (4, 5 и 8 мая) больной не потѣлъ. Вѣсъ тѣла постепенно понижался до конца мая, затѣмъ до середины іюня держался на одной цифрѣ и сталъ постепенно повышаться.

И. 7 случаевъ плеврита; лечение салициловымъ натромъ. 2 среднихъ случая.

LIII. Ефрейторъ Андрей И., 23 лѣтъ. *Perityphilitis. Pleuritis exudativa dextra*. Прибылъ 4 іюня, выписанъ 2 августа 1894 года. 5. Больные 2-ой день рвотою и болью въ животѣ. Правая подвздошная область болѣзненна, припухши и даетъ притупленіе звука. Стулъ задержанъ. Назначено *Ol. Ricini* 30,0.

Пузырь со льдомъ и 12 пилюль на область слѣпой кишки. Эмульсія кастороваго масла. 6. Стулъ 2 раза жидко; боль меньше. Втираніе сѣрой ртутной мази. 7. Лучше. 9. Боль въ правой части живота. Сильный кашель. Назначено 4 порошка въ день морфія. Температура, которая съ 39,6 (5 іюня) въ 3 приема упала до нормы (37,5) къ 8 іюня, съ этого числа стала рѣзко повышаться—видимое начало плеврита. Боли надъ лопаткой и въ правомъ боку. 12. Притупленіе сзади справа съ угла лопатки, по подмышечной съ 5 ребра; голосовое дрожаніе ослаблено, дыханіе отсутствуетъ въ этихъ границахъ. Выше выпота бронхиальное дыханіе и хрипы сухіе и влажные. 14. Кашель меньше; притупленіи въ области слѣпой кишки нѣтъ, болѣзненность небольшая. Пузырь со льдомъ снятъ. Согревающий компрессъ на правой бокъ. 15. Явленіи въ плеврѣ тѣ же. Въ лѣвомъ легкомъ появились влажные хрипы. Назначенъ салциловый натръ по 2,0 въ день въ растворѣ. 16 и 17. Стулъ жидкій. Притупленіе сзади увеличилось на 1 палецъ, по подмышечной по старому. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ границахъ притупленія. Массажъ праваго бока. 18. Боль въ боку меньше. 19. Въ боку боли нѣтъ. Притупленіе опять ниже на одинъ палецъ (съ угла лопатки). 20. Вечеромъ вчера былъ жаръ и проливной потъ. 21. Небольшая боль въ груднѣй, кашель небольшой. 22. Боли въ груди нѣтъ. 23. Одышка. Притупленіе въ прежнихъ границахъ. Хрипы выслушиваются въ обоихъ легкихъ. Микстуру салцилового натра оставить. Назначено 6 порошковъ въ день салцилового натра по 0,6. 24. Болей нигдѣ нѣтъ. Появился прозавольный стулъ, тогда какъ съ 13 по 23 іюня ставили ежечасно клизму. Порошки морфія оставить. 25. Притупленіе сзади на 1½ пальца ниже угла лопатки, по подмышечной верѣзкое съ 5 ребра; голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ границахъ притупленія сзади, по подмышечной ослаблены. 26. Боль въ боку и кашель небольшой. 27. Салциловый натръ оставить. Отправленъ на дачу. 29. Выпотъ въ плеврѣ пальца на 3 ниже угла лопатки. 5 іюля. Ознобы по вечерамъ. 10. Ознобы прошли. Никакихъ жалобъ. Легкія нормальны. Больной получаетъ хининъ по 0,6 2 порошка въ день. 2 августа. Больной хорошо поправился. Выписанъ на 55-й день послѣ обнаруженія выпота въ плеврѣ. Температура съ 8 іюня продолжала волнообразныя кривыя; втеченіе

4—5 дней она поднималась до 39°, затѣмъ падала до нормы. Цикль такихъ 3 подъёмовъ закончился на 15-й день болѣзни плевры; затѣмъ начался 2-ой циклъ подъёмовъ, но уже только не выше 38,8; послѣднее повышение 7 іюля до 40,2, затѣмъ 8 іюля температура упала до 36,8 на 30-й день плеврита. Далѣе держалась на 37, а въ концѣ—колебанія отъ 36,4 до 37,4. Количество мочи съ 14 іюня (500 кс.) постепенно поднялось до 1300 кс. къ 24 іюня. Больной съ 10 до 23 іюня всѣ ночи порядочно потѣлъ. При изслѣдованіи мокроты буторковъхъ палочекъ не найдено.

LIV. Рядовой Захаръ С. 24 лѣтъ. *Pleuritis exud. sinistra*. Прибылъ 14 іюня, выписанъ 9 августа 1894 года. Уже перенесъ одинъ разъ лѣвосторонній плевритъ въ апрѣлѣ 1893 года. 15. Болеетъ 3-й день болью въ лѣвомъ боку и кашлемъ. Въ лѣвомъ боку сзади притупленіе начинается съ угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра; голосовое дрожаніе и дыханіе здѣсь отсутствуютъ, сзади очень ослаблены въ границахъ притупленія. Верхушки легкихъ нормальны. Стулъ и аппетитъ нормальны. № 37,1—38,6. 16. Кашель порядочный. Назначено 6 порошковъ въ день салцилового натра по 0,6 и 3 порошка морфія. 17. Притупленіе сзади съ угла лопатки, по подмышечной съ 5 ребра; голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ границахъ притупленія. 18. Боль въ боку по старому, кашель меньше. 19. Кашель незначительный, боль въ боку меньше. Притупленіе сзади по старому, по подмышечной съ 4 ребра. 20. Боль въ груди усилилась. Ноютъ ноги въ колѣнныхъ сгибахъ. Отправленъ на дачу. Тамъ назначенъ салциловый натръ съ йодистымъ калиемъ въ микстурѣ. 1 іюля. Выпотъ въ прежнемъ положеніи. Назначено 4 порошка въ день салцилового натра по 0,6. 10. Рѣзкое улучшеніе. Выпотъ быстро всасывается. 21. Выпотъ совершенно всосался. Явленіи сращенія листовъ плевры. Чувствуютъ себя здоровымъ. 9 августа. Выписанъ на 58-й день болѣзни. Температура ввечеръ держалась на 37,9—38,6, постепенно увеличивая размахи, вечеромъ 22 іюня дошла до 39 и пала до нормы (36,9—37,4) на 14-й день болѣзни; затѣмъ опять постепенное повышение, максимумъ котораго 39,3 держался 2, 3 и 4 іюля, и опять, увеличивая суточные размахи, температура пала до нормы на 27-й день болѣзни—9 іюля. Отсюда до конца тем-

пература нормальна. Большой всё ночи, проведенный в Госпиталь, сильно потёлся.

5 тяжелых случаев плеврита.

LV. Солдат Стефанъ В. 22 лѣтъ. Pleuritis exud. sinistra. Прибыль 29-го мая, выписанъ 23-го августа 1894 года. 30-го мая. Боленъ 3 дня знобомъ, колотье въ лѣвомъ боку и кашлемъ. Кашель продолжается недѣли 3. Въ лѣвомъ боку притупление звука сзади начинается съ угла лопатки не полное, по подмышечной полное съ 5 ребра; голосовое дрожание ослаблено, дыханіе отсутствуетъ въ границахъ притупленія. Согревающий компрессъ на бокъ. Ванна. 3 порошка кодеина. Молочная порція. 31. Кашель меньше, боку легче, не знобило, не потѣлъ. 1. Стула не было. Клизма. 31 и 2. Притупление держится въ прежнихъ границахъ. 3. Боль въ груди и боку, кашель. 4. Боли въ боку и кашель меньше. Притупление сзади рѣзкое на 6 пальцевъ выше угла лопатки (со spina scapulae), спереди съ 2 ребрадо низу. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ спереди въ границахъ притупленія, сзади дрожаніе только ослаблено, а дыханіе бронхиальное въ предѣлахъ тупого звука. 8. Боли въ груди нѣтъ, кашель меньше. Притупление по старому. Одышка небольшая. 10. Спать плохо отъ кашля. Вместо кодеина назначено 2 порошка морфія въ день и 2 на ночь. 11. Кашель меньше. Морфія оставить. Назначить салициловый натръ 4,0 въ день въ растворѣ. 13. Боль и одышка небольшія. 11, 13 и 15. Притупление по старому. 17. Чувствуетъ себя легче. 18. Притупление сзади рѣзкое на 4 пальца выше угла лопатки, спереди съ ключицы до низу. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены въ верхней и отсутствуютъ въ нижней части тупого звука. 2-я порція, $\frac{1}{2}$ кружки молока. 19. Бокъ не болить. Ванна. 20. Притупление сзади съ угла лопатки, спереди по старому съ ключицы. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены. Хрипы въ обоихъ легкихъ. 21. Стулъ жидкій 4 раза. Капли опиума. 23. Стулъ кашцеобразный. Салициловый натръ и опиумъ оставить. Отправленъ на дачу. 23 и 25. Выпотъ въ прежнемъ положеніи. На дачѣ получалъ йодистый калий по 1,2 въ день. 8-го іюля. Хорошо поправился. Дыханіе яснѣе. 31. Легкія почти нормальны. 23-го августа. Притупление сзади незначительное съ угла лопатки, по подмышечной съ 3 ребра;

голосовое дрожаніе и дыханіе нормальны—срашенія листовъ плевры. Выписанъ на 88-й день болѣзни. Температура 38,5—40 (30-го мая), держалась выше 39 до 9-го іюня, когда упала до 38. Затѣмъ, поднявшись почти до 40, она дѣлала суточные размахи отъ 38 до 39,6, позже отъ 37,6 до 38,6 почти до половины іюля; была нѣсколько времени нормальна, и опять размахи отъ 37 до 38 до 10-го августа. Пульсъ со 100 въ минуту вначалѣ лихорадки съ паденіемъ утренней температуры колебался отъ 70 до 80. Число дыханій соответственно пульсу вначалѣ колебалось отъ 25 до 35 въ минуту, позже отъ 25 до 30. Количество мочи во время высокой температуры держалось на 600—800 кс. за сутки, съ паденіемъ температуры увеличилось до 1500 кс.; уд. вѣсъ измѣнялся соответственно количеству мочи. Во все время лихорадки, включая немногихъ ночей, больной потѣлъ. Всѣ тѣла падали все время до 4-го іюля, затѣмъ стали появляться.

LVI. Матросъ Шайдула Ш. 25 лѣтъ. Pleuritis exud. dextra. Прибыль 7 іюня, выписанъ 2 августа 1894 года. 1. Боль въ груди давно. Теперь появился кашель и головная боль, колотье въ правомъ боку. Здѣсь имѣется притупление звука сзади не полное съ угла лопатки, по подмышечной рѣзкое нѣтъ. Дыханіе ослаблено, голосовое дрожаніе нормально. 4. Сильно потѣлъ, кашель небольшой, боли по старому. 5. Притупление сзади полное на палецъ выше угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе сзади мало измѣнено, дыханіе отсутствуетъ въ границахъ притупленія. 7. Колотье въ груди и боку сильнѣе. Чувствуетъ себя хуже. Притупление сзади на 3 пальца выше угла лопатки рѣзкое, по подмышечной съ 5 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе очень ослаблены. 10. Притупление сзади полное на 4 пальца выше угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ границахъ притупленія. Назначить салициловый натръ по 4,0 въ день въ растворѣ. Согревающий компрессъ и массажъ бока назначены еще съ перваго дня. 12. Боль въ груди меньше. Притупление сзади полное на 3 пальца выше угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе ослаблено, дыханіе отсутствуетъ въ границахъ притупленія. 14. Боль въ груди небольшая. Притупление сзади полное съ угла лопатки, голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ границахъ. 15. Кашля

почти нѣтъ. Колотье въ боку; одышка нѣтъ. 16, 18 и 20. Выпотъ въ прежнемъ положеніи. Салициловый натръ оставить. Отправленъ на дачу. Тамъ получилъ іодистый калий. 29 іюня боль въ боку по старому. Притупленіе сзади съ угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Дыханіе отсутствуетъ въ этихъ границахъ; голосовое дрожаніе ослаблено въ самомъ низу. 10 іюля. Боли почти совсемъ прошли. Обширныя срашенія листковъ плевры. 2 августа. Выписанъ на 63-й день болѣзни. Въ мокротѣ бугорковыхъ палочекъ не найдено. При пробномъ проколѣ получена сывороточная жидкость. Температура съ 1 іюня (39,9) упала къ 3-му до 38 и постепенно подаялась до 39,7 къ 7 іюня, далѣе также постепенно упала до нормъ къ 19 іюня; съ этихъ поръ была нормальна. Пульсъ. дойдя до 100 въ минуту въ день наивысшей температуры (7 іюня), вмѣстѣ съ послѣднею постепенно опустился до 64 къ 14 іюня. Число дыханій колебалось отъ 30 до 36 въ минуту, а къ 19 іюня увеличилось даже до 48. Кривныя количества мочи за сутки, уд. вѣса ея и количества принимаемой за сутки жидкости параллельны. Количество мочи, колебалось во время лихорадки отъ 600 до 800 кс. за сутки, увеличилось постепенно послѣ паденія температуры до 1550 кс. Нѣсколько ночей во время колебанія температуры большой потѣлъ.

LVII. Машинистъ Василій Б. 26 лѣтъ. Прибылъ 21 іюля, выписанъ 30 августа. *Pleuritis exudativa dextra*. 22. Боленъ недѣлю знобюмъ и потомъ, головою болью, кашлемъ и болью въ боку. Кашель съ прошлаго года. Въ правомъ боку сзади притупленіе звука полное съ угла лопатки; голосовое дрожаніе и дыханіе почти отсутствуютъ въ границахъ тупого звука. Въ легкихъ повсюду сухіе хрипы, жесткое дыханіе. Согрѣвающий компрессъ на бокъ. 3 порошка морфія. 6 порошковъ салицилового натра по 0,6. Молочная порція. 24. Боли по старому, кашель. Притупленіе сзади полное на 4 пальца выше угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ границахъ. 5 порошковъ морфія въ день. 26. Спать плохо; боль въ боку небольшая. Притупленіе по старому. Ванна. 27. Съ вечера знобило, затѣмъ потѣлъ. Запоръ 3-й день. Бокъ болитъ немного; кашель небольшой. Морфій оставить. 2-ая порція, $\frac{1}{2}$ кружки молока. 28. Знобило и потѣлъ. 29. Боль и кашель меньше. Спать плохо. Стулъ нормальный. 30. Салициловый натръ оставить. 31. Зно-

бить по вечерамъ, ночью сильно потѣть. Притупленіе сзади полное съ угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ границахъ притупленія. Въ легкихъ влажные и сухіе хрипы. 2. Спать плохо. Запоръ. Кашля и боли почти нѣтъ. Притупленіе по старому. 3. Стулъ былъ; кашля нѣтъ. Вечеромъ вчера знобило затѣмъ потѣлъ. Въ деревнѣ болѣлъ лихорадкой; селезенка нѣсколько увеличена, прощупывается. 4 и 6. Притупленіе по старому. 8. Чувствуетъ себя лучше. Притупленіе нерѣзкое съ угла лопатки, по подмышечной съ 5-го межребернаго промежутка, голосовое дрожаніе отсутствуетъ въ этихъ границахъ, дыханіе ослаблено по всей сторонѣ. Отправленъ на дачу. Назначенъ іодистый калий. 23 августа. Кашля нѣтъ. Не потѣть. Чувствуетъ себя здоровымъ. Притупленіе сзади на 4 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе очень ослаблены въ этихъ границахъ. 30. Выписанъ на 46-ой день болѣзни. Повторное изслѣдованіе во обваружило бугорковыхъ палочекъ въ мокротѣ. Температура съ 39,5 (22 іюля) постепенно упала до 37,5 къ 25-ому іюля, держалась 4 дня на 38°, затѣмъ втеченіе недѣли размахи отъ 37 до 38, и, наконецъ, установилась на нормѣ. Больной порядочно потѣлъ всѣ ночи.

LVIII. Рядовой Трофимъ Ш. 22 лѣтъ. Прибылъ 18 августа, выписанъ 30 августа 1894 года. *Pleuritis exud. sinistra*. 18. Боленъ 6 дней болью въ бокахъ, особенно лѣвомъ, и кашлемъ. Первые 2 дня былъ знобъ и потъ, остальные четыре дня полное притупленіе съ ключицы до низу, сзади съ угла лопатки до низу. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ границахъ. Согрѣвающий компрессъ на бокъ и 6 порошковъ салицилового натра по 0,6. 19. Кашель незначительный. 20. Боль въ боку была ночью сильнѣе. 21. Притупленіе по старому. 23. Притупленіе спереди пальца на 2 ниже ключицы, сзади съ угла лопатки. 25. Спереди притупленіе съ 3 ребра. Колотья почти нѣтъ. 28. Притупленіе сзади нерѣзкое съ угла лопатки, по подмышечной съ 5 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ вдѣсь, а сзади только ослаблены. Надъ выпотомъ шумъ тревія плевры. Салициловый натръ и компрессъ оставить. 30. Притупленіе незначительное. Чувствуетъ себя здоровымъ. Выписанъ на 18-ый день болѣзни.

Температура первый вечеръ 38,2, второй 38, остальные дни нормальна. Больной всё ночи порядочно потѣлъ.

LIX. Матросъ Иванъ Н. 27 лѣтъ. Pleuritis exud. sinistræ. Прибыль 11 августа, выписанъ 10 сентября. 12. Боленъ недѣли 2 болью въ лѣвомъ боку и кашлемъ (это началось уже съ полгода назадъ). Потѣтъ немного каждую ночь. Сзади слѣва притупленіе звука верѣзкое съ угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ границахъ. Выше шумъ тренія плевры. Верхушки легкихъ нормальны. Аппетитъ плохъ. Согрѣвающій компрессъ на бокъ и массажъ его. Салицилового натра по 4,0 въ день въ растворѣ. Отваръ сенегі. 13. Кашель небольшой. 15. Притупленіе сзади верѣзкое со *spina scapulae* до низу, по подмышечной съ 5 ребра рѣзкое. Голосовое дрожаніе и дыханіе здѣсь отсутствуютъ, а сзади только съ угла лопатки. 16. Кашель и боль въ боку по старому. Назначена еще спиртная настойка наперстянки съ валеріаной по 15 капель 2 раза въ день. 20. Притупленіе сзади со *spina scapulae*, спереди на палецъ ниже ключицы. 23. Сзади притупленіе на палецъ ниже, спереди по старому. Кашля нѣтъ, одышка. 26. Притупленіе сзади съ $\frac{1}{4}$ лопатки, спереди со 2 ребра. Самочувствіе хорошее. 28. Притупленіе сзади съ угла лопатки, голосовое дрожаніе и дыханіе почти отсутствуютъ. По подмышечной шумъ тренія плевры. Больной чувствуетъ себя здоровымъ. Салициловый натръ оставить. 29. Кашель усилился. Назначенъ мышьякъ. 1. При вздыханіи колетъ бокъ. Боли нѣтъ 2-ой день. Притупленіе сзади верѣзкое съ угла лопатки, по подмышечной съ 7 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ границахъ. Сверху до низу шумъ тренія плевры. 4. Чувствуетъ себя прекрасно. Колотье въ груди временами. Небольшой кашель, одышка. Притупленіе сзади въ самомъ низу. Дыханіе отсутствуетъ съ угла лопатки. Сзади и спереди шумъ тренія плевры. 7. Выпота нѣтъ. Явленія сращенія листковъ плевры. 10. Выписанъ на 45-ый день болѣзни. Повторное изслѣдованіе на бугорковья палочки мокроты дало отрицательный результатъ. При пробномъ проколѣ получена сероваточная жидкость. Первое время больной потѣлъ по ночамъ.

Л. 10 случаевъ плеврита; леченіе другими средствами, или безъ всякаго леченія. 4 легкихъ случая.

LX. Матросъ Сементъ И. 21 года. Pleuritis exud. dextra. Прибыль 28 февраля, выписанъ 2 апрѣля 1894 года. 1 марта. Боленъ 4 дня болью въ правомъ боку и кашлемъ. Съ правой стороны сзади притупленіе звука начинается нѣсколько ниже угла лопатки; голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены здѣсь. Надъ выпотомъ шумъ тренія плевры. Въ обоихъ легкихъ явленія бронхита; сердце нормально. Назначенъ салициловый съ іодистымъ натръ по 1,0 на сутки въ растворѣ. Согрѣвающій компрессъ на бокъ и массажъ его. Молочная порція. t° 37,7—38,6. 2. t° 38—39,3. 3. Шумъ тренія плевры слышенъ на большемъ участкѣ. Боль въ боку меньше. Выпотъ въ прежнемъ положеніи. t° 38,7—39,3. 4. t° 38—39. По ночамъ ежедневно потѣтъ. Микстуру оставить. 5. t° 37,7—38,4. Сильный кашель; ночью потѣлъ. Назначено 4 Доверовыхъ порошка по 0,3. 6. Кашель меньше. t° 37,6—38,2. Притупленіе сзади неполное съ угла лопатки, по подмышечной съ 7-го ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе очень ослаблены въ этихъ границахъ. 2-ая порція, $\frac{1}{2}$ кружки молока. 7. Боль въ боку меньше, t° 37,5—38,3. 11. Тоже. Кашель несильный. Притупленіе сзади на 2 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 7 ребра; голосовое дрожаніе и дыханіе здѣсь ослаблены. 13. Кашель и боль въ боку продолжаются. 15. Притупленіе по старому. 18. Притупленіе сзади на 3 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной какъ раньше; голосовое дрожаніе и дыханіе очень ослаблены въ границахъ притупленія. 19. Боли по старому, кашель не сильный. 22. Боли меньше. Притупленіе сзади полное на 4 пальца ниже угла лопатки, голосовое дрожаніе здѣсь ослаблено, дыханіе отсутствуетъ. Ванна. 23. Кашель усилился. 24. Боли легче; кашель сильный. Притупленіе сзади неудовимо, по подмышечной съ 7 ребра. 28. Колотье меньше, кашель небольшой. Одышки почти нѣтъ. 29. Тоже состояніе плевры. Ванна. 1. Боли въ боку и кашля нѣтъ. Ничтожное притупленіе сзади; голосовое дрожаніе нормально, дыханіе ослаблено. Компрессъ снять. 2. Выписанъ на 36-ой день болѣзни. Температура съ 8 марта нормальна (37—37,4) кромѣ 3 вечеровъ, когда она поднялась до 37,6. Пульсъ вначалѣ держался около 90 въ минуту, къ 21 марта упалъ до 60 и опять постепенно поднялся до 90 къ 1 апрѣля.

Число дыханій вначалѣ держалось около 30 въ минуту, а съ 10 марта отъ 25 до 28. Количество мочи съ 400 кс. (за 4 марта) постепенно увеличилось до 1500 кс. 15 марта, держалось такъ съ недѣлю, къ 24 марта достигло 1800 кс., а съ слѣдующаго дня держалось около 1000 кс. Кривая количества мочи за сутки, уд. вѣса ея и количества принимаемой за сутки жидкости совершенно параллельны. За исключеніемъ немногихъ ночей больной потѣлъ, какъ во время лихорадки, такъ и послѣ прекращенія ея до конца періода всасыванія выпота и паденія вѣса тѣла (19 марта). Вѣсъ тѣла постепенно падалъ до 19 марта, затѣмъ повышался.

LXI. Матросъ Матвѣй Г. 24 лѣтъ. *Pleuritis exud. sinistra*. Прибылъ 25 февраля, выписанъ 18 марта 1894 года. 25. Заболѣлъ недѣлю 2 кашлемъ и болю въ лѣвомъ боку при дыханіи. По вечерамъ ежедневно знобъ, затѣмъ потъ. Притупленіе звука сзади начинается почти съ угла лопатки, по подмышечной съ 7 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены въ этихъ предѣлахъ. Селезенка съ 7 ребра, безболѣзненна, прощупывается. Назначено 3 Доверовыхъ порошка въ день по 0,3. т° 38,5. 26. Вчера не знобило, немного потѣлъ, т° 37,4—38. Согрѣвающий компрессъ на бокъ. 27. Кашель небольшой, колотье въ лѣвомъ боку. Не знобило, потѣлъ. т° 37,5—38,5. 28. Притупленіе звука сзади съ угла лопатки, по подмышечной съ 7 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены. т° 37,5—38,5. Смазать бокъ іодомъ. Ванна. 1, 2, 3. Тѣже явленія. 5. Ночью знобило. Притупленіе сзади на 4 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной нѣтъ. Колотье держится, кашель небольшой. Ванна. 6. Колотье меньше, не знобило. Аппетитъ хорошъ. 7. Рѣзь въ животѣ. Запоръ нѣсколько дней. Притупленія рѣзкаго нѣтъ нигдѣ. Голосовое дрожаніе и дыханіе сзади въ самомъ низу ослаблены. Касторового масла 30,0. 8. Стулъ 3 раза. Боль въ боку и кашель незначительны. 9 и 10. Рѣзь въ животѣ. 11. Въ легкихъ притупленія нѣтъ, дыханіе ослаблено въ самомъ низу сзади. Ванна. 16. Головная боль. Боли въ боку нѣтъ. 17. Ничего не болитъ. 18. Выписанъ на 36 ой день болѣзни. Температура со 2 марта колебалась отъ 37,4 до 37,8. Количество мочи 1300 кс. 1 марта, 1500 кс. 3—6 марта, 500 кс. 7 марта и 1800 кс. 9 марта; далѣе оно колебалось отъ 1000 кс. до 1500 кс. Вѣсъ тѣла уменьшался до 8 марта, далѣе колебался около этой

цифры. Кромѣ первыхъ 2—3 ночей въ Госпиталѣ больной не потѣлъ.

LXII. Матросъ Андрей Ш. 23 лѣтъ. *Pleuritis exud. sinistra*. Прибылъ 9 марта, выписанъ 21 марта 1894 года. 9. т° 39. Боленъ 3 дня кашлемъ и колотьемъ въ лѣвомъ боку, знобомъ и потомъ по вечерамъ. Слѣва сзади небольшое притупленіе звука въ самомъ плу, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены въ этихъ границахъ. Стулъ и аппетитъ нормальны. 10. т° 37,8—38,5. Назначено 3 Доверовыхъ порошка по 0,3. Согрѣвающий компрессъ на бокъ. Потѣлъ. 11. т° 37,7—38,4. Притупленіе сзади на 2½ пальца ниже угла лопатки, по подмышечной по старому. Колотья въ боку нѣтъ. Слабость. Ванна. 12. Не потѣлъ. Боли въ боку и кашля нѣтъ. т° 37,7—38,2. Притупленіе сзади съ угла лопатки, по подмышечной съ 4 ребра. Голосовое дрожаніе ослаблено, дыханіе почти отсутствуютъ. 13. Не знобило, не потѣлъ. т° 37,1—38,3. Компрессъ снять. 14. Опять кашель. Потѣлъ. Притупленіе сзади неполное съ угла лопатки, по подмышечной съ 7 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены въ этихъ предѣлахъ. т° 37,5—37,8. 15. Небольшой кашель, болей нѣтъ. 17. Притупленіе по старому. 18. Кашля нѣтъ. Чувствуетъ себя хорошо. 20. Притупленіе едва уловимо. Голосовое дрожаніе нормально, дыханіе сзади внизу ослаблено. 21. Выписанъ на 15-ый день болѣзни. Температура съ 15 марта (37,6—37,6) постепенно упала до нормы ко дню выписки. Во время высокой температуры больной потѣлъ по ночамъ.

LXIII. Матросъ Павелъ У. 23 лѣтъ. Прибылъ 1 июня, выписанъ 26 июля 1894 года. *Perityphlitis. Pleuritis exud. dextra*. 1. Боленъ 4-й день—боль въ животѣ и поносъ. Языкъ сильно обложенъ. Животъ вздутъ и болѣзненъ въ области пупка. Головная боль. Въ легкихъ явленія небольшого бронхита. Касторового масла 30,0. 2. Стулъ 2 раза. Животъ мягче. 3. Болѣзненность и припухлость въ области слѣпой кишки. Назначенъ висмутъ и втираніе ртутной мази. 4. Припухлость меньше, болѣзненность продолжается. 7. Жалобы на боль въ области печени и въ правомъ боку. Животъ не болитъ. Въ правомъ боку сзади притупленіе звука на 2 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ предѣлахъ. Выше шумъ

трения плевры. Висмутъ и ртутную мазь оставить. 8. Смазать йодомъ и согревающей компрессъ на бокъ. 9. Небольшой кашель. Бокъ колить меньше. Потѣть сильно по ночамъ. Аппетитъ удовлетворительный, стулъ 3 раза кашцеобразный. Притупленіе по старому. Ванна. 10. Не потѣлъ. Стулъ нормальный. 11. Чувствуетъ себя легче, боли нигдѣ нѣтъ, кашель небольшой. Притупленіе сзади по старому, по подмышечной съ 5 ребра. 2 Доверовыхъ порошка въ день. 13. Бокъ болитъ немного, кашля нѣтъ. Притупленіе сзади на 3 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ предѣлахъ. Шумы трения плевры. 14. Чувствуетъ себя здоровымъ. 15. Бокъ не болитъ. Притупленіе по старому. Ванна. Порошки оставить. 17. Притупленіе сзади на 4 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены въ этихъ предѣлахъ. Шумы трения плевры. 19. Временами боль въ боку. Притупленіе въ прежнихъ границахъ. Шумъ трения плевры. 20. Отправленъ на дачу. 22. Притупленіе звука и ослабленіе дыханія держится справа. 1 июля. Никакихъ жалобъ. Общія покровы блѣдны. 15 июля покровы нормальной окраски. 26. Выписанъ на 49-й день заболѣванія бока. Температура съ 38 (1 июня) постепенно повысилась до 39,2 6 июня и также постепенно упала до нормы (37) 11 июня, далѣе колебалась отъ 36,6 до 37,5. Пульсъ 72—10 июня, 60—13-го и 72—17 июня съ постепенными переходами. Число дыханій отъ 22 въ минуту постепенно повысилось до 28 къ 16 июня. Кривыя количества мочи за сутки и ея уд. вѣса параллельны. Количество мочи 600 кс. за 9 июня увеличилось до 1600 кс. 11-го и до 2200 кс. 17 июня; далѣе упало до нормы. Больной потѣлъ сильно во время высокой температуры и мало во время нормальной.

3 среднихъ случая плеврита.

LXIV. Матросъ Ипполитъ III. 21 годъ. Pleuritis exud. dextra. Прибылъ 6 апрѣля, выписанъ 30 августа 1894 года. 7. Болея 4-й день кашлемъ и болью въ груди. Сзади въ правомъ боку притупленіе звука на 3 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ этихъ предѣлахъ. Языкъ обложенъ. 2-я порція. Верхушки легкихъ и сердце нормальны. Больной

чрезвычайно хорошо упитанъ. Ванна. 8. Одышка, спалъ хорошо. 3 Доверовыхъ порошка. Согревающей компрессъ на бокъ. 9. Боль въ груди и спинѣ. 10. Тоже. Притупленіе сзади съ угла лопатки. Голосовое дрожаніе и дыханіе здѣсь отсутствуютъ. 11. Аппетитъ плохъ. Стула нѣтъ 3 дня. Клизма. 12. Кашель и боль въ боку. 13. Притупленіе сзади на 1 палецъ выше угла лопатки полное, по подмышечной полное съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ предѣлахъ тупого звука. 15. Боль въ пяткахъ, трудно стоять. Днемъ знобитъ. 17. Прибавлено $\frac{1}{2}$ кружка молока къ порціи. 16 и 18. Притупленіе по старому. 20. Ванна. Массажъ бока 2 раза въ день. Салициловый натръ съ йодистымъ натромъ по 2,0 въ день въ микстурѣ. (Съ 18 апрѣля). 22. Вчера вечеромъ болѣла голова, знобило. Стулъ черезъ день. 23. Не знобило. 21 и 25. Притупленіе по старому. 27. Боль въ боку и кашель по прежнему. Въѣсто Доверовыхъ назначены порошки сурьмы. 28. Кашель меньше. Аппетитъ лучше. Притупленіе сзади съ угла лопатки, по подмышечной съ 5 ребра; голосовое дрожаніе ослаблено, дыханіе отсутствуетъ въ границахъ притупленія. 1. По старому. 2. Кашель меньше. Ломота въ голенахъ и колѣняхъ; боль въ груди и боку. 4. Притупленіе сзади по старому, по подмышечной съ 4 ребра. 8. Колотье въ груди сильнѣе. 9—19. Безъ измѣненій. Выпотъ въ тѣхъ же границахъ. 23. По старому. Кашель небольшой. 24. Микстуру оставить. Отправленъ на дачу. Тамъ получалъ йодистый калий по 1,0 въ день. 4 июня жалобы на боль въ груди. 29 июня. Выпотъ въ прежней границѣ сзади, по подмышечной съ 6 ребра притупленіе. Голосовое дрожаніе и дыханіе очень ослаблены. Колотье въ груди усиливается къ вечеру. Изрѣдка потѣть ночью. Самочувствіе по прежнему плохое. 7 июля. Небольшая боль въ правомъ боку. 25 июля. Никакихъ жалобъ. 23 августа. Притупленіе сзади съ угла лопатки. Голосовое дрожаніе и дыханіе очень ослаблены. (Срашеніе листковъ плевры). 30. Выписанъ на 150-й день болѣзни. Въ мокротѣ бугорковыхъ палочекъ не найдено. При пробномъ проколѣ получена сывортонная жидкость. Температура постоянная выше 38 держалась до 12 апрѣля, опускалась по утрамъ ниже 38 до 18 апрѣля, далѣе дѣлала крупныя размахи въ 2 градуса, достигая вначалѣ 39,6—39,8 вечеромъ, позже 38,6 вечеромъ; съ 27 апрѣля по 7 мая размахи не превышали одного градуса (отъ 36,8 до

37,8), затѣмъ температура была нормальна. Съ 28 мая опять размахн сначала въ 2, а затѣмъ немного болѣе 1 градуса; вечерняя температура въ первые дни превышала 38, позже не превышала. Пульсъ вначалѣ колебался около 90 въ минуту, затѣмъ около 80 и послѣ паденія высокой температуры около нормы; 13—16 мая онъ участился до 88 и постепенно дошелъ до нормы. Число дыханій вначалѣ больше 30 въ минуту, далѣе колебалось около 25. Кривыя количества за сутки мочи, уд. вѣса ея и количества принимаемой за сутки жидкости параллельны. Количество мочи колебалось отъ 500 до 800 кс. за сутки, 29 апрѣля послѣ прекращенія лихорадкѣ рѣзко увеличилось до 2100 кс., къ 3 мая до 2800 кс., а къ 11-му до 3000 кс., на время уменьшилось и опять увеличилось до той же цифры. За исключеніемъ немногихъ ночей болѣной потѣлъ все время лежанія въ Госпиталѣ. Вѣсъ тѣла рѣзко упалъ первыя 2 недѣли, затѣмъ колебался около минимальной цифры, на время повышаясь и опять падалъ.

LXV. Матросъ Максимъ С., 21 года. Прибылъ 24 апрѣля, выписанъ 21 июня 1894 года. *Pleuritis exud. sinistra Febris. intermittens.* 24. Боленъ недѣлю сухимъ кашлемъ. Колотья въ боку нѣтъ, стулъ нормальный. Въ правомъ легкомъ сухіе хрипы. Въ лѣвомъ легкомъ сзади притупленіе звука съ угла лопатки до низу, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены въ предѣлахъ притупленія. *t°* 38,9. 26. *t°* 38,4—38,6. 27. Притупленіе сзади по старому, по подмышечной съ 4 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе здѣсь отсутствуютъ. *t°* 38,2—39,1. Порошки сурьмы. Согревающимъ компрессъ на бокъ. 28. Кашель меньше. *t°* 38,3—38,5. 29. Кашель незначительный, боль въ боку ничтожная. *t°* 37,2—39. 30. Боль въ груди небольшая. Съ 10 часовъ утра знобъ, затѣмъ жаръ и потъ. *t°* 39—40,5. 1 мая. Спалъ хорошо, не потѣлъ. Сердце нормально. Подъ лѣвой ключицей шумъ тренія плевры. Притупленіе по прежнему. Днемъ приступъ зноба и пота. *t°* 36,9—40,5. Селезенка увеличена, болѣзненна и прощупывается. Въ крови найдены плазмодіи. 2. Кашель порядочный; зыглы обложень, боль подъ ложечкой. Днемъ опять приступъ лихорадки. *t°* 37,8—40. 3. Съ 10 часовъ утра знобитъ. Назначень хининъ 1 порошокъ вечеромъ (солянокислый хининъ 0,9). *t°* 36,3—37,1. 4. Не знобитъ. *t°* 36,2—37. 5. Кашель меньше, не знобитъ. 7. Боль въ груди, боку и въ

области селезенки. Кашля нѣтъ. 9. Бокъ не болитъ. Селезенка менѣе болѣзненна, прощупывается. 5, 7 и 9. Притупленіе въ груди по старому. 10. Чувствуетъ себя здоровымъ. Селезенка не болѣзненна, прощупывается. 11. Притупленіе сзади верѣвое на 1 палецъ ниже угла лопатки, по подмышечной съ 4 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены въ этихъ границахъ. По подмышечной шумъ тренія плевры. Хининъ оставить (получалъ его каждый вечеръ 3—10 мая). Ванна. 13. Притупленіе сзади еще на одинъ палецъ ниже, по подмышечной съ 5 ребра. 15. Селезенка еще прощупывается. 17. Селезенка не прощупывается. Притупленіе сзади ничтожное подъ угломъ лопатки, голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ самомъ низу. По подмышечной шумъ тренія плевры. Ванна. 19 и 21. Тоже. При кашлѣ нѣсколько колить лѣвый бокъ. Согревающимъ компрессъ на бокъ. 22. Боль въ боку сильнѣе. Ванна. 23. Кашля нѣтъ, боль въ боку незначительная. Притупленіе сзади на 3 пальца ниже угла лопатки, голосовое дрожаніе до угла лопатки очень ослаблено, дыханіе отсутствуетъ въ самомъ низу. По подмышечной нѣтъ притупленія. Во всемъ лѣвомъ боку шумъ тренія плевры. 24 и 25. По старому. 27. Отправленъ на дачу. 21 июня. Слышенъ легкій шумъ тренія, дыханіе всюду слышно. Выписанъ на 65-ый день болѣзни. Въ мокротѣ бугорковѣхъ палочекъ не найдено. При пробномъ проколѣ получена сывороточная жидкость. Температура съ 4 мая до конца нормальна. Пульсъ первые дни былъ 96 въ минуту, затѣмъ отъ 70 до 80, а при нормальной температурѣ отъ 60 до 70. Число дыханій отъ 32 въ минуту упало до нормы, затѣмъ однако поднялось до 26. Количество мочи, державшееся вначалѣ на 800—1200 кс. за сутки, къ 8 мая поднялось до 2200 кс., а къ 10-ому до 2600 кс., затѣмъ постепенно уменьшилось до нормы. До окончанія лихорадки болѣной потѣлъ, потомъ этого не было. Вѣсъ тѣла, начавъ со дня паденія температуры, постепенно повышался.

LXVI. Рядовой Константинъ Н. 21 г. Прибылъ 26 июня, выписанъ 26 іюля 1894 года. *Pleuritis exudativa sinistra.* 27. Боленъ недѣлю колотьемъ въ лѣвомъ боку, сухимъ кашлемъ. По ночамъ потѣтъ. Въ лѣвомъ боку сзади притупленіе звука съ угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра; голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ предѣлахъ тупого звука. Выше шумъ тренія плевры. Верхушки легкихъ нор-

малыни. Ванна. Согревающий компрессъ на бокъ и массажъ бока 2 раза въ день. Порошки сурьмы съ каломелемъ (последняго по 0,01) 3 въ день. 28. Бокъ болитъ сильноѣ. Притупленіе сзади на 3 пальца выше угла лопатки, по подмышечной съ 5 ребра; голосовое дрожаніе и дыханіе очень ослаблены въ этихъ предѣлахъ. 29. Кашель меньше. Аппетитъ и стулъ нормальны. 1 порція. 30. Боль въ лѣвомъ боку и подъ ложечкой. Притупленіе сзади на 1 палецъ выше угла лопатки, дыханіе здѣсь отсутствуетъ, голосовое дрожаніе ослаблено. По подмышечной съ 4 ребра неполное притупленіе, дыханіе и голосовое дрожаніе ослаблены. 2. Боль въ груди небольшая, кашля нѣтъ. Притупленіе сзади рѣзкое съ угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе очень ослаблены въ границахъ притупленія. Ванна. 4. При лежаніи на лѣвомъ боку одышка и боль. Притупленіе по старому. Отправленъ на дачу. 7. Шумъ трени держится въ лѣвомъ боку. Назначенъ мыльнякъ. 9. Сращенія листовъ плевры. 11. Поправляется. 26. Выписанъ на 36-ой день болѣзни. Температура только 1-й вечеръ достигла 38°, далѣе колебалась отъ 37 до 37,7 и наконецъ отъ 36 до 37°. Больной потѣлъ всѣ ночи во время подлихорадочной температуры.

3 тяжелыхъ случая плеврита.

LXVII. Матросъ Прокофій С. 21 года. *Pleuritis exud. sinistra*. Прибылъ 6 апрѣля, выписанъ 16 августа 1894 года. 6. Боленъ 3 дня знобитъ, кашлемъ, ломотою во всемъ тѣлѣ, колотьемъ въ лѣвомъ боку. Головная боль, аппетитъ очень плохъ. Притупленіе сзади слѣва на 3 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ границахъ притупленія. Подъ правой ключицей влажные хрипы. Притупленія и рѣзкихъ измѣненій въ верхушкахъ легкихъ нѣтъ. Смазать бокъ іодомъ. Ванна. t° 38—38. 7. Знобитъ ночью. t° 38,3—40. 4 порошка морфія въ день. 8. Кашель меньше. Головная боль. Согревающий компрессъ на бокъ. t° 38,6—39,9. 9. Притупленіе сзади полное съ угла лопатки, по подмышечной по старому; голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ границахъ притупленія. 11. Колотье въ груди. Притупленіе сзади на 2 пальца выше угла лопатки, по подмышечной съ 5 ребра. Не потѣетъ. Запоръ. Клизма. 13. Притупленіе сзади полное со *spina scapulæ* до низу, спереди съ ключицы. Голосовое дрожаніе очень ослаблено, дыханіе въ нижней части выпота отсутствуетъ, въ верхней—бронхальное. 14. Кашель и боль въ боку. Назначено *infusum erhedrae vulgaris* изъ 8,0 на сутки. 15. Не спалъ отъ кашля. Головная боль. Ванна. 16. Одышка при лежаніи. 17. Сильный кашель. 18. Притупленіе по старому. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ границахъ притупленія. 19. Тоже. Хвойникъ оставить. Одышка. 20. Пробнымъ проколомъ извлечена сывороточная жидкость. Затѣмъ посредствомъ троакара выпущено 3000 кс. чистаго сывороточнаго выпота. Массажъ бока. 21. Боль въ боку и кашель меньше. Притупленіе звука сзади на 2 пальца ниже угла лопатки; голосовое дрожаніе и дыханіе здѣсь отсутствуютъ. 22. Боль въ груди при кашлѣ. Сильно потѣлъ ночью. Назначено салициловаго натра съ іодистымъ по 2,0 въ день въ миктурѣ. Морфіи отбѣненъ. 23. Кашель сильный, не потѣлъ. Притупленіе сзади полное съ угла лопатки. 25. Боль въ груди, въ боку нѣтъ. Кашель меньше. Сильно потѣлъ. 26. Временами познабливаетъ. Притупленіе сзади на 2 пальца выше угла лопатки. 28. Познабливаетъ, не потѣетъ. Притупленіе сзади со *spina scapulæ* до низу, по подмышечной съ 3 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе очень ослаблены въ этихъ границахъ. 1. Кашель сильный, боль въ груди; одышки нѣтъ. 5. Кашель меньше. 6. Притупленіе звука рѣзкое сверху до низу, рѣзкое на 1 палецъ выше угла лопатки. 7. Кашель и боль въ груди небольшіе, бокъ не болитъ. 8. Кашель сильнѣе. Назначено 4 порошка въ день кодеина. 9. Притупленіе сзади рѣзкое съ угла лопатки, по подмышечной съ 3 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе ослаблены въ этихъ границахъ. 13. Кашель небольшой, не потѣетъ. Притупленіе сзади по старому, по подмышечной съ 4 ребра. 14. Жидкій стулъ. Капли опиума. 16. Стулъ нормальный. Одышки нѣтъ. Опиумъ оставить. 18. По вечерамъ головокруженіе. 15, 18, 20 и 23. Выпотъ въ прежнихъ границахъ. 24. Головокруженія нѣтъ. Салициловый натръ оставить. Отправленъ на дачу. Тамъ получалъ іодистый калий въ малыхъ дозахъ. 29-го іюня. Чувствуетъ себя лучше. Кашель небольшой, бокъ немного колетъ; потѣетъ не всегда. Притупленіе сзади съ угла лопатки, по подмышечной съ 3 ребра. Голосовое дрожаніе здѣсь ослаблено, дыханіе отсутствуетъ въ самомъ низу подъ угломъ лопатки.

24-го июля. За послѣдніе дни выпоть быстро всасывается. 1-го августа. Выпота совершенно нѣтъ. Отлично поправился. 15. Совершенно здоровъ. Выписанъ на 134-й день болѣзни. Въ мокротѣ бугорковыхъ палочекъ не обнаружено. Температура вначалѣ держалась на 39, къ 18-му апрѣля упала довольно рѣзко до нормы; въ тотъ-же день вечеромъ поднялась до 39 и колебалась отъ 38 до 39, нѣсколько дней дѣлая размахи отъ 37 до 39. Съ 7-го мая температура нормальная; только нѣсколько вечеровъ поднималась до 38. Пульсъ долго держался на 96 въ минуту; во время утреннихъ послаблений онъ колебался отъ 72 до 84, а къ 18 мая опять поднялся до 96 и даже до 104—22-го мая. Число дыханій въ минуту соответственно пульсу вначалѣ колебалось отъ 30 до 35, далѣе держалось на 30 и наконецъ на 24—28; 18-го мая оно тоже участилось до 32 въ минуту. Кривыя суточного количества мочи, ея уд. вѣса и количества принимаемой за сутки жидкости параллельны. Количество мочи колебалось отъ 600 кс. до 1000 кс. за сутки, по мѣрѣ послабленія температуры поднялось до 1700 кс. 27-го апрѣля и до 1750 кс. 6-го мая, далѣе колебалось около 1000 кс. и, наконецъ, дошло до 1500 кс. Вѣсъ гѣла постепенно падалъ до прекращенія лихорадки (6-го мая), отсюда сталъ повышаться. Нѣкоторыя ночи больной потѣлъ.

LXVIII. Матросъ Анисимъ К. 21 годъ. Pleuritis exud. sinistra. Прибылъ 13 мая, выписанъ 23 августа 1894 года. 13. Боленъ 4 дня головою болью, сухимъ кашлемъ, колотьемъ въ лѣвомъ боку и одышкою. Въ лѣвомъ легкомъ полное притупленіе звука сзади съ угла лопатки, по подмышечной съ 5 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе здѣсь отсутствуютъ. Въ деревнѣ когда-то болѣлъ тоже лѣвый бокъ. Верхушки легкихъ нормальны. Назначенъ согревающий компрессъ на бокъ. Кастороваго масла 30,0. Иодистый калій съ настоемъ наперстянки въ небольшихъ дозахъ. т° 39,2. 14. т° 37,6—38,5. 15. т° 37,8—38,4. 16. Выпоть увеличился сзади на 2 пальца. Сердце немного смѣщено. т° 36,4—37,9. 17. т° 37,1—37,8. 18. Выпоть въ тѣхъ же границахъ; надъ выпотомъ шумъ тренія плевры. т° 36,6—37,9. Поставлена мушка подъ угломъ лѣвой лопатки. 19. т° 37,4—38,7. Боли въ боку и груди, кашель продолжается. При ходьбѣ значительная одышка. 20. т° 37,6—39,7. Ежедневно знобитъ нѣсколько разъ; не потѣетъ никогда.

21. т° 37,2—39,2. 22. Тоже. т° 37—37,5. 23. Кашель порядочный ночью. т° 37,2—40,6. Притупленіе сзади на 4 пальца выше угла лопатки, сзади голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ границахъ притупленія. По подмышечной по старому. 24. Вчера днемъ сильно знобило, затѣмъ немного потѣлъ. Кашель усилился. Боль въ груди; въ боку нѣтъ. т° 38,2—39,6. 25. Вчера днемъ меньше знобило, ночью порядочно потѣлъ. т° 37,1—40. 26. Вчера днемъ знобило, ночью притупленіе сзади на 1½ пальца выше угла лопатки, по подмышечной съ 4 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ границахъ притупленія. Согревающий компрессъ на бокъ. Ванна. 27. Не знобило. Кашель по старому. Спитъ порядочно. 28. Притупленіе сзади нерѣзкое съ угла лопатки, по подмышечной съ 6-го ребра. Голосовое дрожаніе ослаблено въ границахъ притупленія. Дыханіе отсутствуетъ; и выше дыханіе очень слабое. 30. Боль въ груди и животѣ. Одышка. Притупленіе сзади на 2 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Микстуру оставить. Отправленъ на дачу. 7 июня. Никакихъ жалобъ. Выпоть по старому незначительный. По лѣвой подмышечной выслушивается шумъ тренія плевры. 20. Боли въ боку почти прошли. 29. Поправляется. Притупленіе сзади на 3 пальца ниже угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ предѣлахъ притупленія. Шума тренія нѣтъ. 1 июля хорошее самочувствіе. 26. Снова боли въ лѣвомъ боку. т° 38,2—38,1. 31. Болей нѣтъ. 23 августа. Больной очень хорошо поправился. Въ плеврѣ выпота нѣтъ; остались явленія сращенія листовъ плевры. Выписанъ на 106-ой день заболѣванія. Температура съ 26 мая все время нормальна за исключеніемъ одного дня (26 июля). Пульсъ 120 въ минуту 13 мая, съ 17 по 22 мая держался на 90, 24-го 64, а съ 27 мая 60. Число дыханій вначалѣ 30 въ минуту, 21—25 мая держалось на 48, а съ 26 мая на 42. Кривыя суточного количества мочи и ея уд. вѣса соответственны. Количество мочи 500 кс. за 20—24 мая, послѣ паденія температуры увеличилось до 1000 кс. 27 мая и до 1300 кс. 29 мая. За исключеніемъ 3 дней зноба больной не потѣлъ.

LXIX. Рядовой Алексѣй Л. 22 лѣтъ. Pleuritis exud. dextra. Febris intermittens. Прибылъ 9 июня, выписанъ 9 августа 1894 года. 10. Боленъ 3-ій день болью въ правой половинѣ

груди и кашлемъ. Въ правомъ боку сзади притупленіе звука съ угла лопатки, по подмышечной съ 6 ребра. Голосовое дрожаніе ослаблено, дыханіе отсутствуетъ въ этихъ границахъ. Въ правомъ легкомъ всюду слышны шумы тренія плевры. Боль подъ ложечкой. Верхушки легкихъ нормальны. Ванна. 3 Доверовыхъ порошка въ день. Каломеля 0,5 на приемъ. т° 37,3—40,5. 11. Не потѣлъ. Стулъ былъ 2 раза. Вчера послѣ ванны (29 Я) было обморочное состояніе, которое продолжалось недолго. т° 37,3—37,9. 12. Сильно потѣлъ ночью. Кашель, боль подъ ложечкой. Притупленіе сзади полное съ угла лопатки, по подмышечной съ 4 ребра. Голосовое дрожаніе и дыханіе отсутствуютъ въ предѣлахъ тупого звука сзади и ослаблены по подмышечной. т° 36,7—40,5. Согревающий компрессъ на бокъ. 13. Вчера днемъ сильно знобило, затѣмъ потѣлъ. Селезенка увеличена, болѣзненна, прощупывается. Въ крови найдены плазмодии. т° 37,4—38. 14. Не знобило, не потѣлъ. Бокъ болить при кашлѣ. т° 37,5—39,3. Назначено по 1 порошокъ сѣрно-кислого хинина (0,9) вечеромъ. 15. Кашель и боль незначительны. Не знобило. т° 37—38,7. 16. Бокъ почти не болить. т° 37,7—38,9. 17. Рѣзъ въ животѣ, жидкій стулъ. т° 37,4—38,8. Ванна. 18. Стулъ жидкій 4 раза. т° 37—39. Капли опія. 19. Тоже. т° 37,3—38,6. 20. Бокъ не болить, болитъ грудь. Притупленіе сзади неполное на 4 пальца выше угла лопатки, полное съ угла. Дыханіе и голосовое дрожаніе отсутствуютъ съ угла лопатки, выше очень ослаблены. По подмышечной какъ и раньше. т° 37,3—37,9. 21. Стулъ 4 раза жидкій; кашель незначительный. Хининъ оставить. Опій продолжать. 22. Стулъ жидкій 3 раза. Притупленіе сзади по прежнему, по подмышечной со 2 ребра; голосовое дрожаніе и дыханіе здѣсь ослаблены. 23. Кашель небольшой, стулъ жидкій. Отправленъ на дачу. Тамъ получалъ іодистый калий по 1,0 въ день. 29. Бокъ болить меньше. Иногда бываетъ потъ. Притупленіе сзади по старому; спереди на 1 ребро ниже. 6 июля. Выпотъ нѣсколько меньше. Самочувствіе удовлетворительное. 17. Притупленіе въ тѣхъ же границахъ; дыханіе слышно яснѣе; голосовое дрожаніе ослаблено. 1 августа. Поправляется. 9. Выписанъ на 63-й день болѣзни. Въ легкихъ обширное сращеніе листовъ плевры. Температура съ 23 июня нормальная, только нѣсколько вечеромъ повысилась до 37,8. Пульсъ колебался отъ 60 до 70 въ минуту. Число дыханій

вначалѣ колебалось отъ 25 до 32 въ минуту, 21 июня поднялось до 42. Кривая суточного количества мочи, ея уд. вѣса и количества принимаемой за сутки жидкости параллельны. Количество мочи во время лихорадки уменьшилось (1200 кс. за 11 июня, 1000 кс. за 14—19 июня), къ 23 июня увеличилось до 1700 кс. За исключеніемъ 2—3 ночей больной потѣлъ во время высокой температуры.

II ГРУППА — АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЛЯ ЧЕРНОРАБОЧИХЪ.

A. 9 случаевъ остраго суставнаго ревматизма; леченіе хвойникомъ.

LXX. Мѣщанинъ Алексѣй Л. 20 лѣтъ, кузнецъ. Прибылъ въ больницу 14 октября, выписанъ 5 декабря 1894 года. Прежде никогда ревматизма не было. 14 октября. Боленъ около 2 недѣль. До сихъ поръ ничѣмъ не лечился. Опухоль обоихъ колѣнныхъ, особенно лѣваго, суставовъ. При покоѣ болѣе нѣтъ. При движеніи и давленіи болѣзненны оба колѣна, лѣвой локтевой и правый лучезапястный (послѣдній припухши) суставы, 4-ый палецъ на лѣвой стопѣ. Назначено. Кастороваго масла 30,0. Алтайный отваръ (4,0—180,0). Телятина, 2 стакана молока, булка. Сердце нормально. т° 38,3—38,6. 15. Плохо спалъ отъ сильной ломоты въ колѣнныхъ и локтѣ. Суставы въ прежнемъ положеніи. т° 37,6—37,8. Прибавленъ супъ къ порціи. 16. Спалъ лучше. Постоянная сильная боль въ пораженныхъ суставахъ. Въ лѣвомъ локтевомъ болѣ усилась. Алтайный отваръ оставить. т° 37—38,4. Назначено infuso-decoctum ephedrae vulg. взъ 15,0 на сутки. 17. Не спалъ ночь. Боль нѣсколько меньше въ лѣвомъ колѣнѣ, усилилась въ лѣвомъ локтѣ. Правый лучезапястный суставъ опалъ, не болить. Стула нѣтъ 3-й день. Аппетитъ удовлетворительный. т° 38—38,5. 18. Стулъ былъ послѣ кастороваго масла (30,0). Спалъ ночь, боли въ колѣнныхъ немного меньше, при давленіи порядочная боль, опухоль по старому. Назначено 6 стакановъ молока и 1½ булки на сутки (прочее отмѣнено). т° 37,5—37,5. 19. Боль въ лѣвомъ колѣнѣ очень сильная, особенно ночью, въ правомъ только при движеніи и давленіи. Ручные суставы мало болѣзненны. т° 37,5—38,3. Назначено inf. dec. ephedrae изъ 20,0—на сутки. 20. Ночью сильно рвало лѣвое колѣно, теперь легче. Боль въ обоихъ

тазобедренных суставахъ. Опухоль по старому. Ручные суставы почти нормальны. т° 37,6—38,8. 21. Ночью сильно рвало лѣвое колѣно, опухоль его увеличилась; теперь боль при движеніи. Въ правомъ лучезапястномъ опухоль и боль усилилась. Стула 2 дня нѣтъ. т° 37,9—38,7. 22. Боль въ лѣвомъ колѣнѣ меньше, опухоль по старому. Лѣвая рука съ трудомъ сгибается въ локтѣ. Тазобедренные суставы по старому. Палецъ ноги болитъ меньше. т° 37,4—38,5. 4 стакана молока, жареная телятина. 23. Боль въ лѣвомъ колѣнѣ меньше, опухоль опала. Боль при движеніи въ правомъ плечевомъ, тазобедренномъ и колѣнномъ. Спать удовлетворительно. Дня 3 по вечерамъ бываетъ знобъ, жаръ и потъ. т° 37,8—38. 24. При покоѣ болей нѣтъ. При давленіи и движеніи боль въ лѣвомъ колѣнномъ, локтевыхъ и лучезапястныхъ суставахъ. 1-ый тонъ у верхушки сердца нечистый. 25. Ночью сильно ломило лѣвое колѣно, теперь меньше. Опухоль по старому. Боль и припухлость въ правомъ лучезапястномъ и лѣвомъ локтевомъ суставахъ. Сердце нѣсколько увеличено въ поперечникѣ; 1-ый тонъ нечистый. 26. Нѣсколько дней по вечерамъ сильная головная боль. 27. Тоже. 28. Въ лѣвомъ колѣнѣ ломота меньше; боль при давленіи по старому. Боль въ крестцѣ и паховыхъ областяхъ. 29. При покоѣ болей нѣтъ. При движеніи и давленіи боль въ прежнихъ мѣстахъ, припухлость держится. Въ правомъ плечевомъ суставѣ боль меньше. Появилась боль при движеніи и давленіи въ правомъ голеностопномъ. 30. Сильная боль ночью въ пораженныхъ суставахъ. Плохо спалъ. 31. Спать плохо; 2 дня по вечерамъ жаръ въ головѣ и головокруженіе. Боли по старому. Опухоль лѣваго колѣна меньше. 1 Ноября. Ломота днемъ и ночью въ пораженныхъ суставахъ. Inf decocum изъ 30,0 на сутки. 2. Тоже. 2 дня, какъ чувствуетъ сжиманіе въ области сердца. Головокруженія не бываетъ. 4. Тоже. 5. Ломота продолжается въ колѣнныхъ суставахъ; ходить съ большимъ трудомъ. Правый плечевой и лучезапястный ломаютъ меньше. Припухлость рѣзкая въ правомъ голеностопномъ, въ другихъ суставахъ небольшая. 6 и 7. Тоже. 8. Боли ночью не было, спалъ хорошо. При движеніи и давленіи боли по старому. 9. Боль и опухоль въ лѣвомъ колѣнѣ усилилась. Появилась боль при наступаніи на правую пятку. 2-ой день постоянное головокруженіе. Inf-dec. изъ 40,0 на сутки. 10. Вчера болѣла голова. При движеніи и давленіи боль въ суставахъ;

ходить съ большимъ трудомъ. 11 и 12. Тоже. 13. Въ плечевомъ и локтевомъ суставахъ боль меньше. Въ правомъ голеностопномъ припухлость и боль. Головокруженія нѣтъ. Хвойникъ оставить. 14. Опухоль и боль при давленіи въ лѣвомъ колѣнѣ меньше, движеніе свободнѣе. Припухлость и затрудненіе сгибанія въ правомъ лучезапястномъ. Ванна. 15. Припухлость и боль при давленіи въ лѣвомъ колѣнѣ усилилась, въ правомъ лучезапястномъ тоже. Правый голеностопный по старому. Салициловаго натра 6 порошковъ по 1,0. 16. Чувствуетъ себя лучше. Въ плечевомъ и лучезапястномъ суставахъ боль меньше; въ другихъ по старому. 17. Плечевому и голеностопному суставамъ значительно легче. Правый лучезапястный нормаленъ. 19. Шумъ въ головѣ, слабость. Опухоль колѣна меньше, но оно не разгибается. Салициловый натръ оставить. Смазываніе іодомъ лѣваго колѣна. 22. Правый лучезапястный суставъ опять болитъ при давленіи; колѣно лѣвое припухло и горячо, болитъ по старому. Растираніе летучей мазью. 6 порошковъ фенацепина по 0,6. 25. Опухоль колѣна меньше. 26. Назначенъ іодистый калий 4,0 на сутки. Согревающий компрессъ на колѣно. 28. Чувствуетъ себя лучше. Во всѣхъ суставахъ боль меньше. Головная боль. 30. Ходить свободнѣе. 3. Лѣвое колѣно меньше болитъ, опухоль опала; боль послѣ ходьбы. Въ правомъ голеностопномъ боль при давленіи и ходьбѣ. 4. Ходить свободно; боли при давленіи почти нѣтъ въ колѣнѣ. 5. Въ колѣнѣ боли при давленіи нѣтъ. Пятки болятъ при ходьбѣ. Временами ломота въ правомъ голеностопномъ суставѣ. Выписанъ на 66-ой день заболѣванія. Сердце нормально. Кровяное давленіе, измѣряемое сфигмоманометромъ Ваши, колебалось отъ 100 до 110 mm. Сфигмограмма получалась всегда одна и таже. Температура съ 24 октября держалась на 37,6—38,8; со 2 ноября на 37,4—38,4 и только со 2 декабря нормальна. Пульсъ вначалѣ колебался отъ 90 до 100 въ минуту, а со 2 ноября около 90. Число дыханій соответственно пульсу вначалѣ было 25—30 въ минуту, позже 20—25. Количество мочи вначалѣ колебалось отъ 1500 кс. до 1800 кс. за сутки, ко 2 ноября упало до 1000 кс., а отсюда постепенно увеличивалось до 1900 кс. (16 ноября) и опять упало до 1100 кс. Большой постоянно потѣлъ ночью, нѣсколько сильнѣе во время леченія хвойникомъ, чѣмъ до того.

ЛХХІ. Крестьянинъ Андрей Ч. 16 лѣтъ, сапожникъ.

Поступилъ въ больницу 18 октября, выписанъ 11 ноября 1894 года. Прежде ревматизма никогда не было. 18. Боленъ около 10 дней болью въ суставахъ. Боли при покоѣ и давленіи въ большемъ пальцѣ правой стопы и въ лучезапястныхъ суставахъ. Во всѣхъ трехъ припухлость и краснота. При давленіи боль въ лѣвомъ плечевомъ и правомъ коленномъ. Небольшой кашель. Аппетита нѣтъ. Сердце и легкія нормальны. Сначала болѣлъ лѣвый коленный суставъ, теперь онъ нормаленъ. Лечили дома мѣстными средствами: горчичниками etc. Лучезапястные суставы поражены 3 дня. Алтайный отваръ. 6 стакановъ молока, 1½ булки. t° 38—38,19. Немного спалъ. Правый лучезапястный суставъ болитъ меньше. Ломота въ обоихъ коленныхъ суставахъ. Аппетитъ лучше. t° 38,1—38,9, 20. Спалъ лучше; колѣни болятъ при движеніи. Сильныя боли въ лѣвомъ плечевомъ, лучезапястныхъ, суставахъ плюсны обоихъ стопъ. 1-ый тонъ въ сердцѣ сопровождается шумомъ. Отваръ оставить. Infuso-decoctum erphedrae изъ 20,0 на сутки. t° 38,4—39. 21. Ночью была сильная одышка и боль подъ ложечкой. Стула не было. Сегодня боли сильнѣе въ правомъ лучезапястномъ (постоянная ломота); при движеніи сильная боль въ лѣвомъ коленномъ и плюсовыхъ суставахъ. t° 38—38,5. Касторового масла 30,0. 22. Подъ утро немного спалъ. Стулъ былъ. Боль въ лѣвомъ локтевомъ суставѣ при движеніи. Въ правомъ колѣнѣ сильная боль, опухоль увеличилась; въ стопахъ по прежнему. t° 38,2—38,6. 23. Въ колѣнѣ боль меньше. Сегодня сильно болитъ лѣвый голеностопный и плюсовые суставы, всю ночь не спалъ. Въ правомъ локтѣ по старому. Поперечникъ лѣваго сердца увеличенъ, 1-ый тонъ съ шумомъ у верхушки. t° 37,8—38,5. 24. Въ колѣнѣ (лѣвомъ) боли нѣтъ, опухоль небольшая. Боль при давленіи въ плюснахъ, особенно лѣвой стопы. Во всей лѣвой рукѣ при покоѣ боли нѣтъ. Спалъ хорошо. t° 37,3—38,5. По вечерамъ всегда знобитъ. 25. Сильная боль съ ночи въ правыхъ локтевомъ и лучезапястномъ суставахъ при движеніи и давленіи. t° 37,3—38,4. 26. Болей при покоѣ нигдѣ нѣтъ, колѣни нормальны, правый лучезапястный тоже. При движеніи и давленіи боль въ плюснахъ, адъе припухлости. Лѣвый плечевой немного болятъ. t° 37,2—37,7. Границы сердца нормальны; 1-ый тонъ вездѣ сопровождается шумомъ. 27. Боль и опухоль въ правомъ голеностопномъ суставѣ; въ другихъ почти

нѣтъ боли; опухоль держится въ правомъ колѣнѣ, оно съ трудомъ сгибается. Небольшая боль въ лѣвомъ лучезапястномъ суставѣ. 28 и 29. Тоже. 30. Ночью сильно болѣлъ лѣвый голеностопный суставъ, теперь не болитъ, опухоли нѣтъ. 31. Небольшая боль при давленіи въ лѣвомъ плечевомъ и правомъ локтевомъ суставахъ; остальные почти нормальны. 1 ноября ночью сильно ломило правое колено и лѣвый лучезапястный суставъ; въ послѣднемъ появилась припухлость и затрудненіе сгибанія. Плохо спалъ. Inf-decoctum изъ 30,0 на сутки. 2. Спалъ хорошо. Ломоты нигдѣ нѣтъ. Ходить больно. Въ лѣвомъ колѣнѣ припухлость и боль при движеніи, тоже въ правомъ голеностопномъ суставѣ. 3. Тоже. 4. Ночью сильно ломило правое колено и голеностопный суставъ, плохо спалъ. 5. Ломоты нѣтъ и ночью не было. Правое колено почти нормально. Правый голеностопный безъ измѣненія. Ходить довольно свободно. 6. Боли при движеніи и давленіи въ локтевыхъ суставахъ. Оставить хвойникъ. 7. Боль въ шейной части позвоночника при давленіи и движеніяхъ. Ванна. 8. Тоже. слабость въ ногахъ. 9. Въ шеѣ боль меньше. 10. Болей въ суставахъ нигдѣ нѣтъ. Сердце нормально. Выписанъ на 34-ый день болѣзни. Кровяное давленіе въ лучевой артеріи было постоянно 75—80 mm. Сфигмограмма имѣла всегда приблизительно одинъ видъ. Температура съ 29 октября нормальна. Пульсъ колебался отъ 60 до 70 въ минуту, а съ 3 ноября на 50—52. Число дыханій вначалѣ держалось на 22—28 въ минуту, съ 27 октября на 18. Количество мочи вначалѣ колебалось отъ 1000 до 1500 кс. за сутки, къ 23 октября (1-ны утреннія послабленія) увеличилось до 2100 кс. и колебалось далѣе отъ 1500 до 2000 кс. Вольной потѣлъ одну ночь въ день увеличенія мочи (24 октября) и другую на другой день послѣ назначенія хвойника 30,0 на сутки (при нормальной температурѣ).

LXXII. Крестьянинъ Андрей Б., 15 лѣтъ, торговецъ. Поступилъ 25 октября, выписанъ 28 ноября 1894 года. 25. Раньше ревматизма никогда не было. Боленъ 4 дня. Поражены оба колѣнные и голеностопные сустава. Боли при покоѣ нѣтъ; при движеніи и давленіи сильная боль; припухлость суставовъ. Сердце нормально. Супъ, котлеты, 2 стакана молока, булка. t° 38—38. 26. Тоже. t° 37,5—38,5. 27. Боли по прежнему при движеніи, временами при покоѣ. t° 37,7—38,3. 28. Припух-

лость и боли по старому; слѣва боль въ передней поверхности бедра. Стула не было. Касторового масла 15,0. Infuso-decoctum erhedrae изъ 20,0 на сутки. t° 37,0—37,5. 29. Боли по старому при движеніи, временами при покоѣ. Спаль плохо. t° 36,9—37,3. 30. Сегодня ночью боли въ суставахъ были очень сильныя, припухлость по старому; давленіе ихъ весьма болѣзненно. Спаль плохо. t° 36,8—37,5. 31. Тоже. t° 37—38,6. 1. Ломота въ суставахъ продолжается и днемъ; ночью не даетъ спать. Inf-decoctum изъ 30,0 на сутки. t° 37,4—38,1. 2. Спаль плохо. Улучшенія никакого нѣтъ. t° 36,8—37. 3. Боль въ правомъ колѣнѣ меньше, опухоль въ немъ нѣсколько опала; въ лѣвомъ рѣзкая припухлость, сильная боль днемъ и ночью. Въ голеностопныхъ суставахъ боль при давленіи. Сегодня ночью потѣлъ. Сердце нормально. 4. Ночью ломота была меньше, остальное по старому; ходить не можетъ. 5. Ломоты при покоѣ нѣтъ и ночью не было. Пораженные суставы болѣзненны при давленіи и движеніи, припухлость ихъ меньше. Спаль хорошо. 6. Временами стрѣляющія боли въ лѣвомъ голеностопномъ, гдѣ имѣется рѣзкая припухлость. Другіе суставы болѣзненны при давленіи и ходьбѣ. 7. Тоже. 8. Болей при покоѣ нѣтъ. Боль при движеніи и давленіи въ голеностопныхъ суставахъ; въ колѣнныхъ только при движеніи. 9. Появилась боль въ суставахъ плечны и лѣвомъ колѣнномъ; въ первыхъ имѣется припухлость. 10. Болей при покоѣ нѣтъ. Въ плечевыхъ суставахъ боль при давленіи. 11. Тоже. Въ колѣнныхъ боль при хожденіи. 12 и 13. Безъ измѣненій. 14. Въ плечевыхъ суставахъ болей нѣтъ, опухоль опала. Припухлость и боль при давленіи въ колѣнныхъ суставахъ. Хвойникъ оставить. 15. Тоже. Массажъ суставовъ. Ванна. 16. Боль появилась опять при давленіи въ обоихъ голеностопныхъ суставахъ, припухлость злѣе держится. 17. Боли улеглись въ голеностопныхъ и колѣнныхъ суставахъ. 18. 6 порошковъ салицилового натра по 0,9. Ванна. 19. Шумъ въ головѣ. Въ колѣнныхъ боли нѣтъ; въ голеностопныхъ по старому. 3 порочка въ день. 20. Боль держится въ лѣвомъ голеностопномъ суставѣ и справа въ Ахилловомъ сухожиліи. Салициловый натръ оставить. Ванна. Смазать іодомъ пораженные суставы. 22. Безъ измѣненій. Растираніе легучей мазью. 23. Голеностопные суставы совершенно нормальны, припухлость исчезла. Боли въ Ахилловыхъ сухожилияхъ при давленіи; ходить свобод-

нѣе. 26. Ходить свободно. 28. Небольшія боли при давленіи въ Ахилловыхъ сухожилияхъ. Выписанъ на 38-ой день болѣзни. Температура со 2 ноября нормальна. Пульсъ во время высокой температуры былъ 100 и даже 108 (1 ноября) въ минуту. Къ 8 ноября постепенно упалъ до 60 и колебался далѣе отъ 60 до 70. Число дыханій соответственно пульсу вначалѣ 26 въ минуту, далѣе 20—24. Количество мочи было 1400—1600 кс. за сутки при высокой температурѣ, со 2 по 7 ноября было 1200—1300 кс. за сутки; къ 8 ому поднялось до 1850 кс., къ 11 ому даже до 2400 кс., затѣмъ постепенно уменьшалось до 1500 кс. 25 ноября. Больной потѣлъ только одну ночь на 2-ой день послѣ назначенія 30,0 хвойника при нормальной температурѣ. Кровяное давленіе въ лучевой лѣвой артеріи всегда было 75—80 mm. Сфигмограмма всегда имѣла одинъ и тотъ же видъ.

LXXII. Крестьянинъ Иванъ Е. 15 лѣтъ, булочникъ. Поступилъ 2 ноября, выписанъ 14 ноября 1894 года. Прежде ревматизмомъ не хворалъ. 3 ноября. Боленъ около недѣли. Раньше 4 дня болѣла голова, боль въ суставахъ появилась всего 3 дня. Боль и припухлость въ лѣвыхъ колѣнныхъ и голеностопномъ суставахъ; тѣже суставы справа болѣзненны при давленіи. Аппетита нѣтъ. Запоръ 3 дня. Сердце нормально. t° 38—38,2. Касторового масла 15,0. Алтайный отваръ. Супъ, 2 стакана молока, булка. 4. Боль по старому при давленіи и ничтожная при движеніи, при покоѣ нѣтъ. Плохо спалъ. 1-й тонъ въ сердцѣ сопровождается шумомъ. t° 38—38,3. 5. При давленіи еще сильныя боли. Спаль. Вечеромъ болѣла голова. Боль подъ лопаткой; стула сегодня не было. t° 37,5—37,6. Infuso decoctum erhedrae изъ 30,0 на сутки. Клизма. 6. Стулъ былъ. Боли постоянныя только въ правомъ голеностопномъ суставѣ, злѣе припухлость и краснота держится; другіе суставы почти нормальны. Появилась боль при движеніи и давленіи въ обоихъ подмышечныхъ впадинахъ. t° 37—37. 7. Появился кашель. Утромъ было носовое кровотечение; голова не болитъ. Въ голеностопномъ правомъ суставѣ боль меньше при ходьбѣ и давленіи. 2-й день боль при движеніи и давленіи въ лѣвомъ тазобедренномъ суставѣ; въ подмышечныхъ впадинахъ боли нѣтъ. 2-ю ночь порядочно потѣеть. Легкія нормальны; шумъ въ сердцѣ рѣзче. t° 38—37,3. 8. Спаль хорошо. Боль при движеніи и давленіи въ лѣвомъ

тазобедренномъ суставѣ; другіе нормальны. Кровотечение изъ носа; кашля нѣтъ. ° 37—37,9. Въ лѣвомъ тазобедренномъ суставѣ боль только при хожденіи. Со вчерашняго дня болитъ голова. 10. Голова не болитъ. Поправляется. Въ сердцѣ шумъ по прежнему. 11. Суставы нормальны; ходить свободно. Хвойникъ оставить. 12 и 13. Головокруженіе при ходьбѣ. 14. Здоровъ. Сердце по старому. Выписанъ на 18-й день болѣзни. Температура съ 9 ноября нормальна. Пульсъ 100 въ минуту 4 ноября, постепенно падалъ до 50 13 ноября. Число дыханій было 25—32 въ минуту во время высокой температуры и 22—24 позднѣе. Количество мочи 300 кс. 4 ноября, 1000 кс. 6-го, 1200 кс. 8-го и 1700 кс. 9 ноября; затѣмъ постепенно упало до 1000 кс. и опять поднялось до 1700 кс. Больной потѣлъ 2 ночи при пониженіи температуры.

LXXIV. Крестьянинъ Василій И. 22 лѣтъ, чернорабочій. Поступилъ 7 ноября, выписанъ 21 ноября 1894 года. Хвораетъ рецидивами остраго суставного ревматизма лѣтъ 10, почти каждую весну и осень. 7 ноября. Лѣвое колѣно сильно припухши, болѣзненно при давленіи и движеніи. Боль въ лѣвомъ локтевомъ суставѣ, припухлости нѣтъ. Боль въ крестцѣ. Остальные суставы нормальны. Боленъ 4 дня. 1-й тонъ увернушки сердца замѣненъ шумомъ. Аппетита нѣтъ. Зрачки равномѣрны по 3 мм. (дневной свѣтъ). ° 36,5. Назначенъ алтейный отваръ. 6 стакановъ молока, каша, 1½ булки. 8. Спать плохо, лѣвое колѣно меньше болитъ. Опухоль и сильная боль при давленіи въ правомъ колѣнномъ и лѣвомъ локтевомъ суставахъ. Стула не было. Отваръ алтейный оставить. Infuso-decoctum erhedrae изъ 30,0 на сутки. ° 38,1—38. 9. Спать хорошо. Крестецъ не болитъ. Боли въ колѣнныхъ, лѣвомъ локтевомъ и лучезапястномъ усилились. Стула не было. Зрачки равномѣрны по 5 мм. ° 38,5—37,4. Infuso-decoctum изъ 40,0 на сутки. 10. Появилась боль въ правомъ плечевомъ суставѣ; не спалъ всю ночь. Сильная боли при движеніи и дотрогиваніи въ затылочной части шеи. Въ колѣнныхъ боль меньше, въ лѣвой рукѣ по старому. Стулъ былъ. ° 37,8—37,5. Боль при глотаніи. 11. Не спалъ ночь. Въ колѣнныхъ боли нѣтъ. Обѣ руки болятъ во всѣхъ суставахъ, при движеніи и давленіи сильная боль; лучезапястные суставы припухли. Боль въ тазобедренныхъ суставахъ, въ шеѣ по старому. ° 38,3—38,6. 12. Не спалъ ночь. Въ шеѣ боли нѣтъ.

Лучезапястные суставы сильно болятъ; ломота въ правомъ колѣнномъ и голеностопномъ. Боли при глотаніи нѣтъ. ° 38,7—38,6. Зрачки равномѣрны по 5 мм. 13. Очень мало спалъ. Возвратилась боль въ шеѣ. Въ лѣвомъ лучезапястномъ суставѣ боль меньше, въ правомъ по старому; въ плечевыхъ суставахъ боль меньше. Колѣни и локти не болятъ. ° 38,4—38,5. 14. Вчера сильно ломилъ лѣвый плечевой суставъ (послѣ согревающего компресса, наложеннаго по приказанію дежурнаго ассистента, боли прошли). Теперь боль при давленіи и движеніи въ правомъ плечевомъ, локтяхъ и лучезапястныхъ и тазобедренныхъ суставахъ. Компрессъ снять. ° 37,5—38. Мясная порція. 15. Спать хорошо. При покоѣ болей нигдѣ нѣтъ. При движеніи и давленіи въ правомъ плечевомъ, пальцевыхъ суставахъ обѣихъ кистей, въ тазобедренныхъ. ° 37,5—37,8. Сердце по старому. 16. Тоже. 17. Съ ночи ломота въ правомъ плечевомъ суставѣ, при давленіи и движеніи сильная боль; въ тазобедренныхъ по старому. 18. По старому. 19. Нигдѣ боли нѣтъ. Паховыя железы увеличены, болѣзненны. Хвойникъ оставить. 20. Поправляется. 21. Здоровъ. Сердце по старому. Выписанъ на 18-й день болѣзни. Кровяное давленіе въ лѣвой лучевой артеріи было постоянно 170—180 мм. Сфигмограмма имѣла одинъ и тотъ же видъ. Температура съ 16 ноября нормальна. Пульсъ колебался отъ 90 до 100 въ минуту; послѣ паденія температуры постепенно упало до 80. Число дыханій вначалѣ колебалось отъ 25 до 35 въ минуту, позднѣе отъ 25 до 30. Количество мочи при высокой температурѣ колебалось отъ 1000 до 1500 кс. за сутки; 16 ноября увеличилось до 2000 кс., а 20-го даже до 2200 кс. Больной незначительно потѣлъ 2 ночи при высокой температурѣ (8 и 13 ноября).

LXXV. Дворянинъ Н. К. 41 года. Поступилъ 14-го ноября, выписанъ 17-го декабря 1894 г. Прежде ревматизма никогда не было. 14-го ноября. Боленъ 2 недѣли болью, являющеюся попеременно въ разныхъ суставахъ. Это время лечился мазями и иодистымъ калиемъ. Суставы кистей рукъ и лѣвые колѣнный и голеностопный припухши, крайне болѣзненны; движенія невозможны. Сердце нормально. ° 38,4—39. Боль при глотаніи. 15. Стула не было. При движеніи и давленіи боли кромѣ прежнихъ въ плечевыхъ и локтевыхъ суставахъ; измѣненъ въ нихъ нѣтъ. Всѣ ночи до сихъ поръ потѣлъ. Клиз-

ма. Полуторохлористое желѣзо съ глицериномъ для смазыванія глотки. 6 стакановъ молока, булка. t° 38—39. 16. Появилась боль при движеніи и давленіи въ правомъ колѣнѣ. Въ локтевыхъ суставахъ боль меньше, въ остальныхъ по прежнему. Спитъ удовлетворительно, не потѣетъ. t° 38—39. Назначено infuso-decoctum erpethrae изъ 40,0 на сутки. 17. Сегодня боли усилились въ правомъ колѣнѣ, припухлость нерѣзкая. Появилась припухлость и боль при давленіи въ лѣвомъ лучезапястномъ суставѣ, онъ красенъ. Въ правомъ плечевомъ боли почти нѣтъ. t° 38,2—39,4. 18. Всю ночь ложило пальцы рукъ и лучезапястные суставы. Правый лучезапястный красенъ. Правый голеностопный суставъ болѣзненъ при давленіи. t° 38—38,5. 19. Спалъ лучше. Ночью ломота была нѣсколько меньше. Теперь при покоѣ небольшая боль въ пальцахъ обѣихъ кистей. Остальные суставы болятъ по старому. t° 38—39,3. Стула нѣтъ 3 дня. Клизма. 20. Чувствуетъ себя нѣсколько лучше. Ночью немного ложило лѣвую кисть. Правый лучезапястный суставъ нормаленъ. При давленіи и движеніи боль въ локтевыхъ и пальцевыхъ, особенно сильная въ правомъ колѣнномъ суставѣ. Головная боль. Больной плачетъ. t° 38—38,4. 21. Появилась боль въ шеѣ и въ большомъ пальцѣ лѣвой стопы. Правое колѣно болитъ только при движеніи. Спалъ хорошо. Временами боль при глотаніи. t° 38,5—39. 22. Кисти рукъ почти нормальны. Въ локтевыхъ, правомъ колѣнномъ боль при движеніи и давленіи. t° 38,5—38,2. 23. Ночью ложило кисти рукъ и пальцы и правый локоть; теперь здѣсь боль при давленіи и движеніи. Шея почти не болитъ. Стула нѣтъ 4-й день. t° 37,8—38. 24. Ночью и днемъ сильная ломота въ кистевыхъ и пальцевыхъ суставахъ. t° 37,8—38. 25. Тоже самое. t° 38—38,5. 26. Спалъ хорошо всю ночь. Ломота ночью была меньше. При давленіи пальцевые суставы правой кисти болѣзненны, припухши, красны. Локти нормальны. Правое колѣно болѣзненно при давленіи. Аппетита нѣтъ. Стула нѣтъ 5-й день. Клизма. t° 37,5—38,5. 27. Ночью ломоты не было. Сегодня появилось колотье въ лѣвомъ колѣнѣ. t° 37,6—38,1. Ощущеніе давленія въ груди. 28. t° 37—38,5. При давленіи нигдѣ боли нѣтъ. При движеніи боль въ правомъ колѣнѣ. Аппетитъ лучше. 29. Боль при давленіи въ голеностопныхъ суставахъ. Стула не было 3 дня. Клизма. t° 37—38,3. 30. Ночью была ломота въ лучезапястныхъ (въ

правомъ появилась припухлость) и пальцевыхъ суставахъ. t° 37—38,5. 1-го декабря. Тоже. t° 37—39. 2. Боль при движеніи и давленіи въ лѣвомъ лучезапястномъ и пальцевыхъ суставахъ. Правый лучезапястный припухши, красенъ. Въ правомъ колѣнѣ при движеніи и давленіи боль. t° 38—39. Хвойникъ оставить. 3. Чувствуетъ себя лучше. Суставы по старому. Слабость. Запоръ. Назначенъ іодистый калий 4,0 на сутки. Клизма. 4. Ломоты нигдѣ нѣтъ. Въ кистяхъ боль при давленіи и движеніи. Съ трудомъ начинаетъ садиться (раньше онъ все время неподвижно лежалъ). Іод. калий отказывается принимать. Ванна. 5. Ходить еще не можетъ; боль въ пяткахъ. 6. Вчера вечеромъ и ночью ложило правую кисть; сейчасъ ломота и боль при давленіи. 6 порошковъ салициловаго натра по 1,0. 7. Ломоты не было, боль при давленіи меньше. Принялъ только 1 порошокъ—вырвало. 8. Небольшая ломота ночью. 4 порошка сала по 0,6. 10. Небольшая боль при давленіи въ кистяхъ рукъ. Ходить не можетъ отъ слабости. 11. Ходить свободно. 12 и 13. Небольшая боль при давленіи въ пальцахъ правой кисти. 14. Чувствуетъ себя почти здоровымъ. Порошки оставить. Ванна. 16. Вчера было дурно. Боль при давленіи и хожденіи въ правомъ голеностопномъ суставѣ. t° 37—38,5. Смазать іодомъ. Внутрь іодистый и бромистый натръ по 4,0 на сутки. 17. Въ голеностопномъ суставѣ боли нѣтъ. Небольшая боль при давленіи въ колѣняхъ. Выписанъ на 47-й день болѣзни. Кровяное давленіе въ правой лучевой артеріи колебалось отъ 160 до 180 мм. Сфигмограмма всегда имѣла одинъ и тотъ-же видъ. Температура съ 4-го декабря постепенно упала до нормы къ 7-му и дала только одинъ вечеръ новышеніе до 38,5. Пульсъ колебался отъ 100 до 120 въ минуту и только 1-го декабря былъ 92. Число дыханій колебалось отъ 25 до 30 въ минуту. Количество мочи первые 5 дней было 1300 кс. за сутки, 20-го ноября 800 кс., а 22-го даже 600 кс.; отсюда начало постепенно подниматься (при утреннихъ послабленіяхъ температуры) и достигло 1500 кс. 30-го ноября. При постоянной высокой t° большой немного потѣлъ по ночамъ; съ 24-го ноября не потѣлъ. Сердце не пострадало.

LXXXVI. Торговецъ С. 27 лѣтъ. Поступилъ 17 ноября, выписанъ 23 ноября 1894 года. Лѣтъ 5 назадъ былъ легкій приступъ суставного ревматизма. 17 ноября. Теперь боленъ

дней 6. Боли въ коленныхъ, тазобедренныхъ, въ лѣвомъ голеностопномъ суставахъ и пальцахъ лѣвой стопы; кромѣ тазобедренныхъ всё они припухли. Первые дни (дома) были опухши и болѣли суставы рукъ; принималъ по 2 порошка салициловаго натра въ день. Границы сердца нормальны; 1-й тонъ у верхушки съ шумомъ. t° 38,5. Мясная порція. 18. Ночью ломили колѣни; спалъ. Суставы по прежнему. t° 37,5—38. 19. Ночью ломило лѣвое колѣно, опухло въ немъ держится. При давленіи небольшая боль въ лѣвомъ колѣнѣ, въ пальцахъ лѣвой стопы. Infuso - decostum erhedrae изъ 40,0 на сутки. t° 37,5—37,6. 20. Чувствуетъ себя лучше. Ночью ломило мизинецъ правой кисти, въ немъ замѣчается припухлость и краснота. Въ тазобедренныхъ суставахъ небольшая боль. Лѣвое колѣно болѣзненно при давленіи и ходьбѣ; припухлость въ немъ держится. t° 37,1—37,4. 21. Чувствуетъ себя лучше. Колѣни нормальны, боль въ нихъ при ходьбѣ. Правый мизинецъ почти не болитъ. Боль при движеніи въ лѣвомъ тазобедренномъ и правомъ локтевомъ. 22. Мизинецъ нормаленъ. Сильная боль въ нижней части позвоночника при давленіи. Правый локтевой суставъ не болитъ. 23. Ночью болѣлъ лѣвый тазобедренный суставъ, теперь боли только при движеніи. Позвоночникъ не болитъ. Хвойникъ оставить. Больной пожелалъ выписаться (12-й день болѣзни). Температура съ 19 числа нормальна. Пульсъ колебался около 70 въ минуту. Число дыханій 24 въ минуту 1-ые 2 дня, 16—20 ноября и опять 24 въ день выписки. Количество мочи 1000 кс. за 17 ноября, 1400 кс. за 20-ое и 2000 кс. за 21 ноября. Больной никогда не потѣлъ. Кровяное давленіе въ лѣвой лучевой артеріи колебалось отъ 170 до 190 мм. Сфигмограмма не измѣнилась за это время.

LXXVII. Крестьянинъ Федоръ Н. 18 лѣтъ, рабочій. Поступилъ 30 ноября 1894 года. Перенесъ въ 1893 году острый суставной ревматизмъ. Теперь боленъ 5-й день. 30. Лѣвый колѣнный и голеностопный суставы припухши, послѣдній красенъ; боли при движеніи и давленіи; ломота теперь небольшая, ночью была сильная, не давала спать. Правые колѣнный и голеностопный болѣзненны при давленіи, ночью ломили; измѣненій въ нихъ нѣтъ. Сердце и легкія нормальны; небольшой кашель. t° 37,5—38. Мясная порція. Алтейный отваръ. 1. Сильно ломили колѣнные и голеностопные

суставы. На лѣвый голеностопный суставъ вчера по приказанію дежурнаго врача наложенъ былъ согревающий компрессъ—нисколько не облегчилъ болей. Теперь сильная ломота, почти не спалъ ночь. Мѣстныя измѣненія по старому. t° 37,2—38,2. Отваръ отмѣненъ. Назначено infuso-decostum erhedrae изъ 40,0 на сутки. 2. Всю ночь не спалъ. Сильно ломило правый колѣнный и оба голеностопные суставы; они очень болѣзненны при давленіи. Лѣвый колѣнный суставъ мало болитъ. При покоѣ значительная боль. Правый зрачокъ 6 мм., лѣвый 7 мм. при дневномъ свѣтѣ. t° 38—38,5. 3. Ночью было кровотеченіе изъ носа. Ломота нѣсколько меньше чѣмъ вчера. Мѣстныя явленія по старому. t° 37,2—38,3. 4. Спалъ мало. Правое колѣно меньше болитъ; правый голеностопный по старому. Сильно заболѣло лѣвое колѣно, очень болѣзненно при давленіи. Лѣвый голеностопный суставъ не болитъ. Стулъ 3 раза (прежде ходилъ по разу). t° 38—38,5. 5. Вечеромъ болѣла голова. Ночью ломота была меньше. Лѣвое колѣно припухши, сильно болѣзненно. Голеностопные суставы болѣзненны при давленіи. Чувствуетъ себя лучше. Зрачки равномѣрны по 5½ мм. t° 37,5—37,8. 6. Спалъ хорошо. Лѣвое колѣно по старому. Ходить не можетъ. Боль въ большихъ вертелахъ. t° 37,2—37,3. 7. Ломоты ночью не было. Остальное по старому. Голеностопные суставы нормальны. Въ лѣвомъ тазобедренномъ суставѣ боль при давленіи. 8. Тоже. 9. Въ лѣвомъ тазобедренномъ суставѣ боли нѣтъ. Появилась боль и припухлость въ правомъ тазобедренномъ. Зрачки равномѣрны по 5½ мм. Лѣвое колѣно почти нормально. 10. Боль въ правомъ тазобедренномъ суставѣ меньше. Появилась боль при давленіи и движеніи въ правомъ голеностопномъ суставѣ и Ахилловомъ сухожильи; припухлости нѣтъ. Жалобы на сердечное. Сердце нормально. 11. Правый тазобедренный суставъ нормаленъ. Правый голеностопный по старому. 2-ой день насморкъ и кровотеченіе изъ носа. 12. Немного ноетъ лѣвое колѣно. Обѣ стопы зябнутъ. 13. Правый голеностопный болѣзненъ при давленіи и движеніи, припухъ. 14. Тоже. 15. Въ правомъ голеностопномъ суставѣ боль незначительная; сильная боль въ лѣвомъ при давленіи и хожденіи, ночью въ немъ ломота. Ходить трудно. Хвойникъ оставить. 16. Ломоты не было. Временами ноетъ въ голеностопныхъ суставахъ. Ванна. 17. Ходить легче. Ванна. Йодистый калий 4,0 на сутки.

18. Незначительная болезненность въ правомъ голеностопномъ. 19 и 20. Лучше. Иодная сыпь на лицѣ. 21. При давленіи и хожденіи сильная боль въ правомъ голеностопномъ. 22. Тоже. 23. Ничтожная боль при давленіи въ правомъ голеностопномъ. Небольшая боль при давленіи въ лѣвомъ коленномъ. Выписанъ здоровымъ 7 января 1895 года на 43-й день болѣзни. Температура съ 10 декабря нормальна (36,2—37). Пульсъ 64 въ минуту 30 ноября, участился до 80 къ 4 декабря, упалъ до 56 къ 7 декабря и колебался отъ 60 до 68. Число дыханій 22 въ минуту 30 ноября, 28—2 и 3 декабря и 18—22 остальные дни. Количество мочи 2400 кс. за 30 ноября, упало до 1100 кс. къ 3 декабря, увеличилось до 1800 кс. уже 4 декабря, колебалось около этой цифры, увеличилось до 2900 кс. 14 декабря. Больной сильно потѣлъ со дня назначенія хвойника всѣ ночи при высокой температурѣ и несильно и не всегда при нормальной. Кровяное давленіе въ правой лучевой артеріи было всегда 125—130 mm. Видъ сфигмограммы существенно не мѣнялся.

LXXIII. Мѣщанинъ Михаилъ Т. 17 лѣтъ, торговецъ. Поступилъ 6 декабря, выписанъ 19 декабря 1894 года. Прежде ревматизма никогда не было. 6 декабря. Болеетъ 5 дней, лечился мазями. При покоѣ ломота въ голеностопныхъ суставахъ—они красны, горячи, сильно болезненны при давленіи. Лѣвый лучезапястный тоже красенъ и горячъ. Кромѣ того болезненны коленные, локтевые и плечевые суставы. Последнюю ночь плохо спалъ и сильно потѣлъ. Сердце нормально. Запоръ 3 дня. t° 38,5—39,2. Костороваго масла 30,0. Молочная порція. 7. Сильная ломота ночью въ голеностопныхъ суставахъ. При давленіи и движеніи боль въ прежде пораженныхъ суставахъ. Немного потѣлъ ночью. Стулъ былъ. t° 38,9—39,4. Infuso-decoctum ephedrae пзъ 40,0 на сутки. 8. Спалъ хорошо. Ломоты не было. Боль при давленіи и движеніи въ голеностопныхъ, коленныхъ, плечевыхъ и лѣвомъ лучезапястномъ суставахъ; голеностопные еще припухши, коленные меньше. Ходить не можетъ. Тоны сердца чисты, перебои. t° 39,2—39. 9. Плохо спалъ отъ сильной ломоты въ лучезапястныхъ суставахъ; при давленіи сильная болезненность, правый припухъ. Голеностопные суставы опали, болезненны. Аппетита нѣтъ. 1-ый тонъ въ сердцѣ съ шумомъ, перебои. t° 39,4—39. 10. Спалъ хорошо, ломоты не было. Правый лучезапястный

суставъ и вся кисть припухши, горячи. Кромѣ его болезненны плечевые; коленные только при движеніи. Перебои нѣтъ. t° 39,5—38. 12. Ходить не можетъ. Правая кисть почти нормальна; лѣвая припухши, болезненна. Также болезненны плечевые и локтевые суставы. Шумъ у верхушки сердца съ 1-ымъ тономъ. t° 39,1—37,6. 13. Плохо спалъ. Ночью была сильная ломота въ лѣвомъ коленномъ и тазобедренныхъ суставахъ, въ 1-омъ небольшая припухлость; теперь въ нихъ же, а также въ голеностопныхъ боль при движеніи и давленіи. t° 38,6—38. 14. Спалъ хорошо; ломоты не было и теперь нѣтъ. Боль при давленіи и движеніи въ голеностопныхъ, локтевыхъ и плечевыхъ суставахъ. t° 38—38,2. 15. Боль при давленіи въ правомъ коленномъ (оно горяче лѣваго) и лопаткахъ; другіе суставы не болезненны. t° 37,3—37,5. 16. Тоже. t° 37,3—36,9. 17. Небольшая боль при давленіи и движеніи въ локтевыхъ суставахъ. Другіе нормальны; ходитъ свободно. Хвойникъ оставить. 18. Тоже. Ванна. 19. Чувствуетъ себя здоровымъ. Суставы нормальны. Выписанъ на 18-й день болѣзни. Пульсъ 84 въ минуту 6 декабря, 88—8 го; отсюда постепенно вмѣстѣ съ утренними послабленіями температуры падалъ и достигъ 60 къ 16 декабря. Число дыханій соответственно пульсу вначалѣ было 24—26 въ минуту, затѣмъ 22—24. Количество мочи 700 кс. за 9 декабря, 1150 кс. за 11—16 декабря, 1450 кс. за 17-ое и 1600 кс. за 19 декабря. Больной почти всѣ ночи при высокой температурѣ потѣлъ; съ 16 декабря не потѣлъ. Кровяное давленіе въ лѣвой лучевой артеріи колебалось отъ 150 до 170 mm. Видъ сфигмограммы существенно не мѣнялся.

Б. 3 случая подостраго суставнаго ревматизма; леченіе хвойникомъ.

LXXIX. Мѣщанинъ Михаилъ Р. 15 лѣтъ, торговецъ. Поступилъ 9 ноября, выписанъ 6 декабря 1894 года. 9 ноября. 3 мѣсяца назадъ лежалъ здѣсь же съ острымъ сочленовнымъ ревматизмомъ; съ тѣхъ поръ долго была ломота въ суставахъ, последнее время боль появлялась временами. Теперь болезненны суставы плечевые, локтевые, лучезапястные, голеностопные; очертанія ихъ не мѣнялись. Назначены порошки салициловаго натра по 0,5 4 въ день. 16. Со времени поступленія облегченія не чувствуетъ. Тѣ же болѣ. Голеностопные суставы припухши, другіе безъ рѣзкихъ мѣненій. Салициловый натръ оставить. Температура за это время была нормальна (36,8—

37,2). Сердце нормально. 17. Боли при движении и давлении в локтевых, лучезапястных, плечевых, голеностопных суставах, в позвоночнике. 18. Тоже. t° 37,2—37,4. Назначено infuso-decoctum ephedrae из 40,0 на сутки. 19. Боли по старому. t° 36,7—37,6. 20. Со вчерашнего вечера сильная головная боль, была тошнота, рвало, всю ночь знобь и жарь попеременно без пота. Боли по старому. Лицо красно. Зрачки равномерно расширены (по 7 mm). Аппетит пропал. t° 39,9—39. Хвойник оставить. Ванна. Валериановы капли. 21. Голова болит меньше; плохо спал. В суставах боль по старому; прибавилась в правом тазобедренном суставе при движении. Зрачки по 5 mm. t° 38—37,9. 22. Голова почти не болит; зрачки по $3\frac{1}{2}$ mm. Аппетит лучше. Суставы болят при движениях по старому. t° 37,4—37,5. Валериану оставить. Infuso-decoctum ephedrae из 20,0 на сутки. 23. В лучезапястных суставах боль при давлении меньше. Появилась боль при движении и давлении в пальцевых суставах правой кисти; в других мѣстах по старому. Голова болит немного. С 20 числа каждый вечер знобит, не потѣет. t° 37,3—38,1. 24. Зрачки равномерны по 5 mm. Плохо спал. В позвоночнике боль хуже, в тазобедренном суставе меньше; в остальных по старому. Голова болит сильнее. t° 37,6—38. Хвойник оставить. Ванна. 25. В руках боли нѣтъ кромѣ одного сустава праваго указательнаго пальца. В плечевых, голеностопных суставах и спинѣ боль. Головная боль продолжается. Зрачки по 4 mm. Валериановы капли. t° 37,9—38,5. 26. Вчера знобило, голова болит меньше. Спал плохо, суставы по старому. t° 37,2—37,6. Капли оставить. 1 порошок в день сѣрнокислога хинина по 0,6. 27. Головная боль и озноб меньше. В плечевых суставах боль меньше. Ванна. Растираніе летучей мазью. 28. В спинѣ, плечевых и лѣвомъ локтѣ боль меньше. Другіе суставы нормальны. Ванна. 29. Спять хорошо, голова немного еще болит. Боль в спинѣ меньше. Появилась боль в поясницѣ. Йодистый калий 2,0 на сутки. 30. Плохо спал; шумъ и боль в головѣ. Насморкъ. Ванна. Йодистый калий съ бромистымъ натромъ по 2,0 на сутки. Хининъ оставить. 1. Спалъ хорошо, голова мало болить. Боли меньше. 2 и 3. Чувствуетъ себя лучше. 4. Голова не болить. В поясницѣ боли нѣтъ; в спинѣ и плечевыхъ суставахъ меньше. 5. Боли почти нѣтъ. 6. Спять хорошо.

Зрачки по $3\frac{1}{2}$ mm. Болей нигдѣ нѣтъ. Выписанъ здоровымъ. Температура съ 27 ноября дала одно повышеніе до 38 (29 часа), медленно упала до 36,8; вечеромъ 4 декабря опять повышеніе до 38, на другой день нормальна. Пульсъ 64—68 17 и 18 ноября, участился до 140 в минуту 20 ноября, къ 22-ому упалъ 68. Число дыханій 22—24 в минуту дошло до 26—20 ноября. Количество мочи держалось на 1800 кс.—2100 кс. за 17—19 ноября, 20 ноября упало до 800 кс.; отсюда медленно поднялось до 1500 кс. 23-го и до 1800 кс. 27 ноября. Больной никогда не потѣлъ. Кровяное давленіе в лѣвой лучевой артеріи колебалось отъ 80 до 100 mm., 20 ноября поднялось до 125 mm. Пульсъ принялъ скачущій характеръ того же числа.

LXXX. Крестьянинъ Александръ В., 50 лѣтъ, кистейникъ. Поступилъ 10 ноября, выписанъ 2 декабря 1894 года. Нѣсколько разъ перенесъ суставной ревматизмъ, послѣдній разъ лежалъ въ октябрѣ этого года. 10. Теперь боленъ 3 дня. Боль постоянная во всѣхъ суставахъ рукъ и ногъ; при давлении и движении боль усиливается. Рѣзкихъ измѣненій нѣтъ; болѣе припухли голеностопные суставы у внутреннихъ лодыжекъ. Сердце нормально. Запоръ 2 дня. Первые 2 ночи потѣлъ и спалъ; эту ночь не спалъ и не потѣлъ. Трианіе рукъ и ногъ (больной алкоголикъ). Зрачки равномерны по 4 mm. (разсѣянный свѣтъ). t° 36,7—36,5. Кастороваго масла 30,0. Алтейный отваръ. Мясная порція. 11. Не спалъ ночь. Сильная боль в лучезапястныхъ и коленныхъ суставахъ; первые порядочно припухли, особенно лѣвый. Зрачки по $3\frac{1}{2}$ mm. Отваръ оставить. Infuso-decoctum ephedrae из 40,0 на сутки. t° 37,8—38,6. 12. Плохо спалъ; боль в шее; в груди тяжесть при дыханіи. Боли нѣсколько меньше; лѣвый лучезапястный суставъ красенъ. Потѣлъ всю ночь. t° 37,8—37,3. 13. Ночью болѣлъ лѣвый голеностопный суставъ. Теперь при покоѣ боль в ручныхъ суставахъ; при давлении в лѣвомъ коленномъ, в правомъ только при движении. В лучезапястныхъ суставахъ боль по старому, опухоль опала. Боль при глотаніи. Стула нѣтъ 2 дня. Смазываніе глотки. t° 37,4—37,8. 14. При покоѣ боли нѣтъ кромѣ кистей рукъ, гдѣ постоянное колотье; опухли нѣтъ. При давлении и движении боль в лѣвомъ голеностопномъ, коленныхъ, плечевыхъ, лучезапястныхъ суставахъ. Ходить не можетъ.

Стулъ былъ. t° 37,1—37,5. 15. При покоѣ боль въ пальцевыхъ суставахъ лѣвой кисти; ночью здѣсь была сильная ломота. Плохо спать. t° 37,3—37,5. 16. При покоѣ боли нѣтъ. При движеніи и давленіи въ лучезапестныхъ и голеностопныхъ. Ходить очень трудно. Сердце нормально. t° 38—37,2. 17. Немного ноютъ лучезапестные и голеностопные суставы. t° 36,5—36,7. 18. Боль при давленіи въ голеностопныхъ суставахъ, остальные нормальны. Послѣ ходьбы слабость въ ногахъ. 19. Тоже. Хвойникъ оставить. 20. По вечерамъ немного ноютъ суставы. Ванна. 21. Слабость въ рукахъ и ногахъ. 22. Чувствуетъ себя хуже. Ночью сильно ныли колѣни. Боль при движеніи и давленіи въ колѣнныхъ, голеностопныхъ, лѣвомъ локтевомъ и лучезапестномъ. Плохо спать. Назначено *inf-decoctum ephedrae* изъ 40,0 на сутки. 23. Ломота была нѣсколько меньше. Лѣвый лучезапестный горячъ, болѣзненъ. 24. Тоже. 25. Ломота ночью и теперь меньше. Лѣвые локтевой, лучезапестный, колѣнный и голеностопный нѣсколько болѣзненны. 26. Тоже 27. Ночью ломило лѣвое колѣно. Лѣвая кисть болѣзненна при давленіи. Вчера вечеромъ была тошнота и тяжесть подъ ложечкой. 28. Ломоты почти не было. При давленіи и движеніи нигдѣ болей нѣтъ. Тяжесть въ головѣ. Хвойникъ оставить. 29. Головная боль, шумъ и звонъ въ головѣ. Болей въ суставахъ нѣтъ. Ванна. 30. Головъ легче. 1. Послѣ ходьбы тинущее ощущеніе въ колѣнныхъ сгибахъ и слабость въ ногахъ. 2. Выписанъ на 25-й день болѣзни. Температура съ 17 ноября нормальна. Пульсъ 80 въ минуту 10 ноября, по 108—111 и 12-го; отсюда постепенно упалъ до 52 къ 18 ноября и колебался отъ 52 до 60. Число дыханій 20—22 въ минуту во время лихорадочной температуры и 14—18 съ 17 ноября. Количество мочи по 1300 кс. за 12—14 ноября, увеличилось до 2200 кс. къ 17-ому ноября, уменьшилось до 2000 кс. къ 21-ому и до 1400 кс. къ 29 ноября. При лихорадочной температурѣ больной нѣсколько потѣлъ по ночамъ, при нормальной не потѣлъ. Кровяное давленіе въ лѣвой лучевой артеріи колебалось отъ 180 до 190 mm.; сфигмограмма существенно не мѣняла своего вида.

LXXXI. Крестьянинъ Александръ С. 15 лѣтъ. Поступилъ 20 ноября, выписанъ 5 декабря 1894 года. 20. Прежде никогда не хворалъ. Теперь боленъ съ недѣлю. Сначала болѣлъ и былъ припухши лѣвый колѣнный суставъ, теперь онъ нор-

малентъ. Теперь поражены правые колѣнный и голеностопный суставы, они припухли, горячи, красны, болѣзненны при давленіи и движеніи; при покоѣ боль временами. Сердце нормально. Зрачки равномерны по $4\frac{1}{2}$ mm. (разсѣянный свѣтъ). t° 37,8. Отваръ алтейный. Мясная порція. 21. Спать хорошо, не потѣлъ. Ломоты не было. Краснота и жаръ исчезли съ пораженныхъ суставовъ. t° 37,5—36,8. 22. Ночью сильно ломило правое колѣно, теперь оно болѣзненно при давленіи и движеніи; правый голеностопный суставъ болѣзненъ, припухши. Сильно потѣлъ ночью. t° 36,7—36,8. Назначено *inf-decoctum ephedrae* изъ 40,0 на сутки. 23. Спать хорошо, немного потѣлъ. Правые колѣнный и голеностопный суставы не болятъ. Лѣвые колѣнный и голеностопный суставы болѣзненны при давленіи и движеніи; очертанія ихъ мало измѣнены. 25. Сильно ломило ночью лѣвое колѣно; опухоль его увеличилась. Другіе суставы нормальны (правый голеностопный еще припухши). Зрачки по 6 mm. 26. Ломота ночью была меньше. Боль при давленіи и движеніи въ лѣвомъ колѣнѣ. 27. Ночью колѣно не болѣло, болѣзненно при давленіи. Заболѣлъ опять правый голеностопный суставъ. Зрачки по $6\frac{1}{2}$ mm. 28. Правый голеностопный суставъ покраснѣлъ, горячъ, болѣзненъ; лѣвое колѣно по старому. 29. Тоже. 30. Тоже. Хвойникъ оставить. 1 декабря. Боли при давленіи и движеніи въ правомъ голеностопномъ и лѣвомъ колѣнномъ суставахъ меньше. Ванна. 2. Ночью была неоольшая ломота. Днем по старому. Иодистый калий 4,0 на сутки. 3. Ломоты нигдѣ нѣтъ. Колѣнный и голеностопный суставы нормальны. Больно ступать на пятки. Растираніе ихъ летучею мазью. 4. Опять боль при давленіи и хожденіи въ правомъ колѣнѣ. Головная боль, насморкъ. 5. Болей нигдѣ нѣтъ. Выписанъ на 22-ой день болѣзни. Температура съ 22 ноября нормальна, колебалась отъ 36 до 37. Пульсъ колебался отъ 56 до 64 въ минуту. Число дыханій было 20—24 въ минуту. Количество мочи 1700 кс. за 22 ноября, 1550 кс. за 24 е, 2200 кс. за 27 ноября и 2800 кс. за 28-е; 29 ноября опять уменьшеніе—1900 кс. Большой потѣлъ при паденіи температуры (до назначенія хвойника) и немного 2 слѣдующія ночи (при хвойникѣ). Кровяное давленіе въ лѣвой лучевой артеріи колебалось отъ 70 mm. до 100 mm. Видъ сфигмограммы былъ все время одинъ и тотъ же.

В. Случай острого суставного ревматизма безъ лечения.

LXXXII. Крестьянинъ Демадъ С. 17 лѣтъ. Раньше ничѣмъ не хворалъ. Поступилъ 5 ноября, выписанъ 12 ноября 1894 года. 5. Боленъ 3 дня. При движеніи и давленіи боль въ правомъ колѣнномъ и голеностопномъ и лѣвомъ колѣнномъ суставахъ. Голеностопный суставъ припухши, колѣни мало измѣнены. Границы сердца нормальны; 1-ый тонъ сопровождается шумомъ. т° 38,6. Алтѣйный отваръ. Мясная порція. 6. Боли по старому. Ходить съ трудомъ. т° 38—38,3. 7. Боли при движеніи нѣтъ. Небольшая боль при давленіи въ правомъ голеностопномъ суставѣ, припухлость его держится, краснота и жара нѣтъ. Колѣни нѣсколько затрудняютъ ходьбу. т° 36,9—37,6. 8. Болей нигдѣ нѣтъ при давленіи и движеніи. Опухоль опала. т° 36,6—36,8. 9. Чувствуетъ себя здоровымъ. Въ сердцѣ шумъ по старому, временами перебои. 10. Перебои нѣтъ. Отваръ оставить. 12. Здоровъ. Въ сердцѣ шумъ. Выписанъ на 10-ый день болѣзни. Температура съ 8 ноября нормальна. Пульсъ 64 въ минуту 6 ноября, упалъ до 44 къ 10 ноября. Число дыханій 24 въ минуту 6 ноября, 16—7 и 8-го; 22—10 и 11 ноября. Количество мочи 2150 кс. за 6 ноября, 1900 кс. за 7-ое, 2700 кс. въ день паденія температуры (8) и 2000 кс. за 9 ноября. При высокой температурѣ большой потѣлъ по ночамъ. Кровяное давленіе въ правой лучевой артеріи колебалось отъ 100 до 120 mm. Видъ сфигмограммы не мѣнялся.

Г. 2 случая острого суставного ревматизма; лечение салициловымъ натромъ.

LXXXIII. Крестьянинъ Василій В. 37 лѣтъ, поденщикъ. Поступилъ 19 декабря 1894 года, выписанъ 31 декабря того же года. Лежалъ острымъ суставнымъ ревматизмомъ въ этой же больницѣ, выписанъ вначалѣ декабря. Суставы колѣнные припухши и болѣзненны. 1-ый тонъ у верхушки сердца нечистый. Ванна въ 28° R. Салициловый натръ 6,0 на сутки въ микстурѣ. т° 38,6—39. 20. Небольшая припухлость въ лѣвыхъ локтевомъ и лучезапястномъ суставахъ. Ломота и рѣзкая чувствительность къ давленію во всѣхъ остальныхъ. У верхушки сердца 1-ый шумъ; акцентъ на 2-омъ тонѣ легочной артеріи. Ванна 30°. т° 37,6—38,9. 21. Лѣвый лучезапястный и правый колѣнный суставы припухли больше. Боли и чувствительность къ давленію во всѣхъ остальныхъ. Порошки салицилового натра (по 1,5) 4 въ день. Ванна 30° R. т° 37,9—39. 22. Въ лѣвомъ лучезапястномъ суставѣ опухоль исчезла, появилась

въ правомъ при сильныхъ боляхъ. Ванна. Компрессъ на лучезапястные суставы. т° 37,8—38,4. 23. Боли стихли. Припухлость праваго лучезапястного, лѣваго колѣннаго и голеностопныхъ суставовъ. Ванна. т° 38—38,4. 24. Припухлости суставовъ нигдѣ нѣтъ. Чувствительность къ давленію почти во всѣхъ суставахъ. т° 38—38,4. 25. Припухлости и болей нѣтъ. т° 37—37,4. 26. Незначительная болѣзненность въ голеностопныхъ и локтевыхъ суставахъ. 27, 28, 29 и 30 здоровъ. Въ сердцѣ шумъ по старому. Температура рѣзко пала на 7-ой день, затѣмъ была нормальна. Выписанъ на 12-ый день со дня поступленія въ больницу.

LXXIV. Сергѣй И. 20 лѣтъ, ремесленникъ. Поступилъ 23 декабря 1894 года, выписанъ 3 января 1895 года. Лежалъ съ 23 ноября по 6 декабря этого года съ тѣмъ же. 23. Боленъ 5-ый день. Оба голеностопные, колѣнные, плечевые, лѣвый локтевой и лучезапястный суставы припухли, очень болѣзненны. Сердце нормально. т° 38,8—38. 3 порошковъ въ день салицилового натра по 0,6. 24. Рѣзкая припухлость обоихъ лучезапястныхъ, небольшая праваго колѣннаго сустава. Боли въ голеностопныхъ, локтевыхъ, правомъ тазобедренномъ суставѣ. Сердце нормально. т° 38,7—38,9. 4 порошка въ день по 1,5. Ванна 30° R. Согрѣвающие компрессы на лучезапястные суставы. 25. Припухлость меньше, боли проходятъ. т° 37,8—37,6. 26. Припухлость исчезла. Нигдѣ никакихъ болей. Самочувствіе хорошее. Шумъ въ ухахъ. 3 порошка въ день. Ванна 30° R. т° 36,8—37. 27. Здоровъ. 2 порошка въ день. 28 и 29. Тоже. 30. Небольшая ломота въ правомъ плечевомъ суставѣ. Температура рѣзко пала на 7-ой, окончательно на 8-ой день болѣзни; далѣе была нормальна. Выписанъ здоровымъ на 16-ый день болѣзни.

Д. 4 случая хроническаго суставного ревматизма; лечение хвойникомъ.

LXXXV. Мѣщанинъ Яковъ Л. 19 лѣтъ, папирсникъ. Поступилъ въ больницу 11 іюля 1894 года. 11. Боль во всѣхъ суставахъ. 3 порошка салицилового натра по 0,3 въ день. 17. Въ правомъ колѣнѣ хрустъ. 19. Боль въ колѣнныхъ суставахъ больше. 20—29. Тоже. 5 августа. Назначенъ іодистый калий съ салициловымъ натромъ аа по 2,0 на сутки. 7. Опухоль праваго колѣна безъ измѣненія. 12. Боль въ правомъ колѣнномъ и обоихъ голеностопныхъ суставахъ при умѣ-

ренной припухлости ихъ. Йодистый калий 3,0 на сутки. Ванна. Согревающие компрессы и смазывания йодомъ суставовъ. 15. Боль въ лѣвомъ колѣнѣ. Боли въ голеностопныхъ суставахъ меньше; припухъ большой палецъ правой стопы. 20. Лѣвое колѣно сильнѣе припухло. Появилась боль въ обѣихъ локтяхъ. На лѣвое колѣно наложена неподвижная повязка. Далѣе тѣ же боли, усиливаясь въ однихъ, уменьшаясь въ другихъ суставахъ при самомъ разнообразномъ противоревматическомъ леченіи (антипиринъ, фенацетинъ, салолъ, салипиринъ, аконитъ); суставы колѣнные, голеностопные и локтевые при характерныхъ измѣненіяхъ въ нихъ неизмѣнно поражены. 5 октября. (Мои наблюденія). При покоѣ боли въ правомъ колѣнѣ, при движеніи въ голеностопныхъ суставахъ; послѣдніе измѣнены въ очертаніяхъ. Спать хорошо, стулъ нормальный. Ванна. Алтейный отваръ. 7. Боли въ лѣвомъ колѣнѣ и правомъ плечевомъ суставѣ усилились; появилась боль въ лѣвомъ плечевомъ суставѣ. 8. Тоже. Ванна. 9. Ломота въ правомъ колѣнѣ усилилась, при движеніи въ немъ хрустѣ. 11. Въ плечевыхъ суставахъ боли почти нѣтъ; въ другихъ суставахъ ломота меньше. Ванна. 12. При покоѣ нигдѣ нѣтъ болей; при движеніи боли меньше. Недѣли три не было такого облегченія. Правый колѣнный и голеностопные суставы измѣнены по старому. 14. Опять боли въ пораженныхъ суставахъ. Алтейный отваръ оставить. Назначено *infuso-decoctum erhedrae* изъ 15,0 на сутки. 17. Появилась боль при давленіи по бокамъ правой колѣнной чашки, чего давно не было. При покоѣ боль въ правомъ голеностопномъ суставѣ. Вообще чувствуетъ себя хуже. 18. Въ колѣнныхъ, голеностопныхъ, локтевыхъ и лучезапястныхъ суставахъ боли усилились; въ правомъ лучезапястномъ суставѣ припухлость увеличилась. 19. Тоже. Назначено *infuso-decoctum* изъ 20,0 на сутки. 21. Въ правомъ колѣнѣ боль усилилась. Появилась боль въ области грудины. 24. При покоѣ боли нѣтъ; движеніе въ правомъ колѣнѣ труднѣе. Правый лучезапястный суставъ припухъ сильнѣе. 26. Появилась ломота въ верхней части правой голени. 27 и 28. Тоже. 29—31. Ходить съ большимъ трудомъ; боли по старому. 1 ноября. Ломоты въ колѣняхъ нѣтъ, ходить легче. Локти болятъ по старому. *Infuso-decoctum erhedrae* изъ 30,0 на сутки. 2. Въ лѣвомъ локтевомъ и правомъ лучезапястномъ суставахъ

сильная боль ночью. 3. Сильная ломота была ночью въ правомъ колѣнѣ. 4. Въ правомъ голеностопномъ суставѣ боль сильнѣе, припухлость по старому. Ходить трудно. Сегодня ночью сильно потѣлъ (потъ бывалъ вначалѣ болѣзни). По вечерамъ бываетъ боль въ вискахъ. 5. Потѣлъ не такъ сильно. Колѣно немного ноетъ; при движеніи и давленіи боли по старому въ тѣхъ же суставахъ 6. Чувствуетъ себя лучше, боль при хожденіи только временами. Правая кисть немного болитъ ночью. Потѣлъ несильно. *Infuso-decoctum* оставить. 7. Боль усилилась въ колѣняхъ и правомъ локтѣ; движенія праваго колѣна свободнѣе. Немного потѣлъ. Ванна. 8. Ходить легче. Боли въ колѣняхъ меньше; въ лѣвомъ лучезапястномъ и локтевыхъ суставахъ боль усилилась. 9. Назначено *infuso-decoctum erhedrae* изъ 40,0 на сутки. 10. Ходить свободно; въ колѣняхъ незначительная боль при движеніи и давленіи. Въ правомъ локтевомъ суставѣ припухлость и ломота ночью. Не потѣеть. 11. Ходить труднѣе, опять боль въ правомъ колѣнѣ. 12. Ночью болѣла лѣвая кисть и лѣвое колѣно. При давленіи боль въ обѣихъ колѣнныхъ и голеностопныхъ суставахъ. Хрустѣ въ правомъ колѣнѣ и опухоль праваго локтя по старому. 15. Появилась боль въ большомъ пальцѣ правой кисти; боль и опухоль на 9-омъ ребрѣ по лѣвой сосковой линіи. *Infuso-decoctum* оставить. 16. Сильная боль въ локтевыхъ и лучезапястныхъ суставахъ при движеніи и давленіи. Колѣно болитъ при хожденіи; хрустѣ въ немъ по старому. Появилась воючая течъ изъ праваго уха (годъ не было течъ изъ уха). 20. Чувствуетъ себя хуже. Боль въ правомъ колѣнѣ и правой пяткѣ при хожденіи. Сильная течъ изъ уха. 23. Ночью ломило лучезапястные суставы, теперь болѣзненные при давленіи. Правый локоть по старому. Хрустѣ въ правомъ колѣнѣ меньше. Порошки салициловаго натра по 0,6 4 въ день. Летучая мазь для растиранія. 24. Боли въ правомъ колѣнѣ сильнѣе при движеніяхъ. 25. Ночью ломило все суставы. Въ правомъ локтѣ припухлость и боль сильнѣе. 6 порошокъ салициловаго натра по 1,0. 26. Шумъ въ головѣ. Ночью была ломота въ правомъ колѣнѣ и локтѣ. 27. Ночью ломоты не было. Правый локоть болятъ при давленіи. 28. Боль при давленіи и опухоль меньше. 29. Назначенъ йодистый калий по 3,0 на сутки. 30. Ломоты нѣтъ. Въ колѣнѣ боль меньше, въ локтѣ по старому. Течъ изъ уха сильнѣе. 1 декабря. Колѣно сгибается легче,

ломоты не было. Жидкий стулъ, боль въ животѣ. 3. Ломило правый локоть, опухоль безъ измѣненія. (Иодистаго калия не принималъ вчера). 6. Иодистый калий 6,0 на сутки. 8. Ломоты нѣтъ; ходить легче; хрусть въ правомъ колѣнѣ небольшой; локоть по старому. 14. Тоже. 18. Боль при давленіи и опухоль въ правомъ локтѣ уменьшились. 20. Правое коѣно сгибается свободно, не болитъ, хруститъ очень мало. Стулъ жидкий. Температура со дня поступления больного была нормальна и колебалась отъ 36,5 до 37,5. Раза два за все это время было вечернее повышение до 37,8. Пульсъ вначалѣ колебался отъ 64 до 72 въ минуту; съ 20 октября (послѣ назначенія хвойника) колебался отъ 70 до 80 въ минуту. Число дыханій постоянно колебалось отъ 20 до 25 въ минуту. Количество мочи за сутки съ 21 по 27 октября постепенно увеличивалось (съ 1300 кс. до 1800 кс.), а затѣмъ уменьшалось до 1000 кс. (15 ноября). Больной потѣлъ нѣсколько ночей во время пріемовъ настое-отвара изъ 30,0 хвойника. Зрачки, измѣряемые въ темной комнатѣ при искусственномъ освѣщеніи были равномѣрны по 6 мм. 14, 15, 17, 19, 22 и 24 Октября и по 6½ мм. въ діаметрѣ 28 и 30 октября, 2, 5 и 12 ноября. Кровяное давленіе въ лѣвой лучевой артеріи колебалось отъ 80 до 100 мм. Видъ сфигмограммы постоянно былъ одинъ и тотъ же. Больной и послѣ моихъ наблюденій долго не могъ отдѣлаться отъ болей въ суставахъ. При моемъ посѣщеніи больницы 27 января онъ еще лежалъ тамъ.

ЕХХХVІ. Крестьянинъ Григорій Т. 33 лѣтъ, плотникъ. Поступилъ 22 сентября, выписанъ 20 декабря 1894 года. Боленъ болѣе двухъ мѣсяцевъ; началось съ опухоли голеностопныхъ и колѣнныхъ суставовъ и боли въ нихъ. 22 сентября. Боли въ лѣвомъ голеностопномъ суставѣ и пяткѣ, около наружнаго мыщелка припухлость; кромѣ того ломота въ колѣнныхъ и плечевыхъ суставахъ; въ нихъ замѣтныхъ измѣненій нѣтъ. Ходить съ трудомъ. Въ другихъ отношеніяхъ здоровъ. Назначенъ иодистый калий 3,0 на сутки; согревающие компрессы. Ванна 30 R. 25—26. Боли меньше. 29. Ломота въ лѣвомъ колѣнномъ и голеностопномъ суставахъ. 1 октября. Лѣвый голеностопный суставъ больше припухъ. Порошки салолы. 4. Боль въ колѣнѣ и пяткѣ меньше. 5. (Мои наблюденія). Сильная ломота ночью, днемъ боль при ходженіи и давленіи въ лѣвомъ колѣнѣ и голеностопномъ суставѣ. Оставить салолъ.

Назначено 3 порошка въ день хлористаго аммонія по 0,2. Ванна. 6. Ночью были боли сильнѣе, появились въ крестцѣ (прежде не бывало). Ходить съ костылемъ. 7 и 8. Тоже. 9. Боль сегодня меньше, спать удовлетворительно. Ванна. 10. Появилась ломота и припухлость въ пальцевястныхъ суставахъ правой кисти. 11. Ломота ночью сильнѣе чѣмъ послѣднее время; припухлость лѣваго голеностопнаго сустава увеличилась. Боль въ колѣняхъ усилилась при движеніи. Ванна. 13. Ночью сильно ломило правое колѣно. Лѣвое колѣно и голеностопный суставъ болѣзненны при давленіи. Смазать іодомъ колѣнные суставы. 14. Ночью ломота была меньше. Порошки оставить. Назначенъ infuso-decoctum erhedrae изъ 15,0 на сутки. Вечеромъ этого дня въ 6 часовъ сдѣлана больному по ошибкѣ ванна въ 30 R. 15. Ночью болей совсѣмъ не было, спать хорошо. Почувствовалъ облегченіе вчера въ 7 часовъ вечера, когда сильно потѣлъ. 16. Появилась постоянная боль и краснота въ пальцевястныхъ суставахъ правой кисти. 17. Появилась боль въ поясницѣ. Трудно сгибать лѣвое колѣно, припухлость въ немъ держится по старому; при наступаніи боль въ лѣвой пяткѣ. 19. Болей въ колѣнѣ нѣтъ, ходить свободно. Боль при наступаніи на пятку и припухлость въ лѣвомъ голеностопномъ суставѣ по старому. Infuso-decoctum erhedrae изъ 20,0 на сутки. 20. Ночью сильно рвало пальцевястные суставы правой кисти и лѣвый голеностопный суставъ. 21. Опять припухлость и боль лѣвой колѣнной чашки. 22 и 23. Ночью сильная ломота въ лѣвомъ колѣнномъ и голеностопномъ суставахъ; припухлость послѣдняго увеличилась. 24. Ломота меньше. 25. Сильно ломило лѣвое колѣно, опухоль увеличилась; въ голеностопномъ суставѣ боль и опухоль меньше. Опухоль и боль при движеніи въ правой кисти по прежнему. Плохо спать. 26. Ночью сильно ломило колѣно; боль въ пяткѣ усилилась, не даетъ ступать. 28, 29 и 30. Тоже самое. Спать плохо. 1 ноября. Сильно рветъ правые пальцевястные суставы. Назначено infuso-decoctum erhedrae изъ 30,0 на сутки. 2. Ночью очень сильная боль въ колѣнѣ, на пятку совсѣмъ не можетъ становиться; рука по прежнему. 3 и 4. Болей въ колѣнѣ нѣтъ, въ рукѣ по прежнему. 5. Сильно потѣлъ ночью. Затрудненіе при движеніи въ колѣнѣ и пяткѣ меньше, ходить безъ костыля. Въ пальцевястныхъ суставахъ опухоль ошала, боль только при давленіи. 6. Ходить опять труднѣе. Infuso-

decoctum оставить. 7. Боль при ходьбѣ небольшая. 8. Спать плохо, сильно болѣла правая кисть, опухоль увеличилась. 9. Тоже, infuso-decoctum erhedrae изъ 40,0 на сутки. 10. Въ рукѣ опухоль меньше и боль ничтожная; ходить безъ костыля; опухоль лѣваго голеностопнаго сустава опала. 11. Спать плохо. Ночью болѣла голова и появилась боль и краснота въ лѣвомъ колѣнѣ. Въ рукѣ опухоль держится, боли при давленіи нѣтъ. 12. Вчера вечеромъ сильно болѣла голова, рвало зеленою. 13. Сегодня ночью была боль въ обоихъ колѣнныхъ суставахъ, лѣвый припухъ; оба болѣзненны при давленіи. Въ голеностопномъ (лѣвомъ) опухоль и боль усилились. Ходить съ большимъ трудомъ съ костылемъ. 14. Появилась боль въ плюсну лѣвой стопы. 15. Ночью сильная ломота въ колѣнѣ; сильная боль въ пяткѣ. Оставить inf-decoctum. 16. Плохо спать отъ боли. 6 порошковъ салициловаго натра по 1,0. 17. Чувствуетъ себя хорошо. Ночью не ломило и сейчасъ нѣтъ боли. Припухлость колѣна и голеностопнаго сустава уменьшилась. Ходить безъ костыля. 18. Тоже. 4 порошка въ день. 20. Боль въ колѣнѣ при движеніи. 21. Колѣно сильно ломило ночью. Опухоль въ рукѣ усилилась. 6 порошковъ салициловаго натра (таже доза). 22 и 23. Ломоты нѣтъ. 24. Опухоль въ колѣнѣ и голеностопномъ суставѣ усилилась. Оставить порошки. Подъ вліяніемъ 10 порошковъ въ день салолы по 1,0 боли исчезли, движенія сдѣлались безболѣзненными. 8-го декабря. Боль въ лѣвомъ колѣнѣ при движеніи, въ лѣвой пяткѣ при наступаніи. Назначенъ іодистый калий 4,0 на сутки съ бромистымъ аммоніемъ 2,0 на сутки. 10. Легче. 11. Ходить безъ костыля. Опухоль лѣваго голеностопнаго сустава исчезла, на пятку наступать свободно. 16. Въ колѣнѣ болѣе при давленіи нѣтъ. Поправляется. 18. Небольшая боль въ пяткѣ при ходьбѣ. Іодистая сыпь. 20. Выписанъ почти совершенно здоровымъ. Температура за все время лежанія больного колебалась отъ 36,5 до 37,5. Только разъ послѣ назначенія отвара хвойника изъ 30,0 больной сильно потѣлъ, а на другой день вечеромъ температура поднялась до 38. Пульсъ все время держался на 60 въ минуту; только 2 раза поднялся до 70 (вскорѣ послѣ назначенія хвойника). Число дыханій держалось на 18—20 въ минуту. Количество мочи 1800—1900 кс. за 18—23 октября, увеличилось къ 27 октября до 2600 кс., затѣмъ колебалось около 2000 кс. за сутки и 12-го ноября опять увеличилось до

2600 кс. Больной потѣлъ только 2 раза въ вышеупомянутыхъ случаяхъ. Зрачки, измѣряемые при искусственномъ освѣщеніи, все время леченія хвойникомъ были равномѣрны по 5 mm. въ діаметрѣ. Кровяное давленіе въ правой лучевой артерій было всегда 125—128 mm. Видъ сфигмограммы не мѣнялся.

LXXXVII. Крестьянинъ Михаилъ П. 39 лѣтъ, огородникъ. Поступилъ 12-го ноября, выписанъ 10-го декабря 1894 года. 12-го ноября. Боленъ недѣлю. Вначалѣ была опухоль лѣваго плечеваго сустава довольно рѣзкая; дня три тому назадъ она опала подъ вліяніемъ смазыванія іодомъ. Боли отъ начала болѣзни не уменьшились. Днемъ боль постоянная, но не сильная; ночью весьма рѣзкая, не даетъ спать. Ни разу не потѣлъ ночью. Отваръ алтейнаго корня. Мясная порція. 13. Ломота ночью въ лѣвомъ плечевомъ суставѣ; теперь боль при давленіи и движеніи. Отваръ оставить. Назначенъ infuso-decoctum erhedrae изъ 30,0 на сутки. 14. Ночью былъ проливной потъ; сильная боль не давала спать. Теперь постоянная ломота въ томъ-же суставѣ, усиливающаяся при давленіи. Infuso-decoctum изъ 40,0 на сутки. 15. Ломота съ вечера прекратилась; ночью сильно потѣлъ, спалъ хорошо. Теперь суставъ постоянно ноетъ; при движеніи и давленіи боль по старому. 16. Тоже. Не потѣлъ. 17. При движеніи и давленіи боль о чѣй сильная. 18. Давленіе менѣе болѣзненно, поднимать руку еще не можетъ. 19. Ночью сильно потѣлъ. При давленіи боли въ плечевомъ суставѣ нѣтъ; движеніе затруднено по прежнему. 20 и 21. Тоже. 22. Нѣсколько поднимаетъ руку, хотя и съ болью. 23. Руку поднимаетъ выше. Ощущеніе жженія въ плечевомъ суставѣ. Infuso-decoctum оставить. 24 и 25. Безъ переменъ. Растираніе плеча летучею мазью и согревающимъ компрессомъ на ночь. 27. Поднимаетъ руку легче. 28. Поднимаетъ руку свободно; при этомъ небольшая боль. 29. Появилась боль при давленіи въ передней части плечеваго сустава. 30. При давленіи боли нѣтъ; жженіе по старому; поднимать руку больно. 1—5. Тоже. Смазываніе плечеваго сустава іодомъ. Ванны. 6. Временами ноетъ плечевой суставъ, поднимаетъ руку съ трудомъ. Іодистый калий 4,0 на сутки. 8. Насморкъ, головная боль. Руку поднимать легче. Оставить іодистый калий. 10. Болѣе въ плечевомъ суставѣ нѣтъ. Здоровъ. Выписанъ на 42-й день болѣзни. Темпера-

тура все время была нормальна (не выше 37,5 вечером). Пульс вначалѣ былъ 90 въ минуту, затѣмъ колебался около 80 и наконецъ дошелъ до 72 въ минуту (23-го ноября). Число дыханій вначалѣ держалось на 20 въ минуту, затѣмъ на 18. Количество мочи 1100 кс. за 12-е ноября, увеличилось до 2300 кс. за 13-е ноября, продержалось такъ съ недѣлю и увеличилось еще до 2500 кс. (19 и 20-го ноября); дальѣ оно постепенно уменьшилось и колебалось отъ 1500 кс. до 2000 кс. за сутки. Кровяное давленіе въ правой лучевой артеріи колебалось отъ 170 до 190 mm. Сфигмограмма не представляла характерныхъ измѣненій. Диаметръ зрачковъ, измѣряемый при разсѣянномъ свѣтѣ, колебался между 5½ mm. и 6 mm.

LXXXVIII. Крестьянинъ Сидоръ Д. 46 лѣтъ, швейцаръ. Поступилъ 30 ноября 1894 года, выписанъ 5 января 1895 г. Въ 1890 году перенесъ острый суставной ревматизмъ, поправился совершенно. Теперь боленъ недѣлю три. Вначалѣ болѣли оба большіе пальца стопъ и правый плечевой суставъ, затѣмъ прибавилась боль въ лѣвомъ колѣнѣ. До сихъ поръ лечился растираніями и порошками салицилового натра. 30 ноября. Лѣвый колѣнный и правые плечевой и голеностопный суставы ломаютъ при покое, боль сильная при давленіи и движеніи, а также произвольно ночью; лѣвое колѣно припухши, другіе суставы не измѣнены. Иногда немного потѣетъ ночью. Сердце нормально. Стулъ и аппетитъ исправны. Отваръ алтейнаго корня. Мясная порція. 1 декабря. Плохо спалъ отъ боли въ поясницѣ. Ходить съ трудомъ. Выѣсто алтейнаго отвара назначенъ *infuso-decoctum ephedrae* изъ 40,0 на сутки. 2. Ночью сильно ломило оба колѣна; опухоль ихъ, особенно лѣваго, увеличилась. Поясница не болитъ. Совсѣмъ не можетъ ходить. Не спалъ ночь. 3. Вчера вечеромъ послѣ большого количества горячаго чая сильно потѣлъ. Въ лѣвомъ колѣнѣ боли почти нѣтъ, опухоль по старому. Сильная боль и припухлость въ правомъ колѣнномъ суставѣ. Возвратилась боль въ большихъ пальцахъ стопъ; правый плечевой суставъ болитъ меньше. 4. Плохо спалъ отъ боли въ лѣвомъ колѣнномъ суставѣ, онъ болѣзненъ при давленіи. 5. Оба колѣнные и правый плечевой суставы сильно болѣли ночью, не давали спать; теперь они ноютъ, сильно болѣзненны при давленіи и движеніи. Ходить еще не можетъ. 6. Ночью ломота была меньше. 7. Сильно ломило большіе пальцы и лѣвое колѣно;

суставы большихъ пальцевъ нѣсколько покраснѣли. 8. Спалъ ночью, ломота была меньше. Припухлость и болѣзненность колѣнныхъ суставовъ по прежнему; правый плечевой суставъ болѣзненъ при движеніи. По вечерамъ бросаетъ больного въ жаръ, пота не бываетъ. Чувствуетъ себя лучше чѣмъ при поступленіи. 9. Ломота продолжается. Ходить не можетъ. 10, 11, 12 и 13. По ночамъ ломота въ тѣхъ же суставахъ, днемъ въ нихъ боль при давленіи. Ходить съ большимъ трудомъ. 14 и 15. Тѣ же боли. Оставить *infuso-decoctum*. 16. Ночью ломоты не было; остальное по старому. 17. Опять ломота ночью въ пораженныхъ суставахъ. Ванна. Лодистый калий и бромистый аммоній по 4,0 на сутки. 18. Ломоты не было ночью. Боли при давленіи и движеніи въ пораженныхъ суставахъ. Послѣ ванны потѣлъ. 19. Тоже. Ночью ломило всѣ пальцы обѣихъ стопъ, теперь они болѣзненны при давленіи и хожденіи. Растираніе суставовъ летучей мазью. Ванна. 20 и 21. Также ломота ночью, днемъ боль при давленіи и хожденіи въ колѣнныхъ суставахъ и большихъ пальцахъ стопъ. Лодистый калий оставить. 6 порошковъ салицилового натра по 1,0. 23. Ночью ломоты не бываетъ. Днемъ ноютъ большіе пальцы стопъ. Колѣни совершенно безболѣзненны, опухоль ихъ спала. Ходить свободно. Выписанъ поправляющимся 5 января на 57-ой день болѣзни. Температура все время была нормальна, не превышая 37,5 вечеромъ. Пульсъ 80 въ минуту при поступленіи, участился до 96 въ минуту ко 2-ому декабря и опять колебался около 80. Число дыханій колебалось отъ 24 до 26 въ минуту. Количество мочи первые дни колебалось отъ 1000 кс. до 1500 кс. за сутки, увеличилось до 2600 кс. къ 5 декабря и до 3000 кс. къ 10 декабря, дальѣ постепенно упало до 2300 кс. къ 15-ому числу. Зрачки измѣрялись нѣсколько разъ при разсѣянномъ свѣтѣ; диаметръ ихъ всегда былъ равенъ 4 mm. Кровяное давленіе въ лѣвой лучевой артеріи колебалось все время отъ 120 до 125 mm. Видъ сфигмограммы существенно не мѣнялся. Большой потѣлъ только одинъ разъ на другой день послѣ назначенія хвойника, выпивъ много чая.

LXXXIX. Е. Полицейскій служитель Савелій Б. 33 лѣтъ. *Rheumatismus articularis et muscularis subacutus*. Поступилъ 13 ноября, выписанъ 3 декабря 1894 года. Боленъ двѣ недѣли болями въ голенахъ. Теперь боль постоянная въ обѣихъ голенахъ и колѣнныхъ суставахъ; при давленіи боль не уси-

ливается, она сильнѣе при движеніи; объективныхъ измѣненій нѣтъ. Въ другихъ отношеніяхъ здоровъ. Мясная порція. Отваръ алтейнаго корня. 15. Боли по старому, спать плохо. Голени сильно зябнуть. 16. Ломота временами; боль отдаетъ въ бедра. Въмѣсто алтейнаго отвара назначенъ infuso-decoctum ephedrae изъ 40,0 на сутки. 17. Вчера вечеромъ бросало въ жаръ ноги, пота не было. Ломота была сегодня утромъ. 18. Утромъ сильно ломило ноги. 20. Вчера вечеромъ ломило правый голеностопный суставъ; въ голенихъ ощущеніе стягиванія ихъ, они холодны на ошупь, ломать временами. 22. Съ утра сильнѣе ломить правую голень. Слабость въ ногахъ при ходьбѣ. 23. Постоянная ломота въ голенихъ и боль въ нихъ при давленіи. Ломило вчера правое колѣно. Спать хорошо, не потѣть. 24. Стрѣляющія боли въ плечевыхъ суставахъ; боль при давленіи не усиливается, объективныхъ измѣненій нѣтъ. Въ голенихъ опять очень сильная ломота, отдающая и въ бедра. 25. Ломота въ лѣвой голени. 26. Ломота не давала спать. Временами боль въ лѣвомъ плечевомъ суставѣ, отдающая въ лѣвый же локоть. 28. Немного ломило лѣвое колѣно. 29. Временами ломить голени и колѣнные суставы. Ломота въ плечевыхъ суставахъ и правомъ лучезапястномъ. При ходьбѣ небольшая боль въ пяткахъ. 30. Вчера вечеромъ потѣлъ послѣ лекарства. Утромъ ломило правое колѣно. Въ плечевыхъ суставахъ ощущеніе стягиванія, при давленіи боли въ нихъ нѣтъ. Чувствуетъ тяжесть въ груди; утромъ болѣла голова. 1. Чувствуетъ себя лучше. Ноги не ломить; при ходьбѣ боль въ правомъ колѣнѣ; въ плечевыхъ суставахъ боли меньше; послѣ ходьбы боль въ пяткахъ. Съ утра познабливаетъ. 2. Утромъ ломота въ мышцахъ праваго бедра. Плечевые суставы безболѣзненны. Колѣнные болятъ вначалѣ при ходьбѣ. Оставить infuso-decoctum. Ванна. 3. Ломоты нѣтъ. Послѣ ходьбы боль въ пяткахъ. Выписанъ на 34-й день болѣзни. Температура все время держалась на 36,6—37. Пульсъ вначалѣ 56 въ минуту, затѣмъ держался на 60 и наконецъ поднялся до 68 въ минуту. Число дыханій соответственно пульсу вначалѣ 18 въ минуту, потомъ 24 и наконецъ 26. Количество мочи съ 1500 кс. (за 14 ноября) увеличилось до 2200 кс. къ 17 ноября, постепенно уменьшилось до 1000 кс. къ 25 ноября, рѣзко увеличилось до 3000 кс. 27 ноября и опять упало до 1500 кс.

29 ноября. Кровяное давленіе въ лѣвой лучевой артеріи было всегда 115—120 mm.; видъ сфигмограммы не мѣнялся.

Ж. Два случая сѣдалищной невралгіи; леченіе хвойникомъ.

ХС. Крестьянинъ Алексѣй Р. 43 лѣтъ, мясникъ. Поступилъ 16 сентября, выписанъ 28 октября 1894 года. 16. Болеетъ 9 дней. Боли на протяженіи лѣваго сѣдалищнаго нерва. Хожденіе затруднено. Подъ вліяніемъ салициловаго натра, затѣмъ салолу, мушекъ и горячихъ ваннъ получилось нѣкоторое уменьшеніе болей и облегченіе хожденія. Къ 4 октября воротилось прежнее состояніе. 5 октября нашелъ слѣдующее. Боли при давленіи по ходу лѣваго сѣдалищнаго нерва. Ломота по старому. Ходить согнувшись. Назначена ванна 29° R. Отваръ алтейнаго корня. 7. Послѣ ванны нѣсколько легче ходить. Ночью ломота въ ногѣ всегда одинакова. Ванна. 10. Ночью боли были сильнѣе, ходить по старому съ трудомъ. Боли въ лѣвомъ голеностопномъ суставѣ; объективныхъ измѣненій нѣтъ. 11. Ломота меньше, спать спокойно. Ходить легче. 13. Постоянная ломота и стрѣляющая боль въ лѣвой ногѣ, ночью очень сильная. Спать плоховато. 14. Отваръ алтейнаго корня оставить. Назначено infuso-decoctum ephedrae изъ 15,0 на сутки. 17. Ломота по старому. Ходить по прежнему, согнувшись. 18. Боли уменьшились. 19. Спать спокойнѣе, боли меньше; ходить по прежнему. Infuso-decoctum изъ 20,0 на сутки. 20. Тоже. 22. Боли усилились, плохо спать. 23. Въ голеностопномъ суставѣ боль сильнѣе; ходить по прежнему, согнувшись. 24. Боль еще сильнѣе. 26. Боли постоянныя въ лѣвой ногѣ. 27. Въ голени боль усилилась, въ бедрѣ по старому. Ходить согнувшись. Оставить infuso-decoctum. 28. Выписанъ по собственному желанію. Температура была все время нормальна. Пульсъ колебался отъ 60 до 70 въ минуту. Число дыханій колебалось отъ 18 до 24 въ минуту. Количество мочи было 2400 кс. за 12 октября, 2100 кс. за 14 октября (день назначенія хвойника), 2800 кс. за 15 октября; далѣе оно постепенно уменьшалось до 2500 кс. за 26 октября. Больной никогда не потѣлъ. Диаметръ зрачковъ, измѣряемыхъ при искусственномъ освѣщеніи, былъ всегда одинъ и тотъ же (4 mm). Кровяное давленіе въ правой лучевой артеріи было всегда 105 mm.; видъ сфигмограммы не мѣнялся.

ХСІ. Крестьянинъ Александръ Д. 30 лѣтъ, городской.

Поступилъ 23 августа 1894 года. Лежить до сихъ поръ. 23 августа. Сильная боль по ходу праваго сѣдалищнаго нерва. Хожденіе весьма затруднено. Въ остальныхъ отношеніяхъ здоровъ. Леченіе салициловымъ натромъ, затѣмъ фенацетиномъ, мушками и ваннами вызвало временное облегченіе. Также мимолетно было дѣйствіе подкожныхъ впрыскиваній антипирива и электризаціи. 5 октября. Боли при давленіи въ мѣстѣ выхода сѣдалищнаго нерва въ правой ягодицѣ; по ходу нерва давленіе не болѣзненно. Ночью сильныя боли по всему протяженію нерва. Ходить согнувшись. Спитъ плохо. Назначены порошки хлористаго аммонія и ванна черезъ день. 8. Боли по старому. 10. Второй день чувствуетъ облегченіе. 13. Боли опять усилились. 14. Назначенъ *infuso-decoctum erhedrae* изъ 15,0 на сутки. Порошки и ванны оставлены. 15. Не спалъ ночь; боли были очень сильныя. 16. Ночью не столь сильная боль, днемъ постоянная рѣзъ по ходу нерва. Кромѣ того боль въ передней поверхности бедра. 17. На спалъ ночь отъ сильной боли въ ногѣ. 18. Тоже. 19. Назначено *infuso-decoctum erhedrae* изъ 20,0 на сутки. 20. Не спалъ отъ боли. 21. Появилась боль въ лѣвой ногѣ. 22 и 23. Тоже. 24. Ходить труднѣе—боль въ правой стопѣ. 25 и 26. Спитъ совсѣмъ плохо. Боли въ обѣихъ ногахъ. 27. Въ лѣвой ногѣ боли нѣтъ; въ правой по прежнему. 28—30. Тѣ же боли. Оставить *infuso-decoctum*. 31. Ходить не можетъ, боль по прежнему. Съ 1 по 22 ноября боли сначала уменьшились отъ большихъ дозъ салициловаго натра, затѣмъ вновь появились послѣ отміяніи порошковъ, которые вызывали сильный шумъ въ головѣ. Хожденіе не улучшилось. 23. Сильная ломота въ правой ногѣ. Назначено *infuso-decoctum erhedrae* изъ 40,0 на сутки. 25. Боль постоянная въ правой ногѣ, ночью очень сильная. Появилась боль съ внутренней стороны праваго бедра. 27. Боль еще усилилась, появилась въ поясницѣ. Плохо спитъ, ходить труднѣе. *Infuso-decoctum erhedrae* изъ 60,0 на сутки. 28. Ночью очень сильная боль въ правой ногѣ; спалъ плохо. 29. Плохо спалъ, жалуются на сердцѣбіеніе. Боль усилилась, отдаетъ въ правый пахъ и *renis*. Боль въ поясницѣ не даетъ поворотиться. Чувствуетъ себя хуже чѣмъ былъ, когда поступилъ въ больницу. Оставить *infuso-decoctum*. Йодистый калий 4,0 на сутки. Растираніе легучей мазью. 30. Ломота уменьшилась; ходить съ трудомъ. Сердцѣбіеніе. 1 декабря. Боль меньше,

ходить сталъ лучше; боли въ паху нѣтъ. Сердцѣбіенія не бываетъ. 2. Плохо спалъ, ломота усилилась. 5. Боль продолжается, спитъ удовлетворительно. Фурункулозъ. 6. Йодистаго калия 6,0 съ бромистымъ аммоніемъ 4,0 на сутки. Мушка на правую ягодицу. 7, 8 и 9. Чувствуетъ себя лучше, ходить легче. 10. Боль усилилась. Йодистая сыв. Оставить йодистый калий. Далѣе подъ вліяніемъ салолу получилось значительное облегченіе, боли появлялись только временами; ходить сталъ свободнѣе. Однако нога не возвращалась къ нормальному состоянию, и больной еще до сихъ поръ (я посѣтилъ его 27 января) лежитъ въ больницѣ. Температура за все время лежанія въ больницѣ была нормальной. Пульсъ, дыханіе и суточное количество мочи не измѣнились подъ вліяніемъ леченія хвойникомъ. Только во время пріемовъ большихъ дозъ настоетвара пульсъ участился до 84 въ минуту. Больной никогда не потѣлъ. Диаметръ зрачковъ, измѣряемый въ первый періодъ леченія хвойникомъ при искусственномъ освѣщеніи, былъ всегда одинъ и тотъ же (по 6 mm.). Кровяное давленіе въ лѣвой лучевой артеріи держалось постоянно на 125—128 mm. Видъ сфигмограммы не мѣнялся.

3. 2 случая сердечныхъ заболѣваній и одинъ случай хроническаго воспаленія почекъ; леченіе хвойникомъ.

ХСН. Отставной солдатъ Егоръ Г. 52 лѣтъ, банщикъ. Поступилъ 30 ноября 1894 года. Диагнозъ: *Cor lassum*. Боленъ съ годъ одышкою и отеками. На военной службѣ служилъ втеченіе 6 лѣтъ трубачомъ. Недѣли три тому назадъ лежалъ въ Обуховской больницѣ; тамъ одышка и отеки совершенно прошли. 30 ноября. Одышка и кашель по временамъ. Сердце нѣсколько увеличено (лѣвая граница по сосковой линіи); у верхушки и на аортѣ 1-ый тонъ глухъ, на легочной артеріи замѣненъ шумомъ. Сосуды склерозированы. Печень нѣсколько увеличена. Въ легкихъ кое-гдѣ сухіе хрипы. Небольшой отекъ голеней. Назначенъ настой наперстянки изъ 0,3 на сутки. Молочная порція. 2 декабря. Одышка меньше, отеки почти исчезли. 3. Кашель по утрамъ. Въ сердцѣ и легкихъ тѣже явленія; изрѣдка перебои сердца. Отечны обѣ голени до коленъ. Оставить наперстянку. Назначенъ отваръ алтейнаго корня. Мясная порція. 4. Кашель усилился; одышка по старому. Въ легкихъ сухіе хрипы; перебои сердца нѣтъ. 3 Доверовыхъ

порошка (по 0,3) въ день. 5. Одышка меньше, кашель сильный. 7. Одышка только по утрамъ, кашель меньше. Въ сердцѣ же явленія, изрѣдка перебои. Отеки безъ измѣненія. Въ легкихъ сухіе хрипы. Алтайный отваръ оставить. Назначенъ infuso-decoctum erpidae изъ 40,0 на сутки. Одинъ Доверовъ порошокъ въ день. 8. Перебои въ сердцѣ нѣтъ, остальное по старому. Временами ломота въ голенихъ. 9. Рѣзкій шумъ съ 1-мъ тономъ у всѣхъ отверстій сердца; перебои. 10. Отеки по старому, ломота въ ногахъ меньше. По утрамъ хрипитъ въ груди, съ большимъ трудомъ отхаркиваетъ мокроту. 11. Ночью была одышка и кашель. Сердце по прежнему, перебои изрѣдка. 13. Перебои попадаютъ чаще. 14. Тоже. 15. Сегодня ночью былъ сильный кашель и одышка. Въ легкихъ сухіе хрипы. Два Доверовыхъ порошка (по 0,3). 16. Изрѣдка перебои. 18. Рѣзкій шумъ въ сердцѣ, перебои. 19. Одышки не было. Перебои по прежнему. Оставить Доверовы порошки. 20. Перебои рѣже; сердце по прежнему. Ощущеніе боли въ области верхушки сердца. 21. Ночью сильный кашель не давалъ спать; въ легкихъ—жесткое дыханіе и сухіе хрипы. Одинъ Доверовъ порошокъ. 22. Сильный кашель не давалъ спать, одышка (такая же, съ какою онъ припалъ въ больницу). Сердце по старому. Оставить infuso-decoctum. Окружность голени, измѣряемая на одномъ уровнѣ 11, 12, 13, 15, 17, 18 и 21 декабря, за это время увеличилась на 1 см. въ каждой голени. Почти всѣ ночи во время пріемовъ хвойника больной немного потѣлъ. 23. Сухой кашель и тяжесть въ груди, головная боль, слабость. Количество хриповъ въ легкихъ увеличилось. 24. Знобъ и головная боль. Мокрота окрашена кровью (чего прежде никогда не было). Сердце по прежнему. Температура утромъ 38,4. Затѣмъ больной долго не могъ оправиться, и при моемъ посѣщеніи его 27 января я нашолъ его сильно исхудавшимъ. Температура была постоянно нормальна кромѣ повышенія до 37,8—17 декабря и вышеупомянутого—24 декабря. Пульсъ колебался отъ 72 до 84 въ минуту. Число дыханій колебалось отъ 24 до 26 въ минуту кромѣ дней съ повышеніемъ температуры. Количество мочи 2500 кс. за 6 ноября, увеличилось до 2900 кс. за 7 ноября (день назначенія хвойника), отсюда постепенно уменьшалось до 1200 кс. къ 15 декабря и опять увеличивалось до 2500 кс. (17 декабря) и до 3200 кс. (20 декабря); 21 декабря оно было опять меньше (2200 кс.). Кровяное давленіе, измѣ-

ряемое въ лѣвой лучевой артеріи вначалѣ держалось неизмѣнно на 170 мм., а къ 20 декабря уменьшилось до 120 мм. и 23-го даже до 110 мм. Сфигмограмма измѣнила тѣмъ свой видъ, что въ послѣдніе дни леченія хвойникомъ на ней показались вторичные подъемы отъ перебоевъ.

ХСП. Мѣщанка Екатерина Б., дѣвица 44 лѣтъ. Поступила въ больницу 23 февраля 1893 года, лежитъ до сихъ поръ. Диагнозъ: Insufficiencia valvulae bicuspidalis et stenosis ostii venosi sinistri. Большая нѣсколько разъ лежала въ Александровской больницѣ съ этою же болѣзью. Заболѣла 3 года тому назадъ послѣ остраго суставнаго ревматизма. Поступила послѣдній разъ съ явленіями расширеннаго сердца, двумя шумами у верхушки сердца, перебоими, отекомъ ногъ, увеличеніемъ печени, синюхой и уменьшеніемъ мочи. Скоро подъ вліяніемъ леченія наперстянкой синюха, отеки и одышка уменьшились, количество мочи уже черезъ недѣлю возросло до 2000 кс. за сутки. Далѣе теченіе почти двухлѣтняго пребыванія въ больницѣ при уменьшеніи дозы наперстянки или замѣня ея другими слабыми сердечными средствами наступало ухудшеніе состоянія. 7 декабря 1894 года я нашолъ ее въ слѣдующемъ состояніи. Сердце увеличено во всѣхъ размѣрахъ, но рѣзко; у верхушки два рѣзкихъ шума, въ которыхъ весьма трудно разобрать вслѣдствіе частаго сердцебіенія и перебоевъ. Одышка только послѣ ходьбы; отековъ нигдѣ нѣтъ; въ легкихъ кое-гдѣ влажные хрипы; печень немного увеличена, неболѣзненная. Лицо нѣсколько синюшно. Мочи 2000 кс. за сутки. Съ 1 декабря получала настой наперстянки. Стулъ вызывался настоємъ сенны. 8. Отмѣнены всѣ средства и назначенъ отваръ алтейнаго корня. 11. Перебои по прежнему. Границы сердечной тупости: верхняя съ 3 ребра, правая съ середины грудины. Шумы по старому. 13. Отваръ алтейный оставить. Назначено infuso-decoctum erpidae изъ 40,0 на сутки. 14. Безъ измѣненій. 15. Съ ночи усилилась одышка, появилась сильная боль въ области печени и во всемъ животѣ. Перебои въ сердцѣ рѣже. Ночью сильно потѣла. 16. Рѣзкіе перебои. Вчера ночью былъ сильный жаръ, потъ и жажда. Не можетъ ходить отъ слабости. Стулъ нормальный. 17. Одышка усилилась; рѣзкая синюха лица. Остальное по старому. 18. Одышка еще сильнѣе; больная всю ночь провела сиди. Чувствуетъ себя гораздо тяжелѣе. 19. Сильная одышка; не можетъ лежать; аппетитъ про-


паль. Печень рѣзко увеличена, болѣзненна. Сердце по старому. 20. Чувствуетъ себя очень плохо; не спала ночь; утромъ потѣла. Въ сердцѣ тѣ же явленія. Отековъ замѣтныхъ нѣтъ. Больная рѣшительно ничего не ѣсть и не пьетъ, такъ-какъ боится опухнуть. Оставить infuso-decoctum erhedrae. 21. Бѣлокъ въ мочѣ. Одышка по старому. 22. Не спала, всю ночь сидѣла. Ночью былъ жаръ, пота не было. Температура все время была нормальна. Пульсъ 128 въ минуту 8 декабря, упалъ до 104 10-го декабря, постепенно участился до 128 къ 14-ому декабря и такъ держался до конца. Число дыханій вначалѣ было 36 въ минуту (11—15 декаб.), къ 17-ому увеличилось до 48, а къ 19-ому декабря даже до 56 въ минуту. Количество мочи держалось на 2000 кс. за сутки 10—13 декабря, постепенно уменьшилось до 1000 кс. къ 15 декабря и до 300 кс. 19 декабря. Кровяное давленіе въ правой лучевой артеріи вначалѣ держалось на 170 mm., 20 декабря упало до 140 mm. Сфигмограмма послѣдніе дни пользованія болъной хвойникомъ имѣла видъ почти прямой линіи. Послѣ этого неудачнаго опыта больная получила опытъ настой наперстянки и начала медленно поправляться; количество мочи уже черезъ нѣсколько дней увеличилось.

XCIV. Крестьянка Пелагея А. 17 лѣтъ. Диагнозъ: Nephritis chronica. Поступила въ больницу 5 сентября 1894 года въ слѣдующемъ состояніи. Сильно отечны лицо, ноги и руки; животъ вздутъ. Количество мочи 1500 кс. за сутки; въ ней много бѣлка, подъ микроскопомъ гліаиновые и зернистые цилиндры. Подъ вліяніемъ леченія наперстянкой количество мочи скоро увеличилось до 3000 кс. (уд. вѣсѣ 1,006); бѣлка много по прежнему. 20. Отеки не пропадаютъ. Слѣдуетъ леченіе кофейномъ и паровыми ваннами. 3 октября. Отеки ногъ меньше. 13. Мочи 1500 кс., бѣлку много. 23. Кашель. 3 ноября. Голени еще порядочно отечны, лицо одутловато. 9. Бѣлку въ мочѣ много (количество мочи 1500 кс.). 18. Вчера анобило, температура поднялась до 39,5 вечеромъ; болѣла голова и нѣсколько разъ рвало. Отеки увеличились. Съ 15 октября больная была на молочной діетѣ. 3 декабря. Бѣлку въ мочѣ 6‰ по Эсбаху. Въмѣсто молока назначена мясная порція съ двумя стаканами молока. 6 декабря я нашелъ больную въ слѣдующемъ состояніи. Лицо очень блѣдно; сильная отечность вѣкъ и голени; сердце нормально; въ легкихъ въ правомъ

свади выслушиваются сухіе хрипы. Порядочный кашель. Вчера былъ 5 разъ поносъ. Назначенъ отваръ алтейнаго корня; три Доверовыхъ порошка по 0,2. 7. Кашель, спать хорошо. Въ легкихъ сухіе и влажные хрипы. 8. Кашель меньше. Лицо отекло сильнѣе, голени по старому. Оставить отваръ алтейнаго корня. Назначенъ infuso-decoctum erhedrae изъ 40,0 на сутки. 9. Кашель меньше. Отеки на лицѣ усилились. Со вчерашняго дня головокруженіе, потѣть по вечерамъ. 10. Вѣки сильно отечны; кашля почти нѣтъ. 11. Кашля нѣтъ. Утромъ было головокруженіе; по вечерамъ больная чувствуетъ жаръ въ головѣ. Доверовы порошки оставить. Стулъ все это время нормальный. 13. Стула не было. Отеки вѣкъ по прежнему. Клизма. 14. Бѣлка въ мочѣ по Эсбаху 7‰. 15. Сильно ломило лѣвую голень, боль не давала спать. Боль въ животѣ. Температура вечеромъ 38,3. 16. Вчера былъ стулъ жидкій 3 раза, рвота 2 раза; боль въ животѣ (больная вслѣдствіе сильной жажды выпила вчера много воды). Согрѣвающій компрессъ на животъ; 2 раза въ день по 5 капель опійной настойки. 17. Стулъ жидкій и рвота по 1 разу. Вѣки опали. Головокруженіе и тошнота, боль въ животѣ меньше. 19. Стулъ нормальный; животъ почти не болитъ; вѣки мало отечны. Опій оставить. 20. Тоже. Бѣлку въ мочѣ по Эсбаху болѣе 7‰. (За сутки 1700 кс. мочи). 21. Опять сильный отекъ лица. 22. Тоже. Оставить infuso-decoctum erhedrae. Бѣлку въ мочѣ гораздо болѣе 7‰ (въ суточномъ количествѣ 1400 кс. мочи). 23. Вѣки нѣсколько отечны. Вчера не потѣла. 24. Тоже. Бѣлку въ мочѣ, разбавленной водою вдвое, по Эсбаху больше 7‰ (слѣдовательно болѣе 14‰). Окружность голени, измѣряемая на одномъ уровнѣ 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21 и 24 декабря, была одна и таже (по 35 см.). Температура была все время нормальна за исключеніемъ двухъ дней (15 и 16 декабря), когда былъ приступъ поноса и рвоты. Пульсъ колебался отъ 64 до 84 въ минуту, весьма рѣзко участился 16 декабря (до 108) и упалъ до 80 на слѣдующій день и до 60 къ 22 декабря. Число дыханій колебалось отъ 25 до 30 въ минуту и увеличилось до 36 12-го и затѣмъ 16 декабря. Количество мочи держалось на 1000 кс. 6—11 декабря; 12—17 декабря оно было по 1500 кс. за сутки; 18 декабря дошло до 2350 кс.; далѣе постепенно уменьшилось до 2000 кс. 21-го и до 1700 кс. за 23 декабря. Больная все ночи

во время леченія ягоднымъ хвойникомъ потѣла, тогда какъ прежде этого не было. Кровяное давленіе въ лѣвой лучевой артеріи колебалось отъ 120 до 125 мм.; видъ сфигмограммы измѣнился замѣтно только 21 декабря, когда подъемъ волны сдѣлался болѣе рѣзкимъ, а паденіе болѣе медленнымъ (соотвѣтственно этому пульсъ 64 въ минуту).

При посѣщеніи моемъ больницы 27 января я засталъ больную въ прежнемъ состояніи.



Положенія.

1) Иодистый калий переносится гораздо лучше, если его соединять съ бромистымъ аммоніемъ.

2) Противъ рвоты у холерныхъ больныхъ хорошо помогаетъ сѣрный эфиръ по 10—15 капель на пріемъ.

3) При леченіи холернаго больного прекрасно вліяетъ сильное отвлеченіе къ конечностямъ, въ видѣ приложенія горчичниковъ. Весьма вѣроятно, что внутривенныя вливанія физиологическаго раствора поваренной соли будутъ дѣйствовать лучше, если ихъ соединить съ энергическимъ отвлекающимъ леченіемъ.

4) Не мѣшало бы посредствомъ узаконеній запретить или, по крайней мѣрѣ, затруднить браки между людьми, ненормальными въ психическомъ отношеніи или страдающими нервными разстройствами.

5) Общія сѣтованія на недостатокъ врачебной помощи въ деревнѣ справедливы. Слѣдовало бы обратить на это вниманіе и увеличить количество земскихъ врачей, уменьшивъ участки, находяшіеся въ ихъ завѣдованіи.

6) Пора уже отстать отъ рутины систематическаго забиванія молодежи древними языками. Обязательное изученіе ихъ для полученія доступа къ высшему образованію не соответствуетъ общему прогрессу.

7) Психическое вліяніе при леченіи больныхъ имѣетъ огромное значеніе, на что нужно обратить вниманіе при испытаніи новыхъ средствъ.

8) Салициловый натръ въ дозѣ 4,0—8,0 въ сутки представляетъ хорошее средство при леченіи первичнаго сывороточнаго выпотного плеврита.

Curriculum vitae.

Потомственный дворянинъ Николай Николаевичъ Вестенрикъ, сынъ преподавателя русской словесности, православнаго вѣроисповѣданія, родился въ С.-Петербургѣ въ 1869 году. Среднее образованіе получилъ въ 3 С.-Петербургской классической гимназіи, которую окончилъ въ 1887 году съ серебряною медалью.

Въ томъ же году поступилъ на первый курсъ Императорской Военно-Медицинской Академіи. Весною 1892 года былъ командированъ отъ Комитета Наслѣдника Цесаревича въ Самарскую губернію для борьбы съ эпидеміями скорбута и сыпного тифа, тамъ же остался и во время развившейся эпидеміи холеры.

Проведя болѣе 6 мѣсяцевъ въ командировкѣ, вернулся въ Октябрѣ того же года въ Петербургъ продолжать выпускные экзамены. Окончилъ Академію съ отличіемъ въ Февралѣ 1893 года и Высочайшимъ Приказомъ отъ 7 Марта былъ назначенъ младшимъ врачомъ въ Кадръ № 3 Кавалерійскаго Запаса. До отправления въ свою часть успѣлъ сдать докторантскіе экзамены.

Въ Августѣ того же года переведенъ тѣмъ же званіемъ въ 17 Флотскій Экипажъ, въ которомъ состоитъ и понынѣ. Въ Сентябрѣ 1894 года прикомандированъ на зимніе мѣсяцы до открытія навигаціи къ Петербургскому порту для занятій въ Военно-Медицинской Академіи.

Сочиненіе подъ названіемъ „о лечебномъ значеніи ягоднаго хвойника (*ephedra vulgaris*)“ представляетъ въ качествѣ диссертациі на степень доктора медицины.
