

Рябоконе Е.Н., Стеблянке Л.В., Баглык Т.В., Гурьева Т.Е., Кирсанова А.В.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЬЗАМА «ВИТАОН» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

Харьковский национальный медицинский университет

В настоящее время при выборе препаратов для лечения заболеваний СОПР все чаще предпочтение отдают лекарственным средствам растительного происхождения в сочетании с традиционной терапией.

Целью нашего исследования явилось изучение клинической эффективности бальзама «Витаон» для полости рта (ООО «Литомед», г. Москва) при лечении заболеваний СОПР.

Материалы и методы. В состав бальзама «Витаон» входят растительные экстракты и эфирные масла с высоким содержанием биологически активных веществ.

Нами проведено комплексное лечение 32-х больных обоего пола в возрасте 24 - 58 лет, из них с хроническим рецидивирующим герпесом (ХРГ) - 12 человек, хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом (ХРАС) — 8 человек, язвенно-некротическим гингиво-стоматитом (ЯНГС) - 3 человека, травматическими поражениями полости рта — 9 человек. Обследование всех больных проводили традиционными клиническими методами. Диагноз устанавливали на основании жалоб больных, данных анамнеза, объективных и дополнительных методов исследования.

После проведения гигиены полости рта, удаления зубных отложений,

устранения травмирующих факторов на пораженные участки СОПР наносили бальзам «Витаон» для полости рта в виде аппликаций на 5-8 минут. Больных обучали гигиене полости рта и рекомендовали в домашних условиях 4-6 раз в день проводить самостоятельно аппликации или полоскания полости рта с использованием бальзама.

Оценку эффективности препарата проводили на основании субъективных данных и динамики результатов клинических наблюдений.

Результаты исследований. Полученные нами результаты исследований показали, что положительная динамика в клиническом течении указанных заболеваний отмечена в 100% случаев. Уже на следующие сутки после применения бальзама «Витаон» для полости рта все больные отмечали улучшение состояния: за счет уменьшения болевых ощущений облегчался приём пищи при эрозивно-язвенных поражениях СОПР, исчезал неприятный запах и дискомфорт в полости рта. Побочных эффектов при использовании данного фитопрепарата не было выявлено ни в одном случае. Эпителизация эрозивных поражений СОПР наблюдалась уже на 3-4 сутки.

Выводы. Таким образом, проведение лечения с использованием бальзама «Витаон» для полости рта явилось рациональным и эффективным в комплексном лечении заболеваний СОПР, что позволяет рекомендовать его для применения в

стоматологической практике.