

Міністерство охорони здоров'я України
Харківський національний медичний університет



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕЙРОНАУК

ЗБІРНИК ТЕЗ

МІЖВУЗІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Харків, 2015

УДК 616.89

А43 Актуальні питання нейронаук: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків 29 квітня 2015 р.) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет - Харків:
- 2015.-48 с

За редакцією професора В.М. ЛІСОВОГО

Відповідальний за випуск професор Г.М. Кожина

Друкується за рішенням вченої ради Харківського національного медичного університету (протокол № 4 від 16 квітня 2015 р.).

Відповідальність за якість та достовірність матеріалів несуть автори публікацій.

Гебефреническая форма шизофрении.

Батовская А.О.

Харьковский национальный медицинский университет.

В настоящее время ранняя диагностика и лечение гебефренической формы шизофрении является одной из актуальных медико-социальных проблем современной психиатрии. Медико-социальная значимость проблемы заключается в том, что гебефреническая форма является одной из наиболее злокачественных и отличается наибольшей резистентностью к психофармакотерапии.

Целью исследования стало выявление наиболее частых факторов риска и характерных черт у больных гебефренической формой шизофрении.

Для исследования была сформирована группа пациентов из 6 человек в возрасте от 18 до 47 лет с диагнозом шизофрения гебефреническая, проходящими курс в 1-м и 2-м психиатрических отделениях ХОКПБ № 3.

Были подробно проанализированы архивная документация и анамнестические данные пациентов. Установлено, что среди данной выборки наиболее частыми факторами риска развития гебефренической формы шизофрении являются: наследственность, инфекции матери во время беременности, детские психологические травмы. Присутствовали характерные проявления в детском возрасте: зависимость от родителей, необщительность, чрезмерная чувствительность, стойкие асоциальные черты. У одного пациента заболевание начиналось с проблем в поведении: непослушание и ранние сексуальные контакты.

Вывод. Благодаря полученным результатам можно сделать вывод о полиэтиологичности и различных патомеханизмах гебефренической формы шизофрении. Дальнейшее изучение данного вопроса является актуальной темой для научных поисков.